

معالجات

جلد سوم

(حمیات، حمیات خلطیہ و امراض متعدی)

وسیم احمد اعظمی



بقیہ کتب سنبلہ فی فروع اربعہ بنائے دہا

معالجات

جلد اول

(امراض نظام اعصاب و دوران خون و تنفس)

حکیم وسیم احمد اعظمی



قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویسٹ بلاک - 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110 066

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

1992	:	پہلی اشاعت
2008	:	تیسری طباعت
1100	:	تعداد
73/- روپے	:	قیمت
675	:	سلسلہ مطبوعات

Moalijat Vol. I

By Wasim Ahmad Azmi

ISBN : 81-7587-255-1

ناشر: ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی۔ 110066
فون نمبر: 26103381، 26179657، 26108159، فیکس: 26103938
ای۔ میل: urducouncil@gmail.com، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in
طابع: میکاف پرنٹرس، 2847، بلیلی خانہ، ترکمان گیٹ، دہلی۔ 110 006

پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دو خداداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مخفی عوامل سے آگہی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبروں کے علاوہ، خدا سیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشکیل و تعمیر سے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر وسیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کا فن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر پھیپائی کا فن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقہ اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور

پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے سمجھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول اس ہر دلنیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تنقیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یہ امر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپنی تشکیل کے بعد قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قارئین نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔

اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خامی روگئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کردی جائے۔

ڈاکٹر علی جاوید
ڈائریکٹر

تہذیب

میں اس کتاب کو داد اچان جناب اختر علی صاحب مرحوم کے نام۔
منسوب کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، خدا ان کو اپنے جوار
رحمت میں جگہ دے۔ آمین!

وسیم احمد اعظمی

Learn Unani By Abdul Waris Salman

ترتیب

۱۳	ابتدائیہ
۱۵	امراض نظام اعصاب
۱۶	نظام اعصاب کی مختصر تشریح و منافع
۲۳	۱. امراض دماغ
	صداع
۲۴	صداع کی اقسام
۲۸	صداع حار سازج
۲۹	صداع بارد سازج
۳۱	صداع دُموی
۳۵	صداع صفراوی
۳۸	صداع بلغمی
۴۰	صداع سوداوی
۴۲	صداع یرنجی عصبی
۴۳	صداع معدی صفراوی
۴۵	صداع معدی بلغمی
۴۷	صداع معدی سوداوی
۴۸	صداع فصعت دماغی
۵۰	صداع حسی
۵۱	صداع خفہ

53	صدراعجمی
54	صدراعجامی
55	صدراعخاری
56	صدراعبخاری
57	صدراعفری
59	صدراعبینہ خودہ
61	صدراعبحانی
63	صدراعشمی
64	صدراعسری
65	صدراعدودی
66	صدراعضعف معدی و دکاوت حسن معدی
67	صدراعشرکی
69	عصابہ
72	شقیقہ
78	سرسام
89	سرسام دماغی نخاعی
93	سدر
98	دوار
105	قوما
111	جمود و شخوص
114	سہر
119	مانیا
124	کابوس
128	مالینولیا
136	مالینولیا مراقی

140	قطرب
142	صبارا
143	مرع
154	فالج
158	فالج النصفی
163	استرخاء جسم اسفل
168	استرخاء
170	لقوه
176	خدر
178	تشنج
187	رعشه
192	رقاص
195	اختلاج
197	فريضة الشمس
200	سكتة
206	خراج دماغ
209	تليين دماغ
212	ترجيع دماغ
215	استلاء دماغ
217	سلعات دماغ
223	سدود دماغ
226	فقر دماغ
231	فصط دماغ
233	سب، امراض نخاع
234	التهاب نخاع

234	التهاب الغشاء المخاطي
243	نزف نخاعي
244	سلو نخاع
246	هزال نخاع
250	تغلب نخاع
255	ضعف اعصاب
258	التهاب اعصاب
261	وجع الاعصاب
266	امراض نظام دوران خون
267	نظام دوران خون کی مختصر تشریح و منافع
271	د۱، امراض قلب
272	وجع القلب
279	سرعت قلب
283	بطور قلب
287	ارتعاش اذن قلب
289	استسقاء غلاف قلب
291	التهاب بطانة قلب
298	التهاب غلاف قلب
307	التهاب عضلة قلب
311	اتساع قلب
314	عظم قلب
316	مینوتت قلب
322	ارتعاج قشار دم
327	خفقانہ
338	غشی

344	دب، امراض صمامات قلب و اوعیہ خون
345	تقبقر اور لی
348	تفیق اور لی
351	تقبقر صمام تاجی
353	تفیق صمام تاجی
357	مکلس شرایین
360	تعلب شرایین
364	تخثر الدم قلبی
366	انورسا
370	امراض نظام تنفس
371	نظام تنفس کی محقر تشیخ و منافع
374	دل امراض ریہ
375	فصیق النفس
384	ذات الریہ
396	ذات الجنب
404	آتاع شعب
408	انتفاخ الریہ
414	تدرن ریہ
424	التهاب شعب
430	نفث الدم
437	شہیقہ
442	دب، امراض صدر
443	تقبقر الصدر
446	جمود الصدر
448	استسقاء الصدر
452	مصادر

Learn Unani By Abdul Waris Salman

ابتدائیہ

میرے زمانہ طالب علمی میں طب کی نصابی کتابوں کا حصول ایک دشوار گزار عمل تھا ، تلاش بسیار کے بعد بالفرض دو چار کتابیں مل بھی جاتیں تو مباحث کے اختصار یا غیر ضروری طوالت کا شکوہ بہ حال رہتا۔۔۔ تاہم ادھر چند سالوں میں جہاں یونانی طب کے مختلف شعبوں میں تحقیق و جستجو کے زحمان کا احیا ہوا ہے وہیں اس فن کے حاملین میں نصابی ضرورتوں کی تکمیل کا احساس بیدار ہوا ہے اور ذائقہ کے علاوہ ریاستی اکادمیوں کے مالی اشتراک اور ترقی اردو بیورو (نئی دہلی) وغیرہ سے نصابی کتابیں شایع ہو رہی ہیں۔۔۔ خدا کرے وہ دور جلد آئے جب اس فن کے طالبین کے لیے نصابی کتابوں کا حصول کوئی مسئلہ نہ رہے اور یہ لوگ دیگر طریقہ ہائے علاج کے طالبین کی طرح فنی و نصابی کتابوں کے انتخاب کی لذت سے آشنا اور لطف اندوز ہوں،۔۔۔ معالجات (امراض نظام اعصاب و دوران خون و تنفس) کی تالیف میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔

”معالجات“ پر میری یہ دوسری طبی تالیف ہے۔ اس کتاب کی زبان کو آسان اور عام ہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاہم ایک فنی اور تکنیکی کتاب اور عام موضوع کی کتاب کی زبان میں تفریق کا قائل ضرور ہوں، اور یہ بات تالیف کے ہر مرحلے میں میرے تحت الشعور میں رہی ہے۔

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی فہرست ”مصادر“ کے ذیل میں تحریر ہے تاہم یہاں چند کتابوں کا تذکرہ خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں، قدیم ماخذ

میں کامل الصنائع، المحامی الکبیر فی الطب اور القانون فی الطب کے علاوہ سید اسماعیل جرجانی کی کتاب ذخیرہ خوارزم شاہی اور حکیم محمد اعظم خاں کی اکیر اعظم نے مجھ کو خاص طور سے متاثر کیا ہے، ان کتابوں سے طب یونانی کا نظریہ سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے، اردو کتابوں میں حکیم محمد کبیر الدین کا شرح اسباب کا ترجمہ (ترجمہ کبیر)، حکیم غلام جیلانی کی مخزن حکمت، حکیم محمد سعید کی تجربات طبیب، حکیم نذیر الدین احمد کی فروق الامراض اور ڈاکٹر صادق حسین کی کامل التشنیص نے مجھے کافی متاثر کیا ہے چنانچہ اس بات کے اعتراف میں ذرا بھی جھجھک نہیں کران حشرات سے اثر پذیر میری کا عکس میری تحریر بھی ہو سکتا ہے۔

سہایت مرض، اسباب اور علامات کے لیے جدید طریقہ علاج کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، لیکن علاج کے ذیل میں صرف یونانی طریقہ علاج تحریر کیا گیا ہے اور لکھنؤ طبی اسکول کی پیروی کرتے ہوئے علاج بالمفردات کو ترجیح دی گئی ہے۔

اس کتاب کو طلبہ اور اساتذہ کے لیے مفید بنانے کی اپنی سی سعی فردر کی ہے تاہم بشری تقاضوں کے تحت غلطیوں کے امکانات بہر حال ہیں، اس سلسلے میں مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔

آخر میں ان تمام بزرگ اور لو جو ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کا تعاون کسی نہ کسی صورت میں حاصل رہا ہے۔ ان میں حکیم خورشید احمد شفقت اعظمی، حکیم سید محمد حسان نگرانی، حکیم ملک دامت امین، ڈاکٹر اقبال احمد قاسمی اور برادر عزیز دانش احمد اعظمی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ————— اپنی شریک حیات سلطانہ وسیم کا تذکرہ اس حیثیت سے فردر کردوں کہ انھوں نے کتاب کی ترتیب و ترویج کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔

وسیم احمد اعظمی

امراض نظام اعصاب

Learn Unani By Abdul Waris Salman

نظام اعصاب مختصر تشریح و منافع

NERVOUS SYSTEM ANATOMY AND PHYSIOLOGY

نظام عصبی دراصل ایک پیچیدہ نظام ہے، اس نظام سے جسم کے مختلف اعضاء اور حصوں میں باقاعدگی اور نظم پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظام دو حصوں پر مشتمل ہے۔

I: دماغی نخاعی عصبی نظام Cerebro-Spinal Nervous System

اس میں دماغ، نخاع اور ان سے نکلنے والے اعصاب شامل ہیں

II: شرکی عصبی نظام Sympathetic Nervous System

اس میں وہ عقدہ عصبی شامل ہیں جو صلب کے سامنے دونوں جانب، فقرات سے نکل کر عظم العصعص تک جاتے ہیں، ان عقدہ دگرہوں سے عصبی ریشے نکل کر قلب، معدہ، امعاء، کبد، طحال، شکم اور صدر کے اندرونی اعضاء میں جاتے ہیں اور ان اعضاء کی شرائین میں حسب ضرورت انقباض و انبساط کا فعل انجام دیتے ہیں۔

دماغی نخاعی عصبی نظام

یہ ایک متناخل، نرم اور سفید، زردی مائل عضو ہے جو تین غلافوں میں پوشیدہ ہو کر دماغ | تحف کے جوف میں رہتا ہے اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے، اس کا قاعدہ سامنے، پیشانی کی طرف اور زاویہ پچھلی جانب، عظم قحدرہ کے قریب ہوتا ہے۔ دماغ کو درج ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(I) مقدم دماغ Cerebrum

(II) وسط دماغ Mid Brain

(III) موخر دماغ Cerebellum

Medulla Oblongata

دماغ راس انخلاع

دماغ کے ان حصوں میں چند خلا بھی ہیں، جن کو بطون Ventrices کہتے ہیں۔
درج ذیل ہیں :

Lateral Ventricles

(I) بطن اول
(II) بطن ثانی

Third Ventricles

(III) بطن ثالث

Fourth Ventricles

(IV) بطن رابع

تشریح :- یہ دماغ کی سب سے بڑی، بیضوی ساخت کا حصہ ہے، اس کا اگلا
مقدم دماغ | حصہ پچھلے حصہ کے مقابلہ میں کسی قدر تنگ ہوتا ہے۔ یہ فرج مستطیل
Longitudinal Cerebral Fissure کے ذریعہ دو حصوں میں منقسم ہے اور ہر ایک
حصہ کو نصف کرہ Hemisphere کہتے ہیں، دونوں نصف کرے ایک سفید ساخت
Corpus Callosum کے ذریعہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ مقدم دماغ
میں بالائی اندرونی اور زیریں تین سطحیں بھی ہیں۔ ہر نصف کرہ کی بیرونی سطح محراب اور اندرونی
سطح کسی قدر مقعر ہوتی ہے۔ ان میں متعدد تزارید یا تلافیف Convolutions اور
فجرات Sulcus Or Fissures ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہر نصف کرہ کی بیرونی سطح
پر پانچ بڑے فصوں (لوٹھڑے - Lobes) بھی ہوتے ہیں۔

مقدم دماغ کے منافع درج ذیل ہیں

منافع | (I) محیطی نشیبوں اور فرازوں میں بہت پیچیدہ قومہائے منعکس ہوتے ہیں۔

(II) حس کا مرکز (شگاف رولنڈو کے پیچھے)

(III) حرکت کے مراکز (شگاف رولنڈو کے آگے)

(IV) مراکز بصارت (پچھلے حصہ میں)

(V) مراکز سماعت (صدغی نشیب و فراز میں)

(VI) مراکز تکلم (اگلے حصہ میں)

(VII) مراکز خیالات (جانبی نشیب و فراز میں)

(VIII) مراکز مشغولی (شگاف سلوین کی تہ میں)

یہ تمام مراکز عصبی ریشوں کے ذریعہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

تشریح :- یہ عظم و قندری Sphenoid Bone کے جسم اور عظم قحدرہ
اوسط دماغ | Occipital Bone کے زائئہ مربع پر رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعہ اجزاء
 دماغ باہم ملتے ہیں، چنانچہ بالائی طرف مقدم دماغ، نیچے راس النخا اور پیچھے موخر دماغ واقع ہے۔
 I, راس النخاع کے افعال میں معاونت، مثلاً سانس لینے، بولنے اور نگلنے میں مدد دینا
منافع | II, مرکز اعصاب حرکتی، مثلاً عضلات مضغ Mastication 'عضلات راس

اور عدد لعابہ کے عضلات وغیرہ

III, مقدم راس، منہ، آنکھ، ناک، حنک، زبان دانتوں اور تین لوز کا مرکز جس۔

IV, ملتجی اور سامعی حس منعکس ہوتی ہیں۔

تشریح :- یہ بین البطنین کے نیچے قحدرہ کے زیریں حفرہ Posterior
موخر دماغ | Cranial Fossa کے فرش پر واقع ہے۔ ایک درمیانی شکاف کے ذریعہ یہ
 حصہ دماغ بھی دو جانبی لوتھڑوں میں منقسم ہے، موخر دماغ کی بالائی سطح کے وسط میں ابھار ہوتا ہے
 جس کے ذریعہ یہ دونوں لوتھڑے باہم ملے رہتے ہیں۔

اس کی سطح کسی قدر چمٹی ہوتی ہے اور اس میں متعدد متوازی ابھار ہوتے ہیں جو شکافوں کے
 ذریعہ ایک دوسرے سے علاحدہ ہوتے ہیں، شکاف اندر کی طرف اگر شاخ در شاخ تقسیم ہو جاتے
 ہیں اور دماغ کو متعدد دھوٹے بڑے لوتھڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔

منافع | I, حرکات و سکنات کو ترتیب دینا

تشریح :- یہ دراصل نخاع کا بالائی، موٹا حصہ ہے جو گردن کے پہلے مہرہ کے
راس النخاع | بالائی کنارے سے اوسط دماغ کے زیریں کنارے تک پھیلا ہوا ہے، اس
 کی اعلیٰ سطح عظم قحدرہ کے زائئہ مربع کی نالی میں ہوتی ہے اور پچھلی سطح موخر دماغ کے دونوں حصوں کے
 درمیان ہوتی ہے، اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ دماغ کے دوڑنے حصوں کے برعکس
 خاکی مادہ مبدأ النخاع میں اندر اور سفید مادہ باہر کی جانب ہوتا ہے۔

راس النخاع کو نظام اعصاب میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کی ایک بڑی
منافع | وجہ یہ ہے کہ نخاع سے دماغ تک جتنے بھی عصبی ریشے جاتے ہیں وہ سب اس کے اندر

سے ہو کر جاتے ہیں — چنانچہ یہ

I. حیات انسانی کے لیے نہایت ضروری ہے

II. قوائے نفسانہ، تنفس، دوران خون، کھانے پینے اور امعاء کی حس و حرکت پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔

III. بعض قوسہائے منکسر، اسی میں تکمیل پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً مکھن، قے کرنا اور کھانا وغیرہ۔

IV. دماغ کی طرح یہ بھی تین غشاؤں میں ملفوف ہے اور مجری الفقرات Vertebral Canal

نخاع | میں رہتا ہے۔ یہ راس النخاع سے شروع ہو کر بارہویں صدری

مہرے اور پہلے قطنی مہروں کے زائیدوں کے درمیان تک چلا گیا ہے تاہم اس کی اغشیہ دوسرے مجری

مہرے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ نخاع، قطنی اور عُنقی فقرات کے بالمقابل زیادہ پھیل جاتا ہے چنانچہ

عُنقی پھیلاؤ پانچویں، چھٹے عُنقی فقرے میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح قطنی کشادگی دسویں گیارہویں

صدری فقرات کے بالمقابل زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ نخاع دراصل عصبی مادہ کا ایک

بڑا ستون ہے جس کے دونوں جانب سے بہت سے ایسے اعصاب خارج ہوتے ہیں جو ارادی اور

حسی حرکات میں معاون ہوتے ہیں۔

I. یہ بازوؤں، ٹانگوں، کمر اور گردن کی حرکات پر براہ راست قابو رکھتا ہے۔

II. حشائے افعال کو ترتیب دیتا ہے۔

III. سر کے علاوہ جسم کی تمام عصبی تحریکات کی گذرگاہ ہے۔

IV. حرکات منکسر کا مرکز ہے۔

V. جسم کے بہت سے حصوں سے تحریکات قبول کرتا ہے اور ان کو منقبض کر کے ان کے

اصل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔

VI. عضلات کے تغذیہ پر منبسط رکھتا ہے۔

میدان کے لحاظ سے اعصاب کی دو قسمیں ہیں

اعصاب کی اقسام | I. اعصاب دماغیہ Cranial Nerves

II. اعصاب نخاعیہ Spinal Nerves

دماغ کی زیریں سطح سے اعصاب کے بارہ جوڑے نکلتے ہیں جو ناک، آنکھ،

اعصاب دماغیہ | زبان، کان اور اس کے دوسرے قریبی اعضاء میں پھیلتے ہیں۔ جن اعضاء کو

یہ عصبی جوڑے پرورش کرتے ہیں ان ہی کے فعل یا نام کی مناسبت سے ان کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ مثلاً عصب شامہ، عصب بصری، عصب محرک العین، عصب بکری وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دماغی اعصاب میں سے اکثر اعصاب خالصاً حسی ہوتے ہیں اور بعض خالصاً حرکتی اور بعض مرکب ہوتے ہیں۔

اعصاب دماغیہ کے اسماء درج ذیل ہیں:

(I) عصب شامہ :-

یہ ایک حسی عصب ہے جو ناک کی غشاء مخاطی میں ختم ہوتا ہے اور خوشبو و بدبو کی حس کو منتقل کرتا ہے۔

(II) عصب بصری :-

عصب کا یہ جوڑا آنکھ کے ڈھیلے میں جاتا ہے، یہ جوڑا ابھی خالصاً حسی ہے۔

(III) عصب محرک العین :-

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ آنکھوں کو حرکت دیتا ہے، یہ خالصاً حرکتی ہے۔

(IV) عصب بکری :-

یہ آنکھ کو نیچے اور باہر کی جانب گھمایا کرتا ہے، یہ خالصاً حرکتی جوڑا ہے۔

(V) عصب مبعده :-

یہ آنکھوں کو باہر کی طرف گھماتا ہے، یہ خالصاً حرکتی ہے۔

(VI) عصب مرکب / توامی ثلاثی :-

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ تین شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک شاخ حسی ہوتی ہے جو آنکھ کے ڈھیلے، منہ، ناک، دانتوں اور رخساروں کے گرد پھیلتی ہوئی زبان کی اگلی سطح پر تمام ہوتی ہے۔ یہی عصب چشم اور چہرہ کے عصبی اوجاع اور ذائقہ کا احساس، مرکز کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اس کی دوسری دو شاخیں حرکتی ہیں اور چبلنے کے وقت جبرطے کو حرکت دینے والے عضلات میں پھیلتی ہیں۔

(VII) عصب وچہبی :-

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ چہرہ کے عضلات سے تعلق رکھتا ہے، یہ خالصاً حرکتی عصب ہے اور چہرے کے تمام عضلات، زبان، تالو، حلق اور کان کے عضلات کو حرکت میں لاتا ہے۔

۷۷۷ عصب سامو :-

یہ حسی عصب ہے اور کان کے اندر دنی حقہ میں پھیلتا ہے، اور شنوائی کا خاص عصب ہے۔

۷۷۸ عصب مرکب / عصب لسانی بلعومی :-

اس عصب کی ایک شاخ حسی ہے اور زبان کے پچھلے حقہ میں پھیل کر ذائقہ کے احساس میں معاونت کرتی ہے اور دوسری شاخ حرکت کی ہے جو نعلتہ وقت کام کرنے والے حنجہ کے عضلات میں حرکت لاتی ہے۔

۷۷۹ عصب مرکب / عصب طواف / عصب راجح :-

یہ عصب پیمپھڑوں، قلب، جگر اور معده میں جاتا ہے اور معده کی طرف آکر پھر لوٹا جاتا ہے۔

۷۸۰ عصب نخاعی اضافی

یہ گردن کے بعض عضلات (حلق و حنجہ) میں پھیلتا ہے اور حرکت کی عصب ہے۔ اس کا ایک اور حقہ عضلا قص، حلیمہ اور عضلا منحرف کو حرکتی ریشے دیتا ہے۔

۷۸۱ عصب تحت اللسان :-

یہ زبان کے عضلات میں پھیلتا ہے اور حرکت کی عصب ہے۔

اعصاب نخاعیہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نخاع سے خارج ہوتے ہیں اور اعصاب نخاعیہ | یہ ۳۱ جوڑے ہیں — ۸ اعصاب عنقیہ، ۱۲ اعصاب ظہریہ، ۵ اعصاب قطنیہ، ۵ اعصاب عجزیہ اور ۱ عصب عصعصیہ۔

۷۸۲ اعصاب عنقیہ :- Servical Nerves

جیسا کہ مذکور ہوا۔ یہ آٹھ جوڑے ہیں، گردن کے مقام پر نخاع سے نکلتے ہیں اور ان کی شاخیں قطن کی جلد، فقاہ، چہرے، ترقوہ، کندھے، عضلات صدر، جلد، بازو اور کلائی کے درمیان اور اندرونی عضلات میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔

۷۸۳ اعصاب ظہریہ :- Dorsal Nerves

یہ بارہ جوڑے ہیں اور مقام پشت پر نخاع سے نکلتے ہیں یہ صدر و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتے ہیں۔

۷۸۴ اعصاب قطنیہ :- Lumber Nerves

یہ پانچ جوڑے ہیں جو کمر کے مقام پر نخاع سے خارج ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں صدر و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔

۱۔ اعصاب عجزیہ :- Sacral Nerves

یہ پانچ جوڑے ہیں جو نخاع سے نکل کر عظم العجز Sacrum سے باہر آتے ہیں۔ ان کی شاخیں فخذ اور پیر کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔

۲۔ اعصاب عصومہ :- Coccyx Nerves

یہ جوڑا عظم العصومہ میں ہوتا ہے۔

(ب) افعال و منافع کے اعتبار سے بھی اعصاب کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ اعصاب محسّہ :- Sensory Nerves

۲۔ اعصاب محرکہ :- Motors Nerves

یہ وہ اعصاب ہیں جن کے ذریعہ حرارت، برودت اور لینت و صلابت وغیرہ کا اعصاب محسّہ | احساس ہوتا ہے، انہی اعصاب کے ذریعہ جملہ خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتے ہیں اور عقل کو خارجی اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔

ان اعصاب کے ذریعہ عصبی مراکز کے تاثرات ان حصوں تک جلتے ہیں جہاں اعصاب محرکہ | ان کی شاخیں تمام ہوتی ہیں۔ ان اعصاب کے ذریعہ عضلات میں انقباض پیدا ہوتا ہے اور تغذیہ، نمو اور رطوبات کے اخراج کے فعل میں مدد ملتی ہے۔

۱۔ اعصاب عصبی نظام | یہ ایک سلسلہ پر مبنی ہے جس میں کثیر تعداد میں عصبی عقدہ عصبی گروہیں ہوتے ہیں۔ یہ سلسلے عمود الفقار کے دونوں جانب لگے حصے میں ہیں۔

ان عصبی عقدے کچھ شاخیں نکل کر عروق دمویہ اور اندرونی اعضاء میں جاتی ہیں اور ان کے ریشے بدن کے مختلف حصوں میں حال کی مانند پھیل جاتے ہیں اور قلب، پیپسرے، معدہ، مثانہ، امعاء اور جوف شکم کے بعض دوسرے اعضاء پر تھوڑا بہت اقتدار رکھتے ہیں۔

د. امراض دماغ

Learn Unani By Abdul Waris Salman

صداع


HEADACHE

اس مرض میں سر کے اعضاء میں درد اور الم ہوتا ہے اور بعض مفطرب و پریشان ہو جاتا ہے واضح رہے کہ صداع عام طور سے دوسرے امراض میں بطور عرض پیدا ہوا کرتا ہے۔

اقسام


(۱) غیر مادہ اور مادہ کے اعتبار سے چند مشہور اقسام

تقسیم اولیٰ



دب، محل وقوع کے اعتبار سے

تقسیم باعتبار محل وقوع



ملہ ملہ کلاں کوہ علیحدہ سے آئندہ صفحات میں کیا گیا ہے۔

صداع حار ساذج

SIMPLE HOT HEADACHE

اس مرض میں بغیر کسی مادہ کے محض حرارت پہنچنے یا تفرق اتعال سے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب کی دو انواع ہیں

(II) خارجی

(I) داخلی

(أ) داخلی :-

(I) گرم دواؤں کا استعمال مثلاً :-

(I) فلفل

(II) نانخواہ

(III) حلبہ

(IV) زنجبیل

(II) دماغ کو نقصان پہونچانے والی غذاؤں کا استعمال :-

(I) خردل (رائی)

(II) پیاز

(III) اخروٹ کہنہ

(IV) کلونجی

(V) لہسن

(III) دماغ کی طرف بخارات کا صعود کرنا :-

(IV) فساد مزاج دماغ

(V) حدت خون

(ب) خارجی :-

(I) دھوپ میں دیر تک قیام کرنا / زیر اثر رہنا

(II) حرارت کے زیر اثر رہنا

- III, زیادہ دوڑنا
 IV, کثرت کلام / نعرہ بازی
 V, خلو، محدہ / غذا میں تاخیر
 VI, غیض و غضب
 VII, بلند آواز کا سننا
 VIII, جماع

علامات | سر کی جلد چھونے سے گرم محسوس ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، منہ اور نتھنے خشک ہوتے ہیں، دوی کی شکایت ہوتی ہے، سرد اشیاء کے استعمال یا سرد تدا بیر سے سکون ملتا ہے، حار تدا بیر کی سرگزشت ملتی ہے، گرم دواؤں کے استعمال کی صورت میں اضطراب و بے چینی ہوتی ہے، فہم متاثر ہوتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے اور حواس میں کسی قدر تکدر پیدا ہو جاتا ہے۔

اصول علاج |۔ دماغ میں برودت پہنچائیں۔
 مریض کو معتدل ہو ا میں رکھیں۔

۔ سرد شمولات و نطول کرائیں

۔ سرد ادویہ و اندزیہ استعمال کرائیں

۔ سر پر سرد پانی ڈالیں

علاج |۔ کشیز خشک، براؤہ صندل سفید ہر ایک ۵ گرام، کافور اگر ارام کو پانی میں پیس کر پیشانی پر ضماد کریں۔

۔ سرد روغیات مثلاً روغن بنفشہ، روغن نیلو فر یا روغن کدو (دغیرہ) کو برف سے ٹھنڈا کر کے سر پر لگائیں

۔ روغن گل ہرہ سرکہ، میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں

۔ لعاب بہداد ۳ گرام، شیرہ عناب ۵ دانہ، شیرہ مغز کدو ۳ گرام، شیرہ تخم کاہو مقشر کو عرق

گاؤز بان ۱۵ ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلو فر ۸ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں، تبرید کے لیے بے مثال ہے۔

۔ قبض کی صورت میں قرص طین ۲ عدد یا اطر فیض زمانی ۷ گرام، رات میں کھلائیں۔

۔ ماہ الشیر نوش کرائیں

۔ تلیقین کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں

نسخہ تلیقین کل بنفشہ ۷ گرام، گل نیلوفر، تخم کاسنی ہر ایک ۵ گرام، عناب، آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ، تمر ہندی، تمر نجبین، مغز فلوس خیاب شنبہ، گل قند، ہر ایک ۴۸ گرام، روغن بادام ۶ ملی لیٹر حسب دستور استعمال کرائیں۔

۔ شدید درد کی صورت میں سعوٹ کا یہ نسخہ مفید تصور کیا گیا ہے۔

نسخہ سعوٹ افیون، کافور ہر ایک ۱۲-۱۳ گرام، لڑکی والی عورت (مال) کے دودھ میں حل کر کے روغن گل کا اضافہ کر کے ناک میں سعوٹ کرائیں۔

۔ درج ذیل نخلخہ سنگھاتا بھی سودمند ہے۔

نسخہ نخلخہ صندل سفید ۹ گرام، کافور ۲ گرام، عرق کیورہ ۱۲ ملی لیٹر میں گھس کر عرق خض کا اضافہ کر کے ایک چوڑے منہ کی شیشی میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت سنگھائیں۔

صداع بارد سازج^۱

SIMPLE COLD HEADACHE

اس مرض میں کسی مادہ کے بغیر، محض برودت سے درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب | اسباب دو انواع کے ہوتے ہیں
(I) داخلی

(II) خارجی

(A) داخلی :-

I زیادہ سرد پانی نوش کرنا

II سرد پانی کی مانند دوسری یا بالخصوص سرد چیز استعمال کرنا

(B) خارجی :-

I سرد ہوا کا لگنا

II خارجی طور پر برف کا استعمال

III سرد پانی میں نہانا

علامات | سر کی جلد، چھونے سے سرد محسوس ہوتی ہے، جو اس میں تکدر، پراگندگی اور سستی ہوتی ہے۔ درد عام طور سے سر کے پچھلے حصہ کی طرف مائل ہوتا ہے، سرد تدا بیر / اغذیہ کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے اور گرم تدا بیر سے راحت ملتی ہے۔

اصول علاج | — مریض کو گرم مقامات پر قیام کا نظم کرائیں
— تکمید کرائیں

— حمام کرائیں

— ملیّنات استعمال کرائیں

— ادویہ جارہ کا نطول کرائیں

۱۔ اس درد سر میں کسی قدر خبط الحواسی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ”خبط“ بھی کہہ جاتے ہیں۔

• گرم خوشبو سنگھائیں

• انکباب کرائیں

• سیال یا غیر سیال اشیاء مثلاً گرم پانی یا گرم ریگ وغیرہ کو تعمیلی میں رکھ کر اس سے
علاج | عمید کریں۔

• حمام حار کرائیں

• گرم کپڑے لٹھا کر گرم پانی کا بھپا رہ دیں۔

• گرم روغنیات مثلاً روغن سوسن، روغن مرزنجوش یا روغن چھبیلی میں سے کسی ایک

کو نیم گرم کر کے سر پر ڈالیں

• بابونہ، اکلیل الملک، مرزنجوش، صعتر، نہام، پلودینہ، شیخ ارمنی، ہم وزن کو پانی میں
جوش دیکر نطول کرائیں۔

• رفع قبض کے لیے بنفشہ گرام، سپستان ۱۱ دانہ، تخم کتاں ۲ اگرام، انجیر ۲ عدد، ان دواؤں
کو جوش دیکر ترنجبین حسب ضرورت کا اضافہ کر کے نوش کرائیں مفید ہے۔

• گرم خوشبو میں مثلاً مشک، عنبر، عود، ریحان، نرگس، شگوفہ نارنگی، نسرتین اور سوسن
سنگھائیں۔

• گل چکن ۱ گرام، خاکس، پوست ہیل کلاں، ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں چیس کر
نیم گرم پیشانی پر ضاد کریں۔

• جندبیدستر، حب الغار، قسط اکباب چینی اور آب سرداب سے تیار کردہ ضاد لگانا بھی
سودمند ہے۔

• چائے یا قہوہ نوش کرائیں

• دارچینی، اسطوخودوس ہر ایک ۳ گرام، بیل خوردہ عدد، ان دواؤں کو ۲۵۰ ملی لیٹر
پانی میں جوش دے کر، مل چھان کر نبات سفید ۲ گرام ملا کر بطور چائے نوش کرائیں۔

• گاؤزبان، گل گاؤزبان، ہر ایک ۵ گرام، عناب ۵ دانہ اور مصری ۲ گرام کو پانی میں
جوش دے کر نوش کرائیں،


• رات میں اطرینفل زمانی ۷ گرام کھلائیں، بہترین ملین ہے۔

صداع دمووی

SANGUINE HEADACHE

اس مرض میں عروق دماغیہ خون سے پر ہو جاتی ہیں اور مرضی عوارض کا سبب بنتی ہیں۔

اقسام



اسباب

(۱) شریانی:-

- I) مزاج دمووی
- II) قلب کے بائیں بطن کا موٹا ہو جانا
- III) ریہ کے بعض امراض
- IV) دماغی مشاغل کی زیادتی
- V) رنج و غم
- VI) شاہانہ زندگی بسر کرنا اور محنت و ریاضت نہ کرنا
- VII) التهاب کلیہ

۱۔ اس میں شریانی دوران خون تیز ہوتا ہے جس سے دماغی عروق شعریہ خون سے پر ہو جاتی ہیں اور ان کی بازروی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔

۲۔ اس میں دریدی دوران سست ہو کر دماغی عروق شعریہ خون سے پر ہو جاتی ہیں یعنی دماغ میں خون کی آمد حسب معمول ہوتی ہے لیکن اس کی واپسی یعنی بازروی سست ہوتی ہے۔

- (VIII) قبض
(IX) حمیات حادہ
(X) ضربہ شمس (لو لگنا)
(XI) احتباس طمث
(XII) سمیات مثلاً
(I) تمباکو
(II) ریائل نائٹریٹ
(ب) ویریڈ :-

- (I) ویریڈماغی میں انسداد
(II) گردن کی ویریڈوں پر سلو یا قیص وغیرہ کے کالر کا دباؤ
(III) سلو اجوف فوقانی
(IV) امراض ریه مثلاً
(I) صغیر الریه
(II) انتفاخ الریه
(III) سعال مزمن
(IV) بعض امراض قلب

علامات | چہرہ اور آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، پسوٹوں میں تہج ہوتا ہے، سر میں شدید گرانی ہوتی ہے تمام سر میں خفیف یا شدید نوعیت کا درد ہوتا ہے، یہ درد عام طور سے پیشانی اور گدی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے مریض پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تاہم گہری نیند نہیں آتی بلکہ غنودگی سے مشابہہ ایک کیفیت طاری رہتی ہے، پیشاب غلیظ ہوتا ہے۔

نازک مزاج اور دماغی مشاغل والے لوگوں اور رنج و غم کی صورت میں شریانوں کی تروپ میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے مکھیاں یا چنگاریاں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، نبض سریع چلتی ہے۔
ضعف اور رقت خون کی صورت میں چہرہ زرد، ہونٹ پھیکے، بے رونق اور اطراف سرد

محسوس ہوتے ہیں، حقائق کی سی کیفیت ہوتی ہے، مدغین کی رگیں / شریانیں تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

اصول علاج |۔۔۔ قیصال کی فصد کھولیں
سنگھیاں کھینچوائیں

۔۔۔ ملینات استعمال کرائیں

۔۔۔ کامل تنقیہ کے بعد سرد طلا استعمال کرائیں

۔۔۔ سعوطات استعمال کرائیں

۔۔۔ سرد لخلخو سنگھائیں

۔۔۔ مبردات استعمال کرائیں

علاج |۔۔۔ امتلاء کی صورت میں قیصال کی فصد کھولیں، اس بابت مریض کے جسمانی قوی کو مد نظر رکھیں۔

۔۔۔ ہچھنوں کے ساتھ پنڈلیوں پر سنگھیاں کھینچوائیں

۔۔۔ مندل اور کافور کو گلاب میں گھس کر پیشانی پر اس کا فساد رکھیں

۔۔۔ عرق گلاب / سرکہ / برف آب میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں

۔۔۔ خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی صورت میں ریخ اسروں یا چھوٹی چندن کا سفوف اگر ام سادہ

یا ہمراہ شہد استعمال کرائیں

۔۔۔ حرّت خون کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

لعاب بہدازہ ۳ گرام، شیرہ تخم کاہو مقشرہ ۵ گرام، عرق کاؤزباں ۲۲ ملی لیٹر میں نکال کر

شربت بنفشہ ۲۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔۔۔ مزید تبرید کی ضرورت ہو تو اسی نسخہ میں

شیرہ عذاب ۵ دانہ اور شیرہ مخزن تخم کدو ۷ شیریں ۳ گرام کا اضافہ کر دیں،

۔۔۔ رنہ قبض کے لیے اطرینل کشینزی ۷ گرام، رات میں سوتے وقت کھلائیں

۔۔۔ سبوس گندم ۳۶ گرام، نمک طعام ۰.۸ گرام، کوہ لیٹ پانی میں جوش دیکر اس سے پاشویہ

کریں۔

۔۔۔ مندرجہ ذیل مہمل بھی مفید تصور کیا جاتا ہے :

نسخہ ہل تریجین، شیر خشک ہر ایک ۸ گرام، مغز خلو س خیار شبنم ۸ گرام، ان کو عرق بید
 مشک، عرق بید سادہ، عرق کمو، عرق نیلوفر، ہر ایک ۴ ملی لیٹر میں دو گھنٹے بجھو کہ
 مل چھان کر لعاب اسپنول، شیر و مغز کدوئے شیریں، شیر و مغز تخم ہندو دانہ ہر ایک ۲ گرام،
 روغن بادام ۶ گرام کا اضافہ کر کے نوش کر ایس مفید ہے۔

درج ذیل نخلخہ گھائیٹ

نسخہ نخلخہ آب خیار شبنم، آب کاہوئے سبز، آب کشنیز سبز، مندل سفید گھسا ہوا، روغن گل،
 قدرے سرکہ اور کافی گرم گرام کو گھس کر ان تمام دواؤں کو ایک کھلے منہ کی
 شیشی میں ڈال کر ہلا کر گھائیٹ۔

۔ کثرت مشاغل دماغی یا رنج و غم کی صورت میں یہ نسخہ بہت مفید ہے۔

کشتہ فولاد ۱۲ گرام، ہوا مکھن کھلائیٹ یا

۔ خمیرہ مروارید، خمیرہ سکاؤز باں عنبری، اطر فیل اسطوخودوس یا ماء اللحم میں سے کوئی ایک
 حسب ضرورت استعمال کر ایٹ

۔ کامل تنقیہ کے بعد سرد طلا، جن میں آرد جو، کالی، معصارہ بید سادہ یا سرکہ شامل ہو، استعمال
 کر ایٹ۔

صدراع صفراوی

BILIOUS HEADACHE

اس مرض میں معدہ میں صفراء کے اجتماع یا بچثیت مجموعی جسم میں صفراء کی زیادتی سے درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔

I, غلبہ خلط صفراوی / معدہ میں صفراوی خلط کا اجتماع
II, سوء ہضم

III, کبد کے افعال کی خرابی

IV, شیریں، گرم اغذیہ کا بکثرت استعمال

V, موسم گرما

علامات | سر چھونے پر گرم محسوس ہوتا ہے۔ درد منواتر یا نوبت کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ متواتر درد ہونا معدی امراض کی علامت ہے اور نوبت کے ساتھ ہونا غذائی

فساد / خرابی کی علامت ہے۔ معدہ پر صفراء کے ترشح غیر طبعی کی صورت میں سر میں شدید درد ہوتا ہے، صدغین کی شریانیں تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جی ملاتا ہے، اِسکائیاں آتی ہیں، ذائقہ کڑا ہوتا ہے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، نکتھے خشک ہوتے ہیں، دماغ میں حرارت اور بے ہوشی کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے، نبض سریع چلتی ہے، چہرہ زردی مائل ہو جاتا ہے۔
تے یا دست کے ذریعہ صفراوی خلط خارج ہونے پر درد میں فوراً تسکین ہو جاتی ہے اسی طرح سرداشیاء کے استعمال سے بھی راحت ملتی ہے، دماغ میں بوجھ اور تناؤ نہیں ہوتا پیشاب اور پاخانہ اعتدال پر رہتا ہے

اصول علاج |۔۔۔ تنقیہ و استفرغ سادہ کریں
مہر دات استعمال کریں

۔۔۔ تعدیل مزاج اختیار کریں

۔۔۔ نطول کریں

— پاشویہ کریں

پانی میں سکنجبین ملا کر نوش کرائیں اور حلق میں انگلی ڈال کر قے کرائیں تاکہ معدہ
علاج سے صفا خارج ہو سکے۔

— سرپر ٹھنڈا پانی دھاریں

— تراشاکر رو یا خیار سرپر رکھیں

— مندل اور کافور ۱۵.۶ گرام، گلاب میں گھس کر پیشانی اور مدغین پر لگائیں

— مندل سفید، تخم کاہو، ہر ایک ۶ گرام، کافور ۱ گرام، کو آب کشنیز سبز مروق میں پیس کر
پیشانی پر لپیپ کریں۔

— لعاب، بہدانہ، شیرہ، تخم کاہو مقشر، ہر ایک ۳ گرام، شیرہ معناب ۵ دانہ کو عرق گاؤزبان ۱۲۴
لی لیٹر میں بحال کر شربت نیلو فر ۲۴ ملی لیٹر ملا کر برف سے ٹھنڈا کر کے نوش کرائیں۔

— جوارش آملہ ۷ گرام، عرق گاؤزبان ۲۴ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں

— گل نیلو فر ۷ گرام، تخم کاسنی نیم کوفہ ۵ گرام، معناب ۷ عدد، آلو بخارا ۵ عدد، ان دواؤں کو
۲۵۰ ملی لیٹر پانی میں بھگو کر مل چھان کر شربت نیلو فر ۳۶ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

— درج ذیل پاشویہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ پاشویہ
خجازی، گل بنفشہ، گل نیلو فر، خطمی، ہر ایک ۳ گرام، نمک لاہوری ۰.۸ گرام،
سبوس گندم، تراشہ کدو، ہر ایک ۶ گرام، جملہ اشیا کو ۱ لیٹر پانی میں جوش دیکر
پاشویہ کریں — اور درج ذیل نسخہ نوش کرائیں

نسخہ:

گل بنفشہ، گل نیلو فر، تخم کاسنی نیم کوفہ، تخم خیارین، مغز تخم کدو، شیریں ہر ایک ۹ گرام،
آلو بخارا ۱۱ عدد، تر ہندی ۸ گرام، ان تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق بید سادہ ہر ایک ۳۲ ملی لیٹر
میں مل چھان کر شربت لیون کاغذی ۳۶ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں

نسخہ مسہل
پانچویں یا چھٹے دن اس نسخہ میں آلو بخارا ۱۰ عدد، ترنجبین ۸ گرام، مغز فلو س
خیارنبہ ۶ گرام، گلغند ۸ گرام اور روغن بادام شیریں ۶ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے
مسہل دیں اور دو دن بعد درج ذیل نسخہ تبرید استعمال کرائیں۔

نسخہ: تبصریہ
 تخم کاسنی، تخم خیارین، ہر ایک ۹ گرام، تخم کاہو مقشرہ ۵ گرام، بہدانہ ۳ گرام،
 اول الذکر تینوں دواؤں کا شیرہ اور بہدانہ کا لعاب و عرق بیدر سادہ و عرق کاسنی
 ہر ایک ۷ ملی لیٹر، عرق بیدر مشک ۶۰ ملی لیٹر میں نکال کر شربت انارین یا شربت ترنج ۶۳ ملی لیٹر
 میں ملا کر پہلے سبوس اسپغول ۶ گرام کھلا کر اوپر سے یہ دوا نوش کرائیں

Learn Unani By Abdul Waris Salman

صداع بلغمی

PHLEGMIC HEADACHE

اس مرض میں بلغم کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ عام طور سے بلغم، صداع کا باعث نہیں ہوتا۔ اور صداع کی یہ نوع نسبتاً قلیل الوقوع ہے۔

I تمام جسم یا صرف سر میں بلغمی خلط کا اجتماع
II بارد المزاج ہونا

III بارد اغذیہ و ادویہ کا بکثرت استعمال

IV تھکے کی زیادتی / پے درپے حملہ

علامات | سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے، حواس میں ٹکدور ہوتا ہے، نیند لمبی اور گہری آتی ہے، صداع دھوی و صفراوی کے مقابلہ میں درد میں خفت ہوتی ہے اور حرارت، چہرہ و آنکھوں کی سرخی مفقود ہوتی ہے۔ نتھنوں اور منہ میں رطوبت آتی رہتی ہے، پیشاب سفید اور غلیظ ہوتا ہے۔ نبض بلی چلتی ہے اور صداع نسبتاً زیادہ عرصہ تک رہتا ہے۔

اصول علاج | تنقیہ عام کرائیں اس کے بعد تنقیہ خاص (تنقیہ راس) منفعیات استعمال کرائیں۔

نفع | اور تنقیہ کے بعد ضاد، نطول اور خوشبوئیات کے ذریعہ تعدیل مزاج کی تدبیر اختیار کریں۔
عطوسات، قطورات اور تکبیر حار کرائیں۔

علاج | عام طور سے یہ مرض نزلہ و زکام کے بگڑا جانے کی وجہ سے عارض ہوتا ہے اس لیے نزلہ بارد کی ادویہ استعمال کرائیں

نسخہ:-

محل بنفشہ، تخم خباری، تخم خطمی، اصل السوس مقشر، جوشاندہ اسطوخودوس ہر ایک ۷ گرام، شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔
نفع | مادہ بلغمی کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ منضج بادیان، بیخ اذخر، بیخ کاسنی، بیخ کرفس، بیخ بادیان، ہر ایک ۷ گرام، اصل السوس مقرر پیریا دشاں، اسطوخودوس، ہر ایک ۵ گرام، مونیزمنق ۹ دانہ، انجیر ۵ دانہ، ان دواؤں کو رات میں گرم پانی سے بھگو کر صبح مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۸ گرام کے ہمراہ نوش کرائیں۔

دس بارہ دن بعد اسی نسخہ میں درج ذیل مسہل دواؤں کا اضافہ کریں۔

نسخہ مسہل
سنا، مکی، ۷ گرام کوغذ کورہ بالا ادویہ میں رات کو بھگو دیں صبح کو جوش دے کر
چھان لیں اور تر بنجیں ۸۰ گرام، شکر سرخ ۸ گرام، مغز املتاس ۶۰ گرام،
حل کر کے دوبارہ چھان لیں اور روغن بادام شیریں ۳ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نیم گرم نوش کر لیں
ایک دن کے وقفے سے ۲، ۳ مسہل دیں، وقفہ کے دن درج ذیل نسخہ تبرید استعمال
کرائیں۔

نسخہ و تفسیر ۵۲۔ عرق گاؤزباں ۱۲ گرام کو ورق نقرہ اعد میں لیپٹ کر کھلائیں اور پیرے شیرہ عذاب
۵۲۔ عرق گاؤزباں ۱۲ ملی لیٹر میں نکال کر تخم بیهچاں کے گرام، شربت بنفشہ
۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کریں۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ منقہ و مرغ استعمال
کرائیں۔

نسخہ منقح دماغ
حب ایارن جو روغن بادام شیریں سے چرب کریں اور اس پر درق نقرہ
اعداد پلیٹ کر رات کے آخری حصہ میں مریض کو نیند سے بیدار کر کے ،
موق کاؤز باں ، نیم گرم پانی کے ساتھ کھلائیں اور صبح کو نسخہ مسہل سے مغز املتاس اور روغن بادام
شیریں خارج کر کے استعمال کرائیں ۔

تنقیہ دماغ کے لیے درج ذیل نسخہ بھی مجرب ہے

نسخہ، مستقی دماغ۔

صبر، تردید، ایفون، مصطلکی، مقنونا، نمک ہندی کو شہد میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں

بنالیں اور حسب ضرورت استعمال کرائیں

.....نمک چکنی، ترید اور جندیدہ ستر کو باریک پیس کر ٹولی باندھ کر سٹھائیں

سدراب، بالونہ، مرزنجوش یا پودینہ وغیرہ کا جوشانندہ ناک میں ٹپکائیں۔

صداع سوداوی

MELANIC HEADACHE

اس مرض میں سوداوی اثرات کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے۔

دماغ کی طرف سوداوی خلط کا صعود کرنا

اسباب I دماغ کی طرف سوداوی خلط کا صعود کرنا
II قبض

علامات سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے۔ ہوس کا غلبہ ہوتا ہے۔ نیند غائب ہو جاتی ہے، پہرہ اور جسم نیلگوں ہو جاتا ہے، نبض دقیق اور بلی چلتی ہے، پیشاب سفید اور رقیق ہوتا ہے لیکن نفخ کامل کے بعد اس میں غلظت اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔

اصول علاج I۔ منفع، مسہل اور تنقیہ کے اصول کو اختیار کریں۔
II۔ کامل تنقیہ کے بعد تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں

۔ نظام ہضم کو درست کریں

۔ خوشبوئیات لگھائیں

علاج

منفع، مسہل، تبرید کے اصول پر عمل کرتے ہوئے درج ذیل نسخہ استعمال کریں

نسخہ منفع بسقارغ بادیان، بادرنجبویہ، اسطوخودوس، اقیقون ہر ایک ۷ گرام، مونیرنتقی ۹ دانہ
آلو بخارا ۳۱ عدد، جلد دواؤں کا جو شانہ تیار کر کے ہمراہ ترنجبین ۷ گرام نوش
کرائیں۔ ۱۲۰۱ دن کے بعد درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کریں

نسخہ مسہل اقیقون، تربد ہر ایک ۳۶ گرام، بسقارغ ۸ گرام، غاریقون، اسطوخودوس ہر
ایک ۸ گرام، ایارج ۸ گرام سب دواؤں کو کوٹ چھان کر آب بادیان کے ساتھ
گولیاں بنائیں اور گرم پانی کے ساتھ کھلائیں

حسب ضرورت اس کے ساتھ اطرلعل اسطوخودوس ۷ گرام بھی استعمال کر سکتے ہیں

۔ بالونہ، ناخونہ، مرزنجوش اور رومن چنبیلی کا لپ لگائیں۔

- نرگس، مشک اور عنبر لگھائیں
- گرم و تر روغنیات مثلاً روغن بابونہ، روغن نرگس، روغن مرزنجوش، روغن بابونہ میں سے کوئی ایک ہمراہ روغن بنفشہ و روغن نیلوفر سر پر رکھیں۔
- رفع قبض کے لیے اطفال زمامی ۷ گرام، بوقت خواب کھلائیں۔
- سبوس گندم، نمک طعام، ہموزن لے کر کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر ٹکڑ کر لیں۔ اور اس کے بعد درج ذیل ضاد استعمال کرائیں
- نسخہ ضاد
برگ بنفشہ، گل چکن، پوست ہیل کلال، پوست خشخاش، ہر ایک ۶ گرام کو پانی میں پیس کر پیشانی اور صدغین پر لپیپ کرائیں۔

صداع ریحی عصبی

GASEO-NERVOUS HEADACHE

اس مرض میں ریہ کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے درد سر عارض ہوتا ہے۔ اور مریض مضطرب و پریشان ہو جاتا ہے

اسباب | I, دماغ میں محسوس ریح
II, معدہ کی غلیظ ریح
III, نفارخ اغذیہ کا بھڑکتا استعمال

علامات | سر میں تناؤ و محسوس ہوتا ہے، درد منتقل ہوتا رہتا ہے، ثقل اور فریاد موقوف ہوتی ہیں، کان بجتے ہیں، تاہم غلیظ ریح کی صورت میں صدغین میں شدید ٹیسس اٹھتی ہیں۔

اصول علاج | ۱۔ محلل ریح ادویہ استعمال کرائیں
۲۔ رفع قبض کی تدابیر اختیار کریں

علاج | ۱۔ شیخ ارمی، صعتر، مرزنجوش، برنجاسف، اکلیل الملک، کرفس اور سویا، کا جوشانہ بنا کر نطول کرائیں

۲۔ قفل سیاه اور چند بیدستر سے عطوس کرائیں

۳۔ صبر، کنڈش، زعفران، قفل سیاه اور مشک کو آب مرزنجوش میں تیار کر کے سھوکھ کرائیں، بہت سودمند ہے۔

۴۔ بادیان، زیرہ سیاه انیسون کو گلاب اور عرق بادیان میں جوش دیکر ہمراہ گلقد نوش کرائیں۔

۵۔ معدہ کی ریح غلیظ کی صورت میں حب کبد نوشادری ۲ عدد، جوارش کوئی ۷ گرام بعد غذا کھلائیں۔

۶۔ رفع قبض کے لیے قرص ملین ۲ عدد، اٹریفل کشنیزی ۷ گرام بوقت خواب کھلائیں

صداع معدی صفراوی

GASTRO-BILIOUS HEADACHE

اس مرض میں معدہ میں صفراوی (بالعموم) اذیت کے اثرات عصب راجع Vegus

Nerve افشیدہ دماغ یکسہ پہنچ جاتے ہیں اور صداع (درد دسر) پیدا ہو جاتا ہے۔

(I) سوء مزاج سادہ

(II) سوء مزاج مادی (صفراوی)

اسباب

علامات عام طور سے یہ درد باری کے ساتھ ہوتا ہے جس کا انحصار معدہ کی کیفیات اور دماغ کی طرف بخارات اور ردی مواد کے صعود پر ہوتا ہے۔ سوء مزاج معدی سادہ میں فعل ہضم کی خرابیوں کی علامات موجود ہوتی ہیں، معمولی مقدار میں بھی غذا لینے سے معدہ بوجھل ہو جاتا ہے اور نفخ کی شکایت عارض ہو جاتی ہے، یہی سبب ہے کہ امتلاء معدہ کی صورت میں درد میں شدت ہوتی ہے اور خلو معدہ میں درد میں نسبتاً کمی آ جاتی ہے۔

فم معدہ میں صفراوی خلط کے اجتماع کی صورت میں متلی ہوتی ہے، آنکھیں کسی قدر زرد ہو جاتی ہیں، شکم میں مروڑ اور اینٹھن ہوتی ہے ذائقہ تلخ ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اور صفراوی تھے ہو جانے کے بعد پیاس زائل ہو جاتی ہے اور درد میں کمی آ جاتی ہے۔

ملحوظ رہے کہ سوء ہضم کی وجہ سے عارض ہونے والے صداع میں، درد عام طور سے سر کے اگلے حصہ میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سر جھکانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شریان سبائی کو دبانے سے راحت ملتی ہے، قے اور امہال سے بھی درد میں کمی آ جاتی ہے۔

معدہ کی اصلاح کریں

اصول علاج مقیات کے ذریعہ صفراؤ کا تنقیہ کریں

_____۔ مطفیات استعمال کرائیں

_____۔ تقویت معدہ کے لیے قابضات استعمال کرائیں

_____۔ تقویت راس کی تدابیر اختیار کریں

_____۔ معدہ کی اصلاح کے لیے جوارش جالینوس کھلائیں

_____۔ علاج | معدہ میں صفراوی خلط کے اجتماع کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ:۔
سکنجبین ۸ گرام کو گرم پانی میں ملا کرتے کرائیں، اس کے بعد سکنجبین سادہ یا سکنجبین نوعائی استعمال کرائیں۔

_____۔ تقویت معدہ کے لیے رب بہہ رب انار، رب انگور خام اور رب زعفران بہترین تصور کیا جاتا

ہے۔

Learn Unani By Abdul Waris Rahmani

اس مرض میں معدہ میں بلغم لزوج غیر معمولی طور پر جمع ہو جاتا ہے اور درد سر کا باعث ہوتا ہے۔

۱۔ بلغم کی تولید میں معاون اخذیہ کا بکثرت استعمال

اسباب (II) معبود میں یسار اور فاسد بلغم کا اجتماع

(III) فصول، مفہم

IV

علامات | صدر سے قبل تجھ کو شکایت ہوتی ہے۔ ترش ذکارس آتی ہیں، نفخ شکم ہوتا ہے، بکثرت لعاب دہن ہوتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں اور بلغمی قے ہو جانے کے بعد درد میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

..... مقیاسات کے ذریعہ معرہ کا تنقیہ کریں

اصول علاج | ۱۔ مقویات معدہ استعمال کرائیں اور

۱۰۔ قوت ہاضمہ کو درست کریں

۱۲۔ تخم سویا، تخم مہلی، نمک طعام ہر ایک ۳ گرام، شہد خالص ۸ گرام کو پانی میں جوش

علاج دے کر چھان کر نوش کرائیں، اس سے قے ہو کر معدہ سے بلغم خارج ہو جائے گا۔

اس کے بعد مٹکی رومی اگر ۱۰۰ گرام، باریک پیس سرکل نقد ۲۴ گرام ملا کر کھلا میں

. حب ایار ج کے ذریعہ اسہال کرائیں۔۔۔۔۔ یہ صورت اس وقت اختیار کریں جب قے کرانا

محکم نہ ہو یا کسی اور مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

. —۔ معده و دماغ کی تقویت کے لیے درج ذیل نسخہ بہت مفید ہے

نہجی برائے تقویتِ معدہ و دماغ :-

کشتہ خبث المہدید، کشتہ، مہرجاں ہر ایک ۵۰ ملی گرام، جوارش جالینوس ۷ گرام کے ہمراہ صبح، شام کھلائیں۔

۔۔۔ جہدار، خود صلیب ہر ایک اگر ہم، ان کو پس کر خمیرہ کا دُزباں غنبری جواہر والا ے گرام میں ملا کر
 بوقت خواب کھلائیں۔۔۔۔۔ ہفتہ میں دو بار اطلیغل زمانی ے گرام ہمارا آب بوقت خواب کھلائیں۔
 ۔۔۔ شدید درد سر کی صورت میں صندل سفید کو آب کشنیز سبز مروق میں پس کر پیشانی پر لپکرائیں

Learn Unani By Abdul Waris Salman

صدراع معری سوداوی

GASTRO-MELANIC HEADACHE

اس مرض میں معدہ میں سوداوی خلط میں اضافہ ہونے کے باعث درد سر ہوتا ہے۔

اسباب | طبی طحال سے معدہ پر سوداوی خلط کا ترشح

علامات | معدہ میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ اشتہا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غم معدہ میں دغدرغہ اور لہر لہر ہوتا ہے۔ سوداوی قے کے بعد درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

منفع استعمال کرائیں

اصول علاج | معدہ کا تنقیہ کریں

نفع خلط سوداوی کے لیے جوشاندہ ایتھون نوش کرائیں

علاج | اس کے بعد درج ذیل دواؤں سے معدہ کا تنقیہ کریں

ہیدیاہ، اسطوخودوس، بسفاج، غارلقون، سنگ لاجورد اور سقمونیا کو پیس کر آب بادر۔

نیچویہ میں گوند صیں اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر حسب ضرورت استعمال کرائیں۔

تنقیہ معدہ کے بعد کبوتر نو شادری ۲ عدد، غذائینے کے بعد استعمال کرائیں

صداع ضعف دماغی

ANAEMIC HEADACHE

اس مرض میں ضعف دماغ کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں خون کم مقدار میں پہنچتا ہے جس سے اس کی طبعی پرورش میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب | I, دماغ میں دموی رسد کی کمی
II, دماغی مشاغل کی زیادتی

III, شور و غل

IV, ناک اور حلق کی اعصاب حسیہ کا ضعف

V, جلق

VI, کثرت جملع

VII, نرف دماغی

VIII, رعاف

IX, بحشت جریان خون مثلاً بواسیر، خون حیض

X, مزمن امراض / حاد امراض

XI, ضعف و نقاہت

XII, جسم کے کسی حصہ پر چوٹ لگنا، جس سے دماغ بھی متاثر ہو جائے

XIII, بعض امراض دماغ

XIV, جسمانی تحریکات کی زیادتی

علامات | معمولی دماغی مشاغل اور ادنیٰ تحریکات سے درد عارض ہوتا ہے اور مزید تحریکات سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور استراحت سے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نیند آجانے کی صورت میں درد بالکل معدوم ہو جاتا ہے، ضعف دماغ کے ساتھ اگر قبض بھی ہو تو درد میں شدت ہوتی ہے اور بہت جلد جلد واقع ہوتا ہے، جو اس میں تکدر ہوتا ہے، دماغی افعال مثلاً

قوت فکر و خیال اور قوت حافظہ میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختیاری حرکات وغیرہ میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے۔

اصول علاج: — مقویات دماغ استعمال کرائیں
— سوء القنیہ کا ازالہ کریں

— مغزات استعمال کرائیں

— جب ضرورت ممکنات و فوہات بھی دے سکتے ہیں۔

— درد کو فوراً تسکین دینے کے لیے روغن لبوب سبوح سر پر نکالیں نیز چند قطرے علاج: — تاک اور کان میں بھی ٹپکائیں

— قرص مثلث کو آب کشنیز بزم مروق کے پانی میں گھس کر خضاد کریں

— صبح کو خمیرہ کا دواؤ زبان غبری جو اہر والا ۷ گرام، کھلا کر اوپر سے بادیان ۵ گرام، مغز بادام شیریں ۷ عدد، دانہ ہیل خورد ۳ گرام، پانی میں پیس کر معری ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

— شام کو قرص نقرہ مرکب اعدد، خمیرہ آب ریشم ۷ گرام ملا کر کھلائیں

— درج ذیل حریرہ بادام بھی نہایت مفید ہے۔

نسخہ حریرہ بادام:-

مغز بادام شیریں ۵ دانہ، مغز تخم کدو ۷ شیریں، مغز تخم تربوز، تخم خنقاں سفید ہر ایک

۳ گرام، کو پانی میں پیس کر شیرہ نکالیں اور معری ۲۴ گرام ملا کر آگ پر رکھیں اور گھی سے بگھاردیں

جب حریرہ کی طرح غلیظ ہو جائے تو نیچے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر صبح کے وقت نوش کرائیں۔

— اور رات میں سوتے وقت جدوار، عود صلیب، ہر ایک اگر ۱ گرام، باریک پیس کر اطر فیصل

کشنیز ۷ گرام ملا کر گرم پانی کے ساتھ کھلائیں

— خون کی کمی کی صورت میں کشتہ، فولاد ۶۶ ملی گرام، جوارش جالینوس ۷ گرام کے ہمراہ خذالیجہ

کے بعد دوپہر، شام کھلائیں۔

صداع حسی

HYPERSENSITIVE HEADACHE

اس مرض میں دماغی حس کے تیز ہو جانے سے درد سر عارض ہوتا ہے۔

اسباب | دماغ کی ذکاوت حس

علامات | دماغ کی ذکاوت حس غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ معمولی اسباب و تحریکات سے بھی بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور ان سے اذیت پاتا ہے۔ دماغی افعال صحیح، سالم ہوتے ہیں۔

اصول علاج | غلیظ غذا میں کھلا کر حس کو کمزور کریں اور اس میں کندی لائیں۔
خون کو کشیف بنانے والی دوائیں مثلاً مخدرات استعمال کرائیں۔
ضعف قوت ہضم کی صورت میں سرد سبزیوں کھلائیں، بہترین غذائی اصول علاج ہے۔
سری دسر، اور کھلے پائے، داکار، ہمارا آتش جو پکا کر کھلانے کی ہدایت کریں۔
علاج | ہریہ، ہمارا گوشت کاؤ، تیار کر کے کھلائیں۔
ضعف ہضم کی صورت میں سرد سبزی ترکاریاں مثلاً خرد کا ساگ، کشنیز سبز اور برگ کاہو، پکا ہوا کھلائیں۔

کثافت کے لیے مخدرات مثلاً شربت خشخاش نوش کرائیں۔
فلونیا (ایک معجون) استعمال کرائیں۔
تخم کاہو، پوست خشخاس، افیون، اجوائن خراسانی، برگ فلک سیر اور برگ لغاح کا طلاء لگائیں۔
بہترین مخدر ہے۔

دواء الشفا، ۲ گرام ہمارا آب تازہ کھلائیں، تسکین دماغ اور حس کی کمی کے لیے سود مند ہے۔
قوی مخدرات سے احتراز لازمی ہے۔

حریرہ مغز بادام شیریں کھلائیں۔
سرہ نیم گرم پانی ڈالیں۔

صداع خفہ

LEVITY HEADACHE

اس مرض میں خفت کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ درد سر عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

III. خلا، نزف

اسباب | IV. بوسست، استفراغ

III. کثرت مشاغل، بیداری، بے خوابی و غم

IV. نازک مزاجی

V. خلو، معدہ

یہ درد سر عام طور سے غیر معمولی استفراغ کے بعد عارض ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے علامات | چمکاریاں یا کھمیاں اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، نبض سریع چلتی ہے، کمزور اور دقیق زغیرہ خون والے اشخاص میں اس مرض کی وجہ سے چہرہ زرد ہونٹ پھیکے ہو جاتے ہیں اور برد اطفال کی شکایت ہوتی ہے، صدغی شریانوں میں زپ ہوتی ہے اور دل دھڑکتا ہے۔

قلت خون کی صورت میں سر کے اگلے حصہ میں درد ہوتا ہے چہرہ زرد اور بے رونق ہوتا ہے۔ سر گھومتا ہے۔ سانس پھولتی ہے اور خفقانی کیفیت ہوتی ہے۔

اصول علاج | صداع ضعف دماغی کے اصول پر علاج کریں۔

علاج | مریض کو مندرجہ ذیل حریرہ پلائیں

نسخہ حریرہ :-

تخم کدوئے شیریں، تخم خشاش، مغز اخروٹ ہر ایک ۲ گرام، معری ۲ گرام، جملہ اشیا کو خیر کاؤ میں پیس کر گھی کا بھار دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو آگ سے اتار کر سرد کر لیں اور

استعمال کرائیں۔۔۔ اس میں حسب ضرورت مغز بادام شیریں اور مغز تربوز کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔
 درج ذیل معجون راحت بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ معجون راحت :-

حب الاس، تخم خرفہ، تخم کاہو، گل سرخ، رب السوس، زرشک صمغ عربی ہر ایک ۲۰ گرام
 تخم کاسنی، کشنیز سبز، ہر ایک ۴۳ گرام، صندل سفید، تخم خیاریں، تخم کدو، تخم شاہترہ، انجبار، ہر
 ایک ۵ گرام، یاقوت، ہیل خورد، ہیل کلال، طباشیر، ہر ایک ۶ گرام، کافور ۲ گرام، عناب ۲ عدد،
 ترنجبین ۲ گرام، رب بھی، رب انار ہر ایک ۲۰۰ گرام، معری ۲۵۰ گرام، عرق گلاب مقطر ۱۶۸
 ملی لیٹر، کدو ۴ عدد، تربوز کا نیچوڑا ہوا پانی۔۔۔ خشک دواؤں کو کوٹ چھان کر رب کے پانی
 میں قوام بنائیں اور پھر معجون بنا کر استعمال کرائیں۔
 ۔۔۔ روغن بنفشہ، روغن نیلوفر اور روغن کدو سحوط کرائیں۔

Learn Unani By Abdul Wahid Siddiqui

صداع حمی

PYREXIAL HEADACHE

اس مرض میں حمی کی وجہ سے درد سر عارض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں فاسد مواد اور گرم بخارات دماغ کی طرف صعود کر جاتے ہیں۔

اسباب | حمی

علامات | درد سر کے ساتھ حمی کی علامات بھی موجود ہوتی ہیں اور حمی کے کم / ختم ہو جانے کی صورت میں درد سر بھی کم / ختم ہو جاتا ہے۔

اصول علاج | حمی کا علاج کریں۔
صداع حاد کے اصول علاج کی روشنی میں علاج کریں۔

علاج | حمی کے اصل سبب کو ملحوظ رکھتے ہوئے علاج کریں۔
معالجہ کے لیے صداع حاد کی طرف رجوع کریں۔

صداع جماعی

COITAL HEADACHE

اس مرض میں جماع کے بعد درد سر پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ مرض ضعیف اعصاب والے افراد میں کثیر الوقوع ہے، قوی الاعصاب اور قوی الباہہ اشخاص میں ناپید ہے۔

(I) جماعی حرکات

اسباب (II) استفراغ منی کے نتیجے میں بدن اور دماغ میں بیہوشی پیدا ہو جانا
علامات (III) جماع کے بعد خفیف ریشہ اور بدنی حرکات میں ضعف کا احساس ہوتا ہے، بعض اوقات جسم میں بیہوشی اور لاغری کو بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

اصول علاج (IV) بیہوشی کے ازالہ کی ترکیب کریں
مقویات استعمال کرائیں

مفرحات استعمال کرائیں

علاج (V) تربیب بدن کے لیے شیریں پانی سے غسل کرائیں
دماغ کی تربیب کے لیے روغن بنفشہ سر کو امیٹیں
تقویت بدن کے لیے گوشت کو خوشبودار مصالحہ جات میں پکا کر کھانے کی تاکید کریں
تقویت اعصاب کے لیے روغن قسط اور جنرید سترکی مالش کریں
تقویت دماغ کے لیے صداع ضعف دماغی کے ذیل میں تحریر کردہ نسخہ حریرہ استعمال کریں
غیرہ محاذ زباں مغبری اور دواء المسک معتدل استعمال کریں۔

صدراع خماری

ALCOHOLIC HEADACHE

اس مرض میں خالص، غلیظ اور کہنہ شراب نوش کرنے سے سر میں درد عارض ہو جاتا ہے۔

(I) خالص، غلیظ اور کہنہ شراب کی زیادتی

(II) کوئی دوسری نشہ آور چیز

اسباب

غلیظ، خالص اور کہنہ شراب نوشی کے نتیجے میں معدہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا اور اس کے

علامات

بخارات دماغ کی طرف صعود کرتے ہیں اور اپنی حرارت، تمدد اور ردی کیفیات سے دماغ کو ازیت پہنچاتے ہیں چنانچہ اس سے فوراً درد عارض ہو جاتا ہے۔ سر میں ثقل محسوس ہوتا ہے۔ بارد، رطب مزاج والوں میں یہ ثقل اس قدر شدید ہوتا ہے کہ سر کو سیدھا کر کے بیٹھنا بھی دشوار ہوتا ہے۔

اصول علاج ————— معدہ میں باقی بچی شراب کو بذریعہ قے خارج کرنے کی تدابیر اختیار کریں

————— مسہل دیں، اس مقصد کے لیے مسہل بلغم اور مسہل صفرا، دونوں دوائیں

دیں۔

————— تقویت معدہ کی تدابیر اختیار کریں

————— مقوی راس دوائیں استعمال کرائیں

————— پاشویہ کریں

علاج ————— سکنجبین اور جو شاندرہ ثبت کے ذریعہ معدہ کی باقی شراب کو قے کے ذریعہ خارج کریں

————— معدہ کی باقی شراب کے اخراج کے لیے درج ذیل نسخہ مسہل بھی سودمند ہے۔

نسخہ مسہل:-

ایارج فیکر اکھلامیں ————— یا سقمونیا / آب انار دیں اور سقمونیا نوش کرائیں

————— تقویت و تسکین معدہ کے لیے شربت انار، شربت سیب اور شربت غورہ، ہمراہ آب مرد استعمال کرائیں۔

————— باوند اور بنفشہ کسی قدر پانی میں جوش دے کر پاشویہ کریں۔

صداع بخاری

GASEOUS HEADACHE

اس مرض میں بخارات کے دماغ کی طرف صعود کرنے کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے۔

اسباب | دماغی رومی اخلاط و مواد کی موجودگی میں بدنی و نفسانی تحریکات

علامات | جسم میں غلطی امتلاء کی علامتیں موجود ہوتی ہیں

جسم سے متعلقہ خلط کا تنقیہ کریں

اصول علاج | ————— مقوی راس ادویہ استعمال کرائیں تاکہ وہ ردی بخارات کے اثرات سے متاثر نہ ہو۔

روغن بادام تلخ ناک اور کان میں ٹپکائیں

علاج | ————— سبوس گندم، گل بنفشہ، نیلوفر، فطری سفید، مندل سفید کو عرق گلاب، سرکہ اور روغن گل میں گوندھ کر فساد کریں۔

جوارش طباشیر، کھلائیں۔

سفوف کشنیز اور آملہ استعمال کرائیں

خمیرہ خشخاش کھلائیں

سرپر گرم پانی دھاریں

گلاب، نیلوفر، بنفشہ وغیرہ خوشبوئیات سونگھائیں

شدید حرارت کی صورت میں کافور اور مندل سونگھائیں

جوشاندہ فطری سے سرکہ دھوئیں

برودت کی صورت میں مشک اور جندبید متر سونگھائیں

آب کدو، آب بید کا بھپارہ کرائیں

سود مزاج کی صورت میں کبیریت اور زرنیخ کی دھونی مفید تصور کی جاتی ہے۔

ماء الشیر نوش کرائیں

صداع ضربی

TRAUMATIC HEADACHE

اس مرض میں سر میں چوٹ لگنے سے درد سر عارض ہوتا ہے۔

اسباب | ضرب و سقط

علامات | سر میں چوٹ لگنے کی سرگزشت ملتی ہے۔ ابتدا میں ضرب کی اذیت کھوپڑی کے اوپر کی جھلی میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد دماغی جھلیاں بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں، اور ان اعشیہ دماغ میں التهاب ہوتا ہے، بعض اوقات انشعاق کی علامتیں بھی ملتی ہیں، کبھی سر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس سے اعشیہ میں تمددی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اصول علاج | مسکن درد ادویہ استعمال کرائیں۔
مبردات استعمال کرائیں۔

مقویات راس استعمال کرائیں۔

دفع مادہ کے لیے قیغال یا باسلین کی فصد کھولیں۔

مسهلات استعمال کرائیں۔

علاج | درج ذیل نسخہ مقوی، مسکن اور مبرد، خصوصیات کا حامل ہے اور صداع ضربی میں بہت مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ :-

آرد جو، گل ارمنی، میٹھا، آرد مسور، رسوت، اقاقیا، آس کی شاخیں اور مندل سے تیار کیا ہوا
نماد استعمال کرائیں۔

سر پر سرد پانی ڈالیں، برف کی تھیلی رکھیں۔

مسہل کے طور پر جو شانہ عذاب اور مغز المتاس نوش کرائیں۔

درم کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

پوست انار، برادہ کندر، سرود جھاڑ اور گل سرخ استعمال کرائیں۔
 کسر کی صورت میں اس کا مناسب عمل بالید کریں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

صدراع بیضہ خودہ

ORGANIC HEADACHE

اس مرض میں کھوپڑی کے اندر اور باہر تمام سر میں یا اس کی بالائی سطح پر درد ہوتا ہے۔

اسباب | I، معدہ یا سر کے بخارات
II، اخلاط اربعہ میں سے کسی ایک ردائت

III، ورم غلیظ

IV، حمہ

V، ریاحات غلیظہ

VI، اورام بارده

علامات | تمام سر میں یا سر کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے اور یہ درد کم و بیش ہر وقت رہتا ہے اور اکثر اوقات مزمن ہوتا ہے، نوبت کی سی کیفیت کے ساتھ درد میں اضافہ

بھی ہوتا رہتا ہے۔ معمولی جسمانی تحریکات، ہجرات اور سخت اور ناگوار آوازوں سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گفتگو بھی ناگوار محسوس ہوتی ہے، تیز روشنی سے اذیت پہنچتی ہے اور تاریکی و تنہائی میں یکگزوہ قرار ملتا ہے۔ درد کی باری کے موقع پر آنکھوں کا کھولنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سر پر فرب کا احساس ہوتا ہے، بخارات سے دماغ کی غلیظ یا رقیق افشہ کے متاثر ہونے کی صورت میں درد اور تناؤ آنکھوں کی جڑوں تک محیط ہوتا ہے۔ بخارات کے بیرونی فشا، دماغ

۱۔ مجموعی ملاحظہ: ”بیضہ“ اور ”خودہ“ میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور اس کا اطلاق سارے سر کے درد پر کرتے ہیں تاہم علامہ انطاکی ”بیضہ“ اس درد کو قرار دیتے ہیں جو وسط میں ہوتا ہے اور صدراع خودہ کا اطلاق اس درد پر کرتے ہیں جو دائرہ سر کے اندر گرد ہوتا ہے۔ ”خودہ“ دراصل ایک جنگلی لباس ہے، جو سارے سر کو محیط ہوتا ہے، اسی مناسبت سے صدراع کی اس نوع کو
Helmet Headache

میں مرگنا نہ ہونے کی صورت میں سر پر ہاتھ رکھنے یا سر کو چھونے سے بھی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے
چہرہ ہر تندا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ بھی مستحضر ہو جاتا ہے۔

خلط دم کی صورت میں سر میں شدید حرارت اور سوزش ہوتی ہے، چہرہ سرخ سیاہی مائل
ہو جاتا ہے، ذائقہ خیریں ہوتا ہے، غلبہ خلط صفراء کی صورت میں سر میں شدید سوزش ہوتی ہے،
مریض سر پر اتکارہ رکھا ہوا محسوس کرتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، چہرے کی رنگت زرد ہوتی ہے، غلبہ خلط
بلغمی کی صورت میں سر میں نقل اور تندا ہوتا ہے، چہرے پر کبھی علامت ہوتی ہیں چنانچہ رنگت سفید
ہوتی ہے اور منہ میں تری ہوتی ہے، غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں جلد میں بیوست و خشونت
کی علامات ملتی ہیں، مزاج میں غصہ اور چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور چہرے کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی
ہے۔

اصول علاج ————— خلط غلب کا تنقیہ کریں
مقویات دواس استعمال کروائیں

۔ غلبہ خلط حار کی صورت میں مسودات اور غلبہ خلط بارد کی صورت میں ادویہ حارہ استعمال
کرائیں۔

علاج ————— قصد کھولیں
تلیسین شکم کے لیے قرص طبعی، قرص صبح، شام کھلائیں

۔ محل کے طور پر بالون اور اکیلل الملک استعمال کرائیں

۔ غلبہ خلط حار کی صورت میں روغن گل سر پر رکھیں

۔ اسی مقصد کے لیے صندل، افاقیا، آس اور گل سرخ کا لیپ بھی مستعمل ہے۔

۔ کافور، گلاب اور عرق بید کا غلاہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔

۔ گل سرخ کے جوشاندہ سے نطول کرائیں

۔ برگ حنا، انخاب، سر پھوک، شاہترہ، ہیمونین کے جوشاندہ سے تنقیہ کرائیں

صدراع بحرانی

CRISIS HEADACHE

اس مرض میں کسی دوسرے مرض خاص طور سے امراض حادہ میں بحران واقع ہونے کے نتیجے میں درد سر ہوتا ہے۔

اسباب
عقوی امراض میں بحران کے وقت اخلاط میں جوش و ہيجان واقع ہوتا ہے

علامات
درد سر، یوم بحران میں پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات درد سر کے ساتھ پیشاب سفید اور رقیق ہوتا ہے، کبھی متلی، اور دھڑکن سر کی شکایت ہوتی ہے اور کبھی نفخ، قزاق، اضطراب اور سوزش ہوتی ہے، مٹھن آنکھوں کے سامنے شعائیں، سرخیلاں اور خیالی سرخ یا زرد صورتیں دیکھتا ہے، بعض مٹھنوں میں گردے میں ثقل اور جھوٹی پسلیوں کے نیچے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ان علامتوں سے جہاں مرض کی نوعیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے وہیں معالج، معالج کے بارے میں بہت سے نکات سے فائدہ ہوتا ہے۔

اصول علاج
متلی اور دوران سر کی صورت میں متلی ادویہ استعمال کرائیں۔
نفخ و قزاق اور اضطراب کی صورت میں مسہل دوائیں کھلائیں۔
نظروں کے سامنے سرخیلاں اور چمکاریاں اڑنے کی صورت میں رطافت کی تدابیر اختیار کریں۔
گردے اور مٹھنوں میں ثقل کی صورت میں مدرات بول استعمال کرائیں۔
اصل السوس پیچ خیلہ ہر ایک ۸ گرام، برگ چتر ۸ گرام، الی دواؤں کا علاج
جوشاندہ نوش کرائیں اس سے طبیعت تھ کی طرف مائل ہوتی ہے۔
کنجبین ۲۸ گرام ہر آگرم پانی استعمال کرائیں، تھ آور ہے۔
اسہال لانے کے لیے درج ذیل نسخہ معاون ہے۔
نسخہ مسہل:-

غاب، آلو بخارا ہر ایک ۵ دانہ، سپستان ۱۵ دانہ، مویر منقی ۲۰ دانہ، خیساندہ ۲۰ دانہ،

۴۸ ملی لیٹر، شیر خشک ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں
درج ذیل نسخہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔
نسخہ حقیقہ:-

عنا ب، سبتان، آلو بخارہ ہر ایک ۵۵ عدد، برگ چقندر، اس جو ہر ایک ۲۴۰ گرام
آلو بالو ۱۰ دانہ، نیلوفر، بنفشہ ہر ایک ۷ گرام کے چوشاندہ میں ترنجبین ۴۸ گرام، روغن کنجد
۲۴ ملی لیٹر ملا کر حقیقہ کریں۔

۔۔۔ رعات لانے کے لیے ناک کو کھیل میں یا سر کے بھارت کا بھپارہ دیں اس بابت درج ذیل
نسخہ بھی سودمند ہے۔
نسخہ:-

پودینہ دشتی، شگوذہ، ازخہ، کنڈش، ان کو بیل کے پتہ میں گوندھ کر قتیلا بنائیں اور ناک
میں رکھیں

۔۔۔ ادرا بول کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
نسخہ برائے ادرا بول:-

شیرہ تخم تربوز، شیرہ تخم خیلہ ہر ایک ۶ ملی لیٹر، کنجبین ۴۸ گرام یا شربت بنفشہ
۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔

صداع شمی

SMELLY HEADACHE

اس مرض میں بو کی وجہ سے درد سر عارض ہوتا ہے۔ دراصل یہ بو ایسے ناک کے ذریعہ مسو کی کے یا مسامات کے ذریعہ نفوذ کر کے سر میں اقلید پیدا کر دیتی ہیں۔

(I) خوشبودار اور تیز بو کی حدت مع سوء مزاج دماغ / ضعف دماغ
(II) مزاج کی بو۔

علامات | درد سر کی شکایت ہوتی ہے اور تیز خوشبو یا مزاج / دباغت کے پانی وغیرہ کے قریب ہونے کی روئید ادا ملتی ہے۔

اصول علاج | 1۔ تیز، خوشبودار چیز کی صورت میں درد سر عارض ہو تو سرد خوشبوئیاں تو لگیں۔
2۔ سرد و غنیاں سر کو لائیں

3۔ حمام کرائیں

4۔ سر پر پانی دھاریں

5۔ اگر صداع کا سبب تیز خوشبو ہو تو سرد خوشبو مثلاً بنفشہ، نیلوفر اور کافور وغیرہ
علاج | سنگھائیں

6۔ یہوست اور حرارت کی صورت میں سرد، خوشبودار و غنیاں سر کو لائیں

7۔ بربودار خشک چیزیں اگر مرض کا باعث ہوں تو بنفشہ اور نیلو قرسنگھائیں اور اگر تر ہوں تو گلاب، صندل اور کافور سنگھائیں۔

8۔ مسامات کھولنے کے لیے سر پر گرم پانی ڈالیں

9۔ سر کو سنگھائیں اور اس میں تر کی ہوئی جتنی ناک میں رکھیں

صداع سدی

EMBOLIC HEADACHE

اس مرض میں، دماغی عروق میں سدہ پیدا ہونے کی وجہ سے درد سر عارض ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ مرض عیش کو شش لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب I، اور دہ دماغ میں سدہ ہونا
II، ٹرائین میں سدہ ہونا

III، غلیظ اغذیہ کا استعمال

IV، ترک ریاضت

V، ترک غسل

علامات سر میں بوجھ اور تناء و محسوس ہوتا ہے، چہرہ میں امتلاء ہوتا ہے۔

ملطف اخلاط ادویہ استعمال کرائیں۔۔۔

اصول علاج I، منقیات کھلائیں

علاج II، ملطف مقاصد کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ برائے تلطفیف :-

افیمون، زوقا، حاشا، بسفاج، ہر ایک ۵ گرام، ان دواؤں کا جوشاندہ تیار کریں اور

ہمراہ گلقد ۸ گرام نوش کرائیں

۔۔۔۔۔ تلطفیف کے بعد حسب ایارج کھلائیں

صداع دودی

VERMINAL HEADACHE

اس مرض میں، متغیوں کے انتہائی حقد سے متعل، مقدم دماغ کے آس پاس کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی حرکت اور تغیر اعمال پیدا کرنے والے افعال کی وجہ سے سر میں درد عارض ہو تا ہے۔

I. مقدم دماغ میں غلیظ سولہ کا بکثرت اجتماع اور ان میں فساد و تعفن پیدا ہو جانا اسباب | جس سے کیڑوں کی پیدائش کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے۔

II. کسی اور مقام سے کیڑوں کا اوپر کی طرف ریگ جانا

علامات | شدید غارش ہوتی ہے، ناک سے بد بو آتی ہے، استراحت کی حالت میں درد میں کمی ہوتی ہے اور چلنے پھرنے یا متحرک رہنے کی صورت میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ناک کے راستہ کیڑوں کا اخراج بھی ہوتا ہے جو ایک یقینی اور تشخیصی علامت ہے

تنقیہ دماغ کریں

اصول علاج | قاتل دیدان دوائیں کھلائیں

III. علاج | ایلا ریج فیقلا، سوڈا کرائیں، اس سے دماغ کا تنقیہ ہو جائے گا رات میں سوتے وقت اطرینل شاہترہ ۷ گرام کھلائیں

۔ برگ نیم کے جوشاندہ سے ناک میں پچکاری کریں

۔ عصارہ برگ شفتالو، عصارہ توت اور آفستین نیز درمنہ ترکی کا عصارہ بطور جوشاندہ استعمال کریں۔

صداع ضعف معدی و ذکات حس معدی

اسی مریض میں معدہ کے ضعف اور ذکات کی وجہ سے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ مریض مضطرب ہو جاتا ہے۔

اسباب I. ضعف فم معدہ کی وجہ سے فاسد مواد کا جذب و قبول
II. تعفن و فساد کی اذیت کا عصبی تعلق کی وجہ سے دماغ تک پہنچنا
III. معدہ میں صفراء کی زیادتی

ضعف معدہ کی علامتیں موجود ہوتی ہیں، خلو، معدہ کی صورت میں درد میں غیر معمولی علامات | طور پر شدت پیدا ہو جاتی ہے، صبح کو خواب سے بیدار ہونے پر بھی درد میں شدت ہوتی ہے، ترش اشیاء کے استعمال سے بھی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اصول علاج | ہضم کی اصلاح کریں اور مقویات معدہ استعمال کرائیں
F. فاسد و موزی خلط کا تنقیہ و ازالہ کریں

۔ مقیات استعمال کرائیں

علاج | صبح کو بیدار ہونے کے بعد روٹی کا ٹکڑا آب انار یا آب انگور خام میں بھگو کر کھلائیں
۔ غذائینے کے بعد چند دنوں تک حب پیپتہ ۲ عدد / جوارش کوئی / جوارش جالینوس
۷ گرام کھلائیں۔

۔ معدہ میں صفراء و موزی خلط کے اجتماع کی صورت میں گرم پانی میں سکنجبین ۸ گرام ملا کر
نوش کرائیں۔ اس سے تھکے ہو جائے گی، اس کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
جوارش کوئی ۷ گرام کھلا کر، تخم کنوٹ ۳ گرام، بادیان ۱۵ گرام، موسیر منقہ ۹ دانہ، عرق بادیان،
عرق مکو، ہر ایک ۲ ملی لیٹر میں پیس چھان کر شربت درد ۸ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں — اور
درد میں افادہ کے باوجود چند دنوں تک جوارش کوئی کا استعمال برقرار رکھیں۔


صداع شرکی

SYMPATHETIC HEADACHE

اس مرض میں مختلف اعضاء کے اشتراک سے درد سر واقع ہوتا ہے، جس سے مریض پریشان اور مضطرب ہو جاتا ہے۔

اقسام

تقسیم باعتبار اعضاء اشتراک



I, قبض

II, سوء ہضم

III, ورم رحم

IV, التهاب کبد / التهاب کلیہ

V, ورم طحال

VI, التهاب مرق

VII, قدامی امراض

VIII, ولادت کے بعد خون نفاس کا احتباس

IX, وجع المفاصل / سلعوات دماغیہ / آنکھوں کی تکان

علامات: ابتداء میں درد کا آغاز بالعموم دورے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا مناسب علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہی درد رفتہ رفتہ مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔

التهاب کلیہ یا نقص فعل کلیہ کی صورت میں متلی اور تھکی شکایت ہوتی ہے جو بدقت تمام رکتی ہے، درد کی ٹیسس منتشر طور پر محسوس ہوتی ہیں، سر میں امتلاء محسوس ہوتا ہے، نبض صلب چلتی ہے، شراہین کی دیواریں دبیز ہو جاتی ہیں، غنودگی سی طاری ہوتی ہے اور دیگر کلیوی علامات

موجود ہوتی ہیں۔ سو، ہضم، قبض اور دیگر عضوی اشتراک کی وجہ سے عارض ہونے والے درد میں ان اعضاء کی مخصوص علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔

آنکھوں کی تھکان، وجع المفاصل اور سلعات دماغیہ کی صورت میں ان کی مخصوص علامات اور سرگزشت ملتی ہیں۔

متعلقہ اعضاء کے امراض کا ازالہ کریں، اس سے مدافع خود بخود ختم

اصول علاج

ہو جائے گا۔

۔۔۔ درد کی شدت اور المیہ کی کوکم کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔

۔۔۔ قدامی صورت میں فصد کھولیں اور سینگیوں کھینچوائیں و تنقیہ کریں

۔۔۔ قدامی صورت میں مافن کی فصد کھولیں، پنڈلیوں پر سینگیوں کھینچوائیں اور دماغ ذیل

علاج

ادویہ سے تنقیہ کرائیں

حب بنفشہ یا ایاراج فیکرا کھلائیں
۔۔۔ پیروں کو کنج ران سے لے کر قدم تک خوب زور سے باندھیں اور نمک طعام و روغن فیری سے مالش کریں۔

۔۔۔ وجع المفاصل کی صورت میں اس کے مستقل علاج کے ساتھ نقوع شاہترہ میں سورنجان اور بوزیدان کا اضافہ کر کے استعمال کرائیں۔

۔۔۔ شرکی معدی میں درج ذیل نسخہ مفید ہے۔
نسخہ:-

پوست ہلیلہ کابل، پوست ہلیلہ زرد، آملہ خشک، ہلیلہ سیاہ ہر ایک ۴۴ گرام، کشنیز خشک معطر ۴۴ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر ہلیلہ جات کو روغن بادام میں چرب کر کے شہد خالص تین گنا ملا کر رکھ لیں اور ۹۔۔۔ ۴۴ گرام کھلائیں۔ موسم گرما میں شہد کی بجائے نبات سفید تین گنا ملائیں۔

عصابہ

TIC DOULOUREUX

اس مرض میں صبح کے وقت قحط کے پانچویں عصب، عصب ثلاثی و جہی یا اس کی شاخ میں درد ہوتا ہے، درد کی شدت سے مریض مضطرب و پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مجنونانہ حرکات تک کر گذرتا ہے۔ یہ مرض ادھیڑ عمر والوں میں کثیر الوقوع ہے۔

(I) گرم یا سرد اخلاط کا دماغی عضلات میں صعود کر کے محبس ہو جانا
(II) اخلاط اربعہ کا دماغ کی طرف صعود

(III) احتباس نزول و زکام

(IV) قبض

(V) سوء ہضم

(VI) دُموی اجزاء کا طبعی ضعف / سوء القنیہ

(VII) تامل و تحرک الاسنان

(VIII) بعض امراض اذن وOLF

(IX) سرد و گرم ہو جانا

(X) طیر یا وی سمیت

(XI) وجع المفصل

(XII) فقرس

(XIII) پانچویں عصب کی استخوانی گذرگا ہوں میں التهاب پیدا ہو جانا

علامات | درد کا آغاز عام طور سے صبح تڑپ کے ہوتا ہے اور عصب ثلاثی و جہی کی شاخیں چونکہ بہت زیادہ ہیں اس لیے ان کے ماؤف ہونے کے لحاظ سے مختلف علامتیں نمایاں ہوتی ہیں، چنانچہ یہ درد رخسارہ، ابرو، تھوڑی، پیوٹے، آنکھ کے ڈھیلے، پیشانی یا زیریں جڑے میں ہو سکتا ہے، درد کی نوعیت نشتر برقی اور ترقی ہوتی ہے، درد کی شدت کی وجہ سے مریض بے چین ہو کر

صحیح اٹھتا ہے اور مقام درد کو بار بار ملتا اور دباتا ہے، بعض اوقات درد کی شدت سے لیوں کو دانتوں سے کاٹا اور چباتا ہے اور خود کشی تک کی کوشش کر ڈالتا ہے، کبھی کبھی عقلات اینٹھ جاتے ہیں تاثر جانب کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے، درد کا دورہ معمولی تحریکات اور انقلابات نفسانی سے بھی واقع ہو سکتا ہے چنانچہ کھانسی یا چھینک آنے، سرد ہوا کا جھونکا لگنے یا خوشی و مسرت یا رنج و غم کی خبر سننے سے بھی دورہ پڑ سکتا ہے۔

حالات شدید حالات میں مرض کا دورہ بہت جلد جلد پڑتا ہے لیکن مزمن صورت میں ہفتوں ہینوں بعد واقع ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شقیقہ کا بیان ملاحظہ کریں۔

غلبہ دم یا فساد دم کی صورت میں پہلے فصد کھولیں اس کے بعد پیشانی اصول علاج پر جو نیچیں لگائیں

— پنڈلیوں اور پیروں پر دھک کریں۔

— صفراوی، بلغمی وغیرہ اخلاط کے غلبہ کی صورت میں منفعج و مسہل کے ذریعہ تنقیہ کریں، اس کے بعد تبرید کریں،

— حسب ضرورت فساد کریں

— ناک میں دوا ٹپکائیں

علاج — بزرالینج کا فور، افیون، ہر ایک ۲ گرام، باریک پیس کر عرق کلاب میں مسور کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت عورت کے دودھ میں حل کر کے ناک میں ٹپکائیں۔

— اخلاط کی رعایت سے منفعج، مسہل اور تبرید کا اصول علاج اختیار کریں جن کا تفصیلی بیان سابق میں ہو چکا ہے۔

— تخم کاہو، گل نیلوفر، آرد جو، کشنیز خشک، مندر سفید، ہر ایک ۲ گرام، عرق کلاب میں پیس کر روغن گل ۲۴ ملی لیٹر، افادہ کر کے فساد کریں۔

— ایلوا، چراغہ شیریں ہر ایک ۱ گرام، کشنیز خشک، تخم کرفس زیرہ سفید ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق کشنیز سبز میں تمام دواؤں کی ۴ گولیاں بنائیں اور صبح، شام ۱۔ اگولی ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں۔

— شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خرد سیاہ، شیرہ کشنیز خشک، ہر ایک ۳ گرام، عرق گاؤ زبان

۲۴ ملی لیٹ، میں نکال کر شربت نیلو فر ۲۴ ملی لیٹ کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ اور درج ذیل نسخہ ضاد استعمال کرائیں۔
نسخہ ضاد:-

آرد جو، تخم خطمی، مندل سفید، گل سرخ، ہر ایک ۳ گرام، افیون اگر اگرم، جلد دواؤں کو عرق کلاب میں باریک پیس کر، مزہ ۲۴ ملی لیٹ شامل کر کے نیم گرم ضاد کریں۔
۔ احتباس نزلہ کی صورت میں ترنج ساٹھی تین مرتبہ شیر مدار میں تراور خشک کر کے باریک پیس کر سفوف بنائیں اور بطور ہلاس نفوخ کریں۔
۔ اگر حرارت ساذج مرض کا باعث ہو تو کافور پیس کر روغن گل میں ملا کر ناک میں ٹپکائیں۔
یا یہ ضاد استعمال کرائیں۔
نسخہ ضاد:-
برگ کاسنی تازہ، پیس کر متاثر مقام پر ضاد کریں۔


Learn Unani By Abdul Wahid Sumari

شقیقہ

MIG-RAINE

اس مرض میں، نصف سر میں، دائیں یا بائیں جانب اور کبھی سارے سر میں باری کے ساتھ شدید درد سر ہوتا ہے، سارے سر میں درد کی صورت میں بھی ایک طرف درد کا احساس نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، درد کے ساتھ متلی، تھ، اور آواز دروشتی کے تئیں بہت زیادہ حس انجیزی بھی ہوتی ہے، چنانچہ طلوع آفتاب کے ساتھ درد میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور زوال آفتاب کے ساتھ اس کی شدت میں تخفیف ہونے لگتی ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی درد ختم ہو جاتا ہے اور مریض اپنے آپ کو بالکل صحت مند محسوس کرتا ہے۔

اقسام



اسباب

- I, نزلا دی رطوبتوں کا کسی ایک شق میں محسوس ہو جاتا
- II, بخارات کا تمام جسم، یا اسی شق کی جانب کے اعضاء سے سر کی طرف صعود کرنا

III, سرد یا گرم اختلاط

IV, کثرت جماع

V, کثرت حیض

VI, عرصہ تک دودھ پلانا

VII, اختناق الرحم

VIII, قبض

IX, سوء ہضم

عام جسمانی ضعف	(X)
دماغی مشاغل کی کثرت	(XI)
طیریاوی سمیت	(XII)
خون کی کمی	(XIII)
صداع	(XIV)
نقرس	(XV)
جمع المفاصل	(XVI)
سودا مزاج بعضی	(XVII)
ضعف بھارت	(XVIII)
تیز روشنی	(XIX)
تیز بو	(XX)
وراثت	(XXI)
بے خوابی	(XXII)
سنگان	(XXIII)
فاؤکشی	(XXIV)
سریع الاشتعال ہونا	(XXV)
بیش حساسیت	(XXVI)

علامات | I, یک نمبر : شقیقہ کی مکمل نوبت، درج ذیل تین خصوصی علامتوں پر منحصر ہے :

(II) درد سر

(III) خضائی اختلال، جو متلی، تھ یا بعض اوقات اسہال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

دورہ شروع ہونے سے قبل عام طور سے ضعف، ماندگی، سستی اور ثقل راس کی شکایت ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے چمکاریاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ علامات عام طور سے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی رونما ہونے لگتی ہیں، اس کے بعد مدین، ابرو اور آنکھ کے پچھلے حصہ میں مدینا دورہ شروع ہو کر رفتہ رفتہ تیز تر ہو جاتا ہے اور مدین کی عروق تیزی کے ساتھ تڑپنے لگتی ہیں،

آواز اور تیز روشنی کی برداشت نہیں ہوتی، حرکت سے عوارض میں شدت آجاتی ہے، بعض اوقات بینائی میں بھی خلل واقع ہوتا ہے اور معمولی غفلت سے بے عارت کے زائل ہو جانے کا بھی امکان رہتا ہے، بصورت دیگر نزول الما ہوسکتا ہے۔

درد عام طور سے سر کے ایک ہی جانب ہوا کرتا ہے اور بعض اوقات سارے سر میں بھی ہونے لگتا ہے تاہم درد کی شدت ایک ہی جانب زیادہ ہوتی ہے، سر چھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، جسم کانپتا ہے، نبض ضعیف چلتی ہے، شدت مرض میں متسی اور رتے ہوتی ہے، جس میں ابتدا میں غذائی مادہ خارج ہوتا ہے اس کے بعد فاسد اخلاط خارج ہوتی ہیں۔

خلط فاسد کے، اشتیہ دماغ میں اثر انداز ہونے کی صورت میں درد میں غضب کی شدت ہوتی ہے اور اس کی ٹیسس آنکھ اور کوئے کی طرف نکلتی محسوس ہوتی ہیں، بعض اوقات درد کی شدت سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔

اگر مادہ باہر کی شرائین میں ہو تو عوارض میں خفت ہوتی ہے نیز شرائین پر ہاتھ رکھنے سے عوارض میں خفت آتی ہے، طنین کی صورت میں سر ہلکا اور مقام درد پر ہاتھ رکھنے سے گرم محسوس ہوتا ہے، بخارات کی صورت میں سرد ہوا یا سرد پانی سے درد میں سکون آجاتا ہے۔ یرق کی صورت میں سر ہلکا محسوس ہوتا ہے، تاہم ملمس سرد ہوتا ہے۔

اخلاط بارہ کی صورت میں گرانی سر ہوتی ہے، ملمس سرد ہوتا ہے، مرض کا دورہ دیر تک رہتا ہے اور عام طور سے نزلہ و زکام کی شکایت رہتی ہے، نیز سرد اندامیہ سے راحت ملتی ہے اور اخلاط عارہ کی صورت میں درد میں غیر معمولی شدت ہوتی ہے ملمس عارہ ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے نیز سرد اشیا کے استعمال سے راحت ملتی ہے۔

دورہ کی مدت ۲-۳ گھنٹے سے ۲۴ گھنٹے تک اور بعض اوقات تین یوم تک ہو سکتی ہے لیکن عام طور سے غروب آفتاب کے ساتھ نوبت بھی ختم ہو جاتی ہے، دورہ ختم ہونے پر مریض کو نیند آجاتی ہے اور بیدار ہونے پر مریض اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہے۔

واقع رہے کہ شقیقہ عام طور سے سن بلوغ کے قریب شروع ہوتا ہے اور مردوں کی نسبت عورتوں میں کثیر الوقوع ہے، تحقیق کرنے پر اکثر بچپن میں صفراوی حملوں کی سرگزشت ملتی ہے، یہ مرض بوڑھوں یا ادھیر عمر والوں میں نادر الوقوع ہے، پچاس سال کی عمر کے بعد اس کی نوبت عام طور سے ختم ہو جاتی ہے، شقیقہ کی نوبت اور حیض میں قریبی تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ سن ایاس کے بعد

عورتوں میں اس کا حملہ مشاہدہ میں نہیں آیا ہے۔

تفریقی علامات

عصابہ

- ۱۔ درد سر کے عرض میں ابرو کے علاوہ آنکھ، نثار، تھوڑی اور زیریں جبرطے میں بھی محسوس ہوتا ہے۔
- ۲۔ اگرچہ علی الصباح شروع ہوتا ہے تاہم زوال یا غروب آفتاب وغیرہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ رات و دن مسلسل یا غیر مسلسل طور پر رہتا ہے۔
- ۳۔ مادہ مرض افترہ دماغ یا شراٹین میں ہوتا ہے۔
- ۴۔ تھے وغیرہ نہیں ہوتی۔
- ۵۔ نبض صلب اور متدنیز عشاء غلام اور خلیفہ ہوتا ہے۔
- ۶۔ ادھیڑ عمر کے مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔

شقیقہ

- ۱۔ درد عام طور سے نصف سر کے طول میں ہوتا ہے۔
- ۲۔ صبح کے وقت، طلوع آفتاب سے شروع ہو کر زوال آفتاب اور پھر غروب آفتاب کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے اور مریض کو الف فرہوش کر دیتا ہے۔
- ۳۔ مادہ مرض افترہ دماغ یا شراٹین میں ہوتا ہے۔
- ۴۔ متلی یا تھے ہو سکتی ہے۔
- ۵۔ نبض سریع اور پیشاب اترجی یا تینی ہوتا ہے۔
- ۶۔ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے۔

غلبہ دم یا فساد دم کی صورت میں یا سلیق یا قیصال کی قصد کھولیں اور دوا تینی یوم بعد پیشانی یا صدغین پر جو نیکیں لگائیں۔

اصول علاج

- ۔ بخارات کے نزول کے لیے پنڈلیوں اور پیروں کی مالش کریں
- ۔ دموی اخلاط کے علاوہ دوسرے اخلاط کے غلبہ کی صورت میں خلط غالب کا منفع و مسہل کے ذریعہ تنقیہ کریں اس کے بعد تبرید کریں۔
- ۔ حالت سکون میں پاک و صاف و خوش و خرم رہنے کی تاکید کریں۔
- ۔ کثرت مشاغل اور دماغی کاموں سے احتیاط کریں۔
- ۔ طلوع آفتاب سے قبل کھلی فضا میں سیر و تفریح کی ہدایت کریں
- ۔ طلوع آفتاب کے بعد ہی خود کھانا کھانے کی تاکید کریں، بشرطیکہ نوبت کی وجہ خلوع مہدم ہو۔

بصورت دیگر غذا اور پانی کم استعمال کرائیں۔

نوبت کے وقت غذا نہ دیں اور قبض ہو تو اطمینان زمانی ۷ گرام کھلائیں اور اگر مزید
علاج ضرورت ہو تو درج ذیل ادویہ کا حقہ دیں۔

نسخہ حقہ:

شک طعام ۱۲ گرام، صابن ۱۲ گرام، ————— ایک لیٹر گرم پانی میں ملا کر روغن بید انجیر
۳۶ ملی لیٹر شامل کر کے حقہ کرائیں۔

۔ اگر درد کا حملہ خدا کے بعد ہو تو حقہ کرائیں۔

۔ منوم کے طور پر روغن بنفشہ، روغن کدو یا روغن کاہو سر پر رکھیں

۔ تخفیف درد کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ:

صمغ عربی ۳ گرام، افیون ۷ گرام، زعفران ۵۰ ملی گرام، جملہ دواؤں کو باریک پیس کر گلاب یا
سفید میوہ مرغان میں گوند میں اور کاغذ پر لٹا کر صدقین پر رکھیں
۔ تنقیہ معاد کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:

شیر و تخم خیارین، شیر و تخم خرفہ، شیر و کشنیز خشک ہر ایک ۳ گرام، عرق بادیان ۴۴ ملی لیٹر میں
مکمل کر ثربت نیلو فر ۲۴ ملی لیٹر کے ہر لہ نوش کرائیں ————— اگر صفراوی علامات موجود ہوں تو
اسی نسخہ میں شیر و زرشک ۳ ملی لیٹر اور عناب ۵ دانہ کا اضافہ کریں ————— ترطیب کے لیے اور
مسکن کے طور پر اس نسخہ میں شیر و ہمزہ کدو ۷ شیریں، اور شیر و تخم کاہو ہر ایک ۳ ملی لیٹر کا بھی اضافہ
کر سکتے ہیں۔

۔ مزمن نزلہ کی صورت میں گل بنفشہ، تخم خلی، تخم خبازی ہر ایک ۷ گرام، گاؤ زبان، شاہترہ
ہر ایک ۵ گرام، عناب ۵ دانہ، سپستان ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو شام کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر
خمیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں اور ایک دن کے وقفہ سے رات میں اطمینان زمانی ۷ گرام ہر لہ آب گرم نوش کریں
۔ شدت درد کی صورت میں سیندر کو سفید کاغذ پر لٹا کر فیتہ بنائیں اور سورج نکلنے سے قبل
اس کے ایک سرے کو آگ دکھا کر مخالف جانب کے نچنے میں سونچائیں۔

۔ بندوق ہندی (دریٹھ) کو کسی قدر پانی میں گھس کر متاثر جانب کے مخالف ناک میں سوجھا کر لیں۔

— نوشادر، چونا، تھوڑے پانی میں حل کر کے ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور مریض کو سٹھکھائیں۔

— قرص مثلث اعداد، پانی میں گھس کر کنپٹی دھوئیں، اور پیشانی پر طلا کر لیں۔

— درج ذیل نسخہ بھی سودمند تصور کیا جاتا ہے۔

قرص دوار الشفا ۲ عدد، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جو اہر والا میں ملا کر کھلائیں اور اوپر سے مغز بادام شیریں، مغز کدوے شیریں، مغز تخم تربوز، مغز تخم کاہو، مغز تخم خشتا ش سفید، ہر ایک ۴ گرام، جلد دواؤں کو پانی میں پیش کر چھان لیں اور معری ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

— قرص نقرہ جدید اعداد، خمیرہ گاؤ زبان جدوار عدد صلیب والا ۷ گرام، صبح کو کھلائیں اور جب جدوار اعداد بوقت خواب دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔

— معجون نانخواہ بعد از طعام کھلائیں

— جمال گوڈ ایک عدد، پانی میں گھس کر درد کے مخالف جانب کی کنپٹی پر ایک روپیہ کے برابر ضاد کریں۔

— شقیقہ کے مریض ہونے کی صورت میں درج ذیل نسخہ ضاد استعمال کرائیں
نسخہ ضاد :-

برگ جنا، شحم حنظل، اشق، اکلیل الملک، کباب جینی، زبرجد، ہموزن کو باریک پس لیں اور مرکز میں ملا کر ضاد کریں۔


سرسام

(التهاب اغشیه دماغ)

MENINGITIS

اس مرض میں دماغ کی دو اغشیہ، ام رقیق [Piamater] اور ام غلیظ / ام جاقیہ - Dura mater میں سوزش و التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ اطباء التهاب دماغ - Cerebritis اور دو اغشیہ دماغ اور التهاب دماغ [Cerebro Meningitis] کو سرسام Meningitis کے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

اقسام



اس میں مادہ مرض حار ہوتا ہے اور مرض اغشیہ دماغ میں ہوتا ہے، چاہے اگر مادہ مرض صفا ہے تو اس کو قرنطیس کہتے ہیں اور مادہ مرض خون ہے تو قرنطیس غیر خالص۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے بعض اطباء، مادہ دہوی کی صورت کو صوف "قرنطیس" اور مادہ صفاوی کی صورت کو "قرنطیس خالص" قرار دیتے ہیں۔

(باقی صفحہ 79 پر)

اسباب | اخلاط :-
 اخلاط الاربعہ میں سے کسی کا غلبہ یا فساد

تدابیر حارہ

I دھوپ کی تمازت

II آگ کی تمازت

III کثرت سے نوشی

IV شدید ریاضت

V گرم اشیاء کا استعمال

حمیات حارہ / متعدی امراض :-

I حمی محقہ

II جدری

III حصبہ

IV طاعون

V آنکھ

VI مادہ سل

VII انف العنزہ

امراض مفاصل :-

I وجع المفاصل

۱۔ اس نوع میں فاسد خون متعفن ہو کر جوہر دماغ میں التهاب کا باعث ہوتا ہے۔

۲۔ اس نوع میں صفراء یا صفراء خون، جوہر دماغ میں التهاب کا باعث ہوتا ہے۔

۳۔ اس نوع میں جوہر دماغ میں غلیظ سودا و محترق، التهاب کا باعث ہوتا ہے۔

۴۔ اس نوع میں رزی، فاسد اور محترق خون کی وجہ سے دماغی شرائین میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔

۵۔ اس نوع میں بلغم کی وجہ سے مجاری جوہر دماغ یا نفس دماغ میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۔ اس نوع میں سودا کی وجہ سے مجاری جوہر دماغ یا نفس دماغ میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

نقرس	II
امراض راس :-	
فرب دماغ	I
عظام قحف کا درد	II
جبرائیم :-	
میننگوکوکس	I
نیوموکوکس	II
اسٹیفیلوکوکس	III
کرائیڈیوکوکس نیوفامنس	IV
امراض قشبی :-	
پولیو	I
درد اصل الاذن	II
التهاب کبد قشبی	III
Viral Hepatitis	
نملہ سادہ	IV
Herpes Simplex	
حمی غدویہ	V
Lymphogranuloma Venereum	
Variola-Zoster Virus	VI
طفیلی امراض :-	
Amoebiasis	I
Trichiniasis	II
Trypanosomiasis	III

مستزقات :-

کان یا ناک کی سوزش کی سرایت	I
امراض جلد کے مادہ کا دماغ کی طرف انتقال	II

کثرت مطالعہ	۱۰۱
احتباس بول	۱۰۲
التهاب کلیہ مزمن	۱۰۳
قبض	۱۰۴
احتباس طث	۱۰۵
غیض و غضب	۱۰۶
ورم مثانہ	۱۰۷
فم معدہ میں اجتماع غلط	۱۰۸
وجع الماعصاب	۱۰۹
ورم رحم	۱۱۰

”معمولی“۔

علامات | سرسام کی مخصوص علامتوں کے ظہور سے قبل سستی، کسندی اور مزاج میں چڑچڑاہٹ ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے اور سر گھومنے لگتا ہے۔ اس کے بعد مرض کی علامات مخصوصہ کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ نوجوانوں میں سردی سے اور بچوں میں تشنج کے ساتھ بخار آتا ہے، جو ابتدا میں ۱۰۲ درجہ تک ہوتا ہے، — اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے، پیٹ پر تھک ہوتا ہے، غینہ غائب ہو جاتی ہے۔ سر میں شدید درد اور بار بار تشنج کے دورے پڑنے کی وجہ سے مریض چیختا چلاتا ہے، دانت پیستے، عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے، ہڈیاں اور اختلاط عقل ہوتا ہے، آنکھیں سرخ، نمناک ہوتی ہیں، اور اکثر ہلکی باندھے دیکھا کرتا ہے، اطراف میں تشنج ہوتا ہے، قبض اور احتباس بول ہوتا ہے، گردن اور پشت میں صلابت آجاتی ہے، شدید ہڈیانی صورت میں مریض بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بستر اور کپڑوں کو سختی سے پکڑ لیتا ہے، بعض اوقات بستر اور کپڑوں کو چھنے اور دیوار یا ہوا میں کسی غیر مری چیز کو تلاش کرتا یا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار ہڈیاں کی بجائے مکمل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، عضلات مفلوج ہو کر مسترخ ہو جاتے ہیں اور بول و ہرگز بغیر ارادہ

نوٹ۔۔۔ سواغیر حقیقی کے اسباب بھی کم و بیش یہی ہیں تاہم اس میں دماغ اور اغشیہ دماغ میں التهاب نہیں ہوتا، سر کے بیرونی احصام، ورم معدہ اور عمومی درد وغیرہ اس کے اسباب محرکہ میں شامل کئے جاسکتے ہیں۔

خارج ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے۔ تنفس خراٹے سے آتا ہے اور مریض بے ہوشی ہی کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔
(ب) خصوصی:-

غلط خلط دموی کی صورت میں ناک سے خون کے قطرے آتے ہیں، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوتی ہیں، ان سے پانی خارج ہوتا ہے، ان میں میل بھی ہوتا ہے، زبان سیاہی مائل سرخ ہو جاتی ہے، پیشانی کی عروق خون سے بھری ہوتی ہیں۔ نبض اور تنفس کی حرکتیں عظیم ہوتی ہیں، مریض اضطراب کی وجہ سے اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، بے خوابی زیادہ نہیں ہوتی، اور ہڈیاں کے اثنا میں مریض خوب ہنستا ہے۔ غلط خلط صفراوی کی صورت میں بخار نہایت شدید ہوتا ہے۔ ہڈیاں اور اختلاط عقل غلط دموی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ شدید بے خوابی ہوتی ہے۔ زبان نہایت خشک ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، منہ اور آنکھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، ناک کے سرے پتلے ہو جاتے ہیں۔ پیشانی کی جلد پچھے کی طرف کھینچ جاتی ہے، عصب بصری کے التهاب کی وجہ سے روشنی ناگوار گذرتی ہے، آواز سے بھی نفرت ہوتی ہے، پتیلیاں پھیل جاتی ہیں، صفراوی تے آتی ہے۔ پیشاب سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، نبض زیر چلتی ہے تاہم جمی کی شدت کے تناسب سے نبض میں اس قدر سرعت نہیں ہوتی اور یہ علامت صرف سرا صفراوی کے ساتھ ہی مختص ہے، رقبض ہوتا ہے۔

غلط خلط بلغمی کی صورت میں منہ سے بکھرتا لعاب خارج ہوتا ہے، آبکائیاں آتی ہیں، زبان سفید ہوتی ہے، مریض خاموش پڑا رہتا ہے اور بات کا جواب مشکل سے دیتا ہے، پککول میں ثقل محسوس ہوتا ہے، براز نرم اور پیشاب غلیظ ہوتا ہے، ثقل و کسندہ ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔

غلط خلط سوداوی کی صورت میں بخار خفیف ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی خشکی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، مریض دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے، گریہ فزائی اور جزع فزع کرتا ہے۔ موت کا ذکر اکثر کرتا رہتا ہے۔ نیند میں چونک جاتا ہے، تنفس میں کابوسی کیفیت ہوتی ہے، نبض بلی، مختلف اور صغیر و صلب چلتی ہے۔

مقام مرض کے اعتبار سے بھی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ نفس دماغ میں التهاب کی صورت میں ابتدا میں متلی ہوتی ہے، آبکائیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد قعر چشم میں نہایت شدید درد ہوتا ہے، سر میں ثقل محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد حواس میں یکدر اور اختلاط عقل ہوتا ہے، مادہ مرض کے صفراوی ہونے کی صورت میں بخار نہایت شدید ہوتا ہے، نبض عظیم اور موجی چلتی ہے۔

مقدم دماغ میں التهاب کی صورت میں خیالات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے لہذا وہ غیر موجود اور غیر مری چیز کو موجود اور مری خیال کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ کبھی لباس اور بستری کچھ چھنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی ہانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

وسط دماغ میں التهاب کی صورت میں فکری فساد رونما ہوتا ہے، مریض ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے اور پیشاب غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔

موخر دماغ میں التهاب کی صورت میں شدید زنیان ہوتا ہے غشا و صلب میں التهاب کی صورت میں افشئہ میں درد اور تشنج ہوتا ہے نبض صلب اور فشاری چلتی ہے۔

غشا الین میں التهاب کی صورت میں ابتداء مرض میں تحف اور پیشانی میں شدید درد ہوتا ہے، اور نبض موجی چلتی ہے۔

جملہ افشئہ دماغ اور دماغ میں التهاب کی صورت میں سابق میں مذکور (عمومی) علامات رونما ہوتی ہیں۔

ذیل میں سرسام اور اس سے مشابہ بعض امراض کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں

تفریقی علامات

سرسام حار	تسم بول
۱۔ قرب یا کسی مرض حار کی سرگزشت ملتی ہے۔	۱۔ درم کلیہ کی سرگزشت ملتی ہے۔
۲۔ تبہج نہیں ہوتا۔	۲۔ عام تبہج ہوتا ہے
۳۔ حرارت دن بدن زیادہ ہوتی ہے۔	۳۔ حرارت ابتداء میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔
۴۔ تشنج فروری نہیں۔	۴۔ تشنج لازمی ہے۔
۵۔ گردن کے عضلات میں صلابت اور ارڑ ہوتی ہے۔	۵۔ صلابت اور ارڑ نہیں ہوتی۔
۶۔ مریض کے پاس سے بو نہیں آتی۔	۶۔ مریض کے پاس سے پیشاب کی بو آتی ہے۔
۷۔ پیشاب طبعی، خارج ہوتا ہے۔	۷۔ پیشاب میں رطوبت بیغیہ اور قشر خارج ہوتے ہیں۔

- ۸۔ ہڈیاں اور اختلاط عقل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ۸۔ ہڈیاں غیر موجود یا نہایت خفیف ہوتی ہے۔
 ۹۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ ۹۔ چہرہ مومی ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

ہڈیاں سکڑی [Delirium Tremens]	سرسام حاد [Acute Meningitis]
۱۔ حرارت طبعی ہوتی ہے۔	۱۔ حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
۲۔ ہڈیاں شدید اور مسلسل ہوتا ہے	۲۔ ہڈیاں غیر مسلسل اور نسبتاً زیادہ شدید نہیں ہوتا۔
۳۔ ملمس ابھورطب ہوتا ہے۔	۳۔ ملمس جاریا بس ہوتا ہے۔
۴۔ پتلیاں طبعی ہوتی ہیں۔	۴۔ پتلیاں منقبض ہوتی ہیں۔
۵۔ یہ کوائف نہیں ہوتے۔	۵۔ مریض لمزے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔
۶۔ کسی طرح کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔	۶۔ شدید درد ہوتا ہے۔
۷۔ صلابت اور درد نمایاں نہیں۔	۷۔ گردن میں صلابت اور درد نمایاں ہوتا ہے۔
۸۔ آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں۔	۸۔ روشنی سے نفرت ہوتی ہے۔
۹۔ نبض سریع چلتی ہے۔	۹۔ نبض نسبتاً بھل چلتی ہے۔

تفریقی علامات

مانیا [Mania]	سرسام حاد [Acute Meningitis]
۱۔ زبان صاف ہوتی ہے۔	۱۔ زبان گدلی ہوتی ہے۔
۲۔ دونوں ہی علامتیں مفقود ہوتی ہیں۔	۲۔ قے آتی ہے اور شدید بخار ہوتا ہے۔
۳۔ درد نہیں ہوتا۔	۳۔ درد ہوتا ہے۔
۴۔ نبض زیادہ بھل نہیں چلتی۔	۴۔ نبض بھل چلتی ہے۔

تاہم غصہ سے احتراز کریں۔

علاج |۔ سرسام حار میں پہلے حقنہ کریں۔

نسخہ حقنہ :-

گل بنفشہ، گل سرخ ہر ایک ۲ گرام، غلاب، پستیاں ہر ایک ۵ ادانہ، جملہ دواؤں کو ۱۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور نمک طعام ۶ گرام، روغن بیدانجیر ۳۶ ملی لیٹر شامل کر کے حقنہ کریں۔ حقنہ کے بعد درج ذیل نسخہ کا پاشورہ کریں۔

نسخہ پاشورہ :-

گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل خطمی، ہبوس گندم ہر ایک ۲ گرام، برگ سناوکی، نمک طعام ہر ایک ۶ گرام، جملہ دواؤں کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دیں جب ۲ لیٹر پانی رہ جائے تو نیم گرم پاشورہ کرائیں۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ لخلخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ لخلخہ :-

منڈل سفید، گل ازمنی، خس ہر ایک ۳ گرام، آب کشیزبہ، عرق گلاب ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، جملہ دواؤں کو حل کریں اور تھوڑا کافور ملا کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور مریض کو نوش کھائیں۔ نسخہ لخلخہ کے بعد درج ذیل نسخہ تبریدہ اس استعمال کرائیں۔

نسخہ تبریدہ :-

شیرہ غلاب ۵ دانہ، لعاب بیدانہ، شیرہ تخم کاہو مقشر، شیرہ تخم کدوے، شیریں ہر ایک ۳ گرام کو عرق بیدمشک، عرق گلاب ہر ایک ۳۶ ملی لیٹر، عرق گاؤزبان ۵۷ ملی لیٹر، میں نکال کر شربت نیلوفر ۴۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

اگر نسخہ حقنہ کی دوائیں میسر نہ ہوں تو درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل :-

تمر ہندی، ترنجبین، شربت دنیار، شربت درد مکرر، ہر ایک ۴۸ گرام/ ۱۲ ملی لیٹر، عرق گاؤزبان ۴۴ ملی لیٹر، اول الذکر دونوں دواؤں کو عرق گاؤزبان میں بھگو کر حل کریں اور مل چھان کر شربت ملائیں اور حسب ضرورت ایک مرتبہ میں یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے نوش کرائیں۔

۔۔ بعض اوقات مذکورہ نسخہ حقنہ و مسہل کی بجائے درج ذیل نسخہ تلیین استعمال کرنا زیادہ موثر ہے۔

آلو بخارا ۱ دانہ، تمر ہندی ۲۰ گرام کو عرق گاؤڑ زبان عرق مکو، ہر ایک ۷۲ ملی لیٹر، عرق گلاب ۲۲ ملی لیٹر میں جھگو کر زلال حاصل کریں اور اس میں تربجبین خراسانی، گل قند ہر ایک ۸ گرام، شیر خشک ۲۲ گرام ملا کر چھانیں اور عصارہ ریوند ۵۰۰ ملی گرام باریک پیس کر اوپر سے چھڑک کر نوش کریں۔

خمیرہ کا دُزبان عبری جواہر والا، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خمیرہ ابریشم خمیرہ مناب والا، ان میں سے کوئی ایک خمیرہ، ۵ گرام کھلائیں۔

— غلبہ غلط سوداوی کی صورت میں ہلید، بسفانج، گاؤ زبان، برگ بادرنجبویہ ہر ایک ۵ گرام، پستان ۵ دانہ، ترنجبین کے جوشاندہ سے مادہ کو نفع پہنچائیں اس کے بعد مخرج سودا، ادویہ مثلاً ہلید سیاہ، ہلید کابی، سنا، مکی، شاہترہ، اقیتمون، بادرنجبویہ، گاؤ زبان، بسفانج، صیوس گندم، مویز منقی، مغز فلوس خیار شنبہ اور روغن بادام سے تیار کردہ جوشاندہ سے حقہ کریں ماء الشعیر نوش کرائیں اور سکنجبین دیں۔

..... گل سرخ، ناخونہ، برگ خشخاش، برگ چقندر کو پانی میں جوش دیکر سر پہ دھاریں۔

----- سرعام باراد/ بلغمی میں عام طور سے قبض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں سرعام حار کے ذیل میں بیان کردہ حقنہ اور ازالہ قبض کی تدابیر اختیار کریں، اس کے بعد حسب ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ:-

دوا المسک معتدل گرم پہلے کھلائیں اس کے بعد عرق بادیان، عرق گاؤزبان ہر ایک ۵ ملی لیٹر نیم گرم، شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر میں ملا کر شام کو نوش کرائیں۔ اور صبح کو درج ذیل نسخہ منفع استعمال کرائیں۔

نسخہ نمبر :-

گل بنفشہ، بیتخ کاسنی ہر ایک ۷ گرام، موہن منقہ ۹ دانہ، کاڈنربان، تخم خطمی، تخم خیارین، نیمکوفتہ اسطوخودوس، ہر ایک ۵ گرام، جملہ دواؤں کو رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر غمیرہ بنفشہ ۶ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

آٹھ دن بعد اسی نسخہ میں برگ سناہلی ۷ گرام، مغز فلوس خیانتنبہ، ترنجبین، ترمہندی، شکر سرخ ہر ایک ۸ گرام، شیر خشک ۲ گرام، شیر و مغز بادام شیریں ۷ گرام کا اضا ذکر کے تین، چار مسہل دیں۔ اس کے بعد حب ایاراج کے ساتھ ایک مسہل اور دیں۔

— مونگ کی روٹی سر پر رکھوائیں۔

— تحلیل درم کے لیے مرغ یا کبوتر کا شکم چاک کر کے گرم گرم سر پر بندھائیں۔

— مذکورہ بالا تدابیر سے جب عوارض میں تخفیف پیدا ہو جائے تو تقویت دماغ کے لیے کشتہ

خبث الحدید، کشتہ و مرجان جواہر والا، ۵۰۰ ملی گرام، دواء المسک معتدل ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں۔

— درج ذیل نسخہ بھی مجرب ہے۔

نسخہ نمبر :-

گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل خطمی، برگ گل سرخ، سبوس گندم، برگ بید، برگ خشتخاش سفید،

جملہ دواؤں کو پیس کر شیر زن یا شیر بزم میں دوبارہ اس قدر پیس کر غمیر کی مانند ہوئے اور اس کا خول

ساینا کر سر پر رکھیں۔

سرسام دماغی نخاعی

CEREBRO-SPINAL FEVER

اس مرض میں دماغ اور نخاع کی اغشیہ میں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، غشی یا بے ہوشی ہوتی ہے اور جسم پر سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں موسم سرما یا بہار میں ۵-۲۵ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

Meningococcus Infection

اسباب
I) نبتہ سحائے کا تعدیہ
II) سکان

III) دھوپ میں چلنا پھرنا

IV) رنج و غم

V) غربت کی زندگی

VI) نبتہ سحائے سے متاثر شخص سے خلط ملط

ملفوظ رہے کہ نبتہ سحائے کا تعدیہ بالعموم ناک اور حلق کے ذریعہ ہوتا ہے، یہ جرثومہ اسی راستہ سے جسم انسانی میں داخل ہوتا ہے اور اسی راستہ سے خارج بھی ہوتا ہے۔

علامات
مرضی علامات یک یک رونما ہوتی ہیں، چنانچہ سر کے پچھلے حصہ میں شدید درد ہوتا ہے جس کی ٹمیس گردن اور پشت تک پہنچتی ہیں، معمولی جسمانی تحریک سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، گردن اور پشت کے عضلات میں شدید اینٹھن ہوتی ہے، سر پیچھے کی جانب اس قدر کھینچ جاتا ہے کہ گردی دونوں شانوں کے درمیان پہنچ جاتی ہے، اسی کے ساتھ کم و بیش تمام جسم اکڑ جاتا ہے، بعض اوقات اکڑا کی شدت کی وجہ سے ٹانگوں کا کھولنا دشوار ہو جاتا ہے اور بعض گھٹنے سکیرٹے، پہلو پر خمیدہ، پڑا رہتا ہے، بعض اوقات مفاصل متورم ہو جاتے ہیں، شدید ہڈیاں ہوتا ہے، ابکائی اور تے آتی ہے ابتداء سے ہی درجہ حرارت ۱۰۲-۱۰۴ تک ہوتا ہے، عمر البلیغ کی

شکایت ہوتی ہے۔ دانتی بھی لگ سکتی ہے، قبض، بے خوابی، اور نقابت ہوتی ہے، غنودگی، بے ہوشی یا سکتہ کی سی کیفیت ہو سکتی ہے، بچوں میں سرخ کی مانند دورے پڑتے ہیں، فالج بھی ہو جاتا ہے، بخار کے ۶، ۵ دن بعد جسم کے مختلف حصوں میں خاص طور سے زیریں اعضا، میں سرخ یا سیاہی مائل سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، پتلیاں سکر جاتی ہیں، آنکھ کے ڈھیلے کے بعض عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے دائیں آنکھ میں التهاب ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ آواز اور روشنی سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ ————— خفیف حالتوں میں ۱۰، ۱۲ دن میں مرضی علامات میں کمی آنے لگتی ہے، اگر ہاٹ اور تشنج کم ہو جاتا ہے، بخار بھی کم ہونے لگتا ہے اور ہوش و حواس بحال ہو جاتے ہیں ————— اس مرض کی مدت حفاقت ۱۔ ۵ یوم ہے۔

حمی دماغی نخاعی / سرسام دماغی نخاعی اور حمی تیغویہ میں اشتباہ ہو سکتا ہے، ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

حمی تیغویہ	سرسام دماغی نخاعی
۱۔ درد سر جی بھی ہوتا ہے اور نہریان کی صورت میں درد رفع ہو جاتا ہے۔	۱۔ درد سر قہر دی ہوتا ہے اور نہریان کے ساتھ بھی درد موجود ہوتا ہے۔
۲۔ عضلاتی صلابت نہیں ہوتی۔	۲۔ عضلاتی صلابت پہلے نمودار ہوتی ہے۔
۳۔ بھینگا پن نہیں ہوتا۔	۳۔ بھینگا پن ہوتا ہے۔
۴۔ تشنج اور فالج نہیں ہوتا۔	۴۔ عام طور سے تشنج اور فالج ہوتا ہے۔
۵۔ نقابت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔	۵۔ نقابت زیادہ نہیں ہوتی
۶۔ نبض سریع چلتی ہے۔	۶۔ نبض بطنی چلتی ہے۔
۷۔ قے نہیں ہوتی	۷۔ اکثر قے ہوتی ہے۔
۸۔ بحران ہوتا ہے۔	۸۔ بحران نہیں ہوتا
۹۔ چہرے سے جھٹ اور بے خبری کا پتہ چلتا ہے۔	۹۔ چہرے سے اضطراب و درد کا اظہار ہوتا ہے۔
۱۰۔ حرارت ابتدا سے ہی فی معمولی ہوتی ہے۔	۱۰۔ حرارت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے۔

اس کے مرض کے نتیجہ میں بعض اوقات فالج، ثقل سماعت، اندھا پن، دم امل الاذن، الف العنزہ

التهاب اذن، ذات الریه، ذات الحنجرب، ورم مفاصل، الفم، فم اور کلیہ سے نوزل اور التهاب غلاف القلب وغیرہ کی شکایت بھی ہو جاتی ہے اور بعض اعضاء میں میتوت پیدا ہو جاتی ہے۔

دافع عفونت اور قاتل جرثیمہ و قشب دواؤں کے محلول سے حنجروہ اور ناک

اصول علاج

دھوئیں۔

سر پر برت یا سرد پانی کی تھیلی رکھیں۔

میرد نما دلا جائیں۔

الخلخو استعمال کرائیں۔

سرسام حار کے اصول علاج کو اپنائیں۔

علاج ست کافور، ست پودینہ اور ست اجوائن کے چند قطرے پانی میں حل کر کے اس سے حنجروہ اور ناک کو صاف کریں۔

سر کے بال منڈوا کر مندل کو گلاب میں گھس کر، اس میں کافور اور سرکہ کا اضافہ کر کے ایک

کپڑے میں بھگو کر بار بار مریض کے سر پر رکھیں

سر پر برت کی ٹوپی یا سرد پانی کی تھیلی رکھیں۔

درج ذیل نسخہ کو پیشانی پر رکھائیں۔

نسخہ نماد:-

کشتیز خشک، گل بنفشہ، رسوت، مندل سفید، تخم کاہو، معشر، ہر ایک ۳ گرام، جلد دواؤں کو عرق کھو، ۴۴ لیٹر میں پیس کر پیشانی پر نماد کریں اور اس کا اعادہ کرتے رہیں، سود مند ہے۔

درج ذیل لخلخو استعمال کرائیں۔

نسخہ لخلخو:-

مندل سفید، تخم کاہو، گل ارمنی ہر ایک ۳ گرام، عرق بید مشک، عرق گلاب، آب سیب، آب ہی، آب خیار، آب کشتیز، ہر ایک ۲۴ لیٹر، کافور ۱ گرام، ان دواؤں کو ترتیب دے کر مریض کو سونگھائیں۔

اس کے بعد اس نسخہ کو استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

شیرہ خشک، شیرہ مغز تخم کدو، شیریں، شیرہ مغز تخم خیارین، شیرہ تخم کاسنی، ہر ایک

گل بنفشہ، گل سرخ ہر ایک ۱۲ گرام، عناب، پستیاں، ہر ایک ۱۵ دانہ، جملہ دواؤں کو ۱۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر جھان لیں اور نمک طعام ۶ گرام، روغن بیدرنجیر ۳۶ ملی لیٹر شامل کر کے حقنہ کے بطور استعمال کرائیں۔

درج ذیل مسہل بھی فائدہ مند ہے اور حقنہ کی بجائے استعمال ہے۔

نسخہ مسہل :-

تمر ہندی، ترنجبین ہر ایک ۴۸ گرام، شربت دنیا، شربت وردہ دکر ہر ایک ۴۸ ملی لیٹر،
 عرق صاڈ زبان ۴۸ ملی لیٹر، تمر ہندی اور ترنجبین کو عرق صاڈ زبان میں بھگو کر حل کر لیں اور چھان کر
 مذکورہ بالا شربتوں کے ہمراہ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے نوش کر ایسے اور نصف تا ایک گھنٹہ میں ساری
 دو انوش کرادیں۔ اسہال ہو جانے پر تقویت دماغ کے لیے درج ذیل ادویہ استعمال کر لیں۔
 خیرہ صاڈ زبان غبری جواہر والا، خیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خیرہ ابریشم شیرہ غلاب والا،
 ہر ایک ۵ گرام میں سے کوئی ایک کھلائیں۔

سرد

GIDDINESS

اس مرض میں سر میں ثقل اور گرانی محسوس ہوتی ہے اور مریض جب کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کانوں میں بھنبھنہٹ کی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔
 اسے روح نفاسی کا دماغی بطون اور دماغی عروق میں طبعی طور پر حرکت کرنے سے رک

اسباب | جانا

(II) سرد اور غلیظ اخلاط

(III) سر پر خفیف چوٹ لگنا

(IV) سدہ دماغ

(V) ورم دماغ

(VI) ضعف دماغ

(VII) عام جسمانی نقاہت

(VIII) دُموی امراض

(IX) ضعف معدہ

(X) سوء ہضم

(XI) بعض امراض قلب

(XII) بعض امراض کبد

(XIII) بعض امراض اذن

(XIV) بعض امراض چشم

لہ سرد کے لغوی معنی مینائی کے متحیر اور منتشر ہونے کے ہیں اور اس مرض میں چونکہ مینائی پریشان اور پرانگندہ ہو جاتی ہے، اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

منشیات / سمیات (XV)

امراض رحم (XVI)

غلط اخلاط اربعہ (XVII)

علامات | سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے اور کھڑے ہونے پر آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کانوں میں طنین کی سی کیفیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیخ الرئیس ابن سینا کا خیال ہے کہ سدر، دوار کا تقدم ہے۔ اس کے برخلاف ابو بکر محمد بن زکریا رازی کا خیال ہے کہ اس مرض میں مریض متحیر رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور سر میں گرانی ہوتی ہے، کبھی کانوں میں سنسنہٹ محسوس ہوتی ہے اور عقل کام نہیں کرتی۔۔۔۔۔ اور یہ کیفیت دوار کے بعد پیش آتی ہے۔۔۔۔۔ بوجہ شیخ الرئیس ابن سینا کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔

تقریبی علامات

م ر ع

سدر

- | | |
|--|--|
| ۱۔ تشنج، اینٹنٹن اور پریشان حرکتیں ہوتی ہیں۔ | ۱۔ جسم میں تشنج اور اینٹنٹن نہیں ہوتی۔ |
| ۲۔ کسب رنگی واقع ہوتا ہے۔ | ۲۔ سدر، دوار کے بعد واقع ہوتا ہے |
| ۳۔ منہ سے جھاگ خارج ہوتا ہے۔ | ۳۔ منہ سے جھاگ نہیں آتا۔ |
| ۴۔ خرخرہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ | ۴۔ خرخرہٹ کی آواز نہیں ہوتی۔ |

اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
اصول علاج | خلط کے موافق تنقیہ کریں۔

فصد کھولیں۔

یہ بھی بخارات میں کا سر ریا ح ادویہ استعمال کرائیں۔

ضعف کی صورت میں مقویات کھلائیں۔

علاج | خلط دومی کے غلبہ کی صورت میں سرار و یا قیصال کی فصد کھولیں۔۔۔۔۔ ترمہندی اور عتاب کا نفقوع، ہمراہ سکنجبین نوش کرائیں۔۔۔۔۔ روغن بنفشہ کی سرپر مالش کریں۔۔۔۔۔ سرکہ، آب کشنیز ملا کر ناک میں نشوونق کر کریں۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ

آملہ، کشنیز، ہر ایک ۱۲ گرام، نیلوف ۲۴ گرام، شکر تری ۲۴ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام، صبح، شام کھلائیں۔
درج ذیل نسخہ بھی مفید پایا گیا ہے۔

تجزیه :-

_____ جلد دوم میں پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر تربت عنب ۸ ملی لیرو یا تربت نیلو فر ۲ ملی لیرو ملا کر نوشن کرائیں۔

..... غلبہ صفراء کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نہج:

پوست ہلید، گل بنفشہ، ایک ساکرامنٹ — دونوں دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شہ خشت
۴۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

درج ذیل نسخہ مفرح بارد بھی سودمند ہے۔

نسخہ منفرج بارد :-

منزل سرخ، طباثیر، گل ارمنی، یادرنجویہ، پوست ترنج، پوست بیرون پستہ، ہر ایک ۹ گرام،
 زرد شک، بہدانہ فوفل، ہر ایک ۵، ۳۵ گرام، کشنیز خشک، تخم خرفہ، گل کاؤ زبان ہر ایک ۲۲۵ گرام،
 گل سرخ ۲۴ گرام، شربت سیب ۵۰۰ ملی لیٹر، حسب دستور معجون تیار کریں اور ۹ گرام کھلائیں۔

نسخہ:-

مکھو خشک، گل سرخ، گل بنفشہ، تخم خطمی، تخم کاسنی نیم کوفتہ، گل نیلوفر ہر ایک ۷ گرام،
 عناب ۶۰ گرام، آلو بخارا ۵ دانہ —————۔ جملہ دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر
 شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرالیں۔

غلیظ خلط بلغمی کی صورت میں حب ایابارج ہمراہ ماء العسل استعمال کرائیں۔۔۔۔۔ روغن بابونہ
کی سریرہ مالش کریں۔ اور درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نہیں۔

گل بنفشہ، بیج کاسنی، بادیان ہر ایک ۷ گرام، اسطوخودوس، اصل السوس منقشہ، گاؤزبان ہر

۵ گرام، مویز منقہ ۹ دانہ —۔ جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل پھان کر خمیہ و بنفشہ
۸ گرام شامل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ :-

خاکسی ۱۲ گرام، آب کشنیز بزمروق میں پیس کر نیم گرم پستانی پر ضا د کریں

نسخہ :-

برگ ثبت، سائے پھل ہر ایک ۳ گرام، دونوں کو باریک پیس کر نسوار بنا کر سونگھائیں
— غلبہ سودا کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ :-

شاہترہ، چراتیہ، گل سرخ، بادیاں ہر ایک ۷ گرام، بفعاج — ۵ گرام، مویز منقہ ۹ دانہ
— جملہ دواؤں کو صبح کو پانی میں جوش دیکر خمیہ و بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ :-

جوشامدہ، لیسفانج، اسطوخودوس، گاؤ زبان، زریب، آلونخارا، بادرنجبویہ، اقیقہ یون میں
ترنجبین ملا کر نوش کرائیں

— ضعف دماغ کی صورت میں درج ذیل نسخہ تحریرہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تحریرہ :-

مغز بادام شیریں ۵ عدد، مغز تخم کدو، شیریں، مغز تربوز، تخم خشخاش سفید، کشنیز خشک
ہر ایک ۶ گرام — جملہ دواؤں کو پانی میں پیس کر نبات سفید ۲ گرام ملا کر تحریرہ بنائیں اور گرم
گرم کھلائیں۔

— فساد خون کی صورت میں یہ نسخہ مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ :-

چراغتہ، اجوائن دیسی، ہلیلا طلال، ہر ایک ۸ گرام — جملہ دواؤں کو کوٹ کر سفوف
بنائیں اور ۶ گرام سفوف کو ۲۰۰ ملی لیٹر پانی میں بھگو کر صبح کو جوش دیں، جب ۲۵۰ ملی لیٹر پانی رہ جائے
تو صاف کر کے تین مرتبہ نوش کرائیں۔

— درج ذیل نسخہ بھی مجرب ہے۔

نسخہ:-

پوست ہیلہ کابلی ۳ گرام، تربہ صاف کردہ ۵ گرام، نمک لاہوری، غالیقون مغربل ہر ایک
اگر ۱ گرام، اسطو خود رس ۳ گرام — جلد دواؤں کو کوٹ کر چند گویاں بنالیں، یہ ایک خوراک ہے۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman


دوار

VERTIGO


اس مرض میں مریض اُس پاس کی چیزوں اور اپنے بعض اعضاء کو گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے اور قوت توازن کے متاثر ہونے کی وجہ سے کھڑے رہنے یا بیٹھنے پر قادر نہیں ہوتا اور گر پڑتا ہے۔

اقسام

د، اسباب کے اعتبار



دب، کیفیت کے اعتبار سے



لے دوار کی اس نوع میں مریض ارد گرد کی ساکن چیزوں کو گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے

لے دوار کی اس نوع میں مریض اپنا سر یا بعض دوسرے اعضاء گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے

اسباب

غلبہ اخلاط الاربعہ :-

- | | |
|------|-------|
| I, | خون |
| II, | صفراء |
| III, | بلغم |
| IV, | سوداء |
- دماغی عروق و بطون میں ان اخلاط کا اجتماع اور غیر طبعی حرکت ۔

امراض الرأس :-

- | | |
|-------|-----------------|
| I, | امراض موخر دماغ |
| II, | سوء مزاج دماغ |
| III, | ضعف دماغ |
| IV, | نزف دماغی |
| V, | فربہ و سقط |
| VI, | سکتہ |
| VII, | صرع |
| VIII, | شقیقہ |
| IX, | سلعہ دماغ |

امراض چشم :-

- | | |
|----|------------|
| I, | ارتعاش چشم |
|----|------------|

امراض اذن :-

- | | |
|-----|--|
| I, | جوبہ میں پیپ پڑ جانا |
| II, | اندرونی کان کی نیم دائرہ نالیوں میں کوئی نقص |

ادویات / سمیات :-

- | | |
|----|-------|
| I, | کونین |
|----|-------|

II, اسٹریٹو مانی سن

III, سلی سائی لائٹ

IV, شراب نوشی

V, افیون

VI, تمباکو نوشی

متفرقات :-

I, معدہ، شاذ، کلیہ، قلب، کبد، رحم، مرق اور اطراف وغیرہ اعضاء میں سے کسی ایک سے اخلاط
دریاح کا دماغ کی طرف صعود کرنا اور عروق دماغی، شرایین اور تنجاویف میں روح کا تموج اور
روح بامرہ کا حرکت میں آنا۔

II, سوء مزاج قوی کا ایک بیک ظاہر ہونا

III, کسی چیز کا نظروں کے سامنے دیر تک گردش کرنا

IV, امراض حادہ کے بعد کی نقاہت و ضعف

V, معدہ امعاء کے بعض مزمن امراض

VI, تھکس شریانی

VII, بول زلالی

VIII, کثرت حیض

IX, کثرت نفاس

X, استخاضہ

XI, کثرت مطالعہ

XII, کثرت مباشرت

XIII, فشار خون کا غیر طبعی ہونا

علامات | غلیظ صفراوی میں رنگ زرد ہو جاتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، زرد رنگ کے
خیالات آتے ہیں، نبض سریع چلتی ہے، سرد اشیاء کے استعمال سے دوار ختم ہو جاتا
ہے۔ غلیظ خلط دموی کی صورت میں دوار کے وقت خون کی حرکت اور جوش کے باعث چہرہ اور
آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، عروق متلی ہوتی ہیں، سرچھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے، دوار کی ابتداء

میں آنسو بہتے ہیں، دوار کی نوبت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ غلبہ خلط بلغمی کی صورت میں سر میں گرائی اور ثقل محسوس ہوتا ہے، منہ سے بکثرت قھوک خارج ہوتا ہے، پیاس کم لگتی ہے، حواس کمزور ہوتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، پیشاب سفید رنگ کا خارج ہوتا ہے، نبض لین چلتی ہے جو دباؤ پر طے پر باسانی دب جاتی ہے، گرم تدابیر اختیار کرنے سے دوار میں تخفیف ہوتی ہے۔ غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں دوار کا خیالات آتے ہیں، دوسرے میں مبتلا رہتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، بیداری کی حالت میں سامنے کی اشیاء کو سیاہ تصور کرتا ہے، نبض ملب اور ضعیف چلتی ہے۔ غلبہ ریح / دوار ریحی میں بیشتر علامات دوار بلغمی سے مشابہ ہوتی ہیں، صرف ثقل نہیں ہوتا۔ اخلاط ریا حیحہ حارہ کی صورت میں اخلاط حارہ (دموی، صفراوی) کے ذیل میں بیان کردہ علامات موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس میں دوار نہایت شدید ہوتا ہے، تاہم زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا، ہر وقت چھینکیں آتی ہیں، ناک خشک ہوتی ہے، دوار کی شدت کے باعث مریض گر پڑتا ہے، اس وقت اس کے سر میں پسینہ آجاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ دوار کی یہ نوع مستقل اور نوبتی ہو سکتی ہے، نوبت ۲۴ گھنٹہ سے ایک ماہ تک کی ہو سکتی ہے۔ دوار کے ساتھ متلی، تے اور فشار دموی ضعیف ج. ۴۰ B. کی شکایت ہوتی ہے۔

معدہ سے اخلاط / ریح بارد کے دماغ کی طرف صعود کرنے کی صورت میں سابق میں مذکور سرد اخلاط سے مشابہ علامات پائی جاتی ہیں، متلی ہوتی ہے، سوجھ بھم ہوتا ہے، ترش ڈھاریں آتی رہتی ہیں، درد سر ہوتا ہے جو بالعموم سر کے اگلے حصہ سے شروع ہو کر یا فوراً تنک اور کبھی سر کے پچھلے حصہ تک چلا جاتا ہے۔ دوار بھی کبھی موقوف ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی کمی و زیادتی معدہ کے امتلاء اور خلو، پختہ پختہ یا خلو و معدہ کی صورت میں دوار موقوف ہو جاتا ہے اور امتلاء کی صورت میں دوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، معدہ سے گرم ریح کے، دماغ کی طرف صعود کرنے کی صورت میں بھوک زائل ہو جاتی ہے، سانس بگڑ جاتا ہے، اختلاج ہوتا ہے، دوار کے حملہ سے قبل متلی ہوتی ہے اور صفراوی تے خارج ہوتی ہے، خلو و معدہ کی حالت میں مرضی عوارض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، معدہ میں سوزش اور جہن محسوس ہوتی ہے، ناف میں درد ہوتا ہے۔

شریان صدغی، شریان اذنی موخر یا دونوں شریان سباتی سے مادہ کے دماغ کی طرف صعود

کی صورت میں متعلقہ شریانوں میں امتلا کی کیفیت پائی جاتی ہے اور ٹیسر بھی محسوس ہوتی ہے، شریانوں پر دباؤ ڈالنے سے عوارض میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔

ضربہ و مسقطہ کی صورت میں موج کی مانند حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سو مزاج مختلف کی صورت میں دماغ ہلکا محسوس ہوتا ہے، خارجی طور پر گرمی یا سردی پہنچنے کی سرگزشت ملتی ہے۔

کان کی نیم دائرہ نالیوں میں نقص کی صورت میں اگر باہر کی نیم دائرہ نالی متاثر ہو تو دو ارفقی لکیر میں ہوتا ہے اور مریض، متاثر جانب ہی گرتا ہے اور بائیں نالی میں نقص ہے تو دو ارفقی ہوتا ہے اور مریض سامنے کی طرف گرتا ہے۔

سلو دماغ کی صورت میں دو ارنہایت شدید ہوتا ہے اور موخر دماغ میں سلو کی صورت میں عوارض اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ دو ارنہ کی تشخیص میں عصب بصری کے معائنہ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔

اصول علاج | حلقہ، جبوب اور غفرہ کرائیں۔

_____ استعمال کرائیں

_____ سوٹا کرائیں

_____ طلا، بھپارہ اور شمومات استعمال کرائیں

_____ امتلاء دم کی صورت میں قصد کھولیں، سنگھیاں لگائیں۔

_____ مطلقات استعمال کرائیں

_____ رفع قبض کریں

_____ نفس دماغ میں اخلاط بارہ کے نلی کی صورت میں حسب ایار ج ۹ گرام کھلائیں، اس کے

علاج | بعد اذیفل صغیر، اذیفل اسطوخودوس یا اذیفل اقیمون میں سے کوئی ایک ۱۲ گرام کھلائیں،

بصورت دیگر درج ذیل نسخہ منفع استعمال کرائیں

نسخہ منفع بلغم:-

گل بنفشہ، بادیان، بیج کاسنی، ہر ایک ۷ گرام، اسطوخودوس، اصل السوس مقشر، گاؤزباں

۵ گرام، جلد دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل جھان کر خمرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر

نوش کرائیں، شام کو شیرہ بادیان ۷ گرام، مویرہ منقہ ۹ دانہ، شیرہ تخم کنوٹ ۵ گرام، عرق بادیان ۱۸ ملی لیٹر میں بحال کر خیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

آٹھ دس دن یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد اسی میں برگ ستارہ کی ۷ گرام، مغز فلوںس خیار شنبہ ترہندی، ترنجبین، شیر خشک، شکر سرخ ہر ایک ۸ گرام، شیرہ مغز بادام شیریں ۵ دانہ ملا کر دو، تین مہل وقذ سے دیں اس کے بعد تقویت دماغ کے لیے قرص مرجان جواہر والا یا قرص مرجان سادہ اعداد، خیرہ گاؤ زبان مغزی ۵ گرام کے ساتھ کھلائیں۔

درج ذیل نسخہ تحریرہ مغز بادام بھی مستعمل ہے :

نسخہ تحریرہ مغز بادام :-
مغز بادام شیریں ۵ دانہ، مغز تخم کدو ۷ شیریں، مغز تخم تربوز، تخم خشکاش ہر ایک ۳ گرام، جلد دواؤں کو پانی کی مدد سے پیس کر شیرہ نکالیں، نبات سفید ۲ گرام ملا کر آہ پر رکھیں، جب کاٹھا ہو جائے تو گھی کا بگھار دیکر استعمال کرائیں۔

۔۔۔ قبض اور سورہ، سہم، اگر اس کا سبب ہو تو اطفال زمانی، اطفال ملین یا اطفال کشیزی، ۲ گرام،

گلقدہ ۲ گرام یا خیرہ بنفشہ ۲ گرام استعمال کرائیں۔

۔۔۔ جوارش جالینوس ۷ گرام یا حب پیچہ ۲ عدد کھلائیں۔

۔۔۔ غلبہ خون کی صورت میں قیال کی قصہ کھولیں اور پنڈلیوں پر سنگھیاں لگائیں

۔۔۔ مطفیات کے طور پر لعاب اسپغول، شربت غلاب، آتش جو وغیرہ استعمال کرائیں

۔۔۔ گرم ریاح اور بخارات کی صورت میں قیال یا باسلیق کی قصہ کھولیں

۔۔۔ دماغ میں صفراوی اخلاط کے غلبہ کی صورت میں مغز فلوںس خیار شنبہ اور شیر خشک آمیز جوشانہ

ہلید و شہترہ استعمال کرائیں۔

نسخہ جوشانہ ہلید :-

ہلید زرد، آلو بخارا، سپستان، تخم کاسنی، ترہندی جلد دواؤں کو جوش دیکر چھان لیں اور

ترنجبین اور سقمونیا ملا کر نوش کرائیں

۔۔۔ بخارات کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ :-

پوست ہلید کابلی، کشیزہ معشر، آملہ منقہ ہر ایک ۸ گرام، طبائیر سفید، تخم حاض کل گاؤ زبان

ہر ایک ۱۱۵ گرام، پوست ترخ ۱۸ گرام، نبات سفید تین گنا، عرق کلاب، عرق بید مشک، ہر ایک ۲۵۰ ملی میٹر، درق نقرہ ۵۰ گرام — جلد دواؤں کا حسب دستور معجون بنائیں اور ہر گرام کھلائیں۔
 — غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں چرایہ، شاہترہ، گل سرخ، بادیان ہر ایک ۷۰ گرام، بسفاریج،
 فستق ۵۰ گرام، مویز منقہ ۹ دانہ — جلد دواؤں کو پانی میں جوش دیں پھر نیمہ بنفشہ ۸۰ گرام ملا کر
 نوش کریں۔


Learn Unani By Abdul Waris Salimi

قوما

COMA

اس مرض میں گہری، طویل، مفراط اور غیر طبعی نیند آتی ہے، مریض بہت مشکل سے بیدار ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی سوئے، غنودگی برقرار رہتی ہے، اور اسباب کے مستحکم ہونے کی صورت میں حس و حرکت اور ادراک و شعور کی ساری قوتیں باطل ہو جاتی ہیں، تاہم تنفس اور قلب کی حرکات برقرار رہتی ہیں۔

اقسام | جاری ہیں۔ — اس کی متعدد اقسام ہیں، ذیل میں اس کی چند مشہور اقسام تحریر کی



اسباب

امراض راس :-

I. ترغیر الدماغ

II. ضغط الدماغ

۱۔ یہ دراصل یونانی زبان کے لفظ "کوما" کی تعریب ہے جس کے معنی "گہری نیند" کے ہیں، عربی زبان میں اس کا مترادف "سبات" ہے، چنانچہ اقسام کے ذیل میں سبات کو ہی عنوان کا درجہ دیا گیا ہے۔

درم دماغ	III,
دمل دماغ	IV,
سلو دماغ	V,
زیادتی خون دماغ	VI,
سوء مزاج دماغ حار	VII,
سوء مزاج دماغ بارہ غیر مادی	VIII,
خام رطوبتوں کا مقدم دماغ میں اجتماع	IX,
ضربہ و سقطہ دماغ	X,
ضعف دماغ	XI,
قلت خون دماغ	XII,
دماغی تکان کی افراط	XIII,
استسقاء الدماغ	XIV,
مرع	XV,
سکتہ	XVI,
احتقان الرحم	XVII,
لیٹرغس	XVIII,
تشنج	XIX,
ضربت الشمس	XX,
ضعف اعصاب	XXI,
نزله و زکام	XXII,
امراض معدہ و امعاء۔	
اسہال	I,
فساد ہضم	II,
معدہ کے انجرات کا دماغ کی طرف صعود کرنا	III,
دیدان امعاء	IV,

ادویات و سمیات :-

خون میں سمی مواد کا شامل ہو جانا، خواہ وہ سمیات خارجی ہوں مثلاً —

- I, افیون
- II, کثرت سے نوشی
- III, بھنگ
- IV, کاربن مونو آکسائیڈ
- V, کاربن ڈائی آکسائیڈ
- VI, پے تھی ڈن
- VII, مارفین
- VIII, آرگینو فاسفورس مرکبات — یا

خون میں شامل ہونے والے سمی مواد داخلی ہوں مثلاً —

- I, ذیابیطس
- II, احتباس بول
- III, تسم بول

متفرقات :-

- I, سردی لگنا
- II, فاد کشی
- III, استفراغ مفرط
- IV, رنج و غم
- V, شدید ریاضت
- VI, قلت دم
- VII, صدر، ریه یا رحم سے مواد کا دماغ کی طرف صعود کرنا
- VIII, نقص استتال
- IX, بیماری سے پیدا شدہ نقاہت
- X, غذا کی زیادتی

علامہ روح کا ضعیف اور عمل تحلیل کا سریع ہونا

دماغ میں رطوبات کے اجتماع کی صورت میں سر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، چہرے پر علامات | برہمراہٹ اور پھوٹے کسی قدر پھولے ہوئے اور بوجھل ہوتے ہیں، ناک اور منہ سے رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ مقدم دماغ میں خام رطوبتوں کے اجتماع کی صورت میں سر کے اگلے حصہ میں ثقل محسوس ہوتا ہے، آنکھوں کی حرکت میں گرائی ہوتی ہے، ابروؤں میں اختلاجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زبان پر لیسار رطوبت جمی رہتی ہے اور تھنوں سے غلیظ رطوبت بہتی رہتی ہے۔

دماغ کے شدید سو مزاج بارد سادہ غیر مادی کی صورت میں سر میں بیرونی طور پر شدید سردی لگنے کی سرگزشت ملتی ہے۔ چہرہ پر تہیج نہیں ہوتا، چہرہ کی رنگت سبزی مائل ہو جاتی ہے، نبض میں تندہ، کسی قدر صلابت اور تفاوت ہوتا ہے۔

سر میں امتلا، دہی کی صورت میں آنکھیں خمار آلود، سرخی مائل ہوتی ہیں، سر بھاری ہوتا ہے، نبض سریع اور ممتلی ہوتی ہے، اطراف ڈھیلے ہو جاتے ہیں، دماغ میں خون اور دیگر رطوبات کے اجتماع کی صورت میں نیند کا شدید غلبہ ہوتا ہے، مریض کو بڑی مشکل سے جگایا جاسکتا ہے، تنفس اور نبض محسوس ہوتی ہے، گفتگو بھی سمجھ سکتا ہے، ہاتھ پیر کو حرکت دے سکتا ہے۔ اس طرح غنودگی اور غفلت کا تسلسل برابر قائم رہتا ہے۔

معدہ سے اخراجات ردیہ کے صعود کی صورت میں سبات سے پہلے سدر اور دواہر ہوتا ہے، کان بجتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے مختلف قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں، خلو، معدہ کی حالت میں ان عوارض میں تخفیف ہوتی ہے۔

صدر سے اخراجات کے صعود کی صورت میں ذات الجنب یا ذات الریہ کی علامات پائی جاتی ہیں، اسی طرح ادویات و سمیات کے استعمال کی صورت میں ان کی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں۔

تفریقی علامات

سبات تسم بالانحیون

سبات تسم بالکحول

- ۱۔ پتلیاں مقبض اور آلین کی نوک کی طرح چھوٹی۔
- ۲۔ نہیں پھیلتیں۔

- ۱۔ پتلیاں طبعی یا منبسط ہوتی ہیں
- ۲۔ طانچ مارنے سے پھیل جاتی ہیں۔

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۔ ملمس جاد ہوتا ہے۔ | ۳۔ ملمس بارد ہوتا ہے۔ |
| ۴۔ تنفس سریع اور عمیق ہوتا ہے۔ | ۴۔ تنفس بلی ہوتا ہے |
| ۵۔ تنفس منظم اور بھیکاری ہوتا ہے۔ | ۵۔ تنفس غیر منظم اور اٹھلا ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ مریض کے پاس سے شراب کی بو آتی ہے۔ | ۶۔ مریض کے پاس سے افیون کی بو آتی ہے۔ |
| ۷۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ | ۷۔ چہرہ زرد و نیلگوں ہوتا ہے۔ |
| ۸۔ نبض سریع ہوتی ہے | ۸۔ نبض بلی چلتی ہے۔ |

سبب تسم بالکھول

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۔ مریض کو بیدار نہیں کیا جاسکتا۔ | ۱۔ مریض کو بیدار کیا جاسکتا ہے |
| ۲۔ پتلیاں غیر مساوی ہوتی ہیں۔ | ۲۔ پتلیاں مساوی ہوتی ہیں۔ |
| ۳۔ تنفس میں کسی قسم کی بونہیں ہوتی | ۳۔ مریض کے پاس سے شراب کی بو آتی ہے۔ |
| ۴۔ تنفس خراطیے دار ہوتا ہے۔ | ۴۔ تنفس بھیکاری ہوتا ہے |
| ۵۔ فالج و تشنج بالعموم ہوتا ہے | ۵۔ فالج یا تشنج نہیں ہوتا۔ |
| ۶۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ | ۶۔ حرارت کم ہوتی ہے |
| ۷۔ انعکاسی تحریکات اکثر ایک جانب | ۷۔ انعکاسی تحریکات طبعی ہوتی ہیں۔ |
| مفقود ہوتی ہیں۔ | |
| ۸۔ نبض بلی چلتی ہے۔ | ۸۔ نبض سریع چلتی ہے۔ |

اصول علاج | غلبہ دم کی صورت میں فصد کھولیں

- غلبہ بلغم کی صورت میں جسمانی تحریکات سودمند ہیں۔
- برف کی تھیلی رکھنا، پاشویہ اور نماد کریں۔
- پنڈلیوں پر خالی سنگیاں کھینچوائیں

علاج | سبب کے نامعلوم ہونے کی صورت میں مریض کے سر کو اونچا رکھیں اور اس پر سرد پانی دھاریں۔

- صندل، کافور، کوکلاب میں گھس کر اس میں کپڑا تڑکڑ کے سر پر رکھیں۔

— برودت کی صورت میں جنبدیدستر، ماقرقحہ، پیاز دشتی، کوسرک میں پیس کر سرپرلیپ کریں۔

— فصد کھولیں اور پنڈلیوں پر سنگیاں کھینچیں۔

— پاشویہ کریں۔

— درج ذیل نسخہ، حقنہ استعمال کرائیں

نسخہ حقنہ:-

بنفشہ، نعلی، نیلوفر، ہر ایک ۹ گرام، سنا، کھلی پدسیا و شاں ۶ گرام، بابونہ، الکلیل الملک، ہر ایک ۵ گرام، سوس گندم، حلیہ، ہر ایک ۲۴ گرام، آخر الذکر دونوں دواؤں کو ایک پوٹلی میں باندھ کر اور جلد دواؤں کو ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکائیں۔ جب الیٹر باقی رہ جائے تو مغز-فلوس خیار خنبر ۸ گرام، روغن کجند و شہد، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، نمک اور بورہ ارمنی ہر ایک ۳ گرام، آخر الذکر تینوں دواؤں کو گھینپ کر ان کو مذکورہ جو شانہ میں ملا کر حقنہ کریں — مرینس کو جب ہوش آجائے تو درج ذیل حب مسہل استعمال کرائیں۔

نسخہ حب مسہل:-

محل بنفشہ ۷ گرام، ہلیلہ زرد ۴ گرام، تربید، تخم کرفس، بادیان، نمک نفطی ہر ایک ۳ گرام، سقمونیائے مشوی ۵۰۰ ملی گرام، جلد دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق بادیان کی عدد سے گولیاں بنائیں اور ہمراہ عرق گلاب ۸۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

— جنبدیدستر، قلعہ سیاہ، ہر ایک ۱ گرام، ان کو باریک پیس کر چھان لیں اور سونگھائیں

— فریون، جنبدیدستر، ہر ایک ۱ گرام کو روغن قسط ۱۲ ملی لیٹر میں ملا کر سرپر مالتش کریں

— دماغ میں بلغم کی زیادتی کی صورت میں اطرلفل کشنیزی یا اطرلفل زمانی ۷ گرام ہمراہ آب تازہ کھلائیں اور صبح کو شام خبت الحدید، کشتہ مر جاں ہر ایک ۲۰ ملی گرام ہمراہ جوارش بسا سہ کھلائیں۔

اس مرض میں یکبارگی جسم کے کل یا بعض اعضاء اکثر کمر سخت ہو جاتے ہیں یا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور مریض پلکیں چھپکانے پر قادر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ یہ مرض ۶-۲۰ سال کی عمر میں عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب | I. دماغ کے بطن میں ترکاسدہ سوداوی
II. مالیخولیا

IV) التهاب اغشية دماغ

(VI) سر یا پشت پرچوٹ لگنا

VIII منشیات کا بکثرت استعمال

IX اعتناق الرحم

(X) احتباس حیض / زنفاس

علامات | مریض کی حس و حرکت یکبارگی زائل ہو جاتی ہے، چنانچہ دورہ پڑنے پر جس حالت میں ہوتا ہے اسی میں پڑا رہتا ہے، یعنی اگر مرض کا حملہ سونے، کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی حالت میں واقع ہو تو مریض اسی ہیئت میں پڑا ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جاتی ہیں، بند ہوں تو کھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ تنفس کے نہایت بطنی ہونے اور حرکات کے منجمد ہو جانے کی وجہ سے مریض

ۛ سارے جسم یا بعض اعضاء کا اگر ذکر سخت اور مجھد ہو جانا۔

۳۔ بیکوں کا نہ جھیننا، اور آنکھیں کھلی رہنا۔ — بلکہ خود ہے کہ جو دود شخوص کو "آخذہ" اور قاطو خس بھی کہتے ہیں۔

مرده کی طرح معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بعض اوقات حملہ مرض سے قبل درد سر، دوران سر اور فواق وغیرہ علامات مندرجہ پائی جاتی ہیں، اور باری کے وقت مریض بے حس ہو جاتا ہے، اختیاری حرکتیں مفقود اور عضلات بے عمل ہو جاتے ہیں، قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے اور قریبہ کی حس نہایت کم ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ یہ باری چند ثانیہ سے چند گھنٹے تک رہ سکتی ہے۔ اشتباہ سے بچنے کے لیے ذیل میں جمود اور سبات کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

سبات

جمود

- | | |
|--|---------------------------------|
| ۱۔ حالت صحت میں مریض کی وضع اور ہیئت کے اعتبار سے آنکھیں کھلی یا بند ہوتی ہیں۔ | ۱۔ آنکھیں بالعموم بند ہوتی ہیں۔ |
| ۲۔ مرض کا حملہ ایک بیک ہوتا ہے۔ | ۲۔ عوارض بتدریج پیش آتے ہیں۔ |
| ۳۔ قہوڑی مدت میں ختم ہو جاتا ہے | ۳۔ مدت دراز تک رہتا ہے۔ |
| ۴۔ نبض صلب چلتی ہے۔ | ۴۔ نبض لیں چلتی ہے۔ |
| ۵۔ سردی و خشکی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ | ۵۔ سردی و گرمی سے پیدا ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ مریض گفتگو کرنے پر قطعی قادر نہیں ہوتا۔ | ۶۔ مریض بمشکل گفتگو کر سکتا ہے۔ |
- دورہ کے وقت مریض کو ہوش میں لانے کی تدابیر کریں، اس سلسلے میں اصول علاج میں نسوار اور حقنہ مفید ہے۔

۔۔۔۔۔ محلل ضاد رکھیں۔

۔۔۔۔۔ حسب ضرورت گرم روغنیات کی مالش کریں۔

۔۔۔۔۔ مذکورہ بالا تدابیر اختیار کرنے کے بعد مقویات دماغ و اعصاب استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ دورہ کی حالت میں چہرہ اور سر پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں۔

علاج۔۔۔۔۔ عاقرقحاً باریک پیس کراسی کی ذرا سی نسوار دیں۔

۔۔۔۔۔ مریض اگر قوی ہو تو درج ذیل ادویہ کا حقنہ دیں

نسحہ حقنہ :-

گل سرخ، افیمون، شہم حنظل، بسفلاج، بابونہ، خطمی، ہیلد کابلی، غاریقون، پودینہ خشک،

ہر ایک ۹ گرام، دو لیٹر پانی میں جوش دیکر اس میں روغن بیدرنجیر ۳۶ ملی لیٹر ملا کر حقہ کریں۔
— مریض اگر کمزور ہے تو درج ذیل نسخہ حقہ استعمال کرائیں۔

نسخہ حقہ لینہ :-

سیوس گندم، برگ چقندر کو پکا کر یا بھگو کر پانی حاصل کریں اور اس میں تھوڑا شحم
حفظل، بورہ ارمنی اور روغن کنجد ملا کر حقہ کریں۔

— دودھ ختم ہونے پر زوفا، بالونہ، الکلیل الملک، تخم ثبوت اور سرکہ عنصل شامل کر کے سرکہ
پچلے حقہ پر لیسپ کریں۔

— روغن خیری، روغن سداب، روغن مرزنجوش میں کسی قدر چند بیدرستر ملا کر مالش کریں۔

— زوال مرض کے مرحلے میں کلقتند علی کھلائیں اور پانی کی بجائے ماء العسل نوش کرائیں۔

— تدابیر حارہ اگر مرض کا سبب ہوں تو دورہ ختم ہونے کے بعد مریض کے سر کو شیر زن، روغن
کدو، روغن گل یا روغن بنفشہ سے تر کر رکھیں نیز یہی روغنیاں تلوویں، ہتھیلیوں، انگوٹھوں
اور ناف پر ملیں اور ناک میں ٹپکائیں۔

— بعض اطباء نے گدی میں داغ دینا، مفید بتایا ہے۔

— تقویت کے لیے خمیرہ کاؤزبان، خمیرہ آبریشتم عودہ مصطکی ہر ایک ۵ گرام اور دواء الملک

معتدل جو اہر والی میں سے کوئی ایک دوا عرق کاؤزبان یا عرق بادیان کے ہمراہ کھلائیں اور شنب
میں اطریش کشنیزی استعمال کرائیں۔



INSOMNIA

اس مرض میں مریض بیدار رہتا ہے اور یہ بیداری طبعی حالت سے بڑھ جاتی ہے۔

اقسام I

اسباب اور کیفیات کے اعتبار سے اس کی درج ذیل قسمیں ہیں :-



اسباب I امراض راس :-

- (II) جنون
- (III) دماغ میں شور و طوبات کا اجتماع
- (IV) دماغی کاموں کی کثرت
- (V) دماغ کا سوہ مزاج سرد و خشک سازج
- (VI) دماغ کا سوہ مزاج گرم و خشک سازج
- (VII) دماغ کا سوہ مزاج سرد و خشک مادی
- (VIII) دماغ کا سوہ مزاج گرم و خشک مادی
- (IX) آتشک دماغی

IX مایوژیا

X مراق

امراض قلب :-

I بعض امراض قلب

امراض ریہ :-

I نفثۃ الریہ

II دبیلہ الریہ

III فسیق النفس

IV التهاب غشجی

V سعال

امراض کبد :-

I سوء مزاج کبد

II یرقان

امراض کلیہ :-

I بعض امراض کلیہ

امراض معدہ و امعاء :-

I خلو معدہ

II شکم سیری

III سوء ہضم

IV نفخ شکم

V قبض

VI غذا کی زیادتی جو معدہ پر بار گزرے

VII تحمہ

عادات اور حفظان صحت سے بے پروائی :-

- I, نظام زندگی میں یکبارگی تبدیلی
 II, سونے سے قبل مفرصت مقام پر دیر تک رہنا
 III, جذبات کا برا نیگنہ ہونا
 IV, خواب گاہ کا زیادہ گرم ہونا / ہوا کا کم گندہ ہونا
 V, شور و غل
 VI, بستر کا بہت زیادہ یا بہت کم ہونا
 VII, سوتے وقت گرم اور محرک مشروبات استعمال کرنا
 VIII, بکثرت تمباکو نوش کرنا
 IX, شدید درد
 X, حمی کا آغاز
 XI, غذا کی مقدار کا کم کر دینا جس سے دماغ میں یہ سوسٹ پیدا ہو جائے
 XII, ثقیل اور نفاخ اغذیہ و اثریہ
 حاد / متعدي امراض :-

- I, نقرس
 II, بعض حمیات
 III, سوزش پیدا کرنے والے بخارات
 متفرقات :-

- I, پیری
 II, قلت خون
 III, جسم میں اخلاط فاسدہ کا اجتماع
 IV, کثرت مطالعہ
 V, مستقبل کا فکر
 VI, خوف / خوشی
 VII, اختناق الرحم
 VIII, سوء القنیہ

دماغ کے سو مزاج سرد و خشک سادہ کی صورت میں سر اور حواس ہلکے ہوتے ہیں، زبان اور نیتھے خشک ہوتے ہیں۔ سو مزاج سرد و خشک (سوداوی) مادی کی صورت میں غلبہ سودا کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سو مزاج سرد و خشک مادی صغیر کی صورت میں غلبہ صفرا کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ دماغ میں بلغم ثور کی صورت میں نیتھوں میں تری اور آنکھوں میں کچھ ہوتی ہے، سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے بے خوابی کے ساتھ ساتھ چونک جانے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔

— منہج مسہل اور تہذیب استعمال کرائیں۔

علاج | جوشاندہ بنفشہ، نیلوفر، برگ کاہو، کشنیز سبز، اجوائی، نر اسانی، پوست خماش کو کسی چھوٹے منہ کے برتن سے تالپر ڈالیں۔
— بنفشہ، نیلوفر اور برگ کاہو سونگھائیں۔

.....۔ دُغْن کدوے دراز / مدور بشیر زن میں ملا کر ناک میں ٹپکائیں

— آب کشنیز سبز، شیرہ تخم فحنجاش، روغن نیلوفر، آب برگ کاهو، کاغذ سونگھائیں

نظریہ اخلاق کی صورت میں جو شائد اصل الموسس، شیخ بادیان، کا وزیران اور مکتفہ کے ذریعہ

نفع دیں اور حب ایارج اور حب شب یار کے ذریعہ دماغ سے مادہ خارج کریں
 — تنقیہ کے بعد روغن بابونہ، اتھوان نیم گرم سرور رکھیں۔

— روغن لبوب سفید، روغن کاهو، روغن بادام شیریں اور روغن مغز تخم کدو کے شیریں مریض رکھنا بھی سودمند ہے۔

— بال ترشو اکرتالو پر درج ذیل نماد لکائیں

نسخہ: ضما د:-

تخم خرفہ، تخم کاہو، تخم نیلوفر، مندر سفید ہر ایک ۳ گرام، کافور ۱ گرام، افیون، زعفران ۵۰۰ ملی گرام
جملہ دواؤں کو پیس کر روغن گل ۶ ملی لیٹر میں ملا کر آب کشنیز سبز مرقد کا اضافہ کر کے استعمال کرائیں۔

— مقامی درد وغیرہ کے سبب مہر واقع ہونے کی صورت میں حب جلدوار اور برشتا استعمال
کر سکتے ہیں۔

— ۶ ملی لیٹر شراب میں کسی قدر گرم پانی ملا کر نوش کرانے سے بھی مہر کے عوارض جاتے رہتے ہیں۔

— جمی کی حالت میں، تھیلی اور تلوے سہلانا اور پاشنویہ مفید ہے، ملحوظ رہے کہ اس حالت میں
سر میں تیل ڈالنا، اطباء کے نزدیک سودمند نہیں ہے۔

— روغن گاؤ یا روغن بادام کو تھیلیوں اور تلوؤں پر ملنے سے بھی نیند آجاتی ہے۔ اس سلسلے
میں روغن گاؤ کو پانی میں دھولینا سودمند ہے۔

— درج ذیل قرص مہر بھی فائدہ مند ہے۔

نسخہ: قرص مہر:-

تخم کاہو، تخم خشخاش، تخم چولائی، کاسنج، آرد باطلا، ہر ایک ۱۱ گرام، افیون ۵۰۰ ملی گرام کوٹ
چھان کر لعاب اسپغول میں گوند کر قرص بنائیں اور شربت خشخاش ۸ ملی لیٹر کے ہمراہ رات میں
استعمال کرائیں۔

درج ذیل طلا، بھی اطباء کے معمولات میں سے ہے۔

نسخہ: طلا:-

برگ بنفشہ، نیلوفر، تخم کاہو، برگ خطمی، پوست خشخاش ہر ایک ۱۲ گرام، لغاح ۶ گرام،
جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر آب کاہو سبز کے ساتھ ملا کر پیشانی پر لپیپ کریں۔

— چھوٹی چندن، گل سیوطی کا سفوف بنا کر ۱۲ گرام کھلائیں۔


— فلک سیر سبز دھنگ سبز، ۱۱ گرام، کسی قدر شیر گاؤ میں پیس کر مہندی کی طرح تلوؤں پر
لگائیں۔

مانیا

MANIA

اس مرض میں مریض غفیناک اور مضطرب رہتا ہے، بھاگتا، دوڑتا ہے۔ اس میں غیر ضروری جوش اور عمارات و اطوار و اخلاق میں درندگی ہوتی ہے۔

اقسام



اسباب

- | | |
|-------|----------------------------|
| I, | احتراق صفراء |
| II, | صفراء آمیز سوداء کا احتراق |
| III, | بے اعتدالی طبع |
| IV, | زہد و تقویٰ |
| V, | غریبی تعصب |
| VI, | جوشش ملکی |
| VII, | دماغی محنت کی زیادتی |
| VIII, | جلوتہ |

(۱) مانیا کی اور بھی متعدد انواع ہیں جیسے نفاہی، عشق، مسرہ، دغیر، طوالت کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

کثرت مباشرت	(IX)
کثرت مے نوشی	(X)
خوف	(XI)
رنج و غم	(XII)
حل اور وضع حمل کی تکالیف	(XIII)
رحم اور خصیتہ الرحم کے امراض	(XIV)
ایام رضاعت	(XV)
سن ایاس	(XVI)
آتشک	(XVII)
بعض حمیات حادہ	(XVIII)
مرع	(XIX)
نفاس	(XX)

جنون کے ساتھ زندگی ہوتی ہے مریض متفکر اور خاموش رہتا ہے۔ ابتدا میں کسی سوال کے جواب میں تغافل اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے، لیکن بار بار کے امرار پر اس قدر بوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا نا طعہ بند ہو جاتا ہے۔ بدن لاغر اور سیاہی مائل ہوتا ہے۔ طبیعت میں شرارت اور فساد کے عناصر زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کیفیت بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ غم اور اضطراب بہت زیادہ ہوتا ہے۔

۱۔ مانیاء سرقہ :-

مریض کی طبیعت بے اختیار چوری کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے باوجود یہ قانون اور ساج کی نظر میں سرقہ قابل تعزیر جرم ہے اس کا برملا اعتراف کرتا ہے اور بتا کر مسرور ہوتا ہے بعض مریض دولت مند ہوتے ہوئے بھی پیسے، دو پیسے کی چیز بھی چرانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بعض مریض دوکان وغیرہ پر ایک دوکاندار کی چیز چرا کر دوسرے دوکاندار کے سامان میں ڈال دیتے ہیں بعض مریض چوری کی روکیدار دبتانے سے احتراز کرتے ہیں۔

۲۔ مانیاء مائی :-

مریض کی طبیعت میں پانی میں ڈوب مرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہی

وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔

۳۔ مانیہ ابتہاجی :-

مریض کو خوش کن مناظر دکھائی دیتے ہیں، جس کے سبب وہ ہر وقت شلداں و فرحاں رہتا ہے، تاہم اس کی حرکات اور گفتگو میں مجنوں کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ بالعموم مسکرات و منشیات کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے۔

۴۔ مانیہ ناری :-

مریض آگ کا تماشہ دیکھنے کا شائق ہوتا ہے اور اس میں اس کو بڑا لطف آتا ہے اور وہ خود بھی آگ سے کھیلنے سے گریز نہیں کرتا۔

۵۔ مانیہ مرغی :-

مریض، مرغ کے باعث مجنونانہ حرکت کرتا ہے۔

۶۔ مانیہ خمری :-

مریض کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو سیری نہیں ہوتی اور اس کی شراب نوشی کی حرص میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے، ذہنی اختلال کی وجہ سے اکثر کام غیر اخلاقی ہوتے ہیں، غدار، بدچلنی اور فریب دہی کا عادی ہو جاتا ہے۔

۷۔ مانیہ اختناق :-

اختناق الرحم کی مریض عورتوں میں ہوتا ہے۔

۸۔ مانیہ کلبی :-

مریض کتوں جیسی حرکت کرتا ہے، غضب کے ساتھ طبیعت میں کھیل کود کی طرف بھی میلان ہوتا ہے، اور ایذا رسانی کے ساتھ مہربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ مانیہ کلبی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا مریض اگر کسی صحت مند انسان کو کاٹ کھائے تو مر جاتا ہے، جیسا کہ باؤلے کتے کے کاٹے میں ہوتا ہے۔

۹۔ مانیہ ذئبی :-

مریض خود کو بھیڑیا تصور کرتا ہے اور اسی طرح کی درندگی پر آمادہ رہتا ہے۔ مانیہ کی اس نوع اور قریب میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں درندگی کے عناصر ہوتے ہیں اور خواہش نسبتاً شدید ہوتے ہیں۔

۱۔ مانیا قتل نفس :-

مریض اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے درپے رہتا ہے، اور خبر گیری اور نگہداشت کے باوجود موقع پاتے ہی خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔

۱۱۔ مانیا قتل عمد :-

یہ مانیا کی بدترین قسم تصور کی جاتی ہے، مریض کی عقل و شعور میں بظاہر کسی طرح کا فتور نہیں معلوم ہوتا، تاہم مریض خاموشی اور مضحک رہتا ہے۔ جب کسی اندرونی تحریک، یا کسی خاص بات سے اس میں جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ قتل کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اس خودکام ارادے کو کسی پر ظاہر نہیں ہوتے دیتا اور بہت خاموشی سے اس جرم کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ اس کو اس سے سروکار نہیں کہ اس کے جرم کا نشانہ اپنا کوئی عزیز بن رہا ہے یا غیر۔

۱۲۔ عصبی ہیمان کے ازالہ کے لیے مسکن اعصاب ادویہ استعمال کرائیں۔

اصول علاج

۱۔ فوہات استعمال کرائیں۔

۲۔ رفع قبض کے لیے ملنیا دیں۔

۳۔ مواد کے تغیر کے نتیجہ میں عارض ہونے والے مانیا میں منفع اور مسہل کا اصول اپنائیں۔

۴۔ جوش و ہیمان کے ازالہ کے لیے فصد کھولیں۔

۵۔ شدید عوارض میں سرپر ٹھنڈا پانی ڈالیں، سرد ضداد رکھیں۔

۶۔ نیند لانے کے لیے شربت خضخاش نوش کرائیں، یا نہایت قلیل مقدار میں افیون

علاج ۱۳۔ ماہ الشیعر میں ملا کر نوش کرائیں

۱۴۔ دوا الشفاء، اگر ام، صبح، دوپہر، شام کھلائیں۔

۱۵۔ درج ذیل ضداد سے تبرید راس کریں۔

نسخہ ضداد :-

گل نیلوفر، گل بنفشہ، گل سرخ، ریشہ خطمی، کوکنار، ہر ایک ۴۴ گرام، برگ خیابرن، برگ بید، برگ کاہو، برگ عنب الثعلب، ہر ایک ۶۰ گرام، جلد دواؤں کو ۳ لیٹر پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو روغن کدو، روغن گل ہر ایک ۴۴ ملی لیٹر میں ملا کر اس میں سپرد انکر کے پیشانی پر رکھیں۔

۔۔۔ حسب ضرورت ۱۰۔ ۲۰ یوم تک درج ذیل نسخہ منفع استعمال کرائیں۔
نسخہ منفع:-

عنب الثعلب، گل گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اسطوخودوس، ابریشم خام مقرض، اقیقہ
ولایتی، سفلیٰ فستق، برگ گاؤ زبان، ہر ایک ۵ گرام، گل بنفشہ، نیلوفر، شادہ ہر ایک
۷ گرام، آلو بخارا، عنب ہر ایک ۵ دانہ، جلد دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو کر، صبح کو
مل چھان کر کلغندر ۸ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔۔۔ جب مادہ میں منفع کے آثار پیدا ہو جائیں
تو اسی نسخہ میں سناہ کی ۷ گرام، بھگو دیں اور صبح کو ترنجبین، شیر خشک، مغز فلس خیار شیریں ہر ایک
۸ گرام، شیر و مغز بادام شیریں ۵ دانہ ملا کر ایک ایک دن کے وقفے ۳، ۴ سہل دیں اور وقفے کے
دن درج ذیل نسخہ تہرید استعمال کرائیں۔
نسخہ تہرید:-

خمیرہ گاؤ زبان ۲ گرام، ورق نقرہ میں لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد شیرہ عنب ۵ دانہ،
عق گاؤ زبان ۴ ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ ۴ ملی لیٹر ملا کر، تخم ریحاں مسلم چھوٹ کر نوش کرائیں
۔۔۔ منفع سہل اور تہرید کا نسخہ استعمال کرنے کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ:-

مروارید، لاجورد مغسول، طباشیر، زہر مہرہ ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، جلد دواؤں کو باریک پیس کر
خمیرہ ابریشم شیرہ عنب والا ۵ گرام ملا کر کھلائیں، اس کے بعد شیرہ بڑ ۵۷ ملی لیٹر شربت عنب ۴۴ ملی لیٹر
ملا کر ۲، ۳ دن تک استعمال کرائیں، پھر رفتہ رفتہ دودھ اور شربت کی مقدار بڑھائیں یہاں تک کہ
دودھ کی مقدار ۸۰ ملی لیٹر اور شربت کی مقدار ۶۰ ملی لیٹر ہو جائے، پھر اس طرح بتدریج مقدار کم
کریں یہاں تک کہ ابتداء کی مقدار تک آجائے۔
۔۔۔ روغن لبوب سبعہ کی سرپر مالش کریں۔

کابوس

NIGHT MARE

اس مرض میں مریض کو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے یا سینے پر بیٹھا ہے، اور پھر اسی گھبراہٹ میں بیدار ہوتا ہے، جس سے وہ کابوسی / ضابطی کیفیت تو زائل ہو جاتی ہے تاہم اضطراب و توحش کچھ دیر تک باقی رہتا ہے۔
(I) غلیظ بخارات کا جو ہر دماغ پر دباؤ ڈالتا (یہ بخارات، دموی، بلغمی یا سوداوی اسباب ہو سکتے ہیں)

(II) اعصابی تاثر، جس سے عضلات تنفس متاثر ہو جائیں۔

(III) سوہمضم

(IV) دیران امعاء

(V) مغلط غذائیں کھانا

(VI) ریاضت کی کمی

(VII) عرصہ تک غسل نہ کرنا

(VIII) دماغی محنت کی زیادتی

(IX) (بچوں میں) دانت نکلنا

(X) دماغی تردد و تفکر

(XI) غذائی بے اعتدالی

(XII) حفظان صحت کے اصولوں کی عدم پابندی

(XIII) چائے اور تمباکو کی زیادتی

علامات نیند کی حالت میں، ڈراؤنے خواب دیکھنے کی وجہ سے مریض سینہ پر بوجھ محسوس کرتا ہے، یہ بوجھ کسی تصوراتی انسانی جسم یا کسی وزنی شے کا ہوتا ہے، یا مریض محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے گلے یا جسم کو دبوچ رہا ہے، جس سے اس کا دم گھٹا جاتا ہے۔ بولنے اور حرکت کرنے سے

عاجز ہوتا ہے، اسی اضطراب و کشمکش میں چونک کر جاگ اٹھتا ہے۔ بیدار ہونے پر کابوسی /
صاوغولی کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔ تاہم اضطراب و توحش کچھ دیر تک باقی رہتا ہے۔
اگر مرض کا سبب دمووی بخارات ہوں تو چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا
ہے تاہم نیند گہری نہیں آتی۔ — بلغمی بخارات کی صورت میں حواس میں کمزور ہوتا ہے،
رینٹو اور قحوک بخارت خارج ہوتا ہے، جسم میں استرخائی کیفیت اور کسلی پڑی ہوتی ہے۔ —
سوداوی بخارات کی صورت میں نیند کم آتی ہے، آنکھیں دھنس جاتی ہیں، موہوم اور
خیالی شے سیاہ دکھائی دیتی ہے اور غلبہ سوداؤ کی دوسری مخصوص علامات پائی جاتی ہیں۔ —
برودت کی صورت میں کسبارگی سر میں سردی لگنے اور ضعف دماغ کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ —
اطباء کا بوس کو صریح کا مقدمہ قرار دیتے ہیں۔

اصول علاج | امتلا، دم کی صورت میں فصد کھولیں۔ پینڈلیوں پر سنگھیاں کھینچوائیں۔
 خلط غلیظ کے انزال و تنقیہ کی تدابیر اختیار کریں۔
 برودت کی صورت میں گرم روغنیاں و منادات استعمال کرائیں۔
 فعل ہضم کو درست کریں۔

علاج | چونکہ فعل ہضم کا غخل اس مرض کا کثیر الوقوع سبب ہے لہذا فعل ہضم کو درست کرنے کی خاطر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

جوارشس جالینوس ۷ گرام کھلانے کے بعد شیرہ بادیان ۷ ملی لیٹر، شیرہ تخم کشوتہ ۵ ملی لیٹر، شیرہ کشنیز خشک ۳ ملی لیٹر، عرق بادیان ۴۴ ملی لیٹر میں نکال کر خیرہ بنفتہ ۸۴ گرام ملا کر صبح کے وقت کھلائیں اور غذائینے کے بعد معجون ناخواہ ۷ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں

— شدید صنعت کی صورت میں خمیرہ گاؤں زبان مغربی جواہر دالہ گرام ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔
— قبض کی صورت میں قرص ملین ۲ عدد، یا اطر فیصل زمانی ۷ گرام بوقت خواب کھلائیں۔

— بلغم اور سوداء کے اجتماع کی صورت میں درج ذیل مسہل استعمال کرائیں۔
نسخہ مسہل :-

کھنکی ۷ گرام، سقمونیا، شحم حنظل ہر ایک ۱۲ گرام، افیون اگر ام، جلد دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنا میں اور حسب ضرورت استعمال کرائیں۔ تنقیہ کے بعد درج ذیل نسخہ۔

نسخہ مقوی دماغ :-

حریرہ مغز بادام میں ہیل خورد ۳ عدد پیس کر کھلائیں۔

۔ دیدان امعاء کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ دیدان :-

کمیلہ، سرخس، ہر ایک اگر ام، گلقتند ۱۲ اگر ام میں ملا کر صبح کے وقت کھلائیں اور رات میں اطریفیل دیدان ۹ اگر ام کھلائیں

۔ تخم زہمخال نیم کو قہ، شکر، ہموزن کھلائیں، مفید ہے۔

۔ اطریفیل کشنیزی ۱۲ اگر ام، اسطوخودوس اگر ام ملا کر کھلائیں نافع ہے۔

۔ درج ذیل معجون آزمودہ ہے۔

نسخہ معجون ہلیلہ :-

پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، آملہ، گاؤ زبان، افسنتین، بادرنجبویہ ہر ایک ۷ اگر ام، افیون، بادیان

دارچینی، عود ہندی، فرغون، فاونیا، ہر ایک ۳ اگر ام، سکنج ۱۰ اگر ام، گلقتند ۵ اگر ام، شہد خالص

۳۶ ملی لیٹ، گلقتند اور شہد کو گلاب اور عرق بادیان ہر ایک ۲۵۰ ملی لیٹ میں جوش دیں اس کے

بعد جلد دواؤں کو روغن بادام میں چرب کر کے ملائیں اور ۷ گرام بوقت خواب کھلائیں۔

۔ بادرنجبویہ ۵ اگر ام، پیس کر شہد خالص ۹ ملی لیٹ کے ساتھ کھلائیں، سودمند ہے۔

۔ خلط دموی کی صورت میں فصد کھولیں اور پنڈلیوں پر گھیاں کھینچیں۔

۔ بلغمی بخارات کی صورت میں جوشاندہ تخم ترب اور شہد کے ذریعہ تے کرائیں اور جوشاندہ

بادیان، عود، گل سرخ، مصطکی اور گلقتند کے ذریعہ دست لائیں۔ جب قویا اور

حب ایارج فیرا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سرکی طرف سے بلغم کے انحرار کے لیے

کندش سگھائیں اور غرغره، طلا، نطول وغیرہ تدابیر اختیار کریں، پاؤں کی مالش بھی مفید تصور کی

جاتی ہے۔

۔ سوداوی بخارات کی صورت میں ماء الجبن اور جوشاندہ اقیتمون نوش کرائیں۔

۔ غلبہ برودت کی صورت میں گرم روغنیات مثلاً روغن اذخر، روغن سداب اور روغن

مصطکی استعمال کرائیں۔

۔ اسی مقصد کے لیے محرمضادات مثلاً خردل، جواکھار، جندبیرہ ہمراہ کر دیا دستی لگانا

سود مند ہے۔
 — غلبہ خون کی صورت میں فصد کے علاوہ زلال تھرہندی ۲۴ ملی لیٹر یا سکنجبین ۴۸ ملی لیٹر
 ہمراہ ماہر العمل نوشتہ کرانا بھی فائدہ مند ہے۔


Learn Unani By Abdul Waris Salman

مانخولیا

MELANCHOLIA


اس مرض میں افکار و خیالات پریشان اور فاسد ہو جاتے ہیں، یہ پریشانی یا فساد عام طور سے ان عادتوں، فطریوں اور تشکلوں کے موافق ہوا کرتا ہے، جو حالت محبت میں مریض کے خیال میں راسخ ہوتی ہیں۔

اقسام



- ۱۔ مانخولیا کی اس تقسیم سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، تاہم میرے نزدیک ہی تقسیم درست ہے۔
- ۲۔ بعض اطباء نے قطرہ اور مانیا ذہنی کو ایک ہی بیماری قرار دیا ہے۔

محرَق خلط کے اعتبار سے



اسباب

خلط محرَق :-

- I, دموی احتراق کے سبب مزاج میں سوداویت
 - II, صفراوی احتراق کے سبب مزاج میں سوداویت
 - III, بلغمی احتراق کے سبب مزاج میں سوداویت
 - IV, سوداوی احتراق کے سبب مزاج میں سوداویت
- امراض دماغ :-

- I, ضعف دماغ
- II, دماغی کام کی زیادتی

نفسانی عوارض :-

- I, رنج و غم
- II, فرحت و مسرت

حاد/متعدی امراض :-

- I, حیات حادہ
- II, آتشک
- III, سوزاک

امراض اعفاء تناسل :-

- I, جلق

II, کثرت مباشرت
III, عمر الطمث
متفرقات :-

I, بواسیری خون کا بند ہونا
II, بے خوابی
III, اختناق الرحم
IV, سوء ہضم
V, سوء مزاج کبد
VI, سوء مزاج طحال
VII, کثرت عے نوشی

علامات چہرہ بے رونق، زردی یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی بے رونق ہوتی ہیں، جلد خشک ہوتی ہے، سوء ہضم اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ معدہ و کبد کے مقام پر ثقل محسوس ہوتا ہے، ذہنی اور فکری انتشار ہوتا ہے، ہر چیز کو اندیشہ بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، گویا عجیب و غریب توہمات کا شکار ہوتا ہے کبھی تو غربت و ناداری سے ڈرتا ہے اور کبھی خود کو بادشاہ تصور کرتا ہے، کبھی خود کو بہت بڑا عالم، فاضل اور بعض اوقات پیغمبر تصور کرتا ہے اور اپنے اتفاقی واقعات کو بطور معجزہ پیش کرتا ہے، بعض اوقات اس کو اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا اور اس خوف سے وہ کھانا، پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بدگمانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر والوں اور رشتہ داروں تک کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔
بعض مریضوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں رہے بلکہ گدھا، مرغ یا مٹی کا برتن ہو گئے ہیں اس لیے گدھے کی طرح رینگنے، مرغ کی طرح بانگ دینے اور ٹوٹنے بکھرنے کے خوف سے لوگوں سے کتر کر چلتے ہیں، بعض مریض خوب ہنستے، بعض روتے اور بعض بالکل خاموش رہتے ہیں، نبض بطی چلتی ہے۔

خلط محرق کے اعتبار سے اس کی مختلف علامات رونما ہوتی ہیں، چنانچہ احتراق دموی میں اختلاط عقل ہوتا ہے، ہنسی اور مرست کا اظہار ہوتا ہے، عروق جسمانی کشادہ اور ابھری ہوئی ہوتی ہیں، رنگ گندم گوں یا مائل بہ سرخی ہوتا ہے اور بالعموم گرم و تر اشیاء کے استعمال کی، اور اخراج خون

کے مادی ہونے کی سرگزشت ملتی ہے۔

احتراق صفراوی کی صورت میں کسی قدر جنونی کیفیت ہوتی ہے، مریض چڑچڑاہٹ، حیران و پریشان اور مضبوط الحواس ہوتا ہے اور دماغ پر حرارت کے غلبہ کی وجہ سے ہڈیاں اور اضطراب ہوتا ہے، میند غائب ہو جاتی ہے، رنجت زرد ہوتی ہے اور شدت غصہ کے باعث مریض کی نگاہیں درندوں کی مانند معلوم ہوتی ہیں، ملمس حار ہوتا ہے۔

احتراق بلغمی کی صورت میں سستی، ماندگی اور سکون کا غلبہ ہوتا ہے، تاہم ملمس حار ہوتا ہے۔ احتراق سودا طبعی کی صورت میں دوران کار تفکرات کا غلبہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی فکر اور خوف دامن گیر رہتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے کم آمیز ہوتا ہے اور اکثر رویا بھی کرتا ہے۔

سودائے سر کی صورت میں اندیشہ ہائے دور دراز کے ساتھ آنکھیں گہری ہوتی ہیں۔ نظر کسی ایک چیز پر یا زمین پر مرکوز ہوتی ہے، سراو پرہرہ سے لاغری اور خشکی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے تمام بدن کا گوشت معتدل ہوتا ہے اور عام طور سے دقوع مرض گہرے فکر و تدبیر، طویل بیداری، دھوپ میں چلنے پھرنے گرم اور مفرد دماغ غذاؤں کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے، پیشاب رقیق ہوتا ہے اور نبض بطنی، صغیر اور مختلف چلتی ہے۔

اصول علاج | علاج میں بھرپور دلچسپی اور عجلت دکھائیں اور مرض کو مستحکم ہونے دیں کیونکہ ابتداء میں اس کا علاج آسان ہوتا ہے اور مستحکم ہو جانے کے بعد نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔

۔۔۔ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں

۔۔۔ فعل ہضم کو درست کریں

۔۔۔ مفرحات، خوشبوئیات اور حسب فرودت فومات استعمال کرائیں۔

۔۔۔ تنقیہ مواد کریں

۔۔۔ ترطیب و تبرید کریں

۔۔۔ حسب فرودت فصد کھولیں۔

علاج | دموی :-۔۔۔ مالنخویائے دموی میں اکھل کی فصد کھولیں، بصورت دیگر باسلیق کی فصد

کھولیں، اور بندش حیض کی صورت میں مافق کی فصد کھولیں۔
 — فصد کھولنے کے بعد تین دن تک مندرجہ ذیل نسخہ، تبرید استعمال کرائیں
 نسخہ تبرید:-

خمیرہ گاؤزبان ۱۲ گرام کو ورق نقرہ اعداد میں لپیٹ کر کھلائیں، اس کے بعد عذاب ۵ دانہ،
 عرق گاؤزبان ۱۴۴ ملی لیٹر میں نکال کر شربت منفہ ۲۴ ملی لیٹر ملائیں اور تخم ریحاں مسلم ۷ گرام
 چھڑک کر نوش کرائیں۔

صبح، و شام درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ برائے صبح:-

مفرج باردے گرام، کھلا کر زرشک، ۳ گرام، آلو بخارا ۵ عدد، عرق کاسنی ۱۲۴ ملی لیٹر
 میں نکال کر شربت انارین ۳۶ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
 نسخہ برائے شام:-

مرئی آملا عدد، پانی سے دھو کر ورق نقرہ اعداد میں لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد آلو بخارا ۵ عدد،
 کشنیز خشک، تخم خرفہ ۳ گرام، عرق گاؤزبان ۹۶ ملی لیٹر میں پیس چھان کر شربت نیلوفر ۱۲۴ ملی لیٹر
 ملا کر نوش کرائیں۔

— بصورت دیگر درج ذیل نسخہ منفعی سات دن نوش کرائیں۔

نسخہ منفعی:-

اقیمون ولایتی، سفاج، فستقی، گاؤزبان، آب ریشم مقرض، عنب الثعلب، اسطوخودوس،
 بادرنجبویہ، ہر ایک ۵ گرام، گل نیلوفر، تخم کاسنی، تخم خطمی، ہر ایک ۷ گرام، گل گاؤزبان ۳ گرام دانہ موٹا
 ۵ عدد، جلد دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقتد ۸ گرام ملا کر نوش
 کرائیں۔

آٹھویں دن اسی نسخہ میں سناہکی ۷ گرام، ترندی ۶ گرام شامل کر کے رات میں بھگو دیں
 صبح کو ترنجبین، شیر خشک، ہر ایک ۸ گرام، مغز خلوس خیانتبر ۶ گرام، شیرہ مغز بادام شیریں
 ۵ عدد شامل کر کے ایک دن کے وقفہ سے نوش کرائیں، اور وقفہ کے دن نسخہ تبرید استعمال کرائیں۔
 نسخہ تبرید:-

خمیرہ گاؤزبان ۱۲ گرام، ورق نقرہ اعداد میں لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد دانہ عذاب ۵ عدد،

عرق گاؤ زبان ۴۴ ملی لیٹر میں پیس کر مل چھان کر شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر ملا کر تخم ریحان مسلم
بے گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
صفراوی :-

— مالتویا صفراوی میں نصف کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، اور مالتویا دھوسی کے ذیل میں بیان
کمرہ نسخہ منفع استعمال کرائیں، اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس نسخہ سے خود دس
اسطوخودوس اور بادرنجبویہ صدف کر دیں۔

— شام کو مغرب بارداستعمال کرائیں۔

— سرپر روغن لبوب سبعہ کی مالش کریں۔

— مذکورہ بالا منفع و مہل دینے کے بعد صبح، شام درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ برائے صبح :-

لاجورد معسول ۵۰۰ ملی گرام، بنسلوچین، زہر ہیرہ ہر ایک اگرام، مروارید ۲۵ ملی گرام، جملہ دواؤں
کو باریک پیس کر خمیرہ ابریشم شیرہ عذاب والا ۷ گرام ملا کر نوش کرائیں، اس کے بعد عرق بیرمشک
ماوا بجمین ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر میں شربت انار شیریں ۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
نسخہ برائے شام :-

قرص دواء الشفا ۲ عدد ہمراہ آب تازہ کھلائیں اور بوقت خواب اطرینفل زمانی ۷ گرام کھلائیں
اور سرپر روغن لبوب سبعہ کی مالش کریں۔
سوداوی :-

— نفث مادہ کے لیے ۲۱ دن تک یہ نسخہ نوش کرائیں۔
نسخہ منفع :-

شاہترہ، چراغ، سرچھوکر، برگ فرنجشک، گل سرخ، تخم کاسنی، بادرنجبویہ، ہر ایک ۷ گرام
عذاب ۵ عدد، جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت عذاب ۸ ملی لیٹر
ملا کر نوش کرائیں۔

شام کو مندرجہ ذیل دوا استعمال کرائیں۔

لاجورد معسول، بنسلوچین ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو پیس کر خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا
۵ گرام ملا کر کھلائیں، اوپر سے عرق شاہترہ، عرق گزر ہر ایک ۶ ملی لیٹر، شربت گڑا حل ۲۴ ملی لیٹر

ملا کر نوش کرائیں۔

۲۱ دن تک یہ نسخہ پلا کر عرق مطبوع ہفت روزہ ۱۰۰ ملی لیٹر صبح کو، سات دن تک استعمال کرائیں۔ تنقیہ جسم کے بعد تین دن درج ذیل نسخہ تہیہ پلائیں۔

نسخہ تہیہ:-

غیرہ ابریشم شیرہ عذاب والا ۷ گرام کھلا کر شیرہ عذاب ۵ عدد، لعاب ریشہ خطمی، ۷ گرام، عرق شاہترہ ۲ ملی لیٹر میں نکال کر شربت عذاب ۲۴ ملی لیٹر ملائیں اور تخم ریحاں مسلم، ۷ گرام چھراک کر نوش کرائیں۔

— تبرید کے بعد صبح کو قرص دوا، الشفا ۲ عدد، ہمراہ شیرہ بڑ، معمولی کمی بیشی سے استعمال کرائیں۔
شام کو غیرہ ابریشم حکیم ارشد والا اور غذا کے بعد دوا، المسک معتدل جو اہر والی کھلائیں۔
— سر پر روغن لبوب سب سے رکھیں۔

— ایاراج فیقرا، اقیقون ہر ایک ۲ گرام جہیر ہود، غاریقون ہر ایک ۷ گرام، سقمونیا مشوی ۱۶ گرام، قرنفل گلدار ۲۰ عدد، جلد دواؤں کو خوب باہر یک پیس کر ریشمی کپڑے سے چھانیں اور شربت ہی یا شربت پوست آترج میں ملا کر معجون بنائیں اور ہفتہ میں ایک بار ۱-۷ گرام کھلائیں بلغمی:-

— چند دنوں، صبح، شام درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

دوا، المسک معتدل، ۷ گرام کھلانے کے بعد شیرہ بادیان ۵ گرام، شیرہ انیسون، شیرہ تخم کشو ہر ایک ۳ ملی لیٹر، عرق گزر، عرق غیر، عرق ماء اللحم ہر ایک ۸ ملی لیٹر میں نکال کر گلقتدہ ۲ گرام، شربت گڑ محل ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ اگر اس نسخہ سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو مالتھو لیاے سوداوی کے ذیل میں بیان کردہ منفعہ ۱۵ دن استعمال کرائیں، سوہویں دن اس میں سنا، کمی، ترمید سفید، گل سرخ، ہر ایک ۷ گرام ملا کر رات میں بھگو دیں اور صبح کو مغز فلوںس خیانتیر ۶ گرام، شکر سرخ، ترنجبین، غیرہ بنفشہ ہر ایک ۸ گرام، شیرہ مغز بادام شیریں ۷ عدد ملا کر ایک دن کے وقفہ سے نوش کرائیں اور وقفہ کے دن مالتھو لیاے سوداوی کے ذیل میں بیان کردہ نسخہ تہیہ استعمال کرائیں۔

— حسب ضرورت حب ایاراج سے تنقیہ دماغ کریں اور اس کے بعد قرص دوا، الشفا اور

دواء المسک معتدل والا نسخہ استعمال کرائیں ۔
 — مالتھو یلے بلغمی اور سوداوی میں مریض کے قومی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قصہ کھولنا سود مند
 ہے اس کے بعد نسخہ تبرید و ترطیب استعمال کرائیں ۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

اس مرض میں افکار و خیالات غیر طبعی ہو جاتے ہیں اور ان میں انانیت اور تکبر کے غماز شامل ہو جاتے ہیں مریض زمیں مارتا اور خود کو سب سے اعلیٰ و برتر تصور کرتا ہے اور معمولی باتوں کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ — مادہ مرض کے مراق میں پائے جانے کی وجہ سے ہی اس کو مانعویا مراقی کہتے ہیں۔

اسباب

امراض کبیر :-

- | | |
|------------------------|--------------|
| I, | سو، مزاج کبد |
| II, | صغرا الکبد |
| III, | دبیله کبد |
| امراض معدره و امعاء :- | |
| I, | سو، ہضم |
| II, | بواسیر |

متفرقات :-

- | | |
|------|----------------------|
| I, | ضعف اعصاب |
| II, | دماغی محنت کی زیادتی |
| III, | مقاصد میں ناکامی |
| IV, | رنج و غم کی زیادتی |
| V, | کثرت مباشرت |
| VI, | خوف و دہشت |

VII. جریان

VIII. محنت کی عادت کے بغیر عیش و آرام

IX. سو مزاج قلب

امراض حادہ کی نقابت

آتشک

عظم طحال

علامات ابن جاتی ہے۔ معمولی سی بات کو بھی خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، سوہمضم کی وجہ سے ترش، دھانی ڈکاریں آتی ہیں، تھوک کثرت سے خارج ہوتا ہے، ورم اور یرغ کی وجہ سے نفخ و قراقر اور درد کی شکایت ہوتی ہے۔ پسلیوں کے سروں کے نیچے تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ شانوں کے درمیان درد محسوس ہوتا ہے۔ معدہ میں سوزش اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، معدہ سے اوپر کی طرف بخارات چڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نصیق الصدر ہوتا ہے، پاخانہ نرم ہوتا ہے۔

شدت مرض کی صورت میں خود اعتمادی زائل ہو جاتی ہے اور مریض کو اپنی مبالغہ آمیز باتوں میں غلطی کا گمان ہوتا ہے اور وہ ہمہ وقت اپنے خیالات پر نظر ثانی کرتا رہتا ہے۔ اندرونی اعضاء میں کسی شدید و مہلک بیماری کے داہمہ میں گرفتار ہوتا ہے اور دریافت حال پر اپنے مرضی کو الٹ کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، پرٹھ لکھے ہونے کی صورت میں اکثر طبی کتابیں زیر مطالعہ رہتی ہیں اور اپنے اس مطالعہ کی روشنی میں معالجین اور تیمار داروں سے بحث و مباحثہ پر آمادہ رہتا ہے۔ مرضی داہمہ کی وجہ سے اپنی غذا پر خصوصی توجہ دیتا ہے لیکن سوہمضم کی وجہ سے غذا اس قدر سودمند ثابت نہیں ہوتی اور مریض پریشان ہو جاتا ہے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اپنے لباس پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے فساد دم ضعیف ہوتا ہے اطراف سرد ہو جاتے ہیں، دورہ کی حالت میں احتشاء شکم اور صدر میں درد کی شکایت کرتا ہے۔

اصول علاج | مریض کو پُر فضا مقام اور صحت بخش آب دہوا میں لے جائیں اور رنج و غم اور فکر و تردد سے آزاد رکھیں۔

— روزانہ غسل کرائیں اور کپڑوں کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔

— رفع قبض کریں

— منومات مسکنات اور مفرحات استعمال کرائیں

— قوت کے قوی ہونے اور امتلاء خون کی صورت میں فصد کھولیں تاہم قوی درجہ کے استفراغ سے احتراز کریں۔

— دیگر اعضاء میں خرابی کی وجہ سے مرض ہو تو ان کا علاج کریں

— اصلاح ہضم کریں

— رفع قبض کے لیے اطرینفل زمانی ۵ گرام کھلائیں — یا درج ذیل نسخہ تلخیص

علاج استعمال کرائیں۔

نسخہ تلخیص :-

ترنجبین خراسانی، شیر خشت ہر ایک ۴ گرام، مغز فلوںس خیانتبر ۶ گرام، گلقتند ۶ گرام
جلد دواؤں کو ۵۰۰ ملی لیٹر ماء الجبن میں مل چھان کر نوش کرائیں۔
— یہ نسخہ بھی مفید و مجرب ہے۔

نسخہ :-

جوارش آملہ یا الوشمار دلولوی ۵ گرام کھلانے کے بعد شیرہ ہیل خورد ۵ عدد، شیرہ کشنیز
خشک، شیرہ تخم خرقہ، ہر ایک ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں نکال کر شربت انارین یا رب ہی ۲۴ ملی لیٹر ملا کر
نوش کرائیں۔

— درج ذیل نسخہ بھی سودمند ہے۔

طباشیر، دانہ، ہیل، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک ۱ گرام، آملہ مربی عدد، ورق نقہ عدد، جلد
دواؤں کو باہم ملا کر کھلائیں، اس کے بعد شیرہ گرد ساق، شیرہ انار دانہ، شیرہ کشنیز خشک، ہر ایک
۵ گرام، شیرہ زیرہ سفید ۳ گرام، پانی میں نکال کر شربت انارین ۲۴ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش
کرائیں۔

— اطرینفل زمانی ۱۲ گرام، مربی ہلیلہ عدد، دھو کر ورق نقہ لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد

قنیرہ بادیان، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک ۶ گرام، ورق کاؤ زبان ۲۷ ملی لیٹر میں نکال کر گلقتند سیوٹی

۶ گرام اضافہ کر کے نوش کرائیں — قبض کے لیے مجرب ہے۔

— نفخ، قراقر اور درد شکم کی حالت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

جوارشس کوئی ۱۲ گرام کھلا کر شیر و بادیان ۶ گرام، شیر و مونیر منقی ۱۰ ادا، پانی میں نکال کر گلقتند، سنگبین ہر ایک ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔ غلبہ و استلاء خون کی صورت میں باعلیق یا بائیں ہاتھ کی اسلیم کی قصہ کھولیں، التهاب معدہ و احشاء کی صورت میں ان کا معقول علاج کریں۔

۔۔۔ التهاب جگر کی صورت میں مندل سرخ، آرد جو، تخم کاسنی، گل ارمنی، گل سرخ، ہر ایک ۶ گرام، کو عرق کلاب میں پیس کر مقام جگر پر لپیٹ کریں۔

۔۔۔ اس بابت درج ذیل نسخہ بھی کار آمد ہے۔

شیر و تخم کاسنی، شیر و تخم خیاریں، شیر و تخم خربزہ، شیر و خار خشک خورد، ہر ایک ۶ گرام، پانی میں نکال کر شربت بزدوری معتدل ۲۴ ملی لیٹر، آب کاسنی سبز سروق ۲۸ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش کرائیں۔۔۔ مزید ترطیب و تبرید کی ضرورت ہو تو آب خیارشوی ۲۸ ملی لیٹر کا اضافہ کرائیں۔

۔۔۔ درج ذیل ترکیب بھی کار آمد تصور کی جاتی ہے۔

نسخہ قرص آرد ماش کبیر :-

آرد ماش ۲۵۰ گرام، کو حسب ضرورت شیر بزم میں گوندھ کر نمک طعام ۱۲ گرام، حلتیت زنجبیل، ہر ایک ۶ گرام، برگ شبت ۱۲ گرام پیس کر ملائیں اور ایک طرف سے ٹکیہ کو پکا کر خام جانب روغن ازملہ چیر کر نیم گرم باندھیں۔

۔۔۔ مفرج کے طور پر درج ذیل ادویہ کھلائیں۔

مفرج باردے گرام کھلا کر لعاب گاؤ زبان ۵ گرام، شیر و بہمن سفید، شیر و کشنیز خشک ہر ایک ۳ گرام، پانی میں نکال کر گلقتند سیوق ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

قطرب

LYCONTHROPHY

اس مرض میں مریض ہر وقت متوحش، متفکر اور حیران و پریشان پھر کرتا ہے، آبادی اور انسانی صورت سے متوحش ہوتا ہے اور دور بھاگتا ہے، ویران اور غیر آباد مقامات پر چھپا رہتا ہے اور صرف رات ہی میں باہر نکلتا ہے۔

اسباب

(1) دماغ میں سودا، اور صفراء، محترق کا اجتماع

مریض ترش زدہ ہوتا ہے، جسم کا رنگ زرد یا سیاہی مائل زرد ہوتا ہے۔ آنکھیں تاریک، سوکھی ہوئی اور حرورہ چشم میں دھنسی ہوئی ہوتی ہیں، زبان اور منہ خشک ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں حزن، تاسف اور غصہ کی ہوتی ہے۔ چہرہ گرد آلود ہوتا ہے بھوک پیاس اور درد کا احساس کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ مریض کسی ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا، ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ اس کا یہ تردد اس کی چال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آبادیوں اور انسانی صورت سے دور بھاگتا ہے اور بالفرض کوئی شخص اچانک سامنے پڑ جائے تو اس سے بدگمان ہو جاتا ہے اور متوحش رہتا ہے۔ دن میں کھنڈرات، ویرانوں یا قبرستان میں چھپا رہتا ہے اور رات میں باہر نکلتا ہے۔ پنڈلیوں پر زخم ہوتے ہیں، جو تازہ ہوتے رہنے کی وجہ سے مندرمل نہیں ہو پاتے، چہرے پر بھی چوٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، رات میں

لے شیخ الرئیس ابن سینا کے بقول ”قطرب پانی میں رہنے والے ایک چھوٹے سیاہ کیڑے کا نام ہے جو سطح آب پر جلد جلد اور بے ترتیب حرکتیں کرتا رہتا ہے، کبھی ڈوبتا غوطہ کھاتا اور کبھی ابھرتا ہے“ اسی مناسبت سے اس مرض کا نام قطرب رکھا گیا ہے۔

لیکن قول کے مطابق قطرب ایک چھوٹا کیڑا ہے جو رات میں اڑتا پھرتا ہے اور چلتا ہے (یعنی اسی مناسبت سے اس مرض کا نام قطرب رکھا گیا ہے۔

جب یہ نکلتا ہے تو اس کی مترد جال اور ہیئت کڑائی دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں جس سے میں خوش ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی فطرت کے عین مطابق ایسے میں کتے اس کی پنڈلیاں منہ میں دبالیے ہیں، اور زخم ہو جاتا ہے، بعض اوقات مریض گرتا پڑتا بھاگنے کی کوشش میں خود کو لہو لہان کر لیتا ہے۔

اصول علاج:۔۔۔ حسب فردیت فصد کھولیں
تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں
ملفوظات، غنومات اور مبررات و مرطبات استعمال کریں۔

علاج۔۔۔ تیلین شکم کی غرض سے قرص ملین ۲، ۲ مکیہ دیں
 --- نیند لانے کے لیے جوشاندہ تخم خشخاش اور گل بابونہ کا، سر پر نطول کریں
 --- آب کا ہو، آب پوست خشخاش، بابونہ، شیر بزم وزن، ان میں تھوڑا سا روغن ملائیں اور
 کپڑا تکر کر کے سر پر رکھیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدلتے رہیں۔
 --- آملا بیلہ سیاہ، افیمون، بسفاج ہر ایک ۶ گرام، لاجورد مغسول ۴ گرام، جلد دواؤں کا
 سفوف بنائیں اور ۷ گرام، ہمراہ ماء الجبن نوش کرائیں۔

صابرا

MANIAC PHRENITIS

اس مرض میں مریض پریشانی کی، اور بے سروپا باتیں کرتا ہے، سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا، اور مضطرب رہتا ہے۔

اسباب

(ج) احتراق مغز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سودا کا دماغ میں جاگزیں ہو جانا
ابتداء مرض میں طویل بیداری کی شکایت ہوتی ہے۔ بعد میں فرغ فی النوم ہوتا ہے۔
علامات انبان ہوتا ہے، سوال کے موافق مریض کا جواب نہیں ہوتا، آنکھیں سرخ اور ان سے
پریشانی کا اظہار ہوتا ہے، آنکھوں کے ڈھیلوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور مریض آنکھوں میں
تنکایا گرد وغبار محسوس کرتا ہے عروق چشم ابھری اور محتلی ہوتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہتا رہتا
ہے، تنفس متواتر ہوتا ہے۔

سرسام صفراوی کا علاج کریں، تاہم ترطیب میں اضافہ کریں۔
اصول علاج۔ مریض کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ وہ خود کو گزند نہ پہنچا سکے۔

علاج

سرسام صفراوی کا علاج کریں۔


صرع

EPILEPSY


یہ ایک عصبی نویسی مرض ہے جس میں مریض بے ہوش ہو کر، اور عام طور سے ایک پریچ کے ساتھ گر پڑتا ہے اور اس کے اختیاری عضلات میں تشنج اور غیر منظم حرکات ہونے لگتی ہیں۔

اقسام

۱، بنیادی اقسام



۲، مرض کی شدت و خفت کے اعتبار سے



اسباب

Intracranial Causes

۱، درون دماغی اسباب

	I,	دباؤ کی زیادتی
	II,	سلو
Hydrocephalus	II,	اجتماع الماء فی الرأس
Subarachnoid Hemorrhage	III,	تحت العنكبوتی جریان
		دماغ یا اغشیہ دماغ کی التهابی کیفیت :-
	I,	سرسام
Encephalitis	II,	التهاب دماغ
Neurosyphilis	III,	آتشک عصبی
Cerebral Cysticercosis	IV,	
		فرب :-
Intracranial Hemorrhage	I,	درون دماغی جریان
Head Injuries	II,	ضربات رأس
	IV,	ادویاتی امراض :-
Cerebral Atheroma	I,	دماغی قعصہ
	II,	نزف
Thrombosis	III,	تخثر الدم
Embolism	IV,	انسداد
Hypertensive Encephalopathy	V,	بیش طانی مرض دماغ
Stokes-Adam's Syndrome	VI,	اسٹوک آدم کا علائمیہ
Degeneration		انحطاط :-
Cerebromacular Degeneration	I,	
Diffuse Sclerosis	II,	تصلب عمومی
Lipidosis	III,	شحمیت
	V,	خلقی بے اعتدالیاں :-

Cerebral Diplegia	I,
Porencephaly	II,
Tuberous Sclerosis	III, تعصب درن
Extracranial Causes	دبہ بروں دماغی اسباب
	I, سمیات :-
	II, شراب
	III, کوکین
	IV, سیسہ
	V, نکمیا
	VI, کارڈیازول
Nikethamide	VII, نیکیتھامائیڈ
	VIII, کافور
	داخلی :-
Eclampsia	I, انشناج
Uremia	II, تسم پولی
Cholemia	III, صفرائیم
Hypoglycemia	IV, قلت شکریت
	V, قلت کیلشیم
Anoxemia	II, قلت نسیم
Asphyxia	I, دم کشی
	II, کاربن مونو آکسائیڈ کا تسم
	III, استحالی نقص :-
Alkolosis	I, قلاء
	IV, اندرونی ترواش کی بے اعتدالی :-

(V) طفلی عہد :-

- I, دانت نکالنا
 II, کساح
 III, نقص حیاتین
 Pyridoxine Deficiency

(ج) متفرقات :-

- I, غلبہ اخلاط
 II, دیدار امعاء
 III, رنج و غم
 IV, کثرت مباشرت
 V, جلق
 VI, دماغی محنت کی زیادتی
 VII, نقص
 VIII, حیض کی خرابیاں
 IX, دراشت
 X, خارج الحلیات پوٹاسیم کی کمی

علامات

عمومی :-

مرض میں مذکورہ علامات رونما ہوتی ہیں۔

- I, سرسراہٹ
 II, بے ہوشی
 III, تشنج
 IV, مرث کے بعد کی حالت

(I) سرسراہٹ :-

مریضوں میں دورہ سے قبل اس کی چند مخصوص علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جن سے مریض دورہ

کے وقوع کا قبل از وقت تعین کر لیتا ہے چنانچہ بعض مریضوں کو دورہ سے قبل درد سر یا ضعف کا احساس ہوتا ہے۔ کسی مریض کو مختلف رنگ کے دائرے نظر آتے ہیں یا کسی خاص قسم کی بو، کوئی ڈراونی شکل یا آنکھوں کے سامنے چمکاریاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کبھی تقدیمہ المعوضہ کے طور پر ذائقہ میں مخصوص تلخی، بے خوابی، یا جسم کے خاص مقام سے اور عام طور سے پاؤں، ہاتھ کی انگلیوں یا شکم پر سرسراہٹ معلوم ہوتی ہے جو سر کی طرف صعود کرتی ہے اور بعض مریضوں میں بخار کی شکایت ہوتی ہے، کبھی مفاصل سرد ہو جانے اور خم بعدہ پر پھوٹکن کے بعد دورہ پڑتا ہے۔

(II) بے ہوشی / دورہ مرض :-

مذکورہ بالا علامتوں میں سے کوئی مخصوص علامت ظاہر ہونے کے بعد ایک صبح کے ساتھ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کی صورت میں پشت کے بل زمین پر گر پڑتا ہے۔

(III) تشنج :-

ہاتھ پیروں میں تشنج شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو گھوم جاتے ہیں اور اکثر اوقات غیر متحرک ہو جاتے ہیں۔ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے بعض اوقات زبان دانتوں کے نیچے آجاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ تشنجی اثرات پہلے چہرہ اور سامعہ و باہر سے متعلق عضلات پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے بعد اطراف متاثر ہوتے ہیں اور تشنج متواتر کے بعد تشنج ارتجاجی شروع ہو جاتا ہے، دورہ ختم ہونے کے وقت ایک طرف کے ہاتھ یا پاؤں کو جھٹکا لگ کر تشنج رفع ہو جاتا ہے اور مریض ایک آہ کھینچ کر تھوری دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور دورہ موقوف ہو جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ہوش آجاتا ہے ہوش آنے کے بعد بھی کسی قدر بے خبری کی کیفیت رہتی ہے اور ترکان، درد سر، سوجھ بھم معانی تشنج وغیرہ کی معمولی شکایت ہوتی ہے اور کچھ عرصہ بعد یہ عوارض بھی رفع ہو جاتے ہیں۔

(IV) دورہ کے بعد :-

جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، دورہ مرض کے ختم ہونے کے بعد جہاں تکان معمولی بے خبری اور درد سر، سوجھ بھم اور مقامی تشنج کی شکایت ہوتی ہے وہیں بعض مریض ہڈیاں بکتے ہیں اور مارپیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ فالج ہو سکتا ہے اور قوت گویائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

دورہ کی عورت :-

دورہ کی مدت ۵۰ سکند سے دس منٹ تک ہو سکتی ہے، شاذ و نادر ۳۰ منٹ تک ہو سکتی ہے، بعض مریضوں میں ایک دن میں کئی بار دورہ پڑتا ہے اور کبھی چند یوم کے وقفہ سے دورہ پڑتا ہے۔

خصوصی علامات :-

مرع خفیف :-

یہ معینہ وقت پر ماہ، دو ماہ یا سالوں بعد واقع ہوتا ہے علامات مندرجہ یعنی دورہ سے قبل کی علامات ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ اگر ہوشیاری سے مشاہدہ نہ کی جائیں تو نظر انداز ہو جاتی ہیں، مثلاً مریض اکثر بات کرتے کرتے رک جاتا ہے یا مریض چہرہ سے مہوت نظر آتا ہے، یا کسی ایک جانب ٹٹکلی باندھ کر دیکھنے لگتا ہے یا وقتی طور پر اس کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات مرنے سے گھومتا محسوس ہوتا ہے۔ بہر حال چند ثانیہ کے لیے مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آتی ہے اور اس کے بعد ہی مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔

مرع شدید :-

عمومی علامات کے ذیل میں مذکورہ علامات مرع شدید سے تعلق رکھتی ہیں۔

مرع جدید :-

اس کی علامات مرع شدید کی علامتوں سے بھی کسی قدر شدید ہوتی ہیں، دورہ پے در پے پڑتا ہے چنانچہ ابھی ایک دورہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور مریض بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔

ذیل میں مرع اور اختناق الرحم و قلبی غشی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

اختناق الرحم
Hysteria

مرع
Epilepsy

۱۔ مریض دفعتاً قطعی طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دورہ بتدریج واقع ہوتا ہے مریض اگر چہ بے اور اس کو کسی کی آواز سنا نہیں دیتی، دورہ بظاہر بے ہوش ہوتی ہے تاہم وہ تیمارداروں ختم ہونے کے بعد، اثنائے بے ہوشی کے واقعات کی آواز سن لیتی ہے مگر جواب نہیں دے پاتی،

سے ناواقف ہوتا ہے۔

غیر ہوش میں آنے کے بعد دوران بے ہوشی کے واقعات کو بیان کر سکتی ہے۔

۲۔ چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے، دانت پیستا ہے اور بعض اوقات زبان دانتوں کے نیچے آکر کٹ جاتی ہے۔

۲۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے دانت پیستی ہے تاہم زبان نہیں کھینچتی، بلکہ تیار داروں کے ہاتھ یا جسم کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔

۳۔ آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف نکلے ہوئے اور نیم کشادہ ہوتے ہیں اور پتلیاں روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں۔

۳۔ بار بار پلکیں جھپکتی ہے اور روشنی سے پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔

۴۔ منہ سے جھاگ خارج ہوتا ہے۔

۴۔ منہ سے جھاگ خارج نہیں ہوتا۔

۵۔ تشنج منظم طور پر ہوتا ہے جو ابتدا میں

۵۔ تشنج دفعتاً اور غیر منظم طور پر ہوتا ہے،

خفیف اور بعد میں شدید ہو جاتا ہے اور جسم کے ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور چہرہ خاص طور سے بد نما ہو جاتا ہے۔

تشنج سے چہرہ کے عضلات محفوظ رہتے ہیں جس سے چہرہ میں کسی طرح کی بد نمائی نہیں ہوتی۔

۶۔ دورہ کی مدت زیادہ طویل نہیں ہوتی، نرسا خراٹے سے آتی ہے اور مریض کے ہنسنے یا رونے کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی۔

۶۔ دورہ کی مدت طویل ہوتی ہے، مریض لمبی سانس لیتی ہے اور گلے سے روتی اور گلے ہنسنی ہے۔

۷۔ علامت مندرجہ کے طور پر ہاتھ پیر یا تشکم سے ایک قسم کی سرسراہٹ سر کی طرف صعود کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد دورہ شروع ہو جاتا ہے۔

۷۔ تشکم سے ایک گولا سا اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے جو گلے میں جا کر پھنس سا جاتا ہے۔

۸۔ دورہ مریض کے ختم ہونے کے بعد بے ہوشی یا گہری نیند طاری ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے۔

۸۔ دورہ کے زائل ہونے کے بعد نیند نہیں آتی، مریض پست ہمت ہو جاتی ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔

۹۔ مریض بے ہوش ہونے سے قبل صبح مارتا ہے۔

۹۔ مریض بے ہوش ہونے کی حالت میں جینتی چلاتی ہے۔

- ۱۰۔ بے ہوشی کی حالت میں پیشاب پاخانہ
غیر ارادی طور سے خارج ہو جاتا ہے۔
۱۱۔ دورہ از خود زائل ہو جاتا ہے۔
۱۰۔ ایسی صورت پیش نہیں آتی۔
۱۱۔ بالعموم سرد پانی کچھ پینے سے دورہ زائل
ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

قلبی غشی

مرع

- ۱۔ بغیر کسی ظاہری سبب کے، غشی لاحق ہوتی ہے اور عضلات میں تشنجی حرکات پائی جاتی ہیں۔
۱۔ کوئی ظاہری سبب مثلاً شدید گرمی یا شدید
صدومہ وغیرہ اسباب موجود ہوتے ہیں نیز عضلات
میں تشنجی حرکات نہیں ہوتیں بلکہ مریض مردہ کی
مانند پڑا رہتا ہے۔
۲۔ دورہ سے قبل کوئی نہ کوئی علامت مندرجہ
مریض صاف متلی، ضعف یا دوران سر کی شکایت
کرتا ہے۔
۳۔ چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے۔
۳۔ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔
۴۔ بے ہوشی اچانک لاحق ہو کر دفعتاً
۴۔ بے ہوشی بتدریج زائل ہوتی ہے۔
۵۔ سانس تراٹے سے آتی ہے اور منہ سے
۵۔ تنفس ضعیف ہوتا ہے اور جھاگ خارج
جھاگ خارج ہوتا ہے۔
۶۔ دل دھڑکتا ہے، نبض غیر منظم اور قوی ہوتی ہے۔
۶۔ دل کی حرکت میں ضعف ہوتا ہے، نبض
ضعیف اور بلی چلتی ہے۔
۱۔ اصول علاج — اصل سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے منفعی مسہل، تبرید اور تنقیہ کرائیں۔
عطوسات استعمال کرائیں۔
غلبہ دم کی صورت میں فصد کھولیں سنگھیاں لگائیں۔

— دیدان کی صورت میں قاتل و مخرج دیدان دوائیں استعمال کرائیں

— تنقیہ مواد کے بعد مقوی دماغ و اعصاب ادویہ و اغذیہ کھلائیں۔

— دیگر عضوی اشتراک کی صورت میں ان اعضاء اور امراض کی رعایت سے علاج کریں۔

علاج | دورہ کے وقت مریض کو کشادہ اور ہوادار کرہ میں لٹائیں گلے، سینہ اور شکم کی بندش کو ڈھیلی کریں، سر کو اونچا رکھیں اور دانتوں کے نیچے زبان نہ آنے کے لیے منہ میں لاک یا کپڑے کی گولی وغیرہ رکھیں۔

— ہوش میں لانے کے لیے جندبیدستر، عود صلیب اور برگ سداب کو چھان کر عرق پیاز میں حل کر کے ناک میں ٹپکائیں۔

— تخم حنظل، مرکب، زنجبیل، کلونجی، جندبیدستر یا قلعفل سیاہ میں سے کوئی ایک دوا، پانی میں گھس کر یا پیس کر ناک میں قطور کرنا بھی سودمند ہے۔

— رفع تشنج کے لیے — روغنیات حارہ مثلاً روغن سرخ، روغن بابونہ، روغن کچلہ، روغن کلال اور روغن قسط وغیرہ کی جسم پر مالش کریں۔

— دورہ ختم ہونے کے بعد درد سر کے لیے قرص مثلث کو آب کشنیزہ بزمروق میں گھس کر پیشانی پر ضماد کریں۔

— غلیظ رطوبت بلغمی کی صورت میں منفعج مسہل، تربید اور تنقیہ کا اصول بہت مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ منفعج :-

گل بنفشہ، ۷ گرام، اسطوخودوس، بادرنجبویہ، بادیان، ایون، کاکڑ زبان، زرد فاختک، یزخ بادیان، یزخ کاسنی، اصل السوس، یزخ اذخر، یزخ کرفس ہر ایک ۵ گرام، مویر منقی ۹ دانہ، انجیر زرد ۳ عدد، جدوار ۳ گرام، ان تمام دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر کلقتند علی ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

۷ دن تک یہی نسخہ استعمال کرائیں، آٹھویں دن اسی نسخہ میں درج ذیل مسہل دواؤں کا اضافہ کر دیں۔

نسخہ مسہل :-

سنا، مکئی، گل سرخ، تربید، ہر ایک ۷ گرام، ان دواؤں کو مذکورہ بالا دواؤں کے ہمراہ

رات میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر مغزِ امتاس۔ ۶ گرام، خشک سرخ ۸ گرام، ترنجبین ۸ گرام
حل کر کے دوبارہ چھان لیں اور عرقِ مہلاب ۸ ملی لیٹر، روغن بادام شیریں ۶ گرام کے ساتھ
نوش کرائیں۔

تیسرے دن نسخہٴ تبرید استعمال کرائیں۔
نسخہٴ تبرید:-

خمیرہ گاؤ زبان غبری ۷ گرام، ورقِ نقرہ میں پلیٹ کر کھلائیں اور پر سے شیرہٴ عناب ۵ دانہ،
عرقِ گاؤ زبان ۲ ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ ۲ ملی لیٹر ملا کر تخمِ ریحاں ۷ گرام اور پر سے
چھوٹک کر نوش کرائیں۔

دوسرے دن کے بعد تیسرے مہل میں حبِ ایارج ۷ گرام، روغن بادام سے
چرب کر کے ورقِ نقرہ میں پلیٹ کر رات کے آخری پہر، مریض کو نیند سے بیدار کر کے
عرقِ گاؤ زبان ۲ ملی لیٹر کے ساتھ کھلائیں، صبح کو مغزِ امتاس اور روغن بادام کے علاوہ سابق
میں مذکورہ جملہ دوائیں استعمال کرائیں۔

اسی طرح ایک دن کے وقفہ سے دوسرے مغزِ امتاس کے اور دوسرے حبِ ایارج کے
نوش کرائیں، اور وقفہ کے دن نسخہٴ تبرید استعمال کرائیں۔

مہل اور تبرید کے بعد تقویتِ دماغ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہٴ تقویتِ دماغ:-

معجونِ فلاسفہ، طریقلِ اسطوخودوس، جوارشِ جالینوس، ہر ایک ۷ گرام، خمیرہ گاؤ زبان،
جدوارِ عود صلیب والا، دوا المسک معتدل جو اہر والی یا دوا المسک معتدل ہر ایک ۵ گرام
ان دواؤں میں سے کوئی ایک دوا کشتہٴ خبث الحیدر یا کشتہٴ مر جان جو اہر والا کے ہمراہ کھلائیں
— تنقیہ کے بعد یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

— جدوارِ عود صلیب، خمیرہٴ آبریشم حکیم ارشد والا میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد شیرہٴ بادیان،
شیرہٴ عمود منقح پانی میں نکال کر خمیرہٴ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں، شام کو قرص دوا الشفا
اعداد، ہمراہ آبِ تازہ کھلائیں۔

— غلبہٴ خلط سوداوی کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
نسخہٴ منفع:-

بیج کاسنی، بیج بادیان، بادیان، شاہزہ، چرائتہ، ہر ایک ۷ گرام، پر سیاہ نشان، اصل الٹو
مقشر، اسطوخودوس، ہر ایک ۵ گرام، موہن منقہ ۹ دانہ، عناب ۵ دانہ، تمام دواؤں کو رات میں
گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر غلغندہ ۸ گرام اضافہ کر کے استعمال کرائیں۔
پندرہ دن تک یہ نسخہ استعمال کرائیں، اس کے بعد مرعہ بلغمی کے ذیل میں بیان کردہ
نسخہ، مسہل استعمال کرائیں، دو مسہل کے بعد تیسرا مسہل حب ایارج کا دلیغیر مغز املتاس
دروغن بادام، دیں، اور وقفہ کے دن نسخہ، تبرید نوش کرائیں۔ ان نسخہ جات کے
بعد صبح ذیل دوا میں استعمال کرائیں۔

صبح: دوا، مسک معتدل جو اہر والی ۷ گرام، ہمراہ شیر گاؤ ۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
شام: دوا، شفا ۲ عدد، ہمراہ شیر گاؤ ۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
— درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔
نسخہ حب مرعہ:-

جدوہ خطائی ۲ گرام، ہلید سیاہ اگرام، عود صلب عدد، موہن منقہ ۶ گرام، تربہ مجوف
خراثیدہ ۲ گرام، بادیان ۳ گرام، اسطوخودوس ۲ گرام، عرق کلاب میں ایک دن خوب کھل
کریں اس کے بعد جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنالیں اور روزانہ اگولی کھلائیں۔
— رفع قبض کے لیے درج ذیل نسخہ مفید ہے۔


اسپنول مسلم ۷ گرام، پھانک کر اوپر سے شیر گاؤ ۲۵۰ ملی لیٹر میں دروغن بادام شیریں
۱۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

فالج

PARALYSIS

اس مرض میں جسم کے نصف یا بعض حصہ کی حرکت / حس یا حس و حرکت دونوں مفقود ہو جاتی ہیں۔

اقسام



اسباب

اعضاء کا ایک بیک مفلوج ہو جانا:-

I, مقدم دماغ کی شریان وسطیٰ میں سدہ

II, غلیظ اور لزج رطوبتوں کا اعصاب میں جمع ہو کر قوت حساسہ و قوت محرکہ کو بند کر دینا۔

III, التهاب اعصاب

IV, قرحہ و مدہ اعصاب

رفقہ رفقہ، جلد فالج ہو جانا:-

لے لے سے ان اقسام کی تفصیل، علاحدہ سے آئندہ صفحات میں ملاحظہ کریں۔

- I, مقدم دماغ میں نرف
 II, مقدم دماغ کی شریان وسطیٰ میں سدہ دموی
 III, آتشک کی وجہ سے التهاب بطانتہ الشریان
 IV, اعضاء کے مزاج کا فساد
 V, غلبہ برودت / بلوبت
 قلیل الوقوع اسباب :-

- I, سلوات دماغیہ
 II, خراج دماغیہ
 III, تعصب منتشر
 IV, اختناق الرحم
 V, مرع
 VI, داء الرقص
 VII, سرسام حاد
 VIII, یشغس

علامات | عام طور سے فالج کی تشخیص میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، تاہم بعض اوقات فالج بالکل معمول ہوتا ہے اور مریض جسم کے کسی حصہ میں مروت کمزوری محسوس کرتا ہے، ایسی صورت میں مریض سے کہیں کہ وہ اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کرے، فالج ہونے کی صورت میں ایک طرف کی آنکھ زور سے نہیں بند ہو پاتی، مریض سے بیک وقت دونوں ہاتھوں سے معانجہ کریں اور مریض سے کہیں کہ وہ زور سے دبائے، دونوں بازوؤں کی قوت میں فرق پایا جائے گا۔

سطح دماغ پر انصباب خون کی صورت میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تشنج ہوتا ہے اور متاثر عضلات بہت جلد اکڑ جاتے ہیں اور مفلوج اطراف کے مخالفت جانب لقوہ ہوتا ہے۔ وسط دماغ میں غلل کی صورت میں عضلات بہت جلد اینٹھ جاتے ہیں۔ جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اوپر اور باہر کی جانب پھر جاتی ہیں، پتلیوں میں سکڑن آ جاتی ہے

ایک جانب کے پاؤں مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کے مخالف جانب لقوہ ہو جاتا ہے۔
 سلعات دماغ کی صورت میں مرض کا اثر رفتہ رفتہ ہوتا ہے، ابتدا میں تشنج ہوتا
 ہے اس کے بعد لقوہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ، پیر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ درد سر اور
 دوران سر ہوتا ہے، قے آتی ہے اور ضعف بعبارت عارض ہو جاتا ہے۔
 شریئین دماغ میں انجماد دُموی کی صورت میں مرض کے حملہ سے قبل مریض سرد
 اور دوار کی شکایت کرتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، قوت گویائی میں فرق
 آ جاتا ہے اس کے بعد بیہوش ہو کر یا بیہوش ہوئے بغیر فالج ہو جاتا ہے۔
 شریئین دماغ کے مسدود ہونے کی صورت میں ایک بیک فالج ہوتا ہے،
 بے ہوشی نہیں ہوتی۔ فالج اثر عام طور سے دائیں جانب ہوتا ہے اور قلب کا معاونہ کرنے
 پر صامت قلب کے امراض کا پتہ چلتا ہے۔

ساق المشخ کے متاثر ہونے کی صورت میں چہرے کا نچلا حصہ اور ایک جانب کے
 ہاتھ پیر اور دوسری جانب کی پیشانی نیز تیسرا دماغی عصب مفلوج ہو جاتا ہے۔
 پیدا لشی طور پر مفلوج ہونے کی صورت میں بھی عام طور سے دماغ کے دونوں جانب
 ضرب یا دماغ کی ساخت میں نقص یا دیگر دماغی امراض کی موجودگی ہوتی ہے۔
اصول علاج | اور شدید حملہ کی صورت میں ۱۴ دن تک قوی علاج سے احتراز
 کریں۔

- ۔ علاج کا آغاز خفیف منفع مثلاً ماء الاصول حقنہ لیتن اور ملطف مشروبات سے کریں۔
- ۔ مسہل بھی خفیف، ایارج فیکرا و الاستعمال کرائیں۔
- ۔ پانی نہ پینے دیں، اس کے بدلے ماء العسل نوش کرائیں۔
- ۔ عمر، موسم، مزاج اور قوائے جسمانی وغیرہ اگر موافق ہوں تو علاج کا آغاز فصد سے
 کریں۔
- ۔ بلغمی مواد کی صورت میں فصد سے قبل تریاق نوش کرائیں اور اس کے ایک گھنٹہ
 بعد فصد کھولیں۔

علاج — ۵۔ ۸ دن تک شہد خالص ۲۲ گرام، عرق گاؤ زبان ۲۲ ملی لیٹر میں
جوش دے کر نوش کرائیں اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء قطعی طور پر کھلائیں
۹ دن درج ذیل نسخہ منفع استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع:-

بادیان، بیج بادیان، پر سیاوشان، تخم خباری، تخم خطمی، بیج مکر فس، ہر ایک ۷ گرام
اصل السوس، اسطوخودوس، گاؤ زبان ہر ایک ۵ گرام، مویز منقہ ۹ دانہ، انجیر زرد ۳ دانہ،
جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۸ گرام
ملا کر نوش کرائیں۔
آٹھ دن تک یہی نسخہ استعمال کرائیں، نویں دسویں دن اس میں درج ذیل ادویہ
کا اضافہ کر دیں۔

نسخہ مسہل:-

سنا، مکی، تربید سفید، ان دواؤں میں شامل کر کے بھگو دیں اور صبح کو مغز فلو س
خیار شنبہ ۶ گرام، شیر خشت تربجین، شک سرخ، گل قند ہر ایک ۸ گرام شامل کر کے شیرہ
مغز بادام شیریں ۵ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ دوسرے دن نسخہ تربید
استعمال کرائیں، پھر مذکورہ بالا نسخہ منفع ۵ دن نوش کرائیں پھر اس کے بعد حب ایار ج
۹ گرام کے دو مسہل بغیر مغز فلو س خیار شنبہ اور روغن مغز بادام کے اسی نسخہ کے ہمراہ
استعمال کرائیں۔ مسہل کے بعد درج ذیل روغنیات کی ماش کریں
نسخہ روغن سرخ:-

۲۵۰ گرام، تاج، کامپھل، چھڑیلہ ہر ایک ۸ گرام، سعد کوفی، برادہ صندل سفید،
کچلہ، میدہ چوب، سنبل الطیب ہر ایک ۲ گرام، قر نفل، ساذج ہندی، دار چینی، زرد چوب،
دار بلد، عود غرقی ہر ایک ۲ گرام، زنجور ۹ گرام، ہیل خورد ۳۶ گرام، زعفران ۸ گرام، جاوڑی،
مشک خالص، ہر ایک ۶ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ کر الیڑ گلاب میں بھگوئیں، اس کے
بعد قلعی دار دیگی میں ڈال کر نرم آہ پر جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو اتار کر کپڑے سے
چھان کر محفوظ کر لیں اور ایک ہفتہ زمین میں دفن کریں اس کے بعد نکال کر استعمال کرائیں۔
نسخہ روغن بادام:-

قسط، قفل، ہر ایک نیم کو ذرا گرم، عاقر قرہ، جند بیدستر ہر ایک ۷ گرام
فرغیون، اگر ام، شراب کہنہ ۲۰۰ ملی لیٹر، روغن زیتون ۲۵۰ ملی لیٹر ————— قسط اور
قفل کو شراب میں رات میں بھگو دیں، صبح کو اس قدر جوش دیں کہ نصف باقی رہ جائے،
اس کے بعد روغن زیتون شامل کر کے دوبارہ اس قدر جوش دیں کہ شراب اڑ جائے اور صرف
روغن، روغن باقی رہ جائے تو فرغیون اور جند بیدستر کو کوٹ چھان کر ملائیں اور آگ سے اتار
کر محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت نیم گرم کر کے مالش کریں۔

— تقویت کے لیے قرص مرجان جواہر اعداد، خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا ۵ گرام میں ملا کر صبح
کو کھلائیں اور شام کو قرص خبث الحدید اعداد، اطر فیفل اسطوخودوس ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں
اور سوتے وقت بعد از غذا معجون اذراقی ۲ گرام کھلائیں
— قسط اور روغن سیر کی پشت پر مالش مفید تصور کی جاتی ہے۔
— درج ذیل روغن کی مالش مفید ہے۔

نسخہ:-

روغن بیدرنج میں کچلے کو اس قدر بریاں کریں کہ سیاہ ہو جائے اس تیل سے عضو کی
مالش کریں اور اس کے بعد برگ بیدرنج نیم گرم باندھیں۔
— قفل سیاہ، عاقر قرہ، جند بیدستر، فرغیون، حب بلساں، برگ بادرنجیویہ، عود بلساں،
اسطوخودوس، ریونہ چینی، اسارون، قفل سفید، ہر ایک ۶ گرام، بیڑہوٹی ۲ گرام، رات
میں شراب کہنہ میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دیں جب نصف باقی رہے، صاف کر کے روغن
دارچینی، روغن مصطکی، روغن قفل ہر ایک ۳۶ ملی لیٹر، روغن جلو تری، روغن بلساں
۱۳ ملی لیٹر میں ڈال کر اس قدر جوش دیں کہ شراب جذب ہو جائے، اس کے بعد ہڑتال دینی
مالکنگنی ہر ایک ۳ گرام، جند بیدستر ۶ گرام، ہر ایک پیس کر روغن میں ملا کر آگ سے اتار
لیں اور صاف کر کے محفوظ کر لیں اور نیم گرم مالش کریں۔

فالج نصفی

HEMIPLEGIA

اس مرض میں جسم کے طولانی نصف حصہ کی قوت حس / قوت حرکت / دونوں قوتیں

ناقص یا زائل ہو جاتی ہیں، البتہ سر کا حصہ مرض سے متاثر نہیں ہوتا، تاہم چہرہ کا نچرہ حصہ بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتا ہے۔

اقسام



اسباب
I, غلیظ، لزج خلط کے باعث اعصاب کے مسامات کا بند ہو جانا
II, اعصاب کا لمبائی میں کٹ جانا

Rupture Of Arteriosclerotic Vessel (III)

Mycotic Aneurysm (IV)

حاد تعدیہ (V)

سمی مواد (VI)

Trauma ضرب (VII)

Angiomatous Malformation (VIII)

سلو دموی (IX)

Thrombosis تختہ الدم (X)

Embolism انسداد (XI)

Encephalitis التهاب اغشیہ دارغ (XII)

سرسام (XIII)

بیش طنابی مرض دماغ (XIV)

Post-Epileptic Paralysis بعد مرعی فالج (XV)

Disseminated Sclerosis منتشر تصلب (XVI)

وضع حمل	(XVII)
تسم بول	(XVIII)
سلو دماغی	(XIX)
خراج دماغی	(XX)
دا، الرقص	(XXI)
مزمن تحت اُم جافیہ سلو دمویہ	(XXII)
یشرغس	(XXIII)
اختناق الرحم	(XXIV)

دماغ کے متاثر ہونے کی صورت میں [Cerebral Hemiplegia] علامات عام طور سے صبح میں بیدار ہونے کے بعد درد سر عارض ہوتا ہے اس کے بعد دو ایک تے آتی ہے پھر جسم کے نصف اعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ صورت سکتے کے ساتھ عارض ہوتی ہے۔ ماؤنٹ جانب کے ہاتھ کو اٹھا کر چھوڑ دیں تو خود بخود گر پڑتا ہے۔ چہرے پر بھر بھر اہٹ ہوتی ہے۔ پیشاب غلیظ اور سفید ہوتا ہے۔ ذائقہ ہیکا ہوتا ہے، عام طور سے ہوش و حواس قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات حواس میں کمزوری بھی ہوتا ہے متاثر حصہ بدن کے ہاتھ پیر کی حرکت کے مفقود ہو جانے سے حس بھی جاتی رہتی ہے اور بعض اوقات حس میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن یہ صورت شاذ ہی پیش آتی ہے ورنہ بالعموم حس و حرکت دونوں زائل ہو جاتی ہے۔ اگر مرض مزمن صورت اختیار کر لے تو مفلوج ہاتھ، پاؤں لاغر اور سرد ہو جاتے ہیں، ضعف امعاء کی وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے، رو بہ صحت ہونے کی صورت میں ابتداء میں پیر میں طاقت آتی ہے اور بعض کسی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ہاتھ مفلوج رہتا ہے، فالج نصفی دماغی عام طور سے جسم کے بائیں حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اعصاب نخاع کے متاثر ہونے کی صورت [Spinal Hemiplegia] میں سر، چہرے اور زبان پر مرض کا اثر نہیں ہوتا ایضاً کے ہوش و حواس پر بھی خراب اثر نہیں پڑتا اور جس جانب کی حس جاتی رہتی ہے اس کی مخالف جانب کی حرکت معدوم ہو جاتی ہے۔

مری فالج نصفی میں بعض اوقات ایک طرف کے جسمانی اعضا، چند ثانیہ سے ۲۰ دن تک مفلوج رہتے ہیں، لیکن مریع کے دوسرے حملہ سے قبل ہی متاثرہ اعضا کھل جاتے ہیں۔

دارالرقص کے نتیجے میں عارض ہونے والے فالج نصفی میں بھی مریع کا اثر دیر پا نہیں ہوتا اور عارضہ جلد ہی رفع ہو جاتا ہے، متاثرہ اعضا میں تشنجی حرکت ہوتی ہے تاہم چہرے اور زبان پر کسی طرح کا مرضی اثر نہیں ہوتا۔

— مریع کو آرام دہ بستری پر لٹائیں اور نقل و حرکت سے منع کر دیں۔
اصول علاج — سر کو اونچا رکھیں۔

— چار یوم تک غذا اور پانی نہ دیں بلکہ صرف ماداِ غسل نوش کرائیں، پانچویں دن جنگلی کبوتر کا شوربہ نوش کرائیں، آٹھویں دن منفع استعمال کرائیں اس سلسلے میں مادہ مرض کی ریختہ از حد فرو ری ہے۔ چنانچہ اگر برودت کا غلبہ ہو تو ادویہ حارہ شامل کریں اور اگر حرارت کا غلبہ ہو تو ادویہ باردہ شامل کریں، پندرہ دن منفع دینے کے بعد سولہویں دن مسہل دیں دوسہل دینے کے بعد نسخہ تبرید دیں، اس کے بعد پھر منفع پلا کر دماغ کا تنقیہ کریں۔
 — رفع قبض کے لیے حقہ دیں۔

— ابتداء مرض میں قوی ادویہ کے استعمال سے گریز کریں۔

— جملہ تدابیر فالج کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

— فالج میں مذکور علاج کریں۔

علاج — مذکورہ ادویہ کی عدم موجودگی میں یا بدل کے طور پر درج ذیل نسخہ منفع بھی مستعمل ہے۔
 نسخہ منفع مسہل :-

خمیرہ گاؤ زبان ۱۲ گرام ورق نقہ میں پیسٹ کر کھلائیں اور اس کے بعد گاؤ زبان ۵ گرام گل گاؤ زبان ۳ گرام، عناب ۵ عدد پانی میں جوش دے کر شہد خالص یا نبات سفید ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں — سولہویں دن اسی نسخہ میں تخم کشوث مرہ بستہ، تخم کاسنی، تخم قرطم، افیمون دلاہتی مرہ بستہ، بیج کر فس، مکو، ہر ایک ۵ گرام، سناؤ مکی، گل سرخ ہر ایک ۷ گرام، خمیرہ بنفش، مغز فلوں خیانتہ، گل قند، ترنجبین، شکر سرخ

ہر ایک ۲۴ گرام، مغز بادام شیریں ۷ دانہ کا اضافہ کر کے نوش کرائیں — تیسرا اور چوتھا مسہل، رات کو حب ایارج فیکرا ۹ گرام کھد کر صبح کو مذکورہ مسہل میں سے مغز بادام اور مغز فلوئس خیارشمبر حذف کر کے نوش کرائیں۔

— حلیت اگر ام ہمراہ ماوا غسل روزانہ کھلائیں سودمند ہے۔

— متاثرہ حصہ پر چیتے کی چربی کی مالش کریں۔

— روغن بادام تلخ میں تھوڑا سا جندبیدستہ حل کر کے ناک میں ٹپکائیں

— تنقیہ کے بعد درج ذیل نسخہ مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ :-

معجون فلاسفہ ۵ گرام، دوا المسک حار ۳ گرام ملا کر کھلائیں اس کے بعد برگ بادرنجبویہ، دارچینی قلمی، اسطوخودوس، ہر ایک ۳ گرام، پانی میں جوش دیکر مل چھان کر شہد خالص ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

— مرض کے مزمن ہونے یا مذکورہ دواؤں سے صحت پابی نہ ہونے کی صورت میں

درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ حب بیش :-

بیش ۵۰ گرام، عاقرقرا، فلفل، زنجبیل جوڑوا، بسا مسہل ایک ۵ گرام، جمد دواؤں کو باریک پیس کر اچھی طرح ملا کر قند سیاہ اور روغن زرد، حسب ضرورت ملا کر مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور روزانہ گولی کھلائیں۔

— اطباء درج ذیل حب کو بھی استعمال کراتے ہیں

نسخہ حب اذراقی :-

اذراقی مدبر، فلفل سیاہ ہموزن۔ اذراقی کو خوب باریک کریں اور

اس کے بعد فلفل سیاہ کے ساتھ باریک پیس کر فلفل سیاہ ہی کے بقدر خوب بنائیں اور ایک

حب بعد از طعام کھلائیں۔

— سم الفار ۳۹ ملی گرام، کات سفید، طباشیر ہر ایک ۵ گرام، جملہ دواؤں کو باریک

پیس کر گلاب میں گھینپ دیں اور ماش کے بقدر گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی بعد از

طعام کھلائیں۔

استرخاء جسم اسفل

PARA PLEGIA

اس مرض میں جسم کے زیریں اعضاء مثلاً ٹانگیں، مثانہ اور مقعد وغیرہ مسترخ ہوجاتے ہیں۔

اسباب

Upper Motor Neuron Lesion

۱۔ فوقانی حرکی عصبی تضرر

Intracranial Causes

Tumour Of The Flax Cerebri I,

Thrombosis Of Superior Sagittal Sinus II,

Cerebral Diplegia III,

Internal Hydrocephalus IV, داخلی استسقاء دماغی

Thrombosis Of Unpaired Anterior Cerebral Artery V,

Spinal Causes اب، نخاعی اسباب

Sub-Acute Combined Degeneration VI

Disseminate Sclerosis VII, تعلق منتشر

Amyotrophic Lateral Sclerosis VIII,

Syringomyelia IX,

Friedreichs Ataxia X, فریڈرک کاٹیکسیا

XI, کسروخلع

Kummel's Disease XII, مرض کیلاس

Acute Transverse Myelitis XIII, حاد مستعرض التهاب عفلات

	آتشک	IX,
	نزف	X,
	تخثر الدم	XI,
	سلو نخاعی	XII,
	سرام نخاعی	XIII,
Cervical Spondylosis	التهاب فقاری عنقی	XIV,
Spinal Caries	نخر شوکی	XV,
Aortic Aneurysm	انور سملے اور طی	XVI,
	بلا اجزا (نقص تغذیہ کے ذیل میں)	XVII,
	سمیات :-	
Lathyrism	تسم جلبانی	I,
Fluorosis	تسم فلور	II,
	۲۔ تحتانی حرکی عصبی تفرر	
	Lower Motor Neuron Lesion	
Poliomyelitis	التهاب عضلات استرخائی	I,
Peripheral Neuritis	محیطی التهاب عضلات	II,
Acute Infective Polynuritis	حاد سراپتی التهاب عصبی کثیر	III,
Myasthenia Gravis	شدید نہاکت عضلات	IV,
Familial Periodic Paralysis	خاندانی دوری فالج	V,
Myopathies	عضلی امراض	VI,
	متفرقات :-	
	عمر الطمث	I,
	حمل	II,
	سردی لگنا	III,
	قلبی صدمہ	IV,
	اسعار اور مسوڑھوں میں لززع	V,

علامات کثرت جوار

مرضی علامات بتدریج / اچانک نمودار ہوتی ہیں، بتدریج رد نما ہونے کی صورت
علامات | میں ابتداء میں ٹانگوں کے عضلات میں کمزوری، خدر اور چوٹیوں کے ریگنے
 کا احساس ہوتا ہے، پشت اور کمر میں درد ہوتا ہے، پیروں میں جھنجھناہٹ اور سنناہٹ
 ہوتی ہے، مریض کی چال میں لڑا کھڑا ہٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات مریض چلتے میں
 گر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ٹانگوں کے عضلات کی قوت حرکت بتدریج کم ہو کر زائل
 ہو جاتی ہے اور پیر سخت، بھاری اور متشنج ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں استرخائی کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ قوت حس بھی زائل ہو جاتی ہے، مریض کے بستر پر پڑے
 رہنے کی وجہ سے زخم بتری ہو جاتا ہے اور نقاہت وضعف کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی
 ہے۔

التهاب نخاع کی صورت میں جب زیریں نخاع مبتلا مرض ہو تو دونوں پیروں کی
 حس و حرکت دونوں زائل ہو جاتی ہے۔ مثلاً اور معاً، مستقیم بھی مفلوج ہو جاتے ہیں،
 احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے، مثلاً بھر کر تن جاتا ہے اور اس سے قطرہ قطرہ پیشاب
 ٹپکتا ہے اور اس میں سے تیز امونیا کی بو آتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہاتھ، سینہ اور تنفس کے
 عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور مریض فوت ہو جاتا ہے۔

نخاع یا اغشیہ نخاع میں التهاب کی صورت میں اعصاب محرکہ کی خراش کی علامتیں
 مثلاً اختلاج اور عضلات میں تشنج، وغیرہ پائی جاتی ہیں، اسی طرح اعصاب حسیہ میں
 خراش کی صورت میں خارش، سردی، گرمی یا کانٹا چبھنے کی سی علامتیں ملتی ہیں۔
 تلین نخاع کی صورت میں درم حار کی علامتیں مفقود ہوتی ہیں تاہم زیریں اعصاب
 مسترخ ہو جاتے ہیں۔

تفریقی علامات

استرخا جسم اسفل التهاب نخاعی عفوی
 Orgain Paraplegia Due To
 Myopathies

استرخا جسم اسفل انکاسی
 Reflex Paraplegia

۱۔ آغاز مرض سے قبل مثلاً، کلیہ، غدہ قدامیہ ۱۔ اس میں اعصاب بول کے امراض کی مرکز شدت

- اور سوزاک وغیرہ امراض کی سرگزشت ملتی ہے۔ نہیں ملتی۔
- ۲۔ عام طور سے دونوں ٹانگیں مفلوج ہوتی ہیں۔ ۲۔ ٹانگوں کے علاوہ دیگر اعضاء جسم بھی مفلوج ہو جاتے ہیں۔
- ۳۔ عام طور سے استرخاء اوپر کی طرف نہیں بڑھتا۔ ۳۔ استرخائی کیفیت رفتہ رفتہ اوپر کی طرف صعود کرتی ہے۔
- ۴۔ عام طور سے فالج / استرخاء نامکمل ہوتا ہے۔ ۴۔ اکثر مکمل ہوتا ہے۔
- ۵۔ استرخائی کیفیت عضلات میں کم دیش ۵۔ عضلات یکساں طور پر مسترخی ہوتے ہیں۔
- ۶۔ استرخاء کا اثر مثلاً اور رودہ مستقیم پر بہت کم ہوتا ہے۔ ۶۔ مثلاً اور رودہ مستقیم عام طور سے مفلوج ہوتا ہے۔
- ۷۔ مفلوج عضلات میں تشنج شاذ و نادر ہوتا ہے۔ ۷۔ ہمیشہ تشنج ہوتا ہے۔
- ۸۔ دباتے، سینکے اور برف لگانے سے ۸۔ پشت میں کم دیش ہمیشہ درد ہوتا ہے۔
- ۹۔ سینہ یا شکم میں بندھن اور جکڑان محسوس نہیں ہوتی۔ ۹۔ مریض کو اپنا بدن رسمی سے جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ متاثر اعضاء میں چیونٹیاں ریگیں ہوتی ۱۰۔ ہمیشہ چیونٹیاں ریگیں ہوتی اور سوئیاں یا سوئیوں کی سی چھن محسوس نہیں ہوتی۔
- ۱۱۔ اعضاء کی حرارت یا برودت نمایاں نہیں ہوتی۔ ۱۱۔ عام طور سے اعضاء میں حرارت یا برودت واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے۔
- ۱۲۔ حص عام طور سے زائل نہیں ہوتی۔ ۱۲۔ حص زائل ہو جاتی ہے۔
- ۱۳۔ اعضاء بول کے امراض کی عدم موجودگی کی صورت میں پیشاب اکثر ترش ہوتا ہے۔ ۱۳۔ پیشاب ہمیشہ کھاری ہوتا ہے۔
- ۱۴۔ عام طور سے متاثر اعضاء کے عضلات ۱۴۔ متاثر اعضاء کے عضلات لاغر ہو جاتے

- لاغز نہیں ہوتے اور ان کی حرارت میں بھی نہیں اور حرارت میں نمایاں طور سے کمی واقع بہت زیادہ کمی واقع نہیں ہوتی۔
- ۱۵۔ ہاضمہ خراب رہتا ہے۔
- ۱۶۔ شفا یابی جلد ہو جاتی ہے۔
- ۱۷۔ ہاضمہ درست رہتا ہے۔
- ۱۸۔ شفا یابی شاذ و نادر ہوتی ہے۔

اصل سبب مرض کا ازالہ کریں

اصول علاج۔ امتلاء نخاع کی صورت میں فصد، ملینات، مسہلات، مقلات اور مسکات استعمال کرائیں، منفعج، مسہل اور تبرید کا اصول اختیار کریں۔

۔ کرب و اضطراب کے ازالہ کے لیے مسکات اعماب کھلائیں تاہم ایفون اور اس کے مرکبات سے احتراز کریں۔

۔ حسب ضرورت مقویات نخاع کھلائیں۔

۔ عضلات کی تقویت کے دنگ اور محرکات کی مالتش کریں۔

۔ مریض کو آرام سے بستر پر لٹائیں اور نقل و حرکت سے منع کر دیں۔ سر کو اونچا رکھیں۔

علاج۔ بیج بادیان، غنہ الثعلب خشک، اسطوخودوس، بوزیدان، سورنجان، ہر ایک ۵ گرام کو کوٹ کر رات ہی میں جوش دیں اور شربت اسطوخودوس یا شربت اصول سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔ دو ہفتہ بعد تریاق فاروق یا خمیرہ اسطوخودوس استعمال کرائیں۔

۔ متاثرہ اعضاء پر روغن قسط کی مالتش کریں۔

۔ مرض کے مزمن ہونے کی صورت میں جب کچھ استعمال کرائیں۔

۔ چار دن تک پانی اور غذائے دیگر صرف مارا العمل نوش کرائیں، اس کے بعد پانچویں دن جنگلی کبوتر کا شوربہ نوش کرائیں، آٹھویں دن منفعج کا نسخہ شروع کریں اور مادہ مرض کا خیال رکھیں، چنانچہ غلیہ بروقت کی صورت میں حار ادویہ اور غلیہ حرارت کی صورت میں قاطع حرارت ادویہ شامل کریں، پندرہ دن تک منفعج دینے کے بعد سو لہویں دن مسہل دیں، دو مسہل کے بعد پھر نسخہ منفعج نوش کرائیں اور دماغ کا تنقیہ کریں اس کے بعد تبرید کریں، پھر مقوی دوا استعمال کرائیں، ذیل میں جملہ نسخہ جات تحریر کیے جا رہے ہیں۔

نسخہ منفعج:-

زیچ بادیان، بیچ بکیر بیچ کرفس، زیچ بادیان، اصل السوس، اسطوخودوس، تخم خطمی، تخم خلدی،
گاؤ زبان، ہر ایک ۵ گرام، انجیر زرد ۳ عدد، موہن منقہ ۹ دانہ، جلد دواؤں کورات میں گرم
پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شہد خالص ۸ مل لیٹ ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ سہل :-

نسخہ منفع میں ترنجبین، شکر سرخ، مغز فلوکس، خیانتہ ہر ایک ۸ گرام، شیرہ مغز بادام
شیریں ۷ عدد اضافہ کریں۔

نسخہ تبرید :-

خمیرہ گاؤ زبان سادہ ۲۰ گرام، ورق نقہ میں لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد لعاب بہدانہ
مغز تخم کدوئے شیریں، ہر ایک ۳ گرام، شیرہ عناب ۵ دانہ، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۲
لیٹ ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔ تقویت کے لیے قرص نقہ مرکب ۱ عدد، خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں
اور شام کو قرص خشت الحدید ۱ عدد اطفال اسطوخودوس ۵ گرام ملا کر کھلائیں اور غذا کے بعد
معدی اذراقی ۲ گرام یا معجون فلانسف میں چند بیدستر اگر آپس کر ملا کر کھلائیں۔
۔۔۔ تنقیہ کے بعد درج ذیل جوب بھی مستعمل ہے۔

نسخہ جوب :-

عاقرقحہ، پیسل، فلفل سیاہ ہر ایک ۳ گرام، پیلا مول ۶ گرام، زنجبیل، پھناک، ہر
ایک ۳ گرام، جلد دواؤں کو کوٹ چھان کر قند سیاہ ۲۲ گرام، روغن زرد ۳ مل لیٹ میں ملا کر
مونگ کے برابر حب بنائیں اور ۲ عدد بوقت خواب ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
۔۔۔ تنقیہ کے بعد روغن موم اور روغن کچلہ میں سے کسی ایک کی گرما گرم مالش کریں۔

استرخاء

PALSY

اس مرض میں جسم کا کوئی خاص عضو یا سارا جسم مسترخ ہو جاتا ہے۔

اسباب

- I, قطع عصب
- II, التهاب نخاع / درم نخاع بارد
- III, زوال فقار
- IV, ضربہ و سقط
- V, انخلار مفاصل
- VI, سوء مزاج
- VII, اندفاع مادہ بخرانی

علامات | قطع عصب اور التهاب نخاع کی صورت میں درد اور تناؤ کے ساتھ حمی ہوتا ہے درم نخاع بارد کی صورت میں درد اور حمی میں خفت ہوتی ہے۔ زوال فقار کی صورت میں پشت اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور سینہ باہر نکل آتا ہے اور بعض اوقات گردن میں قریبی خمیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انخلار مفاصل میں اس کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں مثلاً زائده باہر نکل آتا ہے۔ سوء مزاج کی صورت میں چھوٹے سے عضو میں برودت اور لینت کا احساس ہوتا ہے اور خارجی یا داخلی طور پر برودت کے زیر اثر رہنے کی روئیداد ملتی ہے۔ اندفاع مادہ بخرانی کی صورت میں امعاء یا رحم کے امراض کی سرگزشت ملتی ہے اور یہ مرض ایام بجران میں عارض ہوتا ہے۔

اصول علاج | — التهاب نخاع کی صورت میں فصد کھولیں۔

— ازمنہ مرض کے مطابق ضما د لگائیں۔

— ضربہ و سقط کی صورت میں فصد اور اسہال دونوں کرائیں۔

— محلات اور مقویات استعمال کرائیں۔

— سوء مزاج کی صورت میں تبدیلی مزاج عضو کی تدابیر اختیار کریں۔

علاج | — التهاب نخاع کی صورت میں فصد کھولیں اور ازمنہ مرض کے اعتبار سے

درج ذیل ضما دات لگائیں۔

نسخہ ضما د ادرع ۱۔

ابتداء مرض میں چھالیہ، اقا قیا، صندل، ہمراہ آب کاسنی کا ضاد لگائیں۔
 زمانہ تیز آید میں ادویہ رادعیہ کے ساتھ مرخی ادویہ کا اضافہ کریں مثلاً آرد جو ہمراہ آب کشنیز
 سبز اور روغن،

زمانہ انتہاء میں مرخی و محلل دوائیں مثلاً بابونہ، برگ چقندر، ہمراہ موم مصفی و روغن آس
 کا ضاد لگائیں۔

— فربہ و سقط کی صورت میں قصہ اور امہال کے ذریعہ جسم کا تنقیہ کریں اور محلل اور مقوی
 دوائیں مثلاً جاوشیر، مرکبی، جندبیدستر، فریون، ہمراہ موم مصفی اور روغن زیتون مقام درم
 پر لگائیں — مضموناً رہے کہ مرخی اعضا، پر اس کا ضاد مفرت رساں ہے۔

— درم باد کی صورت میں حب الغار، جوز السرو، زعفران، شب یافانی، مرکبی، جندبید
 ستر، ہمراہ موم، جو روغن قسط میں پگھلایا گیا ہو، لگائیں

— دفع بحران کی صورت میں خفیف گرم روغنیات مثلاً روغن ازہد، روغن سوسن اور
 روغن نرگس کی مالش کریں، ان میں روغن بابونہ، روغن الکلیل الملک اور روغن مرزنجوش
 کا اضافہ، مادہ کو اس عضو کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ چنانچہ ان روغنیات کا اضافہ کریں۔


لقوہ

FACIAL PARALYSIS

اس مرض میں عصب وجہی اور عصب سد شاخہ کے نسل ہو جانے سے چہرہ کا ایک
 پہلو غیر طبعی طور پر دوسری جانب پھرتا ہے جس سے چہرہ کی طبعی حالت/بیڈت بدل
 جاتی ہے اور دونوں لبوں کے باہم ملنے کی خوبی زائل ہو جاتی ہے۔

اقام

د، مقام مرض کے اعتبار سے



اسباب

لقوہ علی المرکز :-

I, وسط دماغ کے مرکز وجہی پر سلو کا دباؤ

II, نزف دماغی

III, تلین دماغ

لقوہ فوق المرکز :-

I, مقدم دماغ کی سطح یا کیس باطن میں فتور واقع ہونا

II, سلو دماغ

III, تلین دماغ

IV, نزف دماغ

لقوہ تحت المرکز :-

I, فکین کے اعصاب میں خلط غلیظ کا اجتماع۔

II, عصب وجہی پر چوٹ لگنا۔

III, عصب وجہی کے پاس سلو ہونا

IV, برودت

لقوہ تشنجی:-

- I, غلبہ بیہوش
- II, جمی محرقة
- III, بعض امراض حادہ

لقوہ استرخانی:-

- I, غلبہ بردت
- II, قرح عظام الاذن
- III, بعض دماغی امراض
- IV, تامل الانسان
- V, درم اصل الاذن
- VI, آشک
- VII, کنج دہن کا مسترخی ہونا

علامات | مرض کے حملے سے دو، تین دن پہلے، کان کے نیچے گردن کے عضلات میں درد اور ذکاوت حس ہوتی ہے۔ بعض اوقات غدہ کفیفہ میں التهابی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یا سیلان الاذن کی شکایت موقوف ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں مدیر سیلان کا دباؤ عصب کی طرف ہو جاتا ہے اور یہ التهاب بڑھتے بڑھتے عصب تک محیط ہو جاتا ہے اور عصب قفل ہو جاتا ہے، مشلول جانب کے عضلات مسترخی ہو جاتے ہیں اور چہرے کے حرکات میں کوئی حصہ نہیں لیتے، منہ کا زاویہ اور ابرو نیچے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پیشانی کا نصف حصہ بالکل مسلط ہو جاتا ہے، آنکھ کے زیریں پوٹے میں استرخاء ہو جاتا ہے، اور آنکھ بند کرنے کی کوشش میں اوپر کا پوٹہ نیچے گر پڑتا ہے تاہم دونوں پوٹے آپس میں نہیں ملتے اور آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، نیند کی حالت میں بھی ہیبت ہوتی ہے، پانی نوش کرتے وقت متاثر جانب سے پانی باہر گر رہتا ہے، پھونک مارنے اور گالوں کو اچھی طرح پھلا سکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھاتے وقت، کھانا دانتوں اور گالوں کے درمیان جمع ہو جاتا ہے۔

عصب عظم الصدغ کے متاثر ہونے کی صورت میں زبان کے نوک والے حصے کی دہائی

حسِ ذائقہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔ عصبِ وجہی کے کسی اور مقام پر ماؤف ہونے کی صورت میں حسِ ذائقہ میں بطلان نہیں آتا تاہم طین کی شکایت ہوتی ہے۔

عصبِ رشاخہ کے حرکتی حصہ کے شل ہو جانے کی صورت میں احساسات طبعی حالت میں رہتے ہیں۔ اگر ایک جانب ماؤف ہو تو چبلنے اور نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تاہم صحت مند جانب کے بیرونی عضلہ جناحیہ [External Pterygoid Muscle] کے انقباض کے نتیجے میں منہ کھولتے وقت، وہ ماؤف حصہ کی طرف کھینچ جاتا ہے اور منہ کو زور سے بند کرنے کی سعی میں عضلہ مفیوہ اور عضلہ مدغیہ سخت نہیں ہوتے، اسی طرح منہ کو زور سے کھولنے کی سعی میں ماؤف جانب زیریں سطح سخت نہیں ہوتی۔

عصبِ رشاخہ کے حقیقی حصہ کے شل ہو جانے کی صورت میں چہرہ، آنکھ اور زبان بے حس ہو جاتی ہیں، چنانچہ مریض پانی پیتے وقت گلاس ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونٹ کے نصف حصہ میں قوت حس ہوتی ہے اور نصف حصہ کی قوت حس زائل ہو جاتی ہے۔ زبان کے نصف حصہ کی حس ذائقہ بھی متاثر ہوتی ہے، آنکھ میں کسی چیز کے پڑ جانے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔

لقوہ علی مرکز کی صورت میں ماؤف جانب کے عضلات میں ہرالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لقوہ فوق مرکز کی صورت میں مریض آنکھ بند کر سکتا ہے، ہنسنے اور رونے سے متاثر جانب حرکت ہوتی ہے، تاہم کھانا چبانے اور گفتگو کرنے میں حرکت نہیں ہوتی لقوہ تحت مرکز کی صورت میں چہرے کی طبعی ہیئت برقرار نہیں رہتی، متاثر جانب کا چہرہ صحت مند جانب کھینچ جاتا ہے، منہ کا ایک گوشہ زیریں جانب ٹھک جاتا ہے منہ سے رال بہتی ہے، ہونٹ کی مدد سے ادا ہو جانے والے حروف کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے، متاثر جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس سے پانی بہتا رہتا ہے۔

لقوہ تشنجی کی صورت میں حواس میں تکدر نہیں ہوتا۔ منہ کے عضلات کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ متاثرہ حصہ کی جانب پیشانی میں صلابت، تناؤ اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ جس کے سبب اس طرف کی پیشانی کے خطوط اور شکنیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف سر اور گردن کے اطراف میں سلوٹس نمایاں ہوتی ہیں، شدید درد ہوتا ہے، چہرے کے عضلات میں عارضی تشنج اور تجاجی کی شکایت ہوتی ہے اور اعراض نفاذیہ نیز اختیاری

حکامات سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت بوڑھوں میں کثیر الوقوع ہے۔ اور مشکل علاج پذیر ہے۔ لہٰذا استرخانی میں جو اس کند اور کند رہتے ہیں، متاثر جانب کے عضلات میں استرخاء ہوتا ہے۔

اصول علاج ————— ہ، ے دن تک مروت، ماء الاصول اور ماء العسل نوش کرائیں۔
پانچویں یا آٹھویں دن منفعہ دیں اور فالج کا اصول علاج اختیار کریں۔

— اگر ایسی علامات رونما ہو رہی ہوں، جو فالج یا سکتہ کا تقدمہ قرار پائیں، تو قوی مسہل سے مواد کا تنقیہ کریں۔
— فردرت کے مطابق غرغره، تنکید اور چھینک لانے والی دوائیں استعمال کرائیں۔
— تعلیق کرائیں۔

علاج ————— جب تک چوتھا یا ساتواں دن نہ گزر جائے، ماء الاصول اور ماء العسل کے سوا کوئی اور چیز استعمال نہ کرائیں۔
پانچویں یا آٹھویں دن مندرجہ ذیل منفعہ استعمال کرائیں۔
نسخہ منفعہ:-

بادیان، بیج بادیان، بیج کرفس، پر سیاوشاں، تخم خطمی، تخم خبازی، ہر ایک ۷ گرام،
اسطوخودوس، اصل السوس، ہر ایک ۵ گرام، مومیر منقی ۹ دانہ، انجیر زرد ۵ دانہ، جملہ دواؤں کو گرم پانی میں رات میں بھگو کر، صبح کو مل چھان کر غمیرہ بنشتہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں،
آٹھ دن تک یہ منفعہ پلا کر دسویں دن اسی نسخہ میں درج ذیل ادویہ کا اضافہ کر کے بطور مسہل نوش کرائیں۔
نسخہ مسہل:-

سنا، مکی، تربد سفید، ہر ایک ۷ گرام، ان دواؤں کو بھی بھگو دیں اور صبح کو مغز فلووس
خیار شنبہ ۶ گرام، تربد مجین، کلقتہ، شکر سرخ، شیر خشت ہر ایک ۸ گرام شامل کر کے تیرہ
مغز بادام تیرہ ۵ گرام کے ہمراہ نوش کرائیں۔ اگلے دن نسخہ تیرہ استعمال کرائیں۔
اس کے بعد پانچ دن تک نسخہ منفعہ مزید استعمال کرائیں، پھر بغیر مغز فلووس خیار شنبہ اور
مغز بادام کے، حب ایارج ۹ گرام کے دو مسہل دیں۔ اور اس کے بعد روغن سرخ،

روغن خشخاش یا روغن موم کی مالش کریں۔

— دماغی رطوبتوں کے اخراج کے لیے کباب چینی، عاقرقرا، دارچینی، جوزبوا وغیرہ جلنے کی ہدایت کریں — یا مذکورہ دواؤں میں فلفل سیاہ، خردل اور نوشادر کا اضافہ کر کے باریک سفوف بنالیں اور زبان پر ملیں اور جوزبوا ثابت ہمہ وقت زبان پر رکھیں۔

— کلونجی پیس کر سرکہ میں ملا کر ناک میں ٹپکائیں

— درج ذیل طلا، استعمال کرائیں۔

نسخہ طلا :-

خردل کو روغن زیتون یا روغن کنجد میں پیس کر چہرہ کی ماء ف جانب طلا کریں۔

— درج ذیل روغن لقوقہ سے مالش کریں۔

روغن لقوقہ :-

موم سفید ۲ گرام، روغن بید انجیر ۳۹ ملی لیٹر میں پگھلا کر فریون، معطکی، سورنجان تلخ، جند بیدستر، ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو باریک پیس کر اس پگھلائے ہوئے حصہ میں ملا دیں اور متاثرہ حصہ کی اس سے مالش کریں۔

اطباء کرام مندرجہ ذیل نسخہ غرغره بھی مفید تصور کرتے ہیں۔

نسخہ غرغره :-

مرزنجوش، صعتر، خردل، پوست بیج کبر، زنجبیل، عاقرقرا، انار دانه ترش، ہموزن، جملہ دواؤں کو کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور سنگبین غصلی ۸ ملی لیٹر ملا کر غرغره کرائیں۔

— کندرش کو باریک پیس کر ناک میں پھونکیں

— درج ذیل نسخہ دوا المسک حار مفید ہے۔

نسخہ دوا المسک حار :-

مشک خالص، جند بیدستر ہر ایک ۳ گرام، بہمنین، سنبل الطیب، قنفط، قاقہ، سادج ہندی، ہر ایک ۷ گرام، بسرہ سرخ، زرنبا، ایریشم مقرض، سروارید ناسفتہ، کبریا شمع ہر ایک ۹ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر، تین حصہ شہد خالص کے ساتھ معجون بنائیں اور ۳-۴ گرام استعمال کرائیں۔


خدر

ANESTHESIA

اس مرض میں سبب کی قوت و ضعف کے مطابق عضو کی حس میں فتور یا بطلان واقع ہو جاتا ہے اور حرکت بھی احوال طبعی سے پھر جاتی ہے اور بغیر درد کے چیونٹیاں ریگنے اور سوئیاں چھینے جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اقام

اسباب کے اعتبار سے اس کی مندرجہ ذیل اقسام ہو سکتی ہیں:



اسباب

- I, عصبی دباؤ (مثلاً کسر، خلع وغیرہ)
- II, ہیپوسٹ اعصاب
- III, بروڈت اعصاب
- IV, غلیظ خلط کا غلبہ
- V, امتلاء دموئی
- VI, تنگی اعصاب
- VII, سرد یا گرم سمیات
- VIII, قوت حیوانی کا ضعف

٭٭٭ راج
٭٭٭ سود مزاج اعصاب
٭٭٭ بلغمی / دموی سدہ

علامات | عصبی دباؤ کی صورت میں اس کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں جو سرد صورت میں بارہ علامتیں ملتی ہیں، سود مزاج میں اعصاب کثیف اور سخت ہوتے ہیں۔ سدہ بلغمی میں بدن ڈھیلا ہوتا ہے، جسم کارنگ سفید اور حواس کند ہوتے ہیں، استلاء دموی میں، جسم میں غلبہ خون کی مخصوص علامتیں موجود ہوتی ہیں۔

بحیثیت مجموعی، جس عضو میں خدر واقع ہوتا ہے، اس کے عضلات ریشوں میں کبھی گدگدی سی محسوس ہوتی ہے اور کبھی حرارت اور برودت کا احساس کم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قوت حس اس قدر متاثر ہو جاتی ہے کہ مقام ماذن کو قطع کر دینے پر بھی درد وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا اور بعض اوقات عضو میں چوڑیاں سی رہتی محسوس ہوتی ہیں۔

اصول علاج | — برودت کی صورت میں گرم روغنیات سے مالش کریں۔
— مادہ بلغمی کے غلبہ کی صورت میں فالج کے ذیل میں مذکور منفع مسہل اور اس کے بعد تقویت کی تدابیر اختیار کریں۔

— استلاء دموی میں فصد کھولیں۔

علامت | — غلبہ برودت میں گرم روغنیات مثلاً روغن شوفیز یا روغن قسط کی مالش کریں۔ — یا گرم فساد مثلاً کانچھل کو پس کر سرکہ میں ملا کر متاثر عضو پر لگوائیں۔
— روغن تلخ میں ماقرقرا، جالفل، زنجبیل، خردل، قسط، ہم وزن جلا کر اس سے مالش کریں۔
— اگر مرض کا سبب مادہ بلغمی ہو تو فالج کے ذیل میں مذکور منفع مسہل استعمال کریں اور تنقیہ کے بعد معجون فلاسفہ یا معجون اذراقی استعمال کریں، جب کچلہ بھی مفید ہے۔

— استلاء دم کی صورت میں فصد اور تقلیل غذا کی تدابیر اختیار کریں

— درج ذیل نسخہ، خدر بلغمی اور سودادی میں مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ:-

در روغن عقرنی، زرنہاد، مصطکی ردی، ابریشم مقرر، بوزیران، کاؤڈ زبان، قاقہ صغار،

تخم بادرنجبویہ، ہر ایک ۳ گرام، جدوار خطائی، عود مغربی ہر ایک ۱ گرام، سلیخہ، دارچینی، سنبل الطیب، برگ فرنجشک، عود صلیب، ہر ایک ۲ گرام، بہمن سفید، بہمن سرخ ہر ایک ۶ گرام، سورنجان شیریں ۴ گرام، جلد دواؤں کو کوٹ چھان کر، سموزن مصری ملا کر سفوف بنائیں اور کسی مناسب بدرقہ کے ہمراہ ۶ گرام کھلائیں۔
— مندرجہ ذیل نسخہ خدر سودادی میں مجرب ہے۔
نسخہ:-

چرائتہ، شاہترہ، آملہ، قلقل سیاہ، پوست ہلیلہ زرد، گلہو، ہبز، پوست ہلیلہ ہر ایک ۲۵ گرام، جلد دواؤں کو کوٹ کر، تھوڑی سی دوا پوٹلی میں باندھیں اور رات کو پانی میں ڈال دیں، صبح کو پانی پھینک دیں اور پوٹلی کی دواؤں کو دوسرے صاف پانی میں پس کر چھان لیں اور قلقل سیاہ اگر ۱۰ پیس کر اس پر چھڑکیں اور نوش کر لیں، ۱۰ یوم تک یہ نسخہ استعمال کر لیں۔

— مرارہ گاڈ، روغن کنجد، سموزن ملا کر حسب ضرورت کھلائیں۔
— اگر مرض کے سبب کی تعین نہ ہو پا رہی ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کر لیں۔
نسخہ:-

ابتداء میں معجون خدر ۷ گرام کھلائیں اور اس کے بعد ہلیلہ سیاہ، مشبہ مغربی، سرچھوکر، منڈی، چرائتہ، شاہترہ، ہر ایک ۵ گرام، عناب ۵ دانہ جلد دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت عناب ۲۸ ملی لیٹر ملا کر نوش کر لیں۔
— عاقرقہ ۱۲ گرام، شراب ۱۲ ملی لیٹر میں پس کر فساد کریں۔

تشنج


CONVULSION

اس مرض میں ارادی عضلات، غیر اختیاری طور پر اپنے مبادی کی طرف، شدت کے ساتھ منقبض ہوتے ہیں۔ جس سے متعلقہ عضلوں غیر معتاد حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور


وہ عضو ٹٹھا ہو جاتا ہے یا کسی طرف پھرتا ہے۔ ساتھ ہی مریض کو کسی قدر بے ہوشی بھی ہوتی ہے
 _____ ملحوظ رہے کہ تشیخ بذات خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ بعض امراض میں عرض کے طور پر
 واقع ہوتا ہے۔

اقسام

(۱) نوعیت انقباض کے اعتبار سے



(ب) اسباب کے اعتبار سے



اسباب

دماغ و اعصاب:-

- | | |
|-----|-------------------------------|
| I | صدمہ |
| II | دماغ پر چوٹ لگنا |
| III | دماغ میں خون کی زیادتی یا کمی |
| IV | التهاب اغشیہ دماغ |
| V | ضربۃ الشمس |
| VI | مرع |

- VII, کزاز
 VIII, سکتہ
 IX, سلو دماغ
 X, ضعف قوت دماغ
 XI, بیہوشی دماغ
 XII, آتشک دماغ
 XIII, طیریا دماغی
 XIV, تلمین دماغ
 XV, ترنزع دماغ
 XVI, التهاب اعصاب
 XVII, غلیظ بلغمی مادہ کا اعصاب کے فرج (خلل) میں نفوذ کرنا
 XVIII, بیہوشی اعصاب
 XIX, اعصاب کا نامکمل طور پر کٹ جانا / داخلی و خارجی طور پر ایندھنچنا
 XX, اعصاب و عضلات میں استلاء
 XXI, سرسام
 XXII, شلل عمومی
 XXIII, ضعف اعصاب
 XXIV, فالج الاطفال
 امراض قلب :-
 I, پیدائشی امراض قلب
 امراض معرہ و امعاء :-
 I, دیدان امعاء
 II, اسہال
 III, ہیضمہ
 IV, سوء ہضم

IV, درد قویج

V, قبض

امراض کلیه و مثانه :-

I, سمیت بول

II, حصاة مثانه

امراض اعضاء تناسل :-

I, فسیق غلفه

II, جلق

III, کثرت مباشرت

IV, اختناق الرحم

V, فتور حیض و نفاس

VI, ایام حمل

VII, درم رحم

امراض اذن وOLF و اسنان :-

I, التهاب جوبه

II, بعض امراض دندان

III, پچوں میں دانت نکالنا

IV, رعاف

حاد/متعدی امراض :-

I, حمی محرقه

II, جدری

III, حصیه

IV, آتشک مولودی

V, حمی اجامیه

VI, شہیقہ

ادویات/سمیات :-

I,	ایون
II,	شوکران
III,	تسم الکوحل
IV,	تسم کچلہ
V,	ہوام گزیدگی

الفعالات نفسانیہ :-

I,	غصہ ورنج
II,	تعب
III,	دفعاً ڈر جانا
IV,	کثرت بیداری
V,	کثرت مطالعہ

متفرقات :-

I,	شدید سردی لگنا
II,	شدید استفراغ
III,	بھوکا رہنا
IV,	غدرہ تیموریہ کا تفرغ
V,	قلت الدم (خون کی کمی)
VI,	کساح
VII,	جنون
VIII,	نقص تغذیہ
IX,	تشنج جنجہ
X,	اعفاء میں اذیت و خراش
XI,	انسداد شریکین
XII,	انجاد خون عروق

XXIII، خون میں صفراء اور بخارات دغانیہ کی زیادتی

علامات

(۱) عمومی :-

تشیح میں عام طور سے تمام جسم، چہرہ، گردن، بازو، کمر اور اطراف، یکساں طور پر متاثر ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جسم کا پہلوی حصہ ہی متاثر ہوتا ہے، دورہ کے یک بیک شروع ہونے کی صورت میں مریض (اگر کھڑا ہو تو) گر پڑتا ہے، قدم سے بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، جسمانی اعضاء کے عضلات جلد جلد اینٹھتے ہیں، چہرہ بدیدیت ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ نیلگوں یا سیاہ ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ خارج ہوتی ہے اور اگر زبان دانتوں میں اگئی ہو تو جھاگ خوں آلود ہوتی ہے، آنکھیں پھر جاتی ہیں اور ڈھیلے اوپر کی طرف گھوم جاتے ہیں، پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور روشنی سے غیر متاثر ہوتی ہیں، منہ کے شدت سے بند ہو جانے کی وجہ سے سانس تکلیف سے آتی ہے اور کسی قدر خراشا شامل ہوتا ہے۔ عضلات تنفس کے تشیح کی صورت میں چہرہ اور گردن میں احتقان الدم ہوتا ہے، تشیحی حرکات جو عموماً ارتجاجی ہوتی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، عضلات میں صلابت آجاتی ہے اور صلابت کی زیادتی پر ہی حرکات کے دائرہ کی کمی منحصر ہوتی ہے، چنانچہ شدید صلابت کی صورت میں تشیح استمراری/ثابت/متواتر ہوتا ہے۔ جسم کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے، بول و براز غیر اختیاری طور پر خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت کچھ دیر تک ہی قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد اطراف ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور سبکی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر مریض ہوش میں آجاتا ہے، تاہم جسم کے تمام احساسات کند ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہی اعتدال پڑتے ہیں۔ بعض اوقات دورے کے بعد مریض بہت برا فروختہ ہوتا ہے اور یہ کیفیت گھنٹوں برقرار رہتی ہے۔ ابتدا میں تشیحی نوبت جلد آتی اور جلد ہی رفع ہو جاتی ہے مگر بعد میں دورے جلد جلد پڑتے ہیں اور تشیحی حالت دیر تک قائم رہتی ہے۔ دوروں کے جلد جلد پڑنے اور دیر تک قائم رہنے کو ردی تصور کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جسمانی درجہ حرارت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔

(بہ مجموعی :-)

تشخیص ارتجاجی / اضطرابی :-

اس میں عضلات بار بار سکڑتے اور پھیلتے ہیں ۔

تشخیص استمراری / ثابت :-

اس میں عضلات دیر تک اور مسلسل منقبض رہتے ہیں ، جس کے نتیجے میں متعلقہ اعضاء اینٹھ جاتے ہیں اور اسی حالت پر دیر تک قائم رہتے ہیں ۔

تشخیص امتلائی / رطوبتی :-

تشخیص فوراً پیدا ہوتا ہے اور امتلاء مواد کی علامتیں موجود ہوتی ہیں ، مثلاً ثقل اور حرکات میں سستی ہوتی ہے بدن اور اعصاب میں استرخائی کیفیت ہوتی ہے ، پیشاب میں سفیدی اور غلاظت ہوتی ہے ، پیاس میں کمی اور نیند کی زیادتی ہوتی ہے ، جلد میں تناؤ ہوتا ہے اور چھونے میں نرم و مرد محسوس ہوتی ہے ، نبض ممتلی چلتی ہے — آغاز مرض سے قبل بلغم پیدا کرنے والی تدابیر گندہ چکی ہوتی ہیں ۔

تشخیص بسمی / استفراغی :-

تشخیصی علامات بتدریج نمایاں ہوتی ہیں اور یہ بوسست پیدا کرنے والی تدابیر کی روئیدار ملتی ہے جیسے استفراغات ، ریاضت کی زیادتی ، طویل بیداری ، شدید بھوک اور جھجھک و غیرہ ، عضولانغز اور پتلا ہوتا ہے — اطباء کے یہاں تشخیص کی یہ نوع لاعلاج تصور کی جاتی ہے ۔ بعض اطباء کے بقول بچوں اور جوانوں میں یہ نوع کسی قدر علاج پذیر ہے ۔

تشخیص درمی / ریجی :-

متاثر عصب میں التہابی کیفیت ہوتی ہے درد اور تناؤ ہوتا ہے ۔

تشخیص ایندائی / اشتراکی :-

قطع عصب کی صورت میں ، اس کی روئیدار ملتی ہے تیز ، اکال اور گرم اخلاط کی صورت میں متاثر حصہ میں سوزش اور خارش کے ساتھ درد ہوتا ہے ، ہوام گزیدگی کی صورت میں اس کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں ۔ معده سے مشارکت کی صورت میں متلی ، بے قراری اور سوزش معده کی علامات سابقہ کی سرگزشت ملتی ہے ، بعض اوقات عضالبول کی بھی شکایت ہوتی ہے ۔ پیشاب خونا ب اور جھاگدار خارج ہوتا ہے ،

بے خوابی، درد، فواق، ریشہ اور گردن، شانہ اور کمر میں درد ہوتا ہے۔
حمیات حادہ اور مزمن امراض کی صورت میں چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے فزع
فی النوم ہوتا ہے۔ زبان سیاہ، پیشانی اور سر کی جلد میں تناؤ ہوتا ہے۔ ابتدا میں پیشاب
سرخ اور بعد میں سفید ہوتا ہے، دانت کھٹکتے ہیں۔
قسم بول میں شدید درد سر ہوتا ہے، فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ قلب کی تضییع ہوتی ہے
پیشاب میں زلال خارج ہوتا ہے۔ قلت الدم کی شکایت ہوتی ہے اور تشنجی دورے کے
بعد بھی مریض بے ہوش رہتا ہے۔

سوزش دماغ کی صورت میں تشنج کے علاوہ دیگر علامات مخصوصہ بھی موجود ہوتی
ہیں اور عصب بصری میں درد کی بھی علامات موجود ہوں تو تشخیص نہایت آسان ہو جاتی
ہے، خراج اور سلوہ دماغیہ میں اگرچہ عام طور سے تشنج نہیں ہوتا، پھر بھی بعض اوقات
تشنج کے دورے دماغ کی غیر طبعی حالت کاپتہ چلتا ہے اور تشنج کے بعد شدید درد سر
ہوتا ہے جو بہت دیر تک قائم رہتا ہے، ہر سام کی صورت میں دماغی افعال میں کسی
نذر نقص ہوتا ہے، آنکھیں بھیگی اور اعضا مسترخ ہو جاتے ہیں، نبض غیر منتظم چلتی ہے
سدہ قلب کی صورت میں نبض کی رفتار اعتدال سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ دماغ میں
خون کی کمی کے باعث بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔
یہ صورت زیادہ عمر والوں میں کثیر الوقوع ہے، چنانچہ پہلے دورے پر مسکنہ کا گمان ہوتا ہے،
لیکن دورہ ختم ہونے پر کسی قسم کا شل یا استرخا باقی نہیں رہتا۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عام طور سے جوانوں میں تشنج سے موت واقع نہیں ہوتی، تاہم
دماغی اور کلیوی امراض کی موجودگی میں انجام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔

اصول علاج | مریض کو پشت کے بل سیدھا لٹائیں اور سر اور شانوں کو کسی قدر
اونچا کر دیں۔

- گلوبند یا سینہ بند یا تنگ لباس ہو تو اس کو ڈھیلا کر دیں۔
- دافع تشنج اور منوم ادویہ نگھائیں
- تشنج اعضا کی ہلکی مالش کریں۔
- سارے جسم میں تشنج کی صورت میں ایک مرتبہ آب سرد میں آبیزن کرنا سودمند ہے۔

اس بابت ملحوظ رکھیں کہ مریض جوان اور نحیم ہو، موسم تابستانی نیز جسم پر کسی طرح کا زخم وغیرہ نہ ہو۔

— بصورت دیگر آب گندھک اور جوشاندہ روہاہ میں آبرزن کرائیں۔

— حقنہ، حقہ یا کسی اور طریقے سے جسم کا تنقیہ کریں۔

— اعتلا، خون یا شراب کی صورت میں مریض کے قوی کی رعایت سے فصد کھولیں۔

— تشنج رطب کی صورت میں ماء الاصول اور ایارج فیترا وغیرہ سے بدن کا تنقیہ علاج کریں۔

— نفع مادہ کے لیے ماء الاصول، ہمراہ گلقد صبح کو نوش کرائیں۔

— تنقیہ کے بعد روغن قسط، روغن جنبیلی اور روغن سداب کی مالش کریں، اس میں فریون، جندبیدستر اور عاقرقما کا اضافہ سودمند تصور کیا جاتا ہے۔

— تشنج یا بس کی صورت میں متشج عضویٰ کی تربیب کی تدابیر اختیار کریں مثلاً گدھی، بکری وغیرہ کا دودھ پلائیں، ماء البشیر، لعاب بہداز، روغن کدو، روغن بادام شیریں، شربت نیلو فرادر شربت بنفشہ نوش کرائیں۔

— بنفشہ، برگ کاہو، جو مقشر، برگ خلمی، برگ بیدر سادہ، برگ کدو اور نیلو فر کے جوشاندہ سے نطول کریں۔

— روغن بنفشہ، مرغ کی چربی، موم سفید، گائے کی پنڈلی کا گودہ، شیر زن میں گھینپ کر رکھیں۔

— خلمی، آرد جو، لعاب اسپغول، بنفشہ خشک کو ہمراہ روغن (مناسب) ملا کر لگائیں۔

— تشنج کی وجہ سے دوا لینا دشوار ہو تو درج ذیل ادویہ کا حقنہ دیں۔

نسخہ حقنہ:-

صابون ۳ گرام، کستر کر نمک طعام ۳ گرام، دولیٹ پانی میں حل کر کے روغن بیدر انجیر

۴۸ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے حقنہ کریں۔

— بلغم کی صورت میں نفع مسہل اور تنقیہ وغیرہ تدابیر استعمال کرنے کے بعد عاقرقما،

جاو شیر حلتیت، جندبیدستر، قلمفل سیاہ، قسط شیریں، ہر ایک ۳ گرام، جلد دواؤں کو کوٹ

چھان کر خمد میں ملا کر چنے برابر گولیاں بنائیں اور ۳، ۳ گولیاں صبح، شام کھلائیں۔

- جند بیدستر، حلیت ۵۰۰ ملی گرام، پیس کر شہد میں ملا کر صبح، شام چٹائیں
- اکاس بیل کو روغن کنجد اور پانی میں پکا کر گرم گرم، عضو پر باندھیں۔
- موم سفید ۱۲ گرام، ردغن سوسن ۶۰ ملی لیٹر میں پگھلا کر زیتون ۶ گرام، جند بیدستر ۱ گرام، باریک پیس کر ملائیں اور موم سا بند ۶ گرام کا اضافہ کر کے متاثرہ عضو پر لپیپ کریں۔
- نسخہ درج ذیل معجون تشیخ کی بیشتر اقسام میں مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ معجون :-
جائفل، دارچینی، عود غرقی، ببار، زنجبیل، سعد کوفی، اسطوخودوس، بادرنجبویہ، سنبل الطیب، ہر ایک ۳ گرام، مغز بادام، مغز ناریل، ہر ایک ۵ گرام، تریاق حب الغراب ۱۸ گرام جلد دواؤں کو پیس کر تین گناہ شہد ملا کر معجون بنائیں اور صبح، شام ۶، ۶ گرام نوش کرائیں۔


- جند بیدستر، عود صلیب، جدوار اور مشک وغیرہ کھلائیں۔
- مہلات کے بعد تقویت کے لیے قرص مرجان جواہر والا عدد، خیرہ گاؤزیاں جواہر والا ۷ گرام میں ملا کر صبح کو کھلائیں اور شام کو خیرہ ابوشم حکیم ارشد والا ۵ گرام، قرص اعظم العدد میں ملا کر کھلائیں۔

رعشہ

TREMOR

اس مرض میں عضو تعیش کی قوت محرکہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے مرکب اعضاء کے ایک یا دونوں جانب کے اختیاری عضلات میں غیر اختیاری اور غیر منظم حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔

اقام



اسباب

۱۔ اس کے تین بنیادی اسباب ہیں

۱۔ ضعف قوت محرکہ

۲۔ ضعف آلہ حرکت

۳۔ ضعف قوت محرکہ و ضعف آلہ حرکت

۲۔ نظامی امراض بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں
امراض براس :-

۱۔ ضعف اعصاب

۲۔ سلوہ دماغ

۳۔ شلل نصفی

۴۔ داء الرقص

۵۔ اختلاج الحركت موردنی

۶۔ مقدم دموخردماغ کے بعض امراض

۷۔ سدة اعصاب

۸۔ اعصاب کا سود مزاج بارد

۹۔ یبوست اعصاب / احتراق

اخلاط :-

۱۔ لیسدار غلیظ اخلاط

امراض اعصاب تناسل :-

۱۔ کثرت جماع

۲۔ ابتلاء شکم کی حالت میں جماع کرنا

۳۔ تسم بول

بہمیات :-

۱۔ کثرت سے نوشی

- II, کونین کا بکثرت استعمال
 III, ہوام گزیدگی
 IV, تمباکو نوشی
 V, افیون خوردنی
 نفسانی انفعالات :-
 I, غم و غمہ
 II, فرحت و مسرت
 III, شدید اندامت
 IV, صدمہ
 مستفرقات :-
 I, تعصب منتشر
 II, غلبہ برد و دت
 III, بیجان و بے قراری
 IV, شدید امراض کے بعد نقاہت
 V, غوطہ
 VI, حمیات عادہ
 VII, اختناق الرحم
 VIII, مشاغ کے بدن میں غیر معمولی ضعف
 IX, استفراغ
 X, اخراج اخلاط
 XI, سوء القنیہ
 XII, ورجع المفصل
 XIII, دیدان امعاء
 XIV, ایام کی بے اعتدالی
 XV, پہلی بار حمل قرار پانا

(XVI) بے وقت اور بکثرت پانی پینا

مشاعر عضو میں غیر اختیاری پھر کس ہوتی ہے اور وہ اپنی کارکردگی پوری طرح **علامات** انجام نہیں دے پاتا۔ ملحوظ رہے کہ ہر مریض میں رعشہ کے وقت، اس کی مقدار اور اس کی عام کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات رعشہ بالکل ناچیز اور خفیف ہوتا ہے اور بعض اوقات اس قدر زیادہ کی اس کی موجودگی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، نیز کبھی اس کی غیر اختیاری حرکات منظم ہوتی ہیں اور کبھی بالکل بے قاعدہ۔

یہ مرض یک بیک اور رفتہ رفتہ شروع ہو سکتا ہے، مرضی علامات رونما ہونے سے قبل جسمانی اور ذہنی حالت متغیر ہو جاتی ہے، مزاج میں جڑ چڑا پن آ جاتا ہے۔ مرض کی خفیف صورت میں ہاتھ سے چیز کے گر جانے، چلنے میں قدم ڈگمگانے اور کسی چیز کے اٹھاتے وقت ہاتھوں کے کانپنے جیسی شکایات ہوتی ہیں، حادث صورت میں پہرہ بازو اور پیروں کے عضلات میں غیر منظم حرکات ہوتی ہیں ہاتھ میں بھی شدید کپکپی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر پینا دشوار ہو جاتا ہے، بعض اوقات پورا یا نصف جسم ہلتا ہے۔ عصب کے سو، مزاج بار دیا نامکمل سترہ کی صورت میں ان کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔ سو، مزاج یا بس یا بیہوش کی تدابیر کی صورت میں بیہوشی پیدا کرنے والا سبب گذر چکا ہوگا۔ نیز رعشہ والا عضو اور عضلہ لاغر ہو جاتا ہے اور روغنیات کو بہت جلد جذب کر لیتا ہے۔

خفیف رعشہ میں عضلات کے انقباض کا تناسب بالعموم ایک سکند میں نو (۱۱) ہوتا ہے، یہ رعشہ عموماً اطراف میں پایا جاتا ہے لیکن پیری میں اور لیٹرنس کے بعد گردن اور سر میں بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب مریض کوئی اختیاری حرکت کرتا ہے اور کبھی مکمل استراحت کے باوجود ہوتا رہتا ہے، نیند کی حالت میں موقوف اور ہیجان میں زیادہ ہو جاتا ہے۔

پیدائشی اور موروثی رعشہ عام طور سے بچوں میں ہوتا ہے، اس میں اطراف، منہ اور زبان خاص طور سے متاثر ہوتی ہے، قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے رعشہ پر تھوڑی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

یشتر غس کے بعد ریشہ خفیف، اهتزازی اور خشن و منظم، ہر دو طرح کا ہوتا ہے، شدید صورت میں حالت خواب میں ریشہ ہوتا ہے نیز حرکت کرنے اور ہیجان کی صورت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ریشہ کے ساتھ ضعف عضلات، پہرے سے بے کیفی، فساد حس، مردہ پسینہ آنے اور رک رک کر چلنے جیسی علامات موجود ہوتی ہیں۔

عظم غدہ درقیہ کی صورت میں ریشہ دقیق، سریع اور ریاضت کے وقت ہوتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں اور بازو کو پھیلانے پر، انگلیوں میں خفیف ریشہ نظر آتا ہے تاہم ہاتھ اور بازو پر اکثر ریشہ نہیں ہوتا، ہیجان کے وقت ریشہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، دیگر علامات مثلاً عظم غدہ درقیہ، غوطہ جھوٹی اور نوبتی خفقان، وغیرہ پائی جاتی ہیں، لاغری بھی ہوتی ہے۔

کثرت سے نوشی کی صورت میں صبح کے وقت ریشہ زیادہ ہوتا ہے نیز بے خوابی، اضطراب، نہار منہ قے، غم معده پر درد، فساد حس اور عضلات اور دماغی قوتوں میں ضعف کی شکایت ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

تعلب دماغی نخاعی Cerebro-Spinal Sclerosis	ریشہ Tremor
۱۔ نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔	۱۔ بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔
۲۔ حرکات ارادی اختیار سے باہر ہوتی ہیں	۲۔ حرکات ارادی میں بالعموم اختیار ہوتا ہے تاہم عدم نظم کی شکایت ہوتی ہے۔
۳۔ انقباض و تری زیادہ ہوتا ہے۔	۳۔ انقباض و تری، طبعی ہوتا ہے۔
۴۔ سکون کی حالت میں ریشہ نہیں ہوتا۔	۴۔ بحالت سکون اور دوران نیند بھی بعض اوقات ریشہ ہوتا ہے۔
۵۔ دونوں جانب یکساں ماؤٹ ہوتی ہیں۔	۵۔ دونوں جانب یکساں ماؤٹ نہیں ہوتی بلکہ بالعموم ایک جانب محدود علامات ہوتی ہیں۔
۶۔ حرکات کی رفتار یکساں ہوتی ہے۔	۶۔ حرکات غیر منظم اور جلد جلد متغیر ہوتی ہیں۔

اصول علاج | — سو مزاج سرد و غیرہ کی صورت میں ان کے ازالہ و تبدیل کی تدابیر اختیار کریں۔

- اعراض نفسانی کی صورت میں تسکین نفس کا سامان کریں
- بیہوشی کی صورت میں ترطیبی تدابیر اختیار کریں
- شراب نوشی اور جماع کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں
- دیگر اصول، لقوہ اور فالج جیسے ہی ہیں۔

(سو مزاج بارد)

علاج | — غلبہ برودت کی صورت میں حلیت، عاقر قرحا، جنبدید متزہر ایک

۳ گرام، جملہ دواؤں کو پیس کر روغن زیتون میں حل کر کے عفو متعش پر مالش کریں۔

— غلبہ خلط بارد کی صورت میں نفع مادہ کے بعد حب قویا سے تنقیہ کریں اور اس کے بعد تقویت کے لیے معجون فلاسفہ ۵ گرام، معجون اذراقی ۳ گرام، دواء المسک حار ۴ گرام، میں ملا کر استعمال کرائیں۔

— کثرت جماع و مے نوشی کی صورت میں کشتہ کلاں ۲۰ ملی گرام، لبوب کبیر، دواء المسک معتدل جواہر والی ۵ گرام کے ہمراہ صبح کو استعمال کرائیں، شام کو کشتہ مرجان، ۲۰ ملی گرام ہمراہ خمیرہ گاؤز باں عنبری جواہر والا ۵ گرام کھلائیں۔

— تازہ جوز کھلائیں۔

— تریاق کبیرہ ۹ گرام ایک دن میں چند مرتبہ کھلائیں۔

— سو مزاج سادہ اور سو مزاج استلائی میں روغن قسط اور روغن زنبق کی مالش کریں۔

رتاح

CHOREA

اس مرض میں ارادی حرکات، غیر ارادی حرکات کے ساتھ مختلط ہو جاتی ہیں اور جسم کے ایک یا دونوں جانب کے اختیاری عضلات، بالخصوص ہاتھ، پیر اور چہرہ کے عضلات

میں بلا ارادہ غیر منظم حرکات واقع ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ غیر منظم حرکات کم و بیش ”رقص“ کی حرکات سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بیماری کا نام ”داء الرقص“ یا ”رقاص“ رکھا گیا ہے۔

ملحوظ رہے کہ اس مرض کی ماہیت هنوز نامعلوم ہے، تاہم اطباء کا خیال ہے کہ کوئی سمی، فاسد غلط دماغ میں جاگزیں ہو کر ترکیب دماغی میں کچھ ایسی غیر نمایاں خرابی پیدا کر دیتی ہے جس سے اس کے طبعی افعال میں فتور پیدا ہو جاتا ہے اور بظاہر دماغ میں التهاب یا اجتماع خون و تملب و تلیخین وغیرہ کی کوئی علامت بھی نظر نہیں آتی۔ — یہ مرض ۸-۱۶ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

- I, عصبی المروج ہونا
- II, اختناق الرحم
- III, ضعف دماغ
- IV, فرج راس،
- V, التهاب بطائر قلب
- VI, وجع المغاصل حار
- VII, حمیات متعدیہ
- VIII, دیدان امعاء
- IX, انفعالات نفسانیہ
- X, سوء القنیہ
- XI, حفظان صحت کے اصولوں کی عدم پابندی

علامات | ابتداء میں مریض مضطرب رہتا ہے اور ایک مقام پر ٹھک کر نہیں دیتا، ڈراڈرا اور خوفزدہ سا دکھائی دیتا ہے، چلنے پھرنے میں لڑکھڑاہٹ سی ہوتی ہے، پاؤں گھسنے میں، کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے، سوء ہضم کی شکایت ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، ہفتہ دس دن بعد مرض کی درج ذیل

خصوصی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

عام طور سے دائیں جانب کے عضلات بے قاعدگی سے جھٹکے کے ساتھ سکڑتے ہیں، یہ تشنجی حرکت عام طور سے جسم کے ایک ہی جانب تک محدود رہتی ہے لیکن بعض اوقات دونوں طرف کے عضلات میں بھی ہونے لگتی ہے۔ نیند کی حالت میں حرکتیں معدوم ہو جاتی ہیں، مریض کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے پر ان حرکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مریض ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہے۔

شدید حالات میں تمام غیر ارادی حرکات جلد جلد اور شدید تر ہو جاتی ہیں، چہرہ کے عضلات اور آنکھیں ادھر ادھر پھرتی ہیں، مریض دانت پیستا ہے اور بعض اوقات زبان دانتوں کے نیچے آکر کٹ جاتی ہے، گفتگو کرنا اور کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، بول و براز غلط ہونے لگتے ہیں، حرکات قلب اور تنفس میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور سے دو، ڈھائی ماہ تک رہتا ہے اور بیشتر مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے تو یہ مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے اور ۲، ۳ سال تک رہتا ہے، بعض اوقات یہ مرض از خود رفع ہو جاتا ہے تاہم اعادہ کے امکانات بہر حال رہتے ہیں۔

ملینات استعمال کرائیں۔

اصول علاج — دیدان امعاء کی صورت مخرج دیدان ادویہ استعمال کرائیں۔

مقویات کھلائیں

حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی لازمی طور پر کرائیں۔

علاج — سو، التقنیہ کی صورت میں سیرج البھم اور جید الکیموس، مقوی غذائیں کھلائیں۔

گندھک، شورپانی یا سمندر کے پانی سے غسل کرائیں

غلبہ برودت کی صورت میں سارے جسم پر، بالخصوص کانپنے والے اعضاء پر درج ذیل روغن کی مالش کریں۔

جندبیدستر، حلیت، ماقرقہ، ہر ایک ۳ گرام، ان کو روغن زیرتوں ۲۰ ملی لیٹر میں ملا کر مالش کریں — اور صبح کو جندبیدستر ۱ گرام، ماء العسل ۲۰ ملی لیٹر کے ساتھ نوش

کرائیں۔

— روغن سرخ کی مالش کریں۔

— تریاق کبیر ۳ گرام، دن میں ۳ بار استعمال کرائیں

— تازہ اخروٹ کھلائیں۔

— سنبل الطیب ۳ گرام، پانی ۳۰۰ ملی لیٹر میں ۳۲ گھنٹے تک بھگوئے رکھیں اس کے بعد

مل چھان کر ۲۵ ملی لیٹر، دن میں ۳ بار نوش کرائیں۔

— تقویت دماغ و اعصاب کے لیے معجون فلاسفہ یا حب اذراقی کھلائیں۔

اختلاج

TREMBLING

اس مرض میں عضلات میں غیر معتاد، عارضی، ارتجاسی (اضطرابی) حرکت پیدا ہو جاتی ہے جو جھٹکوں کی شکل میں ہوتی ہے اور بہت ہی سریع الزوال ہوتی ہے۔

اسباب

I, حسی اعصاب میں نقص پیدا ہو جانا

II, غیر حسی اعصاب میں مرض پیدا ہو جانا

III, مقدم دماغ کا فعلی نقص

IV, موخر دماغ کی ماؤفیت

V, غلیظ بخاری ریاحات

VI, بارد المزاج ہونا

VII, سرد موسم

VIII, سرد تدابیر اختیار کرنا

IX, جسم میں غلیظ خلط بلغمی

بیان کردہ اصول علاج اختیار کریں۔

ضربت الشمس

SUNSTROKE

اس مرض میں شدت حرارت سے خون میں جوش اُچھاتا ہے جس سے دماغ اور راس النخاع کو شدید اذیت پہنچتی ہے اور نہایت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات غشی اور سباتی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے اور جس تنفس ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسباب

I تیز دھوپ

II شدت حرارت

III ہوا کا بند ہو جانا

IV موسم گرما میں سیاہ کپڑے پہنا

V کثرت سے نوشی

VI جسمانی محنت کی زیادتی

بعض علامات بالعموم تین طرح سے رونما ہوتی ہیں
علامات عام طور سے پہلے شدید گرمی اور تپش کی وجہ سے درد سر کی شکایت ہوتی ہے،
دوار ہوتا ہے جسم کا درجہ حرارت غیر معمولی طور پر ۱۰۸ ڈیگری سینچ جاتا ہے۔ شدید کرب و
اضطراب ہوتا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی ہے۔
ہریان کی شکایت ہوتی ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ خفقانی کیفیت ہوتی ہے
تنفس میں تکلیف ہوتی ہے اور اس سے خراٹے کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد بعض
بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اسی حالت میں شدت ضعف کی وجہ سے بعض

ہلاک ہو جاتا ہے۔

بعض حالات میں شدید نقاہت اور ضعف محسوس ہو کر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، عضلات مترخ ہو جاتے ہیں، نبض دقیق اور ضعیف چلتی ہے۔ قلب کی حرکات نہایت ضعیف ہوتی ہیں، متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے، تمام جسم پسینہ میں تر ہو جاتا ہے، قلبی حرکات کے بند ہو جانے سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے، یا رفتہ رفتہ عوارض میں تخفیف ہو کر مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

(III) دماغ، نخاع اور اس انخاع میں حرارت کی وجہ سے شدت مفرت پہنچ کر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور جس تنفس ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

سبب فاجی	سبب فریۃ الشمس
۱۔ لو لگنے یا شدت حرارت سے گزرنے	۱۔ سکتہ کی سرگزشت ملتی ہے
۲۔ مریض علامات رفتہ رفتہ رونما ہوتی ہیں۔	۲۔ یکایک رونما ہوتی ہیں۔
۳۔ سبب سے قبل حرارت ہوتی ہے۔	۳۔ حرارت نہیں ہوتی۔
۴۔ پتلیاں منقبض ہوتی ہیں۔	۴۔ پتلیاں غیر مساوی ہوتی ہیں۔
۵۔ حقیقی فالج نہیں ہوتا۔	۵۔ حقیقی فالج ہوتا ہے۔
۶۔ امہال غیر ارادی طویل ہوتا ہے۔	۶۔ قبض ہوتا ہے۔
۷۔ بالعموم تنفس معدوم یا پست ہوتا ہے تاہم خراٹے دار بھی ہو سکتا ہے۔	۷۔ تنفس بلند، خراٹے درد ہوتا ہے۔
۸۔ سر اور آنکھیں نہیں پھرتیں۔	۸۔ سر اور آنکھیں پھر جاتی ہیں۔
۹۔ نبض سریع اور اکثر ضعیف چلتی ہے۔	۹۔ نبض بطی اور متلی چلتی ہے۔
۱۰۔ مناسب علاج سے سبب میں کمی آتی جاتی ہے۔	۱۰۔ سبب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

ہے۔

— مریض کو سرد اور ہوادار مکان میں رکھیں اور گداز بستر پر
اصول علاج | سلامیں۔

— بے ہوشی کی صورت میں سرد پانی یا اسی قبیل کی دوسری اشیاء کے چھینٹے ماریں۔

— سر پر برف وغیرہ کی تھیلی رکھیں۔

— مفرجات استعمال کرائیں

— پیاس بجھانے والی دوائیں استعمال کرائیں۔

— بے ہوشی دور کرنے کے لیے سرد پانی یا عرق کیوڑہ و عرق گلاب کے
علاج | چھینٹے ماریں۔

— عرق گلاب و عرق کیوڑہ میں کافور ملا کر سونگھائیں۔

— سر منڈا کر مذکورہ بالا عرقیات میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں اور اس کا بار بار
اعادہ کرتے رہیں۔

— برف کی ٹوپ، سرد پانی کی تھیلی، پیشانی اور گردی پر پھرانا بھی سودمند ہے۔
اور شدید حمی کی صورت میں سارے جسم، بالخصوص سر، گردن اور پشت پر سرد پانی
ڈالیں۔

— پیاس دفع کرنے کے لیے برف کی ڈلی چوسنے کی ہدایت کریں — یا
آم کے پنے میں عرق کیوڑہ یا عرق گلاب اور دوسری ملا کر برف سے مرد کر کے
تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

— تقویت کے لیے درج ذیل نسخہ سودمند تصور کیا جاتا ہے۔
نسخہ :-

مفرج بارد، مفرج یا قوتی ہر ایک ۷ گرام کھلانے کے بعد لعاب ہمدان، شیرہ
مغز تخم کدو، شیریں، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک ۳ گرام، شیرہ عتاب ۵ دانہ،
عرق گلاب، عرق گاؤں زبان ہر ایک ۴۸ ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر ۴۸ ملی لیٹر
کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

— سر کو روغن شیریں میں ملا کر جسم پر ملیں۔

— عرق قالسہ ۴۸ ملی لیٹر، عرق گلاب ۴۸ ملی لیٹر، — میں تھوڑا سا سرد پانی ملا کر

برف سے مزید سرد کر لیں اور نوش کر لیں۔
 — زرشک، بہدانہ پانی میں نکال کر شربت آلو بخارا سے شیریں کر کے نوش کر لیں۔
 — درج ذیل لخلخہ سونگھائیں۔
 نسخہ لخلخہ :-

روغن گل، عرق بید مشک، گلاب دو آتشہ، سرکہ انگوری، ہر ایک ۴۸ ملی لیٹر،
 تازہ عرق گلاب ۹۲ ملی لیٹر، مندل سفید ۴ گرام، کافور ۱ گرام، جلد دواؤں کو باہم ملا کر
 لخلخہ بنا کر سونگھائیں۔


سکتہ

APOPLEXY

اس مرض میں قلب اور اعضاء تنفس کے سوا جسم کے تمام اعضاء کی حس و حرکت
 موقوف ہو جاتی ہے اور مریض پر کامل سکوت طاری ہو جاتا ہے، قلب اور اعضاء
 تنفس کی حرکات بھی نہایت درجہ خفیف ہوتی ہیں۔

اقسام

بنیادی اسباب کے اعتبار سے



اسباب

۱۔ بطون دماغ میں کامل شدہ، خواہ یہ بلغمی ہو یا دموی

دماغ کا گرم حار / بارد	II,
امتلاء دماغ، دُموی	III,
عروق دماغ میں انسداد	IV,
عروق دماغ میں انجماد خون	V,
نفس دماغ یا اغشیہ دماغ میں نزف	VI,
سرد و تر اشیاء کا بکثرت استعمال / سرد تدابیر	VII,
عیش و عشرت کی زندگی	VIII,
کثرت مے نوشی	IX,
کثرت مجامعت	X,
اختلاج قلب	XI,
شحامت عروق قلب	XII,
امراض صمامات قلب	XIII,
صلابت عروق دماغ	XIV,
غیر معمولی جسمانی تحریکات	XV,
تسم بول	XVI,
نقرس	XVII,
تسم افیون	XVIII,
اخراج فضلات جسم میں خلل واقع ہونا	XIX,

ابتداء میں درد سر اور دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ دُموی و طنین جیسی علامات علامات ملتی ہیں، نقل راس ہوتا ہے، مریض گفتگو کے دوران چند ثانیہ کے لیے رک جاتا ہے، ارجاف کی شکایت ہوتی ہے، متلی اور قے آتی ہے، مزاج میں غیر معمولی چڑچڑاہٹ آجاتا ہے، نسیان ہوتا ہے، قوت بے عارت میں خلل واقع ہو جاتا ہے، حول بھی ہو سکتا ہے۔ فزع فی النوم جیسے عوارض رونما ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اعصاب حمی میں فتور اور خلل واقع ہو جاتا ہے اور جسم کے کسی عضو میں غیر معمولی پھرکن، خدر یا مفلوجیت ہوتی ہے۔

(۱) عمومی علامات :-

مذکورہ بالا علامتوں کے رونما ہونے کے بعد مریض بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت مردوں جیسی ہو جاتی ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں تو گر پڑتا ہے۔ تنفس اس قدر بلی اور خفیف ہوتا ہے کہ تشخیص دشوار ہو جاتی ہے، اطراف مسترخ ہو جاتے ہیں، مرض کی نوبت عام طور سے ۵ منٹ سے ۲ گھنٹے تک ہوتی ہے، تاہم ۲ گھنٹے تک بے ہوشی کا برقرار رہنا اور تنفس خرابی کے ساتھ آنارڈی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان حالات میں عام طور سے مریض فوت ہو جاتا ہے اور ہوش میں آنے کی صورت میں فتور عقل یا فالج کی شکایت ہو جاتی ہے۔

(ب) خصوصی علامات :-

سکتہ بلیغیہ میں جسم میں استرخائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رنگت سفید ہوتی ہے، منہ اور ناک سے رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ سکتہ بلیغیہ کی غلطی (خرخراہٹ) صورت ردی تصور کی جاتی ہے۔ سکتہ بلیغیہ کی غیر غلطی صورت میں تنفس کی حرکات معدوم ہوتی ہیں اور مریض مردہ کی مانند ہوتا ہے۔ سکتہ دمویہ میں چہرہ سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے اور خناق قلبی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گردن کی عروق ابھر جاتی ہیں، خرخراہٹ کے بغیر تنفس ہوتا ہے۔ سکتہ دمویہ میں جمی ہوتا ہے، اور سکتہ سے قبل درد سر گردانی سر اور اضطراب وغیرہ علامات رونما ہوتی ہیں۔

امتلاء دموی کی صورت میں سکتہ سے قبل متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے، درد سر اور دوران سر ہوتا ہے، اضمحلال اور کسمندی ہوتی ہے۔ بہر جیسی کیفیات ہوتی ہیں، ہوش آنے پر حواس میں کسی طرح اختلال نہیں ہوتا۔ دماغی عروق کے انسداد کی صورت میں سکتہ یک لخت واقع ہوتا ہے، اور دموی انجماد خون کی صورت میں مذکورہ بالا علامات رونما ہوتی ہیں اور ہوش آنے پر جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہوتا ہے۔

اغشیہ دماغ میں نوزف کی صورت میں بے ہوشی کے وقت شدید تشنج عارض

ہوتا ہے اور اوسط دماغ میں نرف کی صورت میں پتلیاں منعقب ہو جاتی ہیں اور حرارت جسمانی میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔

عمومی طور پر نرف دماغی کی صورت میں سابق میں مذکور علامات پائی جاتی ہیں تاہم مقدم دماغ کی سطح یا کیس باطن میں نرف کی صورت میں سر اور آنکھیں ایک جانب کو پھر جاتی ہیں، بائیں جانب عروق کے اشتقاق کے نتیجے میں نرف الام کی صورت میں تو سر اور آنکھیں بائیں جانب اور اس کے برعکس جانب نرف الدم کی صورت میں سر اور آنکھیں دائیں جانب پھر جاتی ہیں۔

اور نرف الدم اگر اوسط دماغ کی ان عروق سے ہوا ہے جو دائیں حصے کی پرورش کرتی ہیں تو بے ہوشی کے وقت سر اور آنکھیں بائیں جانب اور اس کے برعکس صورت میں دائیں جانب پھر جاتی ہیں۔

شرائین بطون دماغ کے اشتقاق کے نتیجے میں عارض ہونے والے نرف الدم میں بے ہوشی کے وقت عضلات میں انقباض ہوتی ہیں۔

ذیل میں سکتے اور موت کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

موت	سکتے
1۔ روئی کے ٹکڑے، پر، پانی میں کسی بھی طرح کی تحریک نہیں ہوتی۔	1۔ سکتے کے مریض کے نکتھوں کے پاس خوب دھنی ہوئی روئی کا ٹکڑا، کسی پرندے کا ملائم پر لے جائیں، یا کسی چھوٹے برتن میں پانی بھر کر مریض کے سینہ پر رکھیں، دھنی

1۔ جالینوس کا ایک سالہ اس موضوع پر ہے جس کا عربی ترجمہ قسطا بن لوقا نے ”تحریج الدفن“ کے نام سے کیا ہے، اس میں جالینوس نے سکتے کے مریض کو ظاہری موت کے گھنٹے بعد دفن کر دینے کے عمل کو زندہ دگر کرنے کا عنوان دیا ہے۔ راقم الحروف نے اس مخطوطہ کو حکیم سید شجاع الدین حسین ہمدانی، جلالی دہلی گروہ کے ذلتی ذخیرہ کتب میں ملاحظہ کیا ہے اور ان کے ایما پر مرع تعلیقات اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ (مرتب)

ہوئی روئی کے ٹکڑے، پر، یا پانی میں خفیف
- حرکت دکھائی دے گی۔

۲- زبان کے نیچے حلیل کنج ران یا خمیوں ۲- شریان کی حرکت مفقود ہوتی ہے۔
پر ہاتھ رکھنے سے شریان کی حرکت محسوس
ہوتی ہے۔

۳- مقعد میں انگلی داخل کر کے پشت کی ۳- حرکت شریانی معدوم ہوتی ہے۔
طرف دبائیں، شریان کی حرکت محسوس
ہوتی ہے۔

۴- آنکھیں روشن اور چمکدار ہوتی ہیں۔ ۴- آنکھیں بھی ہوئی اور گدلی ہوتی ہیں۔
۵- چراغ یا اس طرح کی روشنی کے سامنے ۵- شبیہ معدوم ہوتی ہے۔
مریض کی آنکھ کا معائنہ کرنے سے اس میں
اس شے کی شبیہ دکھائی دیتی ہے۔

اصول علاج | — فالج کے اصول پر علاج کریں
— سکتہ کی حالت میں مریض کے سر کو گرم رکھنے کے لیے ادویہ حارہ
سونگھائیں۔

— موعطات استعمال کرائیں

— ٹپکور کریں

— قے کرائیں۔

— دورہ کے بعد مریض کے قوی بدنی کی رعایت سے جسم و دماغ کے تنقیہ کی تدابیر
کریں،

— سکتہ دمویہ میں فصد کھولیں، پھپھنوں کے ساتھ سگھیاں کھجوائیں۔

— سکتہ دھمیہ میں اور رام دماغیہ کا علاج کریں۔

— سر کے مادہ کو تیز حقنہ کے ذریعہ جذب کرنے کی تدابیر کریں۔

— سکتہ بلفیہ میں سر کو گرم رکھنے کے لیے مشک، قرفل اور سداب جیسی
علاج | ادویہ حارہ سگھائیں۔

۔ ان تدابیر کے بعد فالج کے اصول علاج کو اختیار کرتے ہوئے شعل، سہل، قریب وغیرہ استعمال کرائیں۔

خراج دماغ

CEREBRAL ABSCESS

اس مرض میں دماغ میں ریم دار التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب

I	ریم پیدا کرنے والے اعضاء کی بلا واسطہ سرایت
II	التهاب وسطی الاذن تقیمی Suppurative Otitis Media
III	جہی اور مصفاقی ہوائی جو فوں کی سرایت
IV	تحف کے مرکب کسور
V	جہبہ یا تحف کا دمل
VI	حدقہ چشم کے امراض
VII	اتساع شغب
VIII	سرخبادہ

علامات کا انحصار بیشتر سرایت رساں Infective نوعیت پر ہوتا ہے اور کسی حد تک خراج کے محل وقوع پر التهاب اذن سے پیدا ہونے والی حالتوں ابتدائی علامات خفیف ہوتی ہیں اور بالعموم تقیمی التهاب یا التهاب حلمہ Mastoiditis کی صورت میں یہ علامات دوسری علامتوں کی وجہ سے دب جاتی ہیں۔ بصورت دیگر حمی، درد سراورقہ نیز غنودگی وغیرہ علامات موجود ہوتی ہیں۔ تقیمی عمل کے بے روک پھیلنے کی صورت میں یہ علامات شدید طور پر، سرعت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں، خراج کے کیمہ بند ہونے کی صورت میں، ابتدائی علامات زائل ہو جاتی ہیں،

اور خراج مزمن صودت اختیار کر لیتا ہے اور اس صودت میں انفجاری یا اشتعالی نوعیت کا درد سر ہوتا ہے۔

اطباء نے اس مرض کی علامتوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔
I، التهابی درجہ :-

یہ درجہ ۱۲—۷۲ گھنٹے پر محیط ہوتا ہے اور مریض کو بالعموم اس مرحلے کا علم نہیں ہو پاتا۔ اس درجہ میں درد سر، قے اور لرزہ نہایت اہم علامات ہیں، درد سر کی نوعیت جلن یا ٹیس جیسی ہوتی ہے۔ درد ذوقی یا مسلسل ہو سکتا ہے، خراج کے مقام پر تکلیف ہوتی ہے، متلی کے بغیر قے خارج ہوتی ہے اور اس میں غذائی اجزاء شامل نہیں ہوتے۔ تیسری اہم علامات لرزہ ہے، لرزہ کی کیفیت معمولی سے تھوکر کا پینے تک ہو سکتی ہے۔
II، درجہ ضعف :-

یہ درجہ ۱—۵ ہفتہ پر محیط ہوتا ہے، التهابی درجہ کی علامتیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں تاہم درد کم ہو جاتا ہے، مریض کراہتا اور ماؤف حصہ پر ہاتھ رکھے رہتا ہے سو پر کسی طرح کے دباؤ سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درد میں اضافہ سے مقام مرض کی تعیین میں معاونت حاصل ہوتی ہے۔ معمولی جسمانی حرکت سے قے اور دوار کی شکایت ہوتی ہے۔ دماغی افعال میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض سوال کے جواب دہر میں دیتا ہے اور کسی جملے کو ادا کرتے ہوئے درمیان میں غنودگی آ سکتی ہے۔ خراج میں کسی طرح کی پیچیدگی کے نہ ہونے کی صورت میں جسمانی حرارت طبعی ہوتی ہے۔ نبض بطنی اور متلی چلتی ہے۔ تنفس سست ہوتا ہے۔
(III) درجہ فالج :-

فالج کی نوعیت سے مقام ماؤف کی صحیح تعیین میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ خراج کے حرکتی رقبہ یا اس کے قریب ہونے کی صورت میں تشنج یا فالج ہوتا ہے۔ فص صدغی کی صورت میں وہ دماغ کے درمیانی حصہ کی بلندی کے نچلے حصہ پر دباؤ ڈالتا ہے جس کے نتیجہ میں اطراف اور چہرہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ خراج کے بائیں جانب ہونے کی صورت میں بطلان تکلم کی شکایت ہوتی ہے۔ فص جہی میں بڑے خراج کی صورت میں دماغ

میں نقل اور حواس میں کندی ہوتی ہے، موخر دماغ میں خراج کی صورت میں بالعموم قے خارج ہوتی ہے، موخر دماغ کے درمیانی فص میں خراج کی صورت میں مریض لڑا کھڑا کر چلتا ہے اور اس جانب کے اعفاء کے افعال میں سستی ہوتی ہے۔
 خراج کے سطح دماغ پر پھوٹ جانے کی صورت میں جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سرسامی علامتیں رونما ہوتی ہیں، نبض سریع چلتی ہے۔ قے آتی ہے اور تشنج ہوتا ہے۔ خراج کے بطون دماغ میں پھوٹنے کی صورت میں ہڈیاں پھیل جاتی ہیں، جسم نیلگوں ہو جاتا ہے، تنفس خراٹے دار آتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تشنج ہوتا ہے اور سبات کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔

تفریقی علامات

سلو دماغ	خراج دماغ
۱۔ کسی طرح کی سرگزشت نہیں	۱۔ ضرب و سقط راس یا امراض اذن کی سرگزشت موجود ہوتی ہے۔
۲۔ لاغری جلد نہیں آتی	۲۔ لاغری ہوتی ہے۔
۳۔ لرزہ اور پسینہ نہیں آتا	۳۔ لرزہ اور پسینہ آتا ہے۔
۴۔ التهاب عصیہ مجوفہ ہوتا ہے	۴۔ التهاب عصیہ مجوفہ نہیں ہوتا
۵۔ درد سر میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا ہے	۵۔ درد سر یکایک شدید ہو جاتا ہے۔
۶۔ مخصوص عضلات میں صرف تشنج ہوتا ہے۔	۶۔ تشنج مرعی کے بعد فالج ہوتا ہے
۷۔ مرض کی رفتار سست ہوتی ہے۔	۷۔ مرض کی رفتار تیز ہوتی ہے

یقینی تشخیص ہو جانے کے بعد عمل بالید

اصول علاج کریں۔

- عوارض میں تخفیف کی تدابیر اختیار کریں
- کان سے سرایت کی صورت میں دافع تعفن ادویہ استعمال کرائیں


مرض کی یقینی تشخیص کے بعد دست کاری (عمل بالید = Operation) علاج کریں۔

تلیں دماغ

CEREBRAL SOFTENING

اس مرض میں جو ہر دماغ کی ساخت نرم پڑ جاتی ہے اور دماغی افعال میں بتدریج نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض بوڑھوں اور دماغی کام کرنے والوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام



۱۔ یہ نوع نسبتاً نثر الوقوع ہے مادہ مرض دماغ کے سفید جوم میں ہوتا ہے یسوں دماغ میں رطوبت بھر جاتی ہے مضافاً صحت کی حالت کی نسبت کم قدر نرم ہوتا ہے اور شدید عوارض میں دماغ، مکھن کی طرح نرم اور سفید دکھائی دیتا ہے۔

۲۔ مادہ مرض دماغ کے خاکستری سفید جوم میں ہوتا ہے اور مزید تر مادہ رخی، مگربی دھال دیتا ہے۔ دموی دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات اس کی ماحت اس قدر رقیق ہو جاتی ہے کہ تشريح بعد الموت کے وقت کھوپڑی کے اوندھانے سے دماغ گر کر بہہ سکتا ہے۔

۳۔ اس نوع میں مقدم دماغ، سر بیضی اور جسم مضاع متاثر ہوتے ہیں، مقام ماضوف نرم اور زہک کی مانند نرم ہوتا ہے۔ تشگاف دینے سے زردی مائل صاف و شفاف رطوبت خارج ہوتی ہے یہ نوع ادھیڑ و دلوں میں کثیر الوقوع ہے اور نہایت مہلک تصویر کی جاتی ہے

اسباب

امراض اس :-

- | | |
|-----|---|
| I | سدہ دماغ / ایجاد خون |
| II | دماغی شراہیں کی دیواروں کی ساخت میں فساد شحمی |
| III | دماغ کا ورم حارہ (قرانیطس) |
| IV | ساختِ دماغ میں نقص و فساد |

امراض نظام دوران خون :-

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| I | متواتر خفیف عروقی انفراد |
| II | عروقی بوسیدگی کا تدریجی عمل |
| III | انصبابِ خون |
| IV | شراسین کا آتشکی مرض |
| V | خون کے موجد لو تھڑے کا استعمال و تغیر |

متفرقات :-

- (I) تشدید دماغی محنت
(II) افاض کلیه

علامات | علامات کا انحصار بالعموم دماغ کے متاثرہ حصوں پر ہوتا ہے، تاہم بوسیدگی ولینٹ کا اثر و عمل وسیع ہوتا ہے اس لیے ذہنی ابتری، تازہ واقعات کے نقص حافظہ کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے اور خیالات کو یکسو کرنے میں دقت ہوتی ہے، جذبات پر قابو نہ ہونا، تند مزاجی، پست ہمتی، پرانگندہ خیالی اور بعض حالتوں میں خوشی کی قلیل مدت مزاجی کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ — موخر دماغ میں مادہ مصربی صورت میں مریض لڑکھاتا اگر اس طرح جیسا ہے تو پائتھے کی طرف گریز ملے گا، احتباس صوت (بختہ اصوات) ہوتا ہے، پیروں میں یکپسٹی ہوتی ہے من صورت میں باتھ، پاؤں یا یہودی حصہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اطراف متورم ہو جاتے ہیں عضلات میں ذبول اور دردناکی پیدا ہو جاتی ہے، اکثر حقے ہوتی ہے، نبض ضعیف اور بطی چلتی ہے

قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بلا ارادہ براز خارج ہوتا ہے، عسر البول ہوتا ہے، تنفس خراٹے دار ہوتا ہے، مرض کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ تنفسی دشواریوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آخر کار ہڈیاں، تشنج یا سبات کے بعد مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ تبلیں دماغ ابیض کی صورت میں سر میں کم و بیش درد ہوتا ہے، یکایک دوار ہوتا ہے جو تھوڑی دیر بعد از خود رفع ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، ہوش و حواس میں فرق پڑ جاتا ہے، قوت حافظہ متاثر ہوتی ہے، اطراف میں سوئیاں چھبنے کا احساس ہوتا ہے، قوت سامعہ اور بامہ خاص طور سے متاثر ہوتی ہیں، بعض اوقات عصب بھری میں ذبول بھی ہو جاتا ہے، غذائینے کے بعد غنودگی جیسی حالت ہو جاتی ہے، ضعف قلب ہوتا ہے اور ذرا سی بات سے دل بلیوں اچھلتا ہے۔

• — علاج کو بڑی حد تک علامات کا تابع ہونا چاہیے۔
• — تکان، بالخصوص دماغی تکان سے احتراز لازم ہے۔

- چڑچڑاہٹ اور بے خوابی کے تدارک کے لیے مسکنت و منومات استعمال کرائیں۔
- ضعف قلب کی صورت میں محرکات و منویات استعمال کرائیں۔
- مفلوج اعضاء کی مالش کا اہتمام کریں۔
- امعاء کا تنقیہ کریں تاہم قوی مسہلت سے احتراز کریں۔
- مریض کا سر اونچا رکھیں اور جسم کو گرم رکھنے کا اہتمام کریں۔
- ملحوظ رہے کہ یہ مرض ابتدائی مراحل میں ہی علاج پذیر ہے۔

• علامات مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں
• علاج: پیری کی صورت میں مریض کو آرام و سکون فراہم کریں اور اطراف کو گرم رکھیں
• فالج کے بعد اس مرض کے عارض ہونے کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

صبح کو معجون اذراقی ۳ گرام کھل کر عرق بادیاں، عرق گاؤ زبان ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر
نوٹس کرائیں — شام کو درج ذیل مقوی قلب نسخہ استعمال کرائیں
نسخہ رائے تقویت قلب:-

دوا المک معتدل ۵ گرام کھلا کر عرق بادیان، عرق گاؤزبان ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر
بوقت شام نوش کرائیں۔ اور مفلوج مفلوک مناسب روغنیات سے مالش
کرائیں۔

• منوم کے طور پر درج ذیل نسخہ مفید و مجرب ہے۔
نسخہ فساد:-

تخم کاہو، تخم نیلوفر، مندل سفید، ہر ایک ۳ گرام، افیون، زعفران ہر ایک ۲۵۰ ملی گرام،
کافور اگر ام، جملہ دواؤں کو باریک پیس کر روغن گل ۶ ملی لیٹر ملائیں اور آب کشنیزبز
۲۲ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے فساد کریں۔

• معجون فلاسفہ ۷ گرام، عرق گاؤزبان، عرق بادیان ہر ایک ۵ ملی لیٹر کے ہمراہ کھلیں۔
• خمیرہ مروارید ۳ گرام ہمراہ منڈی، ۱۲ گرام، شربت گردہل ۲۲ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
• نوشداروی لولونی ۵ گرام چند یوم پابندی سے استعمال کرائیں۔

تزعزع دماغ

CONCUSSION OF THE BRAIN

اس مرض میں کسی خارجی دباؤ سے دماغ ہل جاتا ہے اور اس کے دوران خون میں
خلل واقع ہو کر طبعی افعال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور ثانوی طور پر دوسرے اعضاء پر
بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔

اسباب

I ضرب و سقطہ راس

II سر پر زور کا دھکا پہنچنا

علامات | کسی خارجی کسر و خلع کے بغیر محض خارجی دباؤ کی سرگزشت ملتی ہے اور صرف
دوران خون میں خلل واقع ہوتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے سے یک دم بے ہوشی
طاری ہو جاتی ہے لیکن چند ثانیہ بعد از خود بے ہوشی رفع ہو جاتی ہے تاہم درد و محسوس

ہوتا ہے — خفیف صورتوں میں چند ثانیہ کے لیے دماغ چکرا جاتا ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، حواس مختل ہو جاتے ہیں اور ضعف کی وجہ سے غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے مریض کا کھانا رہنا دشوار ہو جاتا ہے، بعض اوقات متلی اور قے بھی آتی ہے۔ کانوں میں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

شدید صورتوں میں بے ہوشی دیر تک قائم رہتی ہے، مریض گہری نیند کی مانند دیر تک بے خود پڑا رہتا ہے بدن سرد اور رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، روشنی سے پتلیاں غیر متاثر ہوتی ہیں، عضلات مترخی ہو جاتے ہیں، بول و براز خطا ہونے لگتے ہیں، بعض اوقات اطراف مفلوج ہو جاتے ہیں، نبض ضعیف چلتی ہے، تنفس نہایت بطنی ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد عوارض میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے تاہم عقلی قوتوں کا فتور بدستور رہتا ہے۔ صحت کاملہ کے بعد بھی کسی قدر دماغی فتور کی روئیداد ملتی ہے۔ بعض اوقات قوت گویائی مفقود ہو جاتی ہے، حاصل یہ کہ مرضی علامات کا انحمار مقام گزند اور اس سے خارج ہونے والے اعصاب پر ہے۔

ذیل میں ترمز عزع دماغ اور مضطرب دماغ کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ترمز عزع دماغ	مضطرب دماغ
۱۔ مریض دفعتاً بے ہوش ہو جاتا ہے اور اکثر حالتوں میں اس کو بیدار کیا جاسکتا ہے۔	۱۔ مریض مکمل طور پر بے ہوش ہوتا ہے اور وہ کسی طور بیدار نہیں کیا جاسکتا۔
۲۔ پتلیاں مساوی ہوتی ہیں اور بالعموم روشنی میں سکڑتی نہیں ہیں اور اگر متقبض ہوتی بھی ہیں تو نہایت سستی کے ساتھ، خفیف طور پر۔	۲۔ پتلیاں غیر مساوی اور غیر متحرک ہوتی ہیں ابتدا میں متقبض اور بعد میں منبسط ہو جاتی ہیں۔
۳۔ تنفس اتھلا، سست اور بعض اوقات ”آہ“ کے ساتھ آتا ہے۔	۳۔ تنفس سست، خراٹے سے اور کبھی غیر منظم ہوتا ہے۔
۴۔ عضلات مترخی ہو جاتے ہیں تاہم مکمل	۴۔ فالج ہوتا ہے اور جسم کے ایک جانب

فالج نہیں ہوتا۔ بالعموم صلابت ہوتی ہے۔
 ۵۔ متواتر پیشاب خارج ہوتا ہے۔ ۵۔ احتباس بول ہوتا ہے اور مثانہ کے
 امتلاء کی وجہ سے ہی از خود خارج ہوتا ہے۔

اصول علاج۔

- ۱۔ قصد کے ذریعہ مادہ کا امارہ کریں
- ۲۔ خفیف ملین و مسہل استعمال کرائیں
- ۳۔ مقوی دماغ ادویہ کا ضمد کریں
- ۴۔ ضعف کی صورت میں محرکات استعمال کرائیں
- ۵۔ رفع بے ہوشی کی تدابیر اختیار کریں
- ۶۔ گرم پانی یا اینٹ سے ٹکمید کریں، سر پر برف رکھیں، پاشورہ کریں
- ۷۔ باسلیق یا اکھل کی فصعہ کھولیں تاکہ مادہ کا رخ دماغ کی مخالف جانب
- ۸۔ علاج ہو جائے اور التہابی کیفیت پیدا نہ ہو سکے۔

- ۱۔ تیلین کے لیے آب کا سنی ۱۲۰ ملی لیٹر، ہمراہ مغز امتاس ۸ گرام، نوش کرائیں۔
- ۲۔ صندل، سپاری، گل ارمنی، ریوند چینی، آرد، آرد باقلا، کافی، کا ضمد کریں۔ تر عزرع
- ۳۔ دماغ میں درم دمی کی صورت میں یہ نہایت مفید تصور کیا جاتا ہے۔
- ۴۔ روغن بنفشہ، روغن گل، ہمراہ شیر، جس میں رسوت حل کی گئی ہو، کا سوطا کرائیں۔
- ۵۔ نبض ضعیف اور متواتر ہو تو محرکات مثلاً دواء المسک، چائے اور شراب وغیرہ استعمال
- ۶۔ کرائیں۔

- ۱۔ حسب ضرورت، صندل کو عرق گلاب میں گھسن کر کا فور ملا کر برف سے ٹھنڈا
- ۲۔ کریں اور کپڑے کی گدی بنا کر بھگو کر سر پر رکھیں اور بار بار تبدیل کریں۔
- ۳۔ پنڈلیوں پر سنگھیاں کھنچوائیں۔
- ۴۔ جب مریض ہوش میں آنے لگے تو تھوڑا تھوڑا دودھ نوش کرائیں، اس وقت
- ۵۔ محرکات مثلاً قہوہ، چائے اور برانڈی وغیرہ نہ استعمال کریں۔
- ۶۔ مکمل طور پر ہوش میں آجانے پر، ضعف و نقابت دور کرنے کی غرض سے غیرہ
- ۷۔ گاؤزبان عنبری، دواء المسک معتدل اور انوشدارو و لولوئی استعمال کرائیں۔

امتلاء دماغ

CEREBRAL HYPERAEMIA

اس مرض میں دماغ اور اعشیہ دماغ میں غیر معمولی طور پر اجتماع خون ہوتا ہے۔

اسباب

امراض دماغ :-

- I, صدمہ دماغ
- II, سلو دماغ
- III, شرایین دماغ کا اتساع
- IV, خراش واذیت دماغ

امراض اعصاب :-

I, ضربہ الشمس

امراض قلب :-

I, سرعت قلب

II, انورسا

امراض ریہ :-

I, عسر التنفس

II, سعال

متفرقات :-

I, مولد خون اشیاء کا بکثرت استعمال

II, سر کو نیچے جھکانا

III, کونھنا

(IV) سمیات

(V) کثرت سے نوشی

(VI) عیش و آرام کی زندگی

علامات | خفیف حالات میں امتلاء چند ثانیے کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ چہرہ نیلا
اُپر جاتا ہے یا فوخ پر معمولی نقل اور درد محسوس ہوتا ہے۔ شریان سبانی
کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سدر، دوار، مہر اور اضطراب کی شکایت ہوتی ہے۔
قوت حافظہ اور قوت تخیل میں فتور واقع ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔
سستی اور کسندی عام ہوتی ہے، قوت سامعہ و بامرہ میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔
عضلات، بالخصوص اطراف کے عضلات میں اختلاج ہوتا ہے، اور ان میں ذبونی کیفیت
پیدا ہو جانے سے تکان کا احساس جلد ہوتا ہے، نیند کے باوجود فرحت نہیں ہوتی،
خواب نظر آتے ہیں۔

حاد صورت میں دماغی دوران خون میں دفعتاً شدید نوعیت کا خلل واقع ہوتا ہے،
جس سے پرگندہ خیالی عارض ہوتی ہے۔ بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ اور
گردن اور پیشانی کی عروق زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اطراف اور گردن کی عروق میں غیر معمولی
تڑپ ہوتی ہے۔ پتلیاں ابتداء میں تنگ، بعد میں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ نبض ممتلی، بطنی اور
متفاوت چلتی ہے۔ قبض ہوتا ہے۔ آخر میں ہریان اور تشنج کے ساتھ غنودگی، بعد میں
بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مذکورہ علامات کی بجائے صرغ کی
علامتیں نمایاں ہوتی ہیں۔

اصول علاج | — سر کو تکیہ وغیرہ سے اونچا کر کے مریض کو لٹائیں

— برف یا سرد پانی سے دماغ کو بذریعہ نطول و سکوب سرد کریں

— امالہ کی غرض سے پاشویہ کریں

— پنڈلیوں پر ضماد لگائیں

— منوم اور مسکن ادویہ استعمال کرائیں

— بورقی نوعیت کے مسہلات دیں، جن سے امعاء کی مائیت کا زیادہ سے زیادہ

اخراج ہو سکے۔

۔ مریض قوی الاعضاء ہو تو فصد کھولیں ۔

۔ مدرات بول استعمال کرائیں

علاج۔ مسکن کے طور پر دو اراشعفاء استعمال کرائیں
۔ شیرہ تخم کاہو، شیرہ کشنیہ نمیک، شیرہ تخم خشخاش ہر ایک ۳ ملی لیٹر،
شریت ورد ۸ ملی لیٹر کے ساتھ بوقت خواب حسب جدوار اعداد یا برشعش ۲ گرام کے
ہمراہ نوش کرائیں، مجرب ہے ۔

۔ صدغین پر جونکیں لگائیں، اسس بیت مریض کی قوت کو فروغ دے رکھیں ۔

۔ پنڈلیوں پر رانی کے پتے کا ضماد کریں ۔

۔۔۔ کافور مندل، سرکہ و گلاب میں گھس کر کپڑے میں تڑ کر کے سر پر رکھیں اور اسے
برابر تڑ کرتے رہیں ۔

۔ ہلید سیاہ، تربد اور سناہکی و املتاس وغیرہ کا مسہل دیں ۔

۔ جوارش انار بن ۷ گرام ہمراہ عرق گاؤز بان ۲۲ ملی لیٹر نوش کرائیں ۔

۔ درج ذیل نسخہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے ۔

نسخہ :-

گل سرخ، گل نیلوفر، گل گاؤز ہاں، عنب الثعلب، مندل سفید، مندل سرخ،
تخم کاسنی، تخم کاہو ہر ایک ۵ گرام، تر ہندی ۳ گرام، آلو بخارا ۹ دانہ۔ ان کو بھگو کر غیب اندہ
حاصل کر کے شریت انار ترشش ۳۶ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں اور رات میں اطفال کشنیہ
کھلائیں ۔

۔ منغز تخم خیار بن استعمال کرائیں ۔

سلعات دماغ


CFREBRAL TUMOURS

اس مرض میں دماغ اور اعشیہ دماغ میں مختلف اذاع کی فطری افزائشیں

سلعات پیدا ہو جاتی ہیں۔

اقسام

سلعات دماغ Cerebral Tumours



سلوئجی سادجہ:-

اس میں دماغ کا متاثر حصہ لپٹے ہوئے انڈے کی طرح سفید اور سخت ہو جاتا ہے۔
سلوئجی غروی:-

یہ سرس جیسے مادہ پر مشتمل ہوتی ہے، سخت اور نرم دونوں طرح کی ہوتی ہے۔
سفیدی مائل زرد ہوتی ہے اور اس میں شرائین اور وریڈیں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔
یہ دماغ سے شروع ہو کر طبقہ چمکیہ تک محیط ہوتی ہے۔ امرو دسے ناشپاتی کے برابر ہو سکتی ہے، نوعر لوگوں میں کثیر الوقوع ہے، اس کے نمویاب ہوتے رہنے سے دماغی ساخت پر خراب اثر پڑتا ہے۔

سلوئجی لحمی:-

سلوئجی یہ قسم اغشیہ دماغ سے شروع ہو کر جوہر دماغ تک محیط ہو سکتی ہے، سلوئجی رجعت گوشت کی طرح سرخ ہوتی ہے۔ صلابت بھی ہوتی ہے، اس کا حجم ناشپاتی کے برابر ہو سکتا ہے۔

سلوئجی درنیہ:-

یہ نوع مقدم اور موخر دماغ میں کثیر الوقوع ہے۔ اس کا جوہر غیر جیسا دانہ دار۔
گرہ دار اور کسی قدر سخت ہوتا ہے۔ یہ سفید یا ہلکی زرد ہوتی ہیں، ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اور حجم دانہ سوسوں سے انڈے کے برابر ہو سکتا ہے۔ عقد/دانہ کامرکزی حصہ متعلق ہو جاتا ہے، سلوئجی یہ نوع ۲-۷ سال کے بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔

سلو شمیہ :-

سلو کی یہ نوع ام جافیہ Durameter سے تھیلی کی صورت میں لگی رہتی ہے۔ اور اس میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بال وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، یہ حجم میں چھوٹی اور سخت ہوتی ہے۔

سلو کولونیہ / صفراویہ :-

سلو کی یہ نوع مقدم دماغ، موخر دماغ کی زیریں سطح، غشاء، عنکبوتی اور ام رقیق کے درمیان اور شاذ و نادر حققت اور ام غلیظہ کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ صفراوی حصاۃ کے مواد حجری پر مشتمل، چمکدار، ناہموار، بے ڈول اور لمبی سی ہوتی ہے۔ ایک یا متعدد قلعہ درمیان میں ہوتی ہے۔ اس کا حجم دانہ سرسوں سے مٹر کے برابر ہو سکتا ہے۔

سلو کیسیہ :-

یہ ایک مخصوص نوع کے کیرٹے ہوتے ہیں جو دماغ میں عرصہ تک کیسہ میں محبوس رہ کر متحجر ہو سکتے ہیں، اور ان سے کوئی نمایاں مرضی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔

سلو دمویہ / سوداویہ :-

سلو کی یہ نوع ام جافیہ کی زیریں سطح سے چسپاں رہتی ہے، جس کے اندر رفتہ رفتہ خون مترشح ہوتا رہتا ہے جو بعد میں تغیر و استحالہ کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ نوع بڑھاپے میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

اخلاط اربعہ :-

I بلغم

II صفرا

III خون

IV سودا

متفرقات :-

V غراء

II	خیمی اجزاء
III	آتشک
IV	تدرن
V	کیسی دویرے Hydatid Cysts
VI	دنبالی دویرہ Cysticercus
VII	جوہر دماغ کی سفید نسج رابطی
VIII	بیرونی چوٹ
IX	کثرت سے نوشی

علامات | اس ہننے والی علامت ہے، یہ درد ابتدا میں نوبتی اور خفیف ہوتا ہے لیکن بعد میں ہٹیلہ اور اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ بالعموم دوسرے امراض کے نتیجے میں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ درد، سارے سر میں محسوس ہوتا ہے یا ممکن ہے سارے اطراف میں یا سر کی چوٹی میں ہی محدود ہو، مریض بعض اوقات اس درد کو انفجاری یا اشتقاقی بتاتا ہے۔ صبح کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اکثر متلی اور حقیقی قے کے ساتھ پایا جاتا ہے بعض اوقات سر جھکاتا ہے بے خوابی ہوتی ہے اور درم عصر؛ مجوذہ کی وجہ سے ضعف پھر ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ مریض کی بے صارت زائل ہو جاتی ہے، تشنج کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں فالج جانبی یا تحتانی نیز لقوہ کی بھی علامت مل سکتی ہے، حواس میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، ضعف قلب اور تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے، نبض بلی اور ضعیف چلتی ہے۔

سلوہ کے مقام کے اعتبار سے درج ذیل مخصوص علامات نمودار ہوتی ہیں —
 قشرہ دماغ میں سلوہ کی صورت میں وہاں سے کنٹرول ہونے والے تحریک و انقباض کے عضلات متاثر ہوتے ہیں اور تشنجی دورے پڑنے لگتے ہیں یا اس حصہ کے افعال کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے متعلقہ عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور تشنجی و تھدیری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور ان میں سوئیاں سی جھبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔
 سلوہ نص قہر روی دماغی کی صورت میں قوت بے صارت متاثر ہو جاتی ہے اور

کسی چیز کا صرف نصف حصہ ہی نظر آتا ہے، اور بعض اوقات بے عارت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔

سلو فکس مدغی کی صورت میں ثقل سماعت کی شکایت ہوتی ہے اور کیس باطن پر دباؤ پڑنے سے نصف جسم کی حس زائل ہو جاتی ہے اور فالج ہو جاتا ہے۔
وسط دماغ میں سلو کی صورت میں چھٹا، ساتواں اور آٹھواں عصب متاثر ہوتا ہے چنانچہ علی الترتیب آنکھ اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، لقوہ — اور ثقل سماعت ہوتا ہے، ملحوظ رہے کہ سلو والی جانب لقوہ اور دوسری جانب فالج ہوتا ہے۔

دماغ کے فص بھی میں سلو کی صورت میں قوت متخیلہ متاثر ہوتی ہے اور بائیں جانب کی تیسری ترزیعہ بھی پر سلو کے دباؤ کی صورت میں قوت ناطقہ متاثر ہوتی ہے۔
موخر دماغ میں سلو کی صورت میں آٹھویں اور نویں دماغی اعصاب متاثر ہوتے ہیں، چال منوالی، شرائیوں جیسی ہوتی ہے اور چلتے چلتے دائیں یا بائیں جانب گر پڑتا ہے، سر پیچھے کی طرف کھینچ جاتا ہے، پیروں میں تشنج ہوتا ہے اور پشت کے عضلات میں ہزالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

مبداء الخراج میں سلو کی صورت میں نواں، دسواں اور گیارہواں عصب متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج ہو سکتا ہے، عسر البلع کی شکایت ہوتی ہے۔ اختلاج قلب ہوتا ہے، تنفس غیر منتظم چلتا ہے، قے آتی ہے اور زبان کی ایک جانب کے عضلات لاغر ہو جاتے ہیں۔

ساق المنخ میں سلو کی صورت میں ایک جانبی فالج ہوتا ہے۔ تیسرے عصب دماغی پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے دوسری جانب کی آنکھ کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں، پتلی پھیل جاتی ہے اور روشنی کا اس پر اثر نہیں ہوتا، متاثر آنکھ سے قریب کی چیزیں اچھی طرح نظر نہیں آتیں، حول کی شکایت ہوتی ہے اور آنکھ کا بالائی پپوڑ آنکھ کو چھپا لیتا ہے۔

تفریقی علامات

التهاب مانیجس مزمن

Chronic Meningitis

سلوات دماغ

Cerebral Tumours

۱۔ بالعموم کسی بھی طرح کی سرگزشت نہیں ۱۔ سر کی چوٹ، شراب نوشی یا آتشک کی

ہوتی۔

سرگزشت ملتی ہے۔

۲۔ دردمرشدیدۂ ابتدا میں نوبتی ،
بعد میں مستقبل ہوتا ہے ۔

۲۔ سر میں ہمہ وقت درد اور نقل محسوس
ہوتا ہے ۔

۳۔ قے نہیں ہوتی۔

۳۔ قے ہوتی ہے۔

۴۔ فالج مخصوص اعصاب تک محدود ہوتا ہے۔
۵۔ فالج مخصوص اعصاب تک ہی محدود نہیں ہوتا۔

۵۔ متکلم اکثر اداؤں ہوتا ہے۔ ۵۔ متکلم ہمیشہ غیر متاثر ہوتا ہے۔

۶۔ مزاج میں چڑچڑاہٹ نہیں ہوتا۔ ۷۔ مزاج میں چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔

۷۔ التهاب عصب مجوزہ جلد ہوتا ہے۔
۸۔ التهاب عصب مجوزہ بالعموم نہیں ہوتا اور

اگر ہوتا بھی ہے تو دوسری۔

۸۔ علامات مقامی ہوتی ہیں۔ ۸۔ علامات عمومی ہوتی ہیں۔

اصول علاج۔ دوائی علاج کی بجائے عمل بالید کریں، کیونکہ دوائی علاج صرف عوارض کی تخفیف تک ہی کارگر ہے۔

—۔ سلعات افرنجیہ کی صورت میں پارہ کے مرکبات استعمال کریں۔

•۔ سلوڈر نیہ کی صورت میں سل کے اصول علاج کو اختیار کریں اور تقویت اور تغذیہ کی طرف خصوصی توجہ دیں ۔

— تحف میں باہر کی طرف داغ لگانے اور قرعہ پیدا کرنے کی تدابیر اعمال کے لیے ایس کسی قدر ہی کامیاب تصور کی جاسکتی ہے۔

علاج — عام طور سے مرض سے مکمل شفا عمل بالید Operation سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے عمل بالید کی طرف فوراً توجہ دیں۔

.....۔ سلعہ افرنجیہ کی صورت میں ریکپور، شنگرف، دارچینہ، سم الفار اور سیلاب کے مرکبات عرصہ تک استعمال کرائیں۔

م۔ سلو درزیہ کی صورت میں تقویت اعفاء اور تغذیہ کی طرف توجہ دیں اور مرکبات کلیہ مثلاً شکر تیغال، سرطان محرق، کشتہ صدف و مسودارید استعمال کرائیں، روغن ماہی اور غری المسک استعمال کرائیں۔

— معده و امعاء کے تنقیہ کے لیے مرئی ہلید استعمال کریں
 — عصبی ہیجان نمودار ہونے کی صورت میں مسکنات عصبیہ اور
 برشعشا، دوا الشفا، مرکبات افیون اور پوست خشنخا ش استعمال کریں، تاہم ملحوظ رہے
 کہ یہ تدابیر صرف عوارض کی تخفیف کے لیے ہیں، اصل علاج نہیں ہیں۔

سدہ دماغ

CEREBRAL EMBOLIA

اس مرض میں عروق دماغ کے مسدود ہوجانے سے اجزاء دماغ میں خون کی رسد متاثر ہوتی / یا بند ہوجاتی ہے، جس سے ان اجزاء کا طبعی تغذیہ نہیں ہو پاتا، اور جوہر دماغ میں لینت پیدا ہوجاتی ہے، متاثرہ عروق کے مسدود ہوجانے سے ان کی مجاری عروق پر خون کا دباؤ / بہاؤ تیز ہوجاتا ہے جس سے وہ پھٹ جاتی ہیں اور نرغ کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ درمیانی دماغی شریان میں سدادیت نسبتاً زیادہ عارض ہوتی ہے، اسی طرح بائیں شریان، دائیں شریان کی نسبت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

اسباب

امراض نظام دوران خون :-

(I) التهاب بطانہ قلب

(II) صمامات قلب سے فاسد اجزاء کا عمدہ ہو کر دوران خون میں شامل ہو کر دماغ تک پہنچنا۔

(III) شریان سبائی یا شریان اعظم (ادرٹی) کے فاسد اجزاء کا دوران خون میں شامل ہوجانا۔

(IV) تقرح (اغشیہ) بطانہ قلب

(V) ساری امراض قلب

(VI) اکیلی علیقیت کے بعد

(VII) اور وہ (مثلاً صافن، فحذنی یا حوضی) سے سردیت کا دوران خود میں شامل ہو کر دماغ میں
سدود ہو جاتا۔

متفرقات :-

جسمانی ضعف

علامات ان خیالات کی پراگندگی، عقل و حواس وغیرہ اس کی عمومی علامات میں شامل ہیں۔ اگر سده، کسی دوسری جگہ سے دوران خون میں شامل ہو کر آیا ہو، اور انسداد کا باعث ہو تو مرضی علامات یک بیک نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف مقامی عرق کے تخرک صورت میں بتدریج نمودار ہوتی ہیں، اگر مادہ مرض کسی بڑی عرق میں ہو تو ناگہانی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، وسطی دماغی شریان کے اپنے مدار کے قریب سدود ہو جانے کی صورت میں مقابل جانب فالج نصفی ہوتا ہے اور بائیں جانب قرار ہے تو جب Aphasia بھی ہوتا ہے۔
ذیل میں فالج (جریان الدم) اور انسداد عروق دماغی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

سده دماغ

فالج [جریان الدم]

- ۱۔ جوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔
- ۲۔ امراض قلب کی سرگذشت موجود ہوتی ہے۔
- ۳۔ فالج نامکمل ہوتا ہے۔
- ۴۔ فالج مکمل ہوتا ہے۔
- ۵۔ بے ہوشی عموماً نہیں ہوتی۔
- ۶۔ اکثر بے ہوشی ہوتی ہے۔
- ۷۔ عدم نطق بالعموم ہوتا ہے۔
- ۸۔ عدم نطق بالعموم نہیں ہوتا ہے۔

- ۶۔ نبض سریع و ضعیف چلتی ہے۔
 ۷۔ پتلیاں طبعی ہوتی ہیں۔
 ۸۔ قے شاذ و نادر ہوتی ہے۔
 ۹۔ تنفس طبعی ہوتا ہے۔
 ۱۰۔ ابتداء میں درد سر، دوران میں ہوتا ہے۔
 ۱۔ نبض بطور متملی چلتی ہے۔
 ۲۔ پتلیاں غیر مساوی ہوتی ہیں۔
 ۳۔ قے بالعموم خارج ہوتی ہے۔
 ۴۔ تنفس خراٹے دار ہوتا ہے۔
 ۵۔ حمد سے قبل سبات، تشنگ، دوران میں ایلنے کی شکایت ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

اختناق	سردہ دماغ
۱۔ چہرہ قنوم اور نیلگوں ہوتا ہے۔	۱۔ چہرہ رونا دیا محقق ہوتا ہے۔
۲۔ تنفس میں دشواری ہوتی ہیں	۲۔ تنفس خراٹے دار ہوتا ہے
۳۔ پتلیاں مساوی ہوتی ہیں	۳۔ پتلیاں غیر مساوی ہوتی ہیں
۴۔ فالج نہیں ہوتا۔	۴۔ فالج عام طور سے ہوتا ہے۔
۵۔ انوکھی تحریکات موجود ہوتی ہیں	۵۔ انوکھی تحریکات معدوم ہوتی ہیں
۶۔ نیلگوں ہوتا ہے۔	۶۔ خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے
۷۔ نبض صغیر اور سریع ہوتی ہے	۷۔ نبض متملی اور قوی ہوتی ہے
۸۔ دونوں جانب کاٹھنس جا ہوتا ہے۔	۸۔ مغلوب جانب کاٹھنس سر دو خشک ہوتا ہے۔

دماغ کی چھوٹی شرائین میں سردہ کی صورت میں علاج بالدر ا کریں۔
اصول علاج۔ متعدد عروق کے انسداد کی صورت میں عمل بالید کے علاوہ کوئی

چارہ نہیں ہے۔
 سردہ دماغی بلغمی کی صورت میں مشک، سداب اور قرفنس سنگھائیں۔
علاج۔ جذبیہ ستر، فلفل سیاہ اور کند شش کے ذریعہ چھینک لائیں۔
 جو شانہ بالوند، صغتر، پودینہ، چھڑیلہ اور عاقر قرص ٹکڑے کریں۔
 درج ذیل نسخہ سے تیار کیا تیز حقنہ دیں تاکہ انجذاب مادہ ہو سکے۔

نسخہ :-

ثبث، قنطوریون دقیق، سداب خشک، تخم کرفس، مغز تخم ارنڈ، حاشا، برنجاسف،
مری، شکر مرخ اور روغن زیتون سے تیار کریں اور اس پر دوا، سردار و چھڑکیں۔

• — تنقیہ دماغ کے لیے حب ایارج ۲ عدد استعمال کریں

• — مریض بے ہوش ہو تو درج ذیل تدابیر اختیار کریں

مرخ کا پستھ، روغن سوسن یا روغن گاؤ میں چرب کر کے ایارج فیقرا، یا ایلو التھیر کو
مریض کے حلق میں پھیریں۔ اس طرح قے خارج ہو کر مریض ہوش میں آجائے گا
بصورت دیگر درج ذیل نسخہ نفوخ استعمال کریں۔

نسخہ نفوخ :-

برگ ثبث، کا پھل، جندبید منزہ، ایک ۳ گرام، مشک خالص اگر ام، جملہ دواؤں
کو پیس کر تھنوں میں نفوخ کریں۔
• — اس مرض کا شافی اور کافی علاج عمل بالید ہے۔

دماغی فقر الدم


CEREBRAL ANAEMIA

اس مرض میں دماغ کے سارے اجزاء یا کسی خاص جز، میں صالح خون کی طبعی رسد
نہیں ہو پاتی جس سے اس کے تغذیہ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر
ضعف دماغ یا خلل افعال دماغ کی علامتیں رونما ہوتی ہیں۔

اقسام | دموی رسد کے اعتبار سے

۱۔ اس کو ”ضعف دماغ“ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

دماغی فقر الدم
Cerebral Anaemia



- ۱۔ سادے دماغ میں صالح خون کی رسد طبعی مقدار سے کم ہوتی ہے ۔
 ۲۔ دماغ کے کسی خاص حصہ (جزء) میں صالح خون کی رسد طبعی ضرورت سے کم ہوتی ہے ۔

(XIV) جنسی امراض

(I) جلق

(II) جریان / کثرت احتلام

(III) کثرت جماع

(XV) نقص تغذیہ

(XVI) تبض

علامات | سر میں معمولی درد ہوتا رہتا ہے، جو ادنیٰ دماغی تحریکات مثلاً غیض و غضب اور آنکھیں منہ کر تھوڑی دیر، خاموشی لیٹے رہنے سے درد میں افادہ ہو جاتا ہے اور نیند سے بیدار ہونے کے کچھ دیر تک بالکل محدود ہو جاتا ہے۔ تاہم کچھ دیر بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ دماغی قوتوں کے ضعیف ہو جانے کی وجہ سے کسی کام میں دل نہیں لگتا طبیعت میں اضمحلال اور سستی ہوتی ہے۔ حافظہ، بینائی اور سماعت وغیرہ بھی ضعیف ہو جاتی ہیں، کان بجتے ہیں، اٹھتے، بیٹھتے، سر چکراتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شدید عوارض، خاص طور سے دماغی فقر الدم کھی میں تپہ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ پتیلیاں پھیل جاتی ہیں، شہاب بھی ہو سکتا ہے اور غشی رہے ہوئی کی دوسری علامات بھی رونما ہونے لگتی ہیں۔ فاقہ کشی کی صورت میں بذیائی کیفیت ہوتی ہے اور کھی دماغی فقر الدم کی ایک نوع میں مریض یا گلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے۔

ذیل میں دماغی فقر الدم اور بات جس تنفسی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

دماغی فقر الدم	بات جس تنفسی
۱۔ مرض کا حملہ عام طور سے دفعتاً ہوتا ہے۔	۱۔ مرض کا حملہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔
۲۔ چہرہ پھیکا، زرد ہوتا ہے۔	۲۔ چہرہ اور لب نیلے ہوتے ہیں۔
۳۔ غشی کی مدت مختصر ہوتی ہے۔	۳۔ بات کی مدت طویل ہوتی ہے۔
۴۔ نبض کلائی میں غیر محسوس ہوتی ہے۔	۴۔ نبض سیرج اور ضعیف چلتی ہے۔

- ۵۔ تنفس ضعیف اور کسی رکاوٹ کے | ۵۔ تنفس میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی
 بغیر ہوتا ہے۔
 ۶۔ ملمس بار در طب ہوتا ہے | ۶۔ ملمس حار یا بس ہوتا ہے۔
 ۷۔ قلب ماؤف ہوتا ہے۔ | ۷۔ پیچھے مڑے، ماؤف ہوتے ہیں۔

اصول علاج | ۱۔ مقوی اغذیہ و ادویہ کھلائیں۔
 ۲۔ اصل سبب کا تدارک کریں۔

- ۳۔ ہضم کی اصلاح کریں۔
 ۴۔ مریض بے ہوش ہو تو فوری طور پر اس کے سر کی جانب دوران خون بڑھانے کا نظم کریں۔

- ۵۔ جریان الدم کی صورت میں فولد کے مرکبات استعمال کریں۔
 ۶۔ دماغی فقر الدم کی شدید صورت میں نقل الدم کریں۔
 علاج ۱۔ بے ہوشی کی صورت میں مریض کو چند ثانیہ کے لیے الٹا لٹکادیں تاکہ دماغ کی اطراف خون کا دوران زیادہ ہو جائے، اس کے بعد سر ہاتھ نیچا اور پائنتی کو نیچا کر کے اس پر مریض کو لٹادیں۔
 ۲۔ قبض ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

رسوت مصفی، انجیر زرد، صبر زرد، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور بوقت خواب ۲ گولیاں ہمراہ دودھ یا آب تازہ کھلائیں۔
 درج ذیل ادویہ بھی مفید تصور کی جاتی ہیں۔

اسپنول مسلم ۲ گرام، بوقت خواب ہمراہ آب تازہ پھنکائیں۔ یاروغن بادام شیریں ۱۲ ملی لیٹ ہمراہ گرم دودھ ۲۵۰ ملی لیٹ نوش کریں۔
 ۳۔ تقویت دماغ کے لیے یہ نسخہ تحریرہ مستعمل ہے۔

نسخہ تحریرہ :-

منغز بادام شیریں مقشرے دانہ، منغز، تخم تربوز، منغز، تخم کدو، شیریں، ناشتہ، صمغ عربی، ہر ایک ۳ گرام، مصری ۲۴ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں پیس کر آگ پر پکائیں جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں اور ضرورت کے مطابق سرد یا گرم نوش کریں۔

تقویت کے لیے حبوب برہمی بھی اطباء کے معمولات مطب میں شامل ہے۔

نسخہ حبوب برہمی:-

برہمی بوٹی ۳ گرام، کو باریک کوٹ چھان کر روغن بادام سے چرب کر کے فلفل سیاہ ۳ گرام، ہیل خورد ۳ گرام، باریک پیس کر افساد کریں اور پانی میں گوندھ کر فلفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور دو، دو، گولیاں، ہمراہ آب تازہ صبح، شام کھلائیں۔

— درج ذیل روغن لبوب سبب استعمال کرائیں

نسخہ روغن لبوب سبب:-

منقہ خندق، منقہ بادام شیریں، کنجد منقش، منقہ پستہ، منقہ چلغوزہ، منقہ تخم کدوے شیریں، منقہ اخروٹ، ہموزن کارو روغن نکلوا کر سر پر مالش کرائیں۔

— منقہ بادام ۷ عدد ہموزن مصری کے ساتھ رات کو سوتے وقت کھلائیں۔

— مری آملہ مری سیب، مری بھی، مری اناس میں سے کوئی ایک، طہاشیر اور ورق نقہ کے ساتھ کھلائیں۔

— درج ذیل نسخہ مقوی دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ زکام اور نزلہ میں بھی سودمند

ہے۔

نسخہ:-

گل نیلوفر، بنفشہ، پوست بیلہ زرد، اسطوخودوس، گل سرخ، خشتا شہر ایک ۳ گرام، گاؤز بان، ابریشم مقروض، مانیں خورد، تربید سفید ہر ایک ۹ گرام، تخم کشنیز خشک، اصل الوس، خبازی، برگ بادریجہ ہر ایک ۶ گرام، انجیر زرد ۳ دانہ، سپستال ۵ دانہ، عذاب ۶ دانہ، جلد دواؤں کو الیڑ پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح کو جوش دیں جب جو تھائی حتمہ پانی رہ جائے تو چھان کر مصری، شہد مصفی ہر ایک ۲۵ گرام ملا کر قوام بنائیں اور اتار لیں۔ اس کے بعد پوست بیلہ زرد، پوست بیلہ کابی، ہیلہ سیاہ، گل منڈی ہر ایک ۱۲ گرام، آملہ ۹ گرام، زعفران ۳ گرام، سقمونیہ مشوی، بہمن سفید، کشتہ قلعی، کشتہ مرجان، صمغ عربی ہر ایک ۶ گرام، سفوف کرنے لائق دواؤں کا سفوف اور باقی دواؤں کو ملا کر معجون بنائیں اور ۶-۳ گرام کھلائیں۔

ضغطہ دماغ

CEREBRAL COMPRESSION

اس مرض میں قحف پر غیر معمولی دباؤ پڑنے سے جوہ دماغ کسی مقام پر نہ بچ جاتا ہے۔ اور عصبی مسائل غیر طبعی طور پر بند ہو جاتے ہیں جس سے دماغی قوتوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔
_____ مرضی علامات چوٹ لگنے عصبی دباؤ کے فوراً بعد سے ۲۴ گھنٹہ کے اندر نمایاں ہوتی ہیں۔

اسباب

(I) ضربہ و سقط کے نتیجہ میں قحف کا دب جانا

(II) دماغی عروق کا انشقاق، نزف الدم

(III) قحف کے اندرون میں غیر طبعی رطوبت کا اجتماع

(IV) سلو

(V) کیہ

مریض پر سکتہ جیسی بے خودی اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور وہ بے حس و حرکت
علامات | پڑا رہتا ہے، تنفس خراٹے سے آتا ہے۔ پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور روشنی
سے متاثر ہو کر چھوٹی نہیں ہوتیں، نبض بلی اور ممتلی چلتی ہے، بعض اوقات بے ہوشی میں ہی
پیشاب، پاخانہ نیک خارج ہو جاتا ہے اور شدید عوارض میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
ملحوظ رہے کہ مرض کی علامات ۲۴ گھنٹہ کے اندر یا دو، چار گھنٹہ بعد تک رونما ہو سکتی ہیں۔
ضبطہ دماغ اور ترعزع دماغ کی تفریقی علامات ترعزع دماغ کے ذیل میں تحریر کی گئی ہیں۔

اصول علاج | قحف کے لوٹ جانے کی صورت میں عمل بالید Operation کریں۔

_____ سلو و کیہ اور دماغی عروق کے انشقاق میں دوائی علاج کسی قدر ہی سودمند ہے۔

اس لیے اس میں بھی مقدور بھر عمل بالید کو ہی ترجیح دیں۔
 • غیر طبعی رطوبت کے اجتماع کی صورت میں منفعیات و محلات استعمال کرائیں۔
 علاج — قحط پر شدید چوٹ لگنے اور ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کی صورت میں جراحت
 ضروری ہے اس کے بعد مسکنات اور فومات دے سکتے ہیں — عمل بالید
 Operation کی تفصیلات علم الجراحت کی کتابوں میں ملاحظہ کریں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman


امراض نخلع (ب)

Learn Unani By Abdul Waris Salman

التهاب نخاع

MYELITIS

اس مرض میں جرمِ نخاع کے تمام اجزاء مثلاً عروق و مویہ عصبی غلیات، ریشے اور عصبی سریش وغیرہ میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے طبعی افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔



التهاب نخاع کی (ح) حاد [اور] (م) مزمن اقسام ہی زیادہ مشہور ہیں۔

اسباب

امراضِ راس :-

(I) کزاز

(II) ریشہ

(III) پشت یا کمر پر چوٹ لگنا، جس سے نخاع متاثر ہو جائے۔

(IV) تزغزع نخاع

(V) نخاع کی مجاری میں اجتماعِ خون

لہ Mylon یونانی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی مغز [نخاع] کے ہیں اور "Tis" التهاب کی نشاندہی کرتا ہے۔

«التهاب الغشيه نخاع

امراض قطن :

(I) قروح قطن

(II) پشت کے مہروں کی بوسیدگی

(III) سرطان قطن

(IV) فقرات کا ورم حار (التهاب غظمی)

(V) مہروں کا ٹل جانا

(VI) غارہی بروودت و رطوبت

عادر/متعدی امراض :

(I) آتشک

(II) سل

(III) جدری

(IV) حصبہ

(V) جد رین دسانی کے بعد

(VI) ورم اصل الاذن

(VII) طاعون

(VIII) حمی محرقة

(IX) شدید سوزاک

(X) سرخبادہ

(XI) انف العنزہ

سمیات و ادویات

(I) سلفونامائیڈ

(II) کاربن مونو آکسائیڈ

(III) مابعد نخاعی ہستیسیا

(IV) آرسینک

Post-Vaccination

تشبی امراض:

Anterior Polio Myelitis

(I) التهاب نخاع فالجی تقدم

Herpes Zoster

(II) نملہ منطقی

Lymphocytic Choriomeningitis

(III) لمفاوی التهاب مشی دمانی

متفرقات:

(I) وجع المفاصل

(II) نامعلوم اسباب

(III) التهاب مثانہ

(IV) تقیح الدم

علامات

التهاب نخاع مقامی:

التهاب نخاع کی یہ صورت کثیر الوقوع ہے، اس میں نخاع کا کوئی حصہ مکمل یا نامکمل طور پر ناقص نعل انجام دیتا ہے یا اس کا نعل ہی باطل ہو جاتا ہے، چنانچہ گردن، پشت، کمر وغیرہ کے نخاعی حصہ کے مآوف ہونے سے اطراف میں سنسناہٹ اور درد کا کمر میں درد ہوتا ہے، اطراف میں ہزائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی حس زائل ہو جاتی ہے، سردی لگتی ہے اور زیریں اطراف مفلوج ہو جاتے ہیں۔

عنقی حصہ کے نخاع میں التهاب کی صورت میں اطراف، صدر، شکم اور عضلات تنفس مفلوج ہو جاتے ہیں، عسر البلع کی شکایت ہوتی ہے، ہچکی آتی ہے، درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، پتلیاں سکڑ جاتی ہیں، ضیق النفس اور شدت مرورت کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

پشت کے نخاعی حصہ میں التهاب کی صورت میں بالائی اطراف و اعضاء میں مرضی علامات مقصود ہوتی ہیں، زیریں اعضاء شدت سے متاثر ہوتے ہیں، احتباس بول ہوتا ہے، مثانہ مفلوج ہو جانے سے پیشاب کا ارادی اخراج باطل ہو جاتا ہے اور رودہ مستقیم کے مفلوج ہو جانے سے براز خطا ہوتا ہے۔ زیریں اعضاء کا حرکت دینا دشوار ہو جاتا ہے۔

قطنی حصہ کے نخاعی التهاب میں زیریں اطراف پرفالج کا اثر ہوتا ہے۔ حرکات معکوسہ زائل

ہوجاتی ہیں، بول و براز بے اختیار خارج ہوتا ہے۔

انتہاب نخاع منتشر:

یہ کیفیت دفعتاً رونما ہوتی ہے، اس میں نخاع کے تمام اجزاء میں انتہائی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے علاماتی طور پر پہلے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ اور ضعف محسوس ہوتا ہے بعد میں اطراف مفلوج ہوجاتے ہیں، صدر، شکم اور پشت کے عضلات بھی مفلوج ہوجاتے ہیں۔ ان مقامات کی قوت حس زائل ہوجاتی ہے اور معکوسی حرکات بھی غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہیں، احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے، اس کے برخلاف براز بے اختیار خارج ہوتا ہے، درجہ حرارت ۱۰۲-۱۰۴ تک ہوجاتا ہے اور دم گھٹنے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔

التمہاب نخاع عدوی:

یہ مرض عام طور سے متعدی امراض کے بعد ایک بیک نمودار ہوتا ہے، اس میں شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے اور بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے، شفا یابی کی صورت میں رفتہ رفتہ ہوش آجاتا ہے، تاہم ہاتھ پیروں میں ناطاقتی ہوتی ہے، ریشہ اور تشجج کی شکایت ہوتی ہے، چال میں لڑکھڑاہٹ اور تکلم میں لکنت اور گنگناہٹ ہوتی ہے، شدید عوارض میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوجاتا ہے، نقطہ اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے، کمر میں درد، پیروں میں جھنجھناہٹ اور سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے، بیشتر اوقات تے بھی آتی ہے، بعد میں زیریں اطراف میں فالج یا استرفار ہوجاتا ہے۔

تفریقی علامات

التمہاب اشمیہب قرن مقدم نخاع

Polio-Myelitis Anterior

- ۱۔ عضلات مامرہ طبعی حالات میں ہوتے ہیں
- ۲۔ حس طبعی ہوتی ہے یا کسی قدر نقص ہوتی ہے
- ۳۔ الم تضیق نخاع قطنی نہیں ہوتا
- ۴۔ زخم بستی نہیں ہوتا
- ۵۔ پیشاب طبعی ہوتا ہے
- ۶۔ عضلات میں تھمور بہت جلد نمایاں ہوتا ہے۔

التمہاب نخاع

Myelitis

- ۱۔ عضلات مامرہ مفلوج ہوتے ہیں
- ۲۔ بطلان حس ہوتا ہے
- ۳۔ الم تضیق نخاع قطنی ہوتا ہے
- ۴۔ زخم بستی ہوتا ہے
- ۵۔ پیشاب انقباضی ہوتا ہے
- ۶۔ عضلات میں تاخیر سے کموری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ مرض کا حملہ بالعموم ۱۰-۱۲ سال کے درمیان یا اس سے کم میں ہوتا ہے، متنازعہ و نادر ۱۳ سال کے بعد بھی ہوتا ہے۔	۸۔ مرض کا حملہ بالعموم ۱۰-۱۲ سال کے درمیان ہوتا ہے
---	--

اصول علاج

- ۱۔ مکمل آرام و سکون کا نظم کریں۔
- ۲۔ عضلات میں تشنج، صلابت، ہیجان، کیفیت، ذکاوت حس اور شدید انقباضی حرکات کی موجودگی میں امالہ کی تدابیر اختیار کریں۔
- ۳۔ فالج کی صورت میں، فالج کے اصول علاج کو اختیار کریں۔
- ۴۔ عوارض میں تخفیف کی صورت میں نخاع کے فعل کو تیز کرنے والی دوائیں دیں
- ۵۔ زخم بتری سے بچانے کے لئے مریض کو نرم بستر پر لٹائیں
- ۶۔ التهاب نخاع مزمن میں تقویت پہنچانے کی تدابیر اختیار کریں

علاج

- ۱۔ التهاب اغشیہ نخاع میں مستعمل ادویہ استعمال کرائیں
- ۲۔ منوم کے طور پر شیرہ دوار المجنون ۳ گرام، شیرہ قلعہ سیاہ دانہ، پانی ۶ ملی لیٹر، شربت نیلوفر ۲۲ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں
- ۳۔ قبض کی صورت میں سنار می ۱۲ گرام، مار المجنون ۵، ۷ ملی لیٹر میں جوش دے کر شربت دینار ۲۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں
- ۴۔ پیشاب لانے کے لئے قانا طیر استعمال میں لائیں
- ۵۔ تقویت کے لئے کشتہ قولاد یا کشتہ خشت الحدید ۱۳۵ ملی گرام ہمراہ معجون اذراقی

کھلائیں

- ۱۔ سر پر گرم، گرم کھویا باندھیں
- ۲۔ کانور، برگ گلو، سبز، برگ کاشنی وغیرہ اور سوزش و درد کم کرنے والی ادویہ کا ضما د کریں

۔۔۔ درج ذیل نسخہ نوش کرائیں

نسخہ:

گل نیلوفر، گل بنفشہ، تخم کاسنی، تخم خیارین، تخم خطمی، ہر ایک ۵ گرام، گاؤ زبان ۸ گرام،
عناپ ۵ عدد — تمام دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر
شریت بنفشہ / گلقدار ۲۲ گرام ملا کر نوش کرائیں۔ پانچویں دن اسی نسخہ میں ترنجبین، شیرخشت،
مفر قلوںس خیار شنبہ وغیرہ شامل کر کے تلین کریں۔
۔۔۔ زمانہ انتہا میں درج ذیل قیروطی ملیں۔

نسخہ:

گل بابونہ، اکلیل الملک، تخم خطمی، تخم کتاں، پر سیاوشاں ہر ایک ۲۴ گرام، ۵۰ ملی لیٹر
پانی میں جوش دے کر مل چھان کر روغن بابونہ ۱۲۰ ملی لیٹر کے ہمراہ پھر پکائیں۔ جب پانی جل کر
صرف تیل باقی رہ جائے تو اس میں موسم سفید ۲۰ گرام بگھلا کر قدر سے زعفران ملا کر متاثرہ مقام پر
مالش کریں۔

التهاب نخاع حاد

ACUTE SPINAL MENINGITIS

اس مرض میں اغشیۃ نخاع میں شدید التهاب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نادر الوقوع مرض ہے
عورتوں کی نسبت مردوں میں ۲-۷ یا ۲۰-۲۵ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے

اسباب

امراض واس

(I) درم اغشیۃ دماغ

(II) کزاز

(III) ریشہ

(IV) مادہ آتشک کا حرام مغز [نخاع] تک سرایت کر جانا

(V) زخم بستی کا نخاع تک سرایت کر جانا

حاد/متعدی امراض:

(I) سرخبادہ

(II) حمی محرقة

(III) حمی قمریہ

(IV) سل

(V) آتشک

(VI) ذات السریہ

(VII) حمی نفاسیہ

متفرقات:

(I) وجع المفاصل

(II) برودت

(III) ضرر قطن

(IV) مہروں کا گل جانا

علامات

مرضی علامات بتدریج رونما ہوتی ہیں، ابتداء میں سرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، کمر ب اور بے خوابی ہوتی ہے، پشت میں سرزہ کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، جو کبھی ایک مقام میں محدود ہوتا ہے اور کبھی ساری پشت میں پھیلا ہوتا ہے، معمولی تحریک سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک اطراف تک پہنچتی ہے، نخاع کے متورم حصہ سے خارج ہونے والے اعصاب جن اعضاء تک جاتے ہیں، درد کا احساس وہاں تک پہنچتا ہے۔ عضلاتی عراض سے ہاتھ، پیر، پشت، شکم اور گردن کے عضلات تشنج ہونے لگتا ہے، بعض اوقات کمر اور خلفی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، سینہ اور اطراف کے عضلات

میں اختلاجی کیفیت رونما ہوتی ہے، اطراف کے عضلات میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور کسی قدر حرکت کی قوت بھی متاثر ہوتی ہے۔

بطون اغشیہ نخاع میں التهاب کی صورت میں رطوبات کا ترشح بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجہ میں پیر مغلوج ہو جاتا ہے ترشح کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ فالج بالائی جوارح میں ترقی کرتا جاتا ہے، شدت عوارض میں دم گھٹنے لگتا ہے، اعضاء کی حرکات معکوسہ زائل ہو جاتی ہیں، مریض کمزور ہو کر اور کبھی ہڈیاں اوسلے ہوشی کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ بند ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زخم بتری ہو کر اور متغصن اسہال کے بعد مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

گردن کے پاس کے نخاعی اجزاء میں التهاب کی صورت میں گردن پیچھے کی طرف کھنچ جاتی ہے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، یہی صورت کمزور خلی کبلائی ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، بکلیاں یکساں نہیں رہتیں اور شدید بخار ہوتا ہے۔ اس مرض کا خاتمہ بالعموم بُرا ہوتا ہے اور ۳۸ — ۲۸ دن میں موت واقع ہو جاتی ہے۔

مقام پشت پر شدید درد محسوس ہونا اور دردی ٹیس کا ماتھ پیروں تک پہنچنا، حس کا ذکی ہونا، عضلات کا سکڑنا اور مثانہ و معار مستقیم کا مفلوج ہو جانا اس مرض کی تشخیصی علامات ہیں۔

تفریقی علامات

التهاب نخاع	التهاب اغشیہ نخاع
۱۔ دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے	۱۔ حرکت سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے
۲۔ اعصاب کی رفتار پرالم ناخند نہیں ہوتا	۲۔ اعصاب نخاعی کی رفتار پرالم ناخند ہوتا ہے
۳۔ تشنج طویل نہیں ہوتا	۳۔ پشت اور دیگر عضلات میں طویل تشنج ہوتا ہے
۴۔ پیشاب انقلی ہوتا ہے	۴۔ فالج کے نمایاں نہ ہونے تک پیشاب طبعی ہوتا ہے۔
۵۔ ماؤف حصوں میں بطلان حس ہوتا ہے	۵۔ جلدی ذکاوت حس ہوتی ہے
۶۔ حرارت ہمیشہ طبعی یا کسی قدر زیادہ ہوتی ہے	۶۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے
۷۔ مرض کی مدت طویل ہوتی ہے	۷۔ مرض کی مدت قصیر ہوتی ہے
۸۔ فالج زیریں اطراف کا ہوتا ہے	۸۔ فالج اوسط درجہ کا ہوتا ہے

التهاب الغشائية نخاع

- ۱۔ زخم کی سرگزشت نہیں ملتی
- ۲۔ چہرہ کی کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی
- ۳۔ علامات فکری ظاہر نہیں ہوتیں
- ۴۔ حرکت سے خدیر درد ہوتا ہے
- ۵۔ حرکت سے تشنج ہوتا ہے
- ۶۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے
- ۷۔ تشنج کے بعد فالج ہوتا ہے

عزاز

- ۱۔ زخم کی سرگزشت ملتی ہے
- ۲۔ تبسم کزازی ہوتا ہے
- ۳۔ انطباق فلکین ہوتا ہے
- ۴۔ حرکت سے ذکات حس خدیر ہوتی ہے
- ۵۔ بیرونی خراش سے تشنج مارض ہوتا ہے
- ۶۔ حرارت قریباً طبعی ہوتی ہے
- ۷۔ فالج نہیں ہوتا

اصول علاج

- راحت کے اسباب فراہم کریں اور مریض کو چیت یا کمرٹ پر لٹائیں
- ہیجانی کیفیات، عضلاتی صلابت وغیرہ صورت میں امالہ کی تدریجاً مسہلات، ملینات، عمرات اور حنفہ وغیرہ استعمال کرائیں
- ضعف کو ختم کرنے کے لئے مقوی قلب اودیہ و افغیرہ کھلائیں
- نخاع کی کارکردگی کو بہتر بنانے والی دوائیں استعمال کرائیں
- زخم بستری کے امکانات کے تدارک کے لئے نرم بستر ہر لٹائیں اور کمرٹ بدلتے رہیں۔

علاج

- مریض کو چیت یا کمرٹ سلائیں اور نرم و گداز بستر کا نظم کریں نیز زخم بستری کے تدارک کے لئے احتیاطی طور پر کمرٹ بھی بدلتے رہیں، ویسے نرم و گداز بستر پر زخم بستری کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔
- تقویت کے لئے کشتہ فولاد رکتہ خبث الحیدر ۱۲۵ ملی گرام ہمراہ معجون اذراقی ۵ گرام کھلائیں

نزف نخاعی

HAEMATOMYELIA

اس مرض میں نخاع سے جریان خون ہوتا ہے۔ یہ ایک نادر الوقوع مرض ہے اور نزف دماغی سے حیرتناک تضاد ظاہر کرتا ہے۔

اسباب

- (I) عنقی خشوکہ
- (II) پاؤں اور سر کے بل گرنا
- (III) کثرت ریاضت
- (IV) مہروں کا گل جانا
- (V) عروق دموئی کی ساخت میں شیمی فساد واقع ہونا
- (VI) تلیسین نخاع

پہر براہ راست چوٹ لگنا

علامات | مجری نخاع میں جریان خون کی صورت میں یک نخت، پشت میں شدید درد ہوتا ہے، جس کے سبب مریض پر کسی قدر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پیسروں میں جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد پیڑ متانہ اور معار مستقیم کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں، غشاء عنکبوتی کی فضاؤں میں شدید نزف دم کی صورت میں پشت اور سروں میں شدید درد ہوتا ہے اور کچھ عرصہ بعد فالج نصفی مارض ہو جاتا ہے، اور بعد میں تشنجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

نخاع کے بالائی حصہ میں نزف کی صورت میں قلب کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، چنانچہ قلب کا فعل سست ہو جاتا ہے، تنگی نفس کی شکایت ہوتی ہے، جسم سرد — اور رنگ بھیکا پڑ جاتا ہے تاہم مریض کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔

قلیل نزف کی صورت میں فالج آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے اور شدید نزف کی صورت میں مریض فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، بصورت دیگر تلیسین نخاع کی شکایت

ہو جاتی ہے۔ اگر مریض ابتدائی چند گھنٹوں تک زندہ رہ جائے تو آوی ضرر سے موت سناذ ہی واقع ہوتی ہے، ممکن ہے اس کے بعد بولی عفونت یا زخم بستری موت کا باعث بن جائے، بہر حال تقریباً بیشتر مالتوں میں کسی قدر شفا یا بی کی توقع کی جاسکتی ہے اور ابتدائی مراحل میں اصلاح کی رفتار سے ایک حد تک آخری انداز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اصول علاج

- ۔ مکمل استراحت کا نظم کریں
- ۔ مریض کو چیت لٹائیں — آبی توشک پر لٹانا زیادہ سودمند ہے
- ۔ دلک، ریاضت وغیرہ کم از کم تین ہفتے تک موقوف کر دیں۔
- ۔ مسکن دماغ ادویہ استعمال کرائیں
- ۔ پشت پر برف رکھیں اور اندرونی نرف کو روکنے کے لئے مرکبات انیون کھلائیں
- ۔ مفلطات خون استعمال کرائیں

علاج

- ۔ مفلط خون کے طور پر سنگجراحت، دم الاخوین، گمیر و ہر ایک ۱۲ گرام، خمیرہ خشخاش ۱۲ گرام کے ہمراہ صبح، شام کھلائیں
- ۔ اندرونی نرف کو روکنے کے لئے مرکبات انیون استعمال کرائیں


سلفہ نخاع

SPINAL TUMOUR

اس مرض میں جرم نخاع میں غیر طبعی افزائش ہو کر سلفہ پیدا ہو جاتا ہے جو مرضی عوارض کا باعث ہوتا ہے — یہ مرض شاذ و نادر ہوتا ہے۔

از روئے اسباب، متعدد اقسام ہیں، ذیل میں چند مشہور اقسام تحریر

اقسام | کی جارہی ہیں



اسباب |

اخلاط اربعہ:

(I) سودا

(II) صفرا

(III) بلغم

(IV) خون

حاد/متعدی امراض:

(I) آتشک

(II) تدرن

علامات |

نفس جو ہر نخاع میں سلفہ کی صورت میں عام طور سے استرخاد اور فسا لچ جیسی علامات رونما ہوتی ہیں، اور ان کی شدت و خفت کا انحصار جو ہر نخاع کے متاثر رقبہ پر ہے، چنانچہ اگر نخاع کے جملہ سالک متاثر ہوں تو موقوف نخاع کے زیریں اعضاء ہر دو جانب مکمل طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور ان میں ہزالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر نخاع کے دائیں یا بائیں جانب وہ مرھ ہو تو ایک ہی طرف کے عضلات مفلوج ہوتے ہیں۔

افشیہ نخاع میں سلفہ کی صورت میں اعصاب کے مبادی متاثر ہوتے ہیں، جس سے قوت حس یا قوت حرکت، یا دونوں قوتیں باطل ہو جاتی ہیں اور متعلقہ اعضاء کے عضلات میں ہزال پیدا ہو جاتا ہے۔

سلفہ کی وجہ سے بعض اوقات مقام متاثر بر شریہ درد ہوتا ہے جو کم و بیش ہمیشہ قائم

رہتا ہے، کبھی آپ بے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اصول علاج

- درد کی شدت میں مسکنات درد استعمال کرائیں
- تسخنج کی صورت میں مسکنات اعصاب استعمال کرائیں
- مادہ کے مالہ کی تدابیر اختیار کریں
- منومات استعمال کرائیں
- محرکات استعمال کرائیں
- عمل بالیدہ Operation کریں

علاج

- تسکین درد کے لئے افیون اور اس کے مرکبات استعمال کرائیں
- برشعشاء اور دواء الشفا بھی سود مند ہے
- معدہ و امعاء کے تنقیہ کے لئے غصیف مسہلات مثلاً مرئی ہلبلہ اور اطریفلات استعمال کرائیں

ہزال ظہریؑ

TABE DORSALIS

اس مرض میں نخاع کے قائمہ موخر میں صلابت اور قائمہ جانیہ میں اتری یا نقص واقع ہو کر قرن مقدم تک پہنچ جاتا ہے، جس کے سبب ارادی اعصاب کی حس اور طاقت ماؤف ہو جاتی ہے۔ یہ مرض آشکی سرایت کے بعد ۸-۱۲ سال کے درمیان بالخصوص اور مردوں میں بالعموم پایا جاتا ہے۔

لہ اس کا دوسرا نام ہزال نخاعی ہے۔

اسباب

(I) آتشکی سمیت

(II) ضعف اعصاب

(III) بجزرت دماغی محنت

(IV) مرع

(V) کثرت جماع

(VI) جلق

(VII) پشت کے بعض امراض

(VIII) برودت درطوبت

(IX) کثرت مے نوشی

(X) نقص تغذیہ

علامات مرض غیر محسوس طور پر شروع ہو کر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور بالعموم اس مرحلے میں مرض کی علامات غیر نمایاں ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات مرض کی علامات دفعتاً رونما ہوتی ہیں، مزمن صورت میں یہ مرض برسوں تک رہتا ہے، اور مریض اپنے معمول کے مطابق کم و بیش کام کرتا رہتا ہے۔ تفصیلی سہولت کے پیش نظر اس مرض کے علامتی تغیرات کو تین درجوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے

درجہ اول: ابتداء میں ذرا سی محنت اور جسمانی تحریکات سے تکان محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات اطراف یا جسم کے دوسرے حصوں میں درد ہوتا ہے، درد کی نوعیت تشنجی یا دوری نشتری، حرقی اور برقی ہو سکتی ہے جو دفعتاً شروع ہو کر زائل ہو جاتی ہے۔ تاہم درو میں المیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اطراف اور شکم و صدر میں جھڑن سی محسوس ہوتی ہے، درد کی اس صورت میں آغاز عام طور سے معدہ سے ہوتا ہے جو پشت اور شکم کے دوسرے اعضاء تک پھیل جاتا ہے، تپے ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قوت بامرہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہے چنانچہ بھارت ناقص ہو جاتی ہے، پتلیوں کی یکسانیت ختم ہو جاتی ہے، قریب کی چیزوں کو دیکھتے وقت سکوڑ جاتی ہیں، روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں، بالائی پوٹے مسترخی ہو جاتے ہیں۔

قوت سامعہ بھی متاثر ہوتی ہے چنانچہ نقل سماعت کی شکایت ہوتی ہے، اتردار میں شہوانیت میں غیر معمولی اضافہ مشاہدہ میں آتا ہے، اس کے بعد جنسی خواہش پُر مردہ ہو جاتی ہے، نظام بول کے متاثر ہونے کی وجہ سے ابتداً پیشاب کھٹے وقت پریشانی ہوتی ہے اور وہ کھٹک کر خارج ہوتا ہے، بعد میں تقطیر البول یا احتباس البول عارض ہو جاتا ہے۔

درجہ دوم: اس مرحلے میں مرض مستحکم ہو جاتا ہے۔ پیروں میں ناہاتقی کی وجہ سے پیرے قابو ہو جاتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے دونوں پیروں کو جوڑ کر سیدھے کھڑے کرنے کی کوشش میں پیر ڈگمگائے لگتے ہیں اور بالآخر مریض گر پڑتا ہے۔ ویسے بھی چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور بغیر سہارے چلنا دشوار ہوتا ہے۔ تاریکی میں یہ عوارض زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ بعد ان عوارض میں اور بھی شدت آ جاتی ہے، مریض اپنا پر معمول سے زیادہ اٹھا کر بے اختیار دھب سے زمین پر مارتا ہے لیٹ کر آنکھیں بند کر کے ایک پیر کے انگوٹھے سے دوسرے پیر کے گھٹنے کو چھونے سے قاصر رہتا ہے، جلد کی حس میں غیر معمولی طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے، چنانچہ تلوؤں میں گدگدی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ سوئی چبھنے کا بھی احساس نہیں ہوتا، یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کمر میں کچھ بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور سے پیروں کی طرف دیکھے بغیر چلنا دشوار ہوتا ہے۔ ہزال کے بحران مادی میں شکم میں شدید درد، ترش ڈکاریں، قے، مغمض ہو سکتا ہے، پاخانہ کی حاجت کے باوجود اجابت نہیں ہوتی، بلکہ شدید قہض ہوتا ہے، ضعف مثانہ کی عام شکایت ہوتی ہے، پیشاب طبعی طور پر کھل کر نہیں آتا، مریض کو پیشاب کو روکنا دشوار ہوتا ہے، پیشاب میں دھار نہیں ہوتی، بلکہ تقطیر البول کی سی کیفیت ہوتی ہے، قوت باہ میں بھی ضعف آ جاتا ہے، بلکہ اثرات قوت زائل ہو جاتی ہے۔ قروح رونما ہونے لگتے ہیں، چنانچہ جسم کے مختلف اعضاء مثلاً تلوؤں، گھٹنے، کہنی اور کندھے پر ورم، بثور اور قروح ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مفاصل بے ڈول ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس درجہ میں مریض سالہا سال تک زندہ رہ سکتا ہے

درجہ سوم: اس درجہ میں مرض کا اثر ہاتھوں میں ہو جاتا ہے، چنانچہ ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں اور یہ عوارض شانہ تک محیط ہوتے ہیں، بعد میں سرگردن اور صدر کے عضلات بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے میں گفتگو اور تنفس میں دشواری ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ تمام جسم کے عضلات میں استرخائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دماغی افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور مریض ایک مضبوط معطل بن کر رہ جاتا ہے۔

اس مرض کا انجام عام طور سے خراب ہوتا ہے، آنکھ کے پردہ نورانی یا عصبہ مجوفہ میں نقص واقع ہونے کی وجہ سے بھارت زائل ہو جاتی ہے۔ علاج سے مریض ۷، ۸ سال تک زندہ رہ سکتا ہے، تاہم مرض بتدریج ترقی پذیر رہتا ہے اور بعد میں ذات الریہ، عضلات تنفس میں انقباض، فالج، استرخاء یا امراض کلیہ و مثانہ میں مبتلا ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ہزال نخاع سے مشابہ بعض امراض کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

التمہاب الشیمب قرون مقدم نخاع

- ۱۔ درو میں شدت نہیں ہوتی
- ۲۔ توازن قوت طبعی ہوتا ہے
- ۳۔ عضلات کا برقی انقباض معدوم ہوتا ہے
- ۴۔ فالج ہوتا ہے
- ۵۔ عضلات میں لاغری (ضمور) ہوتی ہے
- ۴۔ مفاصل متورم نہیں ہوتے
- ۷۔ بھارت موقوف نہیں ہوتی

هزال نخاع

- ۱۔ درد نہایت شدید ہوتا ہے
- ۲۔ توازن قوت کا فقدان ہوتا ہے
- ۳۔ عضلات کا برقی انقباض قائم ہوتا ہے
- ۴۔ فالج حقیقی نہیں ہوتا
- ۵۔ عضلاتی ضمور (عضلاتی لاغری) نہیں ہوتا
- ۴۔ مفاصل متورم ہوتے ہیں
- ۷۔ بھارت موقوف ہوتی ہے

اصول علاج

۔۔۔۔۔ عام طور سے اس مرض کا سبب آتشک قرار پاتا ہے، اس لئے آتشک کا اصول علاج اختیار کریں۔

۔۔۔۔۔ عوارض کے تدارک کی طرف غور و توجہ دیں اور ان کے اصول علاج کی طرف متوجہ ہوں۔

۔۔۔۔۔ رفع درد کی تدابیر کریں

۔۔۔۔۔ قے کا ازالہ کریں

۔۔۔۔۔ احتباس بول کی صورت میں ٹکڑے کریں، حسب ضرورت قائلطیر استعمال کریں

۔۔۔۔۔ بے خوابی رفع کرنے کے لئے معومات اور مسکنات استعمال کرائیں

۔ کثرت جماع کی صورت میں لقوی اعصاب اور یہ واقعہ یہ استعمال کرائیں

علاج


- ۔ کثرت جماع کی صورت میں لبوب کبیر، معجون فلاسفہ کھلائیں
- ۔ برودت کی صورت میں معجون فلاسفہ، جوارش جالینوس اور اطر فیفل اسطوخودوس کھلائیں اور خارجی طور پر روغن دارچینی، روغن سرخ اور روغن قسط وغیرہ کی مالش کریں۔
- ۔ جب ہیدوار، برشتشا، بطور منوم و مسکن استعمال کرائیں
- ۔ اس مرض کا اہم سبب آتشک ہے، اس لئے آتشک کے علاج کی طرف توجہ دیں۔

تصلب نخاع

SPINAL SCLEROSIS

اس مرض میں، التهاب نخاع کے زائل ہونے کے بعد وہاں کی نسج و اصل Connective Tissue کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک غیر طبعی حجم پیدا ہو جاتا ہے اور آخر میں ساخت کے سکڑ جانے کی وجہ سے صلابت پیدا ہو جاتی ہے جس کے دباؤ سے اصل عصبی ساخت کمزور، ناقص بلکہ بعض اوقات فاسد ہو جاتی ہے اور نخاع کی طبعی کارکردگی پر خراب اثر پڑتا ہے۔

اقسام | مقام مرض، نوعیت صلابت کے اعتبار سے اس کی متعدد اقسام ہیں تاہم ذیل میں اس کی چند مشہور اقسام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے



لہ اس مرض میں نخاع کے قائمہ نمونہ میں صلابت لاحق ہو جاتی ہے۔

اسباب

(I) اعتناق المرحم

(II) طبعی درد

(III) سردی و بھری اختیار کرنا

(IV) انفعالات نفسانیہ

(V) حیاتِ عارہ

(I) حمی قمریہ

(II) ہیضہ

(III) حمی معویہ

(IV) تشنگ

علامات

تصلب اور **تعاشی انتقائی**: آرام اور استراحت کے وقت ہاتھ کانپتے ہیں، چنانچہ ابتداء میں ہاتھ میں لرزہ اور کپکپی ہوتی ہے اس کے بعد ضعف ہو جاتا ہے، آنکھیں بلا ارادہ متحرک نہیں ہو پاتیں۔
تصلب متعدد: مرض کی علامات کا انحصار صلابت کے مقام، نوعیت اور منتشر صلابت پر ہوتا ہے، ابتداء میں چلنے پھرنے میں ضعف محسوس ہوتا ہے، اعضاء میں درد ہوتا ہے، سر اور اطراف کام کے وقت مرتعش ہوتے ہیں، استراحت کی حالت میں ارتعاش معدوم ہو جاتا ہے، لیکن بستر سے اٹھتے ہی ارتعاش عود کر آتا ہے، کسی چیز کو اٹھاتے وقت ہاتھوں کی کپکپاہٹ بہت نمایاں ہوتی ہے۔

۱۔ اس مرض میں نخاع کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے، گول، سخت اور کسی قدر سخت نقطے پیدا ہو جاتے ہیں اور مرضی حواریں رونما ہوتے ہیں۔ یہ مرض اعتناق المرحم کی مریضہ میں کثیراً وقوع ہے۔

۲۔ اس مرض میں نخاع قائمہ جانبیہ کے سفید جوہر میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور صلابت کا اثر طول میں ہوتا ہے

۳۔ اس مرض میں نخاع کے قائمہ مؤخرہ اور خلی جوہر میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ماحیثیت اسباب

ہونے نامعلوم ہیں۔

گفتگو بہت مختصر ہوا۔ ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ ادا کرتا ہے، آنکھیں کسی ارادے کے بغیر ناچتی رہتی ہیں، کچھ عرصہ بعد ضعف ہو کر مریض بستر سے لگ جاتا ہے۔ بطلان اشتہاء، اسہال اور انتہا مثانہ کی شکایت ہوتی ہے، نبض فی منٹ ۱۰۲-۱۰۴ ہوتی ہے، بعض اوقات مریض پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور زخم بستی ہو کر مریض ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔

تصلبِ جانی: ابتداء میں مریض نقل و حرکت کے بعد بہت جلد تھک جاتا ہے، ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں، انعکاس رکبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اضطراب قدمی رونما ہوتا ہے، مریض سنبھل سنبھل کر چلتا ہے تاہم اس حالت میں بھی ٹانگیں اکڑی رہتی ہیں، دونوں زانو کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے پھر مریض پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے، اس کے بعد زانو کے مغللات مقربہ میں صلابت اس قدر نمایاں ہو جاتی ہے کہ ان کا علیحدہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ استراحت کی حالت میں ٹانگیں پکڑ کر ہلانے سے کسی قدر نرم معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد دفعتاً اس میں جھٹکا ہوتا ہے اور وہ حسب سابق اکڑ جاتی ہیں، اس مرض کی رفتار نسبتاً تیز ہوتی ہے اور بالعموم دو، تین سال میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

ارتعاش و دانی: مریض کی رفتار خمور کی سی ہوتی ہے، ہاتھوں کو بے قاعدگی سے جھٹکا دے کر ہلاتا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے وقت اس کی کیفیت پھوٹے بچوں جیسی ہوتی ہے چنانچہ ہاتھ کبھی اس طرف پڑتا ہے اور کبھی اُس طرف، اور پھر دفعتاً اس کو شدت سے پکڑ لیتا ہے، بیٹھنے کی حالت میں سر ہلتا رہتا ہے، آنکھیں غیر ارادی طور پر پھرتی رہتی ہیں، گفتگو کا انداز تھلپ تھلپ کے مریض جیسا ہوتا ہے، آخری ایام میں پاؤں بد وضع اور مغللات مفلوج ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو اور اوائل عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

ذیل میں اس کی چند تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تصلبِ نخاع	فالجِ اہتزازی
۱۔ نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے	۱۔ معمر لوگوں میں کثیر الوقوع ہے
۲۔ سکون و استراحت کی حالت میں رعشہ	۲۔ رعشہ دغلی مسلسل رہتا ہے
مفلوج و ہوتا ہے	
۳۔ سر ہلتا ہے	۳۔ سر ہلتا ضرور ہے تاہم اس میں شدت نہیں ہوتی

- | | |
|--|---|
| ۳۔ انداز گفتگو اور آواز میں فرق آجاتا ہے | ۳۔ انداز گفتگو طبعی ہوتا ہے تاہم آواز ضعیف ہو جاتی ہے |
| ۵۔ مرض کی ابتداء عام طور سے زیریں اطراف سے ہوتی ہے | ۵۔ مرض کی ابتداء بالائی اطراف سے ہوتی ہے |
| ۶۔ حرکت ارادی اختیار سے باہر ہوتی ہے | ۶۔ حرکات ارادی ہو سکتی ہیں تاہم ریشہ ہوتا ہے |
| ۷۔ انقباض وتریں غیر معمولی ہوتا ہے | ۷۔ انقباض وتریں طبعی ہوتا ہے |
| ۸۔ مریض کا رجحان چلنے میں آگے دوڑنے کی طرف نہیں ہوتا | ۸۔ چلنے میں آگے دوڑنے کی طرف رجحان ہوتا ہے |
| ۹۔ مریض کے مزاج میں چڑچڑاہٹ در آتا ہے | ۹۔ مریض کا ہوش و حواس درست ہوتا ہے |
| ۱۰۔ ہیئت وجہی عام طور سے طبعی ہوتی ہے | ۱۰۔ چہرہ کی وضع و ہیئت مخصوص طہرج کی ہو جاتی ہے |

تفریقی علامات

- | | |
|--|--|
| ۱۔ نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے | ۱۔ داء الرقص |
| ۲۔ ارادی حرکات اختیار سے باہر ہوتی ہیں | ۲۔ بچوں میں کثیر الوقوع ہے |
| ۳۔ انقباض وتریں غیر معمولی ہوتا ہے | ۳۔ ارادی حرکات اختیار میں ہوتی ہیں تاہم ان میں نظم نہیں ہوتا |
| ۴۔ کوشش کرنے پر حرکات میں کسی قدر کمی آجاتی ہے | ۴۔ انقباض وتریں طبعی ہوتا ہے |
| ۵۔ سکون و استراحت کی حالت میں ریشہ معدوم ہوتا ہے | ۵۔ کوشش کرنے پر ارادی حرکات میں اور بھی عدم نظم ہوتا ہے |
| ۶۔ حرکات کی رفتار یکساں ہوتی ہے | ۶۔ استراحت اور نیند کی حالت میں بھی ریشہ ہو سکتا ہے |
| ۷۔ دونوں جانب یکساں طور پر مآؤف ہوتی ہیں | ۷۔ حرکات غیر منظم اور جلد بلد تغیر پذیر ہوتی ہیں |
| | ۸۔ عام طور سے ایک جانب محدود علامت یکساں نہیں ہوتیں۔ |

تفریقی علامات

تصلب، جانبی ضمور و عصبی	تصلب نخاع
۱۔ انقباض و تری میں کسی قدر ہی اضافہ ہوتا ہے	۱۔ انقباض و تری میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوجاتا ہے
۲۔ عضلی ضمور نمایاں ہوتا ہے	۲۔ عضلی ضمور نمایاں نہیں ہوتا
۳۔ ارادی حرکات میں نظم ہوتا ہے	۳۔ ارادی حرکات اختیار سے باہر ہوتی ہیں
۴۔ عضلات میں انقباض لیقیبہ صغیرہ ہوتا ہے	۴۔ عضلات میں انقباض لیقیبہ صغیرہ معلوم ہوتا ہے
۵۔ ہوش و حواس درست ہوتے ہیں	۵۔ ہوش و حواس میں خلل واقع ہوتا ہے
۶۔ انگلیوں اور انگوٹھوں میں پرندے کے پنجے کی مانند تغیر ہوتا ہے	۶۔ انگلیوں میں پرندے کے پنجے کی مانند تغیر نہیں ہوتا
۷۔ صلابت ہوتی ہے	۷۔ متاثر حصہ میں صلابت نہیں ہوتی

اصول علاج

- ۱۔ ملینیات استعمال کرائیں
- ۲۔ ترطیب جسم، خاص طور سے ترطیب نخاع کی تدبیر کریں
- ۳۔ آتشک کی صورت میں، اس کا علاج کریں

علاج

- ۱۔ یہ مرض ہنوز لاعلاج ہے، تاہم تلین، ترطیب وغیرہ سے کسی قدر فائدہ ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ تقویت کے لئے دواء المسک، مقدر جواہر والی ۳ تا ۵ گرام کھلا کر عرق بادیاں، عرق گاؤریاں ہر ایک ۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

ضعف اعصاب

NEURASTHENIA

اس مرض میں عصبی نظام میں منتور واقع ہوجاتا ہے جس سے اس کے افعال اور قوائے حیات میں ضعف پیدا ہوجاتا ہے۔

اسباب

- (۱) ضعف جسمانی
- (۲) غیر معمولی عیش و عشرت کی زندگی
- (۳) نازک اندامی / نازک مزاجی
- (۴) دماغی محنت کی زیادتی کی نسبت اچھی اور حرارتی غذا کا فقدان / کمی
- (۵) کثرت مشاغل
- (۶) کثرت تفکرات و ترددات
- (۷) منشیات کا بجز استعمال مثلاً
- (۸) کثرت سے نوشی
- (۹) مدک
- (۱۰) افیون
- (۱۱) چرس / بھنگ
- (۱۲) کوکین
- (۱۳) ہیروئن
- (۱۴) اسمیک
- (۱۵) تمباکو
- (۱۶) محرکات مثلاً

د (I) کافی

د (II) چائے

د (III) تھوہ

د (IV) کوکو وغیرہ کا بھرت استعمال

د (IX) امراض مادہ:

د (I) حمی محرکہ

د (II) حمی دبائیہ

د (X) امراض مزمنہ:

د (I) سل

د (II) آتشک

د (III) ذیابیطس

د (IV) سرطان

د (V) سورہضم

د (XI) امراض اعضاء تناسل:

د (I) کثرت بجمعت / انعام بازی / کثرت احتلام

د (II) منشت زنی

د (III) سرعت انزال / ضعف باہ

د (XII) متفرقات:

د (I) اعصابی خراش

د (II) دوران خون کا نقص / تسمم

د (III) بدنی بد وضعی

د (IV) عصبی نظام میں کسی مرض کی وجہ سے تسمم

د (V) فقر الدم

د (VI) عظم غده درقیہ

علامات | ضعف جسمانی کی تمام علامتیں موجود ہوتی ہیں، مریض بیمار اور دبلا ہوتا جاتا ہے

چہرہ پھیکا اور بے رونق ہوتا ہے، مزاج میں جڑ جڑا پن غالب ہوتا ہے، پست ہمتی، احساس کمتری اور یریشاں خیالی ہوتی ہے، طبیعت میں کسی قدر توحش بھی ہوتا ہے، سرد، دوار اور نفل ہوتا ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، قوت فیصلہ کی صلاحیت جاتی رہتی ہے، کسی کام پر مکمل توجہ نہیں ہو پاتی، اور ذرا سا کام کرنے سے طبیعت اکتا جاتی ہے، بعض اوقات معمولی اعداد و شمار کی ضرب و تقسیم دشوار ہو جاتی ہے، ادھام و افکار کا، جوم ہوتا ہے، احساس کمتری کی وجہ سے مجلسوں اور محفلوں سے گریزاں رہتا ہے۔ اکثر اوقات یا فوخ (خند یا) میں گرانی اور حرارت کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں، بعض مریضوں کو سارے جسم سے یا کسی خاص حصہ سے بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، کمر میں درد محسوس ہوتا ہے، سینہ کی جلد سرخ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کمر، سینہ اور شکم پر انک نقطے پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی خاص حصہ جسم مثلاً یا فوخ، صدین یا کمر میں شدید درد ہوتا ہے، شدید جسمانی ضعف کی صورت میں معمولی محنت و ریاضت سے مریض کا دم پھولنے لگتا ہے اور وہ ٹدھال ہو جاتا ہے، خفقاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کثرت احتلام، ضعف باہ اور رقت منی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، بعض مریضوں میں یاس و ناامیدی کا احساس استفادہ کرتی کر جاتا ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور خود کشی تک کر سکتا ہے۔

اس مرض کا انجام عام طور سے امید افزا ہوتا ہے لیکن عوارض میں تخفیف مسلسل علاج کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، مکمل شفایابی بھی ہو سکتی ہے، تاہم ہلاکت کا تناسب بہت ہی معمولی ہوتا ہے، لیکن ہمارے دور میں منشیات کے بکثرت استعمال کے رواج نے اس مرض کی اہمیت کو ہستہ زیادہ بڑھا دیا ہے، لہذا اس کے تدارک کی طرف معالج کو بہت زیادہ حساس ہو کر توجہ ہونے کی ضرورت ہے،

رعشہ، لرزہ، منہ کی خشکی، اسہال اور بار بار پیشاب کی حاجت وغیرہ بھی اس کی اہم علامات ہیں۔

اصول علاج:

- اسباب اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں
- محرکات، منشیات اور ذہنی تفکرات سے آزادی بھی ایک بڑا علاج ہے
- مریض کے قوی کو مد نظر رکھتے ہوئے مفرجات و مقویات استعمال کرائیں

• بے چینی اور بے خوابی کو رفع کرنے کے لئے مسکنات استعمال کرائیں تاہم اس کا استعمال نہایت احتیاط کے ساتھ اور متعین مدت کے لئے ہی کریں۔

علاج

- تقویت اور مفرح کے طور پر —
- خمیرہ مروارید ۵ گرام ہمراہ عرق گاؤزبان استعمال کرائیں
- مفرح مروارید عنبری ۳ گرام کھلائیں
- دواء المسک معتدل بارو ۳ گرام حسب ضرورت کھلائیں
- - اطرافل اسطوخودوس ۷ گرام ہمراہ حسب ضرورت عرقیات، استعمال کرائیں
- - خمیرہ گاؤزبان عنبری جواہر والا ۵ گرام ہمراہ مناسب عرق استعمال کرائیں
- - خمیرہ مغز بادام شیریں ۵ دانہ، شیرہ تخم کاہو ۳ گرام، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں ۳ گرام، کشمش سبز ۵ گرام، تخم خنکاش سفید ۳ گرام، کنجد سفید ۳ گرام ہمراہ شیر گاؤزبان کرائیں، چند یوم بعد تخم خنکاش کو نسخہ سے خارج کر دیں۔
- - - مغز بادام شیریں ۵ دانہ، رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھلکا اتار کر پتھر پر گھس کر مکھن، ۵ گرام، کھانڈ، ۵ گرام، ورق نقرہ ۵ عدد ملا کر صبح کو کھلائیں، بہت مفید ہے۔

التهاب اعصاب

NEURITIS

اس مرض میں محیطی اعصاب کی نسج خاص میں التهابی یا فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے بالعموم ہاتھ، پیر کے محیطی عضلات یا بعض اوقات ہاتھ پیر، اور اعصاب جمجمہ متاثر ہوتے ہیں۔

اسباب

ادویات / سمیات:

(I) کثرت ے نوشی

Isomazid

(II) آئیسونائیزڈ

Nitrofurantion

(III)

Vincristine

(IV)

(V) سی

(VI) شکیا

(VII) سونا

Thallium

(VIII)

Acrylamide

(IX)

Inert Hydroxyl Phosphate

(X)

Carbon Disulphide

(XI)

N Hexane

(XII)

نقص / فقدان حیاتی:

(I) بیری بیری

(II) بلہ جرا

(III) حیاتی ب ۲ کی

استعداد نقص:

(I) ذویا بطیس

(II) نفرس

(III) اوزید

A. Toxology

(IV) کبر الاہراف

(V) نسیم بول ہرمن

تعدیہ:

- پیچیدگی کے طور پر

(I) خناق

(II) کزاز

(III) جمی تیفوڈیہ

(IV) زحیر

(V) ورم اصل الاون

(VI) حصہ

(VII) جدری

(VIII) الف العنزہ

(IX) تدرن

(X) سرسام

(XI) جذام

(XII) آتشک

متفرقات:

(I) وجع المفاصل

(II) وراثت

(III) سرطان خبیث

(IV) خارجی بردودت

علامات | ابتداءً تدریج ہوتی ہے، حدت کے وقت عصب کی رفتار کے متوازی، قریباً ہر وقت درد ہوتا ہے، شب میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، دردِ حاد، تحت الحاد، درخفیف، تینوں نوعیتوں کا ہو سکتا ہے، بدنی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزمن صورت میں درد باری کے ساتھ ہوتا ہے اور اعصاب کے دبائے سے درد میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں میں جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے، محیطی بے حسی اور پٹریوں میں دردناک تشنج

ہوتا ہے، انگلیوں یا پنجے کو پھیلانے والے عضلات میں استرخاء ہوتا ہے۔ بعض اوقات قصبی قدیمی اور عضلات قصبیہ صغریٰ مسترخ ہوجاتے ہیں، اس کے بعد خفیف ہزانی اور لاغری شروع ہوجاتی ہے، عضلات میں پھڑکن محسوس ہوتی ہے، اور تنہی انقباض ہوتا ہے، متاثرہ عضو متورم ہوجانا ہے اور بعض اوقات بے حسی اور فالج عارض ہوجاتا ہے

اصول علاج

- ۔ کئی کریں
- ۔ محمرات و مملات کا ضمد لگائیں
- ۔ ملنیا استعمال کرائیں
- ۔ عضو کو سکون بخشنے کا نظم کریں

علاج


- ۔ معجون مصفی خاص ۱۰ گرام صبح کو استعمال کرائیں، دوپہر میں جوارش آملہ ۱۰ گرام اور شب میں پوست سرخ ۱۰ گرام آب تازہ میں جوش دے کر نوش کرائیں
- ۔ باریان، پنج بادیان، چرائتہ تلخ، عشبہ مغربی، اسطوخودوس، سنبل الطیب
- ۔ ہر ایک ۵ گرام، پوست سرخ ۱۰ گرام، سورنجان ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں

وجع الاعصاب

NEURALGIA

اس مرض میں نفس اعصاب کی ستاخوں کے محاذی درد ہوتا ہے، اور مریض مضطرب و پریشان ہوجاتا ہے۔

اقسام ۱



اسباب ۱

سوء مزاج دم:

(I) خون کے ترکیبی اجزاء کا بگڑ جانا

(II) آتشک

(III) وجع المفاصل

(IV) نفرس

(V) ذیابیطس

(VI) سوء القینہ

عصبی / انعکاسی ہیجان:

(I) دانت کا لوسیدہ ہو جانا

(II) ٹہری کا مردہ ہو جانا

(III) سلعات

(IV) اکیاس

(V) اورام

(VII) خراجات

وراشت:

(I) موروئی طور پر والد/والدہ/والدین سے

عصبی امراض:

(I) امتناع الرحم

ضربہ وسقطہ:

(I) ضرب

(II) جرح

(III) بتر

متفرقات:

(I) کثرت حیض

(II) سیلان الرحم

(III) سل

(IV) ذات الجنین کے افادہ کے بعد

(V) سردی لگنا

علامات | عام طور سے درد نہایت شدید اور دوری و نوبتی شکل میں نمودار ہوتا ہے، متاثر مقام کی جلد کی احساس اور درد ناک ہوتی ہے، یہ درد ناک متاثر اعصاب کی شاخوں کے جلد میں پھیلنے کی صورت میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے، بعض اوقات درد کی کیفیت انعکاسی ہوتی ہے مثلاً حصہٴ مثانہ میں عصبی اشتراک کی وجہ سے نینین اور رانوں میں بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ اعصابی درد کی شدت کے لئے اگرچہ کوئی وقت متعین نہیں ہے تاہم عام طور سے شام کے وقت اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عصبی اتساع کی وجہ سے اگر کہنی کی اندرونی جانب عصب زبردی پر چوٹ یا دباؤ ڈالا جائے تو اس جگہ کے علاوہ کلائی میں درد ہوتا ہے اور دور انگلیوں میں جھنناہٹ/سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔

اسباب اور مقام کے اعتبار سے ہی ان کی علامتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لہذا اسباق میں مذکور کثیر الوقوع اور قلیل الوقوع انواع کی تفصیل ان امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔ تاہم شخصی نقطہ نظر سے اس قدر ضروری یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور سے عصبی درود، اعصاب کے متوازی اور اکثر اوقات ایک جانب نوبت کے طور پر، خفت یا شدت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور باری کے وقت شدید ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وقفہ کی حالت میں بالکل معدوم ہو جاتا ہے، متاثر مقام کی پرورش اور حرکت اور حس کی قوت میں بھی کسی قدر خلل واقع ہوتا ہے۔

اصول علاج

وجع الاعصاب کا معالجہ دو اصولی حصوں میں منقسم ہے

(I) اندرونی / داخلی علاج

(II) خارجی / مقامی علاج

داخلی علاج:

اس کے بھی دو اہم مقاصد ہیں

(I) ازالہ سبب

(II) تقویت بدن

خارجی / مقامی علاج:

(I) تھمید کریں

(II) اصول تنقیہ اختیار کریں

علاج

- ۔ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں۔
- ۔ وجع القطن کی صورت میں کمر پر سینک دیں، شگھیاں کھینچوائیں۔

بیشتر اقسام کا علاج اس نظام کے امراض کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے، یہاں صرف چند امراض کا علاج تحریر کیا جا رہا ہے۔

۔۔۔۔۔ روغن خردل یا روغن قسط کی 'کمر پیر مالتش کریں

نسخة قیروطنی:

• شہرہ خالص ۳۳ ملی لیٹر عرق بادیاں ۱۴۲ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

• عرق النساء میں مقام درد پیر و غن شفا کی مالش کریں۔

مریض کے قوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتداء میں باسلیق اور بعد میں عرق النسا کی

نقص کھولیں۔

— حسب ضرورت پنڈلیوں پر جونکیں لگائیں

— خندید درد کی صورت میں روغن شبت، روغن گل اور روغن کنجد کی مالش کریں

امراض نظام دوران خون

Learn Unani By Abdu Waris Salman

امراض نظام دوران خون

CIRCULATORY SYSTEM

اس نظام کے تحت روح حیوانی تمام جسم میں پہنچتی ہے اور بقا حیات کا باعث ہوتی ہے۔
اس نظام کے دو حصے ہیں۔

(I) قلب

(II) عروق دمویہ

(I) قلب:

تشریح:

قلب مخروطی شکل کا ایک جوف دار عضلی عضو ہے، اس کا قاعدہ (چوڑا حصہ) تقریباً وسط صدر میں واقع ہے اور اس کا رأس (زاویہ) بائیں طرف پٹا ہوا ہے، اس میں لمبائی میں ایک عضلی پردہ ہوتا ہے جو اس کے جوف کو دائیں، بائیں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر یہ دونوں حصے ایک عرضی پردہ کے ذریعہ مزید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قلب میں چار حصے یا خانے بن جاتے ہیں، جن میں سے دو خانے اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں، دونوں بالائی خانوں کو اذین (Auricles) اور زیریں خانوں کو بطنین (Ventricles) کہتے ہیں، دایان اذن دائیں بطن سے اور بایان اذن بائیں بطن سے ایک سو راخ کے ذریعہ ملتا ہے۔

(Z) دایان اذن (Right Auricles) :

یہ بائیں اذن (Left Auricles) کی نسبت بڑا تاہم دیواریں پتلی ہوتی ہیں، اس کا بہت سا حصہ جسم کے درمیانی خط کے دائیں طرف، عظم القص کے دائیں کنارے سے ذرا باہر چلا جاتا ہے، یہ قلب کا دایان کنارہ بناتا ہے

دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیان ایک کواڑی ہوتی ہے، جس کے تین پٹے ہوتے ہیں ان کو صمام ثلاثی الرؤس (Mitral Valve) کہتے ہیں، یہ صمام زیادہ تر چھا ہوتا ہے، اس کا بالائی سرا دائیں چوتھی غفروف ضلعی کے بالمقابل اور زیریں سرا دائیں طرف

کے پانچویں قص و ضلعی مفصل کے زیریں کنارے پر واقع ہے، اس پٹ کا فائدہ یہ ہے کہ دائیں اذن کا خون دائیں بطن میں آنے تو دیتا ہے تاہم بطن کے انقباض پر اذن میں واپس جانے نہیں دیتا۔

(II) دایاں بطن (Right Ventricle) : قلب کے سامنے کا بہت سا حصہ دایاں بطن بناتا ہے، اس کا زیریں کنارہ ساتویں قص و ضلعی جوڑنے سے شروع ہو کر راس القلب تک چلا جاتا ہے، اس کی شکل مثلث ہے اور دیواریں، بائیں بطن کی دیواروں کی نسبت دقیق ہوتی ہیں تاہم جوف، بائیں بطن کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ایک سو راج کے ذریعہ دائیں اذن کا وریدی خون اس میں آتا ہے جو شریان ریوی (Pulmonary Artery) کے ذریعہ بطن سے پھیپھڑے میں چلا جاتا ہے۔

دائیں بطن کے اختتام اور شریان ریوی کے ابتدائی حصہ میں ایک صمام ہوتا ہے، جس کو صمام ریوی (Pulmonary Valve) کہتے ہیں، یہ بائیں طرف کی تیسری غضروف ضلعی کے بالائی کنارے پر واقع ہے۔ اس کا نصف حصہ عظم النقص کے اور دوسرا نصف حصہ غضروف ضلعی کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دائیں بطن کے خون کو واپس بطن میں آنے سے روکتا ہے۔

(III) بائیں اذن (Left Auricle) : یہ دائیں اذن (Right Auricle) کی نسبت اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے تاہم اس کی ساخت زیادہ دبیز اور مستحکم ہوتی ہے، اس کا زائدہ قلب کا سب سے اونچا حصہ بناتا ہے جو دوسرے بین الاضلاع تک پہنچتا ہے، نیز بہت سا حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔

بائیں اذن اور بائیں بطن کے درمیان میں بھی ایک کوڑا ہوتا ہے، اس کو صمام تاجی (Mitral Valve) کہتے ہیں، یہ بائیں طرف کی چوتھی غضروف ضلعی کے اندرونی سرے پر واقع ہے، یہ بھی خون کو اذن سے بطن میں آنے تو دیتی ہے لیکن بطن کے انقباض کے وقت اس سے خون کو اذن میں واپس نہیں جانے دیتی۔

(IV) بائیں بطن (Left Ventricle) : یہ لمبا اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے اور دیوار نسبتاً زیادہ دبیز ہوتی ہے، اس کا کنارہ قلب کا بائیں کنارہ ہے جو راس القلب سے شروع ہو کر بائیں بین الاضلاع کے زیریں حصہ تک پہنچ جاتا ہے اور خط جانب النقص کے تھوڑا آگے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے اندر شریانی خون بائیں اذن سے آتا ہے اور یہاں سے

شریان اعظم (اورٹی = Aorta) کے ذریعہ تمام جسم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بائیں بطن اور اورٹی (Semilunar Or Aortic Valve) کہتے ہیں، یہ صمام زیادہ گہرا اور ذرا نیچے ہوتا ہے اور دیوار صدر پر عظم القصد کے بائیں نصف پر تیسرے غضروف ضلعی کے زیریں کنارے کے بالمقابل واقع ہے۔ اس صمام کا فائدہ یہ ہے کہ بطن کا خون اورٹی میں جانے کے بعد واپس نہیں آنے پاتا۔

منافع: اذنین کے انبساط کے وقت، دائیں اذن میں اجوف صاعد (Superior Vena Cava) اور اجوف نازل (Inferior Vena Cava) اور بائیں اذن میں وریڈ ریوی (Pulmonary Vein) سے خون جمع ہوتا رہتا ہے، اجوف صاعد اور اجوف نازل کے ذریعہ جمع ہونے والا غیر مصفی ہو تلپے اور وریڈ ریویوں کے ذریعہ بائیں اذن میں جمع ہونے والا خون مصفی ہوتا ہے، اذنین کے انبساط کے آخری مرحلے میں بطن بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، انبساط کے بعد اذنین یک نخت سکڑتے ہیں اور چونکہ بطن کا انبساط بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ان میں جمع شدہ خون بطن میں پہنچ جاتا ہے، یہاں بھی دائیں اذن کا غیر مصفی خون دائیں بطن میں اور بائیں اذن کا مصفی خون بائیں بطن میں جاتا ہے۔ جب دایاں بطن غیر مصفی خون سے اور بایاں بطن مصفی خون سے پُر ہو جاتا ہے تو دونوں بطن ایک ساتھ سکڑتے ہیں۔ اس اثنا میں اذنین کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اذنین اور بطنین کے درمیان صمام (کواڑ) بند ہو جاتے ہیں، بس سے خون اذنین میں واپس نہیں آ پاتا۔ بطن کے انقباض سے ان کا اندر رونے دباؤ شریانوں کے اندرونی دباؤ سے زیادہ ہو جاتا ہے جس سے اورٹی (شریان اعظم) اور شریان ریوی کے تمام کھل جاتے ہیں اور مصفی خون اورٹی کی راہ سے بدن کی تمام شریانوں میں پہنچ جاتا ہے اور غیر مصفی خون شریان ریوی کے ذریعہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ بطنوں سے خون خارج ہونے کے بعد وہ پھینے لگتے ہیں اور ان کا اندرونی دباؤ شریانوں کے اندرونی دباؤ سے کم ہو جاتا ہے جس سے شریانوں اور بطنوں کے درمیانی صمامات بند ہو جاتے ہیں اور خون بطن میں واپس نہیں آ سکتا۔

(ب) عروق ذہویہ:

عروق ذہویہ کی درج ذیل چار اقسام ہیں۔

(1) شریائیں	(2) عروق شعریہ
(3) شریانیات	(4) اور دہ

مشرائین (Arteries) : شریان اعظم (اورطی) بائیں بطن سے ملتی ہے اور شاخ در شاخ ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، ان کی نالیاں لچکدار ہوتی ہیں اور بالعموم جسم میں سیر می جاتی ہیں اور ان کی وضع کچھ اس اعلانہ کی ہوتی ہے کہ دباؤ اور دیگر آفات سے محفوظ رہیں، یہ قلب کے انبساط کے وقت سکڑتی اور انقباض کے وقت پھیلتی ہیں۔

مشرئیات (Arterioles) : یہ شرائین اور عروق شریہ کے درمیان جان کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ طبعی طور پر زرا سکڑی رہتی ہیں اس طرح گویا ان میں محیطی مزاحمت (Peripheral Resistance) ہوتی ہے۔

عروق شریہ (Capillaries) : یہ نہایت باریک نالیاں ہیں، یہ چھوٹی سے چھوٹی شریانوں کو ویدوں سے ملاتی ہیں، یہ قلب کے انبساط اور انقباض سے متاثر نہیں ہوتیں۔

اورده (Veins) : یہ ساختوں میں چھوٹی چھوٹی نالیوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے، ان کی دیواریں بہت باریک ہوتی ہیں، ان میں جابجا کوٹریں (صمامات) لگی ہوتی ہیں جو قلب کی طرف کھلتی ہیں تاکہ خون واپس نہ لوٹ سکے، ملحوظ رہے کہ ویدریوی کے علاوہ تمام اورده جمع ہو کر دائیں اذن میں کھلتی ہیں۔



امراض قلب

Learn Unani By Abul Waris Salman

وجع القلب

ANGINA PECTORIS

اس مرض میں عضلہ قلب میں تشنج ہو کر عظم القصد کے نیچے، مقام قلب پر ایک بیک شدید درد ہوتا ہے، جس کی شدت سے مریض بے دم اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں میں ۳۵-۵۰ سال کے بعد کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

وجع القلب

Angina Pectoris

وجع القلب کاذب

وجع القلب صادق

اسباب

- ۱۔ قلب میں قبل سے مرض کی موجودگی
- ۲۔ شحامت قلب
- ۳۔ احتقاق غلاف قلب
- ۴۔ اعصاب قلب کے نقائص

اس کا دوسرا نام "خجہ صدریہ" ہے۔ واضح رہے کہ وجع القلب دراصل صرف ایک علامت ہے، چونکہ طبی تاریخ میں مرض کے ذیل میں تحریر کرنے کا دستور رہا ہے اس لئے ہم بھی اسی طور پر تحریر کر رہے ہیں (مؤلف)

Obstruction Of Coronary Arteries

Aneurism Of Aorta

Hepatic Colic

(I) تصلب شرايين قلب

(II) صمام اورطی کے امراض

(III) التهاب اورطی

(IV) تشنجی سرعت قلب

(V) انسداد شریان قلبی

(VI) اورطی کا انورسما

(VII) بین الضلعی درد

(VIII) جہدی علامت

(IX) قولنج کبدی

(X) انفعالات نفسانیہ

(XI) غیض و غضب

(XII) شدید صدمہ

(XIII) غیر معمولی فرحت و مسرت

(XIV) فکر و تردد

(XV) حمی حداری / وجع المفاصل

(XVI) نقرس

(XVII) آتشک

(XVIII) امراض معدہ و معاء

(XIX) بدہضمی

(XX) قبض

(XXI) نفخ شکم

(XXII) جوع البقر

(XXIII) کثرت ربابضت

(XXIV) کثرت نالی

(XXV) کثرت نالی

(xxii) تکان

(xxiii) فقر الدم

(xxiv) ماسکی عفونت

(xxv) برودت

(xxvi) کوہ پیائی

علامات | عضلات قلب میں آکسیجن (نسیم) کی غیر معمولی ضرورت، اور تاجی شرائین کی اس بابت عدم کفایت کی صورت میں شدید قلبی دورہ کا حملہ ہوتا ہے۔ مرض کی ابتداء عام طور سے اچانک، اور اس وقت ہوتی ہے جب جسمانی دوران خون کم ہوتا ہے، اسی لئے اس کا حملہ عام طور سے دن میں اور کبھی رات میں یا سحر کے وقت ہوتا ہے، اس کی علامات درج ذیل ہیں۔

(I) درد

(II) تنگی تنفس

(III) تے

(IV) انحطاط / عدم بہبوط

درد : محاذات قلب میں شدید نوعیت کا درد ہوتا ہے اور مرضی تکلیف فوراً ہی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، درد عام طور سے مقام قلب سے شروع ہوتا ہے اور حوالی قلب، بائیں بغل، بائیں بازو کی اندرونی سطح اور بائیں ہاتھ کی دو اندرونی انگلیوں تک پھیلتا ہے، بعض اوقات درد قلب کے مقام سے شروع ہو کر عظم القص کے بائیں طرف ہوتا ہوا بائیں شانے پھر دائیں شانے گردن، دائیں جبڑے تک آتا ہے تاہم دائیں بازو اور ہاتھ تک پھیل جانے کی روداد ہنوز شاذ ہے، درد کے ساتھ جھنجھناہٹ اور خدر کی سی کیفیت ہوتی ہے۔

بعض اوقات درد دائیں اور بائیں دونوں جانب ہوتا ہے اور گردن کی دونوں جانب جلد اراس تک چلا جاتا ہے، کبھی دونوں شانوں سے شروع ہو کر اوپر سینہ تک اور کبھی بالائی شکم سے شروع ہو کر تحت الشراسینی ذبحہ (Angina Epigastric) تک یا نسبتاً نیچے شکم سے شروع ہو کر شکمی ذبحہ (Angina Abdominis) تک پھیل جاتا ہے۔ درد کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے چنانچہ کبھی نشتری سی چمبن محسوس ہوتی ہے تو کبھی

آگ کی سی سوزش و جلن، اینٹھن اور گھٹن، یعنی خارق، ناخن، احتراق اور مضیق نوعیت کا ہوتا ہے، ان حالات میں مریض کو خود کو شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، درد کا دورہ چند سکینڈز سے ۲، ۳ منٹ تک رہتا ہے

تنگی تنفس: حجاب عاجز کے ساتھ درد کی وجہ سے انکاسی مداخلت کے باعث تکلیف رونما ہو کر تنگی تنفس عارض ہوتی ہے ویسے عام طور سے قلب کے افعال میں کمی اور انسداد کے باعث تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے، تنفس اتھلا اور جلد جلد آتا ہے۔
قہ: درد اور تنگی تنفس کے فوراً بعد ہی عام طور سے قہ ہو جاتی ہے۔

انحطاط/صدہ: ہمدرد کی علامات مثلاً نردی اور انحطاط بھی فوراً رونما ہوتا ہے۔
دورہ کی حالت میں مریض جیل پھر نہیں سکتا، بلکہ اگر جیل رہا ہوتا ہے تو فوراً رک جاتا ہے۔ ایک جانب کو ہو جاتا ہے اور مدد کی خواہش کرتا ہے، اور عام طور سے ہاتھوں سے قلب دبا کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی بائیں بازو کو دبا تا ہوا قلب تک پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بے حرکت ہو جاتا ہے اور کبھی وضع تبدیل کرتا رہتا ہے، چہرہ خاکستری، زرد اور بے رونق ہوتا ہے، دماغی اضطراب اور خوف و پریشانی نمایاں ہوتی ہیں، جسم سرد پسینہ سے تر ہوتا ہے، جسم سرد ہو جاتا ہے، مریض کے ہوش و حواس بجاستے ہیں، اور وہ خاموش مگر مکرر دیکھتا ہے۔

نبض تغیر پذیر ہوتی ہے چنانچہ سریع بھی چلتی ہے ویسے عام طور سے صغیر اور ضعیف، بظلی اور دقیق ہوتی ہے، زادیہ قلب پر پہلی آواز کمزور ہوتی ہے اور قلب کی حرکات بھی سریع ہوتی ہیں، لیکن حملہ مرض کے کچھ دیر بعد طبیب مشاہدہ و معائنہ کر رہا ہو تو زادیہ قلب پر انقباضی خمریر سنی جاسکتی ہے۔ غشا، سریہ میں رگڑ کی آواز سنی دیتی ہے، عظم القلب ہوتا ہے۔
دورہ کا اختتام عام طور سے اچانک اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ریح اور پیٹاب خارج ہوتا ہے، مریض چند دنوں تک تکان اور سینہ کی دیوار نیز بازوؤں پر دبائے سے تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے مابعد اثرات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ویسے مریض پہلے ہی حملے میں ختم ہو جاتا ہے، یا کچھ عرصہ یا چند سال بعد دوسرا حملہ مریض کی شمع حیات کو گل کر دیتا ہے۔

دفع القلب کا دب میٹھا میٹھا مہم قسم کا درد محسوس ہوتا ہے درد میں بعض اوقات

شدت بھی ہوتی ہے۔ تاہم وجع القلب کی نسبت معمولی ہوتی ہے، درد کا دورہ گھٹسوں رہتا ہے مریض درد اور اضطراب کی وجہ سے لوٹتا، پلٹتا رہتا ہے۔

تفویقی علامات

وجع القلب کاذب

۱۔ ہر عمر میں ہو سکتا ہے تاہم عورتوں میں کثیر الوقوع ہے

۲۔ دورہ اکثر رات میں ہوتا ہے۔

۳۔ دوسرے عوارض بھی موجود ہوتے ہیں۔

۴۔ درد میں شدت نہیں ہوتی، سینہ کشادہ معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ دورہ کسی تحریک کے بغیر ہوتا ہے۔

۶۔ دورہ ۲۱ گھنٹے تک برقرار رہتا ہے۔

۷۔ مریض لوٹتا اور بار بار اپنی وضع بدلتا ہے۔

۸۔ انجام عام طور سے اچھا ہوتا ہے، ہلاکت کے امکانات قریباً معدوم ہوتے ہیں۔

وجع القلب صادق

۱۔ ۵۰-۳۵ سال کے مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔

۲۔ دورہ عام طور سے استراحت کی حالت میں دن میں ہوتا ہے۔

۳۔ درد، تنگی نفس، تھکاوٹ اور غیر معمولی سریع انحراف کے علاوہ دوسرے عوارض ہوتے ہیں۔

۴۔ درد نہایت شدید ہوتا ہے، سینہ میں تنگی محسوس ہوتی ہے

۵۔ دورہ کسی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۶۔ دورہ چند سکنڈز سے ۳۰-۲ منٹ تک رہتا ہے۔

۷۔ دورہ کے وقت مریض خاموش رہتا ہے اور قریب میں موجود لوگوں کو ترجم آمیز نظروں سے دیکھتا ہے۔

۸۔ انجام مرض خفرائی، بلکہ مہلک بھی ہو سکتا ہے۔

تفریقی علامات

وجع القلب	وجع العصب بین الاضلاع
۱. مرض قلب کی سرگزشت بالعموم ملتی ہے۔	۱. عصبی ادجارج کی سرگزشت ملتی ہے
۲. خلل قلبی مثلاً قلب کا فعل ضعیف اور غیر منظم ہوتا ہے۔	۲. قلب کی کارکردگی طبعی ہوتی ہے
۳. بیرونی ذکاوت حس معدوم ہوتی ہے۔	۳. بیرونی ذکاوت حس نمایاں ہوتی ہے۔
۴. درد ایک جانب ہوتا ہے (بالعموم)۔	۴. درد اکثر دونوں جانب ہوتا ہے
۵. حملہ یک بیک ختم ہو جاتا ہے۔	۵. حملہ کچھ عرصہ تک قائم رہتا ہے۔
۶. حملہ کے بعد جلدی بشور نہیں نکلتے۔	۶. حملہ کے بعد عام طور سے جلدی بشور نمایاں ہوتے ہیں

اصول علاج

- ۱. اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲. تیز، خوشبودار بخور سونگھائیں
- ۳. خشک تنجیدات کریں
- ۴. مسکن تدابیر اختیار کریں
- ۵. تخفیف درد کے لئے مریض کے قوی اور کوائف کو مد نظر رکھتے ہوئے تخفیف
- ۶. مقیات استعمال کرائیں، اسی مقصد کے لئے موسع و منفع عروق ادویہ استعمال کرائیں۔
- ۷. تقویت قلب کی تدابیر اختیار کریں

علاج

- ۱. دورہ کے وقت مریض کو آرام و سکون سے لٹائیں، اور مقام درد پر عطر گلاب یا عطر حنا کی مالش کریں
- ۲. گل بابونہ، گل خطمی، ہر ایک ۲۰ گرام، کو کوٹ کر تھیلی میں بھر کر توست پر گرم کر کے مقام قلب کو سینکیں

۔۔۔۔۔ بوزق، چوب زرد ہر ایک ۱۲ گرام، نمک طعام ۳ گرام، گل غلمی ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ کر پوٹلی بنائیں اور تو سے پر رکھ کر بار بار سینکیں۔

۔۔۔۔۔ دار چینی ۱۲ گرام، وج ترکی، عود غرق، زرنباد، مصطکی ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو عرق گلاب میں پیس کر مقام قلب پر ضماد کریں۔

۔۔۔۔۔ اشق ۳ گرام کو روغن بلسا ۳ ملی لیٹر میں حل کر کے ایک کپڑے میں پیسٹ دیں، اور مقام قلب پر چپکا دیں، جب از خود چھوٹ جائے تو اس مقام کو گرم پانی سے دھو کر دوبارہ کپڑا اسی طرح چپکا دیں۔

۔۔۔۔۔ درد کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو جائے تو جلد وار نشہ جی ایک گرام عرق گلاب میں گھس کر حلق میں ڈپکائیں اور۔۔۔۔۔ صندل سفید ۳ گرام، مشک، زعفران ہر ایک ۱۲ گرام عرق گلاب ۵ ملی لیٹر میں پیس کر بطور لعلخہ سونگھائیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ لعلخہ بھی مفید ہے

نسخہ لعلخہ: عرق کیوڑہ، عرق بید مشک، عرق گلاب، آب کشنیر سبز، آب کدو سبز، سرکہ خالص، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، صندل سفید ۴ گرام ملا کر سونگھائیں۔

۔۔۔۔۔ اگر غذا لینے کے بعد درد کا دورہ ہو تو پہلے گرم پانی میں کنجبین سادہ ۲۳ گرام ملا کر نوش کرائیں، اس کے بعد جوارش کمونی ۷ گرام، عرق گلاب ۴ ملی لیٹر، شربت درد مکر ۲۴ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں

۔۔۔۔۔ قبض کی صورت میں شربت درد مکر ۲۴ ملی لیٹر، شربت دنیا ۳۳ ملی لیٹر، عرق گلاب ۲۴ ملی لیٹر نوش کرائیں۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

۔۔۔۔۔ انوشدارو سادہ ۷ گرام، کھلانے کے بعد شیرہ بادیان ۴ ملی لیٹر، تخم کشوث، شیرہ انیسون ہر ایک ۵ گرام، عرق بادیان ۳۳ ملی لیٹر میں نکال کر گلقد ۲۳ گرام ملا کر صبح، شام استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ زہر مہرہ، عقیق، صدف، ہیل خور دیشب، مرجان، لمبا شیر، ہر ایک ۱۲ گرام، ورق نقرہ ۳ گرام، روح کیوڑہ، روح بید مشک، روح گلاب ہر ایک ۱۰ ملی لیٹر۔ مذکورہ دوا کو عرقیات مذکورہ میں کھل کر پیں اور ۱۲۵ ملی گرام، ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان عنبری ۴ گرام، صبح، شام استعمال کرائیں۔

..... کشتہ یشب، گل گاؤز بان، ابریشم مقشر، ورق نقرہ، کمریم سنکھ، ہر ایک ۳ گرام،
ورق ذہب ۳ گرام، کمر بار، زہر سپرد، کشتہ صدف ہر ایک ۹ گرام، جملہ دواؤں کو یکجا کر کے
سفوف بنائیں اور ۲ گرام، ہمراہ خمیرہ مندل ۲ گرام، صبح، شام کھلائیں

..... گل سرخ، فلفل سیاہ، زنجبیل، دار فلفل، دار چینی، زراؤند طویل، اسارون،
ہر ایک ۲ گرام، مصطکی، زرنباد، انیسون، پودینہ ہر ایک ۴ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر
ہم وزن شہد اور خمیرہ گلقد میں ملا کر عجون تیار کریں اور ۷ گرام استعمال کرائیں۔

..... ریاح کی صورت میں حلتیت ۱۲۵ ملی گرام، موینقی میں بند کر کے فوراً
کھلائیں یا ساذج ہندی اور صعفرانسی، ہر ایک ۴ گرام کو جوش دے کر گلقد ملا کر نوش کرائیں۔
..... تقویت اور تفریح قلب کے لئے درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں

..... دوار المسک معتدل جواہر والی، منقرج بارد، خمیرہ مروارید اور خمیرہ گاؤز بان،
عبری جواہر والا، اول الذکر دونوں دوائیں ۳ گرام اور آخر الذکر دوائیں ۴ گرام استعمال کرائیں
..... درج ذیل نسخہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے

قرص زہر سپرد مرکب ایک عدد، ہمراہ بادیان، تخم خیارین، تخم خرپڑہ، دوقو، تخم کاسنی
ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو جوش دے کر نوش کرائیں۔

..... چوب چینی ۴ گرام، سورنجان ۲ گرام، پانی میں جوش دے کر ہمراہ دوار المسک
معتدل سادہ ۴ گرام نوش کرائیں

..... دورہ کی حالت میں درج ذیل نسخہ ٹکور بھی مستعمل ہے

نسخہ: پوست ختنخاش ۳۴ گرام، عرق گلاب ۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیں اور روغن
تارپین ۴ ملی لیٹر ملا کر فلائین کا کپڑا تر کر کے گرم گرم مقام قلب کو ٹکور کریں۔

سرعت قلب

TACHYCARDIA


اس مرض میں قلب نہایت سرعت کے ساتھ غیر منظم طور پر بھڑکنے لگتا ہے تاہم حرکت
قلب مریض کو قطعی محسوس نہیں ہوتی۔

۱۰ "اختلاج قلب" بھی کہتے ہیں۔

اقسام

سرعت قلب

(Tachycardia)



اسباب

(I) ورزش

(II) عصبی اثرات

Emotional Causes

(III) جذبات کو متاثر کرنے والے اسباب

(IV) عصب راجع (Vagus Nerve) کا شل

(V) فقر الدم

(VI) حمل

(VII) تسمم الکوہل / مادہ / مزمن

(VIII) قلب کی ساخت کا غیر طبعی / مرضی ہونا

(IX) بیش درقیت

(X) بیماری مرض قلب

(XI) شدید انفعام عضلہ قلب

(XII) ناملاج قتل قلب

Ischemic Heart Disease

(XIII) افتقاری مرض قلب

(XIV) ادیات / سمیات

(I) ایڈری نے لن

(II) تھائیروکسن

(III) المروہن

(Ⅳ) آئیسو پرنالین

(Ⅴ) تمباکو نوشی

(Ⅵ) دیگر محرک ادویات

(Ⅶ) غوطہ جھونپی

(Ⅷ) اختناق الرحم

علامات

نبض نہایت سریع چلتی ہے چنانچہ فی منٹ ۷۵-۸۰ کی بجائے ۱۳۰-۲۲۰ مرتبہ اور بعض اوقات ۳۰۰ مرتبہ تک حرکت کرتی ہے، تاہم مریض قلب کی حرکت کو محسوس نہیں کرتا، بعض مرتبہ قلب حرکت کرتے کرتے ایک فالتو ضرب لگادیتا ہے، اور عام طور سے اس طرح کا مریض سالوں زندہ رہتا ہے، اور خود اس کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لئے تسکین کا باعث ہوگی۔

نوٹ کے قلیل المدت (مختصر) ہونے یا مریض کے عادی ہونے کی صورت میں سرعت نبض کے علاوہ بعض اوقات دوسری علامات غیر موجود ہوتی ہیں، تاہم زیادہ عرصہ تک رہنے کی صورت میں عموماً تکلیف ہوتی ہے، سینہ میں پھڑپھڑاہٹ (Flutter Ring) اور گردن میں ضرب (Beating) محسوس ہوتا ہے، سنسنی، خستگی (Exhaustion) اور اطراف میں بردد ہوتی ہے، پسینہ خارج ہوتا ہے، سوز ہضم کی شکایت ہوتی ہے، لعاب دہن، متلی اور تے وغیرہ عوارض رونما ہوتے ہیں، بعض مرحلے میں وجع القلب (Angina Pectoris) کی علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ تنگی محسوس ہوتی ہے، تحت القفسی درد ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ سرعت فعل کی وجہ سے قلب گمراہ بار (Embrassment Of The Heart) ہو جائے اور فشل قلب (Cardiac Failure) اتساع قلب، گردن کی جڑ کی وریدوں کے احتقان (Engorgement) اور عمومی اوزیما وغیرہ کی علامتیں بھی یائی جائیں۔ بہر حال دورہ متوقف ہوتے ہی یہ تمام علامتیں معدوم ہو جاتی ہیں، لیکن شدید حملہ کی صورت میں خستگی باقی رہتی ہے۔

سادہ دوری سرعت قلب کی صورت میں مرض کا آغاز اچانک ہوتا ہے اور اس کا حملہ

چند ثانیہ سے دو ہفتہ تک رہ سکتا ہے، قلب تیز اور باقاعدہ حرکت کرتا ہے، اور مریض کی وضع سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اصوات قلب ٹک ٹک نوعیت کی ہوتی ہیں، خرخرہ غائب ہو جاتا ہے، نبض منتظم ہوتی ہے، اور دورہ یک لخت غائب ہو جاتا ہے۔

عرصہ تک رہنے کی صورت میں مرض اخضر، عظم کبد اور فشل قلب ہو جاتا ہے اور اول الذکر دونوں صورتوں میں کچھ عرصہ میں ہی مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

تجو فی سرعت قلب Sinus Tachy Cardia	بطنی دوری/تشنجی سرعت قلب Ventricular Tachy Cardia
۱۔ مرض کا حملہ اور اختتام یکساں ہوتا ہے۔	۱۔ مرض کا حملہ اور اختتام یکساں ہوتا ہے۔
۲۔ قلبی امراض موجود ہوتے ہیں۔	۲۔ قلبی امراض موجود ہوتے ہیں۔
۳۔ ستاؤ و نادر ۱۴۰ کے قریب ہوتی ہے۔	۳۔ قلب کی رفتار ۱۴۰ سے زیادہ ہوتی ہے۔
۴۔ قلب کی پہلی آواز مستحکم اور واضح ہوتی ہے۔	۴۔ قلب کی پہلی آواز تبدیل پذیر ہوتی ہے۔

اصول علاج

_____ عام طور سے مرض کا حملہ از خود ختم ہو جاتا ہے، بصورت دیگر مریض خود ہی جان لیتا ہے کہ دورے کس طرح رد کا جائے۔

_____ حملہ کے تادیر رہنے کی صورت میں اس کے روکنے کی تدابیر کریں۔

_____ تھے کرائیں، ورزش کرائیں وغیرہ۔

علاج

_____ حملہ کو روکنے کے لئے کسرت کرائیں

_____ سانس روکنے کی ہدایت کریں

_____ آنکھوں کے گیندے پر دباؤ ڈالیں، جوف سبائی پر دباؤ ڈالنا بھی مفید ہے۔

_____ ۱۰۔ ۲۰ سکینڈ پر جوف سبائی پر داہنی طرف خوب دباؤ ڈالیں اور مالش کریں

اور اسی طرح بائیں جوف سباتی (Carotid Sinus) پر اسی قدر دباؤ ڈالیں۔ اس عمل میں ایک بات ضرور مد نظر رکھیں کہ اس عمل سے دماغی علیقت کا اندیشہ ہوتا ہے اور جمع القلب وغیرہ امراض میں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

- ۔۔۔۔۔ مریض کو پر سکون رکھئے اور حملہ کے دوران بستر پر بٹھائیے۔
- ۔۔۔۔۔ مریض کی وضع بدل دیں۔ سر گھٹنوں کے بل کر دیں اور بازو دموڑ کر جسم کو جھکا دیں۔
- ۔۔۔۔۔ مغز تخم خیارین حسب ضرورت کھلائیں
- ۔۔۔۔۔ جواکھار، ریوندر جینی، شورہ قلمی، بادیان، نمک ترب ہر ایک ۵ گرام، نبات سفید ۸ گرام، سفوف بنائیں اور صبح، شام، ۷ گرام ہر بار آب تازہ کھلائیں

بطور قلب

BRADYCARDIA

اس مرض میں اذنین قلب اور بطنین قلب کی حرکات کے باہمی تناسب میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور بطون قلب کی حرکات میں سستی آجاتی ہے، یہ حرکت ۴۰ فی منٹ ہوتی ہے اس کے برخلاف اذنین کی حرکت ۱۰۰-۱۵۰ فی منٹ ہو جاتی ہے۔ بطون قلب کی اس سستی حرکت کی وجہ سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اسباب

- (I) غضلات قلب میں عارضی یا مستقل نقص یا فتور
- (II) شرائین قلب کے امراض جن سے دیوار قلب کی طبعی پردریش نہ ہو رہی ہو
- (III) اوڈیم یا محاطی
- (IV) انعام قلب ماد میتوت القلب (Acute Cardiac Infarction)
- (V) عصب راجع (Vagus Nerve) یا اس کے مرکز پر بالواسطہ
- یا بلا واسطہ خراش یا تحریک

(LXX) (Z) منقطعہ الدماغ

(LXXI) یرقان

(LXXII) انفلونزا

(LXXIII) دیگر امراض مادہ ساریہ کی نقاہت

(LXXIV) جذبات و ہيجان، دیر تک کھڑا رہنا

(LXXV) دوران تنفس میں قلب کا تبادلہ آہستہ ہو جانا

(LXXVI) ہستی بے قاعدگی

Sino-Auricular Block

(LXXVII) جوفی اذینی انسداد

Auriculo-Ventricular Block

(LXXVIII) اذینی بطنی انسداد

(LXXIX) سمیات

(LXXX) ممکنات

(LXXXI) حیات مادہ

(LXXXII) عصبی امراض

(LXXXIII) سکتہ

(LXXXIV) صرع

(LXXXV) مالتھولیا

(LXXXVI) استرخاء

(LXXXVII) نقص الدم

(LXXXVIII) دیا بیطس

(LXXXIX) قروح معدہ

(LXXX) مرض اخضر

علامات جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، اذنین اور بطنین کی رفتار کے طبعی تناسب میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ اذنین ایک منٹ میں ۱۰۰-۱۵۰ مرتبہ حرکت کرتے ہیں اور ان کی یہ حرکت سینہ اور گردن کی عروق میں تڑپتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کے برخلاف بطن (جو اپنے اندر کے خون کو خریانوں میں ڈھکیلتا ہے) کی حرکت ۳۰-۵۰ فی منٹ ہو جاتی ہے اور اس میں

غیر معمولی ضعف کی وجہ سے بطنی انقباض سے پیدا شدہ دموی لہر شریان زندہ اعلیٰ تک نہایت ضعف کے ساتھ پہنچتی ہے اور بعض اوقات اس کا احساس مفقود بھی ہو جاتا ہے، بطور قلب کی دوسری علامات بھی موجود ہوتی ہیں، نبض متعقب (ایک ضعیف ضرب کے بعد دوسری عظیم ضرب ہونا) چلتی ہے۔

ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض انشیا ص کے قلب اور نبض کی حرکت میں بطور، وضعف پیدا انشی طور پر ہوتا ہے جس سے انکی صحت پر کوئی خراب اثر نہیں پڑتا، اس لئے مریض کی حالت کی روئیداد کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

اصول علاج

- _____ اصل سبب کا ازالہ کریں
- _____ حسب ضرورت مقویات و محرکات استعمال کرائیں
- _____ فشار الدم قوی کی صورت میں مضیف فشار ادویہ استعمال کرائیں

علاج

_____ کستہ نقرہ ۱۲۵ ملی گرام، خمیرہ صندل، گرام میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد گل سیوطی، گل گاؤز بان، گل گڑھل، گل چاندنی ہر ایک ۳ گرام، پانی ۲۰۰ ملی لیٹر، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت انناس یا شربت انار شیریں ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

_____ مفرح بارہ گرام، ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر کھلائیں، اس کے بعد عرق گندر ۱۲۵ ملی لیٹر، نبات سفید ۲۴ گرام ملا کر نوش کرائیں

_____ ضعف قلب کے ساتھ اگر کبد بھی متاثر ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ:

_____ ورقہ ۱۲۵ گرام، ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر کھلائیں، اس کے بعد خمیرہ زرشک،

— مفرح اور مقوی نیز دافع حرارت کے طور پر درج ذیل نسخہ مجرب ہے۔

خمیرہ صندل، گرام، کھلانے کے بعد شیرہ کشنیز، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک ۲ گرام، عرق گاؤزبان ۱۳۵ ملی لیٹر میں نکال کر شربت کیوڑہ ملا کر نوش کرائیں۔

— درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ: دوار المسک یا مفرح بار دہ گرام، ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر کھلانے کے بعد عرق عنبر، عرق گاؤزبان نوش کرائیں۔

— کبر یا شمع، طباشیر کبود، ہیل خورد، زہر مہرہ اصلی، یشب، بسلہ جز، ہر ایک ۳ گرام، سروارید ناسفتہ ۵۰ گرام، عرق کیوڑہ، عرق بید مشک ہر ایک ۴۰ ملی لیٹر، عرق گلاب ایک ملی لیٹر، مذکورہ عرقیات میں جملہ دواؤں کو کھل کر کے خشک کر لیں اور ایک گرام، ہمراہ خمیرہ گاؤزبان ۶ گرام نوش کرائیں۔

— جدوار، ورق طلا، ہر ایک ۴ گرام، ورق نقرہ، زعفران، عنبر، شہب، مشک، خالص، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کو عرق کیوڑہ یا بید مشک میں کھل کر کے فلفل سیاہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور ۱-۳ گولیاں کھلائیں۔

— صندل سفید، عود ہندی، سنبل الطیب، کشنیز خشک، گل سرخ، آملہ مقشر، گل گاؤزبان، کبر یا شمع، ابریشم خام، مقرر، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ پیس کر نبات سفید ۵۰ گرام، عرق کیوڑہ اور عرق گلاب حسب ضرورت میں قوام بنائیں زعفران، ورق نقرہ، ہر ایک ۳ گرام کا اضافہ کر کے ۱۲ گرام، نہار منہ عرق گلاب ۱۲ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

— سروارید ناسفتہ، صندل سفید، زہر مہرہ، ہر ایک ۳ گرام، عود، جدوار، بنفشتی ہر ایک ۵ گرام، مشک ۱۳ گرام، کافور ۲۰۰ ملی گرام، گوند ناگوری ۲ گرام، ورق نقرہ ایک گرام، تمام اجزاء کو باریک پیس کر گولیاں بنالیں اور ۲ گولیاں صبح، شام ہمراہ عرق گلاب، عرق بید مشک، ۴۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

— کشتہ عقبی، کشتہ مرجان، کشتہ یشب ہر ایک ۲ گرام، ورق نقرہ ۱۵ عدد، ورق ذہب ۱۰ عدد، روح گلاب، روح کیوڑہ، روح بید مشک، روح گاؤزبان، ہر ایک ۲۳ ملی لیٹر، میں جملہ دواؤں کو سحق کریں اور خشک ہو جائے تو رکھ لیں، اور ۱۲۵ ملی گرام ہمراہ عرق گاؤزبان ۱۲ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ بلبلہ، بلبلہ، آملہ، گل سرخ، آمیسون، گل گاؤزبان ہر ایک ۲ گرام، کشتیز خشک ۵ گرام، نبات سفید ۲۵ گرام، عرق گلاب، عرق بید مشک ہر ایک ۷۵ ملی لیٹر، اول الذکر دواؤں کا سفوف تیار کریں، اس کے بعد نبات سفید کو مذکورہ عرقیات میں حل کر کے قوام تیار کریں۔ جب قوام تیار ہو جائے تو مذکورہ دواؤں کا سفوف اس میں ڈال دیں اور خوب ہلاتیں اور حسب ضرورت ۶-۱۲ گرام نہار منہ کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ گاؤزبان، کہربار، مروارید، مغز تخم کشتیز، پوست ترنج، گل سرخ، ابریشم مقررہ: بہمن سرخ، جملہ دوائیں ہموزن، ان کا سفوف تیار کریں اور شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور ۲ گرام کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ نہ ہر مہرہ خطائی، مروارید ناسفتہ، کہربار شمع، لیشب سبز، طہاشیر کیود، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کو عرق کیوڑہ ۵۰ ملی لیٹر میں خوب ستھق کریں، گل گاؤزبان، صندل سفید، برگ گاؤزبان، گل سیوٹی، ہر ایک ۲ گرام، کو بار یک پیسیں، نبات سفید ۸۰ گرام، ملا کر قوام بنائیں، بعد میں مذکورہ سفوف کردہ ادویہ ملائیں۔ اس کے بعد ورق نقرہ ۳ گرام کا اضافہ کر کے خوب حل کریں اور ۲ گرام کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ ورق نقرہ، شاخ مرجان، ہیل خورد، طہاشیر ہر ایک ۲ گرام، ورق ذہب ۵ گرام، مشک خالص ۲۵ ملی گرام، عرق کیوڑہ میں تین دن ستھق کرنے کے بعد مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت ۱-۳ گولیاں استعمال کرائیں۔

ارتعاش اذن قلب

AURICULAR FLUTTER

اس مرض میں اذنین قلب نہایت جلد جلد منقبض ہوتے ہیں چنانچہ ان کی شرح انقباض ۲۳-۵۰ فی منٹ تک ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف بطنین قلب عام طور سے اس کا نصف یا چوتھائی، تو اس کے ساتھ منقبض ہوتے ہیں، اس طرح گویا اذنین کی ہر حرکت انقباضی سے بطون متاثر نہیں ہوتے بلکہ انکی ہر دوسری یا تیسری تھوک۔ نہ متنبہ ہوتے ہیں۔ یہ

مرض دوری شکل میں مہینوں اور برسوں تک رہ سکتا ہے

اسباب

- (I) بیش تناب
- (II) تصلب شریانی
- (III) التهاب صمام قلب (حی حداری کے سبب)
- (IV) متلی فشل قلب
- (V) تضیق صمام تاجی
- (VI) تعدیہ
- (VII) نہ ہرلی ادویہ / اغدیہ
- (VIII) ہیجان
- (IX) تکان
- (X) آؤنی عضلہ کا خراش آور رد عمل

Congestive Heart Failure

علامات یہ دراصل سرعت کی ہی ایک شکل ہے، اس میں اذین قلب میں نہایت جلد جلد انقباض ہوتا ہے، اور یہ انقباض زفرہ کی طرح ہوتا ہے، مختلف حالات میں انقباض کی شرح ۱۳۰-۳۵ فی منٹ تک ہو سکتی ہے۔ اذینی انقباض کے برعکس بطنی انقباض کی شرح نصف یا چوتھائی تک ہوتی ہے، چنانچہ اگر اذینی انقباض ۳۲ فی منٹ ہو تو بطنی شرح انقباض ۱۶ فی منٹ تک ہو سکتی ہے۔

نبض دقیق، بطی اور خفیف طور پر غیر منظم چلتی ہے، بعض اوقات یہ مرض دورہ کی شکل میں ہوتا ہے، ایسے میں مہینوں اور برسوں تک زفرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اور نبض منظم چلتی ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ استعمال انغیزامور لودورسین

علاج

منفرد تخم خیارین کھلائیں

ریوند چینی، شورہ قلمی، بادیان، نمک ترب، جواکھار، ہر ایک ۱۲ گرام، —
نبات سفید ۳۶ گرام ملا کر سفوف بنائیں اور ۷ گرام صبح، دوپہر شام ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

استسقاء غلاف قلب

HYDRO PERICARDIUM

اس مرض میں غلاف قلب (PERICARDIUM) میں رطوبات جمع ہو کر استسقاء کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے مریض اپنے قویٰ اور افعال میں غیر معمولی تغیر محسوس کرتا ہے،
انفعالات نفسانی (دغہ، غیظ و غضب، تقریباً بالکل ہی معدوم ہو جاتے ہیں۔

اسباب

(I) قلب یا کلیہ کا فعلیاتی نقص

(II) غلاف قلب کے خبیث سلعات

(III) التهاب غلاف قلب تدریجی

(IV) مجاری صدر کے سدے

(V) استسقاء بدنی عمومی

غلاف قلب کے جوف میں غیر طبعی رطوبات کا تدریج اور آہستہ آہستہ اجتماع

علامات شروع ہو جاتا ہے، تدریجی اجتماع کی صورت میں قلب میں اس کے برداشت کی

یہ دراصل التهاب غلاف قلب انسکابی کی ہی قسم ہے، اور اسی لئے اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کی چنداں ضرورت
نہیں تھی، تاہم طبی کتابوں میں اس کو مستقل مرض تحریر کیا جاتا ہے، لہذا ہم نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے۔

استعمال بھی اسی تشریح / اجتماع کے متوازی پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بیک اجتماع رطوبات کی صورت میں عام طور سے قلب کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

عام طور سے طبعی حالتوں میں غلاف قلب کے جوف میں مجموعی رطوبات ۳۰-۵۰ مکعب سینٹی میٹر ہوتی ہیں۔ لیکن غیر طبعی / استثنائی حالتوں میں ۲۰۰ مکعب سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہیں۔ اس رطوبات کی رنگت زرد ہوتی ہے، اور خون ملے ہونے کی صورت میں سرخی مائل خاکستری ہو جاتی ہے مجاری صدر کے سدہ کی صورت میں رطوبت کا رنگ سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔

مریض کو اپنا قلب پانی میں تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ رطوبات جب غیر معمولی مقدار میں ہو کر قلب کو گھیر لیتی ہیں تو قلب بھج ساجاتا ہے اور اس کی حرکت اور حالت میں تغیر عظیم پیدا ہو جاتا ہے، قوتیں ساقط ہو جاتی ہیں، اور غمیض و غضب جیسے انفعالات نفسانی معدوم ہو جاتے ہیں۔ رطوبات کی وجہ سے مقام قلب پر بوجھ اور حکڑن محسوس ہوتی ہے، تنفس میں دشواری ہوتی ہے، چہرے پر بھر بھراہٹ اور بھج ہوتا ہے، اطراف میں بھی تہجی علامات موجود ہوتی ہیں، نبض سریع، ضعیف اور غیر منظم ہوتی ہے، مریض کو کروٹ بدلتے اور گفتگو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ شدید صورتوں میں قلب کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور اضلاع کے درمیانی حصے بھی اوپر کو بلند ہو جاتے ہیں۔ امتحان بالقرع سے ماؤف جگہ سے ٹھوس آواز آتی ہے۔ امتحان بالسمع پر مقام قلب پر اصوات قلبی بہت خفیف سنائی دیتی ہیں جو عام طور سے صدر کے اوپر کے حصہ میں نسبتاً زیادہ واضح طور پر سنائی دیتی ہے۔

اصول علاج

- _____ مریض کو مشتعل کرنے کی تدابیر کریں
- _____ ریاضت کرائیں تاکہ یہ رطوبتیں رقیق اور لطیف ہو کر باہر کی طرف اکٹرا کر تحلیل ہو جائیں۔
- _____ مسہلات استعمال کرائیں
- _____ صدر پر اضمدة حارہ رکھوائیں
- _____ حسب ضرورت مسہل سے قبل منضج بھی استعمال کرا سکتے ہیں

علاج

- _____ حب ایار ج کے ذریعہ تنقیہ مواد کریں

گل سرخ، سنبل الطیب، بادرنجبویہ، زعفران وغیرہ کا سینہ پر ضماد کریں
اسی نسخہ میں معمولی خد ف و اضافہ سے درج ذیل ادویہ کا ضماد کرائیں

نسخہ ضماد:

سنبل الطیب، زعفران، گل سرخ، مسطکی، ہموزن کو آب برگ بادرنجبویہ سبز میں پیس کر
مقام قلب پر لپیپ کریں۔

• رطوبت کے غلیظ ہونے کی صورت میں روغن گل اور موسوم وغیرہ کی قیروطی

استعمال کرائیں

..... خلط غالب کے تنقیہ کے بعد مفرحات استعمال کرائیں

..... مریض کو غیض و غضب میں لانے کی تدابیر کریں

..... درج ذیل نسخہ حبوب مجرب و مفید ہے

نسخہ حبوب:


جدہ دار شیریں، مقل ازرق، ریوندر چینی، زعفران خالص، درونج عقربی، ہر ایک
ہموزن کو آب برگ تنبول بنگلہ سبز، تھمد حاجت، میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں رصوب،
بنا کر سایہ میں خشک کر کے محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت ۲ گولیاں ہمراہ عرق گلاب
۱۱ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

التهاب بطانة قلب

ENDOCARDITIS

اس مرض میں بطانة قلب (ENDOCARDIUM) میں التهاب پیدا ہو جاتا
ہے، اور عام طور سے قلب کے بائیں جانب کے مصراع زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور مرضی
علامات پیدا کرتے ہیں۔

اقسام



اسباب

(I) حمى وجع المفاصل / حمى حداری

(II) حمى حدری

(III) آتشک

(IV) فقرس

(V) سرطان

(VI) خنازیر

(VII) سل

(VIII) ذات السریه

(IX) حمى محرقه

(X) حمى قمریہ

(XI) خناق دبائی

(XII) اجبال وترسی د Chordae Tendmae کے انتشاق کے بعد

(XIII) قلب کے ایک حصہ کی دوسرے حصہ پر غیر طبعی فرک درگروں

(XIV) غیر طبعی سوراخوں سے خون کا دوران

- (XV) عفونت دم
 (XVI) تقيح الدم
 (XVII) اغشية مخاطية سے ریخی اخراج
 (XVIII) سطح جسم پر کھلے ہوئے زخم
 (XIX) التهاب صفاق
 (XX) تنگ و تاریک مقام پر قیام
 (XXI) یکا یک سخت قسم کی حرکت و ریاضت
 (XXII) سرسام
 (XXIII) التهاب کلیہ
 (XXIV) ذیابیطس
 (XXV) فشار دم قوی و بیش تناب قوی
 (XXVI) تصلب شرائین / صمام اور طی کا تضییق

علامات

التهاب بطانة قلب حاد: بطن قلب د Endocardium • کا یہ التهاب ذاتی یا ابتدائی طور پر شاذ و نادر ہی عارض ہوتا ہے، بلکہ دوسرے متعدی امراض میں عرض کے طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔

سادہ / محمود: بطن قلب، بالخصوص صمامات د Valves، پر چھوٹے چھوٹے سم ملی میٹر تک کے سخت دانے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی سطح بے قاعدہ اور مسوں کی طرح پھٹی ہوئی ہوتی ہے، ان کی اصل نسبتاً باریک ہوتی ہے، یہ دانے قلب کے دائیں طرف قلیل مقدار میں اور بائیں طرف نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی ترکیب میں کمریات، بیضار، لیفین اقرص الدم اور بعض اوقات جراثیم، فنگی اور فیروس / قشب بھی شامل ہوتے ہیں۔

اس قسم کا التهاب عام طور سے درج ذیل انجام تک پہنچتا ہے۔

د دانے زائل ہو جائیں اور متاثر صمامات تندرست ہو جائیں

ر، التهاب خبیث کی طرف منتقل ہو جانا

(III) دانے مقام ماؤف سے علیحدہ ہو کر دوران خون میں شامل ہو جائیں اور کسی دوسرے عضو مثلاً دماغ، ریه، کلیہ اور طحال وغیرہ کی طرف چلے جائیں اور سدا دمویہ کا باعث ہوں۔
(IV) مٹے دانے زائل ہو جائیں لیکن بعد میں متاثر صمومات سخت اور دبیز ہو کر یہ ہیئت بد شکل ہو جائیں۔

ہیملک / خبیثیت: التهاب بطاء قلب حاد کی یہ نوع ابتدائی اور ثانوی دونوں طریقے پر وجود پذیر ہو سکتی ہے، اس صورت میں بھی بطاء قلب پر مٹے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس میں صمومات کی ساختیں ضائع نہیں ہوتیں بلکہ ماؤف صمام قلب کے درمیانی غشاء المنصف یا عضلات قلب میں سوراخ ہو سکتے ہیں، بعض اوقات متاثر صمام کے خلیات کی مقامی موت کی وجہ سے اس کا بہت سا حصہ برباد ہو جاتا ہے، ماؤف حصہ میں کمریات بیضاء لیفیس، اقراص الدم اور جراثیم وغیرہ پائے جاتے ہیں، متعلقہ ساختیں دبیز اور سخت ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا سدا دمویہ حجم میں بڑا ہوتا ہے۔ التهاب کا اثر علی الترتیب سب سے زیادہ صمام تاجی پھر صمام اور طی، صمام ثلاثی الرؤوس اور صمام ریوی پر ہوتا ہے، مقام انسداد پر خراج بن کر دوسرے مقامات پر بھی بہت جلد انتقالی قسم کے خراج ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

جب تک صمومات قلب متاثر نہیں ہو جاتے، کوئی خاص علامت ظاہر نہیں ہوتی، **عمومی:** اور صمومات کے متاثر ہونے پر قلب کی نوک پر دھونکنی کی "ہش" کی مانند ایک ہلکی آواز سنائی دیتی ہے۔

جمی و جمع المفاصل / جمی حداری کے سبب عارض ہونے کی صورت میں حداری علامتوں میں کسی اور طرح کی شدید علامات نمایاں نہیں ہوتیں، درد معدوم ہوتا ہے، چہرہ متفکر، نبض سریع اور ضعیف، سربیع اور متواتر ہوتا ہے۔ دوسرے اسباب کی صورت میں علامات شدید اور بعض اوقات مہلک ہوتی ہیں، مقام قلب پر در واد اذیت محسوس ہوتی ہے، عسر التنفس / ضیق النفس کی شکایت ہوتی ہے، سرد پسینہ خارج ہوتا ہے، مریض بے چین اور مضطرب دکھائی دیتا ہے، نبض دقیق اور مختلف چلتی ہے، جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔

التهاب بطاء قلب حاد خبیثیت کی علامات مختلف اشخاص میں مختلف ہوا کرتی ہیں، بعض

مریضوں میں ابتداء میں بخار آتا ہے اور دو پہر میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پسینہ بھی آسکتا ہے۔ یہ صورت فاعلی زندگی بسر کرنے والوں میں کثیر الوقوع ہے، بعض اوقات جی محرقة سے مشابہ علامات پائی جاتی ہیں، جو دراصل عمومی تعدیہ یا سداویت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نبض اور تنفس سریع ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، عدم اشتہار، تشنگی اور کسمندی ہوتی ہے، عام طور سے مریض چند دنوں میں ہی بے پرواہ اور غنودہ دکھائی دیتا ہے۔ رات میں نہدیان بکتا ہے، پتلا، زرد اسہال آتا ہے، تمدد شکم بھی عارض ہو سکتا ہے۔

التهاب بطانة قلب تحت الحاد: بطن قلب کے التهاب کی یہ صورت نسبتاً کثیر الوقوع ہے۔ اس کا حملہ تدریج ہوتا ہے، اس میں دانے نہیں پیدا ہوتے، اور بالفرض ہو بھی جائیں تو صمام اور طی تک ہی محدود ہوتے ہیں، تاہم صمام تاجی زیادہ متاثر ہوتی ہے، جبال و تری بھی متاثر اور مآؤف ہوتے ہیں۔ اس التهاب میں جراثیم بہت قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور عام طور سے اس میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے، تاہم صحت یاب ہونے والے اشخاص میں مقام مآؤف پر پہلے لیفی تغیرات ہوتے ہیں اس کے بعد نکلس پیدا ہو کر مریضی تغیرات موقوف درک ہو جاتے ہیں۔

التهاب بطانة قلب مزمن: التهاب بطانة قلب کی یہ صورت تیس سال سے کم عمر کے افراد میں شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہے، اس میں مہرا عوں مستقل تشوعات اور تغیرات رونما ہوتے ہیں، چنانچہ صمام قلب، خاص طور سے صمام اور طی خاص طور سے متاثر ہوتی ہے، صمام سخت ہونے کے علاوہ سکڑ کر دبیز ہو جاتی ہیں، اور ان کے مختلف طبقوں (layers) میں التصاق ہو کر ان میں کلسی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں، جبال و تری چھوٹی اور دبیز ہو جاتی ہیں، جس کے سبب تقہقر یا تضیق ہو جاتا ہے، ملحوظ رہے کہ بطن قلب کا یہ التهاب بھی ابتدائی یا ثانوی طور پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے، قلب کا دایاں حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس میں پیدا ہونے والے مسے التهاب بطن حاد سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور یہ سختی ان کے کناروں پر ہوتی ہے، بعض اوقات تمام کی تمام چفٹ سخت ہو جاتی ہے، صمام اور طی کے مآؤف ہونے کی صورت میں اس کی ہلدی چفٹیں عام طور سے اور طی کی دیوار کی جانب سمٹ جایا کرتی ہیں، جس کے نتیجہ میں بعض اوقات خریان اکلیلی بھی متاثر ہو کر بند ہو جاتی

ہے۔ صمام تاجی کے متاثر ہونے کی صورت میں بعض اوقات اس کے کنارے لمبائی میں چمٹ جاتے ہیں اور دند کی مانند سودا رخ رہ جاتا ہے جس سے تضیق صمام تاجی عارض ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ تغیر مبالغہ دہ اور عمدہ لمحیہ تک محیط ہو جاتا ہے یا ان لیفی چٹنوں میں تھلب اور ٹکلس ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

قلبی فعلی سرسراہٹ Functional Heart Murmurs	التهاب بطانہ قلب Endocarditis
۱۔ دوران خون میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔	۱۔ دوران خون میں رکاوٹ ہوتی ہے۔
۲۔ عظم قلب نہیں ہوتا۔	۲۔ عظم قلب یا اتساع قلب ہوتا ہے۔
۳۔ مریض عام طور سے کمزور ہوتا ہے اور سواغنیہ ہوتا ہے۔	۳۔ مریض عام طور سے قوی ہوتا ہے۔
۴۔ اکثر قاعدہ قلب پر سرسراہٹ ہوتی ہے۔	۴۔ نرادیہ قلب پر سرسراہٹ ہوتی ہے۔
۵۔ سرسراہٹ دوری و نوبتی ہوتی ہے۔	۵۔ سرسراہٹ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔
۶۔ مناسب علاج سے سرسراہٹ معدوم ہو جاتی ہے۔	۶۔ علاج سے سرسراہٹ غائب نہیں ہوتی۔

تفریقی علامات

حمی تیفوئیدہ Typhoid Fever	التهاب بطانہ قلب قرحی Ulcerative Endocarditis
۱۔ حمی مداری کی سرگزشت معدوم ہوتی ہے	۱۔ عام طور سے حمی مداری کی سرگزشت ملتی ہے
۲۔ ہفتہ وار مخصوص حرارت بدنی ہوتی ہے	۲۔ حرارت بدنی غیر منظم ہوتی ہے
۳۔ مرض کی رفتار سست ہوتی ہے	۳۔ مرض کی رفتار سریع ہوتی ہے
۴۔ سدہ کی علامات عام طور سے موجود نہیں ہوتیں	۴۔ سدہ کی علامات عام طور سے ملتی ہیں
۵۔ قلبی سرسراہٹ معدوم ہوتی ہے	۵۔ قلبی سرسراہٹ موجود ہوتی ہے
۶۔ شکم پر گلابی رنگ کے طفحات عدسی ملتے ہیں	۶۔ جسم پر طفحات نملی ملتے ہیں
۷۔ مخصوص اسہال زکسیر کی علامات ملتی ہیں	۷۔ مخصوص اسہال زکسیر کی شکایت نہیں ہوتی

تفریقی علامات

تفیع الدم Pyemia	التهاب بطانة قلب قرحی Ulcerative Endocarditis
۱۔ ضرب یا دوسرے مرض کی سرگزشت ملتی ہے	۱۔ عام طور سے حمی مداری کی سرگزشت ملتی ہے
۲۔ قلبی سرسراہٹ معدوم ہوتی ہے	۲۔ قلبی سرسراہٹ موجود ہوتی ہے
۳۔ تنفس شیریں ہوتا ہے	۳۔ تنفس ترش ہوتا ہے
۴۔ جلد پر شدید یرقان اثرات ہوتے ہیں	۴۔ طفحات غلی جسم پر ملتے ہیں
۵۔ حواس کی صحت اس کے بعد رغودگی ہوتی ہے	۵۔ حواس میں خلل کے بعد ہدیان ہوتا ہے

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ مریض کو جسمانی تحریکات سے روک دیں
- ۳۔ قبض نہ ہونے دیں
- ۴۔ تفرج کی صورت میں خون کو سمیت مرض سے پاک کریں
- ۵۔ التهاب غلاف قلب کا اصول علاج اور علاج اختیار کریں

علاج

- ۱۔ درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: گاؤزبان گل گاؤزبان ہر ایک ۱۲۰ گرام، برادہ صندل سفید، اسطوخودوس، بادرنجبینہ، بسفاج، فستق ہر ایک ۵ گرام، عرق گلاب، عرق بید مشک ہر ایک ایک لیٹر، عنبر اشہب ۵ گرام، عنبر کوئیچہ کے منہ پر لٹکائیں اور بدستور دو لیٹر عرق کشید کریں اور حسب ضرورت ۴۰ ملی لیٹر نوش کرائیں

- ۲۔ درج ذیل عرق گذر بھی مفید ہے

نسخہ عرق گدود: گاجر کا گودہ، بہن سفید، بہن سرخ، صندل سفید، گاؤزبان،

گل گاؤ زبان، خولجان، شقاق، قاتلتین، پودینہ سبز ہر ایک ۵ گرام، عنبراشہب ۳ گرام، حسب دستور عرق کشید کریں اور ۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
یہ نسخہ جوب بھی محرب ہے

نسخہ حب حیات: مروارید ناسفتہ، زہر مہرہ، صندل سفید، ہر ایک ۳ گرام، عود، جودار، بنفشہ، ہر ایک ۵ گرام، مشک ایک گرام، ۷۰ ملی گرام، ورق نقرہ ایک گرام، جملہ دواؤں کو باریک پس کر عرق گلاب میں گوندھ کر ایک ایک گرام کے جوب بنائیں اور ایک ایک حب صبح، دوپہر، شام، ہمراہ عرق گلاب و عرق بید مشک نوش کرائیں۔
— عرق تنبول استعمال کرائیں

نسخہ عرق تنبول: مشک ۲ گرام، صندل سفید ۷ گرام، ابریشم مقرض، گل گاؤ زبان، ہر ایک ۳۰، قرنفل، گل سرخ، گاؤ زبان ہر ایک ۵۰، ۲ گرام، پان (تنبول)، ۱۰۰ عدد عرق گلاب ۵۰۰ ملی لیٹر، پانی حسب ضرورت — جملہ دواؤں کا بطریق معروف عرق کشید کریں اور حسب ضرورت نوش کرائیں

— خمیرہ مروارید، دوار المسک معتدل، خمیرہ ابریشم ہارشدی اور خمیرہ گاؤ زبان عنبری بطور مقوی قلب استعمال کرائیں۔

التهاب غلاف قلب

PERICADITIS

اس مرض میں قلب کے بیرونی حصہ کو ملفوف کرنے والی غشاء اور غلاف قلب میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں

۱۔ اس کا دوسرا نام "التهاب التامر" ہے

اقسام | مادہ اور کیفیت کے اعتبار سے

التهاب غلاف قلب

(Pericarditis)

التهاب غلاف قلب مزمن

(Chronic Pericarditis)

التهاب غلاف قلب مزمن محصور

(Chronic Constrictive Pericarditis)

التهاب غلاف قلب حاد

(Acute Pericarditis)

التهاب غلاف قلب حاد بعد اجتماع رطوبات

التهاب غلاف قلب حاد انسكابي

(Pericarditis With Effusion)

التهاب غلاف قلب حاد قبل اجتماع رطوبات

التهاب غلاف قلب حاد فائبريني

(Acute Fibrous Pericarditis)

التهاب غلاف قلب حاد انسكابي دموي
التهاب غلاف قلب حاد انسكابي قيحي

اس مرض کے ابتدائی / ذاتی اور ثانوی / شرکی متعدد اسباب ہیں، ذیل میں

چند مشہور اسباب تحریر کئے جا رہے ہیں

اسباب

(Myocardial Infarction)

(I) ميتوتة القلب

(Coxsackie b Viral Infection)

(II) كوكسيكي قيشبي سرايت

(III) حمى حداري

(IV) تدرن

(Empyema)

(V) تقيح الصدر

(VI) تقرح في منتصف الصدر

(VII) ذات الريه مزمن

(Osteomyelitis)

(VIII) التهاب عظام

(XL) التهاب کلیہ تحت المحاد

(X) تعفن الدم

(XL) مجاور اعضاء کے التهاب کا تجاوز کر کے غلاف قلب تک پہنچ جانا

(XL) ابیاض الدم

(XL) انفلونزا

(XL) تسمم الدم کے جملہ اسباب

(XL) حمیات مادہ متعدیہ

(XL) سرایت:

(Streptococcus)

(Staphylococcus)

(Pneumococcus)

(I) بقیہ سیمیہ

(II) بقیہ ضمیمہ

(III) بقیہ نمونیا

(XL) ضرب

(XL) مقامی خراش

(XL) حلی نقرس

(XL) خراج کبد

(XL) اسکر بوط

(XL) ذیابیطس

(XL) جدری / حصیہ

علامات | امراضیاتی نقطہ نظر سے درج ذیل علامات ملتی ہیں

التهاب غلاف قلب حاد:

لیفی (فائبرینی): التهاب غلاف قلب ماد کی یہ نوع نہایت کثیر التوقع اور بے ہزار تصور کی جاتی ہے اور اس مرض میں مبتلا ۷۰ فیصدی مریض اس نوع (التهاب غلاف قلب حاد لیفی) میں مبتلا ہوتے ہیں اور ۵۰ فیصدی سے زیادہ مریض ۲۱ سال کی عمر سے قبل ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس نوع کا التهاب عام طور سے غشاء مائی (غشاء الرطب) سے شروع ہو کر غشاء لیفی تک

پھیل جاتا ہے، چنانچہ اولاً غشاء مائی کی چکنی سطحیں، غلیات بشری کے متورم ہو جانے اور رطوبت لمفاوی کے اخراج سے دھندلی اور چپکدار ہو جاتی ہیں، ان کی عروق دمویہ میں اجتماع الدم ہو جاتا ہے۔ بیرونی سطح پر رطوبت ظلیہ درطوبت لفاویہ، اور لیفی مادہ کی ایک غشاء سی پیدا ہو جاتی ہے، اس غشاء کو اٹھا کر دیکھنے سے اس کی نچلی سطح پر اجتماع خون / دموی نقاط موجود ہوتے ہیں، جیسے جیسے ریشہ دار غشاء دبیز ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے متصلہ عروق کی متواتر رگوں سے شہید کے تھتے کی مانند چنٹ دار ہوتی جاتی ہے۔ التهاب کی خفیف صورتوں میں متصلہ عضلات قلب طبعی نظر آتے ہیں لیکن شدید حالات میں عضلات قلب میں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ۲، ۳ ملی میٹر گہرائی تک پیوست اور زردی مائل نظر آتے ہیں۔ التهاب غلاف قلب کی سب سے پریشان کن علامت، اس میں قطعاً مفقود ہوتی ہے۔ التهاب غلاف قلب کی یہ نوع یہاں پر اکسٹم ہو جاتی ہے، اس صورت میں اس کو التهاب غلاف قلب ماد یا بس بھی کہتے ہیں۔ بصورت دیگر التهاب غلاف قلب حاد، انسکابی / رطوبی کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔

التهاب غلاف قلب حاد انسکابی: التهاب غلاف قلب کی یہ صورت دراصل التهاب غلاف قلب ماد لیفی / بیوسی کا ثانوی درجہ ہوتی ہے، مرض کے آغاز میں غلاف قلب میں درد محسوس ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، قشریرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں خوف غلاف قلب میں ۲۰۰ - ۳۰۰ سی سی تک درج ذیل تین اقسام کی رطوبات تراوش پاکر جمع ہو سکتی ہیں۔

(I) رطوبت هصلى لیفی: اس میں غلاف قلب، التهاب لیفی حاد کی مانند نظر آتے ہیں، مرض کا انجام بام طور سے خوشگوار ہوتا ہے، تاہم قلبی افعال کی میکانی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور ویری ممتلی فشل قلب نمایاں ہو سکتا ہے اور رطوبات کا ترشح جس قدر زیادہ ہوتا ہے انجام اتنا ہی زیادہ غیر خوشگوار ہوتا ہے۔

(II) رطوبت دموی: اس میں غلاف قلب کی ہر دو سطحوں میں متعدد مقامات پر نزف دموی ہو کر اجتماع الدم عارض ہو جاتا ہے، رطوبت طفاوی میں کمی واقع ہو جاتی ہے البتہ قاعدہ تامورہ پر دہی کی مانند غلیظ سی رطوبت طفاویہ پائی جاتی ہے۔

(III) رطوبت قیچی: اس میں غلاف قلب کی سطح سلیٹی رنگ کی کھردری اور دانہ دار

ہو جاتی ہے اور اس کا اثر کسی حد تک قلب پر بھی پڑتا ہے، چنانچہ قلب کی دیوار کو شق کر کے دیکھا جائے تو وہ ۳۰۲ ملی میٹر گہرائی تک زرد اور دھندلی دکھائی دیتی ہے، اس کے ساتھ عام طور سے التهاب بطن قلب بھی پایا جاتا ہے، اس کا انجام عام طور سے خراب ہوتا ہے

معدی مدی علاقات: سریری علامات کے ذیل میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ التهاب غلاف القلب چونکہ عام طور پر جی ہمداری یا اس جیسے دوسرے امراض کے دوران ثانوی طور پر رونما ہوتا ہے، اس لئے عین ممکن ہے کہ اس کی علامات ان امراض کی علامتوں سے بالکل دب جائیں یا پوشیدہ ہو جائیں جو التهاب غلاف قلب کے باعث ہیں، اور اس کی موجودگی صرف اصوات قلب کے تغیر اور دوسری طبیعی علامتوں سے معلوم ہو، ویسے عام طور پر اس کی مخصوص علامتیں موجود ہوتی ہیں۔

جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سردی کے ساتھ قلب کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے جس کی ٹیسس بائیں بازو اور بعض اوقات نیچے انگلیوں تک جاتی ہیں، یہ درد نہایت شدید اور خفیف دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، حرکت اور تنفس سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل شدت سے دھڑکتا ہے اور بعض اوقات مقام قلب پر دبانے سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے، نדיان بھی ہو سکتا ہے، مختصر خشک کھانسی اور گہری سانسوں کے ساتھ دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے، سوز، تنفس ہوتا ہے، جسم یا تو پسینہ سے تر ہو جاتا ہے یا جلد گرم و خشک ہوتی ہے، چہرہ پھیکا، بے رونق، متفکر اور پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات خماروں پر سرنخی بھی ہوتی ہے، نبض سریع، صلب اور غیر منتظم یا سریع، ضعیف، غیر منتظم جلتی ہے۔

قلب کے مقام پر ٹھوس رقبہ ابتداء میں بہت کم بڑھا ہوا ہوتا ہے، تاہم احتکاک (گڑبڑ) کی آواز خوب تیز سنائی دیتی ہے، جو قلب کی آواز کے ساتھ دہری ہو جاتی ہے، جوں جوں غلاف قلب کی غشاء سے پانی ترشح ہوتا جاتا ہے آواز بالقرع، زیادہ سنائی دیتی ہے، سینہ کے پاس کان لگا کر سننے سے رگڑ کی آواز دفرکش ساؤنڈ، سنائی دیتی ہے، ابتداء میں یہ آواز ملائم ہوتی ہے مگر رطوبت لمفاوی پیدا ہونے کے بعد رگڑ کی آواز تیز سنائی دیتی ہے، لیکن غلاف قلب میں زیادہ مقدار میں اجتماع رطوبات یا دونوں طبق کے التصاق کی صورت میں یہ آواز معدوم ہو جاتی ہے۔ بہر حال رگڑ کی آواز سینہ کے درمیانی حصہ کے کسی قدر بائیں جانب، عظم نقص کے درمیانی حصہ پر سنائی دیتی ہے، اور وہاں سے سارے قلب میں پھیل جاتی ہے، اس

آواز کے ساتھ مرمر کی آواز بھی آتی ہے۔ بھیر جیسا کہ ابھی مذکور ہوا کثرت احتمال و انحراف کے ساتھ یہ آواز رفتہ رفتہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اور رطوبات کے انحراف کے عمل کی صورت میں یہ علامتیں رفتہ رفتہ بھیر ظاہر ہونے لگتی ہیں اور شدید عوارض میں قلبی ضعف میں اضافہ ہو جاتا ہے بیش قلبی درد میں غیر معمولی شدت آجاتی ہے چہرہ اترا اور پیکا ہوتا ہے اور مریض ادنیٰ طور پر قتل قلب سے ہلاک ہو جاتا ہے۔

بہر حال التهاب غلاف قلب حاد میں سبب مرض کا ردی ہونا جمع شدہ رطوبات کی کثرت، نفس کی زیادتی اور عضلہ قلب کی غیر طبعی حالت، چہرہ پر نیلا ہٹ اور ضعف و سرعت، نفص وغیرہ اچھی علامات تصور نہیں کی جاتیں۔

التهاب غلاف قلب مزمن: التهاب غلاف قلب حاد انسکابی کے بعد بعض مریض رطوبات کے انحراف سے بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ان میں بظاہر کوئی تکلیف و عارضہ باقی نہیں رہتا مگر بعض جوان مریضوں میں التهاب غلاف قلب حاد، مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے دونوں طبقے متاثرہ مقام پر آپس میں چمٹ جاتے ہیں یا دبیز اور موٹے ہو جاتے ہیں اور مقام مآوف کی وسعت اور ضعف کے اعتبار سے معمولی سے خطرناک نتائج پیدا کر دیتے ہیں غلاف قلب کا یہ التصاق دو طرح کا ہوتا ہے۔

(I) التصاق ساذج: یہ غلاف قلب کے دونوں طبقوں کے درمیان ہی ہوتا ہے اور یہی صورت کثیر الوقوع ہے اس کے قلب کی کارکردگی میں کوئی نمایاں نقص پیدا نہیں ہوتا۔
(II) التصاق مرکب: اس صورت میں غلاف قلب کا بیرونی طبقہ، یہ دیا فرغما عظم نقص یا اضلاع کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس سے بعض اوقات اعصاب حجابی متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ نیز دیا فرغما کی طبعی حرکات میں رکاوٹ پیدا ہو کر قلب میں شدید عظم اور اتساع پیدا ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر ضیق النفس استسقاء زرقی اور اعتناتی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ التصاق بعض اوقات تار عنکبوت دھڑکی کا جالا کی طرح پھیرا اور نہایت کمزور ہوتا ہے جس کو انگلیوں کے ذریعہ توڑا جاسکتا ہے اور بعض اوقات اس قدر دبیز ہو جاتا ہے کہ تمام غلاف قلب پر محیط ہو کر ایک پردہ بنا دیتا ہے، زاویہ غلاف قلب کے مقابلے میں قاعدہ پر یہ التصاق زیادہ عام اور نمایاں ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

التمہاب بطنہ قلب حاد

۱. گہری رگڑ کی آواز آتی ہے۔
۲. سرسراہٹ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔
۳. تبدیلی وضع سے سرسراہٹ میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔
۴. گہری سانس سے سرسراہٹ میں کسی طرح کی تیزی واقع نہیں ہوتی۔
۵. سرسراہٹ کا صورت کے قلب سے متصل ہونا لازمی ہے۔
۶. نبض قلب قوی ہوتا ہے۔
۷. قلبی ٹھوس آواز میں اضافہ نہیں ہوتا۔
۸. سرسراہٹ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔

التمہاب غلاف قلب حاد

۱. سطحی رگڑ کی آواز آتی ہے
۲. سرسراہٹ محدود حصہ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے
۳. تبدیلی وضع بالخصوص جھکنے سے سرسراہٹ نہیں ہوتی
۴. گہری سانس لینے سے سرسراہٹ تیز ہو جاتی ہے
۵. سرسراہٹ کا قلب کی آواز کے ساتھ متصل ہونا لازمی نہیں ہوتا۔
۶. نبض قلب توجی اور ضعیف ہوتا ہے۔
۷. ترشح رطوبات میں قلبی ٹھوس آواز کی حدود میں اضافہ ہو جاتا ہے
۸. اجتماع رطوبات سے سرسراہٹ معدوم ہو جاتی ہے اور انجذاب کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے

تفریقی علامات

ذات الجنیب حاد

۱. درد شدید اور قاطع ہوتا ہے۔
۲. تنفس سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے
۳. نبض قوی چلتی ہے۔
۴. رگڑ کی آواز سانس روکنے سے بند

التمہاب غلاف قلب حاد

۱. درد شدید نہیں ہوتا۔
۲. تنفس سے درد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
۳. نبض ضعیف چلتی ہے
۴. رگڑ کی آواز ہمیشہ موجود رہتی ہے

اتساع القلب / عظم القلب

- ## التهاب غلاف قلب النسيجي

۔۔۔ جسمانی و دماغی تحریکات پر پابندی عائد کریں کیونکہ معمولی سی تحریک بھی جان لیوا ہو سکتی ہے

- ۔۔۔ تنفس میں پریشانی ہو تو اس کا نظم کریں
۔۔۔ اصل سبب کا ازالہ کریں
۔۔۔ التهاب کلیہ کی صورت میں مقام قلب پر مبردات استعمال کریں
۔۔۔ موسم سرما ہو اور مریض کمزور ہو تو گرم تدابیر اختیار کریں
۔۔۔ قوی اجازت دیں تو جو نمکیں لگائیں سنگیاں کھنچوائیں، گلاس لگانا بھی مفید ہے
۔۔۔۔۔ حسب ضرورت محلات اور مبردات استعمال کریں
۔۔۔ دئی التهاب / محصور التهاب غلاف القلب کی صورت میں مبردات استعمال کریں

ماہنامہ تعمیر میں سناپ ۵، سپستان ۹ عدد، جوش دے کر نوش کرائیں

مقام قلب پر درج ذیل منہ دلائیں

نسخہ ضماد: سورنجان، کتیاں، اکلیل الملک، عنب الثعب، خطمی، بابونہ، سب کو باریب
پیس کر مقام قلب پر ضماد کریں۔

اگر موسم سرما کا ہو اور مریض کمزور ہو تو مقام قلب پر گرم روئی یا پلٹس سے

حرارت پہنچائیں

• شہید درد کی صورت میں پسلیوں کے کنارے قلب کے ذاذ میں ۳، ۴

جوئیں لگائیں

• چہرہ پر نیلا ہٹ آجائے تو قصہ کے ذریعہ خون نکالیں

• درج ذیل نسخہ نوش کرائیں

نسخہ: گل گاؤز بان، گل سیوطی، بادر نجمویہ، گل سرخ، سورنجان، عنب الثعب، ہر ایک
۳ گرام۔ جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر سرد کر کے شربت بزوری ۲۵ ملی لیٹر ملا کر
نوش کرائیں۔

• ضعف قلب کی صورت میں خمیرہ گاؤز بان، عنبی، دوار المسک، حارہ ہروالی،
یا خمیرہ مردارید، میں سے کوئی ایک ۵ گرام، سہراہ عرق مکور، عرق گاؤز بان، ہر ایک ۵ ملی لیٹر،
نوش کرائیں۔

• اگر منوم کی ضرورت ہو یا دافع الم درکار ہو تو افیون کے مرکبات استعمال
کرائیں تاہم اس میں احتیاط لازمی ہے۔

• گل بابونہ، گل خطمی، سبوس گندم، پر سیاوشان، اکلیل الملک، عرق کیوڑہ
میں جوش دے کر نیم گرم تکمید کریں

• گل بابونہ، اکلیل الملک، تخم کتیاں، برگ خطمی، برگ پودینہ، زعفران کو عرق
بید مشک میں باریک پیس کر نیم گرم ضماد کریں

• گل سرخ، سنبل الطیب، زعفران، صندل سفید کو عرق بادر نجمویہ، میں ملا کر
نیم گرم ضماد کریں

• گل سیوطی، گل چاندنی، گل گاؤز بان، ہر ایک ۳ گرام، برگ بادر نجمویہ،
گل منڈی، ہر ایک ۵ گرام — پانی میں جوش دے کر مل چھان کر خمیرہ گاؤز بان ۲۳ گرام

ملا کر نوش کرائیں

آب سنترہ، آب چندر، آب گدڑ، عرق گاؤزبان کا بھپارہ دیں اور نوش کرائیں

التهاب عضلة قلب

(MYOCARDITIS)

اس مرض میں قلب کے عضلات (Myocardium) میں بوجہ التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کے طبعی افعال میں فرق آجاتا ہے اور مرضی عوارض رونما ہوتے ہیں۔

اقسام

التهاب عضلة قلب

(Myocarditis)

التهاب عضلة قلب مزمن

Chronic Myocarditis

التهاب عضلة قلب مزمن ليفي

Chronic Fibroid Myocarditis

التهاب عضلة قلب حاد

Acute Myocarditis

التهاب عضلة قلب حاد غير تقيحي

Acute Non Suppurative Myocarditis

التهاب عضلة قلب حاد تقيحي

Acute Suppurative Myocarditis

اسباب

(I) حمى و جمع المغاصل رحمى حدارى

(II) حمى قرمزية

(III) خناق

(IV) التهاب تامور

(V) التهاب بطانة قلب

(VI) خون کے عفونتی امراض

- (VII) عفونت نفاسیہ
 (VIII) التهاب سحاق
 (IX) التهاب نخاع العظام
 (X) ذات السریہ (شاذونادر)
 (XI) حصیہ
 (XII) کوکسائی
 (XIII) بی۔ تعدیہ
 (XIV) درم اصل الاذن
 (XV) انف العنزہ
 (XVI) دار المقوسات
 (XVII) دار المتقیات
 (XVIII) ادویاتی بیش حساسیت مثلاً
 (I) سلفونامائیڈ
 (II) پنسلین
 (III) اسٹریپٹوما سی
 (IV) فینائل بوتازون
 (V) کلور پروپو مائیڈ
 (VI) رینین ڈایون
 (VII) جدرنیہ جدری
 (VIII) سرسام
 (IX) Chlorpropomide
 (X) Rhenundione
 (XI) Small Pox Vaccine

علامات :

التهاب عضله قلب حاد غیر تقیمی: عضله قلب کے التهاب کی یہ کیفیت عام طور سے التهاب غشاء القلب (Pericarditis) یا التهاب بطانة قلب (Endocarditis) کی ترقی کا نتیجہ ہوتی ہے اور التهاب تاملور کی وجہ سے عارض ہونے والا التهاب عضله قلب

نسبتاً زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے، اور بطن قلب کے التهاب کی صورت میں مرضی اثرات خاص طور سے مقامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔

التهاب عضلہ قلب حاد تقیحی: التهاب عضلہ قلب حاد کی یہ نوعیت عام طور سے کسی عمومی سرایت کا نہ صرف نتیجہ بلکہ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے، قلب میں یہ کیفیت کسی سرایت زدہ علاقہ دمویہ کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔

بہر حال التهاب عضلہ قلب حاد تقیحی، غیر تقیحی دونوں ہی صورتوں میں عام طور سے عضلہ قلب اور بطن قلب میں سوزش محسوس ہوتی ہے، حمی حداری کی صورت میں اس کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں، قلب کی رفتار میں سرعت اور مفاصل میں درد محسوس ہوتا ہے، راس القلب پر انقباضی لفظ ہوتی ہے اور عام طور سے مرض کا انجام اچھا ہوتا ہے تاہم خناق اور مرض چغاس (Chagas Disease) میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور حاد حالت سے نجات کے ۱۰-۲۰ سال بعد مزمن قلبی عضلی مرض (Chronic Cardiomyopathy) رونما ہو سکتی ہے

التهاب عضلہ قلب مزمن: یہ صورت التهاب عضلہ قلب حاد کے بعد پیدا ہوتی ہے اور تدریج ترقی کرتی رہتی ہے اور مرض کی تشخیص عام طور سے یعنی تغیر کے آخری درجہ میں ہو پاتی ہے، اور کچھ عرصہ بعد ضعف قلب کی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔

التهاب عضلہ قلب مولود کی صورت میں سقوط قلب کی علامات کے ساتھ ساتھ التهاب دماغ اور التهاب کبد بھی ہوتا ہے، عظم القلب کی علامت بھی ملتی ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ مریض کو جسمانی تحریکات سے منع کر دیں
- ۳۔ مقام قلب پر برف کی تھیلی رکھیں
- ۴۔ ضعف قلب کی صورت میں مقویات و محرکات استعمال کرائیں
- ۵۔ قصہ کھولیں

علاج حسب ضرورت باسلیق کی قصہ کھولیں

_____ عرق گلاب اور سرکہ میں صندل اور کافور گھس کر اس میں کپڑا تر کر کے مقام قلب پر رکھیں۔

_____ ضعف قلب کی صورت میں خمیرہ گاؤزبان عنبری یا خمیرہ صندل ۶ گرام کھلائیں

_____ شدید ضعف قلب کی صورت میں مہرح اعظم ۷ گرام یا دوار المسک ۵ گرام

ہمراہ ماء اللہم مکوہ کاسنی والا ۸۵ ملی لیٹر کھلائیں

_____ درج ذیل نسخہ بھی مفید اور مجرب ہے

نسخہ: رب السوس ایک گرام، خمیرہ خشتیاش ۷ گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد

خمیرہ تخم خرفہ سیاہ ۳۴ گرام، کوکنار ۲ عدد، عرق گاؤزبان ۱۴۵ ملی لیٹر میں نکال کر مل چھان

کر شربت اعجاز ۳۶ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں

_____ برف کے پانی میں تھوڑا سا کافور ملا کر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے نوش کرائیں

_____ تحلیل و تلطیف مادہ کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں:

نسخہ: بابونہ، اکلیل الملک، پرسیاوشاں، خطمی، سبوس گندرم، شلجم، عنب الثعلب،

تخم کرنب ہر ایک، اگر گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مقام قلب اور فم معدہ پر بطول کریں

_____ بابونہ، تخم کتان، اکلیل الملک، برگ خطمی، برگ کرنب، نمام اور زعفران کا

ضماد کریں۔

_____ تخم کتان، گل بنفشہ، سبوس گندرم، نیلوفر، انگور، برگ فرنجیشک، ریحان سبز،

گل بادرنجبویہ، ہموزن کا انکباب کریں۔

_____ تخم گاؤزبان، تخم ریحان، بادرنجبویہ کو جوش دے کر، عرق گلاب ملا کر نوش

کرائیں۔

_____ اگر خفیف ملین کی ضرورت ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: گل بنفشہ، گل گاؤزبان، عنب الثعلب، بادرنجبویہ، ہسفانج ہر ایک ۹ گرام،

عناّب ۲۰ عدد، سپستان ۱۰۰ عدد، مویز منقی ۴۴ گرام، خوبانی ۷ عدد، عرق گلاب ۲۵۰ ملی لیٹر

عرق کیوڑہ ۲۲۵ ملی لیٹر، رات میں بھگو کر صبح کو جوش دے کر مل چھان کر گلقدز مغز تخم خیازشبز

ہر ایک ۴۸ گرام، ترنجبین، ۶ گرام، روغن بادام ۷ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں

_____ اس کے بعد درج ذیل نسخہ تہریدہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تہرید :

— — — جو ہر مہرہ ۱۰ گرام خمیرہ گاؤز بان منبری ۱۰ گرام، ورق ذہب ایک عدد ملا کر استعمال کرائیں اور آنسو، بسفاج، گل گاؤز بان، ہر ایک ۷ گرام، بادیان، بادرنجبویہ ہر ایک ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بادرنجبویہ عرق گاؤز بان ہر ایک ۳۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
ورم جار کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولنے کے بعد شربت نیلوفر ۳۴ ملی لیٹر، عرق مکوہ، عرق شاہترہ ہر ایک ۴۰ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

اتساع قلب

CARDIAC DILATATION

اس مرض میں قلب کے کہفوں (Chambers) کی جسامت میں اضافہ اور اتساع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بطن میں طبعی طور پر انقباض نہیں ہو پاتا اور کچھ پس ماندہ خون (Residual Blood) باقی رہ جاتا ہے، اور دیگر مرضی علامات و عوارض رونما ہو جاتے ہیں۔

اقسام

اتساع القلب

Cardiac Dilatation

اتساع تجاویف قلب مع تعظم دیوار قلب اتساع تجاویف قلب مع ترقق دیوار قلب

اسباب

(I) دوزخ خاص طور سے دوڑنا اس صورت میں اتساع تجاویف قلب مع تعظم دیوار قلب

۱۔ قلب کی تجاویف میں اتساع و Dilatation کے ساتھ قلب کی دیواروں میں بھی تعظم اور مٹایا ہوتا ہے۔

۲۔ قلب کی تجاویف میں اتساع کے ساتھ قلب کی دیواریں پٹلی ہو جاتی ہیں۔

کثیرالوقوع ہے)

(II) مہملات قلب کے بعض مزمن امراض

(III) فشار دم قوی

(IV) دل پر کام کا بوجھ بڑھنا

(V) عضلہ قلب میں سمیت کا نفوذ کرنا

(VI) نظام دوران خون کی کوئی سہادیت

(VII) بعض کیاوی مادے اور سمیات ساریہ

(VIII) تسم الدم

(IX) پیری

علامات | مرض کی ابتداء عام طور سے زیر بار تجویف سے ہوتی ہے اور آخری مرحلے میں مہملات

کے سوراخ پھیل جاتے ہیں اور مہملات میں عدم کفایت (Insufficiency) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اطراف میں دم رخور و نما ہوتا ہے، امتلاء جگر اور ضعف جگر کی علامات ملتی ہیں، عظم بھی ہوتا ہے، حجاب ریہ میں انسکابی کیفیت ہوتی ہے، عسر تنفس ہوتا ہے، نبض صغیر اور منظم چلتی ہے، چہرہ زرد نیلگوں ہوتا ہے۔

ذیل میں چند تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

عظم قلب (Cardiac Enlargement)	اتساع قلب (Cardiac Dilatation)
۱۔ سہائی میں ٹرپ ہوتی ہے۔	۱۔ اور دھ بھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔
۲۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے۔	۲۔ چہرہ زرد نیلگوں ہوتا ہے۔
۳۔ نبض عظیم ہوتی ہے۔	۳۔ نبض صغیر اور منظم چلتی ہے۔
۴۔ نبضۃ القلب واضح اور قوی ہوتی ہے۔	۴۔ نبضۃ القلب مبہم اور کمزور ہوتی ہے۔
۵۔ اصوات قلبی تیز ہوتی ہیں۔	۵۔ اصوات قلبی ضعیف ہوتی ہیں۔

- ۴۔ اصوات اولی در پہلی آواز (مہم) ۴۔ اصوات اولی در پہلی آواز (طویل اور تیز ہوتی ہیں۔
قصیر اور صوت ثانی (دوسری آواز) کے مشابہ ہوتی ہیں۔

تفریقی علامات

- | استماع قلب | شحات قلب |
|--|--|
| ۱۔ نبض منتظم چلتی ہے۔ | ۱۔ نبض غیر منتظم چلتی ہے۔ |
| ۲۔ ٹھوس آواز کی حدود بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ | ۲۔ ٹھوس آواز کی حدود بڑھی ہوئی نہیں ہوتیں۔ |
| ۳۔ قلب کی پہلی آواز کمزور ہوتی ہے۔ | ۳۔ قلب کی پہلی آواز معروم ہوتی ہے۔ |
| ۴۔ قلبی سرسراہٹ عام طور سے پائی جاتی ہے۔ | ۴۔ قلبی سرسراہٹ نہیں ہوتی۔ |
| ۵۔ تنفس طبعی یا سریع ہوتا ہے۔ | ۵۔ تنفس بقراطی (رشین اسٹوکس) ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ علامات دماغی معروم ہوتی ہیں۔ | ۶۔ دماغی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ |

اصول علاج

- ۱۔ مقویات قلب استعمال کرائیں۔
- ۲۔ مفرحات کھلائیں۔
- ۳۔ تفسیق کی تدابیر کریں۔

علاج۔ قرص کشتہ مرورید ایک عدد، خمیرہ مرورید بہ نسخہ کلاں ۴ گرام صبح کو کھلائیں۔
خمیرہ مرورید بہ نسخہ کلاں:

مرورید ۱۲ گرام، بیشب کھربا، صندل سفید، طباشیر ہر ایک ۴ گرام کو باریک پیس لیں۔ رب انار، شہر خالص رب سیب، رب بھی ہر ایک ۴ گرام، قند سفید ۲۵ گرام، عرق کیوڑہ حسب ضرورت، ورق نقرہ ۴ گرام، وزن طلا ۵۰ گرام، قوام بنا کر باریک کریں دواؤں کو اس میں ملائیں، اس کے بعد ورق نقرہ اور ورق طلا ملا کر

..... ۱۔ سہ پہر اور رات میں قرص زہر مہرہ مرکب ۱۱ عدد کھلائیں
..... ۲۔ قرص عقیقہ ۲ عدد، خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والاگرام کے ساتھ کھلائیں اور
سہ پہر کو قرص زہر مہرہ مرکب ایک عدد کھلائیں۔

عظم قلب

CARDIAC ENLARGEMENT

اس مرض میں عضلہ قلب کی خلیات میں گلابی گوجن کا اجتماع ہو جاتا ہے اور اس کی دیواریں دبیز ہو جاتی ہیں اور قلب کے وزن اور حجم میں خفیف سے غیر معمولی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسباب

(I) خلیات عضلہ قلب میں گلابی کو جن کا اجتماع

علامات | امراضیاتی نقطہ نظر سے قلب کے ایلاف عضلی کی دیباڑت اور لمبائی، دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انفرادی طور پر ایلاف کی جسامت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے سبب بحیثیت مجموعی عضلہ کی جسامت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی تنظیم کے علاوہ تکیوینی زیادتی کی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور قلب کے وزن میں دو گنا، سہ گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔

سریرِ یاقی نقطہ نظر سے چہرہ سرخ نظر آتا ہے، دماغی اجتماع دم ہو سکتا ہے، قلبی ٹھوس آواز کے حدود نہ زیادہ، باہر اور نیچے کی طرف ہوتے ہیں، نبض ممتلی اور صلب چلتی ہے، قلب کی صورت اولیٰ متبدل لمبی اور تیز ہوتی ہے، نبض قلب تموجی ہوتا ہے صاف اور قوی بھی ہوتا ہے، سباتی میں تڑپ ہوتی ہے۔

تشخیص میں اشتباہ کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل میں چند تفریقی علامات

تحریر کی جارہی ہیں۔

تفریقی علامات

قلب کی بد وضعی

Cardiac Displacement

- ۱۔ باطنی علامات مثلاً دماغی اجتماع خون
- ۲۔ نبض قلب طبعی ہوتا ہے۔
- ۳۔ قلبی ٹھوس آواز کے حدود میں اضافہ نہیں ہوتا۔
- ۴۔ اصوات قلبی طبعی ہوتی ہے۔

عظم قلب

Cardiac Enlargement

- ۱۔ باطنی علامات مثلاً دماغی اجتماع خون
- ۲۔ نبض قلب تموجی ہوتا ہے
- ۳۔ قلبی ٹھوس آواز کے حدود زیادہ ہوتے ہیں۔
- ۴۔ اصوات قلب کی رفتار اور شدت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

تفریقی علامات

انورسما صدی

- ۱۔ چہرہ زرد یا نیلگوں ہوتا ہے اور دماغی اجتماع دم دریری ہوتا ہے
- ۲۔ قلبی ٹھوس آواز کے حدود اوپر ہوتے ہیں۔
- ۳۔ نبض قلب پھیلا ہوا ہوتا ہے
- ۴۔ سرسراہٹ یا تموج انورسمی ہوتی ہے۔
- ۵۔ صلب کے خلفی حصہ میں درد ہوتا ہے۔
- ۶۔ عام طور سے عسیر العلاج ہے۔

عظم قلب

- ۱۔ چہرے پر سرخی اور اجتماع دم دماغی ہوتا ہے
- ۲۔ قلبی ٹھوس آواز کے حدود خارج میں اور نیچے ہوتے ہیں۔
- ۳۔ نبض قلب تموجی ہوتا ہے۔
- ۴۔ تموج یا سرسراہٹ ہوتی ہے۔
- ۵۔ پشت میں درد مفقود ہوتا ہے
- ۶۔ علاج پذیر ہے۔

تفریقی علامات

تصلب ریہ

Consolidation Of Lung Tissue

- ۱۔ قلب کی صوت اولی طبعی ہوتی ہے
- ۲۔ قلب کی ٹھوس آواز کے حدود غیر منظم ہوتے ہیں
- ۳۔ صوت شعبی اور صوت تنفسی موجود ہوتی ہے
- ۴۔ سرسراہٹ رطوبی ہوتی ہے
- ۵۔ نبض ضعیف ہوتی ہے

عظم القلب

Cardiac Enlargement

- ۱۔ صوت اولی قلبی متبدل ہوتی ہے
- ۲۔ قلب کی ٹھوس آواز کے حدود مربع ہوتے ہیں
- ۳۔ صوت شعبی یا تنفسی غیر موجود ہوتی ہے
- ۴۔ سرسراہٹ تنفسی غیر موجود ہوتی ہے
- ۵۔ نبض متلی اور صلب جلتی ہے

اصول علاج

- ۔۔ ملطقات استعمال کرائیں
- ۔۔ تقویات قلب کھلائیں
- ۔۔ مکمل استراحت کی تاکید کریں

علاج

- ۔۔ ملطقات و ملنیات استعمال کرائیں
- ۔۔ قلب پر زیادہ بوجھ نہ پڑنے دیں

میتوت قلب

MYOCARDIAL INFARCTION

اس مرض میں عضلہ قلب کے دموی تغذیہ میں خلل واقع ہونے سے ناسخ تخلیسات کی موت شروع ہو جاتی ہے، جس سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسباب

Physical Exertion	(I) فعلیاتی / جسمانی تکان
	(II) ورزش اور جسمانی ریاضت کے بعد آرام کی حالت
	(III) شدید ہیجان
	(IV) غذا
	(V) فشارخون میں دفعتاً کمی واقع ہونا — مثلاً
Shock	(VI) صدمہ
Post Operation	(VII) عملیہ کے بعد
Anaesthesia	(VIII) عمل تخدیر
	(IX) انسداد شریان قلب

علامات (Pathological) (I) نقطہ نظر سے انفارکٹ قلب، تہہ میں سرخ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی رنگت زردی مائل سفید ہو جاتی ہے اور میتوت قلب کے فوراً بعد جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مردہ نسیجوں کے رد عمل سے خلیات ابض (WBC) کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، انسدادی حالت عام طور سے قلب کے بائیں حصہ کی شریان اسفل میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میتوت قلب (II) کا مقام اکثر بائیں بطن کی مقدم دیوار ہوتی ہے اور بعض اوقات حجاب بطنی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بیرونی سطح تک میتوت کے اثر انداز ہونے کی صورت میں اس کے اوپر استہابی غلاف قلب کا ایک پیوند بن جاتا ہے اور اندرونی جانب اثر انداز ہونے کی صورت میں اس کے اوپر ولے بھنا قلب کی تباہی یقینی ہے ان کے عدد وہ بطون میں دموی سدہ بھی بن جاتا ہے، جو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوسرے مقامات پر پھرنے لگتا ہے۔

اگرچہ میتوت قلب سے بھی نکت موت واقع ہو جاتی ہے تاہم مزید زبردہ رہے تو مرگ بھج بیرونی اثر سے نرم ہو کر انشقاق عند قلب کا باعث بنتی ہے اور میتوتی، تمام سر اور اندامات پر بھی دموی خون آسکتی ہے، بطن پس دباؤ کی وجہ سے لدج پس اس کا

پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں قلب کی دیوار پھیل جاتی ہے اور اس پر ناکافی استرکی وجہ سے تھرومبوسس (Thrombosis) میں مدد ملتی ہے اور نتیجہ کے طور پر شریانی سدہ کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، مسلسل تناؤ کی وجہ سے تجویف غلاف قلب میں خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے اور قلب یک بیک خنق بھی ہو سکتا ہے۔

سریریا قی نقطہ نظر سے مریض عام طور سے درد، عسر تنفس، غشی، تھیں اور تکان وغیرہ کی شکایت کرتا ہے اور حملہ مرض سے فوراً ہلاک ہو جاتا ہے درنہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے اندر ہلاکت تقریباً یقینی ہے تاہم بڑھاپے میں مریض عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔

درد: شدید حملہ کی صورت میں اچانک درد کا احساس ہوتا ہے یہ درد عظم القص کے درمیان حصہ کے عقب میں ہوتا ہے جس کا پھیلاؤ نیچے یا اوپر ہو کر دائیں یا بائیں بازو تک ہوتا ہے، بازو میں نقل محسوس ہوتا ہے، ہاتھوں اور انگلیوں میں بے حسی یا جھنجھٹا ہٹ ہوتی ہے۔ یہ درد گردن اور جڑے نیز پشت کی طرف کا ندھے یا شکم تک پھیل سکتا ہے اور بعض اوقات شراسیف (Epigastrium) بائیں کہنی، دائیں یا بائیں ہاتھ یا بازو تک محدود ہوتا ہے مدت درد چند ثانیہ سے چند گھنٹہ تک ہو سکتی ہے اور اتفاق کے بعد بھی متاثر حصہ میں کچھ دنوں تک درد کا احساس ہوتا ہے۔

عسر تنفس: عسر تنفس تغیر پذیر ہوتا ہے اور عین ممکن ہے کہ دیگر علامتوں پر حاوی بھی ہو جائے بعض مریضوں میں عسر تنفس ہی واحد علامت ہوتی ہے اور کسی قدر ترقی یافتہ صورت میں ریوی اوڈیا بھی ہو سکتا ہے۔

غشمی: شدید عوارض میں مریض پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔

قہے: قہے بھی ایک علامت ہے جو شدید عوارض یا مخصوص قلبی صدمہ (Cardiogenic Shock) میں رونما ہوتی ہے۔

دوسری علامتوں کے طور پر مریض کا چہرہ بے رونق، زرد، خاکستری مہور یا نیلگوں ہوتا ہے لیڈرٹ پسینہ خارج ہوتا ہے حتیٰ کہ بستر تریہ ہو جاتا ہے اور عام طور سے مریض بے سدھ پڑا ہوتا ہے خفیف میتوت قلب میں درد بھی معمولی درجہ کا ہوتا ہے اور بعض اوقات بالکل معروم ہوتا ہے حرکات قلب عام طور سے بڑھی ہوتی ہیں اور صدمہ کی صورت میں نبض کا حجم کم ہو جاتا ہے ابتدائی ۳۰۲ دنوں میں فشار دم تدریج کم ہوتا جاتا ہے۔

تفریقی علامات

وجع القلب	میتوت قلب
(Angina Pectoris)	(Myocardial Infarction)
۱۔ تکان، سردی یا انجم میرغدا لینے کے بعد مرض کا حملہ ہوتا ہے۔	۱۔ نامعلوم اسباب کے طور پر اور عام طور سے رات میں استراحت کے وقت مرض کا حملہ ہوتا ہے۔
۲۔ درد بازوؤں گردن اور جڑے تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ ۵ منٹ تک ہو سکتی ہے۔	۲۔ درد غیر منتشر ہوتا ہے اور نصف گھنٹہ تک رہ سکتا ہے۔
۳۔ قے نہیں ہوتی۔	۳۔ قے ہوتی ہے۔
۴۔ صدمہ نہیں ہوتا۔	۴۔ صدمہ ہو سکتا ہے۔
۵۔ بخار نہیں ہوتا۔	۵۔ بخار ہوتا ہے۔
۶۔ اصوات قلبی طبعی ہوتی ہیں۔	۶۔ اصوات قلبی ضعیف ہوتی ہیں۔
۷۔ فشارخون طبعی یا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔	۷۔ فشارخون، بہوٹ کے قریب ہوتا ہے۔
۸۔ E.S.R. طبعی ہوتا ہے۔	۸۔ E.S.R. بڑھا ہوا ہوتا ہے۔
۹۔ طبعی ہوتا ہے۔	۹۔ سیرم انزائم (Serum Enzyme) بڑھا ہوا ہوتا ہے۔
۱۰۔ نبض طبعی یا سریع ہوتی ہے۔	۱۰۔ نبض قصیر اور غیر منظم ہوتی ہے۔
۱۱۔ قلت کریات بیضاء (Leucocy Tosis) کی شکایت نہیں ہوتی۔	۱۱۔ قلت کریات بیضاء (Leucocy Tosis) کی شکایت ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

التهاب غلاف قلب	میتوتہ قلب
۱۔ ان تمام تحریکات و افعال سے، اتہار ہی	۱۔ ابتدائی ۲۴-۳۶ گھنٹے میں کھانسنے

- سانس لینے اور دوسری جسمانی تحریکات سے تکلیف ہوتی ہے۔
 ۲۔ ضلعی مزاحمت عام طور سے ابتدائی ۲۴ گھنٹے تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہر وقت ہوتی ہے۔
 ۳۔ اسے انقباض کے پاس اعتکاک (PUL) اور عام طور سے نہیں ہوتا محسوس ہوتا ہے۔
 ۴۔ چند دنوں بعد بخار غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ ۳۔ ابتداء سے ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

- | انسداد ریوی | میتوتہ قلب |
|---|--|
| (Pulmonary Embolism) | (Myocardial Infarction) |
| ۱۔ ریوی میتوتہ ہوتی ہے | ۱۔ میتوتہ کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ |
| ۲۔ کھانسی شدید ہوتی ہے۔ | ۲۔ کھانسی شاذ و نادر ہوتی ہے۔ |
| ۳۔ صدمہ بالعموم پہلی علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ | ۳۔ صدمہ درد کے اضافہ یا چند گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ |
| ۴۔ درد شدید ہوتا ہے اور مقامی نہیں ہوتا۔ | ۴۔ درد دباؤ یا نشتریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ |

تفریقی علامات

- | حاد اقلیلی عدم کفایت | میتوتہ قلب |
|--|---------------------------------------|
| (Acute Insufficiency Coronary) | (Myocardial Infarction) |
| ۱۔ حملہ غیر معمولی نکانہ جذباتی ہیجان کے اوقات میں ہوتا ہے | ۱۔ مرض کا حملہ استراحت کے وقت ہوتا ہے |
| ۲۔ درد عام طور سے نہیں پھیلتا | ۲۔ درد پھیلتا ہے |
| ۳۔ چند تانیہ تک ہوتی ہے۔ | ۳۔ درد کی مدت گھنٹہ نصف گھنٹہ ہوتی ہے |

- | | |
|---|---|
| ۴۔ عسر التنفس عام طور سے ہوتا ہے۔ | ۴۔ عسر التنفس عام طور سے ہوتا ہے۔ |
| ۵۔ بخار نہیں ہوتا یا بالکل خفیف ہوتا ہے۔ | ۵۔ بخار مسلسل ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ Shock نہیں ہوتا۔ | ۶۔ صدمہ (Shock) عام طور سے موجود ہوتا ہے۔ |
| ۷۔ فشار خون طبعی ہوتا ہے یا درجہ عرصہ میں کسی قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ | ۷۔ فشار خون یقینی طور پر کم ہوتا ہے۔ |
| ۸۔ عام طور سے سرعت قلب کی شکایت نہیں ہوتی۔ | ۸۔ سرعت قلب کی شکایت ہوتی ہے۔ |

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ مریض کو ذہنی اور جسمانی آرام و سکون فراہم کریں۔ شدید صورت میں اکیلی تحفظی یونٹ (Coronary Care Unit) میں رکھیں۔
- ۳۔ مسکنات درد تداریک پر اختیار کریں۔
- ۴۔ ضرورت پڑنے پر آکسیجن دیں۔
- ۵۔ صدمہ کی صورت میں عروقی قسا بعض ادویہ استعمال کرائیں ورنہ مفتحات دیں۔

علاج


- ۱۔ شدید صدمہ کی صورت میں ۸۰-۱۰۰ سی سی ٹولک سے بھی کم خون کا دباؤ ہے، تو انسانی خون یا مصل الدم (Plasma) ورون وریڈی (۱۰۶۰-۳۰۰ سی سی) دینا محفوظ زندگی ثابت ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ تسکین المی تداریک اختیار کریں۔
- ۳۔ فشر قلب کی صورت میں آکسیجن دیے، پارہ کے مدد بول مرکبات ورون عضلی استعمال کرائیں۔

ارتفاع فشار دم

HYPERTENSION

اس مرض میں شراین میں موجود خون کا دباؤ ان کی دیواروں پر غیر طبعی طور پر زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اقسام



اسباب

- (I) قلب کے بائیں بطن کے انقباض کی طاقت میں اضافہ ہو جانا
- (II) اور طی میں داخل ہونے والے خون کی جسامت زیادہ ہو جانا
- (III) تصلب شراین
- (IV) محیطی مزاحمت سطحی عروق میں دوران خون میں رکاوٹ / شراین صغیرہ کی متغیر مزاحمت
- (V) خون کی حالت لزوجیت اور جسامت دمی میں اضافہ
- (VI) برودت
- (VII) امراض کلیہ

۱۔ اس کو حفظ الدم قوی اور بیش تناؤ بھی کہتے ہیں۔ شراین میں موجود خون کی مقدار کی مناسبت سے ان کی دیواروں پر پڑنے والا دباؤ فشار الدم کہلاتا ہے۔

(I) تلیف کلیہ

(II) التهاب کلوی عناقیدی تحت المحاد کے درجات گزرنے پر

(III) التهاب کلیہ منتشر حاد

(IV) التهاب حوض کلیہ

(V) کلیہ پر الٹا دھاؤ

(VI) عدد وغیر ناقله

(7) جزو مقدم سے خارج شدہ رطوبت کی زیادتی

خون کا طبعی دباؤ: خون کے دھاؤ کا ایسا تعین، جو تمام تند درست و صحت مند افراد کے لئے طبعی ثابت ہو سکے، قویٰ قریب ناممکن ہے، تاہم عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ اگر مریض کی عمر میں .. اکا اضافہ کر دیا جائے تو مجموعی عدد، طبعی انقباضی دھاؤ کو ظاہر کرے گی۔

بالغوں میں انقباضی دباؤ (Systolic Pressure) : عام طور سے .. ۱۱۰ ملی میٹر ایچ۔ جی میں مریض کی عمر کا تقریباً دو تہائی اضافہ کر دیا جائے تو فشار خون انقباضی کا پتہ چل جاتا ہے، مثلاً اگر کسی مریض کی عمر ۳۵ سال ہے تو اس کا دو تہائی ۳۰ ہوا، اس میں ۱۰۰ ملی میٹر ایچ۔ جی جمع کرنے سے مریض کا انقباضی دباؤ ۱۳۰ ملی میٹر ایچ۔ جی معلوم ہوا۔

بالغوں میں انقباضی دباؤ (Diastolic Pressure) : یہ انقباضی دباؤ کا تقریباً دو تہائی ہوتا ہے، مثلاً اگر انقباضی دباؤ ۱۳۰ ہو تو انقباضی دباؤ تقریباً ۸۶ ہونا چاہیے — ملحوظ رہے کہ متوسط عمر والوں اور ضعیف لوگوں میں یہ تناسب دو تہائی سے کم ہوتا ہے۔

ارتفاع فشار الدم: بالغوں میں انقباضی دباؤ ۱۴۰ ملی میٹر سے اوپر اور انقباضی دباؤ ۹۰ ملی میٹر سے اوپر مستقل طور سے رہنا، قابل توجہ امر ہے، اسی طرح بچوں اور نوجوانوں میں ۱۳۰ ملی میٹر انقباضی دباؤ زیادہ تصور کیا جاتا ہے۔

ملحوظ رہے کہ ۱۰۰ ملی میٹر سے کم انقباضی دباؤ دماغی جریان الدم سے مامون ہونے کی علامت ہے، اس طرح ۱۰۰ سے کم انقباضی دباؤ مامون ہونے کی علامت ہے، اور ۲۰ تک بڑھ جانا خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔

خون کا دباؤ کم ہونا (Hypotension) : ۱۱۰ ملی میٹر سے کم انقباضی دباؤ ہمیشہ کم خیال کیا جاتا ہے۔

(II) عدد نخامیہ

(III) عدد مجبسی

(IX) درون مجبسی و باؤ میں اضافہ

(X) ضربی / ضمن مغرط

(XI) ارتی / خلقی عوامل

(XII) ذہنی اور دماغی مشغولیات کی زیادتی

(XIII) جذباتی برائیاں

(XIV) نمی اجزاء کا کثرت استعمال / اس کا نقص استعمال

(XV) خارجی ستمی عوامل

(I) تمباکو

(II) رصاصی سمیات

(III) کثرت سے نوشی

(XVI) سلعات

(XVII) عقدری تسدد

(XVIII) حمل کا قسم دم

(XIX) بسیار خوری

علامات

ارتفاع فہشمار الدم سلیم: گھمیز سر درد اور نقل راس کی شکایت ہوتی ہے۔ ارتکا ز خیال مشکل ہوتا ہے، کانوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے، معمولی ریاضت اور جسمانی حرکت سے تنگی، نفس پیدا ہو جاتی ہے، اور مدود قلب میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، ر عاف کی شکایت ہوتی ہے، پنڈلیوں میں اینٹھن سی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی قسم کی علامت موجود نہیں ہوتی اور ارتفاع خون کی زیادتی کا علم اتفاقاً ہو جاتا ہے، خرائین عام طور سے سکڑی ہوئی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔

ارتفاع فہشمار الدم خبیث: ارتفاع فشار الدم کی کیفیت اچانک نمودار ہو جایا کرتی ہے،

مرضی ملاحت کا اٹھار اوزیماے عصب بھری لا Odema Of The Optic Nerve سے
 ہوتا ہے۔ یہ اوزیما عصب بھری کے آنکھ میں داخل ہونے کے مقام پر ہوتا ہے۔ طبقہ شبکیہ
 Retina میں رطوبات کا رساؤ یا جریان بھی مشاہدہ میں آتا ہے، اس کے علاوہ بول و موی،
 نفث الدم یاتے الدم و غیرہ رونما ہو سکتا ہے، بول زلاکی اور احتباس مادہ بولی کی شکایت
 ہو سکتی ہے۔ طبیعت میں بے کیلی اور الجھن ہوتی ہے، روز بروز صحت گرتی جاتی ہے، ضعف کا
 ظہر ہونے لگتا ہے اور جسمانی وزن میں کمی آنے لگتی ہے، قلت اشتہار کی شکایت ہوتی ہے اور
 قلت الدم کی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔ اس صورت میں جب طبقہ شبکیہ کی علامات
 کلتین کا اثر اور قلت الدم کی نشانیاں پائی جانے لگیں تو ۴-۸ ماہ میں ہلاکت ہو سکتی ہے۔
 عمومی علامات: فساد، خضم، قبض، خفقان اور تکان کی شکایت ہوتی ہے، سدر و دوار
 ہوتا ہے، چہرے پر تہما ہٹ ہوتی ہے، چہرہ اور آنکھوں کی رنگت سرخ ہوتی ہے، عروق ممتلی
 ہوتی ہیں، شریانوں میں تڑپ ہوتی ہے۔ نبض عظیم چلتی ہے۔ مریض غنودگی کی حالت میں
 ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ حسب ضرورت اتساع عروق کی تدبیر اختیار کریں۔
- ۳۔ مکمل نفسانی اور بدنی استراحت کی تاکید کریں۔
- ۴۔ مصلح سودا اور مرود و مرطب دوائیں استعمال کرائیں۔
- ۵۔ رفع قبض کریں۔
- ۶۔ مریض کے قوای جسمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے فصد کھولیں۔
- ۷۔ مولد خون و خون پیدا کرنے والی، افندیہ و ادویہ سے احتراز کریں۔

علاج

دورہ کے وقت اسرول دھچھوٹا چندن، ۳ گرام، فلفل سیاہ ۵، ۳ گرام،
 سفوف بنا کر شربت عناب کے ساتھ نوش کرائیں، اور خون کا دباؤ کم ہو جائے تو استعمال

بند کر دیں۔ اس سے اعصاب کو تسکین ملتی ہے، خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور کسی قدر خواب آور بھی ہے۔

• ————— اسرول اور فلفل سیاہ کا سفوف اور انٹیمون دلائی ۱۲ گرام، کو ایک پوٹلی میں رکھ کر ۲۵ ملی لیٹر دودھ یا پانی میں جوش دے کر استعمال کرنا بھی سودمند ثابت ہوتا ہے۔

• ————— اسرول (Rawalha Serpentina) کے بہت سے مرکبات دستیاب ہیں مثلاً اسروین، حب فشار، تر یاق فشار، سرپاسل (Serpasil) (راوی لائیٹ) (Rau Wiloid) (راؤ ڈکسین) (Rau Dixin) (سرپائینا) (Serpina) وغیرہ۔ ان میں سے جو بھی مرکب دستیاب ہو، مریض کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرائیں، اسرول کے مرکبات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو عرصہ تک کسی بلاثر کے امکانات و خدشات کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے جوہر کی دریافت کا سہرہ حکیم محمد اجل خاں مرحوم اور ان کے رفقاء کے سر ہے۔

• ————— درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ: لعاب بہدان، شیرہ تخم کا ہو مقشر، شیرہ تخم کدوئے شیریں، شیرہ تخم خسرو سیاہ، شیرہ تخم خیاریں، شیرہ مغز تخم تر بود، ہر ایک ۳ گرام، عرق گاؤزبان ۱۰۸ ملی لیٹر، عرق کیوڑہ ۳۶ ملی لیٹر میں نکال کر شربت عذاب ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

• ————— رفع قبض کی حد ابر اختیار کریں، اس مقصد کے تحت جو ارش سفر جلی مفید و مجرب ہے۔

• ————— مریض قوی الجسہ ہو تو باسلیق یا ہفت اندام کی دھڑکھولیں، اس کے بعد درج ذیل نسخہ تبرید استعمال کرائیں۔

نسخہ تبرید: خمیرہ گاؤزبان ۱۲ گرام، ورق نقرہ ایک عدد میں لپیٹ کر کھلائیں، اس کے بعد عذاب ۵ عدد کا، عرق گاؤزبان ۱۴۵ ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر شامل کر کے تخم ریحاں مسلم ۷ گرام چھوٹ کر نوش کرائیں۔

• ————— اسروین ۱، عدد صبح شام کھلائیں، رات میں جو ارش عود ۴ ملین ۶ گرام۔

دیں۔ مفید و مجرب ہے۔

بعض اوقات سرجری کے ذریعہ ہی اس کا علاج ممکن ہوتا ہے چنانچہ اس
 عملیہ میں پشت اور کمر کے نظام عصبی مشار کی کے ایک حصہ کو کاٹ دیا جاتا ہے جس کو Dorsi-
 Lumbar Sympathectomy کہتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ فشار خون نصبت میں
 اس عملیہ کی قطعی ممانعت ہے۔

خفقان

PALPITATION

اس مرض میں قلب غیر معمولی سرعت کے ساتھ، غیر منظم طور پر دھڑکتا ہے اور اس
 بے نظمی اور سرعت کا احساس مریض کو بھی ہوتا ہے۔ یہ مرض عورتوں میں سن آیا اس کے بعد
 کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

مندرجہ ذیل امراض میں خفقان عارض ہو سکتا ہے

امراض قلب:

Pericarditis	(I) التهاب غلاف قلب
Pern-Cardial Admession	(II) التصاق غلاف قلب
Callification Of Coronary Artery	(III) تکلس شریان قلب
Coronary Infarction	(IV) میتوتہ اکلیلی
Fatty Heart	(V) شحامت قلب
Alcoholic Heart	(VI) قلب الکوملی
Occupational Heart	(VII) قلب حرفی
Mitral Stenosis	(VIII) تضیق تاجی
Mitral Regurgination	(IX) نقہ تاجی
Aortic Stenosis	(X) تضیق اورطی

Aortic Regurgitation

(XI) تھپتھپ اور طی

Senile Changes

(XII) شیخوخی تغیرات

Cloudy Swelling

(XIII) التهاب مرجانی

(XIV) عظم قلب

(XV) اتساع قلب

(XVI) قلب کی قوت حسیہ کی تیزی اور نازکی

افعال قلب میں خلل پیدا کرنے والے امراض:

(I) سلعہ منصف الصدر

(II) انور سما

(III) انتفاخ بطن / استقائے طبعی

(IV) استسقاء رقی

(V) سلعہ خصیۃ الرحم

(VI) امتلاء عروق

امراض اعصاب:

(I) امراض و انفعالات نفسانیہ

(II) ضعف اعصاب

(III) ہزال النخاع

(IV) صرع

(V) اختناق الرحم

(VI) مانعویا

(VII) داء الرقص

مضعف قلب امراض:

(I) التهاب شعبی مزمن

(II) انتفاخ المریہ

(III) ذات الحجب انسکابی

(IX) تلخیرہ

دموی امراض:

(I) مرفن اخضر

(II) قلت الدم خبیث

امراض معدہ و امعاء:

(I) سوء ہضم مع انتفاخ

(II) اتساع معدہ

(III) یواسیر

ثانوی طود پر قلب سے متعلق امراض:

(I) تکلس شریانی

(II) بشور کلیہ

سمیات:

(I) تمباکو

(II) چائے

(III) کوئین

(IV) کونیلے کا دھواں

(V) التهاب پیدا کرنے والے بخارات

متفرقات:

(I) کثرت حیض

(II) احتباس حیض

(III) قلت حیض

(IV) نقرس

(V) وجع المفاصل

(VI) غوطر

(VII) تدرن

(VII) بکثرت انصراف خون

(IX) امتلاء دموی

(X) امتلاء سودادی

(XI) آتشک

(XII) فشار خون قوی

علامات عام طور سے معمولی تحریکات / انفعالات نفسانی مثلاً جوش، غصہ، خوف اور دہشت سے قلب دھڑکنے لگتا ہے، شدید صورت میں سرعت کی رفتار محسوس بھی ہوتی ہے، طبیعت میں کرب و اضطراب ہوتا ہے، سینہ کو دیکھنے سے قلب کی حرکات دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، شرائین میں ٹرپ ہوتی ہے، نبض سریع چلتی ہے جو فی منٹ ۵۰ یا اس سے بھی زائد ہو جاتی ہے، جلد سرخ ہو جاتی ہے، بعض اوقات مقام قلب پر درد محسوس ہوتا ہے، کبھی اس میں نشتریت سی ہوتی ہے، اور کبھی صرف دکھن سی، تاہم درد، خفقان کی یقینی علامتوں میں نہیں ہے۔

سستی بے کیفی، جلد تکان کا احساس، خفیف تحریک سے عسر تنفس، مقام قلب پر بے چینی، تحت اندری درد، وجع القلب کاذب اور غیر معمولی طور پر پسینہ خارج ہوتا ہے، سیدھے کھڑے ہونے پر قلب کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وضعی دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔

قلب کے صماہی امراض کی صورت میں خفقانی علامات کے علاوہ، جی حداری، حمور، آتشک اور دار الرقص وغیرہ کی سرگزشت ملتی ہے، عظم قلب ہوتا ہے، قلب کے امتحان بالسمع سے مختلف نوع کی لفظ معدوم ہوتی ہیں، لیکن نبض یکدم ابھرتی اور یکدم ڈوبتی محسوس ہوتی ہے اور اگر سریف خفیف ریاضت کرے تو لفظ رونما ہو جاتی ہے۔

التهاب غلاف قلب اور فساد حشوی شدید کی صورت میں، بخار آتا ہے، نقاہت کا غلبہ ہوتا ہے اور مریض اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، شجاعت قلب کی صورت میں عضلات قلب میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، معمولی ریاضت سے نبض کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز ہو جاتی ہے، عام ضعف کی وجہ سے سوز، ہضم بھی ہوتا ہے۔

ریوی امراض میں قلب کے دائیں بطن پر ثقل اور بوجھ پڑتا ہے جس سے خفقان عارض ہوتا ہے، اور۔۔۔ امتحان سے باسانی تشخیص ہو جاتی ہے۔

امراض نفسانیہ کی صورت میں خفقان عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، معمولی معمولی تحریکات اور انفعالات سے خفقان ہوتا ہے اور ان عوارض و اسباب کے ازالہ کے بعد خفقان کیفیت ناکل ہو جاتی ہے۔ ویسے عام طور سے اس کی تشخیص میں کوئی دقت نہیں ہوتی

سور مزاج قلب کی صورت میں معمولی ریاضت اور ہیجان سے خفقان ہوتا ہے۔ مقام قلب پر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور کبھی درد کا احساس ہوتا ہے، سانس جلد بھول جاتا ہے اور مریض روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔

قلت دم کی صورت میں علامات بہت واضح ہوتی ہیں۔ ریاضت سے خفقان میں اضافہ ہو جاتا ہے، قے آتی ہے، اور خون کی قلت دور ہو جانے پر خفقان بھی ختم ہو جاتا ہے۔

قلب کے افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والے امراض مثلاً اشتقاق، سلسو خصیۃ الرحم وغیرہ کی صورت میں خفقان عارض ہونے سے قبل ان کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔

سور ہضم کی صورت میں نفع شکم ہوتا ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، سینہ میں جلن اور سوزش محسوس ہوتی ہے، اختناق الرحم کی صورت میں مریض دم گھٹنے کی شکایت کرتی ہے اور بعض اوقات درد سر اور دوران سر وغیرہ کی نشاندہی کرتی ہے۔

معمولی تبا کو نوشی سے بالعموم خفقانی علامات رونما نہیں ہوتیں، لیکن کثرت استعمال کی صورت میں معمولی جسمانی نقل و حرکت سے نبض کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، خفقان دن اور رات دونوں میں عارض ہوتا ہے، لیکن رات کو بستر پر جاتے وقت کچھ سوا ہو جاتا ہے اور مریض خوفزدہ ہو جاتا ہے۔

کوکین کے عرصہ تک استعمال کی صورت میں خفقان کے علاوہ جلد پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ علامات کوکین کھانے کے کچھ دیر بعد ہی رونما ہوتی ہیں۔

امتلاء دموی کی صورت میں عروق ممتلی ہوتی ہیں، ثقل، کسمندی اور ماندگی کا احساس ہوتا ہے، پیشاب رنگین اور غلیظ ہوتا ہے، نبض ممتلی ہوتی ہے۔ امتلاء سوداوی کی صورت میں فکرمیں فساد ہوتا ہے، خوف و دہشت کا غلبہ ہوتا ہے اور مالنحو لیبائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

ذکاوۃ حس کی صورت میں معمولی اذیتوں مثلاً معمولی گرمی، سردی یا نفسانی انفعالات کی وجہ سے خفقان نمودار ہو جاتا ہے، شدید صورت میں مخصوص غذاؤں اور خوشبوؤں سے

بھی قلب دھڑکنے لگتا ہے۔

غوطر جھوٹی کی صورت میں خفقان میں غیر معمولی شدت ہوتی ہے اور عظم غدہ در قیہ اور آنکھوں کے باہر ابھرنے سے مہینوں قبل ہی خفقان اور دوسری عصبی کیفیات کی موجودگی کی روئیداد ملتی ہے، مسلسل خفقان غوطر جھوٹی کی قریباً یقینی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خفقان کے دونوں اہم بنیادی اسباب، قلبی اور غیر قلبی، دونوں میں علاماتی فرق یہ ہے کہ خفقان قلبی امراض قلب کے نتیجہ میں مارض ہونے والا خفقان، قطعاً بے سان و گمان طریقے پر شروع ہوتا ہے اور اسی طرح یک بیک ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف خفقان غیر قلبی دقلب کے علاوہ دوسرے اعضا کے اشتراک سے مارض ہونے والا خفقان، کی علامات ان امراض کے تابع ہوتی ہیں یا بعد میں رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ خفقان غیر قلبی ہی کثیر الوقوع ہے۔

ذیل میں قلب کے فعل اور ساخت کی خرابی کے نتیجے میں ہونے والے خفقان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

خفقان نقص ساختی

- ۱۔ مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔
- ۲۔ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے اور کم و بیش ہر وقت موجود رہتا ہے۔
- ۳۔ ٹھوکنے سے قلب کے زیادہ حصہ پر ٹھوس آواز سنائی دیتی ہے اور سینہ میں ایک غیر معمولی آواز بھی جھوٹی سنی جاسکتی ہے۔
- ۴۔ حرکت قلب نہایت محدود ہوتی ہے۔
- ۵۔ خفقان کے ساتھ بعض اوقات جمع القلب بھی ہوتا ہے جس کی ٹیسس بائیں شانہ اور ہاتھ تک جاتی ہیں۔

خفقان نقص فعلی

- ۱۔ عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔
- ۲۔ بے سان و گمان نوعی طور پر لاحق ہوتا ہے اور دفعتاً زائل ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ مقام قلب پر ٹھوکنے سے زیادہ حصہ پر ٹھوس آواز سنائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات بڑی شریان یا وید پر غیر معمولی آواز سنائی دیتی ہے۔
- ۴۔ حرکت قلب بہت شدید نہیں ہوتی۔
- ۵۔ قلب مضطرب رہتا ہے اور معمولی تحریک پر بھی زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے نیز بائیں پسلی میں خفیف درد ہوتا ہے۔

- ۷۔ آرام کی حالت میں بھی اکثر اوقات دل دھڑکنے لگتا ہے اور جہل قدمی سے فائدہ ہوتا ہے۔
- ۸۔ چہرہ پھیکا، بے رونق اور متورم ہوتا ہے۔
- ۹۔ فصد یا دوسرے ذریعہ سے اخراج خون ہونے سے قلب اور بھی سرعت سے دھڑکنے لگتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے۔
- ۱۰۔ مقوی و محرک غذاؤں اور دواؤں سے نقصان ہوتا ہے اور مسکن دواؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔
- ۱۱۔ چہرہ نیلگوں ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ فصد کھولنے یا خون نکالنے سے قلب کی دھڑکنی میں تخفیف و تسکین ہو جاتی ہے۔
- ۱۳۔ مقوی و محرک غذاؤں اور دواؤں سے نقصان ہوتا ہے اور مسکن دواؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ غلبہ خون کی صورت میں فصد کھولیں
- ۲۔ غلبہ سودا کی صورت میں مالنخولیا کا اصول علاج اختیار کریں
- ۳۔ ملحوظ رہے کہ یہ مرض بالعموم شکر کی ہوتا ہے، اس لئے شکر کے عضو کے امراض کا ازالہ کریں
- ۴۔ فقر الدم کی صورت میں مفرحات و مقویات قلب استعمال کرائیں
- ۵۔ انفعالات نفسانیہ کی صورت میں، انفعالات کو ختم کرنے کی تدابیر اختیار کریں

علاج

- ۱۔ سور مزاج حار سادہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ تبرید استعمال کرائیں
- نسخہ تبوید: شربت نیلوفر، شربت فالمر، شربت انار، شربت صندل کو عرق بید شکر، عرق کیوڑہ، عرق گاؤ زبان وغیرہ میں سے کسی عرق میں ملا کر دہی کی لسی بنا کر نوش کرائیں
- ۲۔ مزید تبرید کی ضرورت ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ تبرید: خمیرہ صندل یا خمیرہ گاؤزبان ۹-۱۲ گرام کھلا کر کشنیز خشک، تخم خرفہ سیاہ ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کا عرق، عرق گاؤزبان، عرق گندر، عرق کیوڑہ ہر ایک ۴۸ ملی لیٹر میں نکال کر، مل چھان کر شربت انار ۲۱ ملی لیٹر ملا کر تخم بالنگو ۳ گرام چھوٹک کر نوش کرائیں۔
 درج ذیل نسخہ بھی مجربات میں شامل ہے۔

نسخہ: آملہ مربی ایک عدد، پانی سے دھو کر ورق نقرہ ایک عدد لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد کشنیز خشک، تخم خرفہ سیاہ، زرشک، ہر ایک ۵ گرام، آلو بخارا ۱۵ عدد کا، عرق گلاب، عرق گاؤزبان، عرق کیوڑہ، عرق صندل ہر ایک ۳۴ ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت انار ۲۴ ملا کر خنجر خشک ۵ گرام چھوٹک کر نوش کرائیں

شدید حرارت اور کرب و اضطراب میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: کافور ۳ گرام، شربت انار ۲۴ ملی لیٹر میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد تخم خرفہ سیاہ ۱۲ گرام، عرق گلاب ۴۸ ملی لیٹر، عرق گاؤزبان ۹۲ ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں
 درج ذیل قرص کا فور بھی مجرب ہے

نسخہ قرص کافور، بسلوچین، گل سرخ، نیلوفر ہر ایک ۴ گرام، تخم خرفہ، مغز تخم خیارین، مغز تخم کدو، ہر ایک ۵۰ گرام، سرطان نہری بریاں، رب السوس ہر ایک ۵۰ گرام، زعفران کافور، ہر ایک ایک گرام ۵۰، ۵۰ ملی گرام، گوند ببول، کتیرا ہر ایک ۵۰، ۵۰ گرام، ترنجبین ۳۶ گرام۔ جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب بہدانہ میں گوندھ کر اقراص بنائیں
 درج ذیل معجون صندل استعمال کرائیں

نسخہ معجون صندل: سفوف صندل سفید ۱۰۸ گرام، سفوف کشنیز خشک ۵۰ گرام، جملہ دواؤں کو آب انگور خام، پانی ہر ایک ۵۰، ۵۰ ملی لیٹر، سرکہ ۴۴ ملی لیٹر میں ایک شب بھگوئے رکھیں، دوسرے دن نرم آنچ پر جوش دیں، جب ایک حصہ پانی رہ جائے تو کتان کے کپڑے سے چھان کر نبات سفید ۵۰ گرام ڈالیں اور زعفران ۵۰ گرام، پوٹلی میں باندھ کر داخل کریں اور جھاگ اتارتے رہیں۔ جب قوام تیار ہونے کے قریب ہو تو زعفران کی پوٹلی نچوڑ کر نکال لیں اور قوام کو آخری شکل دیں، اس کے بعد بسلوچین، صندل سفید، ہر ایک ۳۶ گرام پیس کر ملائیں اور ۵۰ گرام کھلائیں۔

• ————— درج ذیل نسخہ ضما د استعمال کرائیں

نسخہ ضما د: صندل سفید عرق گلاب میں پیس کر اس میں تھوڑا سا کافور ملائیں۔ اس کے بعد آب سیب ترش اور آب بھی کا اضافہ کریں، تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالیں اور جملہ عرقیات کو ملا کر کتاں کے ٹکڑے کو ان میں بھگوئیں اور مقام قلب پر رکھیں

• ————— غلبہ خون کی صورت میں پہلے بائیں ہاتھ کی ہاسلیق کی فصد کھولیں بصورت دیگر پٹریوں پر بچھنے لگائیں۔ اور درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: عنب ۷ عدد، زرشک ۲۳ گرام، قمر ہندی ۱۰ گرام، تینوں دواؤں کو عرق گاؤ زبان، عرق نیلوفر ہر ایک ۱۲۵ ملی لیٹر میں بھگو کر مل چھان کر شربت نیلوفر ۲۳ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

• ————— کشتیز خشک ۹ گرام کو عرق بیر مشک اور عرق گلاب، ہر ایک ۱۰ ملی لیٹر میں رات میں بھگوئیں، صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں

• ————— زرشک ۲۳ گرام کے زلال میں شربت انار یا شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں

• ————— زلال آلو بخارا ۹ عدد، زلال قمر ہندی ۲۳ ملی لیٹر میں شربت نیلوفر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں

• ————— تازہ گاجروں کے گودے کا پانی ۸۵ ملی لیٹر، شربت صندل یا شربت انار ۲۳ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں

• ————— غلبہ صفراء کی صورت میں مطفیات اور مسکنات استعمال کرائیں اور غلبہ خون کا اصول علاج اختیار کریں اور صندل کو گلاب میں گھس کر مقام قلب پر ضما د کریں۔ سرد خوشبوئیات سوئگھائیں

• ————— سوء مزاج بارو کی صورت میں سینہ پر غالیہ کی مالش کریں

• ————— مشک، عنبر، عود، سوئگھائیں

• ————— قلیل مقدار میں شراب ریحانی نوش کرائیں

• ————— صندل، سنبل الطیب، ناگرموتھا، دارچینی، قرنفل، جملہ دواؤں کو ٹکر

آب مورد اور شراب ریحانی میں گوندھ کر مقام قلب پر ضما د کریں

۔ کبریا: جلد پیرستر ہر ایک ۵ گرام، ترنج ۷ گرام، تخم فرنجشک ۷ گرام،

جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد ملا کر کھلائیں

۔ کبریا: تخم فرنجشک ۱۰، ابریشم ۱۰، مقرر، تخم بادرنجبویہ ہر ایک ۷ گرام، گاؤربان

گل سرخ ۳ گرام، صدف ناسفتہ ۴ گرام، ہماؤج بندری ۲، ۵ گرام، سنبل الطیب ۱، سیلخہ، ہیل خورد، گل سوسن، کندر، عود خام، اسطرخودوس، افیتمون، نرکچوز، درونج، دار چینی ہر ایک ۵ گرام، آملا ۷ گرام، بادرنجبویہ ۴ گرام، بہن سرخ، بہن سفید ہر ایک ۳ گرام، قرنفل ۵ گرام، عنبر، مشک ہر ایک ۷ گرام، یاقوت سرخ ۷ گرام، گل ارمنی، مغسول ہر ایک ۵ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر ترنجبین صاف کردہ میں گوندھ لیں اور ۹ گرام استعمال کرائیں

۔ مصطکی، عود سماق، پودینہ خشک، فادر ہر حیدانی ہر ایک ایک گرام، جملہ دواؤں کو حسب ضرورت پیس کر جو دار المسک جو اہر دالی ۵ گرام ملا کر کھلائیں، اس کے بعد عرق عنبر ۳ ملی لیٹر، عرق بادیان ۸ ملی لیٹر، نمیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں

۔ درونج، عقری، زرنبا، ہیل خورد ہر ایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو باریک پیس کر شربت انارین ۲۳ ملی لیٹر ملا کر لعوق بنائیں اور حسب ضرورت استعمال کرائیں

۔ سنبل الطیب، تخم ریحان، گل سرخ ہر ایک ۷ گرام، زعفران ایک گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں پیس کر مقام قلب پر لپکریں

۔ رطوبت اور برودت کی زیادتی کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: پودینہ، کبریا، بریان، بسد بریان، شب یمانی بریان، موتھا، ہر ایک ۵ گرام، زراوند مدحرج، درونج ہر ایک ۷ گرام، مشک ۵۰۰ ملی گرام، سنبل الطیب، صدف ناسفتہ ہر ایک ۵ گرام، شکر ۵ گرام۔ جملہ دواؤں کو حسب ضرورت کوٹ پیس کر ۱۰ گرام، ہمراہ شربت افسنین استعمال کرائیں

۔ اگر مولد بلفی کے خلاف القلب میں ہونے کے سبب یہ مرض عارض ہوا ہو

تو آٹھ یوم درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: عنب الثعلب خشک، بادرنجبویہ، گاؤربان، ہر ایک ۵ گرام، شاہترہ

پرساؤن ہر ایک ۷ گرام، مویز منقہ ۹ عدد، عرق گاؤزبان، عرق شاترہ، ہر ایک ۱۵ گرام، عرق
جملہ دواؤں کو آب میں مذکورہ مرتبات میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر چھلکند۔ ۱۵ گرام ملا کر استعمال
کرائیں۔ نویں دن اسی میں درج ذیل ادویہ کا اضافہ کریں۔

گل سرخ، سنار، مکی ہر ایک ۷ گرام، اسطوخودوس ۵ گرام، ان کو مذکورہ بالا نسخہ میں شامل
کر لیں اور رات میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر مغز فلوس خیار شنبہ ۱۵ گرام، خیرہ بدام ۵ دانہ،
ترنجبین ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں

دسویں دن درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

عنا ب ۵ عدد، بادیان ۵ گرام، عرق گاؤزبان ۱۴ ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ نکال کر چھلکند
۱۵ گرام ملا کر نوش کرائیں

غلبہ بیہوش کی صورت میں گدھی کے دودھ میں آب انار اور روغن بادام ملا کر
نوش کرائیں

— عورت کا دودھ / آب کشیزناک میں پیکائیں

— — — — — بہدانہ، اسپنول، برگ گاؤزبان، ہر ایک ۵ گرام، عرق گاؤزبان ۱۴ ملی لیٹر
میں لعاب نکال کر شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں
درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے

خمیرہ گاؤزبان سادہ کھلانے کے بعد مارا لجن، شیر گاؤ یا شیر بزد ۱۴ ملی لیٹر، شربت نیلوفر
۲۴ ملی لیٹر سے شیریں کر کے نوش کرائیں

— — — — — سور مزاج معدہ یا نفخ شکم کی صورت میں جوارش کمونی ۱۲ گرام / نمک سیلانی
۳۶ گرام ہمراہ آب تازہ یا عرق گاؤزبان استعمال کرائیں

— — — — — ضعف قلب کی صورت میں خمیرہ گاؤزبان عنبری جو اہر والا ۱۵ گرام، خمیرہ مردارید
۳ گرام، خمیرہ صندل ۲ گرام، خمیرہ ابریشم ۳ گرام، ان دواؤں میں سے کوئی ایک، ہمراہ عرق عنبر یا
عرق گاؤزبان نوش کرائیں


— — — — — مارا لجن نوش کرائیں

— — — — — تخم ریحاں ۱۲ گرام، رات کو عرق گلاب ۶۰ ملی لیٹر میں بھگو کر آسمان کے نیچے
رکھ دیں، اور صبح کو مل چھان کر نبات سفید ۲۱ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

غشی

SYNCOPE

اس مرض میں ہوش دھواں کم و بیش باطل ہو جاتے ہیں اور قلب کی حرکت نہایت ضعیف اور بعض اوقات غیر محسوس ہو جاتی ہے، نیز اور بہت سی علامات رونما ہوتی ہیں



اسباب

امراض دماغ:

- د I ، تنزعزع الدماغ
- د II ، ففطنة الدماغ
- د III ، تلین الدماغ
- د IV ، سدة بطون دماغ
- د V ، دماغ کے عضوی نقص
- د VI ، سکتہ شمبہ

غشی کی قسم اور بھی ہے جو عصبی اسباب سے پیدا ہوتی ہے اس کو قوما کہتے ہیں اور امراض دماغ میں شمار کرتے ہیں

انفعالات نفسانیہ:

(I) شدید لذت

(II) فرحت و مسرت / فکر و غم / شدید صدمہ

امراض قلب:

(I) شجاعت قلب

(II) قصور صمامات قلب

(III) کسور صمامات قلب

(IV) ضعف القلب

(V) خفقان

متفرقات:

(I) نزف الدم

(II) بکثرت پسینہ خارج ہونا

(III) تے

(IV) اسہال

(V) شدید درد

(VI) فاقہ کشی

(VII) کثرت مے نوشی

(VIII) تسمم بولی

(IX) ذیابیطس

(X) امراض کلاہرودہ

(XI) سور القینہ

(XII) ایسی فاسد غذاؤں کا استعمال جن سے روح حیوانی کافی مقدار میں پسیرا

نہ ہو سکے

(XIII) سمیات / منشیات — مثلاً

(I) افیون

(II) بھنگ

(III) چرس

علامات | سرد و دوار ہوتا ہے، بھارت میں فرق پڑ جاتا ہے، کانوں میں شور سانسائی دیتا ہے، چہرہ زرد — اور ہونٹ پھیکے پڑ جاتے ہیں، سارا جسم سرد پسینہ میں نہا جاتا ہے، مریض کو اس وقت سہارا نہ ملے تو گر پڑتا ہے، بعض و تحفہ کی حرکات اس قدر ضعیف ہوتی ہیں کہ بعض اوقات نامحسوس مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بعض حالتوں میں بظاہر زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے، چہرے پر مردی چھا جاتی ہے، اطراف سرد اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور بعض صورتوں میں اطراف اٹھ جاتے ہیں اور بول و براز بے ارادہ خارج ہوتا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ انفعالات نفسانیہ میں نوجوان کو بہت جلد ہوش آ جاتا ہے، بحیثیت مجموعی مریض سرد سانس کھینچ کر ہوش میں آ جاتا ہے، اور کبھی ہوش آنے سے قبل سرد سانس کھینچنے کے ساتھ اسہال اور تھکاوٹ وغیرہ علامات بھی رونما ہوتی ہیں اور مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔

ضعیف دورہ کی صورت میں کامل بے ہوشی نہیں ہوتی، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، ضعف قلب ہوتا ہے اور پیشانی پر پسینہ کے قطرات نمودار ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد مریض بالکل ہوش میں آ جاتا ہے۔

ذیل میں قلبی اور امتلائی غشی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

غشی امتلائی	غشی قلبی
۱۔ خون کی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	۱۔ دماغ میں خون کی رسد قلیل مقدار میں ہوتی ہے۔
۲۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ، تنفس خراٹے دار آتا ہے اور نبض ممتلی چلتی ہے۔	۲۔ چہرہ زرد، سانس نہایت ضعیف اور جسم سرد پسینہ سے نہا جاتا ہے۔
۳۔ عورتوں میں سن بلوغ کے قریب اور سن ایاس میں کثیرالوقوع ہے، بچے، جوان لکیاں طود پر مبتلا ہوتے ہیں۔	۳۔ جوانوں میں کثیرالوقوع ہے اور عورتوں مردوں میں یکساں طور پر ہوتی ہے۔

- ۳۔ بعض اوقات کسی علامہری سبب کے بغیر | سر انفعالات نفسانیہ اور عصبی صدمہ کے بعد
محض شدید نفاہت وضعف سے مارض | مارض ہوتی ہے -
ہوتی ہے -
- ۵۔ مارض قلب کی علامتیں پائی جاتی ہیں - | ۵۔ عصبی علامات پائی جاتی ہیں -
۶۔ مہلک ثابت ہو سکتی ہے - | ۶۔ بالعموم مہلک نہیں ہوتی -

اصول علاج

- ۔ دودہ غشی کے وقت مریض کو چہت لٹا کر اس کے سر کو قدم سے نیچا اور ٹانگوں کو اونچا کر دیں اور اگر لٹائے کی جگہ نہ ہو تو بٹھا کر اس کے سر کو زانو کے درمیان جھکادیں اور ہاتھ پاؤں باندھ دیں۔
- ۔ غشی کی حالت میں سونگھنے اور حلق میں ٹپکانے کی دوا کے ذریعہ سبب مرض کی مخالفت میں طبیعت اور روح کی مدد کریں۔
- ۔ حسب ضرورت ہاتھوں کی تھیلیوں کو ملیں اور پاشویہ کریں۔

علاج

- ۔ اصول علاج میں مذکور پہلے اصول کو اختیار کریں
- ۔ غشی کی حالت میں سبب مرض کی مخالفت میں طبیعت اور روح کی مدد کریں، چنانچہ غشی کی وجہ اگر حرارت ہو تو صندل اور کافور سونگھائیں، برودت کی صورت میں خشک اور زعفران سونگھائیں۔
- ۔ غشی قلبی کی صورت میں پیروں اور ہاتھ کی تھیلیوں کی مالش کریں پاشویہ کریں، چہچہ اور سینہ پر گلاب یا سرد پانی کے پھینٹے دیں، مغزات اور منغش حرارت مزیزی اور یہ کو عرق بید مشک اور عرق کیوڑہ وغیرہ میں حل کر کے حلق میں ٹپکائیں، جو اہر مہرہ اور دوا المسک وغیرہ کھلائیں۔
- ۔ غشی استغرائی کی صورت میں ازالہ سبب مرض کے بعد کہاب مرغ، سیب اور بھی کو بریاں کر کے سونگھائیں، ماء اللحم اور شراب نوش کرائیں، گرم روغنات کی مالش

کریں۔ درج ذیل نسخہ استعمال کرنا سمورہ مند ثابت ہوا ہے۔

نسخہ: دودھ المسک ۲ گرام، ہزارہ عرق بید مشک ۴ ملی لیٹر، جلق میں پڑکائیں۔
 غشی نفسانی کی صورت میں مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشبو سوگھائیں اور
 ہاتھ پیروں پر گلاب اور سرد پانی دھاریں، اس کے بعد گرم روغنیات سے دلکب لیتیں کریں۔
 غشی امتلاقی میں باسلیق کی فصد کھولیں، نوشادر اور چونے کا مرکب
 سوگھائیں۔

اگر مرض کا سبب غلبہ ریاح ہو تو کاسر ریاح ادویہ، ہیل خورد، مصطکی،
 منبل الطیب اور گلقد سیوتی استعمال کرائیں۔

درج ذیل نسخہ لختہ ہر قسم کی غشی میں مفید ہے۔

نسخہ لختہ: آب کشیز سبز، آب خیار سبز، عرق گلاب، عرق کیوڑہ، عرق بید مشک،
 سرکہ، ہر ایک ۲ ملی لیٹر، مندل سفید، گل ارمنی، کافور، ہر ایک ۴ گرام، جملہ دوائیں
 کو ایک شیشی میں ڈال کر مرہین کو سوگھائیں

گل سرخ، گل چاندنی، گل سیوتی، گل گاؤز بان، گل نیلوفر، گل داؤدی،
 گل کیتکی، گل امروہ، گل ناشپاتی، گل کیوڑہ، گل نارنج، گل لیموں، گل گردل، گل چنبیلی،
 ہر ایک ۳ گرام، جملہ دوائیں کورات میں عرق گلاب خالص، عرق کیوڑہ، عرق گاؤز بان،
 عرق آبروشم، عرق بید سادہ، عرق سیوتی، عرق مندل، ہر ایک ۵ ملی لیٹر، آب بہ شیریں،
 آب انار شیریں، آب ناشپاتی، آب لیموں، آب سنگترہ، آب نارنج، آب گندہ، آب ترہیز،
 آب قالسہ، آب نیشکر، ہر ایک ایک لیٹر، یشب سبز، زہر مہرہ عطائی، طبا شیر، لاہورد مغسول،
 ہر ایک ۳ گرام، زعفران ۵ گرام، آخر میں مذکور دوائوں کو پوٹی میں باہجہ کنیچے کے منہ میں رکھ کر
 حسب معمول عرق کشید کریں اور ۶ ملی لیٹر ہمراہ شربت انار شیریں ۲۴ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

زہر مہرہ، بسلوچن، سماق، انار دانہ، کبر باشمعی، یشب سبز، جدوار، ہر

ایک ایک گرام، جملہ دوائیں کو باریک پیس کر خمیرہ گاؤز بان جواہر والا ۳ گرام ملا کر لعاب
 گاؤز بان ۳ گرام، شیرہ بادیان، شیرہ اصل السوس، ہر ایک ۴ ملی لیٹر، شیرہ مویرہ منقہ ۹ دانہ،
 عرق گاؤز بان، عرق بید مشک، عرق گلاب، ہر ایک ۴ ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ
 ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

— ورم قلب ہار دی صورت میں درج ذیل نسخہ مفید ہے

نسخہ: چند بیدستر دارچینی، جدوار عطائی، درونج مقربی، مشک خالص، بسیار ہر ایک ایک گرام۔ جملہ دواؤں کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں، اور اس سفوف میں سے ایک گرام لے کر ہمراہ زعفران ۵۰۰ ملی گرام، شربت ابریشم ۲۴ ملی لیٹر میں کھل کر پیں اور ورق طلا ایک عدد، اس میں لت کر کے مریض کو چٹائیں، اس کے بعد تخم گندر، تخم مشربتی، ہر ایک ۳ گرام، عرق بادیان ۱۲۰ ملی لیٹر گرم کر کے ان دونوں تخم کو اس میں بھگو دیں اور مل چھان کر شربت سنبل الطیب ۲۴ ملی لیٹر اس میں حل کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔
 — ضعف کی وجہ سے عارض ہونے والی غشی میں خمیرہ مروارید / خمیر ابریشم حکیم ارشد والا گرام، کشتہ نقرہ جدید ۳۵۰ ملی گرام، ملا کر کھلائیں۔

Learn Unani By Abdul

امراض صمامات قلب - واوعیہ خون -

Learn Unani By Abul Waqis Salman

تقبیر اور طی

AORTIC REGURGITATION

اس مرض میں اور طی یا دہانہ اور طی میں تنگی یا غیر طبعی کیفیت پیدا ہو جانے، بطن قلب کے سکڑنے کے نتیجہ میں سارا خون اور طی میں جانے کے بجائے تھوڑا سا بطن میں ہی واپس آجاتا ہے Regur gitation۔ جس سے مرضی علامات و عوارض رونما ہوتے ہیں۔ ذاتی طور پر یہ مرض ۳۰ سال کے بعد کثیراً وقوع ہے۔

اسباب

- (I) حمی وجع المفاصل
- (II) تحت الحاد بیکٹیریائی التهاب بطانہ قلب Sub-Acute Bacterial Endocarditis
- (III) آتشک
- (IV) التهاب فقرات
- (V) Reiters Syndrome
- (VI) تفسیق دہان (منق) صمام اور طی
- (VII) بیش تناسب قوی
- (VIII) غلیہ کے نتیجہ میں انشقاق

جیسا کہ مذکور ہوا کہ صمام کی چپٹوں کے سکڑنے یا ان کی بندشوں کے بوتار کے کھینچ کر تنگ ہو جانے کی وجہ سے صمام (valve) پوری طرح سے بند نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بطون قلب کے سکڑنے پر ان کے اندر کا خون تمام

تقبیر لغوی معنی باز روی / لوٹنا واپس آنا (Regurgitation) اس کا دوسرا نام مردم نظم اور قلنس بھی ہے۔

کا تمام آگے چلے جانے کی بجائے کسی قدر اذنین میں واپس لوٹ آتا ہے اور درج ذیل مرضی عوارض کا باعث ہوتا ہے۔

دماغی عدم دمومیت جیسی علامتیں رونما ہوتی ہیں جس کے سبب دوران سراور غشی کے ناگہانی حملے ہوتے ہیں۔ بے خوابی ہوتی ہے، ناک سے خون بہتا ہے، چہرہ لب اور غشاء مخاطی مشاحبہ ہوتے ہیں، عام طور سے یہ اولاً رات کے وقت دوری صورت میں یا چین اسٹوکس تنفس کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، تحت القفس درد ہوتا ہے، ذبح صدریہ (Angina Pectoris) کے مثالی حملے بھی ہو سکتے ہیں۔

ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ تقہر صمام اور طی کی حالتوں میں نبض جتنی ضعیف ہوگی، تقہر اتنا ہی زیادہ شدید ہوتا ہے، اس مرض میں چونکہ قلب کے بائیں بطن پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے سبب سرعت بطلان قلب (Heart Failure) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

تقہر ریوی اور انور سما صدی سے اس مرض کا اشتباہ ہو سکتا ہے اس لئے ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تقہر ریوی	تقہر اور طی
۱۔ نبض لیتن چلتی ہے۔	۱۔ نبض سریع، مطرق اور لیتن چلتی ہے۔
۲۔ نبض عروق شعری نہیں ہوتا۔	۲۔ نبض عروق شعری ہوتا ہے۔
۳۔ دایاں بطن بڑھا ہوتا ہے۔	۳۔ بائیں بطن میں عظم ہوتا ہے۔
۴۔ سرسراہٹ ثانوی، بائیں فضا میں سب سے زیادہ اور نمایاں، سمعی ہے۔	۴۔ سرسراہٹ ثانوی، دائیں فضا یا غفوف حنجری پر سب سے زیادہ نمایاں اور بلند ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

انورسما صدري	تقیہر اور طی
۱۔ نبض ضعیف اور لیٹن جلتی ہے	۱۔ نبض سریع، مطلق اور لیٹن جلتی ہے
۲۔ نبضہ عروق شعری نہیں ہوتا۔	۲۔ نبضہ عروق شعری ہوتا ہے۔
۳۔ نسوا و قلب ہوتا ہے	۳۔ عظم قلب ہوتا ہے۔
۴۔ سرسراہٹ انقباضی انورسی	۴۔ سرسراہٹ انبساطی ہوتی ہے۔
۵۔ سرسراہٹ نیچے منتقل نہیں ہوتی	۵۔ سرسراہٹ نیچے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

تقیہر اور طی حداری	تقیہر اور طی آتشی
Rheumatic A. Regurgitation	Syphilitic A. Regurgitation
۱۔ ۲ سال سے قبل کثیر الوقوع ہے۔	۱۔ ۳ سال کے بعد عام طور سے ہوتا ہے۔
۲۔ جی حداری کی سرگزشت ہوتی ہے۔	۲۔ آتشک کی سرگزشت ملتی ہے۔
۳۔ مدت عام طور سے طویل ہوتی ہے۔	۳۔ مدت مختصر ہوتی ہے۔
۴۔ وجع القلب شاذ و نادر ہوتا ہے۔	۴۔ وجع القلب عام طور سے ہوتا ہے اور ابتدائی مرحلے میں تو خاص طور سے ہوتا ہے۔
۵۔ صمام متاثر ہو سکتا ہے۔	۵۔ صمام اور طی عام طور سے متاثر نہیں ہوتا۔
۶۔ انسداد قلب Heart Block ہناؤ نال ہوتا ہے	۶۔ عام طور سے انسداد قلب Heart Block بھی ہو جاتا ہے
۷۔ L. R. D. ٹسٹ منفی ہوتا ہے۔	۷۔ L. R. D. ٹسٹ مثبت ہوتا ہے۔
۸۔ مقدر ہوتا ہے۔	۸۔ شدید آتشک میں بڑھا ہوتا ہے۔

اصول علاج

• اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

• مقوی اعصاب و دوائیں استعمال کرائیں تاکہ مہم کے بند ہونے کا عمل قوی ہو جائے۔

علاج

- غیرہ سرورایدہ گرام کھلائیں
- غیرہ آبر یغم ارشدی گرام ہمراہ عرق گاؤزبان استعمال کرائیں۔
- دواء المسک معتدل گرام ہمراہ عرق منبر استعمال کرائیں
- حمی حداری کی صورت میں اس کا مخصوص علاج کریں
- اُنشک کی صورت میں اس کا مخصوص علاج کریں
- حب جواہر ایک عدد غیرہ گاؤزبان عنبری گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں


تضیق اورطی

AORTIC STENOSIS

اس مرض میں اورطی میں تضیق دہنگی۔ Stenosis ہکی وجہ سے قلب کے سکڑنے کے وقت خون کی روانگی میں رکاوٹ ہوتی ہے، جس سے مرضی علامات / عوارض رونما ہوتے ہیں۔ یہ نادر الوقوع مرض ہے۔

تضیق اورطی

اقسام



اسباب

- (I) ساخت میں پیدا انشی نقص
(II) طبعی صمام میں ٹکلس
Calcification
(III) حمی وجع المفاصل / حمی حداری
(IV) التهاب غشاء بطانہ القلب حادثہ کے نتیجہ میں صمام کا دبیز اور سخت ہو جانا
(V) مثبت قسم
Fixed type
(VI) تضخمی قسم
Hypertrophic Type
(VII) والسلا Valsalva کی بالائی تحریف پرستی ساخت کا اتھال و اثر

علامات تفصیل کی وجہ سے قلب کے انقباض کے وقت خون کی روانگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے عظمیٰ نقص در Stemum کے درمیانی مقام پر اس فضا کے مقابل، دل کی پہلی آواز کی بجائے، ایک غیر معمولی آواز سنا دیتی ہے، جو دوسری تیسری پسلیوں کے مابین ہوتی ہے، لیکن زواہ قلب کی طرف بندہ سچ یہ آواز کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہ آواز طویل اور ناہموار ہوتی ہے، جو دائیں جانب پسلی کی دوسری غروف کے متوازی، قص کے کنارے پر اور اور طی کی راہ ہوتی ہوئی دائیں تر قوہ (CLAVICLE) تک، اور بعض اوقات شریان سبائی پر بھی سنی جاسکتی ہے۔

بعض طویل دقیق چلتی ہے، قلب کا بایاں بطن دبیز اور کشادہ ہو جاتا ہے، جس سے بعض اوقات قلبی تکان کے باعث غشی طاری ہو جاتی ہے، ثقبہ عاجز بطنی اور ثقبہ قنات شریانی کی شکایت ہوتی ہے، ثقبہ صمام تاجی اور ثقبہ اور طی جیسی کیفیات بھی پیش آسکتی ہیں، قلب کے بائیں اذن کے فشل کی صورت میں نوبتی عسر النفس اور انتھاب تنفسی عارض ہوتا ہے۔ ذبح صدر یہ جیسے عوارض بھی رونما ہو سکتے ہیں۔

ذیل میں ثقبہ اور طی اور انورس صمدری سے تفریق کے لئے علامات فارقہ تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تضيق اور طبي	تفريق اور طبي
۱۔ نبض بلی، صلب اور دقت چلتی ہے۔	۱۔ نبض سریع، مطرق اور لٹین چلتی ہے۔
۲۔ سرسراہٹ انقباضی ہوتی ہے۔	۲۔ سرسراہٹ انبساطی ہوتی ہے۔
۳۔ سباتی میں اور پر منتقل ہوتا ہے۔	۳۔ غفروں و حقیری تک نیچے منتقل ہوتا ہے۔
۴۔ عروق شری نبض نہیں ہوتا	۴۔ عروق شری نبض ہوتا۔

تضيق اور طبي	انورسما صدری
۱۔ صدر و پشت میں عام طور سے درد محسوس نہیں ہوتا۔	۱۔ صدر اور پشت میں چھپتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے۔
۲۔ زاویہ پر نبض قلب تموجی ہوتا ہے	۲۔ زاویہ پر نبض قلب طبعی ہوتا ہے۔
۳۔ زاویہ پر بالمس نبض وسیع نہیں ہوتا۔	۳۔ زاویہ پر بالمس نبض وسیع ہوتا ہے۔
۴۔ نبض جانبین پر یکساں ہوتی ہے۔	۴۔ نبض جانبین پر عام طور سے مختلف ہوتی ہے۔
۵۔ سرسراہٹ تنہا ہوتی ہے۔	۵۔ سرسراہٹ دوہری ہوتی ہے۔
۶۔ خنجرہ اور مری کی علامات نہیں ملتیں	۶۔ خنجرہ اور مری کی علامات موجود ہوتی ہیں

اصول علاج

- _____ بہنی قوتوں کو بحال کرنے کی تدابیر اختیار کریں
- _____ قلب کی بے قاعدہ حرکات میں نظم پیدا کرنے کی تدابیر کریں
- _____ نوشادر اور اس کے مرکبات کے ذریعہ خون میں رقت پیدا کریں
- _____ اورطی میں لینت پیدا کرنے کی تدابیر کریں

علاج

_____ عملیہ کریں

تقہقر صمام تاجی

MITRAL REGURGITATION

اس مرض میں صمام تاجی (Mitral Valve) مکمل طور پر بند نہیں ہو پاتیں جس کے نتیجہ میں انقباض قلب کے وقت بائیں بطن کا خون بائیں اذن میں واپس لوٹ جاتا ہے اور دیگر مرضی عوارض کا موجب ہوتا ہے۔

اسباب

- (I) حمی و جمع المفاصل / حمی حذاری
- (II) بیکٹریائی انتہاب بطائہ قلب
- (III) قحطی / فیروسی انتہاب عضلہ قلب
- (IV) خناق
- (V) لیفی انتہاب بطائہ قلب
- (VI) الکلیلی مرض قلب
- (VII) حبال و تریہ کا فساد فعل
- (VIII) بیش تناسب
- (IX) صمام اور طی کے بعض امراض
- (X) استلاقی عضلی مرض قلب

Coronary Heart Disease

علامات کا انحصار تقہقر د باز روی کی وقوعی کیفیت پر ہوتا ہے چنانچہ درمیانی درجہ کے تقہقر میں کوئی واضح علامت نہیں ملتی اور صمام تاجی میں نقصان کا عمل سست ہونے کی صورت میں اس کی علامات تفصیق صمام تاجی سے مشابہ ہوتی ہیں اور عضلہ قلب کے امراض میں علامات میں شدت ہوتی ہے۔ تقہقر کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے

علامات

وہ زاویہ قلب سے قدرے باہر کی طرف قلب کی پہلی آواز کی بجائے زور سے سناؤ دیتی ہے اور قلب کے قاعدہ اور غصروف خمیری پر یہ آواز بالکل معدوم ہوتی ہے، خفیف حالت میں نبض قریباً کما لیت صحت کی مانند چلتی ہے اور شدت مرض کی صورت میں غیر منظم، متفاوت، لیٹن اور سریع چلتی ہے۔

بایاں بطن کشادہ اور دبیز ہو جاتا ہے، انبساط کے وقت بائیں بطن کا خون بائیں اذن میں واپس لوٹ آتا ہے (رجعت قہقری)، اس سے وریڈ شریانی پھیپھڑوں سے لائے ہوئے خون کو پوری طرح خارج نہیں کر پاتی جس کے نتیجہ میں پھیپھڑوں میں اجتماع خون ہو جاتا ہے۔ اس اجتماع خون سے دائیں اذن اور بطن پر بھی اثر پڑتا ہے اور کچھ عرصہ بعد ان میں عظم و اتساع اور قہقری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس سے عام وریڈی دوران خون میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا کبڈہ کلیہ اور طحال وغیرہ میں بھی کم و بیش وریڈی خون کا اجتماع ہو جاتا ہے جو بیرقان اور مستقائے نمی کا باعث ہوتا ہے۔ ان حالات میں شدید کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، تنفس میں تکلیف ہوتی ہے، التهاب ریہ اور سکنہ بھی عارض ہو سکتا ہے۔

تفریقی علامات

تفصیل اور طبی	تفصیل اور طبی
۱. نبض صلب، دقیق اور غیر منظم چلتی ہے۔	۱. نبض لیٹن اور غیر منظم چلتی ہے۔
۲. دماغی علامات ملتی ہیں۔	۲. رگڑی اور کلوی علامتیں ملتی ہیں۔
۳. سرسراہٹ بلند اور تیز ہوتی ہے۔	۳. سرسراہٹ دھیمی اور نرم ہوتی ہے۔
۴. قاعدہ پر سرسراہٹ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔	۴. زاویہ پر سرسراہٹ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔
۵. عروق کلیہ میں منتقل ہوتی ہے۔	۵. سرسراہٹ بائیں اور پیچھے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔
۶. دوسری رگڑی آواز خفیف/ضعیف ہوتی ہے۔	۶. دوسری رگڑی آواز بہت تیز ہوتی ہے۔

اصول علاج |

- _____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- _____ مقوی اعصاب دوائیں استعمال کرائیں
- _____ حسب ضرورت عمل بالیدر Operation کریں

علاج |

- _____ التهاب بطاء قلب کی صورت میں اس مرض کے ذیل میں مذکور علاج کریں۔
- _____ مقوی اعصاب کے طور پر منفرح مروارید عنبری ۳ گرام، ہمراہ عرق گاؤربان ۵ ملی لیٹر استعمال کرائیں یا
- _____ منفرح یا قوتی ۳ گرام ہمراہ مناسب عرق استعمال کرائیں۔
- _____ نبوب کبیر ۵ گرام کھلائیں۔ اطریفیل اسطوخودس ۷ گرام کھلانا بھی سودمند ہے۔

تفصیق صمام تاجی

MITRAL STENOSIS

اس مرض میں صمام تاجی / ذوالراسین د Mitral Valve موصی، ملائم اور ریشہ دار ساخت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے کنارے آپس میں جوڑ کر بٹن کے کاج کی مانند یا قیف نما درز پیدا کر دیتے ہیں، بعض اوقات سوراخ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ چھوٹی انگلی کا سرا میں اس میں داخل نہیں ہو پاتا، حبال و تر یہ سکڑ کر سفید رسی کی مانند ہو جاتی ہیں اور بھی

۱۰ صمام تاجی / تاج نما کیو اڑی یہ قلب کے بائیں اذن اور بائیں بطن کے درمیان سوراخ کے دہانے پر لگی رہتی ہے اور اذن سے بطن میں خون کو آنے تو دیتی ہے لیکن بطن کے سکڑنے پر خون کو اذن میں سے واپس نہیں جانے دیتی۔

عملہ تجزیہ براہ راست صمام (Valve) سے چٹ جاتی ہیں۔ اور ان سے مرضی کیفیات رونما ہوتی ہیں۔ مردوں کی نسبت جوان عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب |

(I) جمی وجع المفاصل / جمی حداری

(II) دوار الرقص

(III) درانت (شاذ و نادر)

(IV) صمام میں بتدریج صلاحیت (شاذ و نادر)

علامات | امراضیاتی نقطہ نظر سے صمام تاجی دبیز، ہموار اور لیفی ہوتی ہے، اس پر کسی قسم کی روئیدگی نہیں ہوتی، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ نقب تاجی قیف نہا اور گول ہو جاتا ہے اور تقلص بہت نمایاں ہوتا ہے، زاویہ قیف خون کے بہاؤ کی سمت میں دبلن کی طرف ہوتا ہے۔ بائیں اذن قلب میں نفخہ رونما ہونے کے بعد توسع کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات یہ توسع بہت نمایاں ہوتا ہے، ایسے میں غذائی نالی پچھلی جانب چلی جاتی ہے۔ اور آخر میں تلیف اذن قلب کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بائیں اذن کے زائدہ دساکن کو Stagnant Corner میں ایک یا دو گڑھ نما سدرے بھی بن جاتے ہیں۔

تقبہ صمام تاجی کی وجہ سے امتلاء ریوی کے علاوہ نفث الدم کارجمان بھی بڑھ جاتا ہے اور شرائین میں اتھیروما کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ریوی وریڈس اذن میں داخل ہونے کے مقام پر بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، پھیپھڑوں کے دوران خون میں ویاؤ کی زیادتی کی وجہ سے دائیں بطن کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب اس میں بھی عظم و اتساع پیدا ہو جاتا ہے، مریض کے زیادہ دنوں تک زندہ رہنے کی صورت میں شری طور پر تقہر تلافی الروس کی بھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ثانوی طور پر احتشاء شکم اور زیریں اطراف پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، انگلیوں کے سرے تقہر و الروس / تقہر صمام تاجی کے مقابل میں زیادہ دبیز ہو جاتے ہیں۔ اس میں مریض شاذ و نادر ہی ۳۵ سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے بلکہ عام طور سے ۳۵ سال سے قبل ہی فوت ہو جاتا ہے۔

اس مرض میں چہرہ کی ایک مخصوص ہیئت ہو جاتی ہے، پیشانی، ناک اور منہ کے ارد گرد کا رنگ ہلکا نیلا یا زردی مائل ہوتا ہے، اس کے برخلاف لبوں اور رخساروں کا رنگ گہرا ہوتا ہے، ابتدا میں ضربہ راس القلب میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ مرض عام طور قلب میں ہوتا ہے لفظ (مرمر = Mur Mur) قبل از انقباض کے ساتھ ارتعاش قبل از انقباض بھی ہوتا ہے۔

قلب کی پہلی آواز بہت بلند اور یک نخت پیدا ہوتی ہے، دوسری آواز مقام ریوی پر بلند ہوتی ہے اور عام طور سے اس میں تضاعف پایا جاتا ہے، بعد میں اختلاج اذن پیدا ہو جاتا ہے، راس القلب نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور حرکات قلب غیر منتظم ہو جاتی ہیں، لفظ انبساطی راس القلب پر سنی جاسکتی ہے۔

حمل کے نتیجہ میں عارض ہونے والے تفتیق صمام تاجی (M.S.) میں عام طور سے کوئی مرضی علامت رونما نہیں ہوتی، تنفسی علامات ریوی مروق میں امتلاء اور کبد میں صلابت کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ انتصابی تنفس اور توجہ قلبی عسر التنفس، تنفسی اذیم، نفث الدم خفقان ہو سکتا ہے۔ شدید عوارض میں ذبحہ صدریہ (Angina Pectoris) بھی ہو سکتا ہے۔

تفتیق صمام تاجی (M.S.) کی تشخیص بعض اوقات بہت دشوار ہو جاتی ہے، خاص طور سے اذنی تموج کی صورت میں، کیونکہ اس میں اس کی خصوصی علامت مرمربا لکل مفقود ہوتی ہے۔ اس وقت قلب کی پہلی آواز زوادیہ قلب پر تیز اور واضح سنائی دیتی ہے جبکہ دوسری آواز نمایاں زوردار اور دیر تک سنائی دیتی ہے اور قلب میں کسی قدر عظم بھی پایا جاتا ہے۔ اشتباہ کے امکانات کو ختم کرنے کے لئے تفتیق صمام تاجی / ذوالرأسین اور تفتیق اور طی سے اس کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تفتیق صمام تاجی	تفتیق صمام تاجی
۱۔ سرسراہٹ انقباض سے قبل ہوتی ہے۔	۱۔ سرسراہٹ انقباض سے قبل ہوتی ہے۔
۲۔ سرسراہٹ بغل کی طرف بڑھتی ہے۔	۲۔ سرسراہٹ محدود حصہ میں ہوتی ہے۔

- | | |
|--|--|
| ۳۔ زیادہ سے اوپر سربراہٹ سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ | ۳۔ تموج ہوتا ہے۔ |
| ۴۔ تموج نہیں ہوتا۔ | ۴۔ نبض صغیر چلتی ہے اور ارتعاد الاذن کی حالت میں بہت غیر منظم چلتی ہے۔ |
| ۵۔ قوت ولایت کے اعتبار سے اکثر غیر منظم چلتی ہے۔ | |

تفریقی علامات

- | | |
|---|--|
| <u>تفہق اور طی</u> | <u>تضیق صمام تاجی</u> |
| ۱۔ ریوی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ | ۱۔ ریوی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ |
| ۲۔ سربراہٹ انبساطی ہوتی ہے۔ | ۲۔ سربراہٹ قبل الانقباض ہوتی ہے۔ |
| ۳۔ سربراہٹ نرم اور موسیقاری ہوتی ہے۔ | ۳۔ سربراہٹ جھنجھری اور غیر موسیقاری ہوتی ہے۔ |
| ۴۔ سربراہٹ بہت وسیع ہوتی ہے۔ | ۴۔ سربراہٹ محدود ہوتی ہے۔ |
| ۵۔ نبض لیفی، سریع اور سطرنی چلتی ہے۔ | ۵۔ نبض لیفی اور متلی چلتی ہے۔ |
| ۶۔ نبضه عروق شعری قائم المعدہ، آنکھوں اور ناخن کے نیچے۔ | ۶۔ نبضه عروق شعری نہیں ہوتا۔ |

اصول علاج

- _____ مقوی و مستہی ادویہ و افندیہ تجویز کریں۔
- _____ نوشادر اور اس کے مرکبات کے ذریعہ خون میں رقت، قلب و ریہ کے افعال میں تحریک اور سانس کی نالیوں کے افرازات و Secretions کو بڑھائیں۔
- _____ چونکہ اس مرض میں اکثر اوقات کبد بھی متاثر ہوتا ہے اس لئے معالجہ میں اس کی بھی رعایت ضروری ہے۔
- _____ بعض اوقات ادویہ مسہلہ میں پارہ کے مرکبات کی ضرورت پڑھتی ہے۔

علاج

_____ صبح کو دیا قوزہ ۶ گرام نمبر ۴ شربت صدر ۴ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

_____ بعد غذا، جب کبدہ نوشادری استعمال کرائیں
 _____ مغز بادام شیریں ۵ عدد، مغز تخم کدوئے شیریں، تخم کاہو، تخم خشخاش، کنجی برغیدہ
 ہر ایک ۲ گرام، شیر گاؤ میں جوش دے کر نوش کرائیں
 _____ تقویت اور اشتہاء کے لئے قرص فولاد ایک عدد، جوارش جالینوس ہا گرام
 ملا کر کھلائیں
 _____ جوارش آملہ لولوی ہا گرام شب میں کھلائیں

تکلس شراین

ATHEROMA

اس مرض میں شراین کی دیواروں (خاص طور سے اندرونی طبقہ) میں کلسی نوعیت کا
 تغیر و فساد ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت آہستہ آہستہ نمونپائے والا مرض ہے جو عام طور سے
 چالیس سال کی عمر کے بعد لاحق ہوتا ہے۔

اقسام

تکلس شراین

Atheroma

تکلس شراین عقدی

تکلس شراین کردی

اسباب

(I) فشار خون قوی کے اسباب مثلاً

(I) طویل دماغی / نفسانی / بدنی ریاضت

(II) تسیم ذیابیطس

(III) حمی اجامیہ

(۱۳) عفونت امعاء

(۱۴) کثرت عے نوشی

(۱۵) سیہ کی سمیت

(۱۶) آتشک

(۱۷) نقرس

(۱۸) خون میں کولسٹرا ل کی زیادتی

(۱۹) وجع القلب

ابتداء میں ماؤف مقام پر شحمی یا ہلکا سی قسم کا فساد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں چونے کے ٹکلیات جمع ہو کر تکلس پیدا کر دیتے ہیں،

علامات | تخلّص شترائین کروی: یہ صورت جھوٹی اور بڑی، دونوں انواع کی شترائین میں پیش آسکتی ہے تاہم شریان اور طی اور قوس اور طی کے اس مقام پر جہاں اس سے شاخیں علیحدہ ہوتی ہیں، کثیر الوقوع ہے، کیونکہ وہاں خون کا دباؤ زیادہ پڑتا ہے۔

ابتداء میں متاثر مقام پر نیم شفاف، چھوٹے چھوٹے حلقہ دار داغ پائے جاتے ہیں، ان داغوں کے کنارے بے قاعدہ اور ناہموار ہوتے ہیں۔ اور ان میں ہلکی نوع کا فساد رونما ہوتا ہے، اس کے بعد اس جگہ نیچ لیٹی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے داغ سفیدی مائل چمکدار نظر آنے لگتا ہے، اس کے بعد ان میں شحمی فساد شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، اس کے بعد شحمی فساد سے حاصل ہونے والے شحمی اجزاء یعنی تیزابات مقام ماؤف پر آنے والے خون کے معدی اجزاء پر عمل کر کے تکلس پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نظام میں اس طرح سے متغیر شدہ نظام پوئین کی مانند نرم ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد چونے کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے معمولی صورت میں ماؤف شریان کے درمیان اور بیرونی طبقہ میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تاہم بعض اوقات درمیانی طبقہ کے عضلاتی ریشوں میں بھی کم و بیش فساد و تغیر رونما ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر بیرونی طبقہ میں نیچ لیٹی زیادہ ہو کر اسے دبیز بنا دیتی ہے۔

تخلّص شترائین عقدی: تکلس کی یہ صورت اکللی، دماغی اور کلوئی شترائین میں کثیر الوقوع ہے۔ اس میں متاثر مقام پر شریان دبیز اور سخت ہو کر عقدی (گمرہ دار) ہو جاتی ہے، اور

صحت مند معتدل / طبعی حالات والی شریان کی طرح لچک جاتی ہے اور نہ ہی کاٹنے پر سکڑتی ہے، متاثر مقام پر شریان کا جوف تنگ ہو جاتا ہے، اندرونی طبقہ دبیز ہو جاتا ہے، اور عقد کی مانند منتشر شکل میں چھوٹے چھوٹے گڑھے پائے جاتے ہیں، جس سے شریان میں جمود الدم ہو کر دُموی سرے بھی پائے جاسکتے ہیں، اس نوع کے تکلس میں خوردبینی مشاہدہ سے اگرچہ شریان کے بیرونی طبقہ میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں پایا جاتا تاہم درمیانی طبقہ میں عضلی ریشوں کے درمیان نیسج لیفی کی زیادتی ہو جاتی ہے، اندرونی طبقے میں کسی قدر رتھی فساد اور بیشتر نیسج لیفی کی زیادتی پائی جاتی ہے، جس میں مروق دُمویہ ناپید ہوتی ہیں۔

ملحوظ رہے کہ تکلس شرائین میں شرائین کی دیواروں میں صلابت اور ان کے جوف میں تنگی کی وجہ سے فشارخون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قلب کے ہائیں بطن میں عظم پیدا ہو جاتا ہے۔ اکلیلی یا دماغی شرائین کے متاثر ہونے کی صورت میں سدہ دُموی پیدا ہو جائے تو بالترتیب فوری ہلاکت یا سکتہ اور فالج وغیرہ رونما ہو سکتے ہیں۔

اصول علاج |

- _____۔ تربیتی تدابیر اختیار کریں
- _____۔ تقویت قلب کا اہتمام کریں

علاج |

- _____۔ مغز بادام شیریں ۵ دانہ، تخم کاہو، تخم خشیاش، کنجد سفید، مغز تخم کدوئے شیریں، ہر ایک ۳۰ گرام استعمال کرائیں۔
- _____۔ مغز باردہ ۵ گرام استعمال کرائیں۔
- _____۔ عملیہ کریں۔

تصلب شرائین


ARTERIO-SCLEROSIS

اس مرض میں شرائین کی دیواریں سخت اور دبیز ہو جاتی ہیں، اور ان کی طبعی لچک معدوم ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابتداء میں شریان کی درمیانی یا بیرونی تہہ میں مقامی طور پر سختی مواد کی ٹکڑیاں و ٹکڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ معدنی عناصر شامل ہو کر صلابت پیدا کر دیتے ہیں جس سے شریان دوران خون میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور شریان پر منحصر عضو تک خون کی مقدار بھر رسائی نہیں ہو پاتی۔

اسباب اور اعضاء کے اعتبار سے اس کی متعدد اقسام ہو سکتی ہیں، ذیل میں بطور مثال چند اقسام تحریر کی جا رہی ہیں۔

تصلب شرائین

Artherio Sclerosis



اسباب

- (I) کولسٹرول سے لبریز غذاؤں
- (II) وائرس منہ (ہیپیز) قشری قسم
- (III) متعدد امراض کی سمیت
- (IV) منشیات کا بجزرت استعمال
- (V) بعض امراض حادہ
- (VI) ایسا پیشہ جو سخت عضلی بار کا سبب ہو

(LVI) نقرس

(LVII) بیش فشارخون

(LVIII) جذباتی تناؤ

(LIX) کاہلی

(LX) انتہاب کلیہ

(LXI) قلت درقیت

(LXII) معانی تسمم

Hypothyroidism

علامات | علامات اور عوارض کا انحصار دراصل عضو کے اعتبار سے شریان کے تھلم پر منحصر ہے، چنانچہ ابتدائی درجوں میں چہرہ پر زردی چھائی ہوئی ہے، سورہضم اور جسمانی وزن میں کمی آجاتی ہے تاہم مریض روزمرہ کی مشغولیات میں منہمک رہتا ہے اور اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتا ہے، قلب، کلیہ یا دماغی افعال میں کوئی نقص موجود نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات کثرت بول کی شکایت بھی ہو جاتی ہے جس میں رطوبت بیضیہ بھی شامل ہوتی ہے۔

ابتدائی درجوں میں شریان کی تروپ کو چھو کر محسوس کیا جاسکتا ہے اور انگلیوں سے دبا کر سارا خون خارج کر کے انگلیوں کے نیچے گھمائی جاسکتی ہے، شریان دبیز محسوس ہوتی ہے، بعد میں صلابت اور عرضی قطر (جوڑائی) اور لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لمبائی کی وجہ سے شریان میں بیج بھی پیدا ہو سکتی ہے، مزید بہن عام طور سے کم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔

اس مرض میں شرائین اکللی عام طور پر اتھرومائی ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں عقلہ قلب کی پردریش اور تغذیہ میں خلل واقع ہو کر انحطاطی کیفیت رونما ہونے لگتی ہے اور ابتدائی فشل قلب (Heart Failure) کی علامات مثلاً خستگی، سانس پھولنا اور زور لگانے پر درد وغیرہ موجود ہو سکتی ہیں۔

شریان تاجی میں تھلم کی صورت میں سدہ دموی پیدا ہو کر یک دم موت واقع ہو سکتی ہے نیز شحات قلب، انورسما اور وجع القلب بھی عارض ہو سکتا ہے۔

مومن صورت میں نزف دماغی، فالج نصفی اور بطلان تکلم بھی ہو سکتا ہے تاہم یہ کیفیات اور عوارض ۱۲-۲۴ گھنٹے تک رہتے ہیں، اس کے بعد مریض کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، سرد و دوار ہوتا ہے، قبض ضعیف چلتی ہے غشی اور صرع بھی ہو سکتا ہے۔ سوداوی علامات مثلاً نسیان خصوصاً مالیہ واقعات بھول جانا، قوت فیصلہ میں کمی، جذباتی برائی، تنگی، خود غرضی، تغیرات سے نفرت و مزاحمت، جھگڑنا، ہات ہات میں بے قابو ہو جانا وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔

پیردوں کی شرائین میں تصلب کی صورت میں حذر، برودت، تشنج احد درد کی شکایت ہوتی ہے، معمولی ورزش سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مریض لنگڑانے لگتا ہے۔

تصلب شرائین منتشر: یہ کیفیت جوانوں اور ادھیڑ عمر والوں میں کثیراً وقوع ہے، تصلب کی کیفیت جسم میں منتشر طور پر ملتی ہے، پھیڑی شرائین بھی موٹی اور دبیز ہو جاتی ہیں، کلیہ اور قلب کا حجم بڑھ جاتا ہے اور عضلہ قلب میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، کلیہ اور صممامات قلب میں بھی تصلب موجود ہوتا ہے۔

تصلب شرائین پیسی: اس صورت میں بڑی شرائین پھیل جاتی ہیں اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں، ان کی دیواریں پتلی اور سخت ہو جاتی ہیں، پھیڑی شرائین کی دیواریں بھی سخت ہو جاتی ہیں اور طی کی اندرونی دیواریں شقاق پیدا ہو جاتا ہے۔

تصلب شرائین آئینہ: اس میں تصلب اور طی کے قاعدہ سے شروع ہوتا ہے ۱۰ سال کے ساتھ قلب کے لچکدار ریشوں اور اس کے عصبی خلیات میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، آتشکی مولودی کی صورت میں شریانی دیواروں میں نقص پایا جاتا ہے، اور خون کے خوردبینی معائنہ سے آتشکی مواد اور جراثیم پایا جاتا ہے۔

تصلب شریان دیوی: اس صورت میں شریان ریہ کی بڑی شاخوں میں اتساع اور صممامات میں نقص اور موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انور سماوی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں مرض انحرک علامات ملتی ہیں، عسر تنفس اور نفث الدم کی شکایت ہوتی ہے، قلب کی دیواریں پھیل جاتی ہیں اور اس کے حجم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجع القلب کے دورے پڑتے ہیں۔

تصلب شرائین معقد: شریان اور طی کے تصلب کی وجہ سے اس میں ابھار اور گمیاں سی پیدا ہو جاتی ہیں، جوانوں میں یہ صورت متعدی امراض کے بعد شرائین بین الاضلاع میں

کثیر المشاہدہ ہے۔

ذیل میں تصلب شرائین اور تکلس شرائین کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تکلس شرائین	تصلب شرائین
۱۔ شریان کی دیوار میں تکلس ہو جاتا ہے، بالخصوص اندرونی طبقہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔	۱۔ شریان کی دیوار کی لیفی سخت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بالخصوص درمیانی طبقہ زیادہ مآؤف ہوتا ہے۔
۲۔ شریان کی دیوار، مقام مآؤف پر کمزور ہو جاتی ہے۔	۲۔ شریان کی دیوار متاثر مقام پر دبیز اور مضبوط ہو جاتی ہے۔
۳۔ شریان کی دیوار مقام مآؤف پر نرم ہوتی ہے۔	۳۔ شریان کی دیوار مقام مآؤف پر سخت ہوتی ہے۔

اصول علاج | ایک بات ضرور مد نظر رکھیں کہ تصلب شرائین کے بعد ان میں طبعی کیفیات پیدا کر دینا نہایت دشوار گزار عمل ہے، تاہم اسکی صلابت میں قدرے کمی کی جاسکتی ہے اور اسے مزید بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے، چنانچہ اصول علاج اور علاج کے ذیل میں عام طور سے انسدادی تدابیر کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔

_____ ممتلی فشل قلب Congestive Heart Failure کو اعتدال میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے خون کی رسد میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔
_____ غذا میں اعتدال لازم ہے۔

_____ بول و براز کے اخراج میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو دور کرنے کی تدابیر کریں۔
_____ مریض کو سکون جسمانی و ذہنی دونوں فراہم کریں اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تائید کریں۔

_____ روزانہ غسل سے جسم کے مسامات کو تحریک دیں تاکہ پسینہ باقاعدہ خارج ہوتا رہے۔

- اگر ویابیطس ہو تو اس کا سنجیدگی اور پابندی سے علاج کریں۔
- کولسٹرول کم کرنے کی غیر معمولی کوشش مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے۔
- باقاعدگی سے کوئی مناسب ورزش کی ہدایت کریں۔

علاج

- ایسپیڈیپ (ہمدرد) استعمال کرائیں اس سے ۳-۴ ہفتہ میں ہی کولسٹرول لیول ۲۰-۲۵ فیصد نیچے ہو جاتا ہے۔
- فشار دم قوی کی صورت میں قوی جسمانی اجازت دیں تو قصہ کھولیں
- دوا المسک معتدل جواہروالی ۱۰ گرام ہمارا عرق عنبر عرق گلاب ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر کھلائیں۔
- حب جواہر ایک عدد دوا المسک بارد جواہروالی ۱۰ گرام ہمارا خربت مفرح ۱۲ ملی لیٹر کھلائیں۔
- خار خسک، گل منڈی ہر ایک ۵ گرام، شاہترہ ۳ گرام، ریوند چینی نیم کوفتہ ہر ایک ۳ گرام، پانی میں جوش لے کر نوش کرائیں۔

تختہ البم قلبی

CARDIAC THROMBOSIS

اس مرض میں دوران حیات، عروق دموئے قلب میں، خون کی جزییات سے ٹھوس یا نیم ٹھوس لوتھڑے پیدا ہوتے ہیں جو مرض عوارض کا باعث ہوتے ہیں۔

اسباب:

(I) اذین القلب کا تناؤ

۱۔ اس کا دوسرا نام سدقہ قلبی یا قلبی انسداد بھی ہے۔

د II ، تفسیق صمام تاجی
د III ، التهاب بطانة قلب

علامات | علامتوں کا انحصار عام طور سے سدرہ کی نوعیت و وضع پر ہوتا ہے۔ تختہ، خواہ کامل ہو یا نامکمل رجزوی، اس سے نبض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ نبض کی رفتار کا انحصار اذن کی تحریک اور بطن کے انقباض پر ہوتا ہے، چنانچہ اذن کی ہر دوسری تحریک کے بعد بطن میں انقباض کی صورت میں نبض کی رفتار ۳۴ ہوتی ہے، اور ہر تیسری تحریک پر انقباض کی صورت میں نبض کی رفتار ۲۳ ہوتی ہے، اور کامل سدرہ کی صورت میں اذنین کی اپنی رفتار ہوتی ہے اور بطنوں کی اپنی رفتار ۳۰-۴۰ کے درمیان ہوتی ہے۔

صرع نما دورے پڑتے ہیں، مریض پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اذنین اور بطنوں کے انقباض میں کوئی تناسب اور تعلق نہیں ہوتا، رسم النبض و ریوی میں صرع کی رفتار اپنی طبعی رفتار، ۷۰ فی منٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔

اصول علاج

- _____ دافع انجماد خون اور یہ استعمال کرائیں
- _____ تسکین اعصاب کی تدابیر کریں
- _____ جسم کو آفتی حالت میں رکھیں
- _____ عملیہ کریں، کیونکہ یہی علاج زیادہ کارگر ثابت ہوا ہے۔

علاج

_____ تسکین اعصاب کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
نسخہ: مغز بادام شیریں ۵ دانہ، مغز تخم کدوئے شیریں، تخم کاہو، تخم خشخاش، کنجد سفید، ہر ایک ۳۰ گرام، حسب دستور استعمال کرائیں۔ صبح کے وقت مغز خواص

یا مفرح بارد جو اہروالی ۵ گرام کا اضافہ کر لیں
اگر دوائی معالجہ کارگر نہ ہو تو عملیہ بروئے کار لائیں

اینورسما


ANEURYSM

اس مرض میں شریان میں غیر طبعی، محدود وسعت اور تجویف پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں سیال یا منجمد حالت میں خون بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض ۳۰-۵۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے، نیز عورتوں کی نسبت مردوں میں اس کا احتمال تیرہ گنا زیادہ ہوتا ہے تاہم اینورسما جراحی مردوں کی نسبت عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

اینورسما

Aneurysm



۱۔ اس کو آم الدم بھی کہتے ہیں۔

اسباب

(I) اوغیر کی دیواروں کا ضعف

(II) خون کے دباؤ میں اضافہ

(III) شدید جسمانی محنت

(IV) سرد ادیت

(V) تدرن

(VI) بیردنی طبقہ کا جراحی تفریر

(VII) خراش

(VIII) آتشک

(IX) تصلب شریانی

(X) اتھرومانی انزرات

علامات

علامتوں کا انحصار انور سما کے مقام اور حجم پر ہوتا ہے، اور زیادہ تر علامات مقامی دباؤ کے سبب ہوتی ہیں، اور کسی قدر اس کے انشقاق سے بھی ہو جاتی ہیں، سب سے عام علامت درد ہے جو اس پاس کی ساختوں پر دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور طی کی محراب کے قریب ساختوں پر دباؤ پڑنے سے اکثر اوقات ہر کی شکایت ہو جاتی ہے، اور کھانسی بھی آتی ہے۔

ینور سمہائے ضربی: اس میں چوٹ یا زخم کی وجہ سے شریانی دیوار کے تمام لبق تقسیم ہو جاتے ہیں اور ارد گرد کی ساختوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، جس سے موی سلعہ (Haematoma) پیدا ہو جاتا ہے، موی سلعہ کی تکوین کے بعد دعمل کے طور پر خون کے گرد و تہ بلیاں رونما ہونے لگتی ہیں اور جیسی بافت Granulation Tissue کی ایک پرت بن جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اس جوف کے گرد کافی نمایاں دیوار بن جاتی ہے، اور بظاہر اہار ساد کھائی دیتا ہے۔

ینور سمہائے وریدی و شریانی: اس صورت میں اگر شریان اور اس کی قروی

وریدیں ایک ہی وقت میں زخمی ہو جائیں تو خون شریان سے ورید کی طرف بہنے لگتا ہے اور دونوں کے مجاری کے قریب ہونے کی صورت میں ورید کے اندر اتساعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور غروٹی / کرہ نما تھیلی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، دیواریں سخت ہو جاتی ہیں، یہ اتساعی کیفیت ورید کی شاخوں میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے (اینورسما منتشر) اور ورید کے اندر بھی کم و بیش تمام شریانی ممبران محسوس کی جا سکتی ہے۔

اینورسمائے خوددار: اس صورت میں شریانی امراض کی وجہ سے ان کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں اندرونی خون کے دباؤ کو برداشت کرنے کی طاقت مفقود ہو جاتی ہے۔

اینورسمائے مخروطی / حرطومی: اس صورت میں طول میں شریان کی سطح کا سارا محیط پھیل جاتا ہے اور اس کی لمبائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ امراضیاتی نقطہ نظر سے اس کے اندرونی طبق میں نمایاں اتھرومائی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں، طبق سخت کھردرا ہوتا ہے اور اس کی اندرونی سطح پر جاجا کلسی صفحے (Calca eous Plates) دکھائی دیتے ہیں۔ بشرہ مبطنہ (Ednothelium) کے زخمی مقامات پر فائبرین ٹکڑے چپے ہوئے ہوتے ہیں، درمیانی طبقے میں ہزالی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتساعی صورت رونما ہوتی ہے۔ اس ہزالی کی تلافی کے لئے بیرونی پرت لیپی افزائش شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح اس میں دبازت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔

اینورسمائے جیبی: اس صورت میں شریان کا صرف ایک حصہ متاثر ہوتا ہے، آتشک کی وجہ سے شریان کی دیواریں قبل سے ہی کمزور ہو جاتی ہیں، جس کے سبب اس میں خون کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں اندرونی دموی دباؤ کی وجہ سے وہ کمزور حصہ پھیل جاتا ہے اور وہاں ایک ابھار سا بن جاتا ہے، جو تدریج بڑھتے بڑھتے پھٹ جاتا ہے۔

اینورسمائے جراحی: اس صورت میں شریان کے اندرونی طبق کے پھٹ جانے کی وجہ سے خون اندرونی طبق میں کچھ دورائی تک داخل ہو جاتا ہے۔ اینورسما کی یہ نوع اورطی صدمہ اور قوس شریان میں کثیر المشاہدہ اور عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اینورسمائے خلقی: اس صورت میں انشقاق سے ام رقیق کے نیچے نرف ہوتا ہے۔

اینورسما کی یہ نوع دماغی شراین، خاص طور سے قاعدہ دماغ کے متوازی نظام،
(محیط ولی) سے متعلق شریانون میں اور عمر کے پہلے حصے میں
کثیر الوقوع ہے۔

اینورسمائے التیمیانی و سیدی: اس صورت میں بھی مقامی التهاب یا جراثیمی
سرایت کی وجہ سے شراین صغیرہ کی دیواروں میں خون کے دباؤ کے برداشت کی
صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اصول علاج |

- _____ علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں
- _____ امدادی اور معاون علاج کریں

علاج |

- _____ آپریشن (عملیہ) ضروری ہے۔

امراض نظام تنفس

Learn Unani By Abdul Waris Salman

نظام تنفس

RESPIRATORY SYSTEM

بقائے حیات انسان میں تنفس کو کلیدی مقام حاصل ہے، اس نظام کے تحت بخارات و غذائے خون سے خارج ہوتے ہیں اور اجزاء نسیم خون میں شامل ہوتے ہیں۔ تنفس کے اعضاء میں ناک، منہ، حنجروہ، قصبۃ السریہ، عروق خشنہ اور ریہ شمار کئے جاتے ہیں، تاہم یہاں موضوع کی مناسبت سے صرف قصبۃ السریہ، عروق خشنہ اور ریہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

صدر دراصل ایک گاؤ دم جو فہ ہے، اور یہ جسم کے بالائی حصہ پر واقع ہے، اس کے سامنے، دونوں جانب ۶-۶ اضلاع اور ان کے متعلقات، اور عظم القفس ہے، نیسز نیچے فقرات ظہریہ اور ۱۲-۱۲ اضلاع اور ان کے متعلقات ہیں۔

(۱) قصبۃ السریہ (Tra-Chia) : یہ ایک غضروفی نالی ہے جو گردن کے پانچویں مہرے کے مقابل حنجروہ سے شروع ہو کر سیدھے طور پر گردن میں نیچے جاتی ہے اور پشت کے تیسرے مہرے کے سامنے دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

(۲) عروق خشنہ (Bronchioles) : پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک شاخ بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، عروق خشنہ جو ہر ریہ میں دوسری عروق کے ساتھ ایک مخصوص انداز میں بٹن جاتی ہیں اور ان کے درمیان ریہ کا مخصوص گوشت آجاتا ہے۔

عروق خشنہ کے انتہائی سروں میں کثیر مقدار میں ہوا جمع ہوتی ہے، ان ہوائی خانوں اور عروق خشنہ کے ساتھ عروق شعریہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی دیواریں یہاں نہایت باریک ہو جاتی ہیں جس کے سبب وریہ شریانی کی عروق شعریہ سے دغانی مادہ ہوائی خانوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور وہاں سے نیم جذب ہو کر ان عروق کے خون میں شامل ہو کر نظام دوران کے تحت قلب کے بائیں بطن میں پہنچ جاتا ہے۔

(۳) ریہ : یہ دو ہوتے ہیں، ایک سینہ کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف،

اور ہر ریہ فقرات ظہریہ اور قلب کی وجہ سے ہی دائیں، بائیں ہوتا ہے، اس کی تکوین پانچ جوہروں سے ہوتی ہے۔

(I) قصبۃ الریہ کی شاخیں

(II) جرم ریہ

(III) ورید شریانی کی شاخیں

(IV) شریان وریدی کی شاخیں

(V) غشاء الریہ

جرم ریہ، رخو اور متخلخل اسفنجی گوشت کا بنا ہے، چنانچہ یہ بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے، اور اس کو دبلانے پر ہوا کا کچھ حصہ خارج ہونے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ دائیں طرف والا ریوی حصہ تین حصوں میں اور بائیں طرف والا ریوی حصہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان ذیلی حصوں کو فصوص کہتے ہیں، پھر تقسیم در تقسیم کے بعد یہ فصیص کہلاتے ہیں دایاں ریہ: اس کا مقدم کنارہ راس الریہ سے شروع ہو کر زیریں اور سامنے کی طرف جسم کے خط وسطی کی جانب آتا ہے۔ یہ سینہ پر پہلی پسلی سے اور پشت پر ساتویں فقرہ عنق کے زائدہ سے شروع ہوتا ہے، اور عظم القص کے پیچھے دوسری پسلی کے بالمقابل خط وسطی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد سیدھا نیچے کی طرف چھٹی ضلعی غضروف اور اور عظم القص کے مقام اتصال تک پہنچ کر دائیں مڑ جاتا ہے۔ یہیں سے ریہ کا کنارہ اسفل شروع ہوتا ہے۔

کنارہ اسفل، خط بعد القص پر چھٹے ضلع کے بالائی کنارے کے پاس ہوتا ہے، اور خط مدوی پر بھی چھٹے ضلع پر اور خطوط ابلی پر ساتویں اور آٹھویں ضلع کے سامنے اور خط پیردسویں ضلع پر نیز عمود انقرا کے قریب گیارہویں ضلع کے بالمقابل ہوتا ہے، دایاں ریہ: اس کا مقدم کنارہ، راس الریہ سے چوتھی ضلعی غضروف تک، دائیں ریہ کے مقدم کنارے کی طرح چلا جاتا ہے، یہاں سے باہر کی طرف مڑ جاتا ہے، اور قلب کی مقدم سطح کے کچھ حصہ کو چھوڑ کر قوس بناتا ہوا نیچے اور باہر کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں سے کنارہ اسفل کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی بائیں ریہ کے کنارہ اسفل کی طرح تاہم کسی قدر نیچے تک چلا جاتا ہے۔ دونوں ریہ کے زیریں کنارے محراب دار ہیں، اس طرح

گویا ان کی مقعر سطح بطن کی طرف ہوتی ہے۔

عمل تنفس کی تکمیل دو مرحلوں کی تکمیل سے ہوتی ہے۔ پہلے مرحلہ حرکت کو زیر رکھتے ہیں، اس میں ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، دوسرے مرحلہ حرکت کو شہیق کہتے ہیں، اس میں ہوا پھیپھڑوں سے باہر آتی ہے۔ تنفس کا طریقہ یہ ہے کہ سانس لینے میں عضلات صدر وغیرہ کی حرکت کے سبب صدر پھیل جاتا ہے اور اس طرح پھیپھڑوں اور جوف صدر میں ایک طرح کا خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں باہر کی ہوا پھیپھڑوں کے اندر جا کر اتنا ہی پھیلا دیتی ہے کہ وہ صدر کی دیواروں سے جا لگتے ہیں، جب عضلات صدر ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھیپھڑے اپنی لچک کی وجہ سے پھر اپنی اصل حالت پر آ جاتے ہیں اور صدر کی دیواریں، پھیپھڑوں کی دیوار کے ساتھ اتار دے جاتی ہے۔ اس طرح جو ہوا سانس کے ذریعہ اندر گئی تھی، وہ اب قلب کی حرارت سے گرم ہو کر اور عضلات دغانیہ کو لے کر باہر نکل آتی ہے، اسی طرح گویا عمل تنفس پورا ہو جاتا ہے۔

امراض ریہ

Learn Unani By Abdul Waris Salman

ضيق النفس

ASTHMA

اس مرض میں عروق خشنہ کے عضلات میں تشنجی انقباض پیدا ہو جاتا ہے، مریض بار بار سانس لینے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ دوسانسوں کے درمیان کا وقفہ کم ہو جاتا ہے اور زفیری کیفیت زیادہ متاثر ہوتی ہے، نیز خون کی صفائی اور نظام دوران خون کو طبعی امور کی انجام دہی کے لئے جس قدر نسیم (اکسیجن) کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار سانس لے کر پھینچ دے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسباب

- د I، غشاء عروق خشنہ میں ورم دموی
- د II، فقرات کاٹل جانا
- د III، حلق اور صدر کے اعضاء میں صلابت
- د IV، استقائی ورم
- د V، امتلاء معدی
- د VI، ضيق الصدر
- د VII، حجاب عاجز میں کسی طرح کی خرابی واقع ہونا
- د VIII، عصبی خلل
- د IX، عسر تنفس
- د X، لزج و غلیظ بلغم کا اجتماع
- د XI، ضعف حرارت غریزیہ
- د XII، سل و دق کے آخری درجات
- د XIII، بیش حساسیت

Allergy

(xv) تفاعل (الرجی)

(I) تمباکو

(II) گردوغبار

(III) مخصوص پھول

(IV) تخم

(V) چوپایوں اور پرندوں کے بال و پر

(VI) آرائش جمال والی اشیاء (کاسمیٹکس)

(VII) گندم

(VIII) انڈا

(IX) بھینس اور پرند کا گوشت

(X) چاکلیٹ

(XI) بعض مخصوص نوع کی مچھلیاں

(xv) منافع الاعضائی نقص مثلاً

Strain

(I) ذہنی دباؤ

Worries

(II) تفکرات

Anxiety

(III) اضطراب

(xvi) ذات الریہ اور اعصاب کے دگر مجاور اور ام مثلاً

(I) التهاب کبد

(II) التهاب طحال

(xvii) بعض امراض قلب

(xviii) امراض کلیہ

(xix) امراض معدہ و امعاء مثلاً

(I) قبض

(II) فساد معدہ

(III) نفخ

- (xx) بواسیر الانف
 (xxi) نزلہ
 (xxii) سعال مزمن
 (xxiii) عظم لوزتین
 (xxiv) سعال دیکھی / شہیقہ
 (xxv) افتقاق الرحم
 (xxvi) حمل کی گرانی
 (xxvii) انفعالات نفسانی
 (xxviii) جدری / حصبہ
 (xxix) سردی لگنا یا برد و دت کی تدابیر
 (xxx) بعض عفونی کیفیات

علامات | عسرا ببلغ ہوتا ہے، یعنی نکلنے میں دقت ہوتی ہے، زبان سرخ اور مروق دہوی بھول جاتی ہیں، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، سینہ پر نقل اور چھتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ یہ نوبتی مرض ہے، چنانچہ نوبت سے پہلے مریض سردی کی شکایت کرتا ہے، خواہ بنا کی ہوتی ہے، ہضمی فتور ہوتا ہے، اور سفید رنگ کا کثرت پیشاب آتا ہے، ان سب تقدمی علامتوں سے مریض کو دورہ کے وقوع کا احساس ہو جاتا ہے۔ بعض مریض نوبت سے قبل سانس بھولنے کی شکایت کرتے ہیں جس میں دوری / نوبتی خصوصیات بھی شامل ہوتی ہیں، بعض اوقات علامات مندرہ کا ظہور نہیں ہوتا اور یک بیک نوبت شروع ہو جاتی ہے، دورہ عام طور سے رات کے پچھلے حصہ میں ۲-۳ بجے یا صبح کو شروع ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی متعین وقت کے بغیر شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ جس تنفس اور سانس نہایت گھٹ گھٹ کرتا ہے، سینہ پر جکڑن سی محسوس ہوتی ہے، احتباس تنفس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس سے مریض مضطرب ہوتا ہے، اس کا طرز نسبت مخصوص ہوتا ہے، وہ سراور کندھوں کو جھکا کر بیٹھتا ہے، شدت مرض اور تنفس میں نسیم داکسیجن کی کمی کی وجہ سے نظام دوران خون متاثر ہوتا ہے، جس سے مریض گھبرا جاتا ہے،

اور نسیم کے زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی شعوری تدابیر کرتا ہے، چنانچہ کبھی تو سر کو دریچے سے نکال کر نسیم جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کسی چیز کو بچڑھ کر آگے کی طرف جھک جاتا ہے، شہیق مختصر اور زفیہ طویل ہوتا ہے، زفیہ میں وقت ہوتی ہے اور وقت صرف ہوتا ہے، پھمپھمے ہوئے ہول جاتے ہیں، قرع پر نہ نانیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، امتحان بالسمع پر سریلی سرراہٹ سنائی دیتی ہے، اور رطوبت پیدا ہو جانے کی صورت میں سرراہٹ رطب بھی سنائی دیتی ہے۔ مریض سانس لیتے لیتے بڑھال ہو جاتا ہے اور تنفس نرمی Gaspin Inspiration کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کھانسنے اور جسم میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے چہرہ اور بدن نیلگوں یا زرد پڑ جاتا ہے۔

تنفس عظیم اور متواتر ہوتا ہے نیز نبض سریع، عظیم اور یقین چلتی ہے، جسمانی حرارت ۸۳ درجہ تک کم ہو جاتا ہے۔ نوبت عام طور سے ۱۰۔۔۔ ۳ منٹ، ۲۔ ۳ گھنٹہ اور شاید نادر ایک دن پر محیط ہوتی ہے، دورہ ختم ہونے کی صورت میں اولاً کھانسی آتی ہے، اور ذرا سا بلغم خارج ہو کر جسم پسینہ سے تر ہو جاتا ہے، بلغم میں کریات بیضاء اور بعض اوقات غشاء شعب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں، اس کے بعد مرض رفع ہو جاتا ہے، اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے، تاہم لاغری اور ضعف نمایاں ہوتا ہے۔ نوبت کے طویل مدت تک برقرار رہنے کی صورت میں بائیں پسلیوں کے جو عضلات تنفسی حرکت میں حصہ لیتے ہیں ان میں دوتین دن تک درد محسوس ہوتا ہے، مزین صورت میں مریض لاغر اور کمزور دکھائی دیتا ہے، شانے گول اور اوپر کواٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چہرے پر تفکر اور گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں اور آواز بھرائی ہوتی ہے اور وقفہ نوبت ۲۰، ۳۰ دن سے ایک سال تک ہوتا ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اس مرض میں ہوائی نالیوں میں تشنج ہو اور بلغم نہ ہو تو اس کو ضیق النفس یا بس، اور اگر تشنج کے ساتھ، ہوائی نالیوں میں سے بلغم بھی ہو تو اس کو ضیق النفس رطب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔

ضیق النفس کا مطالعہ عسر التنفس کی اس شکل سے ہو سکتا ہے جس میں شہیق و انس لینے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ حالت امراض قلب میں کثیر الوجود ہے، اس لئے ان دونوں حالتوں کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ضيق النفس قلبی

- ۱۔ ۲۰ سال کی عمر سے پہلے شاذ و نادر ہی شروع ہوتا ہے۔
- ۲۔ مرضی علامات دیرینہ نہیں ہوتیں بلکہ صرف ۲ سال قبل کی سرگزشت ملتی ہے اور یہ اس مرض کی تشخیص میں بہت معاون ہے، کیونکہ ۴۰-۵۰ سال کی شکایت، ضيق النفس قلبی نہیں ہو سکتی۔
- ۳۔ تنفس کے ساتھ سینہ میں سے آواز سنائی دینا لازمی نہیں، اس کے بغیر بھی سانس اکھڑا ہوا، ریہ کے قاعدہ پر تر بل ہوتا ہے، خاص طور سے ان چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جو سکڑ گئی ہوں۔
- ۴۔ سانس لینے اور خارج کرنے، شہیق و خفیر دونوں میں تکلیف ہوتی ہے۔
- ۵۔ خریر رطب زخیری، پیمپڑوں کے قاعدہ پر سنی جاتی ہے، اگر ضيق النفس کے انتفاخ الریہ بھی ہو تو خریر یا بس (خشک سرراہٹ کے ساتھ)
- ۶۔ قلب کے ماؤف ہونے کی علامات نمایاں ہوتی ہیں، مثلاً دباؤ بڑھنا، عظم القلب اور مقام ریوی پر صوت ثانی کا زیادہ بلند ہونا۔

ضيق النفس شعبی

- ۱۔ مرض عام طور سے ۲۵ سال کی عمر سے قبل شروع ہوتا ہے۔
- ۲۔ تنفسی امراض کی دیرینہ شکایت ہوتی ہے مثلاً سعال، خاص طور سے سردیوں میں۔
- ۳۔ تنفس کے ساتھ سینہ میں آوازیں آتی ہیں۔
- ۴۔ سانس چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔
- ۵۔ سرراہٹ عام طور سے شہیق اور دونوں پیمپڑوں کے تقریباً تمام حصہ میں سنی جاتی ہے، سامنے کی طرف خاص طور سے واضح اور نمایاں ہوتی ہے، قاعدہ ریہ پر خریر رطب سنائی نہیں دیتی
- ۶۔ عام طور سے قلب کی کوئی مرضی علامت نہیں پائی جاتی

- ۷۔ مرض کا انجام عام طور سے اچھا ہوتا ہے اور مریض مدتوں زندہ رہ کر دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا رہتا ہے۔
 - ۸۔ ایڈریالین سے بہت جلد اور نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔
 - ۷۔ مرض کا انجام عام طور سے خراب ہوتا ہے اور مریض تین سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ پاتا۔
 - ۸۔ مارفیا اور اٹروپین سے نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

ضيق النفس

- | | |
|--|---|
| ۱۔ آوازیں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ | ۱۔ آوازیں نمایاں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ |
| ۲۔ کھانسی کے ساتھ بلغم خارج ہوتا ہے خواہ کسی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ | ۲۔ کھانسی خشک آتی ہے |
| ۳۔ سانس خارج کرتے وقت تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ | ۳۔ سانس لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ |
| ۴۔ سینہ میں سرسراہٹ محاطی ہوتی ہے۔ | ۴۔ سرسراہٹ معدوم ہوتی ہے۔ |
| ۵۔ خنجرہ پر علامات سماعتی معدوم ہوتی ہیں۔ | ۵۔ خنجرہ پر علامات سماعتی موجود ہوتی ہیں۔ |

اصول علاج

۔۔۔۔۔ حسب ضرورت تنقیہ کی تدابیر اختیار کریں، اس سلسلے میں زیادہ گرم اور یہ کے استعمال سے احتراز لازمی ہے، نیز انفیون، میبروج، تخم فلک سیرادر اسپنول وغیرہ نسخہ جات میں شامل نہ کریں۔

۔۔۔۔۔ ریہ یا شرابین میں مادہ مرض ہو تو باسلیق کی قصد کھولیں۔

علاج

..... ابتدا میں ذراوند مدحرج ۵۲ گرام کوٹ چکان کر میٹھی ۳۲ گرام

ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ دورہ کے وقت بہدانہ ۳ گرام، سپستان ۹ دانہ، عناب ۵ دانہ، نبات سفید ۳۶ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر، گھونٹ گھونٹ نوش کرائیں۔ اس بابت برگ کتاں کو پانی میں جوش دے کر شکر سے شیریں کر کے نوش کرانا بھی سودمند ہے۔

۔۔۔۔۔ اگر بلغم کا اخراج بآسانی نہ ہو رہا ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
نسخہ: گاوزبان، گل گاوزبان، سبوس گندم، ہر ایک ۵ گرام، ابریشم خام مقشر ۳ گرام، عناب ۵ دانہ، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور شہد خالص ۲ گرام ملا کر دونوں وقت نوش کرائیں۔ اور درج ذیل لعوق چند بار چلائیں۔
نسخہ لعوق: مغز بادام شیریں ۵ دانہ، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم تربوز کثیر، صمغ عربی، ہر ایک ۳ گرام، نبات سفید ۲ گرام، جملہ دواؤں کا حسب دستور لعوق تیار کریں اور استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے

بیج بادیان، اصل السوس مقشر، اسطوخودوس، گاوزبان، زوفاشک، پر سیاوشاں، ہر ایک ۵ گرام، انجیر زرد ۳ عدد، جملہ دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۲ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
۔۔۔۔۔ تخم کتاں ۲ گرام، زوفائے خشک ۵ گرام، شہد خالص ۳۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر چھان کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ اگر شدید تنگی تنفس ہو تو گرم، ابلتے پانی میں گوگل ۳ گرام ڈال کر اس کے بخارات کو سانس کے ذریعہ اندر کھینچیں۔

۔۔۔۔۔ تلین کے لئے درج ذیل نسخہ بھی مجرب ہے، اس سے حلق سے رطوبت

بآسانی خارج ہوتی ہے۔

نسخہ: خردل ۵۰ گرام، نمک طعام، عصارہ قشادہ الحمار، ہر ایک ۵۰ گرام، جملہ دواؤں کو حسب ضرورت کوٹ، گوندھ کر ۸ اقراص بنائیں اور ایک دن کے فائدہ سے ایک قرص ہمراہ ماء العسل، نوش کرائیں۔

- _____ سکینج ۳۰۔ ۳۰ گرام، عروق سداب میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- _____ پیاز دشتی مشوی، پیس کر، شہد ملا کر کھلائیں
- _____ شگجبین غصلی یا سکجبین بزروری استعمال کرائیں
- _____ غار یقون، ۱۰ گرام، تربد ۷، ۱۰ گرام، ایا راج فیکرا ۳۰ گرام، اصل السوس، شحم حنظل، ۱۰ انزروت، مرکی، ہر ایک ۵، ۳۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر میفختج میں جلوب بنائیں اور ۷۔ ۵۔ ۱۰ گرام کھلائیں۔
- _____ جاؤ شیر ۷، ۱۰ گرام، عرق بادیان میں حل کریں اور شحم حنظل ۷، ۱۰ گرام ملا کر گولیاں بنائیں اور ہمراہ ماء العسل کھلائیں
- _____ اشق ۷، ۱۰ گرام، عرق بادیان میں حل کریں اور جند بیدتر ۷، ۱۰ گرام، اضافہ کر کے ہمراہ ماء العسل نوش کرائیں
- _____ درج ذیل نسخہ لعوق بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔
- نسخہ لعوق: شحم حرمل، کنجد مقشر، ہر ایک ۱۰۰ گرام، زوفا خشک ۱۰۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ کر شہد میں ملا کر چائے کے چیم کے برابر روزانہ چٹائیں۔
- _____ جعد، شیخ ارمنی، کما فیطوس، جند بیدتر، زوفا خشک، کندر، ہر ایک ۵، ۳۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد میں گوندھیں اور اس کی دودھور اک بنا کر استعمال کرائیں۔
- _____ جند بیدتر، زرداند مدحرج، راتیانج، ہر ایک ۵، ۳۰ گرام، فلفل سفید، عصارہ قثار، الحمار ہر ایک ۵، ۲۰ گرام، ۵۔ ۱۰ گرام کے بقدر، ہمراہ ماء العسل نوش کرائیں۔
- _____ بورۃ ارمنی ۳۰ گرام، انجدان، اشق، فلفل سفید، ہر ایک ۷، ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ کر میفختج میں گوندھیں اور بقدر باقلا، ہمراہ ماء العسل کھلائیں۔
- _____ زوفا، اصل السوس، بودینہ، خردل، فلفل سیاہ، زیرہ سیاہ، ہوزن کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد میں ملا کر معجون بنائیں اور ۳۰ گرام کھلائیں۔
- _____ ریوند چینی، بیش اسود، صمغ عربی، ہر ایک ۳۰ گرام، زنجبیل ۶، ۳۰ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی، صبح، شام کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ اصل السوس مقشر خوب باریک پیس کر عرق پان دیسی میں کھل کر کے
تھہر بیری کے بقدر گولیاں بنائیں اور بوقت خواب ایک گولی کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ قوتیاسبز، بلادڑ، برادہ شاخ گوزن، ہر ایک ۳۴ گرام، جملہ دواؤں کو
شیر بوز ۳ لیٹر میں اس قدر جوش دیں کہ دودھ خشک ہو جائے، اب اس کو ایک کوری
مانڈی میں گل حکمت کر کے، اسیرا بلوں کی آنچ دیں، سرد ہونے پر دو اکو اچھی طرح
پیس کر، کپڑے سے چھان کر محفوظ کر لیں اور ۱۲۵ ملی گرام کھلائیں

۔۔۔۔۔ مغز چلغوزہ، کتیرا، جمع عربی، تخم کتاں بریاں، ایرسا، ہموزن کو کوٹ کر
تین گنا شہد خالص میں معجون بنائیں اور ۱۲ گرام کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ برگ گاؤزبان، کوئیہ ابریشم ہر ایک ۳ گرام، گل گاؤزبان، زرد فاشک،
ہر ایک ۳ گرام، اصل السوس مقشر ۵ گرام، مویز بنقی ۹ دانہ، صبوس گندم ۹ گرام، جملہ
دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر شربت زوفا، شہد خالص، نبات سفید، ہر ایک
۲۳ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ بیوست کی صورت میں لعوق ندری آب تر بوز والا ۷ گرام کھلا کر پہلے
۳ گرام، سپستان ۹ دانہ، عناب ۵ دانہ، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر
مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۲ گرام، ملا کر شیرہ تخم کا ہو، شیرہ مغز کدو، ہر ایک ۲ گرام
اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ تخم حلبہ پانی میں بھگو کر مقشر کر لیں اور شیرہ نکال لیں، پھر شہد ملا کر
توام بنائیں، آخر میں مغز چلغوزہ ۴ گرام ملا کر لعوق تیار کریں اور ۱۲ گرام کے
بقدر کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ فلفل سیاہ، فلفل دراز، ہیل خورد، شیطانج، دارچینی، قزقل، عاقرقھا،
زنجبیل ہر ایک ایک گرام، ہندل سرخ ۸ گرام، جملہ دواؤں کا سفوف بنائیں اور ۲۵۰
ملی گرام استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ سینہ اور پسلیوں کی کسی کھر کھرے کپڑے سے مالش کریں۔

۔۔۔۔۔ سمندر جھاگ اور نظرون پیس کر سینہ کی مالش کریں۔

۔۔۔۔۔ روغن تخم کتاں ۲۳ ملی لیٹر، موم سفید ۱۲ گرام، عجمی کے گدہ کی

چربی ۱۲ گرام، جملہ دواؤں کو ملا کر قیروطی بنا کر سینہ پر مالش کریں۔

۔۔۔۔۔ روغن گل سینہ پر ملیں۔


۔۔۔۔۔ تاج، زعفران، مرکی، قسط شیریں، ہر ایک ایک گرام، جملہ دواؤں کو باہر ایک پیس کر شراب یا پانی میں ملا کر ۱۰ گرام کی اقراص بنائیں، اور نہار منہ ایک قرص حقہ کی حلیم میں رکھ کر اس کا دھواں کھینچنے کی بہایت کریں۔

ذات الریه

PNEUMONIA

اس مرض میں ریہ کی ساختوں، باریک گزر گاہوں اور ان کے سروں پر حویفات میں التهابی تغیرات رونما ہوتے ہیں، جو عام طور سے سراپت کے سبب، یا سراپت کے ساتھ مشترک ہوتے ہیں اور پھیپھڑے میں کسی قدر صلابت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

اقسام



۱۔ یہ تقسیم کثیرالوقوعی حیثیت سے کی گئی ہے۔

اسباب

خلطی تعفن

(I) دموی

(II) صفراوی

(III) بلغمی

قحطی (ویروسی) جراثیمی

Psittacosis-Ornithosis Groups

(I) سائینوکوسس - آرئی تھوسس گروپ

Respiratory Syncytial Virus

(II) ریسیپائیتری سائی نیشنل وائرس

Cytomegalic Virus

(III) سائینو میگلیک وائرس

Adenovirus

(IV) غنقودی قشیت

(V) انف العنزہ

(VI) جدری

(VII) حصہ

(VIII) جدیری

(IX) نملہ منطقی

Herpes Zoster

Mycoplasma Pneumoniae

(X) فطری مصلی نمونیا

Pneumococcus

(XI) نبقہ نمونیا

Staphylo Pyogenes

(XII) غبی عفونت

Streptococcus

(XIII) نبقہ سبجیہ

Microbacterium Tuberculi

(XIV) خور و جراثیم تدرنی

Haemophilus Influenze

(XV) ہیمو فیلس انف العنزہ

E Coli

(XVI) ای - قولی

Klebsiella

(XVII) کلیبسلا

(xviii) درجہ ذیل امراض کے ساتھ

	(I) شہیقہ
BURCELLLOSIS	(II) بروسیلیت
	(III) جمی تیفودیہ
	(IV) طاعون
Anthrax	(V) جمرہ
Tularemia	(VI) ٹیولاریمیا
Leptospirosis	(VII) دار البریسیات
	طفیلی/قبٹی/خیروسی:
	درجہ ذیل امراض کے ساتھ
Actinomycosis	(I) شعاعی نظریت
Aspergillosis	(II) دار المرشاشیات
Nocardiasis	(III) نوکاردیت
Histoplasmosis	(IV) نیسی مصلیت

اسباب معدہ:

- (I) موسم سرما و موسم بہار
- (II) شہری بود و باش
- (III) سردی لگنا
- (IV) ضعف جسمانی
- (V) جمی قرمز
- (VI) محنت و مشقت
- (VII) کثرت مے نوشی
- (VIII) آپریشن کے بعد
- (IX) صدمہ
- (X) جمی وجع المفاصل

(x) زہریلی ہوائیں اور دھواں

(xi) مٹی کا تیل

(xii) پیرافن

(xiii) پٹرول

(xiv) خناقِ دبائی

(xv) نفاثی آلودگی

علامات |

(ا) حاد :-

ذات الریہ، فحسی : اس میں تمام ریہ یا اس کا کوئی بڑا قص (لو تھڑا) متاثر ہوتا ہے، اس کے تین درجات کی نشاندہی کی گئی ہے۔

(I) احتلاقی : معائنہ میں ریہ میں امتلاء خون ہوتا ہے، اس کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں کسی قدر پچچا ہٹ ہوتی ہے، انگلی گڑونے سے ریہ کی سطح پر نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر پانی میں ڈالا جائے تو نسبتاً ٹھوس ہو جانے کی وجہ سے پانی میں ریہ کا کچھ حصہ تیرتا رہتا ہے اور کچھ ڈوب جاتا ہے، ترانے پر بہت سا جھاگ دار خون نکلتا ہے، عروقِ شعریہ، خون سے بھری ہوتی ہیں، اور ان کی دیواروں سے زرد آب مترشح ہو کر ہوائی خانوں میں جمع ہو جاتا ہے، ہوائی کیسوں کی دیواریں ملتہب نظر آتی ہیں، ریہ کی ساخت میں لچک کی بجائے بھر بھرا ہٹ ہوتی ہے۔

(II) تکبید احمرادی : پھیپھڑے میں صلابت اور بھاری پن آ جاتا ہے، ساخت نرم پڑ جاتی ہے اور امتلاقی کیفیت کے برخلاف دبلنے سے پچچا ہٹ کی آواز آنے کی بجائے صلابت کا احساس ہوتا ہے، پانی میں ڈالنے سے پھیپھڑہ ڈوب جاتا ہے، رنگت کبد کی مانند ہو جاتی ہے، ترانے پر سخت اور ٹھوس چیز کی مانند کٹتا ہے، تنگاف دے کر دیکھنے میں ہوائی کیسوں میں رطوبت لفاویہ کے جمع ہو کر انجمادی صورت اختیار کر لینے کا پتہ چلتا ہے۔ لسانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

(III) تکبید اضمرا دی : پھیپھڑے کی رنگت خاکستری (اغبرادی) ہو جاتی ہے اور وہ گل جاتا ہے، ترانے پر بھورے رنگ کی ماہیت خارج ہوتی ہے۔ ذات الریہ فحسی

کی یہ صورت ہلاکت کی علامت ہے۔

ذات السریہ فی کی اس صورت میں درجہ ذیل پانچ حالات پیش آسکتے ہیں۔

(I) کامل شغایابی بدریہ تحلیل مادہ

(II) غشاء السریہ اور ریہ کا مزمن التصاق

(III) ذات السریہ تلیفی

(IV) تقيج غشاء السریہ

(V) تکبد اشہب کے بعد تقيج / غانفرانا

ابتداء مرض سے دو ایک دن قبل عام ضعف، گرائی اور کرب واضطراب ہوتا ہے، پھر لمزہ سے بخار چڑھتا ہے، ساتھ میں شدید ضعف، صداع، ہدیائ، کرب، متلی، تے اور غنودگی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سینہ میں درد محسوس ہوتا ہے، خشک کھانسی آتی ہے مگر درد کے اندیشہ کی وجہ سے سر پھین کھانسی روکنے کی مقدور بھر کوشش کرتا ہے تاہم بعض اوقات ایسی شدید کھانسی اٹھتی ہے کہ اس کا روک پانا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنے کی حالت میں کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں کھانسی کے ساتھ غلیظ، لیس دار سرفی مائل خاکستری بلغم خارج ہونے لگتا ہے، ہلاکت کے قرب کی صورت میں لیس دار بلغم کا اخراج بند ہو جاتا ہے بلکہ رفیق، بھورا اور سرفی مائل ہو جاتا ہے، تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، رخسارے سرخ ہو جاتے ہیں، اور متورم جانب کے پھیپھڑے کی طرف کے رخسارے میں سرفی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، زبان میلی ہو جاتی ہے اور کانٹے پڑ جاتے ہیں، جلد خشک اور گرم محسوس ہوتی ہے، نبض فی منٹ ۹۰-۱۲۰ چلتی ہے اور تنفس فی منٹ ۳۰-۳۴ اور بعض اوقات ۴۰-۸۰ ہو جاتا ہے، بخار ۱۰۲-۱۰۵ آہوتا ہے، نبض شروع میں قوی اور ممتلی چلتی ہے، آخر میں ضعیف اور بلی چلتی ہے، انتہائی مرحلے میں چہرہ پھیکا اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، جسم سرد پڑ جاتا ہے اور پسینہ سے تر ہوتا ہے۔ آخر میں ضعف شدید کی وجہ سے غشی عارض ہو جاتی ہے اور مرلیض ہلاک ہو جاتا ہے، شغایابی کی صورت میں علامات میں خفت پیدا ہو جاتی ہے اور ۵-۸ دن میں بحران کے ساتھ بخار اتر جاتا ہے۔

ذات الریہ فصیمی: اس میں دونوں ریہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے

نصیحات (جو عروق خشنہ اور خلیات ہوائیہ سے مرکب ہوتے ہیں) میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔

اس میں امراضیاتی نقطہ نظر سے مآؤف عروق خشنہ اور خلیات ہوائیہ (ہوائی کیسے) ملکہب ہو کر بلغمی رطوبت سے بھر جاتے ہیں، ان کی دیواروں کے اندر اور ملی ہوئی ساختوں میں دقیق کریات بیضہ مترشح ہونے لگتے ہیں، ٹھوس حصہ کی دیواروں میں اجتماع خون ہو جاتا ہے، ہوائی کیسوں کا بشرہ باطنہ متورم ہو جاتا ہے اور اس میں کریات، بُشری کریات بیضہ، اور بلغمی / بلغمی قہجی رطوبت جمع ہو جاتی ہیں، اور بہت سے نصیصے، عروق خشنہ اور خلیات ہوائیہ کے بند ہو جانے سے سکڑ کر پچک جاتے ہیں اور ان میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے میں اگر ان کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتے ہیں، ٹھوس رقبہ کاٹ کر دیکھنے میں مخروطی شکل کا نظر آتا ہے، جس کا قاعدہ غشلہ لریہ کی جانب ہوتا ہے، رنگت میں سرخ اور اس کے کنارے بے قاعدہ ہوتے ہیں۔

متاثرہ ریہ کی بیرونی سطح پر اوڑے رنگ کے کثیر الاطراف رقبات کثرت سے نظر آتے ہیں، ان رقبوں کے ارد گرد ہوائی کیسے نظر آتے ہیں، اس متاثرہ حصہ کو دبانے سے پبلے اور پیپ خارج ہوتی ہے، قہجی درجہ میں ریہ کا رنگ سلٹی مائل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نرم ہو کر خراج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خورد بینی امتحان میں متاثرہ حصہ کے ہوائی کیسوں میں کریات بیضہ واحدۃ النواۃ کثرت نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں کریات حررا اور لیفی ریشے بھی دکھائی دیتے ہیں۔

سستی اور عام ضعف محسوس ہوتا ہے، پسینہ کثرت خارج ہوتا ہے، بخار ۱۰۱-۱۰۵ آ۔ تک اور بے قاعدہ طور پر کم و بیش ہوتا رہتا ہے، نبض ضعیف، سریع اور غیر منظم چلتی ہے، تنفس جلد جلد ہوتا ہے، کھانسی دشواری کے ساتھ آتی ہے، بلغم کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے اور اس میں سرنجی بھی نہیں ہوتی، ضعف کی زیادتی کی وجہ سے چہرہ پھیکا اور تیللا پڑ جاتا ہے، بدن کے عضلات تحلیل ہو جاتے ہیں۔

ذات الریہ جزوی: اس میں ریہ جزوی طور پر متاثر ہوتا ہے اور اس کی علامات نصیصی و نصی سے مشابہہ ہوتی ہیں، تاہم اس میں انجام بالعموم بخیر ہوتا ہے۔
(ب) مزمن: اس صورت میں پیمپڑوں میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ

سیاہ ہو جاتا ہے۔ تراشنے پر قاش کی سطح پر سفید رنگ کے ریشے پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں کہیں جوف/غار بھی دکھائی دیتے ہیں، مردق خشنہ پھیلی ہوئی اور غشاء المریہ دبیز دکھائی دیتی ہے۔

ابتداء میں کوئی مرضی علامت ظاہر نہیں ہوتی تاہم متاثر جانب کی پسلی میں درد اور تناؤ ہوتا ہے، ہجانی کھانسی آتی ہے جس میں بدقت بلغم خارج ہوتا ہے، تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے، رات میں بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، خون پھیکا پڑ جاتا ہے، اکثر اوقات بخار بھی مفقود ہوتا ہے۔

سید اسمعیل جرمانی کے بقول، التهاب ریہ (ذات المریہ) کا مواد عام طور سے تحلیل ہو کر دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور کبھی اس میں سفیدی، ہمواری اور غٹگی آجاتی ہے، اور کبھی شراب کی مانند یا پانی جیسا ہو جاتا ہے۔ بہر حال اگر یہ مواد حجاب اور غشاء المریہ میں اتر جائے تو ذات الجنب کا باعث ہو سکتا ہے اور قلب کی طرف مائل ہونے کی صورت میں خفقان اور غشی لاحق ہو سکتی ہے اور سر کی طرف آنے میں سرسام ہو سکتا ہے۔

ذیل میں ذات المریہ اور اس کی علامات سے اشتباہ رکھنے والے امراض کی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ذات المریہ	ذات الجنب
۱۔ واضح تشعیر درد سے مرض کا آغاز ہوتا ہے۔	۱۔ ابتداء میں معمولی سردی کا احساس ہوتا ہے۔
۲۔ چہرے پر تہمتا ہٹ اور سرخی ہوتی ہے، اور متاثر ریہ کی جانب کے رخسارے میں سرخی زیادہ ہوتی ہے۔	۲۔ چہرہ زرد اور متوحش ہوتا ہے۔
۳۔ حرارت بدنی ۱۰۳-۱۰۶ تک ہوتی ہے،	۳۔ حرارت بدنی ۱۰۰-۱۰۲ تک ہوتی ہے۔
۴۔ تنفس جلد جلد اور ہانپنے کی طرح ہوتا ہے۔	۴۔ تنفس نسبتاً کم جلد اور رکا ہوا ہوتا ہے۔

۵. تنفس کے آخر میں سر سراہٹ ہوتی ہے۔ ۵. تنفس کے آخر میں سر سراہٹ نہیں ہوتی۔
 ۶. صوت تنفسی و تکلمی و خفیف صوتی بڑھی ۶. کم ہوتی ہے۔
 ہوتی ہوتی ہے۔
 ۷. بلغم زنگ آلود یا مخصوص طرح کا خارج ۷. بلغم قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے۔
 ہوتا ہے۔
 ۸. بالقرع ٹھوس آواز آتی ہے۔ ۸. بالقرع ٹھوس آواز آتی ہے، لیکن وضع
 تبدیل کر دینے سے آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔
 ۹. قلب طبعی مقام پر ہوتا ہے۔ ۹. قلب کی وضع میں معمولی تبدیلی ہوتی ہے،

تفریقی علامات

- | ذات الریہ | ذات الریہ شمعی |
|---|--|
| ۱. مرض کا آغاز دفعتاً اور تشعیر ہرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ | ۱. آغاز رفتہ رفتہ اور رسال کے ساتھ ہوتا ہے۔ |
| ۲. پہلو میں کسی قدر درد ہوتا ہے۔ | ۲. عظم القص کے پیچھے جھڑن کا احساس ہوتا ہے۔ |
| ۳. حمی دائمہ ہوتا ہے۔ | ۳. حمی مفترہ ہوتا ہے۔ |
| ۴. عام طور سے ایک ہی ریہ متاثر ہوتا ہے۔ | ۴. دونوں ریہ متاثر ہوتے ہیں۔ |
| ۵. ٹھوس آواز ایک جانب، اور بہت نمایاں ہوتی ہے۔ | ۵. ٹھوس آواز دونوں جانب، مگر بہت دھیمی ہوتی ہے۔ |
| ۶. بلغم زنگ آلود یا سابق میں مذکور تفصیلی علامات کے ذیل میں کی طرح ہوتا ہے۔ | ۶. بلغم جھاگ دار اور خون و بیپ کی آمیزش ہوتی ہے۔ |
| ۷. بحران ساتویں دن ہوتا ہے۔ | ۷. ایام بحران نہیں ہوتے۔ |
| ۸. ادھیڑ لوگوں اور بچوں میں کثیر القوع ہے۔ | ۸. عام طور سے بچوں میں کثیر القوع ہے۔ |

تفریقی علامات

ذات الریه	سمل بشدید
۱۔ مرض کا آغاز قشعریرہ اور درد پہلو سے ہوتا ہے۔	۱۔ مرض کی ابتداء التهاب شعبی سے اور سردی کا احساس ہوتا ہے۔
۲۔ عام طور سے ایک ہی پھیپھڑہ متاثر ہوتا ہے۔	۲۔ دونوں پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔
۳۔ چہرے پر شہماٹ اور سرخی ہوتی ہے اور متاثر جانب کا رخسار نسبتاً زیادہ سرخ ہوتا ہے۔	۳۔ چہرہ مدقوق جیسا دکھائی دیتا ہے۔
۴۔ بلغم میں جراثیم / قثب ذات الریه موجود ہوتے ہیں۔	۴۔ بلغم میں دق جراثیم موجود ہوتے ہیں۔
۵۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں قدرے وقفہ بھی ہوتا ہے۔	۵۔ حرارت لازم اور غیر منظم ہوتی ہے۔
۶۔ امتحانی علامات عام طور سے ایک جانب ہوتی ہیں۔	۶۔ امتحانی علامات دونوں جانب ہوتی ہیں۔
۷۔ تنفس سریع۔ ہانپنے سے مشابہہ ہوتا ہے۔	۷۔ تنفس جلد جلد، ہانپنے کے برخلاف ہوتا ہے۔
۸۔ بحران ہوتا ہے اور اس سے قبل پسینہ زیادہ خارج نہیں ہوتا۔	۸۔ بحران نہیں ہوتا اور رات میں بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

ذات الریه جرثومی	ذات الریه قثبی / قیسوسی
۱۔ نبض سریع چلتی ہے اور سرعت کا انحصار جمی پر ہوتا ہے۔	۱۔ نبض بطی چلتی ہے۔

۲۔ غلاف السریہ میں انصبابی کیفیت نہیں ہوتی،	۲۔ غلاف السریہ میں انصبابی کیفیت ہوتی ہے،
۳۔ ۱۵۰۰۰ — ۱۲۰۰۰ تک ہوتا ہے	۳۔ شمار بیاض الدم د طبعی ہوتا ہے

اصول علاج

- _____ غلبہ خون کی صورت میں ابتدائی تین دن کے اندر فصد کھولیں، تلین کریں اور اس کے بعد سینہ پر شنگیاں کھینچوائیں۔
- _____ تنقیہ کے بعد روادام کا ضماد کریں
- _____ محلات استعمال کرائیں مہل کی بجائے فصد پر اتفا کریں
- _____ تسکین حرارت کے لئے مضمفی اور مرطب دوائیں منتخب کریں
- _____ قبض ہو تو اس کے رفع کرنے کی تدابیر کریں

علاج

- _____ مرض کا سبب اگر غلبہ خون ہو تو مواد کے مقام اور وضع کی تعیین کرتے ہوئے اس کی مخالف جانب فصد کھولیں، مقام کا تعیین رخسار کی سرخی، سینہ کی گرانی اور اس پہلو پر لیٹنے سے کیا جاسکتا ہے، چنانچہ پہلے صافن کی فصد کھولیں، اس کے بعد بائلیتی کی، اور اگر ضعف کا اندیشہ نہ ہو تو ہفت اندام اور سرارو کی بھی فصد کھولیں، نزلہ کی صورت میں سرارو کی فصد ہی مفید ہے۔

_____ مقام سینہ پر شنگیاں کھینچیں۔

_____ گل نیلوفر ۵ گرام، عناب ۵ عدد، سپستان ۲۰ عدد، جملہ دواؤں

کو جوش دے کر نبات سفید ملا کر نوش کرائیں۔

_____ تلین کے لئے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ: عنب، نیلوفر سپستان، تخم خطمی، بنفشہ، جملہ دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر مغز فلوس خیار شنبز، تربجین حسب ضرورت کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
 _____ آتش جویں عنب، سپستان، اصل السوس جوش دے کر استعمال کرائیں

اور تین گھنٹہ بعد شربت بنفشہ ۵۵ ملی لیٹر ہمراہ آب سرد نوش کرائیں۔

_____ جوشاندہ کا درج ذیل نسخہ بھی کارآمد ہے۔

نسخہ: پر سیاؤ شاں ۱۴ گرام، تخم خطمی، خبازی، بنفشہ ریحانی ہر ایک

۵۰ گرام، آرد جو مقشر نیکوب ۷۰ گرام، عنب ۲۰ عدد، سپستان ۲۰ عدد، دانہ موہر

۷۰ گرام، انجیر سفید ۱۵ عدد۔ جملہ دواؤں کو ۲۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب تہائی

حصہ پانی رہ جائے تو اتار کر مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۵۰ گرام، کسی قدر روغن بادام

شیریں کا اضافہ کر کے ۱۴۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

_____ تلین کے لئے درج ذیل نسخہ بھی مستعمل ہے۔

نسخہ: مغز فلوس خیار شنبز، موہر منقی ہر ایک ۶۰ گرام۔ جملہ دواؤں کو ڈیڑھ لیٹر

پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو طر ق مکور ۲۰۰ ملی لیٹر ملا کر مرہض کی حسب

قوت ایک یا دو مرتبہ میں نوش کرائیں۔

_____ درج ذیل قرص اعلیٰ درجہ کا منضج تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ: قرص منضج: تخم خطمی، تخم خبازی، تخم خیارین، تخم خرپڑہ، تخم کدو،

رب السوس، شگوفہ اواخر بنفشہ، اکلیل الملک، کتیرا، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب

تخم کتان میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور شربت انجیر حسب ضرورت کے ساتھ استعمال

کرائیں۔

_____ درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے

نسخہ: مغز چلغوزہ ۳۶ گرام، کتیرا، تخم خیار تلخ، نشاستہ رب السوس، تخم خطمی،

ہر ایک ۵۰ گرام، حلبہ مغسول، تخم کتان منقوی، ہنسراج، گوند بول، مغز بادام شیریں،

مغز بنہ دانہ، ہر ایک ۵۰ گرام، بادیاں ۷۰ گرام، تمر ۲۰ عدد، شہد ۲۰ گرام، روغن

گاؤ ۹۰ ملی لیٹر، تمر (خرما) کو شہد اور روغن گاؤ میں اس قدر پکائیں کہ نرم ہو جائے

اس کے بعد جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر اس میں گوندھیں اور حسب بنا کر استعمال کرائیں۔

..... اگر قبض ہو تو رفع کریں اس مقصد کے لئے لعوق سپستان خیارشنبری
۱۲ گرام، عرق گاؤز بان ۱۳۴ ملی لیٹر کے ہمراہ کھلائیں، اس کے بعد درج ذیل نسخہ
استعمال کرائیں۔

نسخہ: بہدانہ ۳ گرام، سپستان ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر
چھان لیں اور شربت بنفشہ ۳۴ ملی لیٹر ملا کر خاکی ۵ گرام چھڑک کر دن میں چند بار
تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔ عوارض میں شدت کی صورت میں اس نسخہ میں تخم عطمی،
گاؤز بان، ہر ایک ۷ گرام، شیرہ تخم کاہو، نقشہ مغز تخم کدو، شیریں، ہر ایک ۳ گرام کا
اضافہ کریں۔ کھانسی کی صورت میں اسی نسخہ میں لعوق سپستان یا لعوق معطل ۱۲ گرام
کو عرق گاؤز بان ۱۳۴ ملی لیٹر میں جوش دے کر نیم گرم تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔
..... درج ذیل نسخہ بھی مفید و مجرب ہیں۔

قرن الایل ۷ گرام، فلفل سیاہ ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں پیس کر نیم گرم
ضماد کریں۔

..... موم، روغن گل، دونوں کو آگ پر رکھ کر پگھلائیں اور نیم گرم مالش کریں۔
..... لو بان ایک گرام، موم سفید ۱۲ گرام کو پگھلا کر مالش کریں۔
..... موم سفید اور روغن بنفشہ کا طلاء کریں، بعد میں اسی میں تخم بٹ اور
لعاب خطمی کا اضافہ کریں، اور پھر رفتہ رفتہ بابونہ، بیج خطمی، بیج سوسن، بنفشہ اور خبازی
کا اضافہ کریں۔

..... ملوہ کے خام اور غلیظ ہونے کی صورت میں کرب اور بادیان کا ضماد کھوائیں۔

..... صندل سفید، آرد جو کو عرق مکو، یا عرق خرفہ میں گوندھ کر تھوڑا سا روغن

بنفشہ ملا کر ضماد کریں۔

..... نفع کے ابتدائی مرحلے میں درج ذیل نسخہ ضماد مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ ضماد: صندل، آرد جو، خطمی، بنفشہ خشک، بابونہ، اکلیل الملک، ہر ایک ایک حصہ
جملہ دواؤں کو کوٹ کر ریشمی کپڑے میں چھان لیں اور تھوڑا سا موم، روغن بنفشہ ملا کر پیسی
ہوئی دوائیں اس میں شامل کر کے مرہم بنائیں اور سینہ پر اس کا ضماد کریں۔

..... نفع مادہ میں تاخیر کی صورت میں تخم کتان، حلبہ، آرد باقلا، ہر ایک

ایک حصہ کا اضافہ کر دیں۔

- سبوس گندم اور نمک وغیرہ سے تلمیذ کریں۔
- پیاس کی شدت کی صورت میں آب سرد کی بجائے نیم گرم پانی یا عرق گاؤزبان، عرق بادیاں نیم گرم، تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔
- اسی مقصد کے لئے آب تٹا، آب تر بوز، آب کدوا اور ترنجبین (کم ترش) استعمال کرائیں۔
- اخراج بلغم ہونے لگے تو شربت بنفشہ اور لعاب بہدانہ چند دنوں تک پابندی سے استعمال کرائیں۔


ذات الجنب

PLEURISY


اس مرض میں غشاء المرید (Pleura) میں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت کبھی تو ایک جانب ہوتی ہے اور کبھی دونوں جانب ہوتی ہے۔

اقسام

(۱) مادی ماہیت کے اعتبار سے



(ب) عوارضی خفت و شدت کے اعتبار سے



اسباب

تعدیہ:

Tuberculosis

(I) تدرن

Bronchiect Asis

(II) ذات الریه

(III) اتساع شعب

B. Virus Infection

(IV) ب' قبی سرایت

(V) غانفراناریوی ومتعدی سدادیت

(VI) سلی کوسس

Deplococh

(VII) کرویات مزدوجہ

متفرقات:

(I) نزولہ کا انحدار

(II) بکثرت شراب خالص نوش کرنا

(III) سرد تدابیر

(IV) غلیظ غذاؤں کا بکثرت استعمال

(V) مزمن ریوی امراض

(VI) بثری امراض

(VII) سرطان ریه

(VIII) ہریرہ و سقہ

(IX) انفلوئنزا

(X) التهاب کلیہ

(XI) التهاب بطانتہ القلب

(XII) التهاب باریطون

حمیات:

(I) حمی معدیہ عفونیہ

(II) جدری

(III) حصہ

(IV) حمی قرمز

(V) حمی نفاسیہ

فساد اخلاط:

(I) فساد صفراء

(II) فساد دم صفراوی

(III) متغفن بغم شور

(IV) سوداء کا بدن میں گرم ہو جانا

علامات | مرضی تغیراتی علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مندرجہ ذیل تین کیفیات خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

(I) درجہ احتقان الدم: اس میں غشاء المریہ کے ماؤف حصہ میں خون جمع ہو جاتا ہے، جس سے اس کی چمک مفقود ہو جاتی ہے اور وہ سرخ اور خشک ہو جاتی ہے۔

(II) درجہ التهاب: اجتماع خون کے بعد نثری قسم کا التهاب پیدا ہو تا ہے اور متاثر حصہ میں یقین مخرج ہو کر جم جاتی ہیں، اور اس میں کرویات بیضاء کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور نتیجہ کے طور پر غشاء المریہ کی اندرونی سطح روئیدار اور ناہموار ہو جاتی ہے، اور سفیدی مائل دغانی نظر آتی ہے۔ بعض اوقات مرضی تغیرات یہیں پر ہو قوف ہو جاتے ہیں اور التهابی کیفیت زائل ہو کر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غشاء المریہ کے دونوں پرت جڑ جاتے ہیں یا غشاء المریہ کا ماؤف حصہ کسی قدر دبیز ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ذات الجنب ببوسی (Dry Pleurisy) کہلاتی ہے۔

(III) درجہ انسداد رطوبات: اگر درجہ التهاب کے بعد شفا یابی نہ ہو تو تجویف غشاء المریہ میں مصلی لینی دینی خون آب (Libro Serum) قسم کی رطوبت کا ترشح شروع ہو جاتا ہے، جو تہنی یا زردی مائل سبز ہوتا ہے اور اس کی ترکیب میں رطوبت بیضیہ اور کریات حمراء کریات بیضاء پائے جاتے ہیں، اور اس کا وزن

مخصوص ۱۰۱۔۲۰۔ تک ہوتا ہے، بعض اوقات کسی دوسری رگ کے انشقاق اور اس میں جریان خون ہو جانے سے مذکورہ بالارنگوں کی بجائے سرخی مائل یا گلابی ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ذات الجنب انسکابی / رطوبتی د Wet Pleurisy کہلاتی ہے۔

حادثہ: مرض کی ابتداء معمولی لرزہ اور بخار سے ہوتی ہے، سینہ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد سینہ میں شدید نشتری درد محسوس ہوتا ہے، درد کارقبہ زیرستان سے عظم تر قوہ عظم قص اور بغل تک ہوتا ہے، سانس لینے، کھانسنے اور ماؤف پہلو پر سونے میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، تنفس میں غیر معمولی دشواری ہوتی ہے، سانس جلد جلد اور کھینچ کر آتی ہے۔ اور درد کے خوف کی وجہ سے تنفسی حرکات کے وقت سینہ کی طبعی حرکات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور مقدور بھر شکم کی حرکات کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی بہت خشک کھانسی آتی ہے اور اگر مرض کا سبب ذات الریہ، التهاب، شعب یا سل ہو تو کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، اور ان کے مخصوص جراثیم بلغم کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، مریض کی کھانسی کی کیفیت بھی مخصوص قسم کی ہوتی ہے اور اس میں درد کی وجہ سے اندر سانس لینے کی حرکت قصیر اور کھانسی کی یعنی ہوا باہر چھوڑنے کی طویل ہوتی ہے، زبان میلی اور اس پر فر جمع ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب سرخ اور قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، رخسارے سرخ اور جلد گرم و خشک محسوس ہوتی ہے، اگر سمیت خون باعث مرض ہو تو بخار شدید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ غشیاں متلی اور درد سر بھی ہوتا ہے، اور بالعموم بدنی درجہ حرارت ۱۰۲۔۱۰۳ تک ہوتا ہے، نبض کی رفتار ۹۰۔۱۲۰ تک ہوتی ہے، اور تنفس کی رفتار ۲۰۔۳۵ کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں سرعت و ضعف ہوتا ہے۔ یہاں تک کی علامات ذات الجنب یبوسی د Dry Pleurisy کی نشاندہی کرتی ہیں۔

انہدام میں دقیق صوت احتکاک د Friction Sound سنائی دیتی ہے اور رطوبات کے اجتماع کے بعد متاثر رقبہ میں قرع ٹھوس ہو جاتا ہے، اور رقبہ کی آواز کے ٹھوس پن میں ہانفے کے ساتھ ساتھ اصوات تنفس، ارتعاش صوتی اور رنائیت د Resonance میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ جب افادہ شروع ہوتا ہے تو رطوبت مائیہ اور صلابت میں کمی آجاتی ہے۔ اصوات تنفس

ارتعاش صوتی اور رنانیت صوتی پھر سنائی دینے لگتی ہے۔ رطوبت جب بالکل زائل ہو جاتی ہے تو صوت اعتکا کی پھر سنائی دینے لگتی ہے تاہم اس کی کیفیت محسن ہوتی ہے۔

ملکونظر ہے کہ صوت اعتکا کی (رگڑ کی آواز Friction Sound) ابتداء میں بہت ملائم اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے، لیکن جب غشاء السریہ میں بلغمی اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ آواز ایک جگہ پر قائم رہ کر نسبتاً زیادہ تیز سنائی دیتی ہے اور اس کی سماعتی کیفیت کان میں چیونٹی کے رینگنے جیسی ہوتی ہے، اور غشاء السریہ میں کے جوف میں تھوڑی مقدار میں خوناب (Serum) جمع ہوتا ہے تو سماعتی کیفیت (مریض سے بات چیت کے وقت) زاویہ کتف کے قریب بکری کے میلنے کی سی ہوتی ہے جس کو اگافونی کہا جاتا ہے اور جوف غشاء السریہ میں رطوبات کے کثیر مقدار میں اجتماع کی حالت میں، جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اور پسیلیوں کی درمیانی جگہ بالکل ہموار یا کسی قدر اونچی دکھائی دیتی ہے اور بچوں میں سینہ پھیل جاتا ہے۔

ہنرمہن: اس میں مرضی علامات میں ذات الحجب حاد جیسی شدت نہیں ہوتی، بار بار لرزہ ہوتا ہے اور بخار چڑھتا ہے۔ تنفس میں تکلیف ہوتی ہے۔ نبض سریع چلتی ہے جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ منہ سے کھور و فارم کی سی بو آتی ہے، صحت مند پہلو میں لیٹنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اس لئے ماؤف جانب پڑا رہتا ہے، بخار کی علامات، حتیٰ دق سے مشابہہ ہوتی ہیں اور بالآخر رطوبات کے اخراج کی تدابیر کرنی پڑتی ہے جس سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

ذیل میں ذات الحجب حاد اور ذات السریہ کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ذات السریہ	ذات الحجب حاد
۱۔ مرض کا آغاز قشریہ سے ہوتا ہے۔	۱۔ مرض کا آغاز درد پہلو، اور لرزہ سے شروع ہوتا ہے۔
۲۔ چہرہ پر تہمتا ہٹ اور سرخی، جو متاثرہ کی جانب کے رخسار پر اور بھی نمایاں ہوتی ہے	۲۔ چہرہ زرد اور متوحش ہوتا ہے

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ۳۔ جسمانی درجہ حرارت زیادہ ۱۰۳ — | ۳۔ جسمانی درجہ حرارت نسبتاً کم ۱۰ — ۱۰.۲ |
| ۱.۶ تک ہوتا ہے۔ | تک ہو جاتا ہے، |
| ۴۔ مرض کا وقوع عام طور سے ثانوی | ۴۔ مرض کا وقوع اولی حیثیت سے اور یک |
| حیثیت سے اور تدریج ہوتا ہے، | بیک ہوتا ہے، |
| ۵۔ بلغم زنگ آلود اور غلیظ نہیں آتا، | ۵۔ زنگ آلود اور غلیظ آتا ہے، |
| بلکہ اس میں جھاگ ہوتا ہے، | |
| ۶۔ بالقرع نمایاں اور ٹھوس آواز اواخر | ۶۔ بالقرع نمایاں ٹھوس آواز آتی ہے، |
| میں آتی ہے ورنہ بالعموم خفیف ٹھوس | |
| ہوتی ہے، | |
| ۷۔ تنفس کے آخر میں سطحی رگڑ کی آواز | ۷۔ سرسراہٹ مطلق کی آواز ہوتی ہے، |
| اعتکاک کی ہوتی ہے | |

اصول علاج

- ۱۔ اس کا علاج بڑی حد تک علامیاتی ہوتا ہے، اس لئے علامیاتی علاج پر بھی زیادہ توجہ دیں۔
- ۲۔ مسکنات دیں۔
- ۳۔ فصد کھولیں
- ۴۔ اطمینان حرارت کی تدابیر اختیار کریں۔
- ۵۔ دفع قبض کریں۔
- ۶۔ غلبہ صفراوی میں اگر درد سینہ کی ٹہریوں کی طرف ہو تو فصد کھولنا زیادہ سودمند ہے، اور اگر درد پسلیوں کے سروں اور معدہ کی جانب مائل ہو تو مسہل دینا زیادہ مؤثر ہے۔
- ۷۔ غلبہ بلغمی اور سوداوی میں فصد کی بجائے حقنہ حادہ منفعی اور محلل ضماد فائزہ ہے۔

علاج

- ۱۔ غلبہ خون کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ

اگر دردِ عظمِ تر قوہ کے پاس ہو تو تر قوہ کے مخالف جانب کے ہاتھ کی باسلیق کی فصد کھولیں اور اگر مرضِ مزمن ہو گیا ہو یا کسی اور ذریعہ سے تنقیہ ہو چکا ہو تو پھر اسی جانب کی باسلیق کی فصد کھولیں۔

_____ گل بنفشہ، تخمِ خبازی، ہر ایک ۷ گرام، اصل السوس مقشر، تخمِ خطمی، پرسیا دشتاں، ہر ایک ۵ گرام، جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔ بہترین منفع ہے۔

_____ درج ذیل نسخہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ: _____ گل بنفشہ، برنجاسف، ہر ایک ۷ گرام، اصل السوس مقشر، ۹ گرام، پرسیا دشتاں، ۵ گرام، مویز شقی، ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر خاکسی ۷ گرام تھوڑک کر نوش کرائیں۔ یہ معجون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

نسخہ معجون: بنفشہ ۱۰ گرام، بہدانہ شیریں ۳ گرام، کیترا ۲ گرام، خطمی ۱۰ گرام، اسپغول ۳ گرام، جملہ دواؤں کو ۱ لیٹر پانی میں ایک رات بھگوئیں، صبح کو جوش دیں جب پانی نصف رہ جائے تو چھان لیں اور ۷ گرام شکر سرخ ملا کر قوام بنائیں اور حسبِ ضرورت استعمال کرائیں۔

_____ آبِ انار شیریں، تازہ گنے کا رس، ہر ایک ۷۰۰ ملی لیٹر، دونوں کو اس قدر پکائیں کہ نصف رہ جائے، پھر اس میں شکر ۱۰ گرام ڈال کر قوام بنائیں اور حسبِ ضرورت استعمال کرائیں۔

_____ درج ذیل نسخہ کو بطورِ سہل استعمال کرائیں۔

نسخہ سہل: بنفشہ ۷ گرام، مغزِ فلوسِ خیارشیز ۵ گرام، ترنجبین ۱۰۰ گرام، عتاب ۲۰ عدد، سپستاں ۵ عدد، جملہ دواؤں کو حسبِ دستور جوش دے کر استعمال کرائیں۔

_____ بنفشہ خشک ۱۰۰ گرام، تخمِ خطمی، اسپغول، بہدانہ، کیترا، ہر ایک ۳ گرام، مغزِ فلوسِ خیارشیز ۲ گرام، شکر سرخ ۱۰ گرام، جملہ دواؤں کو حسبِ دستور سیال میں جوش دیں اور جب نصف رہ جائے تو شکر ملا کر قوام تیار کریں۔ اور حسبِ ضرورت ۵۰۔ گرام، ہمراہ روغنِ بادام استعمال کرائیں۔

• ——— شہید حرارت اور بیہوشی کی صورت میں بہدائہ ۳ گرام، تخم عطلی، تخم خبازی، گل بنفشہ، ہر ایک ۴ گرام، گاؤز بان ۵ گرام، عناب ۵ دانہ، سپستان ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت بنفشہ یا شربت نیلو فرس ۲ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔ اگر شہید گرمی کے ساتھ زہان خشک ہو رہی ہو تو شیرہ مغز کدو شیریں، شیرہ تخم کاہو، ہر ایک ۴ گرام کا اضافہ کریں۔ اور لعوق سپستان یا لعوق خیار نیز چٹائیں۔

• ——— پیاس کی شدت میں یہ نسخہ بھی مفید ہے۔
آب تر بوز، سکنجبین (کم ترش)، استعمال کرائیں اور صبح کو بنفشہ پر وڈہ جلاب رفیق میں روغن بادام ڈال کر نوش کرائیں۔

• ——— بلغم غلیظ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ: گل بنفشہ، پر سیاوشاں، تخم خبازی، تخم عطلی، ہر ایک ۷ گرام، اصل السوس مقشر ۵ گرام، جملہ دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر خمیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر کھلائیں۔
• ——— ذات البجنب غیر خالص میں یہ نسخہ مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ: گل بنفشہ، گرام، اصل السوس مقشر ۵ گرام، شہد خالص ۳ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے چند یوم، نوش کرائیں۔
• ——— درج ذیل حبوب بھی مفید ہیں۔

نسخہ حبوب: شاخ گوزن، نمک لاہوری، ہر ایک ۴ گرام، موم سفید کسی قدر، جملہ دواؤں کو باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک، ایک گولی صبح، شام استعمال کرائیں۔

• ——— بنفشہ، عطلی، بابونہ، ہر ایک ایک حصہ، بیج سوسن ۲ حصہ، آرد جو، آرد باقلا، ہر ایک ۱/۲ حصہ، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر موم اور روغن بنفشہ میں گوندھیں اور صفا کریں۔ اگر تحلیل کی شدید حاجت ہو تو تخم کتاں اور میفنج کا اضافہ کریں، اور حرارت میں کمی کی صورت میں روغن بنفشہ کی بجائے روغن سوسن یا روغن زنگس میں گوندھیں اور اگر حرارت قوی ہو تو تخم کتاں اور میفنج کی بجائے برگ نیلو فر، گل سفید اور کدو دے کر کا اضافہ کریں۔ — یہ نسخہ اعلیٰ درجہ کا ممکن در دوا منفع تصور کیا جاتا ہے۔

_____۔ اُردجو، اکلیل الملک، پوست خشتخاش، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر موم

میں گوندھ کر متاثر حصہ پر ضماد کریں۔

_____۔ شحم بط، شحم مرغ، شحم بز، زوفا رطب، جملہ دواؤں کو پگھلا کر طلا کریں۔

_____۔ تسکین درد کے لئے روغن زیتون کو تھوڑے سے گرم پانی میں ملا کر اس

کی مالش کریں۔

_____۔ بالونہ، بنفشہ، اصل السوس، غنب الشعلب، کوکنار، باقلا، ہر ایک ۵ گرام،

جملہ دواؤں کو ۵ ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر صاف کر کے بھری کے گڑھے کی شحم

(چربی) ۵۰ گرام، روغن گل ۵ ملی لیٹر، روغن بالونہ ۱۲ ملی لیٹر، ملا کر دوبارہ جوش

دیں، جب پانی جل جائے تو سرور کر کے مالش کرائیں۔

_____۔ درج ذیل نسخہ ذات الجنب ریگی اور بلغمی میں مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ قیر و طی: اُرد کر سنہ، اُرد حلیہ، ہر ایک ۵ گرام، شونیز، اصل السوس، ہر ایک

۲ گرام، عاقر قرحا ایک گرام، موم خالص ۱۲ گرام۔ موم کو روغن ناروین یا روغن سوسن

میں پگھلا کر باقی دوائیں باریک پیس کر اس میں ملائیں اور اس کا لیپ سینہ پر کریں۔

_____۔ روغن سرنخ یا روغن گل، اک، حسب ضرورت۔ ان کی مالش بھی مفید

تصور کی جاتی ہے۔

اتساع شعب

BRONCHIECTASIS

اس مرض میں شعبۂ السریہ میں دیر پا اتساع پیدا ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ قریبی ریوی

بافت میں لیفی اور انتفاخی کیفیت رونما ہوتی ہے، جو مرضی عوارض کا سبب بنتی ہے۔

اتساع شعب

اقسام

Bronchiect-Asis

اتساع شعب یابس

Dry Bronchiect-Asis

اتساع شعب رطب

Wet Bronchiectasis

اسباب

I ، کسی بڑے شعبی انبوبہ در Bronchial Tube کا بتدریج ترقی کردہ مسلسل تسدّد
جس سے خارج ہونے والے چھوٹے شعبات میں اتساع پیدا ہو جائے،

II ، انورسما

III ، سرطان

IV ، متواتر الوقوع ریوی تعدیہ

V ، التهاب شعب

VI ، ذات الریه

Syphilitic Stenosis

VII ، تشکی تضیق

VIII ، شہیقہ

IX ، حصہ

X ، حدری

Tuberculous Broncho-Stenosis

XI ، تدری شعبی تضیق

Fibrocystic Disease

XII ، لیمی دویری مرض

XIII ، پیری

XIV ، سردی لگنا

XV ، نقص تعدیہ

XVI ، گرم مقامات / گرم ملبوسات

XVII ، دراشت

XVIII ، عاد متعدی امراض / کمزور کردینے والے مزمن امراض

XIX ، نقرس

XX ، ذیابیطس

XXI ، امراض صمام تاجی

XXII ، حمی قرمزیه

(xxvii) خناق و بانی

(xxviii) کیمیاوی، مٹیج اور زہریلے دھان اور بخارات

(i) کلورین

(ii) ایونیا

(iii) سلفر ڈائی آکسائیڈ

(iv) فارملین

(v) برومین

(xxix) میکانیکی اجسام غریبہ کا براہ تنفس داخل ہو کر خراش پیدا کرنا

(i) کوئلہ

(ii) مٹی

(iii) اون

(iv) فولادی اجزاء

(v) غیر طبعی جدید ساختوں کے داخلی انسداد یا خارجی دباؤ وغیرہ کی

موجودگی۔

شعبوں میں اتساع و کشادگی، ریزش اور مآؤف حصوں اور ملحقہ بافتوں کا

انہدام، یہ تین نمایاں تعیرات ہیں، ضیق النفس، کھانسی اور نفث کی شکایت

ہوتی ہے، تاہم مرض اخضر اور گرز انگشتی (Clubbing Of The Fingers) ہو جائے،

ریوی دوران خون میں مزاحمت کی صورت میں دائیں قلب کا فشل (Heart Failure)

پاؤں کا اذویما، اور پیتھاب میں رطوبت، بیضیہ خارج ہو سکتی ہے۔ بلغم — ریوی بغیر

بوکا اور غیر جھاگ دار — مخاطی ریوی — بدبودار اور مخاطی اور جھاگدار خارج ہو سکتا

ہے، پسینہ خارج ہوتا ہے، لرزہ کے ساتھ ہی آتا ہے۔

تفجیح کی صورت میں مزمن کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، عمومی تسمم، اور انگلیاں گرز کی شکل

کی ہو جاتی ہیں، عسر النفس اور نفث الدم ہو سکتا ہے، عام جسمانی ضعف، فتور، ہضم، وزن میں

کمی اور خفیف سور القینہ کی شکایت ہوتی ہے، بچوں کی نشوونما میں تاخیر ہوتی ہے۔

اتساع عام طور سے ایک ریوی تک محدود ہوتا ہے خاص طور سے اگر اس کا سبب

شعبی تسفط ذات الہیہ ذات الجنب یا جسم غریب ہو، اور بالغرض دونوں ریہ ماؤف ہوں تو مرض کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، یا ایک ریہ دوسرے کی نسبت بہت زیادہ ماؤف ہوتا ہے۔ اتساع کی نوعیت و جسامت کا انحصار ریہ کے اندرون کی توزیع اور درمیان میں حائل ہونے والے ریوی تجدد Consolidation، یا لیفیت (Fibrosis) کی مقدار پر ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض حالتوں میں ایک قاعدہ کے بڑے حصہ بلکہ سینہ کے ایک طرف چہر چرانے والی (Creaking) اور چٹخنے والی (Cracking) لفظ (خرخراہٹ = Rales) پائی جاتی ہیں، جو تنفسی مراہٹ کو پوشیدہ کر دیتی ہیں تاہم کوئی تحدیدی حرکت یا اصمیت (Dulness) نہیں ہوتی۔

اور حالتوں میں رنانیت کا ایک ایسا رقبہ ہوتا ہے، جہاں شعبی تنفس یا قدری تنفس (Aphonic Breathing) اس کے ساتھ شعبی صوتی (Bronchophony) اور صد رکلاں (Pectoriloquy) سنائی دیتی ہیں۔

ریزش کی وجہ سے امتلا کی صورت میں رنین (Resonance) اور اصوات تنفس میں کمی اور ضعف ہوتا ہے، قلب کا میلان ماؤف پھیپڑے کی طرف ہوتا ہے۔ پہلو بدلنے سے کھانسی آنے لگتی ہے، اسی لئے مریض ایک ہی پہلو پر لیٹنا پسند کرتا ہے۔ پہلو کا انتخاب اتساع کے جائے وقوع پر منحصر ہوتا ہے۔

انتہائی صورتوں میں کوائف مرض ذات الریہ مزمن سے مشابہ ہوتے ہیں سینہ کی باز کشیدگی (Retraction) واقع ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ مذکور ہوا قلب انقبی رخ میں متاثر ریہ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اور مقابل کار یہ تعویضی طور پر نفاسی Compensatorily Emphy Sematous ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

_____ تبدیلی آب و ہوا، خصوصاً گرم و خشک آب و ہوا عموماً مفید اور دوائی تاثیر رکھتی ہے۔

_____ شعبی سرایت کا انسداد کریں۔

_____ عمل بائیدر (Operation) کے وقت مریض کے قوی کو ضرور ملحوظ رکھیں،

علاج |


عمل بالید کے ذریعہ وضعی اسالہ Postural Drainge کریں، علامیاتی سکون حاصل ہوتا ہے۔

انتفاخ الریه

EMPHYSEMA

اس مرض میں پھیپھڑوں میں چھوٹے چھوٹے ہوائی پھیپھوے (خلا) بن جاتے ہیں، اور ہوائی تھیلیاں دکیسہ ہوائیہ = Alvoeli پھیل جاتی ہیں اور ان کی دیواروں میں ہزالی کیفیت اور رقت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب اور مرضی کیفیات و علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اطباء نے انتفاخ الریه کی متعدد اقسام بیان کی ہیں، ذیل میں اس کی صرف چند مشہور اقسام تحریر کی جا رہی ہیں۔



انتفاخ الریه تعویضی، انتفاخ الریه نسبی اور انتفاخ الریه جراحی وغیرہ بھی اس کی چند مشہور اقسام ہیں۔

انتفاخ الریه حویصلی:

حادث: اس صورت میں زور سے سانس لینے میں ہوا پھپھڑوں کے اندر تو داخل ہو جاتی ہے، تاہم اس کے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، چنانچہ اس ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ کے باعث پھپھڑے کشادہ ہو جاتے ہیں، ان کی ضخامت / جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 مزمہ: اس صورت میں انتفاخی حالت، تناؤ کے باعث میکانی طور پر رونما ہوتی ہے۔
 انتفاخ الریه ہزانی متنیخوخی: اس صورت میں پھپھڑے کی ہوائی کیسیوں کی دیواروں (Alveolar walls) کا مجموعہ ہزال اور حویصلات صغیرہ ہوائیہ (Air Vesicles) کا ارتعاش ہوتا ہے، اور سینہ نیز پسلیاں تھوٹی اور تر تھوٹی ہو جاتی ہیں، پھپھڑے بھی تھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ نوع بوڑھوں میں کثیر الوقوع ہے۔

انتفاخ الریه خللی: اس صورت میں ساختوں کی درمیانی خلاؤں کے اندر ہوا داخل ہو جاتی ہے، انتفاخ الریہ کی یہ نوع بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔
 دیگر انواع مثلاً انتفاخ الریہ تعویضی، میں انتفاخی کیفیت ثانوی طور پر رونما ہوتی ہے، اس میں پھپھڑے کے متاثرہ حصے کے نہ پھیلنے کی وجہ سے گرد و پیش کے صحت مندر حصے ان کی جگہ کام کرنے کے لئے بہت زیادہ بھیل جاتے ہیں۔ انتفاخ الریہ نسبی میں دباؤ کی وجہ سے ہوا، حویصلاتی دیواروں سے نفوذ کر کے نسبی ساخت میں پہنچ جاتی ہے اور یہاں پھپھڑے یا بلبے پیدا کر دیتی ہے اور ہوا جلد ریلوی اور منصف صدر تک پھیل جاتی ہے۔
 — انتفاخ الریہ جراحی میں ہوا تجویف غشاء الریہ میں جمع ہو جاتی اور مجروح غشاء الریہ سے نکل کر تحت الجلد ساخت تک پہنچ جاتی ہے اور متاثرہ ساخت کو دبائے سے کرکراہٹ کی آواز بآسانی سنی جاسکتی ہے۔

اسباب

ایسی جملہ کیفیات و تدابیر جو:

- (I) ہوائی کیسیوں کے اندرونی دباؤ کو بڑھا دیں
- (II) طبعی حالتوں میں قریبی حصوں سے ملنے والے سہارے کو ختم کر دیں
- (III) ہوائی کیسیوں کی دیواروں کو کمزور کر دیں

مثلاً

- (I) شعبی غشاء مخاطی کا درم
 (II) ہوائی نالیوں کے اندر تراوشات
 (III) ضیق النفس کے متواتر حملے
 (IV) ذات السریہ شعبی
 (V) التهاب الشعب شعری / التهاب عروق خشنہ
 (VI) سعال مزمن
 (VII) نقص تغذیہ
 (VIII) ہزال عمومی / ہزال پیدا کرنے والے جملہ امراض
 (IX) نقص الدم مہلک
 (X) تشہیقہ
 (XI) خناق حنجری
 (XII) ذات الحنجرب رطوبی
 (XIII) پیدا انشی طور پر یہ کمزور ہونا
 (XIV) بچوں میں قبل از وقت اضلاع کا سخت ہو جانا
 (XV) باجہ بجانا
 (XVI) ایسا پیشہ جس میں پھونکنے کی بار بار ضرورت
 (XVII) بار برداری (حمالی)

علامات | مرض بتدریج ترقی کرتا ہے، اور اس سے قبل کہ مرضی علامات رونما ہوں
 مرض کافی ترقی کر چکا ہوتا ہے، یہ علامات عام طور سے خون میں آکسیجن
 کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں، اس مرض کی ابتدائی علامت یہ ہے کہ بچوں میں زینہ چڑھنے
 سے ان کا دم پھولنے لگتا ہے، بچہ دوڑنے اور کھیل کود میں حصہ لینے سے احتراز کرتا ہے اور
 باغرض وہ کھیل میں حصہ لے بھی تو اسے تنفسی تکلیف ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور
 وہ مدد حال ہو جاتا ہے۔

نوعمر لوگوں اور بوڑھوں میں بھی عسر تنفس کی شکایت ہوتی ہے، معمولی دودھ صوب سے دم بھولنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت التهاب شعبہ الریہ سے زیادہ ہوتی ہے، نفخ شکم اور سردی لگنے کی صورت میں عوارض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، مرض کے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی صورت میں لیٹنے سے بھی عسر تنفس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اطراف سرد پڑ جاتے ہیں اور چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے، ہزالی کیفیت رونما ہوتی ہے، پیر اور شکم میں آماس آ جاتا ہے جس پر ٹھوکنے سے حالت صحت کی نسبت آواز زیادہ صاف سنائی دیتی ہے، عمل تنفس سے خاص قسم کی کرخنت آوازیں آتی ہیں، اور اخراج تنفس کا عرصہ طویل ہوتا ہے، زہ راقہ () بھی عارض ہوتا ہے تاہم اس سے مریض کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ ضیق النفس کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں، کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، جو موسم کے تغیر کے ساتھ کم و بیش ہوتی رہتی ہے، شدید عوارض میں دم کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، دمہ کے تشنجی دورے بھی پڑ سکتے ہیں، عمر میں اضافہ کے ساتھ بار بار کھانسی کے حملے سے مریض بتدریج کمزور ہوتا جاتا ہے، تاہم بلفم قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

نظری معائنہ کرنے سے سینہ پیپہ نما معلوم ہوتا ہے، پچھڑوں کا حجم بڑھ جاتا ہے، چنانچہ اس بڑھانے کے لئے جگہ بنانے کے لئے اضلاع کم تر چھے اور عمود الفقرات کا تحر سامنے کی طرف زیادہ اور عظم انقبض زیادہ محسوس ہو جاتی ہے، جس سے نصاب اور عظم انقبض کا درمیانی زاویہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، مریض کی گردن چھوٹی اور پشت گول اور کڑی نظر آتی ہے۔ قد اسی خلی پیما نش بڑھ جاتی ہے، سینہ حالت شہیق میں قائم ہو جاتا ہے، ٹلنے اٹھے ہوئے، عظم الرقوہ اٹھی ہوئی اور فضلاء بین الاضلاع چوڑی اور زاویہ الرقوہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، زاویہ قلب کی ٹھوکر نظر نہیں آتی، گردن کی وریدیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں غمربان کی کیفیت ہوتی ہے اور مقام معدہ پر بھی یہ تڑپ نظر آتی ہے۔

امتحان بالقرع سے تیز اور گونج دار آواز آتی ہے، قلب کے ٹھوس رقبے رفتہ رفتہ محدود اور بعد میں معدوم ہو جاتے ہیں۔

امتحان بالممس میں زاویہ قلب کی ٹھوکر پانچویں، چھٹی پسلیوں کی درمیانی فضا میں محسوس نہیں ہوتی، ارتعاش صوتی طبعی یا قدرے کم ہوتا ہے۔

سماع الصدر سے زہیر طویل، شہیق مختصر اور شہیق کے اختتام پر کسی وقفہ کا پتہ

نہیں چلتا، تنفسی آوازیں دھیمی سائی دیتی ہیں، خشک اور مرطوب سرسراہٹ کی آوازیں سنیے۔ پرسنی جاسکتی ہیں، یہ آوازیں کسی حد تک میز پر انگلی رگڑنے کی آواز سے مشابہہ ہوتی ہیں۔ قلب کی آوازیں بھی مدہم مگر واضح ہوتی ہیں۔

مرض کے ارتقائی مرحلہ میں مریض حرکات صدر سے احتراز کرتا ہے، سینہ چاروں طرف سے پھول جاتا ہے۔ اس مرض کے صرف ایک پھیپھڑے یا اس کے کسی خاص حصہ میں جاگزیں ہونے کی صورت میں سینہ کی بالیدگی بے قاعدہ ہوتی ہے۔ التهاب شعب السریہ کے بار بار حملوں سے مریض کی حالت ناگفتہ بہہ ہو جاتی ہے، اور ذات السریہ فسی، ضعف قلب، اتساع قلب یا استسقاء کی وجہ سے مریض فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات نزع کے بعد موت واقع ہوتی ہے۔

انتفاخ الصدر اور دہشچی سے اس مرض کا اشتباہ ہو سکتا ہے اس لئے ذیل میں ان کی علامات فارقہ تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

انتفاخ الصدر	انتفاخ الریه
۱۔ علامات مرض یک روز نما ہوتی ہیں،	۱۔ علامات مرض تدریج روز نما ہوتی ہیں،
۲۔ عسر تنفس ہمیشہ رہتا ہے،	۲۔ عسر تنفس دوری ہوتا ہے اور جسمانی تحریکات سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے،
۳۔ مرض ایک جانب ہوتا ہے،	۳۔ مرض دونوں پھیپھڑوں میں ہوتا ہے،
۴۔ اخراج تنفس کی آوازیں اکثر معدوم ہوتی ہیں،	۴۔ اخراج تنفس طویل اور دھیمسا ہوتا ہے،
۵۔ تنفس قدری ہوتا ہے،	۵۔ تنفس حویصلی ہوتا ہے،
۶۔ آواز بالقرع انتفاخی آتی ہے،	۶۔ آواز بالقرع حویصلی انتفاخی آتی ہے

تفریقی علامات

ضيق النفس شعبی	انتفاخ الریه
۱۔ صدر کی وضع طبعی ہوتی ہے ،	۱۔ صدر پیچے کی طرح ہوتا ہے ،
۲۔ قلب کی وضع طبعی ہوتی ہے ،	۲۔ قلب ہٹا ہوا ہوتا ہے (غیر طبعی وضع) ،
۳۔ حملے دوری ہوتے ہیں ،	۳۔ مرض ہمیشہ قائم رہتا ہے ،
۴۔ اخراج تنفس دھیمہ نہیں ہوتا ،	۴۔ اخراج تنفس طویل اور دھیمہ ہوتا ہے ،
۵۔ دوران حملہ عسر تنفس ہوتا ہے ،	۵۔ ورزش اور دیگر جسمانی تحریکات سے عسر تنفس میں اضافہ ہو جاتا ہے ،
۶۔ دوران حملہ تمام صدر میں متعدد سرراہٹ صغیری ہوتی ہے ،	۶۔ سرراہٹ کی تعداد کم بشرطیکہ التهاب شعبی نہ ہو، التهاب شعبی کے بعد سرراہٹ بلغمی ہوتی ہے ،
۷۔ امتحان بالقرع سے آواز بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہے	۷۔ امتحان بالقرع سے انتفاخ حویصلی کا پتہ چلتا ہے ،

اصول علاج

- _____۔ اصل سبب کو ملحوظ رکھتے ہوئے علاج کریں۔
- _____۔ حسب ضرورت لعوق استعمال کرائیں۔
- _____۔ مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- _____۔ لوہان سائیدہ ۱۳۰ ملی گرام، خمیرہ ابریشم سادہ ۶ گرام کے ہمراہ صبح کو کھلائیں۔
- _____۔ سہ پہر کو قرص زہر مہرہ مرکب ایک عدد، ہمراہ شربت زردفا ۲۴ ملی لیٹر، پانی میں حل کر کے کھلائیں۔
- _____۔ سورہ، ہضم کی صورت میں نمک جالینوس حسب ضرورت کھلائیں۔

_____ قرص ابیک ایک عدد، خمیرہ ابریشم سادہ ۶ گرام، ہمراہ شربت زنجبیل ۲۳ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

_____ سہ سپر کو قرص خطائی ایک عدد کھلائیں
قرص ابیک ایک عدد، خمیرہ گاؤزبان عنبری ۶ گرام، ہمراہ عرق عنبر ۶ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

_____ لعوق سپستان ۱۲ گرام، لعوق ربوی ۶ گرام، آب گرم میں حل کر کے نوش کرائیں۔

_____ تقویت کے لئے دوار الملک معتدل سادہ ۶ گرام، صبح کے وقت استعمال کرائیں۔
_____ دوار الملک معتدل جواہر والی ۶ گرام، ہمراہ شربت مقوی قلب ۱۲ ملی لیٹر، صبح کے وقت نوش کرائیں۔

_____ ماء الذہب ۳ قطرے، فولاد سیال ۳ قطرے، پانی میں حل کر کے بعد غذا نوش کرائیں۔

_____ رات میں جوارش فلافل ۶ گرام کھلائیں۔

_____ جواکھار اصلی، دارفلقل، برگ آک، نموزن کو بازیک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور ایک ایک گولی دن میں چار بار استعمال کرائیں۔

تدرناریہ


PULMONARY TUBERCULOSIS

یہ حاد متعدی مرض ہے، اس میں مادہ مرض (جراثیم درنی = ٹیوبیرکل بے سی لائی) ریه میں

یہ جراثیم تیزاب پسند ہوتے ہیں، مکانی درجہ حرارت پر انکی افزائش نسل گرجتی ہیں ہوتی تاہم یہ خشک بلغم، مٹی اور گھاس وغیرہ پر مہینوں زندہ رہ سکتے ہیں۔ حیوانی اور انسانی، اس کے تین خاندان ہیں ہوائی خاندان، گھریلو پندوں کو حیوانی خاندان مولیشیوں کو اور انسانی خاندان انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، ہوائی خاندان سے بھی انسان متاثر ہو سکتا ہے۔

بہنچ کر مخصوص قسم کے ابھار (دورن = ٹیڈ برکل) بنا دیتے ہیں، یہ ابھار باجرے کے دانے سے کسی قدر بڑے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات باہم مل کر اخروٹ کے برابر ایک بہت بڑا ابھار بنا دیتے ہیں جو بعد میں زخم بن جاتے ہیں اور ان میں پیپ بڑھ جاتی ہے نیز دوسرے شدید عوارض رونما ہوتے ہیں۔

اقسام



اسباب

اسباب معدہ:

- (I) قوت مناعت / مدافعت کی کمی
- (II) نقص تغذیہ
- (III) غیر صحت بخش رہائش / پُر ہجوم ماحول
- (IV) جسمانی محنت کی زیادتی
- (V) کثرت سے نوشی
- (VI) تمباکو نوشی
- (VII) بعض مخصوص پینے، جن میں سلیم کا استعمال ہو رہا ہو

۱۔ ایک قسم کی سفید یا بے رنگ معدنی چیز: جو عام طور سے پتھروں میں پائی جاتی ہے۔

(xviii) شہیقہ

(xix) انفلونزا

(x) ذیابیطس شکرى

(xi) ذات المریہ

(xii) تصلب کبد

(xiii) جدرى

(xiv) حصہ

(xv) معوی علیہ آنتوں کا آپریشن

(xvi) سورہضم

(xvii) ذات الحجب ہمدیدی

(xviii) عروق کے منہ کھول دینے والے اندرونی یا بیرونی اسباب

(xix) بار والمزاج ہونا

اسباب واصلہ:

(i) عصبیات درینہ (ٹیوبرکل بے سی لانی)

ذرائع تعدیہ:

(i) تنفس کے ذریعے: جراثیم عصبیات درینہ خشک عفونت زدہ گرد و غبار اور

لعاب دہن میں اور مریض کی کھانسی کے ساتھ خارج شدہ بلغم سے سانس کے

ساتھ اندر جانے سے تنفسی راستے تک پہنچ جاتے ہیں اور تعدیہ کا سبب بنتے ہیں۔

(ii) 'لوذتین' جوف منصف الصدر اور شعبۂ قصبہ کی غدود خازبہ کے ذریعہ -

(iii) 'بواکدھن'، بذریعہ حرجی غذا یا حرجی صدر اس صورت میں عصبیات درینہ

ماکول و مشروب کے ہمراہ پہلے غدود ماسار یقار مفاصل / عظام میں پہنچ کر وہاں مرض

پیدا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے دوران خون میں شامل ہو کر یا رطوبت لمفاویہ کے

ذریعہ پھیپھڑوں تک پہنچ کر تہدرن کا باعث ہوتے ہیں۔

(iv) عصبیات درینہ کا ساخت کے توسط سے براہ راست مرکز مل سے پھیپھڑوں میں پہنچ جانا۔

واضح رہے کہ عصیات درنیہ کے خاندان کے تناسب سے انسانوں میں ۵ فیصدی ہوائی خاندان سے، ۵۰ فیصد حیوانی خاندان سے اور ۸۰ فیصد انسانی خاندان سے تدرن ریوی ہوتا ہے۔

علامات | عصیات درنیہ جسم میں داخل ہونے کے بعد حسب ذیل بنیادی علامات پیدا کرتے ہیں۔

(I) خون آمیز سیال کا رساؤ، بالعموم تجاویف مائیہ ہیں

(II) ساختوں میں دذات (ڈیڈ برکل) کا پھیلنا

(III) ان ذرات کا متحد ہو کر بنیری مادے میں تبدیل ہونا

(IV) بنیری رقبوں کا رقیق ہو کر سرد پھوڑے پیدا کرنا

(V) ریشہ دار ساخت (لیفیت) میں تبدیل ہو جانا

(VI) تکلس (Calcification)

حاد: تدرن ریہ حاد، کثیر الوقوع نہیں ہے، تاہم اس کا تعدیہ نہایت مہاد نوعیت کا ہوتا ہے، اور عام طور سے چند ماہ کے اندر ہی مرلض کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس میں عام طور سے دونوں پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔

تدرن ریہ فصصی حاد: اس میں تعدیہ ایسے گرد و غبار کے ساتھ، جس میں خشک شمرہ تھوک کے ذرات ملے ہوتے ہیں، یا مرلض کے حلق کی رطوبات سے تنفس کے راستہ پھیپھڑوں تک ہوتا ہے، یا سابق میں مذکور کسی اور ذریعہ سے تعدیہ ہوتا ہے۔ بہر حال اس کا حملہ ذات الریہ فصصی کی طرح تدرن ریہ ہوتا ہے۔ یہ صورت حصہ اور شہیقہ کے بعد عارض ہوتی ہے۔ تدرن ریہ حاد کی یہ نوع نسبتاً نغیر الوقوع ہے، اس میں عام طور سے دونوں پھیپھڑے ایک ساتھ متاثر ہوتے ہیں، موقوف مقام ٹھوس اور سلٹی رنگ کا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان میں تجسنی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوائی کیسوں کی دیواریں ناپید ہو جاتی ہیں اور ان میں غلیات درنی نظر آنے لگتے ہیں، ان کے بعد ان حصوں میں چھوٹے چھوٹے تدرنی غار یا حوف ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح یکے بعد دیگرے پھیپھڑے کے صحت مند حصے بھی موقوف ہو جاتے ہیں اگر تدرنی غار یا حوف سطح ریہ سے قریب ہوں تو وہ

جوف غشاء الریہ میں پھٹ کر انتفاخ الریہ یا تفع الصدر کا باعث ہوتے ہیں۔ اس میں مرفی تغیرات اس قدر جلد رونما ہوتے ہیں کہ طبیعت غشاء الریہ کے انقباض وغیرہ کی محافظی تدابیر بالعموم عمل میں لایا ہی نہیں سکتی، اور ۵-۶ مہینے کے اندر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

تدرن ریہ دھوی جاوردسی حاد: اس میں دونوں پھیپڑے ایک ساتھ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ریہ کی بالائی سطح سے قاعدے تک، بالخصوص غشاء الریہ کے نیچے سوئی کی نوک یا باجرے کے دانوں کی مانند سفید یا سلیٹی رنگ کے بیشمار دانے دٹیو برکل، پائے جاتے ہیں، جن میں بکثرت کریات، بیضہ موجود ہوتے ہیں، متاثر پھیپڑہ خون سے پُر اور سیاہی مائل نظر آتا ہے اور اس میں تجنبی کیفیت یکسر مفقود ہوتی ہے، اور پھیپڑوں کی ساخت کی نمایاں تباہی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ اس میں ریہ کے علاوہ یکے بعد دیگرے دوسرے اعضاء مثلاً کبد، طحال، کلیہ، صفاق اور اغشیہ دماغی بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔

تدرن ریہ جاوردسی لہفاوی حاد: عام طور سے اس میں پھیپڑے کا ایک ہی حصہ یا صرف ایک ہی پھیپڑہ متاثر ہوتا ہے، اس میں پائے جانے والے دانے دٹیو برکل، سلیٹی رنگ کے، قدرے مکدر ہوتے ہیں اور عام طور سے ریہ کی بیرونی سطح پر یا عروق شعریہ کے سروں پر بے قاعدہ طور سے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں تجنبی کیفیت بھی پائی جاتی ہے اور طفاوی قسم کے کریات، بیضہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

تدرن ریہ تحت الحاد: اس میں درج ذیل چار درجوں کے مطابق مرفی تغیرات رونما ہوتے ہیں۔

- (I) شعب قصبہ، ہوائی کیسوں اور عروق دمویہ کی ارد گرد کی عروق ہاذبہ میں درنات جمع ہو جاتے ہیں جن کی موجودگی سے ایک قسم کا ذات الریہ شعبی پیدا ہو جاتا ہے۔
- (II) اس ذات الریہ شعبی کے نتیجہ میں متاثرہ حصہ کے ہوائی کیسوں اور شعب قصبہ کی ہارک بارک شاخوں میں التباہی رشح کے انجماد سے وہ حصہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔
- (III) منجمد شدہ حلقہ کے ارد گرد کے درنات دٹیو برکل کے دباؤ سے وہاں کی

عروق و موہ میں انسداد پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مقامی طور پر خون کی آمد رک جاتی ہے اور جراثیمی سمیت کے اثر سے خلیات کی مقامی موت ہو جاتی ہے اور تجنسی فساد رونما ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس تجنسی مواد کے گھل جانے سے وہاں جوف پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح سے بنے ہوئے تازہ جوفوں کی دیواریں بے قاعدہ اور مردہ ساختوں کی وجہ سے نرم ہوتی ہیں اور جب یہ جوف مزمن ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر لیفی ساخت کا ایک غلاف سا چڑھ جاتا ہے، جس میں سیاہی مائل، ایک نرم غشاء استرکٹے ہوتی ہے، ان جوفوں میں فاسد شدہ بشری خلیات، مردہ ریوی خلیات اور تجنسی مواد پائے جاتے ہیں۔

(۵) مذکورہ تغیرات کے ساتھ جوف کے ارد گرد محافظ لیفی ساخت بنتی ہے، ماؤف حصہ کے اوپر کی غشاء الریہ دبیز ہو کر اپنی ساخت کی دوسری تہہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس سے اس کے درمیان کی تجویف غشاء الریہ جڑ ہو جاتی ہے۔

صحت کی طرف پیش رفت کی صورت میں مرض کا بڑھنا رک جاتا ہے، جوف کے اندر کے سیال مواد خشک ہو جاتے ہیں، اور ارد گرد کی لیفی ساخت سکڑ جاتی ہے، جس سے جوف مکمل یا نامکمل طور پر بند یا مندمل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مرض بڑھتا جائے تو یکے بعد دیگرے بھیچڑوں کی ساخت کے صحت مند حصے بھی ماؤف ہوتے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ بھیچڑے کے وسیع تر حصے کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد دوسرا بھیچڑہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور بالآخر تنفسی خرابی، عام جسمانی ضعف اور اعضاء رئیسہ کے متاثر ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

تحدون دیہ ہذہن: اس میں، مرضی تغیرات، تدریجاً تحت الحاد کی طرح ہی رونما ہوتے ہیں، تاہم اس کی ایک تلیفی صورت نہایت مزمن ہوتی ہے، اور غشاء الریہ کا غیر معمولی التصاق، عام تلیف ریوی، تدریجی جوف، غدود، انتفاخ الریہ شعبی قصبی اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔

ظاہری علامات: بنیادی علامات یہ ہیں (۱) ادنیٰ درجہ کا حمی (۲) رات میں پسینہ خارج ہونا (۳) قلت اشتہاء (۴) وزن میں کمی (۵) قطعی لمفوسائیٹوسس، چنانچہ ابتدائی مرحلے میں کوئی علامت شاذ ہی ملتی ہے تاہم کھانسی، عام ضعف اور وزن گھٹنے وغیرہ سے معالج مرلین حساس ہو جاتا ہے، مرض کی ابتداء عام طور سے

تبدلیج ہوتی ہے جس کا آغاز بڑھتے ہوئے ضعف اور کھانسی سے ہوتا ہے۔ بدہمی، اختلاج قلب، ذات الحجب، ذات الریه یا التهاب شعی وغیرہ کو بھی اس مرض کی ابتدائی علامتوں میں شمار کیا جاسکتا ہے، ابتداء میں کھانسی خشک ہوتی ہے اور اس میں صرف تھوڑا مخاطی بلغم خارج ہوتا ہے لیکن جب پھیپھڑے کی ساخت برباد ہونے لگتی ہے تو بلغم زیادہ سے زیادہ پیپ دار ہو جاتا ہے، آخری ایام میں قصبۃ الریه کے ٹکڑے اور عروق کے تار اور اجزاء بھی بلغم اور پیپ کے ہمراہ خارج ہونے لگتے ہیں، اس میں عصیات درنہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

ہاضمہ کی خرابی کی علامات بعض اوقات ابتداء ہی میں رونما ہونے لگتی ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے اور غذا لینے کے بعد بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، مریض جلد تھک جانے کی شکایت کرتا ہے۔ بخار، سدرن کی سرگرمی کا خاص معیار پیش کرتا ہے، ابتداء میں اس حرارتی تغیر کا احساس مریض کو نہیں ہو پاتا، شام کا درجہ حرارت زیادہ اور صبح کا کم ہوتا ہے۔ غذا لینے کے بعد ہی بخار میں اضافہ ہو جاتا ہے، صبح کے درجہ حرارت میں اضافہ، سدرن رے میں زیادہ خطرناک علامت تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مریض کی قوت مدافعت کی شدید کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رات کو پسینہ خارج ہوتا ہے اور اس میں ایک مخصوص بو پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات مریض گلابیٹھنے کی شکایت کرتا ہے۔ یہ کیفیت تھکارٹ کی صورت میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے جو بعد میں ارتخود نائل ہو جاتی ہے۔

انتہائی مرحلے میں ناخن ٹوٹے ہو جاتے ہیں، بال گرنے لگتے ہیں، جلد عظم الجہہ پر کھینچی ہوتی ہے، پسلیاں ابھرتی ہیں، رخسارے سرخ ہو جاتے ہیں، حرارت غریزہ کے نقصان، طبیعت کی عاجزی اور اخلاط کے مزاج کے کسر کی وجہ سے پیر متورم ہو جاتے ہیں۔ بلغم کے خورد بینی معائنہ اور شعاع برقی کے ذریعہ اس مرض کی تشخیص آسانی کی جاسکتی ہے۔

اصول علاج

۔۔۔۔۔ عام بدن قوت اور اس کے واسطے سے قوت مدافعت میں اضافہ

کرنے والی دوائیں استعمال کرائیں۔

_____ حسب ضرورت مشتہبی ادویہ استعمال کرائیں۔

_____ پُر فضا مقام پر قیام کرائیں۔

_____ اگر ساتھ میں نزلہ بھی ہو تو سرارو کی فصد کھولیں۔

_____ بصورت دیگر سنگیاں لگوائیں۔

_____ ملحوظ رہے کہ اس مرض کا علامیاتی علاج Symptomatic Treatment

بھی ضروری ہے۔

_____ حالبس خون اور مند مل قروح دوائیں استعمال کرائیں۔

علاج

_____ خون آنے کی حالت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ: گیرو، سنجراحت، بسد سوختہ، دم الاخوین، ہر ایک ایک گرام۔ جملہ دواؤں کو پیس کر خمیرہ خشنخاش یا خمیرہ گاؤزبان ۲۰ گرام میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد بہداندہ ۳ گرام، عذاب ۵ دانہ، سپستان ۹ دانہ، پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

_____ خون کی زیادتی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ: تخم خرفہ ۱۲ گرام، نوشادر ۱۰ گرام، دونوں کو مٹی کے کوزے میں رکھ کر گل ملتانی سے گل حکمت کر کے ایک پیر تک جنگلی ایلوں کی آگ دیں، اس کے بعد نکال کر محفوظ کر لیں اور ۷۵ ملی گرام، ہمراہ شربت انجبار نوش کرائیں۔

_____ سنجراحت، دم الاخوین، مرجان سوختہ، سرطان سوختہ، بسد سوختہ، ہر ایک

ایک گرام، جملہ دواؤں کو پیس کر خمیرہ گاؤزبان ۲۰ گرام ملا کر کھلائیں۔

_____ گندھک آملہ سار ایک گرام، باریک پیس کر شربت اعجاز ۳۳ ملی لیٹر کے

ہمراہ نوش کرائیں۔

_____ عزی المسک ۳ گرام، نبات سفید ۳۰ گرام، شیر گاؤ میں جوش دے کر

چھان لیں اور نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ پھیپھڑوں میں اگر تدرن کی وجہ سے قرحہ پیدا ہو جائے تو صمغ عربی، کتیرا، رب السوس، شکر تیغال، رال سفید، سرطان محرق، ہر ایک ۵۲۵ ملی گرام، جملہ دواؤں کو پیس کر لعوق آب تر بوڑ لعوق خشخاش یا لعوق اسپغول میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد بہدانہ، گاؤزبان، تخم خطمی، ہر ایک ۳ گرام، عناب ۵ دانہ، سپستان ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت شفا ۳۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
نسخہ شربت شفا: گل سرخ، عناب، سپستان ہر ایک ۲۴ گرام، کا حسب دستور شربت تیار کریں۔

۔۔۔۔۔ مزاج میں رطوبت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ: کتیرا، مغز تخم خیار، مغز تخم تر بوڑ، ہر ایک ۳ گرام، صمغ عربی ۳۵ گرام، اصل السوس ۵ گرام، کافور ۵۰ ملی گرام، ہندل سفید ۳۱ گرام، قند سفید ۵ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ۳ گرام استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ تدرن رویہ کے مختلف مرحلوں میں درج ذیل نسخجات بھی مجرب ہیں۔
نسخہ: تخم خطمی، برگ گاؤزبان، ہر ایک ۱۲ گرام، بہدانہ، اصل السوس، مقشر، ہر ایک ۴ گرام، سپستان ۳۴ گرام، تخم خشخاش سفید ۴ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صاف کر کے شکر سفید ۵۰ گرام کے ساتھ قوام تیار کریں، قوام تیار کرنے کے آخری مرحلے میں صمغ عربی، کتیرا، رب السوس، ہر ایک ۴ گرام، ڈال کر خوب اچھی طرح ملائیں اور ۱۲ گرام کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ گل بنفشہ، زرد فائے خشک، گل یلغیر، ہر ایک ۵ گرام، گاؤزبان، بہدانہ، ہر ایک ۳۴ گرام، اصل السوس، مقشر ۱۲ گرام، پودست خشخاش ۴ گرام، سپستان ۲۵ عدد، عناب ۳۰ عدد، مویز بنقی ۵ دانہ، شکر سفید ایک کلو گرام، بہدانہ کے سوائے، جملہ دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو بہدانہ کو ایک پوٹلی میں باندھ کر شامل کر کے جوش دیں اور شربت تیار کریں اور نوش کرائیں۔
۔۔۔۔۔ جب جواہر کافوری ۳۴ عدد، ہمراہ بہدانہ ۳ گرام، عناب ۵ عدد، سپستان ۹ عدد، عرق مادا سبحین ۱۲۰ ملی لیٹر، جوش دے کر شربت فریادیں

۱۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ نسخہ حب جو اہر کا فوری درج ذیل ہے۔

نسخہ حب جو اہر کا فوری: مردارید ناسفتہ، زمرود، یاقوت رسانی، کہربا شمع، لعل بدخشاں، شب سفید، کافور قیصری، ہر ایک ۵۰ گرام، ریشہ بیج انجبار، صندل سفید، ہر ایک ۲ گرام، رب السوس، صمغ عربی، نشاستہ، کتیرا، گل نیلوفر، سرطان محرق، طباشیر سفید، پوست خشخاش، تخم خشخاش، گل گاؤزبان، ہر ایک ۵۰ گرام، زعفران ۵۲۰ ملی گرام، جو اہرات کو عرق گلاب میں صلا یہ کر کے باقی دواؤں کو کوٹ چکان کر شامل کر کے اچھی طرح سخت کریں اور دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں۔

۔۔۔۔۔ شیر خرد گدھی کا دودھ، حب کا فوری یا حب گل ارمنی کے ساتھ صبح

کو استعمال کرنا بھی سودمند ہے۔

نسخہ حب گل ارمنی: گل ارمنی، کہربا شمع، مغز تخم خیارین، مغز خربزہ، مغز تخم کدوئے شیریں، گل داغستانی، گل گاؤزبان، تخم خرفہ سیاہ، شادنج عدسی مفسول، ہوزن، جملہ دواؤں کو باریک کر خوب بنائیں۔

حب علوی خان، عورت یا گدھی کے دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔

نسخہ حب علوی خان: سرطان محرق، کتیرا، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم خشخاش سفید، طباشیر سفید، زعفران، صمغ عربی، گل داغستانی، ہر ایک ۳ گرام، کافور ۲ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چکان کر خوب بنائیں۔

درج ذیل نسخہ بھی مفید اور مجرب ہے۔

نسخہ: سرطان سوختہ ۱۲ گرام، کافور ۹ گرام، سنگ جراح، گل ملتان، زہر مہرہ، خطائی، کات سفید، کتیرا، شادنج عدسی مفسول، قرطاس سوختہ، ہر ایک ۸ گرام، صمغ عربی، نشاستہ، گل ارمنی، ہر ایک ۴ گرام، افیون خالص ۳ گرام، رب السوس ۲۴ گرام، کہربا شمع ۱۰ گرام، زعفران ۵۰ گرام، طباشیر، نقرہ، دم الاخوین، ہر ایک ۲۴ گرام، بسد، سفنج، شاج گوزن سوختہ، مردارید ناسفتہ، ہر ایک ۴۲ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چکان کر روغن کدوئے شیریں، روغن خشخاش، روغن بلساں، ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر، خوب اچھی طرح چرب کریں اور استعمال کرائیں۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ: تخم شبث، بیج انجبار، حب الآس، مغز تخم خیارین، مغز تخم کدوئے شیریں،

تخم خشخاش، مغز تخم خر بوزہ، تخم خرفہ سیاہ، پودست خشخاش، گاؤز بان، مگل خشخاش سفید، اصل السوس مقشر، جملہ دوائیں ہوزن، ان کو بارش یا دریا کے پانی میں بھگونے کے بعد جو ش دیں، پھر مل چکان کر نبت سفید ایک کلو گرام ملا کر قوام بنائیں اور استعمال کرائیں۔
درج ذیل نسخہ بھی فائدہ مند ہے۔

نسخہ: گاؤز بان ۱۵ گرام، اصل السوس مقشر، تخم کاسنی، برادہ مندل سفید، تخم خیارین، ہر ایک ۱۲۰ گرام، تخم خشخاش، تخم خرفہ سیاہ، تخم کاہو مقشر، ہر ایک ۶۰ گرام، مغز تخم کدوئے شیوس، مغز تخم تر بوز، ہر ایک ۳۸ گرام، آخر الذکر ۶ دو اؤں کا شیرہ نکالیں، گلو دسبو، مگل نیلوفر، ہر ایک ۱۲۰ گرام، خسا کئی، مکو، خشک، مگل سرخ، تخم خطمی، تخم بخاری، حب الاس مناب، بیج انجیر، بادیان، پودینہ خشک، ہر ایک ۳۶ گرام، صمغ عربی ۶ گرام، خس تھوڑا سا جملہ دوائوں کا حسب دستور ۳ لیٹر عرق کشید کریں اور حسب ضرورت نوش کرائیں۔

التهاب شعب

BRONCHITIS

اس مرض میں قصبتہ المریدہ (Trachea) کی شعب (Bronchioles) میں
غصوں طرح کا شدید التهاب پیدا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ شدید التهاب الانف (Acute
Rhinitis) یا التهاب حلقوم ہوتا ہے، کھانسی، تنگی نفس اور ضیق الصدر (Steno
Thorax) وغیرہ عوارض نمودار ہو جاتے ہیں۔

اقسام

التهاب شعب

Bronchitis

التهاب شعب مزمن
Chronic Bronchitis

التهاب شعب حاد
Acute Bronchitis

۱۔ اسکا دورانہ سال قرار دیا جاسکتا ہے تاہم اس میں زیادہ جامعیت نہیں ہے اسی لئے التهاب شعب تحریر کیا گیا ہے۔

اسباب

- (I) حنجرہ اور انفی غشاء مخاطی کا التهاب
- (II) شعبی انابیہ (Bronchial Tubes) میں خارجی اجسام کی موجودگی
- (III) ماسکی سرایت (Focal Infection) خاص طور سے جونی امراض Sinus Disease
- (IV) بعض متعدی امراض مثلاً
- (I) حمی محرکہ
- (II) حصہ
- (III) خناق و بانی
- (IV) انفلوئنزا
- (V) شہیقہ
- (VI) آتشک
- (VII) بعض امراض قلب جو دوران خون ریوی میں مزاحم ہوں
- (VIII) شراب کی مزمن سمیت
- (IX) التهاب کلیہ
- (X) اسٹرائنڈ یا مناعت کم کرنے والی دوائیں
- (XI) Steroids Or Immuno Suppressive Drugs
- (XII) Hypogammaglobulinemia
- (XIII) فعلیاتی / کیمیائی تحریک / حساسیت
- (XIV) ریوی کیفیت
- (XV) خارجی یا داخلی طور پر بردت سے متاثر ہونا
- (XVI) عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا
- (XVII) گرم کمروں میں بند رہنا
- (XVIII) غیر ضروری ملیوسات کا استعمال
- (XIX) ضعف / تکان
- (XX) نقص تغذیہ

(xxviii) احتباس حیف

(xxix) ضیق النفس

(xxx) وجع المفاصل

(xxxi) شبی غشاء مخاطی کی تھانس

(xxxii) فضائی آلودگی

(xxxiii) سمن مفرط

علامات

عمومی: تنفس تیز/سریع ہوتا ہے، سینہ متماثل (Symmetrical) اور عام طور سے متوسط درجہ کے بیش تمدد کی حالت میں ہوتا ہے، تنفس کے معاون عضلات (Accessory Muscles) قوی عمل کرتے ہوئے اور فعال نظر آتے ہیں۔ زفیر Expiration طویل ہوتا ہے، اور بعض اوقات شہیق (Inspiration) کے دوران میں اضافہ قضا میں قزع کرنے پر عام طور سے ایک طبعی گمگداز آواز (رنانیت = Resonance) نکلتی ہے، لیکن ہوائی حوٹھلوں (Air Vesicles) کے مارجنی بیش تمدد کے باعث بعض اوقات خفیف سی بیش رنانیت پائی جاتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ جمع شدہ مادہ یا ہبوط کے باعث رنانیت میں کمی واقع ہو جائے، شہیق اور زفیر کے درمیان صغریٰ خرخرے (Subilant Rhonchi) موجود ہوتے ہیں۔ قصبہ البریہ کی بڑی شاخوں میں التهاب کی صورت میں جسمانی حرارت میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے، حلق میں درد محسوس ہوتا ہے، عظم القص کے بالائی حصے کے پیچھے اور گردن کے نیچے حرارت، سوزش اور خراش محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی اٹھی ہے، اس حالت میں سینہ میں نشتری جھین کا احساس ہوتا ہے، کھانستے رہنے کی وجہ سے سینہ کے دونوں طرف کے عضلات میں درد ہونے لگتا ہے۔ مرض کی ابتداء میں کھانسی خشک ہوتی ہے اس کے بعد قلیل مقدار میں رقیق، صاف لیس دار بلغم خارج ہوتا ہے، بعد میں اس میں پیپ شامل ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ زرد اور مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

درم شعب شری کی صورت میں جسمانی حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، درد سر، تنگی تنفس اور قے کی شکایت ہوتی ہے، تنفس سریع ہوتا ہے اور تنفس کے وقت معده کا مقام اور پسلیاں دب جاتی ہیں، شدید کھانسی آتی ہے، خون میں نسیم (اکسیجن) کی کمی کی وجہ سے تشنجی علامات رونما ہو سکتی ہیں، بلغم لیس دار ہو جاتا ہے اور دشواری سے خارج ہوتا ہے۔

حادثہ: عمومی علامات کے ضمن میں بیشتر حادثوں کا تذکرہ آگیا ہے، تاہم تشنجی نقطہ نظر سے حادثوں کا علیحدہ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

مرض کی ابتداء میں کسی قدر سستی، ماندگی اور تنگی سینہ کا احساس ہوتا ہے اور کھانسی واقع ہوتی ہے، لیکن بلغم کا اخراج بالکل نہیں ہوتا، تحت الحاد صورت میں عام عوارض خفیف بلکہ صرف کھانسی تک ہی محدود ہوتے ہیں لیکن حادث صورت میں جسم کا درجہ حرارت ۱۰۱ سے زیادہ ہو جاتا ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، زبان پر فرج ہوتا ہے، امعاء کی کارکردگی میں سستی آجاتی ہے، پینتاپ قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، کھانسی ابتداء میں خشک ہوتی ہے نیز اس کی وجہ سے دھیساکہ عمومی علامات کے ذیل میں مذکور ہوا، عظم القص کے پیچھے اکثر درد ہوتا ہے اور بار (Strain) کی وجہ سے عضلات میں درد ہوتا ہے اور یہ بار دراصل جبری زفر (Forced Expiration) کا نتیجہ ہوتا ہے، بلغم قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے اور اس میں رقیق جھاگ دار شفاف مخاط شامل ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں خون کی دھاری بھی موجود ہوتی ہے، چند دنوں بعد کھانسی سہولت سے آنے لگتی ہے، اور مادہ تر یا وہ مقدار میں، غیر شفاف، زرد یا سبز خارج ہوتا ہے۔ اس قسم کے التهاب کی مدت تین چار ہفتہ تک رہتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

ہنرمند: التهاب شعب کی یہ صورت بوڑھوں میں اور موسم سرما میں کثیر التوجع ہے، مرضی عوارض التهاب شعب حادث جیسے ہی ہوتے ہیں تاہم ان میں حدت اور تیزی نہیں ہوتی، جسمانی درجہ حرارت بھی غیر معمولی نہیں ہوتا، دائمی کھانسی رہتی ہے، جس کے ساتھ رقیق جھاگ دار بلغم خارج ہوتا رہتا ہے، مزمن ہونے کی وجہ سے مستقل قسم کے ثانوی نتائج پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ انتفاخ السریہ اور غد و شعب

تفریقی علامات

اصول علاج

- ۔۔۔۔۔ نزلہ حاد کے اصول کے مطابق علاج کریں۔
 ۔۔۔۔۔ مخرج بلغم ادویہ استعمال کرائیں۔
 ۔۔۔۔۔ ملیں ادویہ کھلائیں۔
 ۔۔۔۔۔ پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں بلغم کے اجتماع کی صورت میں تھے
 لانے والی دوائیں کھلائیں۔
 ! ۔۔۔۔۔ امتلاء رہنے کی صورت میں قصد کھولیں۔

علاج |

• مخرج بلغم اود یہ استعمال کرائیں، چنانچہ اگر رفتی بلغم خارج ہو رہا ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ: تخم خطمی، تخم خبازی، ہر ایک ۷ گرام، بہدانہ ۳ گرام، سپستان ۹ دانہ، غلب ۵ دانہ، جملہ دواؤں کو جوش دے کر چھان لیں اور شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

• بلغم کے لیس دار اور بدقت خارج ہونے کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ: گل گاؤزبان، گاؤزبان، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۵ گرام، مصری ۲۴ گرام، جملہ دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

• پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں بلغم کے احتجاج کی صورت میں قے اود دوا / تدابیر سے قے کرائیں۔

• لعوق خشخاش، حب سعال، دیا قوزا، لعوق شمعون اور شربت اجمار وغیرہ استعمال کرنا بھی سودمند ہے۔

• تلین شکم کے لئے اطفیفل ملین کھلائیں

• گوند ببول، کثیرا، رب السوس، ہر ایک ایک گرام، ان کو بار یک

پیس کر خمیرہ خشخاش ۷ گرام ملا کر کھلائیں، اس کے بعد گاؤزبان ۳ گرام، کوکب ار ایک عدد، عرق گاؤزبان ۱۴۴ ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت خشخاش ۲۴ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

• کثرت بیوست کی صورت میں شیرہ تخم خیاریں، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ

تخم خرفہ، ہر ایک ۲ گرام، عرق گاؤزبان ۱۴۴ ملی لیٹر میں نکال کر شربت خشخاش ۲۴ ملی لیٹر شامل کر کے صبح، شام نوش کرائیں، اود شام کو حریرہ مغز بادام والا کھلائیں۔

• لعوق نرلی آب تر ہوز والا ۷ گرام، لعوق آب نیشکر ۷ گرام، حب خشخاش

ایک عدد ان میں سے کوئی ایک منہ میں رکھیں یا چٹائیں۔
 _____ غصہ، مداز، قفل، سیاہ، نمک، سنگ، جواکھاڑ، ہر ایک مساوی الوزن۔
 جملہ دواؤں کو سفوف کی طرح ہار یک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور ایک گولی منہ میں رکھ کر چوسنے کی ہدایت کریں۔
 _____ مغز گھیکو اور ۲۸ گرام، نچوڑ کر لعاب حاصل کریں اور کپڑے میں چھان کر قلعی شدہ دیگی میں ڈال کر آگ پر رکھیں، جب نصف رہ جائے تو نمک لا ہو رے سے ۳۶ گرام ملا کر چچہ سے ہلائیں، جب تمام پانی اڑ جائے تو ایک خشتی میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت ۲۵۰-۵۰۰ ملی گرام استعمال کرائیں۔
 _____ آرد، اصل السوس بریاں مقشر، ہر ایک ۹ گرام، کشتہ مرجان ۳۰ گرام، مرکی ۵ گرام، جملہ دواؤں کو ہار یک پیس کر میعہ سائلہ کی مدد سے چنے کی برابر گولیاں بنائیں اور منہ میں رکھ کر چوسنے کی ہدایت کریں۔
 _____ بیج بادریان، اصل السوس، پر سیا و نٹاں، زرد قلے خشک، ہر ایک ۵ گرام، مصری ۲۴ گرام، ان کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نیم گرم نوش کرائیں۔
 _____ میعہ سائلہ ایک گرام، پیس کر شہرہ ۲۰ گرام میں ملا کر لعوق ساینکر چٹائیں۔

نفث الدم

HAEMOPTYSIS

اس مرض میں حنجرہ، قصبۃ السریہ، مروق خشنہ اور ریہ سے، منہ کے راستہ خون، تھوک کے ذریعہ خارج ہوتا ہے

اسباب

امراض ریہ:

(I) دق و سل

(II) سینہ کی چوٹ

(III) شہیقہ

(IV) ذات السریہ

(V) ذات السریہ شعی

(VI) فانغریا ریوی

(VII) انسداد ریہ

(VIII) سلعتہ السریہ

(IX) ربیلہ صدری

(X) خراج ریہ

امراض قصبۃ الریہ وعروق خشنہ:

(I) التهاب شعی

(II) اتساع شعب

(III) اور طی کے انور سما کا قصبۃ السریہ میں کھلنا

(IV) مسموم ہواؤں میں سانس لینا مثلاً کلورین اور مسٹرڈ گیس وغیرہ میں

(V) سرطان عروق خشنہ

امراض حنجرہ:

(I) التهاب حنجرہ حاد

(II) قروح دئی حنجری

(III) قروح تشکی حنجری

(IV) سلعہ حنجرہ

(V) مزیدہ و سقط حنجرہ

امراض دوران خون:

(I) ضیق صمام تاجی

- (II) قلبی صدمات
(III) تصلب شرائین / تکلس شریان
(IV) خون کے دباؤ کی ساری صورتیں
(V) تکلس شریان

امراض دموی:

- (I) فرفورا
(II) اسکرلوط
(III) ابیاض الدم
(IV) قلت الدم خبیث
(V) مزاج نرنفی / دموی
(VI) خون کا کسی عضو میں ہضم ہو کر معدوم ہو جانا

متفرقات:

- (I) حیض کی بے اعتدالی (احتباس طمث)
(II) وجع المفاصل
(III) دار الرقص
(IV) امتلاء عروق دموی
(V) غلبہ برودت / یبوست / رطوبت / حرارت
(VI) احتباس خون بواسیر
(VII) دوران خون کو تیز کرنے والی ادویہ و اغذیہ کا استعمال
(VIII) کثرت و دزرش
(IX) بعض طفیلی اجسام

نفث الدم سے قبل کوئی یقینی علامت ہنقدمہ کے طوعہ پڑے عام طور
سے نہیں پائی جاتی، تاہم بعض لوگوں میں، نفث الدم سے قبل سستی

علامات

ماہرگی اور پست ہمتی ہوتی ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، ذائقہ نمکین ہوتا ہے، گلے میں سرسراہٹ اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔ سینہ میں درد اور عمل تنفس میں دشواری ہوتی ہے، قلب میں سوزش سی محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد نفث الدم کھانسی کے ساتھ عارض ہوتا ہے، یہ دو چار قطرے سے لے کر کثیر مقدار تک خارج ہو سکتا ہے، اس میں بلغم کی آمیزش بھی ہوتی ہے، شدید نفث الدم میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

واقع رہے کہ نفث الدم عام طور سے دوسرے امراض کی تشخیصی علامت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ دق و سل میں، نفث الدم ایک ابتدائی تشخیصی علامت تصور کیا جاتا ہے، اس میں خون کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو بلغم میں صرف ایک سرخ لکیر سی ہوتی ہے اور کبھی ۱۰۰-۱۵۰ ملی لیٹر خون خارج ہو جاتا ہے۔ سعال مزمن، ضعف، ہزال اور وزن میں کمی کی روئیداد ملتی ہے، رات میں خوب پسینہ خارج ہوتا ہے، سینے پر پسینہ نسبتاً زیادہ نکلتا ہے، نیز سینہ لاغر اور مسطح ہو جاتا ہے۔

ضیق صمام تاجی کی صورت میں اگر ضعف قلب بھی ہو تو نفث الدم نہایت خراب تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں نفث الدم سدہ دموی یا سدہ شریانی سے انسداد کی وجہ سے ہوتا ہے، چنانچہ انسداد سدہ دموی میں نفث الدم بغیر کسی دوسری علامت کے رونما ہوتا ہے اور انسداد شریانی کی صورت میں یک بیک مقام انسداد پر شدید درد ہوتا ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔

تصلب الشریہ حرقی کی صورت میں خارج ہونے والے خون کی مقدار قلیل ہوتی ہے اور مرلیض کی ذاتی حالت سے اس کی تشخیص باسانی کی جاسکتی ہے۔ چوٹ اور ضرب کی صورت میں، ان کی روئیداد ملتی ہے۔

ذات الشریہ کی صورت میں خون قلیل مقدار میں، کھانسی کے ساتھ آتا ہے، جس کے ساتھ غلیظ اور لیس دار بلغم بھی ہوتا ہے اور خون صرف اتنی ہی مقدار میں آتا ہے کہ بلغم کا رنگ زنگاری بھر ہو جائے اور بس، بعض اوقات بلغم کا رنگ خون کی وجہ سے سرخ بھی ہو جاتا ہے، مرضی علامت (نفث الدم) یک بیک رونما ہوتی ہے۔ بخار شدید اور متواتر رہتا ہے، ابتدائی میں پہلو میں شدید درد ہوتا ہے، تنفس کی رفتار انہض کے تناسب سے زیادہ ہوتی ہے۔

قصہ الریہ کے مرض کی صورت میں نفث الدم معمولی کھانسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور زرخرے کی اونچی ٹہری میں معمولی درد بھی ہوتا ہے۔ نفث الدم ریہ سے ہو تو شدید کھانسی کے ساتھ ہوتا ہے، نیز خون دفعاً زیادہ مقدار میں، زعفرانی رنگ کا کف دار اور بغیر کسی درد کے خارج ہوتا ہے۔

عروق ریہ سے ہونے والے نفث الدم میں خون میں حرارت ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں جھاگ دار ہوتا ہے۔

عروق کے ٹوٹنے یا پھٹنے کی صورت میں خون زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، چنانچہ اگر خون کی حدت کی وجہ سے عروق میں اشتقاق ہوا ہو تو خون میں حدت اور گرمی ہوتی ہے اور حدت دم کی تدابیر کی روئیداد ملتی ہے۔ حدت دم کی وجہ سے قرحہ ہو جانے کی صورت میں خارج ہونے والا خون گرم اور اتہار میں قلیل مقدار میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار جاری ہو جاتا ہے اور بد رنگ ہوتا ہے۔ امتلاء دموی کی صورت میں خون زرد آب کے ساتھ آتا ہے اور اس میں درد نہیں ہوتا۔ اور اس کے اخراج سے مریض راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔

تفریقی علامات

نفث الدم	فی الدم
۱۔ خون کھانسی کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور خون ٹھوکتا ہے، اور صدی علامات ہوتی ہیں،	۱۔ خون کھانسی کے ساتھ خارج نہیں ہوتا، خون کی تپ ہوتی ہے اور صدی علامات ہوتی ہیں،
۲۔ خون کار و عمل کھاری ہوتا ہے،	۲۔ خون کار و عمل تیزابی ہوتا ہے،
۳۔ خلل ریہ کی روئیداد ملتی ہے،	۳۔ خلل معدہ کی روئیداد ملتی ہے،
۴۔ نفث کے بعد کھانسی اور نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے،	۴۔ کھانسی اور نقاہت زیادہ نہیں ہوتی،
۵۔ صدر میں لفظ کی موجودگی ہوتی ہے،	۵۔ صدر میں لفظ موجود نہیں ہوتی،
۶۔ خون سیال، سرخ اور جھاگدار ہوتا ہے،	۶۔ خون سیاہ اور نیمہ ہوتا ہے،

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ۷۔ خون میں کسی بھی چیز کی آمیزش | ۷۔ خون میں غذا اور صفراء کی آمیزش |
| نہیں ہوتی، | ہوتی ہے، |
| ۸۔ پانی میں آہستہ آہستہ تنہہ نشین | ۸۔ پانی میں بہت جلد تہہ نشین ہو جاتا |
| ہوتا ہے، | ہے، |

اصول علاج |

- منہ یا حلق سے خون آنے کی صورت میں قابض ادویہ سے غرغره کرائیں
- امتلاء سر کی صورت میں فصد پچھنے اور سنگھیاں، عمل میں لائیں،
- خفیف امتلاء میں قابض ادویہ استعمال کرائیں،
- ریہ، صدر، خنجرہ اور قصبہ سے خارج ہونے والے خون میں بھی قابضات استعمال کرائیں،
- ملیقات استعمال کرائیں،

علاج |

- منہ سے خون آنے کی صورت میں برگ مورد، شب یمانی، مازو، گلنار کے جو شانہ سے غرغره کرائیں
- منہ میں کوئی تازہ زخم ہو تو اس پر دم الانجورین اور کندر چھڑکیں اس سے جریان بند ہو جاتا ہے۔
- داخلی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
- نسخہ: لعاب رینتہ برگدہ گرام، شربت خشتخاش ۲۴ ملی لیٹر میں ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔
- مائیں کلاں، عصارة لیمونہ، التیس، برگ مورد اور پوست لٹار کے جو شانہ سے غرغره کرائیں۔
- قرص نفث الدم کھلائیں، نسخہ درج ذیل ہے۔

نسخہ قرص نفث الدم: گل ارمنی، گوند ببول، دم الاخوین، ہسلوچن،
کھربا، گلنار، عصارہ لحيۃ التیس، کتیرا، نتاستہ، اقا قیا، آب غرقہ، آب بارتنگ۔
۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ اطباء دہلی کے معمولات مطب میں رہا ہے۔

نسخہ غرقہ: کوکنار، گلنار، کشتیز خشک، مازوئے سبز، شب یمانی
ہریاں، ہر ایک ۴ گرام۔ جملہ دواؤں کو پانی میں جوش دے کر غرقہ کرائیں۔
صرف شب یمانی کو ہی پانی میں حل کر کے حلق میں ٹپکا سکتے ہیں۔
۔۔۔۔۔ داخلی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مشروب: گیر و شگراحت، دم الاخوین، ہر ایک ایک گرام، خمیرہ
خشخاش، گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد لعاب بہدانہ، شیرہ تخم خرفہ سیاہ،
ہر ایک ۳ گرام، کتیر، حب الاس، ہر ایک ۲ گرام، عرق گاؤزبان ۱۴۴ ملی لیٹر،
میں نکال کر شربت اعجاز ۲۴ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
۔۔۔۔۔ غذا کے بعد ست کافور ۴۔۵ قطرہ ہمراہ آب نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ سرکہ میں کپڑا بھگو کر سر پہ رکھیں۔

۔۔۔۔۔ یہ سب خون آنے کی صورت میں صافن اور باسلیق کی فصد کھلیں
اور بڑھ لیوں پر سنگھیاں کھینچیں۔ گدی پر پچھنے اور سنگھیاں کھینچنا بھی مفید
تصور کیا جاتا ہے، خاص طور سے جب خون کوئے یا حلق سے آرہا ہو۔
۔۔۔۔۔ برگ خرفہ کھلائیں

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ بھی نہایت مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ: گل ارمنی، گل مختوم، گل سرخ، طباشیر، تخم خرفہ، شادنج، ہر ایک
۵ گرام۔ کھربائے شمعی، رب السوس، عصارہ لحيۃ التیس، صمغ عربی، اسپغول
مسلم، گلنار فارسی، تخم خشخاش، ہر ایک ۳ گرام، قیون ۲ گرام، اسپغول کے
علاوہ جملہ دواؤں کو باریک سفوف بنائیں اور اس کے بعد اسپغول شامل کریں
اور صبح کے وقت ۴ گرام، ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل لعوق بھی کار آمد اور مجرب ہے۔

نسخہ لعوق انجبار: بیج انجبار ۲۳ گرام، تخم عظمیٰ، سپستان، تخم خبازی،

ہر ایک ۲ گرام، کوکنا مسلم ۵ عدد، بہدانہ ۹ گرام، اصل السوس مقشر ۳ گرام، صواب ۲۰ دانہ، جملہ دواؤں کو رات میں آب پیٹھ مشوی، آب کدو مشوی، ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر میں بھگو کر صبح کو جوش دیں اور مل چھان کر نبات سفید ۵۰ گرام شامل کر کے قوام تیار کریں، اس کے بعد کھرباشمعی، رب السوس، دم الاخوین، طباشیر، گل ارمنی، ہر ایک ۷ گرام، صمغ عربی، کثیرا ہر ایک ۹ گرام کا اضافہ کریں اور حسب ضرورت ۷ گرام چٹائیں۔

۔۔۔ نفث الدم کا جب سبب معلوم نہ ہو تو یہ نسخہ ضرور استعمال کرائیں۔
نسخہ: دم الاخوین، سبکجرات، بعد سوختہ، کھربائے شمعی، مرجان سوختہ، یشب، ہر ایک ایک گرام، مروارید سائیدہ ۱۲۵ ملی گرام، جملہ دواؤں کا سفوف بنا کر شربت انجبار ۳۲ گرام ملا کر لعوق تیار کریں اور تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔
۔۔۔ شلوج عدسی کو خوب باریک پیس کر حسب ضرورت بھنکا میں اس کے بعد آب برگ خرفہ سبز نوش کرائیں۔

۔۔۔ گل ارمنی، دم الاخوین، کثیرا، اقیاقیا، گلناہ فارسی، تخم کاہونہ شاستہ، انجبار، ہر ایک ۳ گرام، طباشیر، کھربا، ہر ایک ۲ گرام، تخم خرفہ، تخم خشتیاش، ہر ایک ۱ گرام، بورہ صندل سفید ۳ گرام، کافور ایک گرام، صدف سوختہ ۵ گرام۔ جملہ دواؤں کو پیس کر چوراک بنائیں اور ایک خوراک، ہمراہ شربت اعجاز ۳۸ ملی لیٹر، بوقت خواب کھلائیں۔
۔۔۔ بہدانہ مقشر ۳ گرام، کاہونہ، کشنیز خشک، ہر ایک ۳ گرام، تخم خرفہ ۵ گرام، تخم خشتیاش ۱ گرام، انجبار، خیاریں، ہر ایک ۷ گرام، برگ بانسہ، بنفشہ، نیلوفر، ہر ایک ۹ گرام، صندل سفید ۲ گرام، بارتنگ ۵ گرام، نبات سفید ۳۲ گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور استعمال کرائیں۔

شہیقہ

WHOOPING COUGH

قصبتہ اسرہ اور بالائی تنفسی گزرگا ہوں کا یہ انتہائی متعدی مرض ہے جس میں شدید قسم کی تشنجی کھانسی آتی ہے، اور کھانسی کے بعد ایک طویل کھنچا ہوا شہیقہ
Inspiration

مسدود مزمار (Glottis) کے راستہ سے عمل میں آتا ہے، جس سے 'ہوپ' یا مرغی کی آواز Crowing Noise پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرض ۲ — ۸ سال تک کے بچوں میں اور لڑکوں کی بہ نسبت لڑکیوں میں کثیرالوقوع ہے۔

اسباب

- (I) ہیوفیلس پرنس (Bordetella Pertussis/Hoemophilus)
 (II) عمومی قحطی تنفسی امراض
 (III) حصیہ کے ساتھ یا اس کے بعد

علامات | مرضی علامتوں کو عام طور سے تین درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ہر درجہ عام طور سے دو ہفتہ مشتمل ہوتا ہے۔
 (I) نزلہ درجہ: خفیف نزلہ جو قابل شناخت نہیں ہوتا، خفیف یا کسی قدر بڑھی ہوئی کھانسی، اور جسمانی حرارت میں معمولی اضافہ، سینہ میں چند خرمصرے (Rhonchi) ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانسی کے ساتھ بار بار زفیری Expiration کوشش بھی ہوتی ہے۔ جو شبہیہ (Pertussis) کے شبہ کی ایک وجہ بن سکتی ہے، — یہ نزلہ درجہ (Catarrhal Stage) یا ابتدائی التهاب شعبہ عام طور سے ۷-۱۰ دن پر محیط ہوتا ہے۔

(II) شمیچی/نوبتی درجہ: دوسرے ہفتہ کے اختتام پر نزلہ لای کی کیفیات مغلوب ہو جاتی ہیں اور مرض کی نوبتی اور تشنجی علامات رونما ہوتی ہیں، کھانسی آتی ہے، کھانسی کا دورہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض بڑھال ہو جاتا ہے، کھانسی کے دورہ کی تحریک بچے کے رونے، حلق میں کسی چیز کے دغہ نہ پہنچانے، گرم دوغبار میں سانس لینے اور بعض اوقات غدا نگلنے اور پانی پینے سے ہو سکتی ہے۔ ابتداء میں کھانسی کے بعد ایک طویل، کھنچا ہوا شہیق ہوتا ہے پھر ہوپ (Whoop) کی مخصوص تشنجی آواز آتی ہے ویسے کھانسی کی نوعیت بھی مخصوص ہوتی ہے جس سے عام طور پر مرض کی تشخیص آسانی ہو جاتی ہے۔

دورہ سے قبل اگر بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کو نوبت کا احساس ہوتا ہے تو وہ ایک بیک ٹھہر جاتا ہے۔ ایک لمحہ کے لئے گھبرا یا ہوا اور متوحش نظر آتا ہے، پھر دوڑ کر ماں یا بڑے بھائی، بہن دایہ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، ابتداً میں ایک مختصر سی تاہم مکمل کھانسی آتی ہے اس کے بعد پے درپے کھانسیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور درمیان میں سانس اندر داخل کرنے (Inspi - ration) کا عمل نہیں ہوتا۔ سلسلہ کی ہر کھانسی بعد میں آنے والی کھانسی نسبتاً کم پُرد شور اور زیادہ گھٹی ہوتی ہوتی ہے، یہاں تک کہ چند لمحہ کے عرصے میں ہی کھانسیوں کی تعداد بڑھ کر پندرہ، بیس، سانس باہر نکالنے (اخراجی کوشش) جیسی کوشش کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر پُرد شور خنجر کی آواز کے ساتھ ایک طویل، کھنچا ہوا شہیق ہوتا ہے جو دراصل پے درپے تنفس کی اخراجی کوشش کے نتیجے میں خارج شدہ ہوا کا، انجذابی بدل ہوتا ہے اور ”ہوپ“ کی آواز آتی ہے۔ یہ بات بھی قابل تحریر ہے کہ ”ہوپ“ کی یہ مخصوص آواز زیادہ عمر والے بچوں میں، جن کا مجری تنفس مزمار کشادہ ہو، مفقود بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی مرض کی تشخیص پے درپے کھانسی آنے اور تنفس کی اخراجی کوشش سے آسانی ہو جاتی ہے۔ بہر حال اس کے بعد مختصر کھانسیوں کا ایک دوسرا دورہ، ایک دوسری ”ہوپ“ کے ساتھ واقع ہوتا ہے، یہ سلسلہ ایک یا دو بار نسبتاً کم شدت اور کم شور کے ساتھ واقع ہو سکتا ہے، اور آخر میں تھوڑا سا لیس دار بلغم خارج ہوتا ہے یا قے ہو جاتی ہے اور دورہ ختم ہو جاتا ہے،

کھانسی کے دوران چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں بس ابھی ابل پڑیں گی۔ شہیق سے بھی کچھ راحت نہیں ملتی، اس کے بعد جب لیس دار بلغم خارج ہو جاتا ہے یا قے ہو جاتی ہے تو راحت محسوس ہوتی ہے، ورنہ بچہ تو اس تفتیح کھانسی کے ہاتھوں بے حس، ٹنڈھال اور بے حال ہو جاتا ہے۔ کھانسنے کی کوشش کے دوران جو مزاحمت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں نرف (Haemorrhage) یعنی ناک منہ اور مسوڑھوں سے جریان خون ہوتا ہے۔ بعض اوقات نرف دماغی بھی واقع ہو جاتا ہے۔ بلغم کی عروق پھٹ جاتی ہیں، پیشاب اور پاتخانہ بھی غلط ہو سکتا ہے، تشنج بھی

واقع ہو سکتا ہے۔ سینہ کے اندر خون کی واپسی میں متواتر مزاحمتوں کے باعث چہرہ متورم نظر آتا ہے، کھانسی کے دوران ثنا یا د Inciso Teeth کے دباؤ سے زبان کے نیچے کی چنٹ دلجامہ اللسان = Fraenum Linguae پر ایک چھوٹا سا زخم بن جاتا ہے۔

جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، دورے کی تعداد تین یا چار اصل ہولپوں Whoops پر مشتمل ہوتی ہے، دورہ ۲۳ گھنٹے میں کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، تاہم مشاہدہ یہ ہے کہ دن کی نسبت رات میں ۶ بجے شام سے ۶ بجے صبح کے درمیان زیادہ واقع ہوتا ہے، ان کی تعداد ۲۴ گھنٹوں میں ۶۰ تک ہو سکتی ہے، لیکن ۴۰ دوروں سے زیادہ کا وقوع شاذ ہی ہوتا ہے بلکہ ۲۰-۲۵ ہی کثیر الوقوع ہے۔ شہیقہ کا یہ دوسرا شہیقی/نوبتی درجہ ۲-۶ ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، بعض حالات میں تین ماہ سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔

د انحطاطی/نفاہتی درجہ: شہیقی/نوبتی درجہ کی علامتوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، نوبت دیر سے آتی ہے اور نوبت میں جوں جوں کمی واقع ہوتی ہے، اس کے ساتھ سادہ کھانسی اس اضافہ ہوتا جاتا ہے جس میں ہوپ نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے، تاہم سادہ کھانسی ہفتوں بدل کے طور پر ستاتی رہتی ہے۔ مدت حضانت: ۷-۲۱ دن، عام طور سے ۱۴ دن ہی ہوتی ہے۔

اصول علاج

- ۔۔۔۔۔ درم شعب قصہ کا اصول علاج اختیار کریں۔
- ۔۔۔۔۔ منفث و مخرج بلغم ادویہ استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ قی آور دواؤں کے ذریعہ قے لائیں۔

علاج

- ۔۔۔۔۔ لوبان ۱۲۵ ملی گرام، باریک پیس کر خمیرہ گاؤز بان ۱۲ گرام میں

ملا کر کھلائیں اور درج ذیل جو شانہ نوش کرائیں۔

نسخہ جو شانہ ۵: اصل السوس مقشر، پرسیاؤشان، باقلا، ہر ایک ۵ گرام، پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ: ساکڑا سنگھی، زنجبیل نیم بریان، دار فلفل، ہر ایک ۴ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف حاصل کریں اور ۱۲۵ ملی گرام، ہمراہ شہد خالص گھینپ کر چٹائیں۔

۔۔۔۔۔ مغز بادام شیریں مقشر، مغز جلیغوزہ، تخم کتان، ہر ایک ۵ گرام، پیپل، کاکڑا سنگھی، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کا سفوف بنا کر تین گنا شہد خالص ملا کر ۲۰۲ گرام دن میں چند مرتبہ کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ حب کندر بھی مستعمل ہے۔

نسخہ حب کندر: کندر، آرد باقلا، مغز بہدانہ، ہر ایک ۷ گرام، ترنجبین، کثیرا، رب السوس، گل بنفشہ، ہر ایک ۵ گرام، مویزہ منقی ۳۴ گرام، انیسون، مغز بادام تلخ مقشر، قند سفید، ہر ایک ۲ گرام، جملہ دواؤں کا سفوف بنا کر لعاب اسپغول کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت ایک، ایک گولی چوسنے کی ہدایت کریں۔

۔۔۔۔۔ بہدانہ، بنفشہ، ہر ایک ۵ گرام، برگ گاؤز بان، تخم خبازی، ہر ایک ۳ گرام، سپستاں ۵ دانہ، عناب ۴ دانہ۔ جملہ دواؤں کو عرق گاؤز بان اور عرق مکود، ہر ایک ۵ ملی لیٹر میں جوش دے کر شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ روغن نار جیل ۴ ملی لیٹر، ۷ دن تک دن میں تین بار نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ حب شہیقہ ۲۱ عدد پانی میں گھول کر چھ سے نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ لعوق شہیقہ، ۴ گرام صبح، سہ پہر اور شام کو چٹائیں۔

۔۔۔۔۔ قیر وطنی سرخ ۱۰ گرام، روغن زیتون شمع ۱۲ ملی لیٹر میں ملا کر سینہ

پر ملیں۔

امراض صدر


Learn Unani By Abdul Waris Salman

تقیج الصدر

EMPYEMA THORACIS

اس مرض میں حجاب الریہ رغشاء الریہ کے تمام یا کچھ حصہ کے جوف میں رقیق یا کسی قدر غلیظ پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ ریوی امراض میں یہ ایک نادر الوقوع مرض تصور کیا جاتا ہے۔

اقسام



اسباب

- (I) ذات الریہ
- (II) خراج ریہ
- (III) تدرن ریہ
- (IV) شعبی حجاب ریوی ناسور
- (V) ضلعی، صدری عمود الفقاری خراج
- (VI) دیا فرعی قرعہ
- (VII) ویلہ صدر
- (VIII) مری کے زخم
- (IX) صدر کے گہرے زخم

(X) تقيح الدم

(XI) عفونت دم

(XII) نزله وبائی

(XIII) اکٹی نو مائی کوکس

(XIV) سرطان ریوی مع حجاب الریه

(XV) ریوی عملیہ (آپریشن)

(XVI) جسم غریب

(XVII) انتفاخ شعب

علامات

عمومی: تقيح الصدر عام طور سے کسی دوسرے مرض کا ثانوی مرحلہ ہوتا ہے اور ذاتی یا ابتدائی طور پر شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں لسانی انسکابی التهاب غشاء الریه جیسی علامات رونما ہوتی ہیں، سینہ میں ثقل اور درد محسوس ہوتا ہے، خشک کھانسی آتی ہے، سانس پھولتا ہے، پیپ کے مقام پر بوجھ درد، تناؤ اور سوزش محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات بلغم بھی خارج ہوتا ہے۔

حاد: بخار کے ساتھ لرزہ بھی ہوتا ہے، کسی میکائی عمل کی صورت میں ابتداء ہی سے حجاب الریه میں درد ہوتا ہے، عسر التنفس اور کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، بلغم خارج ہوتا ہے، قسم کی صورت میں کرب و اضطراب، قلت اشتہار ہوتا ہے، پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے، جسم کا وزن کم ہونے لگتا ہے، انگلیاں ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں اور آغاز مرض کے ۱۳-۲۱ دن بعد ان کے غیر ارادی طور پر آپس میں ملنے کا عمل اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔

ہذہن: سینہ میں درد اور بخار ہوتا ہے، وزن میں کمی آجاتی ہے، قلت الدم کی شکایت ہوتی ہے، یقین کی وجہ سے سینہ میں بد وضعی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھ اطفال کلیہ اور امعاء میں فساد بھی ہوتا ہے۔

رطوبتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رطوبت کے ترشح کے ابتدائی مرحلوں میں کھانسی،

’کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں‘، رطوبت قدرے مکدر، نیم شفاف، کسی قدر غلیظ، بالائی کی مانند ہوتی ہے، اس کی رنگت پہلی عنبری، سبز یا سبزی مائل سفید ہوتی ہے، پو یا تو بالکل نہیں ہوتی یا نہایت متعفن قسم کی بو آتی ہے۔ غافرا نا کے بعد ثانوی طور پر عارض ہونے والے تقيج الصدر میں قیح کا قوام رقیق اور نہایت متعفن ہوتا ہے، اور ذات السریہ کے تعدیہ کی صورت میں پیپ کا رنگ مختلف ہوتا ہے، قوام غلیظ نیز معمولی سی شیریں بو ہوتی ہے اور شعب قصبہ کی غدد جاذبہ بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں تقيج الصدر اور ذات الجنب رطوبی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ذات الجنب رطوبی	تقيج الصدر
۱۔ سردی لگنے اور بھیگ جانے کے بعد شدید حملہ کی روئیداد ملتی ہے،	۱۔ ذات الجنب، ذات السریہ، سل اور عام جسمانی ضعف کی روئیداد ملتی ہے،
۲۔ عام جسمانی حالت اچھی ہوتی ہے،	۲۔ علامات عمومی بہت نمایاں ہوتی ہیں،
۳۔ مناسب دوائی علاج سے رطوبت ختم ہو جاتی ہے۔	۳۔ اجتماع رطوبت، جیب تک کہ ان کا اخراج عمل میں نہ آوے،
۴۔ اخراج مادہ میں صرف رطوبت لمعاویہ خارج ہوتا ہے،	۴۔ اخراج مادہ میں پیپ خارج ہوتی ہے،
۵۔ رطوبت کے نیچے صوت صدری موجود ہوتی ہے،	۵۔ رطوبت کے نیچے صوت صدری معدوم ہوتی ہے،
۶۔ حرارت شاذ و نادر ۱۰۲ سے زیادہ ہوتی ہے،	۶۔ حرارت عام طور سے ۱۰۴ تک ہوتی ہے،
۷۔ قشعریرہ اور پسینہ کی شکایت نہیں ہوتی،	۷۔ قشعریرہ اور بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے،

اصول علاج

۔۔۔ جسم کے تنقیہ کے لئے منفعی، سہیل استعمال کرائیں۔

- _____ فصد کھولیں۔
- _____ ذات الریہ کا اصول علاج اختیار کریں۔
- _____ اضمدة حارہ رکھوائیں۔
- _____ حقنہ کرائیں۔
- _____ سینہ پر عمل کٹی کریں۔

علاج

- _____ قحج (پیپ) کو رقیق بنانے کے لئے زوفا، انجیر، سپستان، اصل السوس، پد سیاؤشاں، مویز منفی، جوش دے کر روغن بادام، کتیرا، نبات سفید، ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد مذار ت بول، تخم خیارین وغیرہ استعمال کرائیں۔
- _____ برگ کرنب، برگ بادیاں کا ضماد لگائیں
- _____ آرد جو، ملک البطم، انجیر خشک، خرما، شراب شیریں میں جوش دے کر استعمال کرائیں۔
- _____ جلیہ، تخم کتان، عظمیٰ، آرد باقلا، کرنب، انجیر کا ضماد لگائیں۔
- _____ سینہ میں، پیپ کے مقام پر باریک مکواة سے چھوٹے چھوٹے داغ دیں۔

جمود الصدر

PULMONARY APPOPLEXY

اس مرض میں عضلات و مجاہب صدر نیز غشاء الریہ، سرد اور کثیف ہو کر سکڑ جاتے ہیں جس سے ان اعضاء میں ایک طرح کا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ طبعی طور پر پھیلنے اور سکڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، بشرق (اچھو لگنا) جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور گردن سیدھی کئے بغیر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ شدید عوارض میں بروت قلب و ریہ اور جیس تنفس ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔

اسباب

- (I) سینہ میں سرد ہوا یا کسی اور طرح کی برودت پہنچنا
- (II) بلغم لزج کا اجتماع
- (III) افیون استعمال کرنا
- (IV) سینہ درد
- (V) سسہ یا پارہ گچھلاتے ہوئے گلاتے وقت دھواں منہ میں چلا جانا

علامات اسباب مرض موجود ہوتا ہے، قلب اور ریہ میں بردی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جن سے ان کے طبعی افعال میں خلل واقع ہوتا ہے، سینہ میں ثقل محسوس ہوتا ہے، تنصاف تنفس کی شکایت ہوتی ہے، تنفس قصیر ہوتا ہے، پیشاب سفید اور غلیظ خارج ہوتا ہے، اطراف سرد پڑ جاتے ہیں، نبض بھلی چلتی ہے، غشی بھی عارض ہو سکتی ہے۔ خندید عوارض میں جیس تنفس، احتراق روح، نیز سینہ کی بعض عروق کے پھٹ جانے کی وجہ سے نفث الدم ہو کر مرہقن قوت ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- _____ روغنیاتِ حارہ کے ذریعہ صدر میں حرارت پیدا کریں۔
- _____ گرم ضماد اور مشروباتِ حار استعمال کرائیں
- _____ اگر حالاتِ اجابت دیں تو اعلیٰ درجہ کے یارجات سے جسم کا تنقیہ کریں۔

علاج

- _____ روغنیاتِ حارہ مثلاً روغن قسط، روغن سوسن، ہمراہ جند بیدستر، ہر ایک ۳ ملی لیٹر کی سینہ پر مالش کریں۔
- _____ سد اب، صعتر، پودینہ، حلقیت، افسنتین، جند بیدستر کا شہد اور روغن اخروٹ کے ذریعہ مناد کریں۔

- _____ شراب کہنہ میں تھوڑی مقدار میں حلیت حل کر کے نوش کرائیں۔
- _____ تر یا ق فاروق کھلائیں۔
- _____ دار چینی، ہیل خورد، جدوار اور عود صلب کا جو شانہ نوش کرائیں۔
- _____ معجون فلاسفہ ۲۰ گرام، ہمرہ عرق عنبر ۱۱ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
- _____ چند بیدستر ۲۰ گرام، ہمرہ شہد ۲۰ گرام کھلائیں۔
- _____ جوز بوا، بسباسہ ہر ایک ۲۰ گرام، جوارش جالنیوس ۲۰ گرام میں ملا کر کھلائیں۔
- _____ ہیل، قرنفل، بسباسہ، ہمرہ مار العسل استعمال کرائیں۔
- _____ روغن بلساں سے مالش کریں۔
- _____ اکلیل الملک، حلبہ، انیسون، مصطکی، سنبل الطیب، کرفس، ہوزن کوکوٹ
- _____ چھان کر روغن زعفران اور روغن بان میں حل کر کے سینہ پر مالش کریں۔
- _____ روغن بابونہ اور نطفہ کی مالش کریں۔
- _____ روغن اور کپڑا گرم کر کے تکمید کریں۔
- _____ بابونہ، اکلیل الملک، بادیان، مکوہ، جوز بوا، ہر ایک ۲۰ گرام۔ برگ
- _____ نیم، بیخ انگشت، انیسون ہندی، ہر ایک ۱۰۸ گرام، جملہ دواؤں کو پانی میں جوش
- _____ دے کر سینہ پر تکمید کریں۔
- _____ جوز بوا منہ میں رکھنا بھی سود مند ثابت ہوا ہے۔
- _____ حلیت قلیل مقدار میں، شراب کہنہ، مار العسل یا اسی طرح کے کسی
- _____ دوسرے عرقیات میں حل کر کے تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

استسقاء الصدر

HYDRO-THORAX

اس مرض میں حجاب المریہ کے جوف میں زرد آب / سیال جمع ہو جاتا ہے جس میں معمولی مقدار میں رطوبت، بیضیہ اور فائبر نیوجین بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض عام طور

سے دیگر عضوی استسقاء کے ساتھ ہوتا ہے۔

اسباب

- (I) التهاب کلیہ
- (II) قلب کا شدید قسادی شمی
- (III) التماع القلب
- (IV) احتقان دموی وریدی عام / مقامی
- (V) کہبت کبد
- (VI) صدر کی بالیدگی کی وجہ سے دوران خون میں خلل واقع ہونا
- (VII) مقام صدر پر بخارات کا اجتماع، جو بعد میں پانی میں مستحیل ہو جائیں
- (VIII) سرد مقام پر قیام کرنا
- (IX) بارد المزاج ہونا

علامات | اس کی طبی علامات پلیورائی انصباب کی طبی علامات سے مشابہ ہوتی ہیں تاہم رگڑ (RUB) غیر موجود ہوتی ہے۔ انصباب عام طور سے دو جانی ہوتا ہے، بعض اوقات انصباب جانی ہی ہوتا ہے۔ رطوبتی نقطہ نظر سے اس مرض میں جوف صدر کے اندر رقیق زرد آب جمع ہو جاتا ہے جس کی ترکیب میں لحمیہ، رطوبت بیضیہ، فائبر نیوجن حصہ لیتے ہیں، کمریات بیضیہ کمریات حمراء عام طور سے غیر موجود ہوتے ہیں۔ غشاء المریہ کی بیرونی سطح چمکدار اور کسی قدر شفاف نظر آتی ہے اور اس میں التهابی علامات مفقود ہوتی ہیں۔

خفیف بخار کی شکایت ہوتی ہے، اطراف میں درم ہوتا ہے، دقیق، مائی نفث بھی ہو سکتا ہے اور مریض کے دیگر مرضی کوائف استسقاء کے مریض سے مشابہہ ہوتے ہیں۔

ذیل میں استسقاء الصدر اور ذات الحجب رطوبتی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

ذات الجنب رطوبی	استسقا-الصدر
۱۔ ایک جانب متاثر ہوتا ہے۔	۱۔ عام طور سے دونوں جانب متاثر ہوتے ہیں۔
۲۔ مرض ادنیٰ ہوتا ہے۔	۲۔ مرض ثلوی حیثیت رکھتا ہے۔
۳۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے۔	۳۔ حرارت طبعی یا طبعی سے کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔
۴۔ پہلو میں درد ہوتا ہے۔	۴۔ پہلو میں درد نہیں ہوتا۔
۵۔ اوزیم عام نہیں ہوتا اور ذات الجنب رطوبی کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔	۵۔ اوزیم عام ہوتا ہے اور دگمہ استسقا کی علامات موجود ہوتی ہیں۔

اصول علاج

- ۱۔ استسقا عمومی یا تقیح الصدر یا اجتماع المذہ فی الصدر کے اصول پر علاج کریں۔
- ۲۔ زیادہ غذا اور پانی وغیرہ نہ نوش کرائیں۔
- ۳۔ حمام عار کرائیں۔
- ۴۔ اصلاح کبد کی طرف توجہ دیں۔

علاج

- ۱۔ پیاز دشتی مشوی .. ۵ ملی گرام، ہمراہ شربت بزوری کھلائیں۔
- ۲۔ پانی کے بجائے عرق مکوہ اور عرق بادیان نوش کرائیں۔
- ۳۔ معجون دبید اور دھ گرام کھلانے کے بعد تخم کشوث، گل غافرت، ہر ایک ۵ گرام، بادیان، تخم خربزہ، تخم کاسنی، بیج کاسنی ہر ایک ۴ گرام، مریمز منقی ۹ دانہ، جملہ دواؤں کو عرق مکوہ، عرق بادیان، ہر ایک ۹۴ ملی لیٹر میں رات میں ہلگائیں

اور صبح کو مل چھان کر آب کاسنی سبز مروق، آب لکڑ دندہ سبز مروق ہر ایک ۳۶ ملی لیٹر، شربت دینار ۳۶ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے

نسخہ قرص: عصارہ غافق، مصطکی روپی، ریوند چینی، زعفران، مجیٹھ، طباشیر، ہر ایک ۲ گرام، گل سرخ، مغز تخم خیارین، مغز تخم خربزہ، زرشک، رب السوس، تخم کشوث، تخم کاسنی ہر ایک ۳ گرام۔ جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر ترنجبین خراسانی ۶ گرام، کو عرق کاسنی ۳۳ ملی لیٹر میں حل کر کے پیسی ہوئی دوائیں اس میں ملا کر اقراص بنائیں اور ۳ گرام کے بقدر آب کاسنی سبز مروق، آب مکوہ سبز مروق یا سکجنبین بزدوری ۳۸ ملی لیٹر کے ہمراہ کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ مرکی، بیج حنظل، زنجبیل، آنہ ہلدی، زبرجد، پوست حلیلہ زرد، تر بد سفید، ریوند چینی، ہر ایک ۶ گرام، سنار مکی ۱۲ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب گھیکوار میں گوندھ کر پیر کے برابر ٹکیاں بنائیں اور حسب ضرورت ۲-۳ ٹکیہ استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ کرلیہ تازہ، کوٹ کر پانی میں بچوڑیں اور ۱۵ ملی لیٹر پانی، شہد یا شربت بزدوری ۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ مغز فلوس خیار شبنر ۹ گرام، سنبل الطیب، اکلیل الملک، سدھ کوئی، ریوند چینی، گل بابونہ، ہر ایک ۶ گرام، جملہ دواؤں کو آب مکوہ سبز مروق میں پیس کر نیم گرم کر کے سینہ پر ضماد کریں۔



مصادر

Learn Unani By Abul Waris Salman

مصادر

- _____ الادویۃ القلبیہ
شیخ ارنیس ابو علی بن عبد اللہ بن سینا / حکیم عبد العزیز فلسفی
ایران سوسائٹی کلکتہ - ۱۹۵۶ء
- _____ اکسیر اعظم (جلد اول)
حکیم محمد اعظم خان
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ
- _____ اکسیر اعظم (جلد دوم)
حکیم محمد اعظم خان
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ - ۱۹۰۴ء
- _____ بیاض کبیر (حصہ اول)
حکیم محمد کبیر الدین
ملک دین محمد ایٹھ سنز، اشاعت منزل
پل روڈ، پاکستان
- _____ بیاض کبیر (حصہ دوم)
حکیم محمد کبیر الدین
دفتر المسیح، بازار نور الامراء
حیدر آباد دکن - ۱۹۵۳ء
- _____ تجربات طبیب
حکیم محمد سعید
محمد رد اکیدمی، کراچی - پاکستان ۱۹۸۳ء

- _____ ترجمہ کبیر (حصہ اول)
 حکیم محمد کبیر الدین
 دفتر المسیح، بازار نور الامراء
 حیدر آباد، دکن
- _____ ترجمہ کبیر (حصہ دوم)
 حکیم محمد کبیر الدین
 دفتر المسیح، بازار نور الامراء
 حیدر آباد دکن ۱۹۴۹ء
- _____ حافظ
 مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجل خان
 یونین پرنٹنگ پریس
 دہلی ۱۹۷۱ء
- _____ الحادی الکبیر فی الطب (المجزء)
 ابو بکر محمد بن زکریا رازی
 مطبع مجلس دائرة المعارف العثمانیہ، حیدر آباد دکن ۱۹۵۵ء
- _____ الحادی الکبیر فی الطب (جلد ۱، ۲، ۳)
 ابو بکر محمد بن زکریا رازی
 مطبع مجلس دائرة المعارف العثمانیہ
 حیدر آباد دکن ۱۹۵۷ء
- _____ الحکیم _____ دسمبر ۱۹۲۸ء
- _____ اپریل ۱۹۲۹ء
- _____ مئی ۱۹۲۹ء
- _____ جون ۱۹۳۶ء
- _____ ستمبر ۱۹۳۹ء
- _____ اپریل ۱۹۴۵ء

جنوری ۱۹۳۸ء

فروری، مارچ ۱۹۳۸ء

جون ۱۹۳۸ء

اپریل ۱۹۳۹ء

مارچ، اپریل ۱۹۵۸ء

ذخیرہ خوارزم شاہی (جلد ششم)

سید اسماعیل جرجانی / حکیم سید عابد حسین

مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ

السیدی

سید الدین گارونی

مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ ۱۳۱۱ھ

سرمدیات

حکیم سید محمد حسان نگرامی

مطبع نظامی، لکھنؤ ۱۹۸۳ء

طب اکبر

حکیم محمد اکبر ازرائی

مطبع منشی گلاب سنگھ، لکھنؤ ۱۸۹۷ء

علاج الامراض

حکیم محمد شریف خان

مطبع مجتبیٰ، دہلی ۱۹۰۳ء

فردق الامراض

حکیم نذیر الدین احمد

محبوب المطابع برقی پریس، دہلی ۱۹۳۸ء

القانون فی الطب (جلد ۱، ۲) ابن سینا

مطبع عامرہ، مصر

_____ کامل التصحیح

ڈاکٹر صادق حسین

قومی طبی کونسل پاکستان

لاہور، پاکستان ۱۹۸۱ء

_____ کامل الصنعة (اول دوم)

ابوالحسن علی بن عباس المجدسی / غلام حسنین کنتوری

مطبع منشی نول کشور — ۱۸۸۹ء

_____ کتاب التیسیر

عبد الملک ابن زہر / شبیر احمد غوری، حکیم عطار الرحمن ندوی،

حکیم محمد ظفر اللہ، حکیم عبیدہ الاسلام قاسمی، مرکزی کونسل برائے

تحقیقات طب یونانی۔ نئی دہلی ۱۹۸۶ء

_____ کتاب العلاج

حکیم محمد شریف

مطبع الحکیم لاہور — ۱۹۳۱ء

_____ ماہیت الامراض (حصہ اول)

حکیم محمد شریف جامعہ

مجلس ترقی ادب، لاہور، پاکستان ۱۹۴۳ء

_____ مخزن حکمت (جلد دوم)

حکیم غلام جیلانی

ایم۔ جے۔ پبلیکیشنز، نئی دہلی ۱۹۵۷ء

_____ معالجات امراض راس

حکیم الطاف احمد اعظمی

محبوب پریس دیوبند — ۱۹۸۶ء

_____ معمولات مطہ

حکیم مد سعید ورققہ

ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، کراچی، پاکستان ۱۹۸۵ء

— میزان الطیب

محمد اکبر ازانی / حکیم محمد کبیر الدین

دفتر اسپیج، قروڑ باغ، دہلی ۱۹۳۷ء

- Hand Book Of Medical Treatment
I K Ganguli
Academic Publishers
5, A Bhabani Dutta Lane
Calcutta 1978
- Clinical Pathology For Student
Neelam Batra
Vikash Publishing House
Ghaziabad 1982
- Davidson's Principles And Practice Of Medicine
Jhon Macleod
L L B S Edition 1979
- Medicine For Student
A F Gol Walla
India Printing Works
9, Nagindas Master Road
Extension
Bombay 1975

Learn Unani By Abdul Waris Salman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

معالجات

جلد دوم

(امراض نظام ہضم و تولید و تناسل)

حکیم وسیم احمد اعظمی



قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویسٹ بلاک - 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110 066

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

1992	:	پہلی اشاعت
2008	:	چوتھی طباعت
1100	:	تعداد
90/- روپے	:	قیمت
676	:	سلسلہ مطبوعات

Moalijat Vol. II
By Wasim Ahmad Azmi

ISBN : 81-7587-256-X

ناشر: انزکس، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی۔ 110066
فون نمبر: 26103938، 26103381، 26179657، فیکس: 26108159
ای۔ میل: urducouncil@gmail.com، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in
طابع: میکاف پرنٹرز، 2847، بلیلی خانہ، ترکمان گیٹ، دہلی۔ 110 006

پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دو خدا داد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مخفی عوامل سے آگہی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبروں کے علاوہ، خدا رسیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشکیل و تعمیر سے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر وسیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کا فن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر چھپائی کا فن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقہ اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور

پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے سمجھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول اس ہر لغزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تنقیدی اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یہ امر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپنی تشکیل کے بعد قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قارئین نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک لڑی ہے جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔

اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خامی رہ گئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر علی جاوید
ڈائریکٹر

تہدیہ

ماںا جان جناب حبیب اللہ مرحوم کے نام !

جن کی زندگی جدوجہد سے عبارت تھی اور جو مجھ کو ایک باوقار عملی
انسان دکھینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت
میں جگہ دے۔ آمین !

وسیم احمد اعظمی
۲۳ اگست ۱۹۸۸ء

Learn Unani By Abdul Waris Salman

ابتدائیہ

ہمارے دور طالب علمی میں طب کی نصابی کتابوں کا حصول ایک دشوار گزار عمل تھا تلاش بیمار کے بعد بالغرض دو، ایک کتابیں مل بھی جاتیں تو مباحث کے اختصار یا غیر مردطوالت کی وجہ سے فنی نکات تک رسائی مشکل سے ہو پاتی۔ ملا رحیم محمد کبیر الدین مرحوم نے شرح الاسباب والاعلام مؤلفہ نفیس بن عوض کرمانی کا اردو ترجمہ شائع کر کے طالبان طب یونانی پر احسان عظیم کیا تھا۔ اور اس ترجمہ کو طبع نادر کتاب کی سی آب و تاب دی تھی۔ یہ ترجمہ پہلی بار ۱۹۱۶ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد معالجات کے موضوع پر ایک بھی کتاب ایسی شائع نہیں ہوئی جو طالبان طب کو اس ترجمہ کی لذت سے آشنا کرائی۔ تحیم غلام جیلانی کی محزن حکمت، اپنے موضوع کی بلاشبہ ایک مثالی کتاب بھی جاسکتی ہے۔ تاہم اس میں بھی یونانی طریقہ علاج کو ثانوی درجہ دیا گیا ہے، اور اب یہ کتاب بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔

ادھر گزشتہ چند سالوں میں جہاں طب یونانی کے مختلف شعبوں میں عملی تحقیق و جستجو کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ وہیں اطباء میں طب کی نصابی ضرورتوں کی تکمیل کا احساس بھی بیدار ہوا ہے اور صوبائی اکاڈمیوں اور ترقی اردو بیورو وغیرہ کے تعاون سے نصابی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ خدا کرے وہ دور جلد آئے جب طب کے شائقین اور طالبین کے لئے نصابی کتابوں کا حصول کوئی مسئلہ نہ رہے، بلکہ یہ لوگ بھی دوسرے طریقہ ہائے علاج کے طالبین کی طرح کتابوں کے انتخابات کی لذت سے آشنا ہوں، معالجات دامراض نظام ہضم و تولید و تناسل کی تالیفات میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔

معالجات کے موضوع پر یہ کتاب طلباء کے ذہن اور درس و تدریس کے مسائل کو غامض رکھ کر لکھی گئی ہے اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع سے طلباء اور شائقین طب کو مزید دلچسپی پیدا ہو، کتاب کی زبان آسان اور عام فہم ہو، اس کا بھی التزام کیا گیا ہے ماہیت مرض اور اسباب و علامات کے لئے جدید طریقہ علاج کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تقسیم سہولتوں کے لئے فزوری جدول بھی دیئے گئے ہیں،

اسباب کے بارے میں ایک بات کی خاص طرف سے مراحت کر دی جائے کہ قدیم کتابوں میں عام طور سے ایک مرض کو دوسرے مرض کا سبب قرار دیا گیا ہے، اس کتاب میں اس نوعیت کے اسباب کو اس نظام کے تحت تحریر کیا گیا ہے جس سے مباحث تک رسائی میں یقینی طور پر آسانی ہوگی۔ علاج کے ذیل میں قدیم و جدید طریقہ ہائے علاج کی پیوند کاری سے احتراز کیا گیا ہے، اوزان کے سلسلے میں کم و بیش نیز ادویہ میں حذف و اضافہ کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں، اور مستند ماخذ اور تجربات کو ہی تحریر کیا گیا ہے۔ معالج کو اس سے روشنی ملے گی اور وہ اپنی حداقت کو بردے کار لاتے ہوئے اس سے مزید اختراع کر سکتا ہے

موضوع سے مقدور بھر انصاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم بشری تقاضوں کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ خامیاں بھی در آئی ہوں۔ ہذا علمی حلقوں سے استدعا ہے کہ وہ ان خامیوں اور کوتاہیوں کی ضرور نشاندہی فرمائیں گے کہ آئندہ اشاعت میں ان کے انزال کی تدابیر کی جاسکیں۔

تالیف کے مرحلے میں جب بھی کوئی فنی دشواری پیش آئی، حکیم خورشید احمد شفقت اعظمی، حکیم محمد یوسف بٹوی، برادر کرم حکیم سید محمد حسان نگرانی، حکیم منظر احسن اور حکیم ملک دامن اللہ کی طرف سے بھرپور تعاون اور رہنمائی ملی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اس کتاب کی تالیف کے ہر مرحلے میں شریک حیات سلطانہ وسیم کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ خدا انھیں خوش و خرم رکھے۔

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط

وسیم احمد اعظمی

۲۳ دسمبر ۱۹۸۸ء

ترتیب

17	امراض کبد
18	کبد کی مختصر تشریح اور منافع
19	سور مزاج کبد
25	ضعف کبد
29	انتفاخ کبد
31	التهاب کبد
40	عظم کبد
43	صغر کبد
47	کیف کبد
48	دبح الکبد
52	حصاة کبد
56	دبيلة کبد
62	سرطان کبد
64	سدة کبد
68	اختقان دم فی الکبد
71	سور القنیه
76	یرقان
88	استسقاء

100	ابیاض الدم
105	مرض اخضر
109	امراض مراره :-
110	مراره کی مختصر تشریح اور منافع
111	التهاب مراره
114	حصاة مراره
117	تولج مراره
119	امراض طحال :-
120	طحال کی مختصر تشریح اور منافع
122	سور مزاج طحال
128	ضعف طحال
131	التهاب طحال
137	صلابت طحال
140	نفوذ طحال
143	تقحج طحال
145	اقتلاء طحال
147	عظم الطحال
154	سدة طحال
157	حصاة طحال
159	امراض معدة و امعاء :-
160	معدة اور امعاء کی مختصر تشریح اور منافع
164	سور مزاج معدة
171	ضعف معدة
176	سور معینم
181	تخمہ

183	غذائی حیاسیت
184	غذائی نسیم
186	وجع المعده
193	وجع الفؤاد
199	التهاب معده
210	دبیلہ معده
213	خلق معده
214	اختلاج معده
215	خارش و دغذو معده
217	حرقت معده
220	قروح معده
224	استرخاء معده
227	انقلاب معده
229	سرطان معده
232	ضعف اشتیاء
237	فنا و شہوت
239	جوع الکلب
243	جوع البقر
246	عطش مفرط
251	نفخ شکم
256	کثرت جشاء
259	فواق
265	تے
275	قی الدم
283	امراض امعاء

284	التهاب امعاء
289	اسبال
297	زلق امعاء
299	زحیر
310	سج امعاء
316	بیضہ
322	مغن
327	قولنج
341	ایلاؤس
343	سد الامعاء
347	قبض
352	التهاب قولون
355	التهاب زائده اعور
360	دق الامعاء
362	فیضان امعاء
369	درم مقعد
375	بواسیر
383	رج البواسیر
386	شقاق مقعد
389	استرخار مقعد
392	خروج مقعد
396	ناصور مقعد
400	مکڑ مقعد
405	امراض بانقراس
408	بانقراس کی مختصر تشریح اور علاج

407	التهاب بالقراس
410	ذیابیطس
419	امراض غدہ درقیہ :-
	غدہ درقیہ کی مختصر تشریح اور منافع
420	قسم درقیہ
422	اوذیماء غماطی / غشائی
427	امراض کلیہ وحالب :-
428	کلیہ اور حالب کی مختصر تشریح اور منافع
429	سورمزاج کلیہ
433	ضعف کلیہ
437	رج کلیہ
439	التهاب کلیہ
449	التهاب حوض کلیہ
452	تشم کلیہ
455	تجیب کلیہ
457	تشم کلیہ
460	ہزال کلیہ
463	وجج کلیہ
469	قروح کلیہ
473	حصاة کلیہ
481	سدہ کلیہ
483	تدرن کلیہ
485	قسم بول
489	امراض خانہ :-
490	مشانہ کی مختصر تشریح اور منافع

491	التهاب مثانہ
498	جرب مثانہ
501	وجع مثانہ
503	حصاة مثانہ
507	قروح مثانہ
509	استفراغ مثانہ
512	انجماد الدم فی المثانہ
513	بول فی الغرث
517	تقطیر البول
521	سلس البول
526	عسر البول
532	احتباس بول
540	بول الدم
547	حرقہ بول
551	سوزاک
561	امراض اعضاء تناسل مردانہ
562	اعضاء تناسل کی مختصر تشریح اور منافع
567	ضعف باہ
577	سرعت انزال
582	التهاب غدہ مذی
584	جریان مذی
587	جریان منی
593	کثرت احتلام
596	جلق
599	درم خصیہ / التهاب خصیہ

605	در دخصیه
612	عظم خصیه
613	صفر خصیه
616	دوالی صفن
619	امراض صفاق :-
620	التهاب باریطون / صفاق
625	فتق
633	قبیلہ مائیه
637	امراض نقص تغذیه :-
638	سمن مفرط
641	پلا جبرا
645	شب کوری
647	اسکر بوط
652	لین العظام
655	بیری بیری
659	بصار در :-

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض کبیدہ

Learn Unani By Abdul Waris Salman

کبد کی مختصر تشریح اور منافع

BRIEF ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF LIVER

تشریح :-
محل وقوع :-

یہ جسم کا سب سے بڑا غدہ (Gland) ہے۔ اور دائیں قسم تحت الشریف (Right Hypochondriac Region) کے تمام حصہ کو، قسم شریف (Epigastric Region) کے بیشتر حصہ کو اور قسم قطنی (Lumber Region) اور بائیں قسم تحت الشریف (Left Hypochondriac Region) کے بعض حصے کو گھیرے رہتا ہے۔

کبد کی لمبائی دائیں سے بائیں طرف ۲۵ سینٹی میٹر، چوڑائی ۱۵ سینٹی میٹر اور وزنی مردوں میں ایک کلو ۴۰۰ — ۶۰۰ گرام، عورتوں میں ایک کلو ۲۰۰ — ۴۰۰ گرام اور جنین میں $\frac{1}{18}$ حصہ جسم ہوتا ہے۔

اس کی بالائی سطح حجاب حاذب سے ملی ہوئی ہے اور زیریں سطح کے وسط میں ایک آڑا شکاف ہوتا ہے، جہاں کبد کی شریانیں، باب الکبد کی دریدیں اور صفراء کی نالیاں داخل اور خارج ہوتی ہیں۔

کبد میں پانچ زوائد ہوتے ہیں، دایاں زائدہ سب سے بڑا بلکہ چار یا پانچ گنا بڑا ہوتا ہے۔ بائیں زائدہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور باقی ۳ زائدے دائیں زائدہ کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں۔

منافع :-

کبد میں خون کی پیدائش ہوتی ہے اور خون سے صفراء علیحدہ کرنے کا عمل بھی یہیں

ہوتا ہے جو غذا کے ہضم کے وقت اس کا پرگرتا ہے۔ اس میں شکر کبدی (گلائیکوجن) بنتا ہے۔ یہ شکر چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں کبد میں جمع رہتی ہے۔ اور حسب ضرورت شکر میں تبدیل ہو کر خون میں لیتی رہتی ہے۔ اور عضلات نیز جسمانی ساخت میں پہنچ کر صرف ہو کر جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے اور قوت بخشتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات جب ناکارہ ہو جاتے ہیں تو کبد ہی ان کو ضائع کرتا ہے۔

سورمزاج کبد


ILL TEMPERAMENT OF THE LIVER

اس مرض میں، کبد کی ساخت میں کسی قسم کا عضوی نقص یا تبدیلی ظاہر ہوئے بغیر اس کے افعال میں خلل آجاتا ہے اور افعال کا یہ خلل دراصل کیفیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اقسام :-

کیفیات اربعہ کے لحاظ سے اس کی چار قسمیں ہیں

سورمزاج کبد



اسباب :-

(I) خارجی طور پر حرارت سے متاثر ہونا

(II) خارجی طور پر بیوست سے متاثر ہونا

(۱۶) خارجی بردت کو قبول کرنا

(۱۷) خارجی رطوبت کو قبول کرنا

(۱۸) غلبہ اخلاط اربعہ

علامات :-

سور مزاج حار :-

سور مزاج حار سادہ کی صورت میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے زبان خشک ہوتی ہے اور خشکی کی وجہ سے بعض اوقات کھردری بھی ہو جاتی ہے، ضعف اشتہا اور قبض کی شکایت ہوتی ہے، کبد میں حرارت محسوس ہوتی ہے، پیشاب میں سرخی اور کم دیش جسمانی حرارت / حتی وغیرہ علامات ملتی ہیں۔

سور مزاج حار مادی، دُموی کی صورت میں مذکورہ بالا علامات کے ساتھ نبض متواتر اور سریع چلتی ہے، اعضاء میں گرانی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ذائقہ میں تلخی کے بجائے شیرینی ہوتی ہے، سور مزاج حار مادی صفراوی کی صورت میں چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور زرد رنگ کی تہ اور اُلٹیاں آتی ہیں، شدید اجتراق کی صورت میں پیشاب میں حرارت اور سوزش بھی محسوس ہوتی ہے، اور اسہال فسالی آتے ہیں۔

سور مزاج بارد :-

سور مزاج بارد سادہ میں چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور سوچن سی ہوتی ہے، زبان، ہونٹ سفید ہوتے ہیں، پیاس میں ہمت کمی ہوتی ہے، پیشاب سفید خارج ہوتا ہے، باضمہ خراب ہوتا ہے، طبیعت میں کسٹندی اور نرمی ہوتی ہے، نبض بطنی چلتی ہے، شراب و اسیر کے عضلات مسترخ سے ہوتے ہیں، حواس میں کندی ہوتی ہے، بردت کی وجہ سے کم و بیش بطلان اشتہا کی سی کیفیت ہوتی ہے۔

سور مزاج بارد مادی، بلغمی کی صورت میں مذکورہ علامات کے ساتھ پیشاب میں سفیدی اور غلاط ہوتی ہے، رنگت سید کی مانند ہو جاتی ہے، تہ اور برازیں بلغمی غلاط خارج ہوتی ہے، سور مزاج بارد مادی، سوداوی کی صورت میں ذائقہ میں ترشی ہوتی ہے اور مرلیض پریاسیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ براز کبھی خشک اور کبھی انجذاب میں ضعف کی

وجہ سے گیلا اور بے بو، کا ہوتا ہے، چہرہ کی رنگت زرد/سفید/سیاہی مائل ہو سکتی ہے۔
سور مزاج یا بس؛

سور مزاج یا بس سادہ کی صورت میں جسم لاغر ہوتا ہے اور خون کی کمی ہوتی ہے
پیاس کم لگتی ہے منہ اور زبان دغیرہ خشک ہوتی ہیں، نبض صلب چلتی ہے، پیشاب سفید
رنگ کا آتا ہے۔ اس میں رقت بھی ہوتی ہے۔

سور مزاج مادی سوداوی یا صفراوی کی صورت میں ان کی مخصوص علامات موجود ہوتی
ہیں چنانچہ کبھی تو براز قلیل مقدار میں ہوتا ہے اور کبھی زبان سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔
سور مزاج رطب؛

سور مزاج رطب سادہ میں لعاب دہن کی کثرت ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے،
کسلمندی ہوتی ہے، پھوٹوں اور چہرے پر تھمبی کیفیت ہوتی ہے۔ اور دوسری، سور مزاج
سرد بلغمی کی علامات موجود ہوتی ہیں۔

اصول علاج؛

_____ سور مزاج سادہ میں صرف تعدیل مزاج کافی ہے _____ چنانچہ

_____ سور مزاج حار سادہ میں سرد تدابیر اختیار کریں،

_____ سور مزاج سرد سادہ میں گرم تدابیر اختیار کریں،

_____ سور مزاج یا بس سادہ میں رطب تدابیر اختیار کریں،

_____ سور مزاج رطب سادہ میں مجفف تدابیر اختیار کریں

_____ سور مزاج مادی میں نفخ و تنقیہ کا اصول ن میں لائیں

_____ سور مزاج مادی دُموی میں فصد کھولیں، تلہین مزاج کریں۔

_____ سور مزاج مادی صفراوی میں فصد کے سلسلے میں احتیاط لازمی ہے۔

علاج؛

_____ سور مزاج حار سادہ میں آب برگ کاسنی سبز مروق، سکببین سادہ،

آب، نارین، شربت نیلوفر، شربت زرشک، مار القرع یا مار الخیار میں سے کوئی ایک نوش

کرائیں۔

۔۔۔ شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم کاسنی اور لعاب اسپنغول نوش کرائیں۔

۔۔۔ درج ذیل نسخہ جات بھی مفید ہیں۔

نسخہ :-

گل بید، گل نیلوفر، ہر ایک ۳۵ گرام، گل سرخ ۲۲ گرام، کافور ۸ گرام، لک مغسول،
فوفی ہر ایک ۲۸ گرام، پرسیاوشاں، زعفران گل قبرسی، مصطکی، ہر ایک ۱۰۰ گرام،
ریوند ۵۰ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب مکوہ اور آب کاسنی میں گوندھ
کر ۲۲ گرام کی اقراص بنائیں اور روزانہ ۲ اقراص، آب مکوہ سبز مروق و آب کاسنی سبز
مروق ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

مغز تخم خیارین، تخم خرفہ، تخم کاسنی ہر ایک ۱۰۰ گرام، عصارہ زرشک ۳۵
ملی لیٹر، گل سرخ، گرام، ریوند ۳۵ گرام، سنبل الطیب ۲ گرام،۔۔۔ تمام دواؤں
کو کوٹ پیس کر اقراص بنائیں اور ۵۰ گرام ہر ایک سکنجبین سادہ و آب انار شیریں استعمال
کرائیں۔

۔۔۔ سور مزاج حار مادی صفراوی میں یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ :-

سنارکمی، ہلیلہ کابل، ہلیلہ زرد، گل سرخ، بنفشہ، ہر ایک ۵۰ گرام، نیلوفر،
تخم کاسنی، تخم کشوث، (ھرہ بستہ) ہر ایک ۱۰۰ گرام، تمر ہندی، گرام، آلو بخارا، خباب،
ہر ایک ۲۰ عدد،۔۔۔ تمام دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جو شس دیں، جب ایک تہائی
رہ جائے تو اتار کر کل چھان کر مغز قلوبس، خیار شیریں ۵۰ گرام، ترنجبین ۶۰ گرام ملا کر دوبارہ
کل چھان کر صبح کے وقت نوش کرائیں۔

۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضار :-

گل سرخ، صندل سرخ، ہر ایک ۵۰ گرام، صندل سفید ۵۰ گرام، نیلوفر، بنفشہ
ہر ایک ۵۰ گرام، فوفی، گل ارمنی ہر ایک، گرام، ساذج ہندی، مصطکی ہر ایک ۵۰ گرام

تمام دواؤں کو باریک پس کر محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت روغن گل، روغن بید، روغن
آس و غیرہ میں ملا کر مقام کبد پر ضما د کریں۔
نسخہ ضما د۔

مندل سفید، بنفشہ، آرد جو، بیج خطمی، نیلوفر، ہر ایک ۵۔۵ گرام، مندل سرخ
۵۔۵ گرام، گل سرخ ۴ گرام، کافور، زعفران ہر ایک ۲ گرام۔ تمام دواؤں کو
باریک پس کر روغن نیلوفر اور موم بقدر ضرورت میں ملا کر مقام کبد پر ضما د کریں۔
• سور مزاج بارد کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کریں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، تخم کرفس مصطکی، انیسون ہر ایک ۵ گرام، پوست بیج کرفس، پوست
بیج بادیان، ہر ایک ۳۵ گرام، فافٹ، فستین، حشیش، ہر ایک ۵۔۵ گرام، قسط شیریں
دتلخ، ریونڈ چینی، سک، قصب الزریہ، ہر ایک ۵۔۵ گرام، فقاح اذخر ۴ گرام۔
تمام دواؤں کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو اتار کر ٹل چھان کر محفوظ
کر لیں اور دوا داند ۱۲ ملی لیٹر ہمراہ روغن پستہ ۱/۲ ملی لیٹر روغن بادام، ملی لیٹر نوش
کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مصطکی، سنبل الطیب، اسارون، لکہ مغسول، ہر ایک ۵۔۵ گرام، گل سرخ،
۴ گرام، فستین، عصارہ فافٹ، ریونڈ چینی، ہر ایک ۵۔۵ گرام، انیسون، گرام،
زعفران ۳ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر آب کرفس کی مدد سے ۵۔۵ گرام
کی اقراص بنائیں اور ایک قرص ہمراہ سکنجبین منضلی اور آب کاسنی تلخ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۳۔

اسارون، لکہ مغسول، سنبل الطیب، ہر ایک ۵۔۵ گرام، گل سرخ ۴ گرام، فستین
رومی، ریونڈ چینی، ہر ایک ۵۔۵ گرام۔ تمام دواؤں کو پس کر پانی کے ساتھ ۳ گرام
کی اقراص بنائیں اور ایک قرص ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
• سور مزاج بارد بغنی میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

بیج کرفس، بیج بادیان، تخم کرفس، بادیان، ہر ایک ۵۰ گرام، نانخواہ، انیسون
ہر ایک ۴۰ گرام، سنبل الطیب، اذخر، ہر ایک ۱۰ گرام، نبات سفید دو گنا، — حب دستو
شریت تیار کریں اور ۴۸ ملی لیٹر ہمراہ روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر، نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د:-

بابونہ، صبر سقوطی، شیخ ارمنی، ہفتین رومی، اکیلل الملک، ہر ایک ۵۰ گرام،
گرام، سنبل الطیب، حب بلساں، عود بلساں، سلیمہ، قسطا، مصطکی، اسارون، ہر ایک
۵۰ گرام، زعفران ۵ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن قسطا، روغن ناروین
یا روغن سوسن و موم سرخ پگھلا کر اس میں شامل کر کے مقام کبد پر ضما د کریں۔
نسخہ ضما د:-

فقاح اذخر، قردانا، مصطکی، حماما، حب بلساں، ہر ایک ۵۰ گرام، فقاح
ہفتین، ہفتین، صبر، ہر ایک ۱۲ گرام، سلیمہ، سنبل الطیب، ہر ایک ۵ گرام،
دیرسا، برگ مزنجوش ہر ایک ۲۸ گرام، اشق ۸۵ گرام، کندر، صغ بطم، ہر ایک ۴۸
گرام، موم ۵۰ گرام، روغن حنا حسب ضرورت — تمام دواؤں کو باریک پیس کر، موم کو
روغن حنا میں پگھلا کر سفوف کردہ دواؤں کو ملا کر ضما د کریں۔
• سو، مزاج خشک سادہ میں شربت نیلو فر اور شربت خشتاش نوش کرائیں
درج ذیل نسخہ حقنہ بھی مفید ہے۔

نسخہ حقنہ:-

کشک ۲۵ گرام، حلزون ۳۵ گرام، دونوں دواؤں کو پانی میں خوب جوش دیں
پھر روغن بنفشہ حل کر کے حقنہ کریں۔
• غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ:-

سکینج، اشق، جاد شیر، ہوزن، تخم کرفس، انیسون نصف جزوہ — تمام
دواؤں کو باریک پیس کر چھوٹی چھوٹی اقراص / حب بنالیں اور ۵۰ گرام استعمال
کرائیں

خارجی طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

آب کدو، آب خرفہ، آب کاسنی، آب کاہو، تمام دواؤں کو روغن بنفشہ میں ملا کر اس سے طلا کر کریں۔

سور مزاج رطب میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ ۲۔

بادیان، خرنوب، نبطی، تخم کرفس، ہر ایک ۵ روگرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر آب بادیان یا آب کرفس میں گوندھ کر ادرہ ۵ روگرام، ہمراہ سنگجبین بزروری استعمال کرائیں۔

ضعف کبد

HEPATARGIA

اس مرض میں کبد کے قوی اربعہ یا بعض قوتوں کے فعل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جس سے مرضی علامات اور دوسرے عوارض رونما ہوتے ہیں۔

اسباب:

- (I) سور مزاج کبد
- (II) برودت و رطوبت کی زیادتی
- (III) شدید ریاضت، جماع اور حمام کے فوراً بعد سرد پانی نوش کرنا۔
- (IV) سدہ کبد
- (V) التهاب کبد
- (VI) ہیلتہ کبد
- (VII) کبد و مرارہ / کبد و طحال کے درمیانی منافذ کا سدہ
- (VIII) غیر معمولی حرارت و بیہوشی

(۱۷) کبد کے مشارک و مجاور اعضاء کا خلل۔

علامات:

جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، ضعف اشتہار یا بطلان اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، جسم کا رنگ سبزی مائل، نیلگوں، زردی مائل یا سفیدی مائل ہوتا ہے، مقام کبد پر شہد کے ساتھ میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، غذا کے کبد کی طرف نفوذ کے مرحلے میں درد کا احساس زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ پیشاب غسالی خارج ہوتا ہے، نبض بطی و دقیق چلتی ہے کبد کا لمس سرد ہو جاتا ہے، اور چہرہ پر تہی علامات بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ غیر معمولی حرارت کی صورت میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ذائقہ تلخ یا شیریں ہوتا ہے مقام کبد پر سوزش کا احساس ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے، پیشاب سرخ یا زردی مائل آتا ہے۔ بطلان اشتہار ہوتا ہے کم و بیش بخار بھی رہتا ہے۔ سور مزاج بارد کی صورت میں بھوک زیادہ لگتی ہے، ابتداء میں بخار نہیں ہوتا لیکن مزمن صورت میں بخار اور مقام کبد پر ثقل کا احساس ہوتا ہے۔ پیوستہ کبد کی صورت میں پیشاب قلیل مقدار میں آتا ہے اس کے برخلاف رطوبت کی صورت میں پیشاب کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں جسم لاغر اور ضعیف ہو جاتا ہے، براز سفید اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، اس کے برخلاف پیشاب کا رنگ اور قوام طبعی ہوتا ہے ضعف قوت ماسک و ہاضمہ کی صورت میں بول غسالی خارج ہوتا ہے، بدن ڈھیلا ہوتا ہے نیز خون رقیق ہو جاتا ہے، بعد میں استسقاء لحمی یا حاد نوعیت کا اسہال ہوتا ہے۔

ضعف قوت دافعہ کی صورت میں پیشاب اور براز کم رنگ اور قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، انجام کے طور پر قویج اور یرقان ہو سکتا ہے۔ مشارک و مجاور اعضاء کی صورت میں ان کی اپنی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں

اصول علاج:

- _____ ضعف کبد عام طور سے: رودت اور رطوبت کی وجہ سے مارض ہوتا ہے اس لئے گرم، خوشبودار اور قابض ادویہ استعمال کرائیں۔
- _____ ضعف قوت باطن میں گرم اور قابض دوائیں دیں،
- _____ ضعف قوت ماسک کی صورت میں کسی قدر کم گرم، نسبتاً زیادہ قابض دوائیں استعمال کرائیں۔
- _____ ضعف قوت دافعہ کی صورت میں ملینبات و مفتحات استعمال کرائیں
- _____ سور مزاج کی صورت میں تبدیلی مزاج کی تدابیر اختیار کریں
- _____ دیگر مشارک و مجاور اعضاء کی صورت میں ان کا مخصوص علاج کریں۔

علاج؛

- _____ دھندلی نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آب کاسنی سبز مروق ۳۵ ملی لیٹر، آب رازیانہ سبز مروق ۹۰ ملی لیٹر، عرق لیموں ۹۰ ملی لیٹر، گلقتند آفتابی ۲۵۰ گرام، نبات سفید ۵۰۰ گرام _____ حسب دستور قوام تیار کریں۔ اور نیچے اتار کر ریوند خطائی ۵۰۰ گرام باریک پیس کر اس میں ملائیں۔ اور ۱۰ گرام ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

انیسون، اسارون، افستین، مغز بادام، تخم کرفس، ہوزن، _____ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر محفوظ کر لیں اور ۳ گرام ہمراہ اسکبجین بزوری استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

پوست نیچ کاسنی، نیچ رازیانہ ہر ایک ۵ گرام، ثمر الطرفا، گاؤ زبان، تخم کشوٹ، تخم خبازی، تخم خطمی، اصل السوس ہر ایک ۲۵۰ گرام، تخم کاسنی ۳۰ گرام، اسارون ۵۰ گرام _____ تمام دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح کوئل چھان کر نبات سفید ۵۰۰ گرام ملا کر قوام تیار کریں اور ۴۸ گرام ہمراہ عرق کاسنی استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

تخم کاسنی، گل سرخ ہر ایک ۱۰ گرام، پنچ کاسنی ۱۲۲ گرام، جھاؤ زبان، تخم خیارین، نیلوفر، ہر ایک ۳۵ گرام، تخم کشوٹ، تخم خربزہ ہر ایک ۵۰ گرام، انیسون ۵۰ گرام، ریوند خطائی ۱۲ گرام، نبات سفید ۵۰ گرام، عرق گلاب، سرکہ ہر ایک ۲۵۰ ملی لیٹر، تمام دواؤں کو عرق گلاب اور سرکہ میں بھگو کر کل چھان کر حب دستور شربت بنائیں اور ۲۴ ملی لیٹر صبح، شام نوش کرائیں۔

نسخہ :-

پوست بلیبلہ زرد، پوست درخت رہیڑا، ہر ایک ۹ گرام، ددنون دواؤں کو ۲۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب پلہ حصہ باقی رہ جائے تو کل چھان کر جواکھار، پیسل، ہر ایک ۱ گرام، سفوف کر کے ڈالیں اور نوش کرائیں۔
 ضعت قوت جاذبہ کی صورت میں دار چینی، مصطلکی رومی، سلیفہ، گل سرخ کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
 خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د :-

افبنتین، مصطلکی رومی کو آب برگ مورد میں پیس کر مقام کبد پر ضما د کریں۔
 ضعت قوت باضمہ کی صورت میں یہ استعمال کرائیں

نسخہ :-

سنبل الطیب، کندر، مصطلکی، جوز ہوا، سعد کوفی، چرایتہ کو خوردنی طور پر استعمال کرائیں۔

خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د :-

صبر، گلنار، پوست انار، گل سرخ، تینوں دواؤں کو آب برگ مورد میں پیس کر مقام کبد پر ضما د کریں۔
 ضعت قوت ماسکہ کی صورت میں یہ ادویہ دیں۔

نسخہ :-

مود، زیرہ، گلنار، رب ہی، رب سیب، گل سرخ استعمال کرائیں۔
خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضمار،۔

مود، زیرہ کو آب سیب میں پیس کر ضما د کریں۔
ضعف قوت دافعہ کی صورت میں اسلیم کی فصد کھولیں، اس کے بعد
ماء الجبین، سکجبین، ایتیمونی اور مرہ ہائے ہلیدہ وغیرہ استعمال کرائیں۔

انتفاخ کبد

HEPATIC TUMEFACTION

اس مرض میں کبد کے اجزاء یا اس کے اوپر استر کرنے والی فشاء کے نیچے ریاہ
اور بخارات جمع ہو جاتے ہیں، جس کے سبب کبد پھول جاتا ہے۔

اسباب:

(I) ضعف کبد / ضعف قوت ہاضمہ کبد۔

(II) سدہ کبد

(III) غذائی بے اعتدالی

علامات:-

مقام کبد پر داہنی پسلیوں کے نیچے تناؤ اور کم دبیش درد ہوتا ہے، غذا جب معدہ
سے کبد کی طرف نفوذ کرتی ہے تو ٹھنڈا درد دماغ طور پر محسوس ہوتا ہے، کبد منفع (پھولے
ہوئے) مقابلہ ہاتھ سے دباؤ ڈالنے سے قراقری آواز سنائی دیتی ہے۔

اصول علاج:

_____ محملات استعمال کرائیں۔

- نہار منہ حمام کرائیں
- دلک کرائیں
- گرم و خشک اشیاء سے تکمید کرائیں۔
- مجففت اغذیہ کھلائیں

علاج :

- کاٹم رومی، سا ذبح ہندی، پودینہ خشک، نمک سلیمانی، نمک سیاہ، زیرہ سفید، زنجبیل، حلتیت خالص، ہم وزن تمام دواؤں کو آب برگ پودینہ سبز مرق میں دوا بہر کھری کر کے سایہ میں خشک کریں۔ اور ۳ گرام کھلائیں۔
- سفیل الطیب، مصطلی رومی، سہاگہ بریان، زنجبیل، نمک سیاہ، جواکھار تربد سفید، ریوند چینی، نوشادر، ہر ایک ۶ گرام تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام، صبح، شام ہمراہ عرق بادیان کھلائیں۔
- مصطلی رومی، ریوند چینی، تربد سفید، سہاگہ بریان، نمک سیاہ، ہر ایک ۶ گرام تمام دواؤں کو کوٹ کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام، صبح، شام کھلائیں۔
- سہاگہ بریان، نوشادر، مصطلی رومی، جواکھار، ہر ایک اگر کم، تمام دواؤں کو باریک پس کر گھٹند ۱۲ گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد بادیان، تخم قرطم، تخم کاسنی، مکوہ خشک ہر ایک ۶ گرام۔ گھٹند ۲۴ گرام تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
- حود غرق، سہاگہ بریان، انیسون، مصطلی رومی، ہر ایک اگر کم، کو باریک پس کر زنجبیل مربی ۹ گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد بادیان، تخم قرطم ہر ایک ۶ گرام، گھٹند ۲۴ گرام کو پانی میں جوش دیکر پانی چھان کر نوش کرائیں۔
- خارجی طور پر درج ذیل ادویہ / تدابیر اختیار کریں۔
- نسخہ تکمید :-
- نمک، شونیز، جاورس و فیہ سے حسب دستور تکمید کریں۔
- نسخہ ضاد :-

افسنتين، مصطكى، گل بابونہ، سنبل الطيب، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک
پیس کر مقام کبد پر نیم گرم ضماد کرر

التهاب کبد

HEPATITIS

اس مرض میں کبد میں امتلاء مواد کی وجہ سے التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے

اقسام بہ لحاظ اخلاط

التهاب کبد

Hepatitis

التهاب کبد دموی التهاب کبد صفراوی التهاب کبد لمبئی التهاب کبد سوداوی

بارد

حار

دب، اس کی درج ذیل دو قسمیں زیادہ متعارف ہیں۔

التهاب کبد

Hepatitis

التهاب کبد سمی

Toxic Hepatitis

التهاب کبد عدوی

Infective Hepatitis

التهاب کبد امیبی

Amoebic Hepatitis

التهاب کبد قشچی

Viral Hepatitis

التهاب کبد مصلی

Serum Hepatitis

اسباب:

غلبہ اخلاط :-

- (I) غلبہ خون
(II) غلبہ صفرا
(III) غلبہ بلغم
(IV) غلبہ سودا

غذائی بے اعتدالی :-

- (I) شیریں اور روغنی اشیاء کا بکثرت استعمال
(II) بخار کی حالت میں بکثرت پانی کا استعمال

تعدیہ :-

- (I) قشب Virus
(II) حمی اصفر Yellow Fever
(III) امیبا Amoeba
(IV) حمی محیطیہ راجعہ / نکسیہ Relapsing Fever
(V) دبیلہ کبد Hepatic Abscess
(VI) پورٹل بیکٹیریمیا Portal Bacteraemia
(VII) خوناب Serum

سمیات :-

- (I) شراب
(II) بوتازولی ڈین
(III) پاس
(IV) احتراق

متفرقات :-

- (I) موسمی بخار

علامات :

دموی :-

لازمی تیز بخار جس کی ابتداء سردی اور لرزہ سے ہوتی ہے، لیکن معمولی التهاب میں بخار ہونا لازمی نہیں ہے، شدید پیاس ہوتی ہے، مقام کبد پر ثقل، اور شدید جھین کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے۔ ضعف، اشتہاء، فساد ہضم، بعض اوقات قبض یا اسہال آتا ہے خشک کھانسی بھی آسکتی ہے۔ چہرہ سرخ، زبان خشک اور میلی، شدید التهاب کی صورت میں فواق ہوتی ہے۔ شدید عوارض میں غشی اور برد اطراف بھی ہو سکتا ہے۔ نبض موجی، عظیم، سریع اور متواتر ہوتی ہے۔

التهاب حاد دموی بعض اوقات مقعر کبد میں ہوتا ہے اور کبھی مدب کبد میں۔ التهاب مقعر کبد کی صورت میں معدی علامات مثلاً ہچکلی، قہقہ، اور تھنیز شدید درد وغیرہ علامات ملتی ہیں، مرین کو پشت کے بل لٹا کر دائیں پسلیوں کے نیچے مقام کبد پر صلابت نہیں ہوتی، ثقل کم ہوتا ہے، سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کھانسی کم یا بالکل نہیں ہوتی۔

التهاب مدب کبد کی صورت میں صدی علامات نمایاں ہوتی ہیں، مرین کو پشت کے بل لٹا کر، مقام کبد پر دبا کر دیکھنے سے ہلائی شکل کی صلابت محسوس ہوتی ہے، صدی وریوی علامات مثلاً کھانسی، عسر تنفس اور مقام کبد پر دائیں پسلیوں کے نیچے ثقل، تناؤ اور درد محسوس ہوتا ہے، پیشاب میں سُرخی اور فصالت ہوتی ہے۔

بعض اوقات التهابی کیفیت مدب و مقعر کبد، دونوں میں ہوتی ہے۔ ان حالات میں دونوں اقسام کی مشترک علامات ملتی ہیں۔ کبد کا یہ التهاب خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ التهاب فشار الکبد کی صورت میں، کبد کے طبعی افعال میں کوئی نمایاں نقص نہیں آتا، تاہم مقام کبد پر ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے، دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسفی عسر تنفس بھی ہوتا ہے۔

صفراوی :-

نوبتی بخار ہوتا ہے، درد اور جھین ہوتی ہے۔ ابتداء میں چہرہ اور زبان کارنگ زرد ہوتا ہے، بعد میں سیاہ ہوجاتا ہے، کرب، سوزش، اور جلن زیادہ ہوتی ہے۔ زبان پر چھوٹی چھوٹی پھینیاں نکل آتی ہیں۔ تھنیز میں پہلے صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے، بعد میں کرائی، زنگاری اور آخر میں

سیاہ مادہ خارج ہوتا ہے، براز زرد ہوتا ہے اور پیشاب نارے ہوتا ہے۔ نبض منشاری کی طرح صلب اور سرعت و تواتر کی زیادتی کے ساتھ صغیر ہوتی ہے۔
بلغمی۔

مقام کبد پر نقل کی زیادتی، معدہ میں تشنج اور کھانسی میں کمی ہوتی ہے، بخار، تشنگی، اور درد کی شدت کا فقدان یا غیر معمولی تخفیف ہوتی ہے۔ چہرے کے عضلات مسترخ ہوتے ہیں تبسج ہوتا ہے، زبان اور چہرے کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ لعاب دہن میں لزوجیت اور پیشاب میں سفیدی ہوتی ہے۔ نبض لین ہوتی ہے۔
سوداوی۔

مقام کبد پر درد کے بغیر صلابت ہوتی ہے۔ بخار نہیں ہوتا، لاغری اور ضعف ہوتا ہے، ضعف اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کم اور سیاہی مائل خارج ہوتا ہے، جسم کا رنگ سیاہ، زبان خشک اور کھردری ہوتی ہے، ————— ملحوظ رہے کہ التهاب کبد سوداوی شاذ و نادر پایا جاتا ہے، التهاب کبد کی دوسری انواع کے بارے میں معالجین لاپرواہی اور غریبہ و سقط کے نتیجے میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔
عدوی۔

اس قسم کا التهاب شدید عوارض کا موجب ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ایک انتہائی نوع کو ضمور صفراوی حاد (Acute Yellow Atrophy) بھی کہا جاتا ہے، تعدیہ کے ایک ہفتہ بعد کبد کا وزن تقریباً ۶۰ گرام کم ہو جاتا ہے، چھوٹے میں ملائم اور غلاف جھری دار۔ محسوس ہوتا ہے، کٹی ہوئی شکل طحال کے مشابہ دکھائی دیتی ہے۔ اس میں شوخ زرد اور گہرے سرخ رنگ کے حصے نظر آتے ہیں۔ زرد رنگ Necrotic Cells کو (Bile) سے رنگنے کے بعد خلیات کے بالکل غائب ہونے کے مقام پر سرخ رنگ نظر آتے ہیں۔ نیز عروق دمویہ و عروق شعریہ خون سے پُر اور کشادہ نظر آتے ہیں خوردبین سے دیکھنے پر کافی بڑے رقبہ میں خلیات کبد بالکل غائب نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا تسبیح خلوی (Cyto Plasm) بھی نظر نہیں آتا۔ اور باب الکید (Portal Vien) بھی متورم نظر آتا ہے، خلیات کبد کی دوبارہ مدائش رک جاتی ہے۔

سمی :-

اس صورت میں خلیات کبد میں تخریر (Necrosis) ہو جاتا ہے، اور ٹڈی پاں (Needle Biopsy) میں بے شمار صفراوی سداد (Bile Thrombin) اور چھوٹے چھوٹے تخریری ماسکے (Necrotic Focci) دکھائی دیتے ہیں۔
التهاب کبد خونابی اور التهاب کبد قشبی میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لئے ذیل میں ان کی علامات فارقہ تحریر ہیں۔

تفریقی علامات

التهاب کبد قشبی Viral Hepatitis	التهاب کبد خونابی Serum Hepatitis
۱۔ مدت حضانت ۳۰ دن کے قریب ہوتی ہے	۱۔ مدت حضانت ۱۰۰ دن کے قریب ہوتی ہے
۲۔ اختلاط سے تعدیہ ہو سکتا ہے۔	۲۔ اختلاط سے تعدیہ نہیں ہوتا، شافونادر ہی ہو سکتا ہے۔
۳۔ شرح اموات زیادہ ہوتی ہے	۳۔ شرح اموات کم ہوتی ہے۔
۴۔ زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔	۴۔ کم اشخاص مبتلا ہوتے ہیں۔

اصول علاج :

- التهاب مقعر کبد کی صورت میں لیٹنات اور مسہلات استعمال کرائیں۔
- التهاب محدب کبد میں مدرات استعمال کرائیں۔
- ضمدات میں ایسی دوائیں شامل کریں جو تھوڑے اور ملل خواص ہوں، بعض اوقات، مرض کے زمانہ کی رعایت کرنا ضرور ہوتی ہے، مثلاً ابتدائیں وادع، انتہائیں مرغیات اور زمانہ انحطاط میں محملات زیادہ شامل کرنی چاہئیں۔
- قبض کی صورت میں لیٹنات استعمال کرائیں۔
- التهاب کبد دموی میں فصد کھولیں۔
- حسب ضرورت اینفیکٹ اور منقیات استعمال کرائیں۔

علاج:

• التهاب کبد دموی کی صورت میں دائیں باسیلیق، اکل یا اسیلیم کی فصد کھولیں اور ریعن کی قوت کو طوطا رکھتے ہوئے رفتہ رفتہ فاسد مادہ کا اخراج کریں، اس کے بعد آب کاسنی سبز مروق، آب کھوہ سبز مروق، آب انارین، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، سکنجبین ۲۲ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

• التهاب مدب کبد دموی میں فصد کے بعد شیرہ سہ تخم، آب کاسنی اور سکنجبین بزدوری استعمال کرائیں۔

• التهاب مقعر کبد، دموی میں تلین کے لیے آب کاسنی سبز مروق، آب کھوہ سبز مروق میں مغز فلوس خیاشبہ حل کر کے اور کسی قدر روغن بادام کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

• درم مدب کبد، بلغی کی صورت میں گرم مدرات مثلاً تخم کرفس، انیسون، بادیان مانخواد، پوست نینج کاسنی میں سکنجبین بزدوری ملا کر نوش کرائیں۔

• درم مقعر کبد بلغی میں بھنجی کے بعد یہ نسخہ مہل استعمال کرائیں۔
نسخہ مہل:-

قندلم، بفساج، ہر ایک ۲۱ گرام، مغز فلوس خیاشبہ ۸ گرام، ترنجبین ۸ گرام، ریوند چینی ۵ گرام، روغن بادام ۲۵ ملی لیٹر، مویز منقی حسب ضرورت — تمام دواؤں کو حسب دستور نوش کرائیں۔

• مقعر کبد کے درم سوداوی کی صورت میں بھنجی مادہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مہل سوداوی:-

سوز منقی ۹ عدد، انجیر زرد ۵۲ گرام، عناب ۲۰ دانہ، پوست نینج کبیر ۵۰ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۳۶ گرام، تخم خلیہ ۵ گرام، بنات سفید حسب ضرورت، تمام دواؤں کا حسب دستور شربت تیار کریں اور ایک چمچ پانی میں حل کر کے روغن بادام ۲۵ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ اس کے بعد اسفرائج کی غرض سے بخوفی خراج ۸ گرام کھلانے کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ استفراغ :-

انفتون ۱۰ گرام، سنار کی ۵ روہم ۳ گرام، بادرنجبویہ، گاؤد باں، اصل السوس ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مغز فلوس خیار شبنم ۸ گرام، شیر خشک، ۴۰ ملی لیٹر حل کر کے روغن بادام، ۱۰ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ اس کے بعد سکنجبین بزوری دواہ الکرم یا قرص نقل استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ التهاب کبد دموی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

تخم کاسنی، تخم خربزہ، تخم کشوث، ہر ایک ۵ روہم ۱۰ گرام، ریوند خطائی ۵ روہم ۱۰ گرام، لک مغول ۵ روہم ۱۰ گرام، جلبا شیر ۵ روہم ۱۰ گرام۔ تمام دواؤں کو پیس کر آب کاسنی میں گوندہ کر اقرص بنائیں۔ اور ۵ روہم ۱۰ گرام ہمراہ آب کاسنی سبز مرق، آب مکوہ سبز مرق، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، سکنجبین بزوری ۴۰ گرام، نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ التهاب مقعر کبد دموی میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

تخم حمام، جلبا شیر، گل سرخ، زرشک، ہر ایک ۵ روہم ۱۰ گرام، ریوند خطائی، لک مغول، ہر ایک ۵ روہم ۱۰ گرام، زعفران ۵ روہم ۱۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی میں گوندہ کر چھوٹی چھوٹی اقرص بنائیں اور ۵ روہم ۱۰ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں،

۔۔۔۔۔ التهاب کبد صفراوی میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

مغز تخم خیار، مغز تخم بارتنگ، مغز تخم خربزہ، ہر ایک ۱۲ گرام، بادیان، گرام، گل سرخ ۴ گرام، ریوند جینی ۵ گرام، عصا زرشک ۱۰ گرام، تخم کشوث، جلبا شیر، مکوہ، تخم کاسنی ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف بنائیں اور ۴ روہم ۱۰ گرام ہمراہ آب کاسنی و آب مکوہ نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ التهاب کبد دموی و صفراوی میں درج ذیل نسخہ جات مفید ہیں۔

نسخہ :-

پوست بیلبلہ زرد ۵ گرام، تخم کشوث، تخم کاسنی، مغز تخم خیار، مغز تخم باد بارتنگ،

ہر ایک، گرام، ریوند چینی، لک مفسول ۸، ۲۵ گرام، سقونیا مستوی اگر ام، — تمام دواؤں کو
پیس کر سفوف بنائیں اور ۲ گرام ہمراہ مارا الجبن نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

ریوند چینی ۸، ۲۵ گرام، تخم کاسنی، بادیان، تخم کرفس، گل سرخ، زرد شک، ہر ایک ۵، ۱۰ گرام،
مغز حب قرط، مغز تخم خربزہ، مغز تخم خیارین، ہر ایک ۲۵ گرام، — تمام دواؤں کو پیس کر
سفوف بنائیں اور ۵۔ ۱۰ گرام، صبح کو ہمراہ آب مکوہ، آب کاسنی سبز مروق، سکنجبین ہزوری
حل کر کے نوش کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

سبیل الطیب، اسار ولی، زعفران، اذخر، مصطلی، بھک سنگ، جواکھار، ہر ایک، گرام،
قصب الذریرہ تلخ، گل سرخ، صبر زنجبیل، حب الالاس، ہر ایک ۳ گرام، مکوہ خشک ۱۲ گرام
مغز فلوس خیار شنبہ ۳۶ گرام، — مغز فلوس خیار شنبہ کو عرق مکوہ سبز میں بھگو دیں
اور لچھان کر شیرہ نکالیں۔ اور مصطلی و زعفران کے علاوہ جملہ دواؤں کو باریک پیس کر اس میں
حل کریں، پھر مصطلی اور زعفران کو باریک پیس کر علیحدہ سے شامل کریں اور ضما د کے طور پر استعا
ل کریں۔

ضما د کے طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہے، التهاب کبد کے ابتدائی ایام میں استعمال کرائیں

نسخہ ۳۔

مندل سرخ، تخم کاسنی، گل سرخ، آرد جو، گل ارمنی ہر ایک ۶ گرام، — تمام
دواؤں کو عرق مکوہ خشک میں پیس کر، روغن گل ۱۲ ملی لیٹر، سرکہ ۶ ملی لیٹر ملا کر مقام کبد پر
ضما د کریں۔

یہ نسخہ التهاب کے آخری مرحلے میں سود مند ہے۔

نسخہ ۴۔

سبیل الطیب، اکلیل الملک، گیسو، گل یالونہ، ہر ایک ۶ گرام، مغز فلوس خیار شنبہ
۹ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب مکوہ سبز میں ملا کر مقام کبد پر
ضما د کریں۔

• ——— ورم کبد بلغمی کی صورت میں داخلی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ قرص :-

ریوند، سقو لو قندر یون، ہر ایک ۸ گرام، گل سرخ، ۷ گرام، تخم کشوث، ۱۰ گرام، امیرسا ۵ گرام، قاقلہ صغار، دارچینی ہر ایک ۸ گرام، زرد فاشک، تخم کرفس انیسون، بادیان ہر ایک ۵ گرام، مصطکی، ۷ گرام، زعفران ۰.۹ گرام، ——— تمام دواؤں کو باریک پس کر آب بہہ میں گوندھ کر ۳۵ گرام کی ٹکیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ اور ہر روز ۲ ٹکیہ ہمراہ سکنجبین ۵۲ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
نسخہ :-

گل سرخ ۵، ۷ گرام، زرشک ۴ گرام، تخم کرفس کوہی، پنج اذخر، سلینج، قصب الزہرہ، نقاح اذخر، انیسون، ہر ایک ۵.۰ گرام، مصطکی، اسارون، سنبل الطیب، دار شیشعان، ریوند چینی، عود، فوہ، لک مغسول، ہر ایک ۷ گرام، مرکلی، زعفران ہر ایک ۴ گرام، ——— تمام دواؤں کو باریک پس کر آب بادیان میں گوندھ کر ۲۲ گرام کی اقراص بنائیں اور ۲ قرص ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔
• ——— التهاب کبد سودادی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱ :-
علبہ ۳ گرام، پر سیا دوشاں، اصل السوس ہر ایک ۵، ۷ گرام، تخم خطمی تخم خبازی ہر ایک ۴ گرام، زرد فاشک ۵.۰ گرام، تخم کتان ۵ گرام، انجیر سفید ۱۰ عدد، صونیز منقہ ۰.۹ گرام، ——— تمام دواؤں کو ۱۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوشش دیں جب پانی ۵۰ ملی لیٹر رہ جائے تو مل جھان کر محفوظ کر لیں اور ۱۲۰ ملی لیٹر لے کر دو غنہ بید انجیر ۶ ملی لیٹر شامل کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔
• ——— غلبہ بلغم کی صورت میں خارجی طور پر یہ دوا استعمال کریں۔

نسخہ ضماد :-
مرکی، فستقین، برنجاصف، گل بابونہ، سعد کوفی، مکوہ خشک، حاشا، ہر ایک ۷ گرام، رسوت ۳ گرام، ——— تمام دواؤں کو آب مکوہ سبز میں پس کر مقام طہال برضاد کریں۔

• سوداوی میں یہ نسخہ خارجی طور پر استعمال کرائیں۔

نسخہ: شحم مرغ، مغز ساق گاؤ، سنبل الطیب، مندل، آرد حلبہ، کرنہ، انجیر،
مقل، برش، اکلیل الملک، سداب، روغن گل و فیرہ سے قیر و طی تیار کر کے مقام کبد پر
مالش کریں۔

عظم کبد


HEPATOMEGALY

اس مرض میں، کسی درم کے بغیر کبد کی طبعی ساخت میں اضافہ ہو جاتا ہے
افعال میں کوئی خاص خلل واقع نہیں ہوتا تاہم اس عظم کی وجہ سے بعض دشواریاں ضرور محسوس
ہوتی ہیں۔

اقسام:

عظم کبد

Hepatomegaly



اسباب:

1. عام جسمانی ضعف کے نتیجہ میں کبد کے رباط اور دیوار شکم کا کمزور ہو جانا۔
2. آنتن احتقان انعقالی۔

1. کبد کے حجم میں واقعی اضافہ ہو جاتا ہے۔
2. کبد بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے حالانکہ اس کا حجم طبعی ہوتا ہے۔

(۱۶۰) سور مزاج حار

(۱۶۱) سدہ قناتہ صفراوی

(۱۶۲) دبیلہ کبد

(۱۶۳) تصلب کبد

(۱۶۴) سرطان کبد

(۱۶۵) آتشک کبد

(۱۶۶) کیہ دیدانی

(۱۶۷) قلت الدم طحال

(۱۶۸) حمی اجمالیہ

(۱۶۹) زحیر

(۱۷۰) ذیابیطس

(۱۷۱) حسیق حمام تاجی

علامات :

۱۔ حقیقی :-

احتمال انفعالی کی صورت میں، امراض قلب سے بالعموم اور حسیق حمام تاجی سے بالخصوص تمام کبد ایک جیسا بڑھ جاتا ہے، کبد کا کنارہ سخت اور سطح بالکل صاف ہوتی ہے۔ وہ بڑھتے بڑھتے ناف تک پہنچ جاتا ہے، اس میں زود صبی اور دردناکی ہوتی ہے۔ شدید عوارض میں یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پیروں میں ترل ہوتا ہے، سورہ ہضم اور استعمار زتی بھی ہو جاتا ہے۔

سور مزاج حار کی صورت میں کبد کے عظم کو امتحان بالחס سے نہیں معلوم کیا جاسکتا، تاہم کبد ایک جیسا بڑھتا ہے۔ مقام کبد پر درد کی بجائے معمولی دکھن سی ہوتی ہے لیکن بخار کی صورت میں معمولی درد ہوتا ہے، سورہ ہضم اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ مقام کبد جسم کے باقی حصہ کی نسبت کچھ گرم محسوس ہوتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، مریض چڑچڑا اور غمگین ہوتا ہے۔ دبیلہ کبد میں عظم کبد زیادہ نمایاں نہیں ہوتا۔

تصلب کبد کی صورت میں کبد کا وزن ۴-۵ کیلو گرام تک ہو سکتا ہے، ابتداء میں صرف حجم میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کنارے نرم اور سطح ہموار ہوتی ہے لیکن پیدا شدہ بافت الحاقی کے سکڑنے کے نتیجہ میں اس کی شکل و ہیئت میں فرق آجاتا ہے چنانچہ اب اس کی شکل اور سطح ناہموار ہو جاتی ہے اور کنارے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ قلت الدم طحالی کی صورت میں مرض کے آخری مرحلے میں عظم کبد ہوتا ہے، اس سے پہلے قے الدم ہوتی ہے اور مرض آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔

سرطان کبد کی صورت میں بھی کبد بڑھ جاتا ہے۔

(ب) غیر حقیقی :-

جگر کی ساخت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تاہم کبد بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے، مثلاً عام جسمانی ضعف کی بناء پر کبد کے رباط اور دیوار شکم بھی کمزور ہو جاتی ہیں جس سے جگر کا سہارا کمزور ہو جاتا ہے اور وہ نیچے لٹک جاتا ہے اور معالج کو عظم کبد کا احساس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مریض کے عام جسمانی ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے تشخیص آسانی کی جاسکتی ہے۔

ذات الجنب اور کساح کی صورت میں ان دونوں امراض کی علامات موجود ہوتی ہیں یا ان کی روئیداد ملتی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال اس مرض میں عظم کبد کے علاوہ کوئی دوسری علامت بالعموم موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی اس غلٹ سے کبد کی طبعی کارکردگی پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے۔

اصول علاج،

- ۱۔ التهاب کبد کے اصول کے مطابق علاج کریں
- ۲۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج:

- ۔۔۔۔۔ آب کا سخی سبز مرق، آب کھوہ سبز مرق نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ خیساندہ انستین نوش کرائیں
- ۔۔۔۔۔ یو ۵۲ بعد غذا نوش کرائیں، مجرب ہے۔
- ۔۔۔۔۔ درج ذیل حب کبدہ نوشادری بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

نسخہ :-


نوشادر، نمک طعام، نمک سیاہ، نمک لاہوری، سہاگہ بریاں، نرکچور، ہلیہ سیاہ، پوست
ہلیہ کابی، باؤٹرنگ، خلفل سیاہ، زنجبیل، ہر ایک ۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر عرق گلاب میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور بعد طعام ۲، ۳ گولیاں کھلائیں۔

صفر کبد

HEPATIC CIRRHOSIS

اس مرض میں کبد سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے طبی افعال میں بھی خلل واقع ہوتا
ہے۔ اور بعض اوقات ۱۵ — ۴۰ یوم میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اقسام :-



اسباب :-

امراض کبد :-

۱۔ سد کبد

یہ نادرالوقوع اور نہایت خطرناک مرض ہے اس میں کبد کی پوری ساخت چند دنوں میں ہی سکڑ کر لاغر
ہو جاتی ہے، اور کبد کے طبی افعال میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، یہ تھیں۔ بالخصوص حاملہ عورتوں میں کثیرالوقوع
یہ کبد چھوٹا ہو جاتا ہے تاہم اس کی ساخت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔

II) الہباب کبد

III) ضعف کبد

IV) کبد پر ہمہ وقت دباؤ رہنا۔

V) یرقان

امراض معدہ و امعاء:-

I) معدہ و امعاء کے قوی اربعہ (ماضمہ، جاذبہ، ماسکہ اور دافئہ) میں ضعف

II) سرطان معدہ

III) خم معدہ کا تفتیق

امراض صدر:-

I) استسقاء صدر

II) عظم القلب

III) متلی فسل قلب

حاد، متعدی امراض:-

I) حمی معویہ

II) حمی اجامیہ

III) انف العنزہ

IV) آتشک

V) مزمن تعدیہ

ادویات:-

I) پارہ کے مرکبات کا بکثرت استعمال

II) سنگمیا کے مرکبات کا بکثرت استعمال

III) منوم ادویہ

IV) صنعتی ادویات (کیمیکل)

متفرقات:-

I) نقص تغذیہ

- (۱) کثرتِ نوثی
(۲) حمل
(۳) رنج و غم
(۴) التهابِ صفاق مزمن
(۵) مصالحہ دارِ اغذیہ کا کثرتِ استعمال
(۶) خلطِ صفراوی کا مزمن مرض۔

علامات :

حادہ۔

یرقان ہوتا ہے، ابتداء میں کبد بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، معمولی بخار ہوتا ہے، قسم شدہ سیفی میں درد محسوس ہوتا ہے، قبض، قراقر اور نفخ ہوتا ہے، اسہال آتا ہے جس میں براز غسالی اور بعض اوقات باقاعدہ خون آتا ہے، ابتداء میں براز کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس کے بعد غسالی، دُموی اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔

پیشاب معمولی یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں صفرا کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رطوبتِ بیضیہ کم ہوتی ہے، تھوڑی دیر رکھے پر سبز زردی مائل رسوب تہ نشین ہو جاتا ہے، تھے آتی ہے، جس میں ابتداءً صرف معدہ کی مخاطی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیسے ہوئے قہوے کی مانند، خون آمیز سیال رطوبت خارج ہوتی ہے، بہن سرخی چلتی ہے۔

جسم کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور زیر جلد چھوٹے چھوٹے دھبے پڑ جاتے ہیں، قویٰ میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ حواس میں ضعف آ جاتا ہے۔ درد سر کی شکایت ہوتی ہے، تنفس میں بدبو ہوتی ہے۔ عضلات میں تشنج ہوتا ہے انگلیاں چھوٹی اور عروقِ دمویہ دقیق ہو جاتی ہیں، زبان خشک اور بھدی ہو جاتی ہے۔ غذا کی مقدار میں معمولی اضافہ سے نقل محسوس ہوتا ہے اور کھانسی آنے لگتی ہے، سرد پانی نوش کرنے سے مقام کبد پر دردِ دناکی اور دباؤ محسوس ہوتا ہے، جسم میں شدید ہزال اور ضعف ہوتا ہے، ناک، معدہ، امعاء اور رحم سے جریانِ خون ہوتا ہے، عورتوں میں اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔ بالعموم ہفتہ عشرہ ہی میں مریض فوت ہو جاتا ہے۔

مرزمن :-

مرض کی علامتیں آہستہ آہستہ اور غیر محسوس طور پر نمودار ہوتی ہیں۔ ابتدا میں نفخ، قراقر، قبض اور اسہال وغیرہ عوارض رونما ہوتے ہیں۔ جلد بے رونق اور پھکی پڑ جاتی ہے، ضعف میں اضافہ ہو جاتا ہے، عضلات بھی تحلیل ہوتے رہتے ہیں، جگر چھوٹا ہو جاتا ہے، کبد کے صفیر کو قرع سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کبدی حدود پر قرع کرنے سے بھدی آواز پیدا ہوتی ہے اور صفیر کے تناسب سے ہی حدود میں کمی آ جاتی ہے۔ اور سور القنیہ یا استسقا ہو کر مریض فوت ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

استسقا (بوجہ دیگر اسباب)	صفیر کبد
۱۔ کبد کی جسامت طبعی ہوتی ہے	۱۔ کبد چھوٹا ہوتا ہے
۲۔ طحال کی جسامت طبعی ہوتی ہے	۲۔ طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے
۳۔ جریان خون شاذ و نادر ہوتا ہے	۳۔ معدی و معوی جریان خون کثیر الوقوع ہوتا ہے۔
۴۔ باریطوی، قلب اور کلیہ میں مرض ہوتا ہے	۴۔ دیگر اعضاء میں مرض نہیں ہوتا۔
۵۔ استسقا اطراف یا چہرہ سے شروع ہوتا ہے	۵۔ استسقا بطن سے شروع ہوتا ہے
۶۔ شکم کی دریدیں پھیلی ہوئی نہیں ہوتیں۔	۶۔ شکم کی دریدیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں

اصول علاج :

- _____ ملطفات، مفتح سد، مدرات اور محلات استعمال کرائیں۔
- _____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- _____ مسبلات اور منقیات کھلائیں۔

علاج :

- _____ مار الاصول نوش کرائیں۔

- _____ تخم کاسنی، پرسیا و شان، تخم کرفس اور تخم کشوت کو پانی میں محوش دے کر ہمارا شہر بہت زردی نوش کرائیں۔
- _____ ایارچ فیکرا استعمال کرائیں۔

تلیف کبد

HEPATIC FIBROSIS

اس مرض میں خلیات کبدی تباہ ہونے لگتے ہیں، اس میں مواد کا ترشح ہوتا ہے جو کچھ عرصہ بعد منجمد ہو کر لیفی ساخت (ریشہ دار ساخت) میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کبد میں غیر معمولی صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب :-

- (I) التهاب کبد
- (II) بعض قلبی امراض
- (III) عادتاً و طبعاً خارج ہونے والے خون کا احتباس۔
- (IV) حصاة الکبد
- (V) حمی اجامیہ
- (VI) آتشک
- (VII) سورہضم
- (VIII) گرم مصالحہ کا کثرت استعمال
- (IX) بواسیر
- (X) کثرت سے نوشی
- (XI) نقص تغذیہ

علامات :-

دائیں طرف کی پسلیوں میں خفیف درد ہوتا ہے، ابتدا میں کبد بڑھا ہوا ہوتا ہے جو بعد میں لٹھی اور صلب ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، ضعف اشتہار ہوتا ہے، سورمخ کی وجہ سے نفع، قبض اور اسہال کی شکایت ہوتی ہے، اسہال بالعموم دموی ہوتا ہے، معدہ دامعہ کی عروق دمویہ کے انشقاق کی وجہ سے تھے الدم کی بھی شکایت ہوتی ہے، شکم کی دریدیں پھول جاتی ہیں۔ جلد خشک، کھردری اور خاکستری ہو جاتی ہے۔ استقلائے زرق اور عظم الطحال ہوتا ہے، پیروں میں تریلی کیفیت ہوتی ہے، جو بعد میں سارے جسم میں محسوس کی جاسکتی ہے، لاغری اور ضعف نمایاں ہو جاتا ہے۔ ————— براز دموی تھے الدم، عظم طحال اور استقار اس مرض کی نمایاں، تشخیصی علامات ہیں۔

اصول علاج :

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- قبض نہ ہونے دیں

علاج :

- ریونجینی، مفرد یا مرکب، استعمال کرائیں۔
 - آب عنب الثعلب سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق، ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر
- بمراہ شربت انار ۱۲ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

دج الکبد

HEPATALGIA

اس مرض میں کبد میں درد ہوتا ہے ————— دج الکبد دراصل بذات خود کوئی مرض نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے امراض کی ایک علامت ہے۔

اسباب :-

۱۔ کبد پر استر کرنے والی عصی غشا کا سورمزاج مختلف اور التهاب

(۱۱) انتفاخ کبد

(۱۲) التهاب کبد

(۱۳) حصاة کبد

(۱۴) سدة کبد

(۱۵) ضرب کبد

(۱۶) عظم کبد

(۱۷) نہار منہ شدید ریاضت، تکان، حمام، یا جماع کے فوراً بعد پانی نوش کرنا۔

(۱۸)

علامات :-

کبد کے سور مزاج حار میں درد سوزشی نوعیت کا ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے منہ خشک ہوتا ہے، پیشاب زرد رنگ کا ہوتا ہے، صفر کبد کی علامات بھی پائی جاسکتی ہیں، براز میں بدبودار غلیظ صفر خارج ہوتا ہے، صفر اوی تے آتی ہے، بطلان اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے اور عام طور سے جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبد کے سور مزاج بار د میں درد کی نوعیت خفیف ہوتی ہے، پلوں اور پردوں میں تھج ہوتا ہے، ہونٹ سفید پڑ جاتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد اسہال آنے لگتے ہیں اور لازمی طور پر بخار ہوتا ہے۔

انتفاخ کبد کی صورت میں درد محدودی کیفیت کا حال ہوتا ہے، درم کبد بلغمی کی صورت میں در د میں خفت ہوتی ہے حصاة کبد اور ضربہ و سقوطہ کبد کی صورت میں ان کی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں، چنانچہ حصاة کبد میں حصاة کی وضع کے اعتبار سے شدید درد ہوتا ہے، درد کی تیسیں اوپر کی جانب دائیں شانے اور پیچھے کی طرف عظم الکلف تک جاتی ہیں۔ درد کی نوعیت تشنجی دوری ہوتی ہے۔ در سے کے درمیان وقفہ میں بھی ثقیل درد ہوتا ہے، درد کی شدت سے بعض اوقات جی مللاتا ہے، آبکائیاں آتی ہیں، فواق کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور دیگر معدی و معوی علامات رونما ہوتی ہیں، نبض سریع اور ضعیف چلتی ہے، پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے، جماع، شدید ریاضت کے بعد پانی نوش کر لینے کی صورت میں پیشانی عرف آلود ہو جاتی ہے، مقام کبد پر پسینہ آ جاتا ہے۔ عظم الکبد کی صورت میں

دردِ نقل کے ساتھ ہوتا ہے اور مریض بائیں پہلو پر لیٹنے سے قاصر ہوتا ہے۔

اصولِ علاج :-

- سور مزاج کی صورت تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں
- انتفاخِ کبد کی صورت میں کاسہِ ریاح ادویہ استعمال کرائیں
- سدہ کبد کی صورت میں منہج، منہیل اور مدر ادویہ دیں
- التباب / درم کبد کی صورت میں اس مرض کے ذیل میں تحریر کردہ اصولِ علاج اختیار کریں۔
- ضربہ و سقطہ کی صورت میں مومیائی وغیرہ کا ضمد کریں۔
- حصاة و رزل کلیہ کی صورت میں مسکن درد ادویہ دیں اور تکیہ کریں، بطول کریں، مدرات و مفتحات استعمال کرائیں۔

علاج :-

- ضرب و سقطہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

گل ارمنی ۵۲ گرام باریک پس کر لعاب اسپنغول اور روضن گل کے ہمراہ کھلائیں۔

نسخہ :-

ریوند چینی، گل ارمنی ہر ایک ۲۲ گرام کو، ہمراہ شربت حب الّاس کھلائیں۔ اور چند دنوں بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

فہ، ریوند چینی، ہر ایک ۵۲ گرام، دارچینی ۵۲ گرام، تمام دوائیں کو باریک پس کر ۵۲ گرام، کو شراب انگوری یا شربت بنفشہ میں حل کر کے ۳ دن نوش کرائیں خارجی طور پر مقام کبد پر مومیائی کا ضمد رکھیں۔

- کبد کے سور مزاج حار کی صورت میں یہ نسخہ دیں۔

نسخہ :-

عصارہٴ بنسنتین، گل سرخ ہر ایک ۵۲ گرام، عود قماری، عود بلسا، حب بلسا،

گل سرخ ۵۰ گرام، سنبل الطیب، عصارہ غافقہ، ریونڈ چینی، افستین، مصطکی،
ہر ایک ۷ گرام، زرشک ۵۰، آگرم، اسارون، رب السوس، قعاح اذخر ۲، گرام،
زعفران ۵۰ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف تیار کریں اور ۷ گرام ہر ایک کینین
لوش کرائیں۔

زرنب، زرنباد، بادیان، مصطکی رومی، دارچینی، ہموزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر اس کے ہموزن نبات سفید ملا کر محفوظ کریں اور ۹ گرام ہمراہ عرق باویان ۸۵ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

•۔۔۔۔۔ حصہ کبد کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

کھاؤ زبان، گل بابونہ، زراوند بعد حرج، ہر ایک ۳ گرام، فنتوریون دقیق، تخم انجیر،
بادرنجبویہ، خطمی ہر ایک، گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو عرق مکوہ، عرق کاسنی ہر ایک ۵۰۰
ملی لیٹر میں جوش دیں اور نل چھان کر شربت بزوری ۳۶ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
نسبتہ:-

سنبل الطیب، زرنب، بادرنجبویہ ہر ایک ۵ گرام، نمک لاہوری ۲ گرام۔
تمام دواؤں کو باریک پیس کر، شیرہ حب النیل سفید، افیمون ہندی تازہ ہر ایک ۹ گرام میں
شہد خالص ۳۶ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

سنبُل الطیب، سلیمہ، اسارون، ایسوں، زعفران، قسط، گل سرخ، تخم کاسنی، تخم کرفس،

۱۰ ہر ایک ۶ گرام، ریونڈ چینی، مرکی ہر ایک ۳ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر تین گنا شہد خالص میں حل کر کے محفوظ کر لیں اور ۵۔ ۶ گرام ہمراہ آب تنازہ کھلائیں۔

- دج الکبد میں خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں
- حصاۃ کبد کی صورت میں اکلیل الملک، مکوہ خشک، گل میسو، بابونہ، پرسیاوشان ہر ایک ۲۴ گرام کو لیٹر پانی میں جوش دیں اور نیم گرم مقام کبد پر اس گرم پانی سے نطول کریں۔
- سنبل الطیب اور مصطلکی کو پیس کر مقام کبد پر ضاد کریں،
- یخ آگ، خاص طور سے اس کی گرہ کو باریک پیس کر مقام کبد پر ضاد کریں
- پوست خنشاں ۲۴ گرام، عرق گلاب ۶۰ ملی لیٹر میں جوش دیکر مقام کبد پر نیم گرم ٹنکور کریں۔

- تخم حلبہ کو سرکہ میں پیس کر گرم کر کے ضاد کریں
- مصطلکی روی، سنبل الطیب، افستین، ہمزون، تمام دواؤں کو عرق بادیان میں پیس کر مقام کبد پر ضاد کریں۔

حصاۃ کبد

HEPATIC CALCULUS

اس مرض میں کبد اور مجاری صفرا میں چھوٹے چھوٹے حصاۃ پیدا ہو کر مرضی علامات کا موجب ہوتے ہیں۔ یہ مرض عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب:

- (I) کبد کے بعض امراض
- (II) دائمی قبض
- (III) حیوانی غذاؤں کا کثرت استعمال
- (IV) کثرت سے نوشی
- (V) غیر معمولی فربہی (سمن مفرط)

(vi) محنت و ریاضت میں کمی

(vii) التهاب مرارہ

(viii) ذیابیطس

(ix) نفرس

(x) تدرن رلیوی

(xi) سرطان

علامات:

ابتداء میں کستی اور کاہلی ہوتی ہے، سورہضم ہوتا ہے، کسی التهاب اور صلابت کے بغیر کبد میں معمولی درد ہوتا ہے، بعض اوقات کبد کے بعض حصوں میں صلابت بھی ہوتی ہے، شدید درد کے آغاز سے قبل اضمحلال بڑھ جاتا ہے پھر خود بخود یا کسی جسمانی حرکت کے بعد شدید درد شروع ہوتا ہے۔ درد بالعموم بائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے، مقام بگر سے اٹھتا ہے جس کی ٹیسس شکم، پشت اور داہنے شانے تک جاتی ہیں۔ مقام کبد کے پاس کی پسلیاں شکم میں کسی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، درد نوبت بنو بہت شدید ہونا جاتا ہے، درد کی شدت کی وجہ سے مریض نثرپنے لگتا ہے۔ پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے، بعض اوقات معمولی لرزہ بھی ہوتا ہے، ابتداء میں مقام کبد پر دبانے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے، متلی، تے اور فواق کی شکایت ہوتی ہے، بعض ضعیف ہوتی ہے۔ شدید صورت میں فشی طاری ہو سکتی ہے۔ سبب بھی ہو سکتا ہے، ————— معالجہ میں بے پرواہی کی صورت میں ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔

تفریقی علامات

قولنج کبدی Hepatic Colic	قولنج کلوی Renal Colic
۱۔ درد مقام کبد سے شکم، پشت اور داہنے شانے کی طرف بڑھتا ہے	۱۔ درد مقام کلیہ سے شروع ہو کر خبیصوں اور قصب کی طرف بڑھتا ہے۔
۲۔ پیشاب میں صفراء کی آمیزش ہوتی ہے	۲۔ پیشاب میں خون کی آمیزش ہوتی ہے۔
۳۔ براز مٹیالا ہوتا ہے	۳۔ براز کارنگ طبعی ہوتا ہے۔

- | | |
|---|--|
| ۴۔ پشاب میں رمل خارج ہو سکتے ہیں | ۴۔ براز میں حصاة خارج ہو سکتے ہیں |
| ۵۔ دورہ کے بعد کچھ ران میں ثقل ہوتا ہے۔ | ۵۔ نوبت کے بعد مراءہ کے دبائے سے درد ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ تقطیر البول یا احتباس بول ہوتا ہے۔ | ۶۔ پشاب غیر طبعی ہوتا ہے |
| ۷۔ مردوں میں، بالخصوص بچوں اور جوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔ | ۷۔ عورتوں میں، بالخصوص ادھیر عر کی عورتوں میں کثیر الوقوع ہے |

اصول علاج:

- مفتحات حصاة استعمال کرائیں اس کے بعد مدرات دیں۔
- مقویات کبد دیں
- فصد کھولیں
- مقام کبد پر مناسب ضماد رکھیں۔

علاج:

- مفتت کے طور پر یہ نسخہ جات استعمال کرائیں
- نسخہ مطبوخ :-
 فوہ الصبح، تخم انجبرہ، بادرنجبویہ، انگور شغال، ہر ایک ۵ گرام، قنطاریون دقیق، ۵ گرام
 گل گاؤ زبان، زراوند، حرج، گل بابونہ، ہر ایک ۳ گرام، عرق غلب الثعلب، خار خشک،
 خار شتر ہر ایک ۲۵۰ ملی لیٹر / گرام — تمام دواؤں کو ان عرقیات میں جوش دیں، جب ایک
 تنہائی رہ جائے تو ل چھان کر شربت انناس — ۸۰ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- نسخہ :-

جاؤ شبیر، تخم بلیمون، حب القلب، تخم ترب، بہوزن — تمام دواؤں کا ہر ایک
 سفوف بنائیں اور ۳ گرام شہد خالص (حسب ضرورت) میں گوندھ کر کھلائیں اس کے بعد درج
 ذیل ادویہ کا جوشاندہ نوش کرائیں۔
 تخم کاسنی، تخم کرفس، تخم خرمزہ، برنجاسف، پنخ بادیان، ہر ایک ۵ گرام — تمام

دواؤں کو آب تازہ میں جوش دیں اور شربت بزوری ۲۴ ملی لیٹر، حل کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔

نسخہ :-

حجر الیہود، صمغ آلو، خار خشک، حب کا کچ، بادیان، مغز خستہ آلو، لبو، تخم بیون، ہر ایک ۵۰، ملی گرام، تخم خربزہ ۵۰، گرام، تخم ترب، حب القلت، ہر ایک ۵۰، گرام، صمغ عربی ۹۰، ملی گرام، مقرب خاکستر، آگینہ سوختہ ہر ایک ۲۵۰، ملی گرام، بنات سفید ۲۳۵، گرام، تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف بنائیں، اور تمام سفوف پھنکا کر عرق بادیان، عرق خار شتر، آب برگ ترب ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ :-

سفوف ریوند چینی، گرام، تخم کاسنی ۵۰، گرام، تخم قلت، سنگ سرماہی، حجر الیہود، بادیان، ہر ایک ۵۰، گرام، صمغ عربی، کیترا، نشاستہ، رب السوس، صمغ آلو، ہر ایک، گرام، تخم خشکاش، تخم خربزہ، طباشیر، ہر ایک ۵۰، گرام، مغز تخم خیارین، مغز تخم خربزہ، خار خشک، مغز تخم کدو، ہر ایک ۵۰، گرام، تمام دواؤں کا باریک سفوف تیار کریں اور ۵۰، گرام، بہرہ شربت خشکاش، شربت بنفشہ ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ شیرہ خیارین کا اضافہ بھی مناسب ہے۔

نسخہ :-

حجر الیہود، سنگ سرماہی، ہر ایک ۵۰، ملی گرام، باریک پیس کر جوارش زرعونی میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد شیرہ دوفو، شیرہ کا کچ، شیرہ حب القلت، شیرہ آلو، ہر ایک ۳۰، گرام، عرق انناس ۱۴۵ ملی لیٹر میں نکال کر چھای لیں اور شربت بزوری ۴۸ ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

نسخہ :-

پرسیاوشاں، خار خشک، ہر ایک، گرام، حب القلت، ریوند چینی ہر ایک ۵۰، گرام، حجر الیہود، زیتون، گرام، زجاج محرق (متعدد بار سوختہ کر کے آب الشفا میں بجھایا ہوا)، مقرب سوختہ، ہر ایک ۵۰، گرام، مغز تخم باد رنگ، مغز تخم خیار، مغز تخم خربزہ، ہر ایک ۳۵، گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں اور ۱-۳ گرام، تین بار بہرہ شربت انجیر استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

حب القلت، حب کاکج، سنگ سراہی، حجر الیہود، تخم کرفس، ہر ایک ۳ گرام،
تمام دواؤں کا باریک سفوف تیار کریں اور ۳ گرام کھلائیں، اس کے بعد تخم کاسنی، تخم خیارین،
خارخسک، ہر ایک ۳ گرام، بیج بادریان، بیج کرفس، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کے
خیساندہ میں شربت بزوری ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

_____ دایئیں جانب کی باسیلق یا ابلی کی فصد کھولیں۔

_____ خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د :-

کبوتر کی بیٹ اور زرداوند طویل کا ضما د کریں۔

_____ مقام کبد پر رومن عقرب کی مالش کریں

_____ مقام کبد پر درج ذیل نسخہ نطول استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

تخم بید انجیر، پرسیاوشاں، خارخسک، گل بابونہ، الکلیل الملک، گل خطمی، تخم کرفس،
حلبہ، مکوہ خشک، مرزنجوش، پوست بیج بادریان، کاکج، گل بنفشہ، برنجاسف، گل سدرخ،
انیسون، گل سوسو، تخم کتاں، تخم بیون، برگ بیداب، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو ہ لیٹر
پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو مقام کبد پر دھاریں۔

دبیلہ کبد

HEPATIC ABSCESS

اس مرض میں کبد کے کسی بھی حصہ میں بالعموم دردائیں زائدہ نیز باب الکبد کے
محاذ میں بالخصوص پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن سے امراضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اسباب :-

امراض کبد :-

۱۔ شکر کبد

- (I) التهاب کبد
- (II) خراج کبد
- (III) کیسی خمیٹ سلعہ کبد
- (IV) ضرب کبد
- (V) حصاة الکبد
- (VI) اجسام غریبہ کبد

امراض معدة و امعاء :-

- (I) التهاب زائده امور
- (II) معاء مستقیم یا کسی دوسری معاء کے عمل بالید کے نتیجہ میں صدیدی مواد کا
دورانی خون میں شامل ہو جانا۔

- (III) زحیری مادہ (زحیر مزمن)

متفرقات :-

- (I) بعض حیات حادہ
- (II) حصاة مرارہ
- (III) نقص تغذیہ
- (IV) کثرت سے نوشی
- (V) گرم ممالک
- (VI) قلعن الدم
- (VII) طیر یا دیسمیت

علامات :-

مقام کبد پر ثقل اور درد محسوس ہوتا ہے، گہری سانس لینے یا کھانسنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شدید سوزش یا چھن ہوتی ہے، اگر دبیلہ سطح کے قریب ہو تو جلد متورم اور سرخ دکھائی دیتی ہے، مریض کے لیے چت لیٹنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لرزہ کے

ساتھ شدید بخار ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، سورہم، نفخ اور قبض کی شکایت ہوتی ہے، سقوط اشتہا ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، عضلات شکم میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، ٹٹوٹنے سے شکم کے قسم قسم کی سی فی میں گول ابھار محسوس ہوتا ہے، لاغری اور ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبد کی ذکارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرعہ پر مقام کبد سخت اور ٹھوس ہوتا ہے، بعض اوقات کبد پر اصوات اعتکاک بھی سنی جاسکتی ہیں، بعض اوقات مقام کبد پر درد کی شکایت کرنے کی بجائے مریض اپنے دائیں شانے پر درد کی نشاندہی کرتا ہے، دبیلا کے باعث حجاب حاجز کے سامنے باریطون میں سوزش ہونے کے صورت میں درد کا احساس کندھے کے جوڑے کے سامنے ہوتا ہے اور حجاب حاجز کے وسط میں سوزش کی صورت میں شانے کی چوٹی پر درد کا احساس ہوتا ہے۔

کچھ عرصہ بعد صلابت کبد ختم ہو جاتی ہے اور کبد نرم محسوس ہوتا ہے اور صدید بنتے وقت کی شدید علامتوں میں سکون آ جاتا ہے، اور دبیلا کے پھوٹنے کے وقت لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے۔ اور ثقل اور گرانی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دبیلا کے سطح پر پھوٹنے کی صورت میں سیاہ، بدبودار پیپ خارج ہوتی ہے، مقعر کبد کا دبیلا عام طور سے امعاء میں کھلتا ہے اور صدیدی مواد مقعد کے راستے خارج ہوتا ہے۔ معدہ میں کھلنے کی صورت میں مخصوص پیپ کی قے آتی ہے۔ محدب کبد کا دبیلا اگر کلیتہً کی طرف کھلتا ہے تو شانہ میں آکر بذریعہ پیشاب خارج ہوتا ہے، بعض اوقات دبیلا کبد پھوٹتا ہے تو اس کا صدیدی مادہ جوف شکم، امعاء اور پردہ خرب کے درمیان جمع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مواد کا جسم سے اخراج نہیں ہو پاتا، جسم کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، التهاب باریطون ہو کر شدید عوارض رونما ہوتے ہیں اور بعض اوقات مریض ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دبیلا محدب کبد، حجاب حاجز کو قتل کرتا ہوا غلاف القلب یا ریہ میں پھوٹ پڑتا ہے، جس کے سبب شدید تنگی تنفس اور قشعریرہ ہوتا ہے، یہ صورت بہت زیادہ ہلاکت خیز ہے۔

تفریقی علامات

دبیلا کبد	التهاب غلاف کبد
۱- قشعریرہ بخار اور پسینہ ہوتا ہے	۱- قشعریرہ یا پسینہ نہیں ہوتا۔
۲- جسمانی حرارت ۱۰۳-۱۰۵ ف تک	۲- حرارت بالعموم ۱۰۱ ف تک

۳- علامات معدی ملتی ہیں۔	۳- علامات معدی نہیں ہوتیں
۴- کبد بڑھا ہوا ہوتا ہے	۴- کبد بڑھا ہوا نہیں ہوتا
۵- چھوٹے پر تموج اور نرمی محسوس ہوتی ہے	۵- تموج محسوس نہیں ہوتا۔
۶- مرین مدقوق نظر آتا ہے	۶- مدقوق نہیں دکھائی دیتا۔
۷- اضمحلال اور سستی ہوتی ہے۔	۷- خوش اور زندہ دلی ہوتا ہے

تفصیل پلورا

دبیلہ کبد

۱- التهاب کبد، زحیر یا ضربہ کبد کی روئیداد ملتی ہے۔	۱- ذات الریہ، ذات الجنب یا دونوں کی روئیداد ہوتی ہے۔
۲- مقام کبد پر ذکاوت حس نسیاں ہوتی ہے۔	۲- ذکاوت حس نہیں ہوتی۔
۳- علامات معدی ہوتی ہیں	۳- علامات رئوی ہوتی ہیں
۴- اجابت مثیالی ہوتی ہے	۴- پاخانہ کا رنگ طبعی ہوتا ہے۔
۵- ٹھوس آواز شاذ و نادر، چوتھی پسلی سے اوپر متجاوز ہوتی ہے۔	۵- ٹھوس آواز، چوتھی پسلی سے متجاوز ہوتی ہے۔
۶- ٹھوس آواز کی حدود، کبد کی حدود کے موافق ہوتی ہیں۔	۶- وضع کے تبدیل کے ساتھ، ٹھوس آواز کی حدود میں تبدیل
۷- سوئی چھونے سے نیچے کبدی اور صدیکہ کا اخراج ہوتا ہے۔	۷- سوئی چھونے سے صدیکہ کا اخراج ہوتا ہے۔

اصول علاج :-

- بالکل ابتدائی مرحلے میں دائیں جانب کی باسیلق کی فصد کھولیں، اور پشت کی جانب مقام کبد پر سنگھیاں کھینچیں۔
- ملیات و رادحات استعمال کرائیں۔
- دبیلہ کے مکمل ہو جانے کی صورت میں منخ، مسہل اور تنقیہ کی دوائیں استعمال

کریں۔

۔۔۔۔۔ دبیله کے پھوٹ جانے کی صورت میں اس کا مناسب علاج کریں۔

علاج ۱۔

۔۔۔۔۔ دبیله کو پکانے کے لیے مارا الشعیر میں شہد ملا کر یا حلبہ اور انجیر کا جوشانہ نوش کرائیں۔

درج ذیل نسخہ، دبیله کو پکانے میں مفید و مجرب ہے۔

نسخہ مطبوخ ۱۔

حلبہ، تخم کتان، ہر ایک ۲۵ گرام، تخم خطمی، تخم خبازی، پرسیاوشاں، ہر ایک ۵۰ گرام، پودینہ، قنطورین، ہر ایک ۲۰ گرام، زوفا خشک، فراسیون، ہر ایک ۵ گرام، انجیر سفید ۱۰ عدد، تمام دواؤں کو ۱۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو مل چھان کر ۱۲۰ ملی لیٹر، ہمراہ شہد ۳۶ ملی لیٹر، روغن بادام شیریں، ۵ ملی لیٹر، نیم گرم نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ ملطف اور مفتوح کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

افنتین، زعفران، سنبل، بنج حاشا، بنج فوہ، مصطلی، بنج قنطوریون — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر روغن شجر مصطلی ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ منہج اور مفتوح کے طور پر یہ نسخہ ضحاد استعمال کرائیں۔

نسخہ ضحاد ۱۔

حلبہ، تخم کتان، تخم مرو، خیر، پیاز زنگس، ہر ایک ۲۵ گرام، بنج خطمی، آرد شیلیم گرد آبیہ ہر ایک ۲۵ گرام، اکلیل الملک، بابوند، ہنفتہ خشک، ہر ایک ۵۰ گرام، مصطلی رومی ۲ گرام، سرگین کبوتر، بورہ ارمنی، ہر ایک ۵۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر روغن خیرہ روغن ہنفتہ (جن میں موم سرخ چھلائی گئی ہو) حسب ضرورت ملا کر مرہم بنالیں اور مقام کبد پر نیم گرم ضحاد کریں۔

۔۔۔۔۔ دبیله کبد اگر گردہ اور مثانہ کی طرف پھوٹ جائے تو یہ نسخہ استعمال

کرائیں۔

نسخہ :-

حاشا، پودینہ، زیت کرفس، بادیان، دو قو، زودفا، ہر ایک ۵ رۛ، اگرام، — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت بنفشہ یا شربت خشماش ۳۶ ملی لیٹر میں حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

تخم خیارین، تخم خربزہ، مغز تخم کدو، ہر ایک ۵ رۛ، اگرام، صمغ عربی، کیترا، نشاستہ، ہر ایک ۸ رۛ، گرام، رب السوس، گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵ رۛ، اگرام، ہمراہ شربت بنفشہ یا شربت خشماش ۳۶ ملی لیٹر، عرق کاسنی ۱۲۰ ملی لیٹر ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔
• دبیہ کبد کا مادہ اگر اعصاب میں گرے یا قے اور برازیں خارج ہو تو درج ذیل نسخہ جات مفید تصور کئے جاتے ہیں۔

نسخہ :-

گل سرخ، مغز تخم خربزہ، مغز تخم خیار، ہر ایک ۴ اگرام، نشاستہ، کیترا، صمغ عربی، گل ارمنی، طباشیر، ہر ایک ۵ اگرام، رب السوس، تخم کاسنی، تخم کرفس، ہر ایک ۵ رۛ، گرام، مصطلک، سنبل الطیب ۵ رۛ، اگرام، — تمام دواؤں کو پس کر ۵ رۛ، گرام کی اقراص بنائیں اور ۲ قرص درج ذیل جوشاندہ کے ساتھ کھلائیں۔

نسخہ جوشاندہ :-

گل بنفشہ، گل نیلوفر، تخم خشماش سفید، ہر ایک ۵ اگرام، پرسیاوشان ۵ رۛ، گرام، انجیر سفید ۵ دانہ، — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور گل چھان کر شکر ملا کر مذکورہ بالا اقراص کے ساتھ دیں۔

• درج ذیل نسخہ جات دبیہ کبد کے اندمال میں مفید ہیں۔

نسخہ :-

مصطلک، تخم کاسنی، گل مختوم، گل ارمنی، ہر ایک ۵ رۛ، گرام، دم الاخویں، طباشیر، گل سرخ، ہر ایک ۵ اگرام، — تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف بنائیں۔ اور ۵ رۛ، گرام، ہمراہ سکجین / مار العسل عطر کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کندر، دم الاخوين ہر ایک ۵۰ گرام، تخم کاسنی نیم کوفتہ، تخم کرفس ہر ایک ۵ گرام،
تمام دواؤں کو پیس کر سکجین صلی / شہد خالص ۲۴ ملی لیٹر میں حل کر کے چٹائیں اور اس کے بعد
شریت انارین ۳۴ ملی لیٹر، عرق بید سادہ ۱۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔
..... خارجی طور پر درج ذیل نسخہ رضاد استعمال کریں۔

نسخہ رضاد ۱۔

صندل سرخ، بارتنگ، مصطکی رومی، ریوند چینی، الک مغسول، ہر ایک ۵ گرام۔ تمام
دواؤں کو آب بارتنگ میں پیس کر مقام کبد پر رضاد کریں۔

سرطان کبد

HEPATIC CANCER

اس مرض میں کبد میں سرطانی فقرہ (گرہ) پیدا ہو جاتی ہے جس سے کبد کے طبعی افعال
میں غیر معمولی خلل واقع ہوتا ہے۔

اسباب:

- (۱) سرطانی مادہ
- (۲) التهاب کبد کے علاج میں لاپرواہی۔
- (۳) منقعات و قابضات کا استعمال۔
- (۴) ضرب کبد کا ثانوی اثر
- (۵) کبد و طحال کے مجاری کا انسداد
- (۶) سرطانی مادہ۔

علامات:

عظم اور صلابت کبد ہوتی ہے۔ مقام کبد پر دبانی سے بالعموم درد نہیں ہوتا اور بعض
اوقات شدید درد ہوتا ہے۔ خلوص معدہ میں درد نہیں ہوتا ہے، غذائینے کے بعد خفیف درد

محسوس ہوتا ہے، ضعف اشتہا، فواق اور متلی کی شکایت ہوتی ہے، زبان خشک اور کھردری ہو جاتی ہے، جسم کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، تنفس میں دشواری ہوتی ہے، پیشاب قلیل مقدار میں سیاہی مائل خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات سرطانی تعقد کو سطح کبد پر بھی محسوس کیا جاسکتا ہے، فقر الدم ہوتا ہے، سارے جسم میں جھبی کیفیت ہوتی ہے، درد کے احساس کا ختم ہو جانا، استسقاء زرقی، اور انتہائی ضعف، قرب موت کی علامت ہے۔

تفریقی علامات

سرطان کبد	دبیلہ کبد
۱۔ عظم کبد آہستہ آہستہ ہوتا ہے	۲۔ عظم کبد بہت جلد ہوتا ہے
۲۔ قشعریرہ اور پینہ نہیں ہوتا	۲۔ بخار، قشعریرہ اور پینہ ہوتا ہے
۳۔ کبد نمایاں طور پر معقد ہوتا ہے	۳۔ لمس سے عقد کا احساس نہیں ہوتا
۴۔ استسقاء بالعموم ہوتا ہے	۴۔ استسقاء نہیں ہوتا۔

اصول علاج :-

- اخلاط غلیظہ سے بدن کا تفتیہ کریں
- محلات، ملطحات اور مسفونات استعمال کرائیں۔
- مفتحات، ملینات اور مقویات استعمال کرائیں۔
- خوشبوئیات بارہ مفید تصور کی جاتی ہیں

علاج :-

- حلیہ، کتان، ہر ایک ۶ گرام، زوفا، اصل السوس، تخم خیارین، ہر ایک ۴ گرام، پیرسیاوشاں ۵ گرام، مویز منقی ۹ عدد، انجیر زرد ۲ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور روض بادام ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- اصل السوس، بادیاں، کوحہ خشک، ہر ایک ۴ گرام، سنبل الطیب ۵ گرام، تخم کاسنی، بیج بادیاں، شاہنرہ، ہر ایک ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر

- شربت، زہری ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- گاوزباں، بادریان، تخم کرفس، تخم کاسنی، ہر ایک ۶ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
- تخم کرفس ۶ گرام، غاف، افستہیں ۵۰۰ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیکر نوش کرائیں۔
- روغن نارہین، روغن بلساں، روغن قسطا حسب ضرورت کو شبت اور صواب کے جوشاندہ میں حل کر کے نوش کرائیں۔

سدہ کبد

HEPATIC OBSTRUCTION

اس مرض میں کبد میں سدہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسباب۔

۱۔ کبد کی اندرونی عروق، مجاری یا عروق ماساریقا کا پیدا انشی طور پر تنگ ہونا۔

۲۔ التهاب کبد

۳۔ غلیظ، لیسدار اور شیریں اذیہ کا بکثرت استعمال

۴۔ شراب نوشی کے بعد غیر معمولی جسمانی نقل و حرکت

۵۔ کشیف الجوبہ ہر اشیاء (مٹی، اشنان وغیرہ) کھانا

۶۔ قابض اشیاء استعمال کرنا۔

۷۔ آبی کثافت۔

علامات۔

کبد میں سدہ، عروق ماساریقا، مقعر کبد اور محدب کبد میں ہو سکتا ہے، اس لئے

علامات علیلہ علیحدہ تحریر کی جا رہی ہیں۔

سدہ عروقی ماساریقا۔

اس صورت میں مقام ماساریقا پر ثقل اور تعدد ہوتا ہے، براز میں بہت زیادہ مقدار میں رقیق کیلوس خارج ہوتا ہے۔ جم میں لاغری اور ضعف ہوتا ہے۔

سدہ مقعر کبد۔

اس صورت میں بیشتر علامات سدہ ماریقا سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس میں پیشاب سفید رنگ کا آتا ہے۔

سدہ محدب کبد۔

تاثر مقام پر غیر معمولی ثقل ہوتا ہے، پیشاب سفید، رقیق اور قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے

انتہاب کبد کی صورت میں ثقل کے ساتھ درد اور کم و بیش بخار بھی ہوتا ہے، اور غلم کبد کی علامات بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ مریضوں میں سدہ میں تعفن پیدا ہو کر جسمانی حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

اصول علاج :-

• اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

• ماساریقا اور مقعر کبد کے سدہ میں مسہلات استعمال کرائیں، مفتحات اور مقطعات دیں۔

• سدہ محدب کبد میں مدرات استعمال کرائیں۔

• مریض کے مزاج کو دوائی، استعمال کے وقت بطور خاص مدنظر رکھیں چنانچہ

بارد المزاج لوگوں میں ادویہ حارہ اور حار المزاج لوگوں میں ادویہ بارہ استعمال کرائیں

• منقعات بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

علاج :-

• سدہ مقعر کبد میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

اصل السوس مقشر، تخم کاسنی، بادیان ہر ایک ۵۰۰ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نبات سفید ۴ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔۔۔ چند دن بعد سنار کی ۵۰۰ گرام، تخم کاسنی ۱۰ گرام، گل سرخ، گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نبات سفید ۳۶ گرام حل کر کے کل چھان کر مغز فلوس خیار شبز ۲۳ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ :-

تخم قرطم، پوست بنج بادیان، پوست بنج کاسنی، خار خشک، مکوہ، ہر ایک ۱۰ گرام، نقاح اذخر، بنج کرفس، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، سنبل الطیب ۳ گرام، مویر منق ۲۴ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر سبجین ریوندی، گلقد صلی ہر ایک ۲۴ گرام حل کر کے آٹھ یوم نوش کرائیں۔۔۔ نویں دن اسی نسخہ میں درج ذیل نسخہ مہسل کا اضافہ کریں۔

سنار کی ۱۲ گرام، ریوند خطائی ۱۰ گرام، افستین رومی ۴ گرام، مغز فلوس خیار شبز، ۸ گرام، شربت دینار ۸۸ ملی لیٹر، ترنجبین ۶۰ گرام، روغن بادام، ۷ ملی لیٹر، کوئڈ کورہ نسخہ کے ساتھ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

سرخس ۵۰۰ گرام، نار دین رومی ۴ گرام، افستین رومی ۴ گرام، بنج کاسنی دشتی ۱۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر تین گنا شہد خالص ملا کر ۵۰۰۔۔۔ ۴ گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

بادیان، تخم کرفس، ۱۰ مہسل، سلیخ، ہر ایک ۳۵ گرام، ثوم بری، خافث، جعدہ، فوہ، سنبل الطیب، قسط، ۵۰۰ گرام، رب السوس، مرکی، ریوند پینی ہر ایک ۵۰۰ گرام، زعفران ۵۰۰ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر تین گنا شہد خالص ملا کر حسب دستور معجون تیار کریں اور ۱۲ گرام ہمراہ مار الاصول کھلائیں غارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضاد :-

برنجاسف، اکلیل الملک، ہابونہ، ہر ایک ۴۵ گرام، ناغواہ، کرفس ہر ایک ۵۰۰ گرام،

مصطلک، سنبل الطیب، اسارون ہر ایک ۷ گرام، بادام تلخ، فراسیون ہر ایک ۱۰ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب بادیان میں گوندھ کر خلوء معدہ کے وقت مقام کبد پر ضا د کریں۔
• سذہ مدب کبد کی صورت میں درج ذیل نسخہ مفید و مجرب ہے۔

نسخہ ۱۔

بادیان، تخم خربزہ، تخم قطر، ہر ایک ۵ گرام، انیسون، گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت دینا ۸۸ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں
نسخہ ۱۔

گل سرخ، مغز تخم خیار، مغز تخم باد رنگ، مغز تخم خربزہ، تخم کاسنی، ہر ایک ۷ گرام، دارچینی ۵۲ گرام، بیج سریق ۲۱ گرام، تخم کرفس، فطر اسالیون، دو قو، ہر ایک ۷ گرام، سنبل الطیب، مصطلک، ہر ایک ۵۲ گرام، زعفران ۴۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر ماء الاصول میں گوندھ کر ۵۲ گرام کی اقراص بنائیں اور سایہ میں خشک کریں، ۲ قرص ہمراہ سنگبین بنزوری ملازات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

اشق، ۷۸ گرام، کندر، مصطلک رومی، ہر ایک ۵۲ گرام، غافث، قسط، ہر ایک ۴۲ گرام، ساذج ہندی ۸۲ گرام، سنبل الطیب، پشک خرگوش، ہر ایک ۵۲ گرام، فلفل، دار فلفل، ہر ایک ۸۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۸۲ گرام ہمراہ ماء الاصول کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

بیج اذخر، بیج سوسن، بیج کبر، بیج بادیان، بیج کرفس، ہر ایک ۳۵ گرام، حلبہ ۵۲ گرام، قسط، فوہ، مصطلک رومی، انیسون، ریوند چینی، ہر ایک ۵۲ گرام، مویز منقی ۲۲ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور ۱۲۰ ملی لیٹر لے کر روغن بادام تلخ، شیریں کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

فہنتین، ریوند، بیج کرفس، ہموزن کو آب کاسنی بنزمر و قی میں پیس کر مقام کبد پر ضا د کریں۔

• سڈہ ماساریقا میں منخ سددادویہ شلاً سکجین بزوری / اصول استعمال کرائیں۔

درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

منبل الطیب ۱۰ گرام، افستین ۵ رس گرام، شہد خالص، حسب ضرورت، اول الذکر دونوں دواؤں کو باریک پس کر شہد کے ساتھ حسب ضرورت معجون سبنا کر استعمال کرائیں۔
— اطباء اس مقصد سے قرص ریوند، قرص زرشک اور شربت دینار وغیرہ بھی استعمال کراتے ہیں۔

• رومی و کشیف الجواہر اور قابض اشیار کی صورت میں رطب المزاج دواؤں سے علاج کریں اور حریرہ روغن بادام، کدو اور انار وغیرہ کھلائیں۔

• سڈہ مقعر کبد میں خارجی طور پر یہ نسخہ بھی مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ ضما د۔

کندر، اشق، زعفران، انیسون — تمام دواؤں کو شحم بٹا اور مرغ نیز روغن گی میں گوندہ کر مقام کبد پر ضما د کریں۔

احتقان دم فی الکبد

HEPATIC CONGESTION

اس مرض میں کبد میں زیادہ مقدار میں خون جمع ہو جاتا ہے۔

اقسام۔

احتقان الدم فی الکبد

احتقان الدم فی الکبد مزمن

Chronic Hepatic Congestion

احتقان الدم فی الکبد حاد

Acute Hepatic Congestion

اسباب :-

- (۱۲) کثرت سے نوشی
- (۱۳) قبض مزمن
- (۱۴) گرم، مرفن اور شیریں اشیاء کا بکثرت استعمال
- (۱۵) گرم ممالک میں رہائش اختیار کرنا
- (۱۶) دم معتاد یعنی بواسیر اور حیف کے خون کا بند ہو جانا۔
- (۱۷) درزش دکرنا۔
- (۱۸) قلب اور یہ کے بعض امراض۔
- (۱۹) گرم دوسر ہو جانا۔

علامات :-

عروق کبد میں اجتماع خون کی وجہ سے مقام کبد پر ثقل محسوس ہوتا ہے، درد اور اضطراب ہوتا ہے، درد ابتدا میں میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ مریض کو بائیں جانب لیٹنا دشوار ہو جاتا ہے، کم و بیش ظلم کبد بھی ہوتا ہے۔ براز گہرے زرد یا سیاہ رنگ کا خارج ہوتا ہے، پشاب قلیل مقدار میں گہرے رنگ کا آتا ہے۔ قبض اور نفخ شکم ہوتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، زبان پر میل جمع ہو جاتی ہے۔ تلی اور درد سر کی شکایت ہوتی ہے، مریض کے مزاج میں ہولنے کی صورت میں استسقاء/یرقان و فیو ہو سکتا ہے۔

احتقاق کبد اور بعض دوسرے امراض میں معالج اشتباہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ذیل میں تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

احتقاق الدم فی الکبد	دبیلہ کبد
۱۔ عظم کبد یکساں اور سرعت کے ساتھ ہوتا ہے۔	۱۔ عظم کبد نامہوار اور تدریج ہوتا ہے۔
۲۔ مقام کبد پر درد پھیلا ہوا ہوتا ہے۔	۲۔ درد مقامی ہوتا ہے

- | | |
|---|---|
| ۳۔ درد نہایت شدید ہوتا ہے۔ | ۳۔ درد شدید نہیں ہوتا |
| ۴۔ تشعریرہ اور حمی ہوتا ہے، پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے۔ | ۴۔ تشعریرہ، حمی اور پسینہ وغیرہ نہیں آتا۔ |
| ۵۔ ذکاوۃ حس نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ | ۵۔ مقام کبد کو دبائے سے خفیف ذکاوۃ حس کا احساس ہوتا ہے۔ |

تشم کبد

- | | |
|--|---|
| ۱۔ عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے اور دق کی روئیداد ملتی ہے۔ | ۱۔ شرب نوشی، نفرس، آتشک اور غن معتاد کے احتیاس کی سرگزشت موجود ہوتی ہے۔ |
| ۲۔ درد نہیں ہوتا۔ | ۲۔ مقام کبد پر درد ہوتا ہے۔ |
| ۳۔ معدی و معوی علامات مثلاً سوز، ہضم و فیو مفقود ہوتی ہیں۔ | ۳۔ معوی و معدی علامات موجود ہوتی ہیں۔ |
| ۴۔ جلد زرد اور چمکیلی ہوتی ہے۔ | ۴۔ جلد کھردری اور سیاہ ہو جاتی ہے |
| ۵۔ کبد پلپلا اور نرم ہوتا ہے۔ | ۵۔ کبد سخت اور ٹھوس ہوتا ہے |
| ۶۔ حس معدوم ہوتی ہے۔ | ۶۔ دبائے سے کسی قدر ذکاوۃ حس ہوتی ہے |

اصول علاج:

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ منضجات و مسہلات استعمال کرائیں

علاج:

- ۱۔ آب کاسنی سبز مرق ۸ ملی لیٹر، شربت بنزدی ۴ ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

سورالتقنیہ


ANAEMIA

اس مرض میں خوں کے خلیات حمرہ میں غیرطبیعی فقدان پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ یا تو حرمت الدم میں غیرطبیعی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا خلیات حمرہ، حرمت الدم فی خلیہ کم ہو جاتا ہے، یا خوں کے دیگر اجزاء میں غیرطبیعی اضافہ ہو جاتا ہے جس سے حرمت الدم کی قلت کا شبہ ہوتا ہے۔

اقسام :-

اس کی درج ذیل تین اساسی اقسام ہیں،

سورالتقنیہ
Anaemia



اسباب :-

امراض کبد :-

(۱) سور مزاج کبد

امراض معدہ و امعاء :-

(۲) ضعف معدہ

(۳) ذرب

(۴) خلفہ

(۵) دیدان امعاء

(۶) معدہ کا عمل بجراچی

دقا، نفث الدم

دقا، قبض مزمن

امراض کلیه ۱۔

دقا، بولہ الدم

دقا، التهاب کلیہ مزمن

حاد/متعدی امراض ۱۔

دقا، سل

دقا، دق

دقا، سرطان

دقا، حمی اجامیہ

امراض اعضاء تناسل ۱۔

دقا، کثرت جماع

دقا، جلق

دقا، عسر الطث

دقا، کثرت الطث

دقا، حمل

امراض صدر

دقا، نفث الدم

دقا، ضعف قلب

ادویات وسمیات ۱۔

دقا، پارہ کے مرکبات

دقا، سیسہ

دقا، کثرت ے نوشی

دقا، ہوام گریذگی

متفرقات :-

1. نقص تغذیہ
2. فقر و فاقہ
3. غیر معمولی منت و ریاضت
4. شدید جریان الدم
5. تفکرات
6. غیر صحت بخش رہائش
7. مٹی کھانے کی عادت (بچوں میں)
8. فولاد کے انجذاب پر اثر انداز ہونے والے امور اور زمین کا نقص تغذیہ۔
9. غیر طبی طحالی میکائیت
10. نامعلوم نمل
11. حیاتیں اسی اورج کی یا فقدان۔

علامات :-

چہرہ اور جسم کا رنگ سفید یا زردی مائل ہو جاتا ہے، اطراف، بالخصوص پوٹے اور چہرے پر تہی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ تہی کیفیت سارے جسم میں ہوتی ہے، چہرے کا بیچ صبح کو بیدار ہونے کے بعد زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور پیروں کا بیچ، دیر تک کھڑے رہنے پر نمایاں ہوتا ہے، ہونٹ بالکل پھیکے ہوتے ہیں، زبان کے کناروں پر دانت کے دباؤ کا نشان معلوم ہوتا ہے، طبقہ مقرر سفید نیلگوں ہو جاتا ہے، ناخن سفید پڑ جاتے ہیں، معمولی جسمانی و ذہنی مشاغل سے ہی مکان کا احساس ہونے لگتا ہے، سستی اور پست ہمتی نمایاں ہوتی ہے۔ بدن میں گر لائی اور ضعف محسوس ہوتا ہے، نبض متواتر، سریع، منتظم اور مغیو ملتی ہے، اور معمولی حرکی سے سرعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، فساد ہضم، ضعف اشتہار یا کثرت اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، اسہال بھی آسکتا ہے، نفخ و قراقرز ہوتا ہے، بعض اوقات کبڑہ خضیر میں بھی نفخ پیدا ہو جاتا ہے پیشاب اور پسینہ کے اخراج میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کبھی پیشاب سفید، رقیق اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، بعض اوقات سارے منہ میں شور نکل آتے ہیں جو بدقت مند مل ہوتے ہیں۔

اعصاب کے متاثر ہونے کی صورت میں سرد، دوار ہوتا ہے، برد اطراف کی شکایت ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، بعض اوقات غشی طاری ہو جاتی ہے، یا فوخ، پیشانی اور اضلاع (RIBS) میں بالخصوص دائیں طرف درد ہوتا ہے، جلد کی وریدیں ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اختلاج کی شکایت ہوتی ہے۔

شدید عوارض میں اختلاجی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی وزن میں غیر معمولی کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہ انخراط بہترین و عمدہ غذائیں لینے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ طحال بڑھ جاتی ہے۔ کبد بھی بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے، اعصابی غلغل کی وجہ سے نفع اور رعبہ ہوتا ہے، بعد میں بینائی بھی متاثر ہو جاتی ہے اور برقان واستقامت بھی ہو سکتا ہے۔

تقریبی علامات

سور القنیہ مہلک Pernicious Anaemia	سور القنیہ فولادی مزمن Chronic Hypochromic Anaemia
۱۔ ۴۵-۶۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔	۱۔ ۲۵-۵۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے
۲۔ مردوں عورتوں دونوں میں یکساں پایا جاتا ہے۔	۲۔ نرے فی صدمی، عورتوں میں پایا جاتا ہے۔
۳۔ عمر ابلیغ نہیں ہوتا۔	۳۔ عمر ابلیغ ہوتا ہے
۴۔ اعصابی علامات بالخصوص موجود ہوتی ہیں	۴۔ اعصابی علامات بالعموم مفقود ہوتی ہیں
۵۔ اسہال شدت سے ہوتا ہے۔	۵۔ اسہال ہوتا ہے۔
۶۔ جسم کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔	۶۔ جلد کا رنگ سفید یا شخی مائل ہوتا ہے
۷۔ لیوکوپنیا Leucopenia ہوتا ہے	۷۔ کریات ابيض کا شمار طبعی ہوتا ہے
۸۔ (Megalo Blastic) ہوتا ہے	۸۔ Normo-Blastic مخ العظم ہوتا ہے۔
۹۔ کریات احمر کی مقدار ۵۰۰۰۰ لیس فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔	۹۔ کریات احمر کی تعداد فی مکعب ملی میٹر ۲۰۰۰-۵۰۰۰ لیس ہوتی ہے

مرض اخضر Chlorosis	سور القنیہ جبک Pernicious Anaemia
۱۔ بلوغت کے قریب نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے۔	۱۔ ۴۵-۶۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔
۲۔ استسقا نہیں ہوتا۔	۲۔ استسقا ہوتا ہے۔
۳۔ بخار نہیں ہوتا۔	۳۔ بخار ہوتا ہے۔
۴۔ طغقات فروری نہیں ہوتے۔	۴۔ فرورہ ہوتا ہے۔
۵۔ چہرے کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے۔	۵۔ چہرہ کا رنگ تمبی ہوتا ہے۔
۶۔ جریان الدم شاذ ہوتا ہے۔	۶۔ جریان الدم بالعموم ہوتا ہے۔

اصول علاج :

- ۱۔ ان تمام امور کی اصلاح، جو سور القنیہ کا مقدمہ ہوں۔
- ۲۔ حیاتین ا، ب، ج وغیرہ حسب ضرورت کھلائیں۔
- ۳۔

علاج :

- ۱۔ اجوائن دیسی ۱۲ گرام، کو صبح کے وقت مٹی کے ایک کورے کوزے میں بھگو دیں دن کے وقت سایہ میں اور شب میں شبنم میں رکھ کر دوسرے روز صبح کو نتھار کر کر لیں۔
- ۲۔ مویز منقہ ۹ دانہ، فلفل سیاہ ۵ دانہ۔ دونوں دواؤں کو عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں پیس کر نوش کرائیں۔
- ۳۔ برگ کسوندی ۵ عدد، فلفل سیاہ ۱۲ گرام۔ دونوں دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو کر صبح کو نتھار کر کر لیں۔
- ۴۔ کشتہ خبیث الحدید ۳۲ ملی گرام، جوارش جالینوس، گرام، دونوں کو ملا کر کھلائیں۔
- ۵۔ فذائینے کے بعد کشتہ فولاد ۳۲ ملی گرام، شربت انار ۲۴ ملی لیٹر میں ملا کر چلائیں۔

• سوتے وقت۔ کشتہ مرجان ۳۲ ملی گرام، خیرہ گاؤ زبان غبری جواہر والا
۵ گرام میں ملا کر کھلائیں،

• آرد نخود کو شیر زقوم چودھارا میں ترک کر کے پھنے کے برابر گولیاں بنائیں اور
۲ گولیاں استعمال کرائیں۔

• سنبل الطیب، قردانا، فسنٹین، انیسون، دج، ہر ایک ۵ گرام،
گل سرخ ۶ گرام، مغز بادام تلخ ۵ گرام، ریوند خطائی ۱۲ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر پھنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گرام ہمراہ آب تازہ / عرق کاسنی / عرق بادیان / عرق
مکوحہ نوش کرائیں۔

• بادیان، زیرہ سیاہ، اجوائن، مکوحہ خشک، ہیل کلاں، پودینیہ، ہم وزن۔
تمام دواؤں کا عرق کشید کر کے پانی کی بجائے نوش کرائیں۔


• زنجبیل ۱ گرام، قسط شیریں، انیسون، ترید موصوف، سنبل الطیب ہر ایک ۴ گرام،
سناہ صوفی، یخ مہک، مک مفسول، مصطفیٰ رومی، ریوند پھین، ہر ایک ۶ گرام، پوست ہلیلہ
لاٹلی، بادیان ہر ایک ۱۲ گرام، شکر سفید ۵ گرام، تمام دواؤں کو سفوف تیار کریں۔
دور ۶ گرام ہمراہ آب گرم استعمال کرائیں۔

یرقان

JAUNDICE

اسی مرض میں خون میں لون صفراوی کے طبعی تناسب میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے
نتیجہ میں مریض کی آنکھ کا طبقہ لمعہ، جلد، غشاء مخاطی اور جسم کی دوسری رطوبتیں اور ساختیں زرد
ہو جاتی ہیں اور بعض حالات میں ان میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔

اقسام ۱۔



اسباب ۱۔

یرقان اصفر ۱۔

سدی ۱۔

انسداد قات صفراوی ۱۔

اس کے درج ذیل اسباب ہو سکتے ہیں

(۱) قنات صفراوی میں دیدان کا اجتماع۔

(۲) التهاب اغشیہ مخاطیہ قنات

(۳) سلعہ قنات

(۴) قنات صفراوی میں صفرا کا خشک ہونا

(۵) خلطی سدہ قنات۔

(۶) حصاة مراره

(۷) التهاب غشاء مخاطیہ اثنا عشری

(۸) التهاب بالقراس

۱۔ یرقان اصفر سدی میں قنات صفراوی میں انسداد کی وجہ سے صفرا خون میں دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔ اور یرقان غیر سدی میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔

۲۔ یرقان اسودے میں دراصل خون میں صفرا غیر معمولی طور پر شامل ہو کر استراقی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں خون، سودا کی طرف مستحیل ہو جاتا ہے۔

- (۳۰) التهاب باریطون
(۳۱) باب الکبد میں غدہ لغاویہ کا تنخم
(۳۲) سلعات کبد
(۳۳) سلعات معدہ
(۳۴) کسیدہ دیرانی
(۳۵) سرطان راس بالقراس

غیر سدی :-

امراض کبد و رحم :-

- (۱) سرطان کبد
(۲) تصلب کبد
(۳) خراج کبد
(۴) احقان دم الفعال
(۵) اعتلا رکبہ زموی
(۶) آتشک کبد
(۷) التهاب کبد
(۸) صفر کبد
(۹) تشم کبد
(۱۰) ضعف کبد
(۱۱) سلع خصینۃ الرحم

حمیات :-

- (۱) حمی اجامیہ
(۲) حمی تیغودینہ
(۳) تقحج الدم
(۴) حمی نکسید

امراض راس :

- (۱) ضعف اعصاب
(۲) ترعزع الدماغ
(۳) بيمان دماغ

امراض صدر :-

- (۱) ذات الریه
(۲) قلبی امراض

سمیات :-

- (۱) فاسفورس
(۲) سنکھیا
(۳) کلورو فارم
(۴) زہر مار (سانپ کا زہر)
(۵) سیاب
(۶) خبث الحديد
(۷) تانبہ

متفرقات :-

- (۱) ہوا حار (گرم ہوا)
(۲) انفعالات نفسانی
(۳) فساد مہنہ
(۴) صفراء کی کثرت پیدائش
(۵) بحران
(۶) سور مزاج بدن
(۷) خون کے جزاء کا تغیر
(۸) کربات عنقودیہ کا تعدیہ
(۹) مہلہ

نامعلوم :-

(i) یرقان نورائیدہ

(ii) حالت الدم میں یرقان

(iii) یرقان موءوثی

یرقان اسود :-

(1) درم طحال حار/ بارد/ صلب

(2) سور مزاج جگر

(3) جگر کی مفرط حرارت

(4) طحال اور جگر کے درمیان بحری (جو سودا کو جگر سے طحال کی طرف

لے جاتی ہے) کا سدھ۔

(5) طحال اور معدہ کے درمیان بحری (جس کے ذریعہ سوداوی مادہ

معدہ پر گزرتا ہے) کا سدھ۔

علامات :-

(1) عمومی :-

ہلہ :-

جلد کا رنگ عام طور سے گندھک سے رنگ جیسا ہوتا ہے، کبھی ہلکا یا گہرا بھی

ہوتا ہے، یرقان مزمن میں سبزی یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے، خارش ہوتی ہے، ہوسدہ قنات

صفہ اوی کی صورت میں شدید تر ہو جاتی ہے، پس تہ مریض کا بدن قیل جاتا ہے اور اس سے خون

بہنے لگتا ہے،

آکھ :-

طبقہ ملحقہ زرد ہوتا ہے، بعض اوقات مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے لیکن

یہ عام علامت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس سے یرقان کی شدت یا خفت کی تعیین کی جاسکتی ہے۔

بول :-

پیشاب کا رنگ لون صفراوی کی وجہ سے ہلکا زرد یا سیاہی مائل زرد ہوتا ہے، پیشاب

سینہ اراماں کا ہوا دھبہ زرد ہو جاتا ہے۔ البتہ آنسو، لعاب و سون، عمدہ دوا عار کی طرح ہات، اعشید، دماغ اور مخی و شامی رطوبتوں کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔

سیدہ فغات صفوانی میں براز کا رنگ سفید کاشی کی طرح اور نہایت بدبودار ہوتا ہے۔ تبصرتا تبصرتا ہفت صورتیں براز کا رنگ طبعی ہوتا ہے۔

نبض ابطی چلتی ہے، اور یہ زمان کے ساتھ فارسی ہو تو سہ پہا چلتی ہے۔

شدیدہ عوارض ہیں۔ مہمغداوی، Cholemea کی علامات مثلاً تھوئشی
نہر بیان، آتشیخ اور اضطلاحی دیکھ رہا ہے۔ ۔ ۔ ۔ معیت سے واقع ہو سکتی ہے۔

لمبار سے کریرقان میں علی الزریب پہلے پشاپ میں ٹون سفادی خارج ہوتا ہے اس کے بعد طبقہ لمعز زرد ہوتا ہے پھر جلد کا رنگ زرد ہوتا ہے، اسی طرح سفادی سے پہلے میں علی الزریب پہلے پشاپ میں ٹون سفادی کا خارج ہوتا ہے پھر جلد کا رنگ عرصہ تک زرد رہتا ہے۔

حرارت کبہ کی صورت میں قتل، صفراوی قے آتی ہے، برا زرد ہوتا ہے، پیتاب سرخ اور جھاگ دار ہوتا ہے، ضعف اشتہار ہوتا ہے، پیاس میں شدت ہوتی ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، جسم میں غیر معمولی لاغری اور نقص ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے، اور من رنہ رفتہ بڑھتا ہے۔ حرارت مارہ کی صورت میں پیشاب رقیق اور زرد آتا ہے جو بعد میں سیاہ، غلیظ اور بدبودار ہو جاتا ہے، زبان سفید ہوتی ہے، مہنی علامات کسارگی ظاہر ہوتی ہیں،

شدت حرارت کی صورت میں، شدت کی پیاس ہوتی ہے، ضعف اشتہاء درد
معدہ حرقت بول کی شکایت ہوتی ہے، ملمس حار ہوتا ہے، عمومی لاغری اور میوہست کا غلبہ ہوتا

ہے، جسم میں خارش ہوتی ہے، زرد دانے نکلتے ہیں، معمولی بخار ہوتا ہے، پیشاب غلیظ، سُرخ مائل رہتا ہے، جو بعد میں سیاہ ہو جاتا ہے، براز نرم، سفید اور بعض اوقات رنگین اور بدبودار ہوتا ہے، اندر کی طور سے ہوتا ہے۔

سردہ کی صورت میں دائیں جانب نفل محسوس ہوتا ہے، پیشاب غلیظ اور سرخ ہوتا ہے ابتدا میں براز زرد اور رفتہ رفتہ سفید خارج ہوتا ہے، غذا لینے کے بعد نفل کی شکایت ہوتی ہے، بدن میں خارش اور سوزش ہوتی ہے، نیند کم آتی ہے اور برفان یکبارگی ہوتا ہے۔
سورمزاج حار کی صورت میں خفیف برفان کے ساتھ دائیں قسم تختی میں درد، نفل اور نفل ہوتا ہے، دبانے سے احساسات میں اضافہ ہو جاتا ہے، دائیں شانے میں درد ہوتا ہے، ذائقہ خراب ہوتا ہے، متلی اور نفے کی شکایت ہوتی ہے نفے میں زرد رنگ کا مادہ خارج ہوتا ہے، منہ خشک اور زبان کھردری ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے پیشاب کارنگ گہرا زرد ہوتا ہے، جسم کا درجہ حرارت ۱۰۲ فہنہ تک ہوتا ہے۔

یرقان طحالی کی صورت میں امراض طحال کی علامتیں ملتی ہیں، مقام طحال پر ثقل، تناؤ، ہوتا ہے، درد اور صلابت بھی ہو سکتی ہے۔

ذیل میں یرقان کبدی اور یرقان دموی کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

یرقان دموی	تفریقی علامات	یرقان کبدی
Heamatogenous Jaundice		
۱۔ مرض کا سبب بخار اور دموی امراض ہوتے ہیں۔	۱۔ مرض کا سبب التهاب معدی یا اثناعشری یا قناتہ صفراوی ہوتا ہے	۱۔ مرض کا سبب التهاب معدی یا اثناعشری یا قناتہ صفراوی ہوتا ہے
۲۔ طحال کی بسلامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	۲۔ کبد کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے	۲۔ کبد کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے
۳۔ عصبی علامات شدید ہوتی ہیں۔	۳۔ عصبی علامات شدید نہیں ہوتیں۔	۳۔ عصبی علامات شدید نہیں ہوتیں۔
۴۔ پیشاب میں صفراوی تیزاب کی آمیزش ہوتی ہے	۴۔ پیشاب میں صفراوی آمیزش ہوتی ہے	۴۔ پیشاب میں صفراوی آمیزش ہوتی ہے
۵۔ زلالی ہوتا ہے۔	۵۔ پیشاب زلالی نہیں ہوتا۔	۵۔ پیشاب زلالی نہیں ہوتا۔
۶۔ سیاہ ہوتا ہے۔	۶۔ براز مٹیالا ہوتا ہے۔	۶۔ براز مٹیالا ہوتا ہے۔
۷۔ کسی قدر بھریان الدم ہوتا ہے۔	۷۔ جلد میں خارش ہوتی ہے۔	۷۔ جلد میں خارش ہوتی ہے۔
۸۔ حرکت قلب سریع اور غیر منظم ہوتی ہے۔	۸۔ حرکت قلب بطی و منتظم ہوتی ہے۔	۸۔ حرکت قلب بطی و منتظم ہوتی ہے۔

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ۹۔ خفیف لاعنی ہوتی ہے | ۹۔ شدید لاعنی ہوتی ہے |
| ۱۰۔ برزقان بین نمایاں ہوتا ہے | ۱۰۔ یرقان خفیف ہوتا ہے۔ |

اصول علاج،

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں جیسا چاہیں۔
یہ تھان بھرائی کی صورت میں دفعہ مادہ میں طبیعت کی اسانت کریں، اور مسالہ
کو کشادہ کرنے کی تدابیر کریں، سورمزاج کبید یا سورمزاج مرادہ مادی یا تھیبہ مادی کی صورت میں
امراض کے ذیل بیان کردہ اصول علاج اختیار کریں۔
مرادہ اور امعاء کی درمیانی نالی میں سدہ کی صورت میں قوت کش کا اصول مرادہ
اختیار کریں۔
استراق دم کی صورت کی مابینو لیاماتی اور سورمزاج کبید کا اصول علاج
اختیار کریں۔
حسب ضرورت فصد رکھولیں، خلط غالب کا استخراج کریں۔

علاج :-

- یہ تان اصف میں درج ذیل نسخہ جات مفید ہیں،
- نسخہ ۱:-
- زرشک منقی، وروچ عقربی، تنعم کاسنی، ہر ایک ۶ گرام، مویز منقی ۲ گرام، سرکہ خالص ۳۶ ملی لیٹر۔۔۔ تمام دواؤں کو سرکہ میں گھس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۳ گرام کھلا کر عرق کاؤ زبان نوش کرائیں۔
- نسخہ ۲:-

- مغز کرنجھو، ۲۵۰ ملی گرام، برگ کرنجھو ۳ عدد، بیل خوردہ ۴ عدد، زعفران حسب ضرورت۔۔۔ تمام دواؤں کو مرق مکوہ میں پیس کر تیار منہ نوش کرائیں، سات دن استعمال کرانے سے انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی۔

نسخہ ۱:-

پلوست ہلیہ کاہلی، ۲۰ گرام، لوہ چون ۶۰ گرام، اصل السوس مقشر ۲۲ گرام، —
تمام دواؤں کو باریک پس کر دوغ ترش ۴ لیٹر میں ملا کر مٹی کی بانڈی میں ڈال کر آٹھ دن تک دھوپ
میں رکھیں اور روزانہ لکڑی سے پھراتے رہیں۔ نویں دن لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر لوہے کے
دستے سے خوب حل کریں جب وہ غلیظ ہو جائے تو جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور صبح،
شام ۱۱ گولی ہمراہ دودھ، ۲۱ دن تک کھلائیں۔

نسخہ ۱:-

آب انارین، آب تربوز، سکجین ہر ایک ۲۴ ملی لیٹر، طلوع آفتاب کے وقت نوش
کرائیں۔ ربوند چینی ۱ گرام، شیرہ کاسنی، شیرہ بادیان ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، کے ہمراہ
دوپہر کے وقت نوش کرائیں۔ سپہر کو شیرہ برگ ترب ۹۸ ملی لیٹر، سکجین ۲۴ گرام
حل کریں اور شکر سرخ حسب ضرورت شامل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱:-

ربوند چینی ۳ گرام، بادیان ۵ گرام، مویز منقی ۹ دانہ، — تمام دواؤں کو رات
کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خیرہ بنفشہ ۲۸ گرام یا شربت بزوری ۴۸ ملی لیٹر ملا کر نوش
کرائیں۔

اگر مذکورہ بالاندا بیر سے افاق نہ ہو تو درج ذیل نسخہ منفع و تسہل و تبرید استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع ۱:-

کل بنفشہ، بیج کاسنی، بادیان، تخم کاسنی، خار خشک نیم کوفتہ، ہر ایک، گرام، گاؤ زبان
تخم خیارین نیم کوفتہ، ہر ایک ۵ گرام، مویز منقی ۹ دانہ، آلو بخارا ۵ دانہ — تمام دواؤں کو
رات میں گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر خیرہ بنفشہ ۴۸ گرام ملا کر ۸ دن نوش کرائیں۔

نسخہ تسہل ۱:-

نویں دن اس نسخہ (منفع) میں سنار کی ۵ گرام، ترسیدی ۶۰ گرام کا اضافہ کر کے
رات کو بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر ترنجبین، شیرہ سخت، گل قند ہر ایک ۴۸ ملی لیٹر / گرام
ملا کر نوش کرائیں۔ دوسرے دن یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تبرید ۱:-

خیرہ گاؤ زبان ۲۲ گرام، ورق نقرہ اعداد میں پیٹ کر کھلائیں، ادھر سے عذاب

۵ دانہ، بادیان، تخم خیارین، ہر ایک ۵ گرام، کو عرق برنجاسف ۱۴۴ ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ نکال کر شربت بزوری ۴۸ ملی لیٹر حل کریں اور تخم ریحان مسلم ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
 حسب ضرورت ۳، ۴ مہل اور تیریدیں، انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی،
 • ————— یرقان اسود میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

فتیمون دلائی ۵۳ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابل، ہر ایک ۵۰ گرام،
 نمک ہندی ۸۵ ملی گرام، ایارج فیکر ۲۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر
 سفوف بنائیں اور مارا لجن ۱۲۰ ملی لیٹر میں سکجینین ۳۶ گرام حل کر کے اس کے ہمراہ استعمال
 کرائیں۔

نسخہ :-

تخم کرفس ۲۲ گرام، زرد چوب، زیرہ سیاہ، اجوائن دلی، ہر ایک ۱۲ گرام —
 ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور اگر آب نیم گرم کھلائیں
 نسخہ :-

مسور کی دھلی ہوئی دال، گرام، کو تھوڑے سے عرق بادیان کے ہمراہ نوش کرائیں
 نسخہ :-

آب برگ مکوہ سبز مروق ۸۰ ملی لیٹر، آب برگ کاسنی سبز مروق ۶۰ ملی لیٹر، آب برگ
 ترب، آب برگ کشینز ہر ایک ۴۲ ملی لیٹر، آب برگ کبر ۳۰ ملی لیٹر ————— تمام پانی کو ملا کر جوش
 دیں اور چھان کر مغز فلوس خیار شبز ۳۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
 نسخہ :-

دار ہلد، ملاگیر، ہر ایک ۵ گرام ————— دونوں دواؤں کو پانی میں پیس کر شہد خالص
 ۷ ملی لیٹر میں ملا کر کھلائیں۔

اگر ان نسخہ جات سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو درج ذیل نسخہ منفع و مہل بروئے کار

لائیں۔

نسخہ منفع :-

بنج بادیان، بنج کاسنی، بنج کرفس، حب قرطم، مکوہ خشک، نقاح اذخر، انیسون،

ہر ایک ۵ گرام، سنبل الطیب ۳ گرام، مویز منقہ ۹ عدد۔ تمام دواؤں کو کورت کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت بنووری ۴۸ ملی لیٹر حل کر کے آٹھ دن تک نوش کرائیں۔

نفسی مسہل :-

نویں دن اسی نسخہ منضج میں سنہرے مکی، گرام، افسنتین، ربوہ چینی ہر ایک ۵ گرام، کا اضافہ کر کے رات کو بھگو دیں، صبح کو مغز فلوس خیار شبنم ۶۰ گرام، ترنجبین، شکر سرخ ہر ایک ۴۸ گرام، شیرہ مغز بادام ۵ دانہ ملا کر شربت دینار ۴۸ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
دوسرے دن یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

اصل السوس، انیسون، بادیان، ہر ایک ۵ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بنووری ۸۴ ملی لیٹر حل کر کے تخم ریحان مسلم ۵ گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

تین مہل کے بعد آب کا سنی سبز مرق ۴۸ ملی لیٹر ہمراہ شربت بنووری ہم وزن چندیم
نوش کرائیں۔۔۔۔۔ یا آب برگ نرب سبز مرق ۸۰ ملی لیٹ، شکر سرخ ۴۸ گرام سے شیریں
کر کے انوش کرائیں۔

[illegible]

منشیہ

کرفس، کاسنی، بادیان، ہر ایک ۴ گرام، کاشیرہ نکالیں اور روغن بادام تلخ، روغن
بادام شیریں ہر ایک ۵۔۱۰ ملی لیٹر۔ _____ اول الذکر تینوں دواؤں کو روغنیاات میں
ملا کر صبح کو نوش کرائیں۔ _____ اور شام کو تخم ترب، مغز تخم خربزہ، انیسون ہر ایک ۳۔۵ گرام
تخم کرفس ۲ گرام، _____ تمام دواؤں کا شیرہ نکال کر سکنبین علی ۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ
نوش کرائیں۔

نسخہ:-

۱۲ گرام، موزین مفتی ۳۰ گرام، مغز چلغوزه ۱۸ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر و گرام

ہمراہ آب رازیانچ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

زونا خشک ۵۰ گرام، بیج سوسن آسمانجونی، فطر اسالیون، تخم کرفس ہر ایک ۳ گرام، پوست بچ بادیان، پوست بچ کبیر، نقاح اذخر، پرسیاوشاں، ہر ایک ۵۰ گرام، تخم کاسنی، بادام تلخ مسحوق، ہر ایک ۱ گرام، تمام دواؤں کو آب کاسنی سبز مرق میں پکائیں اور سکجبین ۶۰ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

پوست درخت بید لرزاں، ۳۰ گرام، کو الیٹر پانی میں نر کریں اور اس پانی کو نوش کرائیں۔

نسخہ :-

ایارچ فیکرا، تخم کشوث، ہر ایک ۱ گرام، ہلیلہ زردہ گرام، ہلیلہ سیاہ، افٹیون ولایتی، ہر ایک ۳ گرام، نمک بندی، نمک ترب، سقونیا ہر ایک ۳ گرام، بادیان، تخم کرفس ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر آب برگ ترب سبز میں خوب سحق کر کے چنے کے برابر گویاں بنائیں اور ۷-۸ گرام ہمراہ آب برگ ترب سبز ۸۵ ملی لیٹر اور شکر سرخ ۸ گرام، نوش کرائیں۔

• یرقان بحرانی میں درج ذیل نسخہ مفید و مجرب ہے۔

نسخہ :-

شیرہ کاسنی، شیرہ خیاریں، شیرہ زرشک، ہمراہ شربت بزوری نوش کرائیں۔ اس کے بعد مغز تخم خربزہ، مغز تخم خیاریں کا شیرہ، عرق مکوہ میں نکال کر شربت نیلو فر ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد تخم کاسنی، خار خشک، مغز تخم خیاریں، گل بنفشہ کا شیرہ نکال کر شربت بزوری اور عرق گاؤ زبان کے ہمراہ نوش کرائیں۔ آٹھویں دن مغز فلوس خیار شنبہ، گل قند اور روغن بادام حسب ضرورت استعمال کرائیں۔

• یرقان سمی میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

مرواریدنا سفتہ ۱ گرام، عرق لیموں کاغذی ۹۰ ملی لیٹر، مروارید کو عرق لیموں میں

کھل کر کے شیشہ کے ایک ڈھکن دار برتن میں ڈال کر تین ہفتے تک گرم پانی میں بھگوئے رکھیں۔ اس کے بعد سقمونیا مدبر ۸ گرام، صبر زرد ۲۲ گرام، اقیتمون ولایتی، دارچینی، قصب الزریہ ہر ایک ۲۲ گرام، کیترا، صغ عربی، صندل سرخ، لاجورد مغسول، قرنفل، عود ہندی، ہر ایک ۸ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر محلول مروارید کے ساتھ سختی کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۵۰، ۵۰ گرام تا ۳ گرام استعمال کرائیں۔

• خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ عطاس :-

مغز تخم کدوئے تلخ، اسطوخودوس، کندش، مغز ریٹھ، ہر ایک ۳ گرام۔ تمام دواؤں کو آب تازہ میں پس کر فیلڈ پر لگا کر ناک میں پھرائیں۔

• یرقان بحرانی میں شیریں پانی سے حمام کرائیں اور روغن بالونہ، روغن

ثبث اور روغن سوسن کی مالش کریں۔

• باسلیق کی فصد کھولیں،

استسقام

ASCITES


اس مرض میں خوں آب (مستخرج ہو کر جلد یا غشاء مخاطی کے

نیچے خلاؤں یا خانوں یا کسی جوف میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اقسام :-

استقار

Ascites



اسباب :-

امراض باریطون :-

- (۱) التهاب باریطون حاد
- (۲) التهاب باریطون تدریجی
- (۳) باریطون کے سلعہ خبیث کی تراوش ثانوی
- (۴) التهاب باریطون برثومی
- (۵) استرخاء باریطون

امراض کبد :-

- (۱) تصلب کبد
- (۲) التهاب غلاف کبد مزمن
- (۳) آتشک کبدی

۱۔ اس صورت میں خون آب تراوش پا کر جلد اور تحت الجلد بافتوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں تمام اعضاء پھول کر گوندھے ہوئے آٹے کی مانند ہو جاتے ہیں، زیر جلد پلائی بافت Gelatinous Tissue بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔

۲۔ اس صورت میں احشاء شکم میں خون آب تراوش پا کر جمع ہو جاتا ہے۔
۳۔ دراصل یہ استقار نہیں ہے بلکہ نفخ کی ایک نوع ہے جس میں شکم استقار زتی کی طرح بڑھ جاتا ہے، اسی ظاہری مناسبت سے طب کی قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ استقار کے ذیل میں کیا جاتا رہا ہے، حقیقی اور غیر حقیقی کی تقسیم اسی لیے کی گئی ہے۔

- (۱۶) دیلیہ کبد
(۱۷) کیہ ویدانی
(۱۸) ضعف کبد
(۱۹) اطروفیائی تصلب کبد التهابی

امراض قلب :-

- (۲۰) ضعف قلب مزمن
(۲۱) سقوط قلب امتلائی Congestive Cardiac Failure

امراض ورید باب الکبد

- (۲۲) سدہ ورید باب الکبد دموی
(۲۳) مجاور احشائے کے سلسلہ سے ورید باب الکبد دب جانا
(۲۴) باب الکبد کے غد و لمفاویہ کے عظم سے ورید باب الکبد دب جانا

امراض کلیہ :-

- (۲۵) التهاب کلیہ حاد
(۲۶) التهاب کلیہ مزمن
(۲۷) ضعف کلیہ
(۲۸) سور مزاج کلیہ بارد

امراض مردہ و امعاء :-

- (۲۹) سور، مضم
(۳۰) بواسیر
(۳۱) درم معدہ
(۳۲) التهاب امعاء
(۳۳) ذرب
(۳۴) فوسنطاریہ

متفرقات :-

- (۳۵) غلبہ اخلاط الرجبہ

- (۱) درامولی استوائ
(۲) توبید دہوی میں آتش
(۳) مرطوب مقامات پر انعام
(۴) شدید ریاضت و مشقت کے بعد دہ پانی نوش کرنا
(۵) ورم طحال
(۶) فقر الدم
(۷) سیہ سیہی
(۸) نقصان تغذیہ
(۹) غذائیں لحمین کی کمی
(۱۰) اوزیما و غطالی
(۱۱) استسقاء بالقراسی
(۱۲) استسقاء مراری
(۱۳) ابیاض الدم
(۱۴) مرض ہا جکن
(۱۵) حیات مزمنہ

علامات : استسقاء لحمی :-

اس مرض میں جلد اور تحت الجلد کی بافتوں میں خوں آب جمع ہو جانے کی وجہ سے درم رخو، استسقاء اور تر بل کا ذب ہوتا ہے۔ جسم خمیری آٹے کی طرح پھولا اور گوندھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جسم کے کسی بھی حصہ میں انگلی گڑانے سے چند ثانیہ کے لیے گڑھا پڑ جاتا ہے چونکہ اس میں خوں آب قلیل مقدار میں اور سارے جسم میں پھیلا ہوتا ہے اس لیے گڑھا بہت معمولی ہوتا ہے اور جلد ہی زائل ہو جاتا ہے، تاہم اگر خوں آب زیر جلد زیادہ مقدار میں ہو تو گڑھا گہرا اور زیادہ دیر میں زائل ہوتا ہے۔ تبیع اور تر بل کا آغاز پیروں سے ہوتا ہے جو بعد میں شکم اور چہرے تک پھیل جاتا ہے، جسم کی رنگت سفید، چکنی، مردہ جیسی ہوتی ہے، براز سفید ہوتا

ہے، پیشاب بھی سفید خارج ہوتا ہے نفع کی شکایت ہوتی ہے، دست آتے ہیں، منہ کا مزہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ پیاس لگتی ہے، ناف ابھری ہوئی ہوتی ہے، نبض موجی، عریض اور لیتن ہوتی ہے۔
استسقاء لحمی میں حکمتہ الاف اور چہرہ، بدن یا دائیں ہاتھ میں تربل ہو تو یہ ردی علامت ہے، اطباء کا خیال ہے کہ ایسا مریض بس دو تین دن کا مہمان ہوتا ہے، اسی طرح چہرہ، جسم یا دائیں ہاتھ میں تربل کے ساتھ اگر بخار الغم کی شکایت پیدا ہو جائے تو مریض پانچویں دن فوت ہو جاتا ہے۔

استسقاء رقی۔

مادہ مرض کے خارج ہونے کی صورت میں حوف شکم میں پیپ، نیز مادہ مرض کے بارد ہونے کی صورت میں پانی جمع ہو جاتا ہے، شکم تدریجاً مشک کی مانند پھولتا جاتا ہے، اور بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، شکم پر ہاتھ مارنے یا مریض کے پہلو بدلنے سے پانی کی لہریں محسوس کی جاسکتی ہیں، دلد لاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پہلو بدلنے پر اوپر کے حرقی حصہ میں گڑھا پڑ جاتا ہے، شکم کی جلد صاف اور تنی ہوئی ہوتی ہے، جس پر ایک طرح کی جھک بھی دیکھی جاسکتی ہے، اس پر سفید سفید لکیریں پڑ جاتی ہیں، ناف پھیل جاتی ہے اور اس کا گڑھا زائل ہو جاتا ہے مریض کی شکل خاص قسم کی ہو جاتی ہے اور بالعموم اس کو دور سے دیکھ کر بھی آسانی تشخیص کی جاسکتی ہے، سوائے شکم کے باقی تمام اعضاء میں ذبول اور لاغری ہوتی ہے۔ جسم کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، سینہ کی پسلیاں تو بہت نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتی ہیں، چہرہ بھپا ہوا، متفکر اور پریشان رہتا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات چہرہ، یلکوں اور قصبہ میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ میں پانی بھر جاتا ہے پیشاب سرخ اور قلیل مقدار میں آتا ہے، انہار میں نبض صغیر، متواتر، اور مائل بہ صلابت و تمدد ہوتی ہے، اور آخر میں، رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے مائل بہ لینت ہو جاتی ہے، اجتماع آب کی وجہ سے عاجز پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے عسر تنفس اور کم و بیش کھانسی کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ استسقاء رقی میں خصبوں کا پھٹ جانا اور برازدوی آنا نہایت ردی علامت ہے، اطباء کا خیال ہے کہ ان علامات کی موجودگی کے بعد مریض بالعموم شفا یاب نہیں ہوتا بلکہ بوقت بھر میں مر جاتا ہے، اسی طرح غب غیر خالص، شطر الغب باللازمی و نائیبہ تمی یعنی میں استسقاء رقی ہو جانا اور ساتھ میں التہاب کبد اور التہاب طحال

پیدا ہو جائے تو بھی مریض ہفتہ عشرہ میں فوت ہو جاتا ہے۔

استسقاء طبعی ۱۔

شکم میں عسیر التخلیل ریاح پیدا ہونے سے شکم پھول جاتا ہے، بعض اوقات اس ریاح کے ساتھ قدرے مائیت بھی شامل ہوتی ہے، شکم میں تردد، پھیلاؤ اور شدید نفع ہوتا ہے، ثقل مفقود ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے، پیٹ پر ہاتھ مارنے سے طبل یعنی ڈھول کی مانند آواز سنائی دیتی ہے، اسی مناسبت سے اس کو استسقاء طبعی کہتے ہیں، مریض کو ہمہ وقت ڈکار محسوس ہوتی ہے، ڈکار یا گوز سے راحت ملتی ہے، امعاء اچھی ہوئی ہوتی ہیں، ادران کی حرکات دو دیہ محسوس ہوتی ہیں، شکم کا قرع ہر جگہ زمانیہ ہوتا ہے۔ ناف ابھرتی ہے اور اس کے پاس مروڑے ساتھ منتقل درد ہوتا رہتا ہے، اعضاء میں قبول ہونے لگتا ہے، ٹانگوں میں تربیلی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، نبض طویل ہوتی ہے، بعض مریضوں میں سرریع، متواتر اور مائل بہ صلابت و تمدد ہوتی ہے، پیشاب سرخ آتا ہے۔

استسقاء کی اس قسم میں ربو، ضیق النفس اور کھانسی آنار دی علامت ہے، ان حالات میں بالعموم دوسرے تیسرے دن مریض فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح قروح دہن، قروح لثہ، قروح بدن اور اسہال بھی مہلک تصور کیا جاتا ہے۔

حبن ۲۔

اس میں ریاح لطیفہ تحلیل ہو کر ریاح غلیظہ باقی رہ جاتی ہیں اور مریض کو صلابت شکم کے علاوہ کوئی اور عارضہ نہیں ہوتا۔

تفریقی علامات

التبّاب بالظہن مزمن Chronic Peritonitis	استسقاء Ascites
۱۔ بالعموم یہ علامتی سرگزشت ملتی ہے	۱۔ بالعموم کبد، کلیہ، قلب اور باریطون کے دیگر امراض کی سرگزشت ملتی ہے
۲۔ اوذیا عام نہیں ہوتا۔	۲۔ اوذیا عام یا مقامی ہوتا ہے۔
۳۔ بطنی درد ہوتا ہے۔	۳۔ بالعموم بطنی درد نہیں ہوتا۔
۴۔ دبائے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	۴۔ دبائے سے درد نہیں ہوتا۔
۵۔ جسمانی حرارت غیر طبعی ہوتی ہے	۵۔ جسمانی حرارت طبعی ہوتی ہے۔

اصل سبب مرض کا ازالہ کریں، اور مادہ فاسدہ کے اخراج و تحلیل کی تدا بیر اختیار کریں۔

۔ ۔ ۔ امراض قلب اور ضعف عروق کی صورت میں مقوی قلب دوائیں استعمال کرائیں
اور نظامِ دوران خون کو اعتدال پر لانے کی تدابیر کریں۔
۔ ۔ ۔ سوز القنیہ کی صورت میں ریاضت کی تاکید کریں، اور مرکبات فولاد (بھی)
استعمال کرائیں۔

علاج :-

شیر شتر ۸۵ ملی لیٹر میں کل قند ۲۴ گرام ملا کر ۳ دن نوش کرائیں۔ اس میں روزانہ ۱۲ ملی لیٹر کا اضافہ کرتے جائیں، جب ۸۵ ملی لیٹر تک پہنچ جائے تو اب بتدریج ۱۲، ملی لیٹر روزانہ کم کرتے جائیں اور جب ۸۵ ملی لیٹر تک پہنچ جائے تو تین دن بھی وزن، پلانے کے بعد چھوڑ دیں اور اگر تلمیہیں کی ضرورت پیش آئے تو مغز، فلوںس خیار شنبہ ۸ گرام، اسی شیر میں شامل کر کے

نوش کرائیں۔۔۔۔۔ شام کو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مجموع دبیہ الورد ۵ گرام کھلانے کے بعد شیرہ بادیان، شیرہ تخم کشوث، ہر ایک ۳ گرام، عرق بادیان ۲۴ ملی لیٹر، عرق غلب الثعلب ۵، ملی لیٹر میں نکال کر گھل قند ۸۰ گرام شامل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

بادیان، زیرہ سیاہ، مکہ خشک، بیل کلاں ہوزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کا عرق کشید کریں اور پانی کی بجائے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

صبر ستوطری ۲۸ گرام، سورنجان شیریں، پوست ہلبہ، بوزیدان، ہر ایک ۷ گرام، تربہ سفید ۲ گرام، سفونیا بریاں، انیسون ہر ایک ۲۵ گرام، منقل ازرق ۵ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر آب گندنا کے ساتھ چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ اور ۲ گولیاں ہمراہ آب نیم گرم مریض کو کھلائیں۔

نسخہ ۴۔

کبیلہ، سیماہ، آملہ سار ہر ایک ۱ گرام، آرد زرد سفید، آرد بیج حنظل، پوست ہلبہ، نمک سیاہ، نبات دار، عصارہ ریوند، شورہ قلمی، ہر ایک ۲ گرام، حب السلاطین مدبر ۴ گرام، شیرہ قوم سے کھل کر کے ۱۲۵ ملی گرام کی جوب بنائیں اور ۱۲۵ ملی گرام تا ۲ گرام ہمراہ شیر شتر کھلائیں۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۵۔

بادیان، تخم کاسنی، تخم خیاریں، ابرنجاسف، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، بیج بادیان، غلب الثعلب خشک، بیج کاسنی، ہر ایک ۷ گرام، تخم کشوث درجہ بستہ ۴ گرام، ریوند پینی ۱۰ گرام، مویز منقی ۱۳ دانہ۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو آب کاسنی سبز مرق ۱۲۰ ملی لیٹر میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو اس قدر جوش دیں کہ آب، صرف ۳۶ ملی لیٹر باقی رہ جائے، اس میں شہ بیت بزوری معتدل ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے ہمار مذہب تریاق اعظم کے ساتھ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زنجبیل، اگرام، قسط شیریں، انیسون، سنبل الطیب، تربد موصوف ہر ایک ۴ گرام، سنائے
صورتی، ریوند چینی، مصطلک رومی، لک منسول، بیج مہک، ہر ایک ۶ گرام، بادیان، پوست ہلیہ کالبی
ہر ایک ۵ گرام، شکر سفید ۱۲۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں
اور ۶ گرام ہمراہ آب نیم گرم کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

غار لقیون، عصارہ غافث، تربد موصوف، گل سرخ مصفی، ہر ایک اگرام، ریوند چینی
برگ سنائے کی، پوست ہلیہ کالبی ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر ہمراہ
شیر شتر نوش کرائیں۔
• استقار لمی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، اگرام، مغز تخم خیاریں، مغز تخم خربزہ، ہر ایک ۴ گرام، تمام
دواؤں کو جوش دے کر چھان لیں اور کلقتند ۱۲ گرام میں عصارہ ریوند ۵۰۰ ملی گرام ملا کر
کھلائیں اور یہ جوش اندہ نوش کرائیں، دوسرے دن عصارہ ریوند ۵۰۰ ملی گرام اور نمبرے
دن اگرام، حسب سابق کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

لک منسول، اسارون، زراوند مدحرج، سنبل الطیب، انیسون، بیج اذخر، گل غافث،
فلفل سیاہ، تخم کشوث، فوہ، دارچینی، ریوند چینی ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو
باریک کوٹ چھان کر ۲، ۲ گرام کی اقراص بنائیں اور اقراص ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔
برودت سے عارض ہونے والے استقار لمی میں یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

عنبہ اشہب، مشک خالص، حلتیت خالص، سہاگہ چوکیہ، نوش درمد بر، کبیریت خالص،
ہر ایک اگرام، تمام اشیاء کو آب برگ میں تبویل بنگلہ سبز مرق ۱۲ ملی لیٹر میں باریک
پیس کر دانہ مونگ کے برابر خوب بنائیں اور سایہ میں خشک کر کے محفوظ کر لیں اور ضرورت کے وقت
۲ خوب ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

کاسنی، بادیان، مکوہ خشک، سنبل الطیب، ہر ایک، گرام، گل قند ۲۴ گرام، _____ تمام
دواؤں کو کسی مناسب عرق میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
_____ استقار زنی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ترید سفید مقشر ۹ گرام، ہر ایک کر کے شیر زقوم میں گوندھ کر تین گویاں بنائیں
اور ایک ایک گولی تین دن کھلائیں۔ اس سے اسہال کے ذریعہ زرد پانی خارج
ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ عرق استعمال کرائیں۔

نسخہ عرق ۱۔

پوست بچ کرفس، پوست بچ بادیان، ہر ایک ۲۰ گرام، افسنتین رومی، مرکبی،
لک مفسول، چراتیہ، قسط شیریں، ریوند خطائی، نقاح اذخر، ہر ایک ۱۲۰ گرام، تخم رازیانہ،
ایسون، مصطلی رومی، تخم کرفس، ہر ایک ۵۰ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر تین حصہ
کر لیں ۱۰ ایک حصہ کو ۱۶ لیٹر گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح کو ہلکی آنچ پر ۱۴ لیٹر عرق کشید کریں۔
اس کے بعد اسی عرق میں دوا کا دوسرا حصہ ڈالیں اور ۱۲ لیٹر عرق کشید کریں، پھر تیسرا حصہ
ڈال کر ۱۰ لیٹر عرق کشید کریں اور ۱۲۔ ۶۰ ملی لیٹر بھی عرق نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شب یانی ۶ گرام، زیرہ سیاہ ۱۴ گرام، قند سیاہ ۲۸ گرام۔ تمام دواؤں کو
کوٹ پس کر صوب بنائیں اور ۹۔ ۱۲ گرام ہمراہ عرق مکوہ ۱۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
نفع مادہ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع ۱۔

مکوہ خشک، بچ بادیان، گل غافث، تخم کشوث (سودہ بستہ)، اصل السوس مقشر،
ہر ایک ۵ گرام، بچ کاسنی، بادیان، تخم خیار سین، پرسیاوشاں ہر ایک، گرام، مونیز منقہ ۹
_____ تمام دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو لچھان کر نیمہ بنفشہ
یا گل قند علی ۸ گرام حل کر کے آٹھ دن نوش کرائیں، نویں دن اسی نسخہ میں عود ۵ گرام، مصطلی
۳ گرام، دار چینی ۵ گرام، سنار کی ۲ گرام کا اضافہ کر کے بھگوئیں، اور صبح کو مغز فلوس خیار شبنم

۶. گرام، شیر خشک ۸۴ گرام، ترنجبین ۵۸۴ گرام، شکر سرخ ۶۰ گرام، مغز بادام ۵ دانہ ملائیں۔
اور صاف کر کے نوش کرائیں، دوسرے دن تبرید کا نسخہ استعمال کرائیں، تین مہل
کے بعد دوا الکرم کبیرہ گرام کھلا کر بادیان، ۵ گرام، انیسون، تخم کتوت ہر ایک ۴ گرام، عرق
بادیان ۵، ملیٹر، عرق برنجاسف ۴، ملیٹر، میں پیس کر مل چھان کر خیرہ بنفشہ ۸۴ گرام
ملا کر نوش کرائیں۔

حب ضرورت درج ذیل نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

نسخہ ۱۔

اصل السوس، تخم خیارین، حب قرطم، ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں
پیس کر شیرہ نکال کر شربت بزوری ۸۴ ملیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
• استقار طبعی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

استقار زقی میں مذکورہ نسخہ منصفی انیسون، دارچینی کوفتنہ، زیرہ سیاہ، ہر ایک
۵ گرام، جیل ۳ گرام، تمام دواؤں کو عرق بادیان، عرق یودینہ ۵، ملیٹر میں پیس کر
شیرہ نکال کر شامل کریں اور ہمراہ شربت دینار ۸۴ ملیٹر، نوکس کرائیں۔ یہ نسخہ
آٹھ دن استعمال کرانے کے بعد نسخہ مسہل دیں اور اگلے دن نسخہ تبرید کی بجائے یہ نسخہ نوش
کرائیں۔

نسخہ ۳۔

دوا المک معتدل، گرام کھلانے کے بعد بادیان ۵ گرام، عناب ۵ عدد، عرق بادیان
عرق گاؤ زبان ہر ایک ۵، ملیٹر میں پیس کر شیرہ نکال کر شربت بنفشہ ۲۲ ملیٹر مل کر کے
دش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

تخم کرفس، رازیانج، اسارون، انیسون، زراوند، ہر ایک ۲ گرام، زیرہ کرمانی ۳ گرام،
نبیل الطیب، جعدہ ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف
مائیں، اور ۹ گرام ہمراہ مار الاصول استعمال کرائیں۔

• جملہ انواع استقار میں خارجی طبعہ پر درج ذیل نسخہ جات/تدابیر اختیار کریں۔

• ————— پسینہ لانے کے لیے درج ذیل تدبیر اپنائیں۔
 بورہ ارمنی کوردغن بابونہ کے ساتھ ملا کر نمک میں پیس کر پیہ نکالیں، بزی یا گاؤ
 میں آلودہ کر کے یا دارچینی، سلیخہ، قصب الزریرہ کوردغن سوسن میں مخلوط کر کے سارے
 جسم پر مالش کریں۔

نسخہ ۱۔

آرد باجرا، آرد مندوا، چوب انکور خاکستر، ارہر سیاہ، آرد نخود مقشر، بریاں،
 بورہ ارمنی، سنبل الطیب، ہر ایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر نیم گرم ٹام
 پر مالش کریں۔ استسقاء رزقی میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

پشک بزر، سرگیس گاؤ خشک، ہر ایک ۱۲ گرام، گل ارمنی، سعد کوفی، گل بابونہ، زیرہ
 سیاہ، مکوہ خشک ہر ایک ۴ گرام، صبر زرد، مرکبی، ریونڈ چینی، اکلیل الملک، ہر ایک ۴ گرام
 بورہ ارمنی ۲ گرام ————— تمام دواؤں کو آب برگ کوئے سبز مروق میں پیس کر ضاد تیار
 کریں اور متورم اعضاء پر لیسپ کریں۔

نسخہ ۱۔

مغز فلوس خیار شنبہ ۹ گرام، ریونڈ چینی، سعد کوفی، سنبل الطیب، اکلیل الملک،
 گل بابونہ، ہر ایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو آب برگ مکوہ سبز مروق میں پیس کر
 نیم گرم ضاد کریں۔

نسخہ ۱۔

نمک لاہوری، کسبریت، بورہ ارمنی ہر ایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو پانی میں
 جوش دیں اور اس گرم پانی سے مرلیض کو نہلائیں۔

• ————— استسقاء طبل کی خاص قسم ”حین“ میں درج ذیل تدبیر سود مند ہیں۔

نسخہ ۱۔

بابونہ، اکلیل الملک، مرزنجوش، صعتر، تخم سداب، جند بیہستر، جھاؤ خالستر،
 جو اکھاڑ، ہر ایک ۶ گرام کو آب برگ سداب میں پیس کر ضاد تیار کریں اور لگائیں،
 درج ذیل نسخہ آہرن استعمال کرائیں۔


آبزَن :-
کبریت، جواکھار، ہر ایک ۸ گرام، دواؤں کو پانی میں جوش دیں
اور اس کا آبزَن کرائیں۔

ابیاض الدم

LEUKAEMIA

اس مرض میں لیوکوبلاستک خلیات سے فعل کی انتہائی زیادتی کی وجہ سے خلیات ابیض () کی تعداد خون میں طبعی حالتوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ طالی، یعنی غدو اور مخ العظام میں بڑھاؤ اور تکاثر ہوتا ہے، شدید فقر الدم، اندرونی نزف اور زبردست جسمانی خستگی ہوتی ہے، یہ انتہائی خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے اور عہد حاضر تک اس کا شافی علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے۔

اقسام:



اسباب:

اس کا اصل سبب ہنوز نامعلوم ہے، تاہم بعض ماہرین فن کا خیال ہے کہ برقی لہروں، فضائی آلودگی اور ایٹمی ذروں کو اس کے اسباب معذہ میں شمار کیا جاسکتا ہے، ————— بہر حال سرطان اور شبنم وغیرہ (Aids) کی طرح اس پر بھی تحقیق جاری ہے۔

علامات:

۱، حاد۔
یک نواتی ابیاض الدم۔

ابیاض الدم کی یہ نوع نادر الوقوع ہے، تحت الحاد (Sub-Acute) شکل میں بھی نمودار ہو سکتی ہے تاہم حاد صورت میں کثیر الوقوع ہے، منہ، بلعوم، اور بعض اوقات معار مستقیم میں آکلہ التهابی، اس مرض کی خاص علامت ہے، اس میں بے ترتیب بنجار ہوتا ہے، نقص الدم بتدریج ہوتا ہے اور خلیات ابیض میں محدود نوعیت کا اضافہ ہوتا ہے۔ بعض حالات میں خلیات ابیض کا شمار ۲۵,۰۰۰، فی مکعب ملی میٹر سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے خلیات ابیض یک نواتی (Monocyte) کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادہ شدید حالتوں میں پیش رونواتی خلیات (Mono-Blasts) بھی خون میں ظاہر ہوتے ہیں،

ابیاض الدم لمغاوی:

ابیاض الدم کی یہ صورت کثیر الوقوع ہے، اس میں مریض چند ہفتوں میں ہی فوت ہو جاتا ہے، لمغاوی غدد نرم ہو جاتے ہیں اور غیر محسوس طور پر بڑھ جاتے ہیں، خون میں خلیات لمغاویہ کی تعداد ۴۰,۰۰۰ ————— ۸۰,۰۰۰، فی مکعب ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، یہ لمغاوی خلیات زیادہ تر پیش رونمغاوی خلیات (Lympho-Blasts) ہوتے ہیں، خلیات احمر کی تعداد میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے شمار میں نہایت سرعت کے ساتھ ۱۰۰,۰۰۰ ————— تک کمی ہو جاتی ہے۔ ابتداء میں مریض، الجھ کو نہایت مختلف علامات بتاتا ہے، جن میں قلاع الغم ضروری ہے، مسوڑھوں، مٹھا، ملی سطوں،

جلد اور اندرونی احشاء سے نزع ہوتا ہے، جس کے سبب بعض اوقات اسکو بوط کا مغالطہ ہوتا ہے، طحال، کبد اور کلیہ کے حجم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مرض کی ابتداء، گردن، کچھ ران اور بغل کے غدود کے غلظت سے ہوتی ہے، بعد میں رعاف اور نزع وغیرہ علامات رونما ہوتی ہیں۔ بچوں میں یہ مرض نہایت شدید ہوتا ہے اور ۶۰ - ۹۰ دن میں موت واقع ہو جاتی ہے، سن رسیدہ لوگوں میں چار، پانچ سال تک مرض برقرار رہ سکتا ہے، قلت الدم بھی بہت جلد پیدا ہو جاتا ہے، جسم پر بکثرت رسولیاں سی پیدا ہو جاتی ہیں۔

ابیاض الدم مخنی / مخنی طحالی :-

اس کی بیشتر علامات ابیاض الدم لمغادی حاد سے مشابہ ہوا کرتی ہیں، اس میں جسم کے بیشتر حصوں میں رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور مخنی طحالی قسم کے خلیات میں اضافہ ہو جاتا ہے، چنانچہ خلیات ابیض کی مجموعی تعداد ۶۰ - ۱۰۰ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اضافی طور پر خلیات نخاعیہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو ۳۰ - ۵۰ فیصد تک پہنچ جاتی ہے۔ جذر اللون کم ہوتا ہے یہ مرض نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے اور بالعموم ۲-۳ سال کے درمیان ہی مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

دب، مزمن :-

ابیاض الدم لمغادی مزمن :-

جسم کی تمام لمغادی ساخت میں تکثیر (Intestinal Tract) جس کے نتیجے میں غدد لمغادی، طحال اور اقلیم امعائی کے کیسہ دار غدود کی جسامت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تندرست ضعیف نقص الدم اور مخاطی سطحوں میں نزعی رجحان یا یا جاتا ہے، غدد کی جسامت میں اضافہ کے باوجود ان میں درد محسوس نہیں ہوتا۔

خلیات ابیض کا شمار عام طور سے ۱۰۰۰۰ فی مکعب ملی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے لمغادی خلیات ان اعداد کا نوے فی صد ہوتے ہیں، طحال کی جسامت میں بھی معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور تلیف نمایاں ہوتی ہے، مرض کے آخری درجات میں مخنی خلیات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ سرخ خلیات (خلیات احمر) کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔

انفارکشن کا رجحان بھی موجود ہوتا ہے، نقص الدم کے ساتھ قلت لونی بھی ہوتی ہے عورتوں کی نسبت مردوں میں یہ نوع ۴/۱ کے تناسب کے وقوع پذیر ہے، اور ۲۳۔ ۲۶۔ ماہ میں موت واقع ہو سکتی ہے۔

ابیاض الدم/مخی/طحال :-

ابتدائی درجات میں مرضی علامات عام طور سے غیر واضح ہوتی ہیں، عام مہینہ کلمندی اور ضعف ہوتا ہے، بعض اوقات مرض کی ابتدائی علامت کے طور پر رعات عارض ہوتا ہے اور کبھی مبہم درد، تنگی تنفس، نفخ شکم یا کوئی دماغی تکلیف ہوتی ہے، ابتدائی درجہ کے بعد عام طور سے دو قسم کی علامتیں رونما ہوتی ہیں۔

(۱) فساد خون سے رونما ہونے والی علامات

(۲) مرض کے نتیجہ میں جسم کے مختلف حصوں میں غیر طبعی رسولیوں کی دباؤں سے رونما ہونے والی علامات۔

فساد خون کے نتیجہ میں عام ضعف، نوز اور سور مزاج ہوتا ہے، ۳-۴ مریضوں میں بخار کے بے قاعدہ حملے ہوتے ہیں، پیشاب میں حامض بول (Uric Acid) کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔

مرض کے نتیجہ میں جسم میں غیر طبعی ساخت پیدا ہو جاتی ہے، طحال بڑھ جاتی ہے غظم طحال یا انتہاب غلاف طحال کی وجہ سے درد ہوتا ہے، کبد بھی معمولی یا غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ عدد لمفاوی میں بھی تعظم ہوتا ہے، عہد البلع اور تنگی تنفس ہوتی ہے۔ استسقاء بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات طحال بڑھ کر پیٹرو کے جوف تک پہنچ جاتی ہے۔ جلد کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، معدہ و امعاء کی طبعی کارکردگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔

لمحوظ رہے کہ ابیاض الدم کی جملہ اقسام میں مخ العظام خاص طور سے متاثر ہوتا ہے چنانچہ مخ العظام کا بار بار معائنہ کرنے سے تشخیص مرض میں کافی مدد ملتی ہے، اطراف میں ہونے والا درد حمی حداری (Rheumatic Fever) اور وجع المفاصل کے مانند ہوتا ہے، تاہم فرق اس قدر ضرور ہے کہ ابیاض الدم میں ہونے والا درد مفاصل کی بجائے ہڈیوں میں ہوتا ہے۔

ذیل میں قلت الدم مہلک اور ابیاض الدم کا ذب سے اس کی تفریقی علامات

تحریر کی جارہی ہیں۔

تفریقی علامات	ابیاض الدم Leukaemia	قلت الدم مہلکہ Pernicious Anaemia
۱۔ غظم الطحال بہت زیادہ ہوتا ہے۔	۱۔ غظم الطحال بہت زیادہ ہوتا ہے۔	۱۔ طحال طبعی ہوتا ہے۔
۲۔ غظم غدد لمفاویہ ہوتا ہے۔	۲۔ غظم غدد لمفاویہ ہوتا ہے۔	۲۔ غظم غدد لمفاویہ نہیں ہوتا۔
۳۔ غظام درد انگیز اور ذکی الحس ہوتے ہیں۔	۳۔ غظام درد انگیز اور ذکی الحس ہوتے ہیں۔	۳۔ غظام درد انگیز یا ذکی الحس نہیں ہوتے
۴۔ قص میں درد محسوس ہوتا ہے۔	۴۔ قص میں درد محسوس ہوتا ہے۔	۴۔ نص میں درد نہیں ہوتا۔
۵۔ جریان الدم تاخیر سے ہوتا ہے۔	۵۔ جریان الدم تاخیر سے ہوتا ہے۔	۵۔ جریان الدم جلد ہوتا ہے۔
۶۔ عام طور سے بخار نہیں ہوتا۔	۶۔ عام طور سے بخار نہیں ہوتا۔	۶۔ بخار ہوتا ہے۔
۷۔ کریات بیضہ کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوجاتا ہے۔	۷۔ کریات بیضہ کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوجاتا ہے۔	۷۔ کریات بیضہ کی تعداد میں حقیقی اضافہ نہیں ہوتا۔
ابیاض الدم	ابیاض الدم کاذب	
۱۔ غظم طحال بہت زیادہ ہوتا ہے۔	۱۔ غظم طحال بہت معمولی ہوتا ہے۔	
۲۔ غظم غدد لمفاویہ خفیف ہوتا ہے۔	۲۔ غظم غدد لمفاویہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔	
۳۔ ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے، خاص طور سے غظم القص میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔	۳۔ ہڈیوں میں درد بہت معمولی ہوتا ہے	
۴۔ کریات بیضہ میں غیر معمولی اضافہ ہوجاتا ہے۔	۴۔ کریات بیضہ کی تعداد میں حقیقی اضافہ نہیں ہوتا۔	
۵۔ قلت الدم بتدریج شدت اختیار کرتا ہے۔	۵۔ قلت الدم نسبتاً آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے	
۶۔ فقدان صحت بہت جلد ہوتا ہے	۶۔ فقدان صحت کم اور تاخیر سے رونما ہوتا ہے	

اصول علاج:

۔ سبب دریافت نہ ہو سکے کی صورت میں صرف عوارض میں تخفیف کی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ درم کبد اور درم طحال کے اصول پر علاج کریں۔

علاج:

• علاج ہنوز دریافت نہ ہو سکا ہے، تاہم بعض اطباء یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

نسخہ:-

بہدانہ، حب الاس، کشنیز خشک، پنچ انجبار، گل نیلوفر ہم وزن، کاجوشاندہ
یا خبیاندہ نوش کرائیں۔

مرض اخضر

CHLOROSIS

اس مرض میں خون کے اجزاء کے طبعی تناسب میں فرق آجاتا ہے، کریات حمرا (R.R.C.) کی تعداد کسی قدر کم ہو جاتی ہے، ان کا حجم چھوٹا اور کسی قدر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے جذر اللون بعض اوقات نصف رہ جاتا ہے، اس کے علی الرغم لیفین کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ۱۲-۱۷ سال کی غیر شادی شدہ لڑکیوں میں کثیر الوقوع ہے، بلوغت سے قبل اور ۳۰ سال بعد نادر الوقوع ہے،

اسباب:

انفعالات نفسانی:-

۱. رنج و غم

۲. زرد حسی

امراض معدہ و امعاء:-

۳. سوء ہضم

۴. دائمی قبض

۵. عفونت امعاء

امراض نظام دوران خون:-

- (۱) تقصیق اور طی
(۲) قصور اور طی
امراض رحم :-
(۳) اجتباس طمث
(۴) قلت طمث
(۵) عسر الطمث
(۶) نقص عضو رحم خلقی
(۷) نقص خصیہ الرحم خلقی
متفرقات :-
(۸) نقص تغذیہ
(۹) ورزش کی کمی
(۱۰) تنگ و تاریک مکانات میں رہائش
(۱۱) عیش و آرائش کی زندگی
(۱۲) ضعف کبد

علامات :

مریضہ کی شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی نشوونما خوب ہو رہی ہے ، وہ تازہ بتازہ سن بلوغت کو پہنچی ہوتی ہے ، اگر لڑکی گوری ہے تو اس کی جلد کارنگ زردی مائل سبز یا سبزی مائل زرد ہو جاتا ہے اور سانولی عورتوں میں سفیدی مائل یا نیلی گول ہو جاتا ہے ، قبض ، سوز ، ہضم اور ضعف اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے ، تاہم غیر معمولی لاغری یا ضعف نہیں ہوتا ، جسمانی اور دماغی محنت سے طبیعت گھبراتی ہے ، مزاج میں چڑچڑاہٹ آجاتا ہے ، برد اطران ہوتا ہے ، درد سر اور دوران سر ہوتا ہے ، درد شکم بھی متوقع ہے ، خذالینے کے بعد سر اور شکم میں درد لازمی ہوتا ہے ، ثقیل اور دیرہضم اشیاء کی طرف رغبت ہوتی ہے ۔ بدن کے مختلف اعضاء میں بھی درد ہوتا ہے ، گوشت سے نفرت ہوتی ہے ۔ کانوں میں مختلف انواع کی آوازیں آتی ہیں ، کونڈہ ، مٹی ، کھریا وغیرہ کھانے کی

خواہش ہوتی ہے، خون کی رگت بھیگی اور اس کا قوام رقیق ہوتا ہے، بالعموم جسمانی حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا تاہم معمولی حرارت ہو بھی جائے تو آرام کرنے سے فرد ہو جاتی ہے، عسر طث، قلت طث اور کبھی کبھی اختناق الرحم ہوتا ہے، سیلان الرحم بھی ہو سکتا ہے، پیشاب بار بار، زیادہ مقدار میں اور پانی جیسا خارج ہوتا ہے۔ متلی اور بعض اوقات قے بھی ہوتی ہے، چہرہ پر کسی قدر تھج اور پیروں میں تزلزل ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں معمولی نیلگوئی شامل ہو جاتی ہے، ان تمام عوارض کے باوجود ہلاکت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ مرکبات فولاد کے استعمال سے اور شفا یابی ہو جاتی ہے، شادی۔

بعد یہ مرض از خود ختم ہو جاتا ہے۔

ذیل میں قلت الدم اور قلت الدم مہلک سے اس کی تفریقی علامات درج کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

قلت الدم Anaemia	مرض اخضر Chlorosis
1- جلد بھیگی اور بے رونق ہوتی ہے۔	1- جلد کا رنگ سبزی مائل زرد، زردی مائل سبزی یا سفیدی مائل یا نیلگوں ہوتا ہے۔
2- لاغری ہوتی ہے۔	2- لاغری نہیں ہوتی۔
3- ہر جنس میں ہوتا ہے۔	3- ہر جنس میں نہ ہو کہ صرف جووان لڑکیوں میں ہوتا ہے۔
4- عوارضات رحمی نہیں ہوتے۔	4- اکثر عوارضات رحمی ہوتے ہیں۔
5- کھانسی اور شدید عسر تنفس نہیں ہوتا۔	5- کھانسی اور شدید عسر تنفس ہوتا ہے۔
6- انفعالات نفسانی کا وجود لازمی نہیں۔	6- انفعالات نفسانی لازمی طور سے ہوتے ہیں۔
قلت الدم مہلک Pernicious Anaemia	مرض اخضر Chlorosis
1- ادھیڑ عمر میں کثیر الوقوع ہے۔	1- بلوغت کے قریب جووان لڑکیوں میں کثیر الوقوع ہے۔

۲۔ بخار نہیں ہوتا۔	۲۔ بخار ہوتا ہے۔
۳۔ استسقا نہیں ہوتا۔	۳۔ استسقا ہوتا ہے۔
۴۔ جریان الدم بالعموم نہیں ہوتا۔	۴۔ جریان الدم بالعموم ہوتا ہے۔
۵۔ چہرے کا رنگ سبزی یا سفیدی	۵۔ چہرے کا رنگ تہی ہوتا ہے۔
یا نیلگوں ہوتا ہے۔	

اصول علاج:

- ۱۔ مریض کی رہائش کا بہتر نظم کریں
- ۲۔ خوشن و خرم رکھنے کی تدابیر کریں
- ۳۔ باضمہ کی اصلاح کریں
- ۴۔ فولاد کے مرکبات استعمال کرائیں
- ۵۔ زود ہضم، لایف اور مقوی غذائیں ازالہ مرض کا باعث ہیں۔

علاج:

- ۱۔ صبح کو کشتہ خبث الحدیہ ۱۳۰ ملی گرام، جوارش جالینوس ۹ گرام میں ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد عرق بادیان ۱۲۰ ملی لیٹر میں شربت انار میں ۲۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

شام کو کشتہ فولاد ۱۶ — ۲۲ ملی گرام، مکھن میں ملا کر چٹائیں۔

تمہ کیب کشتہ فولاد ۱۵۔

اب تخم مع پھل کا زیادہ سا پانی نکال کر مٹی کے ایک برتن میں رکھیں، اس کے بعد فولاد کا ایک صاف ٹکڑا کوئلے کی آگ میں سرخ کر کے اس پانی میں بجھائیں۔ صبح سے شام تک یہ عمل کرتے رہیں، فولاد کشتہ ہو کر برتن کی تہہ میں جمع ہو جائے گا۔ اس کشتہ کو نکال کر مغز گھیکوار میں خوب کھل کریں، اور ٹکیاں بنا کر مٹی کے ایک کوزے میں گل حکت کر کے دس سیرا پلوں کی آگ دیں اور مرد ہونے پر نکال لیں اور استعمال کرائیں۔

امراض مزاح

Learn Unani By Abdul Waris Salman

مرارہ کی مختصر تشریح اور منافع

BRIEF ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF GALL BLADDER

تشریح :-
محل وقوع :-

یہ تھیلی نما عضو ہے، اس میں صفراء بھرا ہوتا ہے۔ یہ کبد کے دائیں فص Right Lobe کی زیریں سطح سے چسپاں ہوتا ہے، اس کے بائیں طوف کبد کا فص مربع Quadrate Lobe اور دائیں جانب کبد کے دائیں فص کا بڑا حصہ ہوتا ہے اور کبد کے اگلے کنارے سے آگے نکلا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے باب الکبد Porta Hepatis ہوتا ہے۔ یہ قولون مستعرض کے دائیں سرے اور اثنا عشری کے پہلے حصہ پر سہارا لیتا ہے۔
مرارہ کے جسم کو درج ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(I) قاع المرارہ Fundus

(II) جسم Body

(III) گردن، عنق Neck

قاع المرارہ Fundus گول، مثلہ مرارہ سے آگے، دیوار بطن مقدم کے پیچھے ہوتا ہے۔ جسم Body کا رُخ بالائی طرف پیچھے اور دائیں جانب ہوتا ہے، اس کی زیریں اور پہلوی سطحوں آزاد اور بالائی سطح کبد کی زیریں سطح کے حفرہ مرارہ سے پیچھے، نعلوی کے ذریعہ

ملی ہوتی ہے۔ عنق/گردن Neck ابتداً بائیں جانب مڑتی ہے۔ اس کے بعد دائیں جانب کو، پھر بائیں جانب مگر مجرای صفراوی Bile Duct سے وابستہ ہوجاتی ہے۔
 ملحوظ رہے کہ مرارہ Gall Bladder کی لمبائی ساڑھے سات سینٹی میٹر اور چوڑائی یونے چار سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس میں Bile صفرا موجود ہوتا ہے۔

منافع :-

مرارہ میں صفرا اکٹھا ہوتا رہتا ہے جو نظام جسمانی کو روزانہ رکھنے کے لئے حسب ضرورت صرف ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ فعل ہضم کے علاوہ اوقات میں جگر سے صفرا پیدا ہو کر مرارہ میں مجتمع ہوتا رہتا ہے اور فعل ہضم کے وقت یہ جگر سے اثنا عشری پر گرتا ہے اور فعل ہضم میں مدد دیتا ہے۔ غذا کو سنت ہونے سے روکتا ہے اور رفع براز میں انتہائی خدمات انجام دیتا ہے۔

التهاب مرارہ


CHOLECYSTITIS

اس مرض میں نفخ، بد ہضمی اور سیسے میں حلن ہوتی ہے، نفخ کے ساتھ دائیں قوس ضلعی کے نیچے یا دائیں کتفی زاویے کے نیچے درد ہوتا ہے۔

اقسام :-

التهاب مرارہ

Cholecystitis



اسباب

امراض مرارہ :-

(I) مجری صفراوی کا انسداد

(II) حصاة مرارہ

(III) مرارہ کا ثانوی تعدیہ

امراض دہن :-

(I) التهاب لوز تین

(II) بوسیدگی دندان

امراض معدہ و امعاء :-

(I) دیدان امعاء

(II) دم زائده اعور

امراض ریہ :-

(I) ذات الریہ

طفیلی و جراثیمی :-

(I) انف العنبرہ

(II) حمی تیغودیہ

علامات :-

حاد :-

عضل تناؤ، دم کے ساتھ شدید درد، اقلیم تحت الغضاریف

میں شدید درد جو دایبہ شانے کی طرف بڑھتا ہے۔ مقامی تناؤ ہوتا ہے، بعض اوقات تنفس میں بھی دشواری ہوتی ہے، جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات لرزہ بھی ہوتا ہے۔ سو بخیم شدید تلم، اور تھکے اور بے چینی ہوتی ہے۔ خون کی جانچ سے سفید دمویت کا پتہ چلتا ہے۔ اختلاج قلب اور یرقان بھی ہو سکتا ہے۔

تحت الحاد :-

اس میں علامات میں خفت ہوتی ہے۔

مزمن :-

علامات کا انحصار حصاة کی موجودگی اور مجری مرارہ کے التهاب پر ہے اور کسی قدر انجذاب سمیات کے اثرات پر بھی۔ چنانچہ نفخ اور بدہضمی ہوتی ہے، غذا لینے کے بعد، خصوصاً روغنی غذا کھانے کے بعد نفخ زیادہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دائیں قوس ضلعی کے نیچے یادائیں کتفی زاویے کے نیچے میٹھا درد شروع ہو جاتا ہے، درد کا آغاز عموماً آگے جھکنے سے ہوتا ہے اور درد کی حالت میں آگے جھکنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، وقتاً فوقتاً شدید درد کے محققہ اور تیز حملے قسم شراسینی سے شروع ہو کر زیریں اضلاع کا ذب Flase Ribs کے گرد، ہر دو جانب پھیل جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پتھری مجری مرارہ یا مجری مشترک میں چلی گئی ہے، درد اور نفخ کے اندیشہ سے مریض کام کاج سے جی چٹا ہے، جس کے باعث اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جسم میں شمی اجزاء زیادہ ہو جاتے ہیں اور مریض کو تنگی نفس کی شکایت ہو جاتی ہے، سینے میں سوزش ہوتی ہے، پتھری مجری مشترک میں پھنس جائے تو یرقان ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں علامات بہت خفیف ہوتی ہیں اور نمایاں شکایت مثلی، درد سر، گردن، کمر اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ خون میں سمی اجزاء شامل ہو جانے سے یہ عوارض شدید ہو سکتے ہیں۔ مقام مرارہ پر دباؤ ڈالنے سے درد محسوس ہوتا ہے، گہری سانس لینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے بلکہ سانس ٹوٹ جاتی ہے۔

اُصول علاج :-

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- التهاب کبد کا اُصول علاج اختیار کریں۔
- حسب ضرورت ميفتات، مصلات اور مدرات استعمال کرائیں۔

علاج :-

- قرص گز اعدد، ہمراہ جوشاندہ بادیان ۵ گرام، پودینہ خشک ۵ گرام،

آلو بخارا ۵ عدد، مونیر منقی ۹ عدد، صبح شام استعمال کرائیں اور رات کو قرص املاح اعداد دیں۔
 قرص الکلی ۲ عدد، قرص گز ۱ عدد، کو بادیان ۵ گرام، پودینہ خشک ۴ گرام
 مونیر منقی ۹ عدد، آلو بخارا ۵ عدد کے جوشاندہ کے ساتھ صبح شام استعمال کرائیں اور رات میں
 قرص املاح اعداد کھلائیں۔

قرص گز ۲ عدد ہمراہ معجون دبید الورد ۶ گرام استعمال کرائیں۔
 زنجبیل نیم کوفتہ، پودینہ خشک، ہر ایک ۵ گرام، بادیان نیم کوفتہ ۶ گرام،
 فلفل سیاہ نیم کوفتہ ۷ عدد، زیرہ سفید ۳ گرام، نوشادر اگر گرام، تمام دواؤں کو رات میں
 پانی میں ہلک کر صبح کو مکمل جھان کر نوش فرمائیں اور بعد غذا قرص گز ۲ عدد کھلائیں۔

حصاة مرارة

GALL STONES

اس مرض میں مرارہ میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ کسی تکلیف اور شدید مرضی علامت کے
 یوں مبتلا رہتی ہے، تاہم مقام مرارہ پر بلوچہ اور مقام معدہ پر تناؤ ہوتا ہے، تنفس میں لمبی آہ
 نکلتی ہے، تپلی ہوتی ہے اور پتھری کے مقام بدلنے سے علامات و عوارض میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔

اسباب :-

۱۔ جراثیمی تعدیہ۔

۲۔ یا تو بیا۔

۳۔ درم راندہ امور

(ملت) سرخبادہ

(IV) ذات الریہ

۴۔ حصاة مرارہ دو طرح کی ہی کثیر الوقوع ہیں۔

(I) حصاة مرارہ استحال

(II) حصاة مرارہ لون

(۶) زہر باد

(۷) بی کولائی

(۸) حمی تیغودیہ

(۹) قبض مزمن :-

(۱۰) صفاء میں کولاسٹرال کی زیادتی :-

علامات :-

حصاة مارہ جب تک مارہ میں رہتی ہے، کوئی مرضی علامت عموماً پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس کے جگہ بدل دیتے ہیں، مرضی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی شدت اور صفت کا انحصار پتھری کی ساخت اور مقام و وضع پر ہوتا ہے۔ بڑی صفاء میں ہو تو براہ سعید ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، عموماً درد کا دورہ رات میں یکبارگی ہوتا ہے، فم معدہ سے درد بڑھ کر دائیں شانے کے بالائی حصہ تک محسوس ہوتا ہے، نویں سیلی کی ٹوک دئی محسوس ہوتی ہے، مے آتی ہے اور لرزہ کے ساتھ بخار ہوتا ہے، اگر پتھری وہی پھنسی رہے تو درد کا دورہ پتارہتا ہے اور قنات صفراء سے نکل کر اثناعشری میں چلی جائے تو درد یکدم منفقود ہو جاتا ہے اور حصاة براز میں خارج ہو جاتی ہیں۔

بعض اوقات حصاة کے مارہ میں پڑے رہے سے بھی مرضی علامات رونما ہوتی ہیں، مثلاً مقام مارہ پر ثقل اور مقام معدہ پر تناؤ سارہتا ہے، مریض سانس لینے لیتے ایک لمبی آہ بھرتا ہے، متلی کی شکایت ہوتی ہے، اس کے ساتھ غش بھی آتا ہے، غذا لینے کے بعد لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اگر حصاة بڑی مشترک Common Bile Duct میں ہو تو زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے مہلک مرضیاتی علامات رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً خون صفراء، التهاب قنات الصفراء، وہیلہ کبد، سوزش بانقرا، سوزش ورید بانی وغیرہ۔ حصاة مارہ کی تشخیص اکسرے سے یقینی طور پر ہو جاتی ہے۔

اصول علاج :-

● اگر مریض ذریعہ اندام ہو تو فریبی کم کرنے کی تدبیر کریں۔

- سو، ہضم کا ازالہ کریں۔
- مفتحات اور مدرات استعمال کرائیں۔

علاج :-

- جوارش انارین ۵ گرام کھلا کر ہادیان ۵ گرام، ریشہ خطمی ۳ گرام، آلو بڑا ۱۵ عدد، مونیہ منقی ۷ عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت دینار ۳۶ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- روغن زیتون خالص ۱۰ قطرے بوقت خواب نوش کرائیں۔
- نمک ترب، نمک پالک، نمک سیکہ، ہر ایک ۳ گرام، حصاة مرارہ انسان ۲، ۵ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اگر گرام ہمراہ شربت اناس ۳۸ ملی میٹر نوش کرائیں۔
- تخم کشوث، انیسون، ہر ایک ۳ گرام، مکوہ ۲ گرام، مونیہ منقی ۷ دانہ — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت انارین ۳۶ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- درد کی شدت میں برقعشا اگر گرام کھلائیں۔
- قرص زہر مہرہ مرکب ۲ عدد ہمراہ عرق برگ تنبول، صبح کو استعمال کرائیں۔
- اور شام کو مفرح شاہی ۶ گرام ہمراہ شربت مفرح دمقوی قلب ۵، ۷، ۱۰ ملی میٹر استعمال کرائیں۔
- حصاة الکلیہ میں مذکور نسخہ استعمال کرائیں۔
- حجر الیہود، سنگ سر یاہی ہر ایک ۲۳ گرام، حجر البقر ۲ گرام، — تمام دواؤں کو عرق لیون کاغذی ۲۰ عدد میں کھل کر کے نمک لاہوری ۶۰ گرام ملا کر نار جیل خاں آب دار میں بھر کر ۲۰ کلو پلوں کی آبخ پر رکھیں، سرد ہونے پر نار جیل حاصل کر کے نمک سیاہ ایک حصہ، نار جیل ۱/۲ حصہ، جوا کھار، فلفل سیاہ ۱/۲ حصہ کے ساتھ کوٹ چھان کر ۳ گرام کھلائیں۔

قولنج مرارہ

BILIARY COLIC

اس مرض میں مرارہ میں شدید سوزش اور درد ہوتا ہے، درد کی شدت سے مریض بے قرار ہو جاتا ہے۔

اسباب:

- (۱) حصّۃ مرارہ کا حرکت کرنا۔
- (۲) حصّۃ کا کبد اور مرارہ کے درمیان احتباس۔
- (۳) حصّۃ کا، محراب صفراوی میں احتباس۔

علامات:

ابتداء میں عام طور سے رات میں فم معدہ، سینہ اور دلہنے شانے میں یکبارگی درد محسوس ہوتا ہے، درد نہایت شدید نوعیت کا ہوتا ہے، جس کی تکلیف سے مریض بے قرار ہو جاتا ہے، یہ درد فم معدہ سے شروع ہو کر دائیں پسلیوں سے پھیلتا ہوا پیچھے فقرات کی طرف جاتا ہے اور دائیں شانے کے بالائی کنارے تک پھیلتا محسوس ہوتا ہے۔ فواق، متلی، قے آتی ہے، بعض اوقات لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، پسینہ خارج ہوتا ہے۔ دورہ کے وقت مقام جگر پر بوجھ اور درد محسوس ہوتا ہے۔

کبد اور مرارہ کے درمیانی راستہ میں حصّۃ کے احتباس کی صورت میں التهاب کبد ہوتا ہے، اور ۲۴ گھنٹے کے بعد یرقان علامت رونما ہونے لگتی ہیں، اس کے علاوہ التهاب کبد کی دوسری علامات بھی ملتی ہیں۔ حصّۃ کے مجری صفراوی مشترک میں احتباس کی صورت میں درد کے ساتھ مرارہ پھیلنے اور یرقان مری کی علامات ملتی ہیں۔ حصّۃ مرارہ کے عضلی حصہ میں ہونے کی صورت میں درد مرارہ کے ساتھ یرقان نہیں ہوتا، شکم میں غماط کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کے سبب شکم بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

اصول علاج :

- _____ حصّۃ مرارہ کا اصول علاج اختیار کریں
- _____ مقام درد پر تاکید کریں

علاج :

- _____ تخم حلیہ، تخم گذر، تخم کرفس، نانخواہ، برگ سداب ہم وزن _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش فرمائیں۔
- _____ کاج، تخم خیار، ہر ایک، گرام، زیرہ، اصل السوس، فستین، ہر ایک ۴ گرام _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر اعلیٰ چھان کر شربت بزوری معتدل ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- _____ آب گھیکو اور تازہ میں نبات سفید ملا کر نوش کرائیں۔
- _____ تخم خیار ۹ گرام، خار خشک خورد، تخم خربزہ، ہر ایک ۲ گرام، تخم کشوث، ۴ گرام، بادیان ۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی میں پس کر مل چھان کر گلقد ۲۵ گرام ملا کر نکھائی ۴ گرام پھڑک کر نوش کرائیں۔
- _____ بابونہ، شبنم، خطمی، برگ کرنب، پودینہ، ہموزن _____ تمام دواؤں کو ۱۰ لیٹر پانی میں جوش دے کر آبرزن کرائیں۔

امراض طحال

Learn Unani By Abdul Wajid Salman

طحال کی مختصر تشریح اور منافع

یہ بھی جسم کا ایک بڑا غدہ (Gland) ہے، اور بائیں قسم تحت الشراہیف (Left Hypochondriac Region) میں ۹-۱۱ ویں بائیں پسلیوں کے مقابل واقع ہے، اس کی ساخت سرخ سیاہی مائل گوشت، اور وہ شراہین اور اعضاء شامل ہیں۔ اس کے اوپر صفاق کا استہ ہوتا ہے، اس کی شکل مستطیل اور چوڑی ہے، لمبائی ۱۲ سینٹی میٹر چوڑائی، سینٹی میٹر اور دبازت ۳ لم سینٹی میٹر ہوتی ہے۔

طحال کی درج ذیل دو سطحیں ہوتی ہیں اور ایک سطح کے ہم نشان اور ہم کنارے ہیں۔

(۱) حجابی سطح Diaphragmatic Surface

(۲) احشائی سطح Visceral surface

(۱) نشان معدی Gastric Impression

(۲) نشان بانقہ اسی Pancratic Impression

(۳) نشان کلوی Renal Impression

(۴) نشان قولونی Colic Impression

کنارے :-

(۱) بالائی کنارہ

(۲) زیریں کنارہ

دعا، اندرونی کنار

دعا، بیرونی کنار

حجابی سطح :-

یہ محدب اور چمکی ہوتی ہے، اس کا رخ اوپر، پیچھے اور بائیں جانب ہوتا ہے،
یہ سطح حجاب حاجز سے متصل ہوتی ہے،
احتشائی سطح :-

یہ سطح اشار سے متصل ہوتی ہے، اور اس میں مذکورہ بالا چاروں نشان پائے جاتے ہیں۔

نشان معدی :-

یہ نشان احتشائی سطح کے بالائی حصہ پر ہوتا ہے، یہاں طحال قاع المعدہ Base of Stomach سے ملتی ہوتی ہے، یہیں ناف الطحال Hilus بھی ہوتی ہے، اسی کے راستے طحال کے عروق و اعصاب طحال میں داخل ہوتے ہیں،
نشان بانقرا سی :-

اس مقام پر ناف الطحال Hilus کے نیچے دم بانقرا سی، طحال کے ساتھ ملتی ہوتی ہے، اس کو بانقرا سی رقبہ (Pancric Area) بھی کہتے ہیں،
نشان کلوی :-

اس کا رخ اندر، نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہاں طحال بائیں کلیہ کی اگلی سطح سے ملتی ہوتی ہے۔

نشان قولونی :-

یہ مثلث شکل کا ہوتا ہے اور کلوی نشان سے ایک ابھرے ہوئے خط کے ذریعہ علیحدہ رہتا ہے، یہاں طحال، قولون نازل (Descending Colon) کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔

کنارے :-

بالائی کنارہ :-

یہ حجابی سطح اور نشان موری کے درمیان ہوتا ہے، اس میں چند شے

(Notches) پائے جاتے ہیں، یہ کنارہ تیز دھاردار ہوتا ہے،

زیریں کنارہ۔

یہ حجابی سطح اور کھوی نشان کے درمیان حائل ہے، یہ کسی قدر دبیز ہوتا ہے، اندرونی کنارہ۔

اس میں ناف طحال (Hilum) پائی جاتی ہے۔

بیرونی کنارہ۔

یہ اضلاع سے متصل اور حجاب حاجز سے ملحق ہوتا ہے، یہ بھی دبیز ہوتا ہے، عصبی دموی پرورش۔

طحال کی دموی پرورش شریان طحال کے ذریعہ عصبی پرورش صغیرہ

نٹائی (_____) کے ذریعہ ہوتی ہے۔

طحال حالت مرض میں؛

طحال اگر معمولی طور پر بڑھی ہوئی ہو تو بائیں طرف کی زیریں چھ پسیلوں سے باہر ٹھونے پر آسانی محسوس کی جاسکتی ہے، اور بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں ناف سے آگے دائیں جانب، کوہے کے بالائی کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔

منافع؛

یہ خون کے سفید ذرات (کریات بیضاء) بناتی اور ان کو سرخ کرنے میں معاون ہے، اور خون کے سیاہ، ناکارہ اور تلچھٹ والے اجزاء کو جذب کر لیتی ہے، ہضم غذا میں بھی معاون ہے، بعض تحقیقات کے مطابق خون کا خزانہ ہے۔


سورمزاج طحال

ILL TEMPERAMENT OF SPLEEN

اس مرض میں جرم طحال میں کسی قسم کی عضوی خرابی ظاہر ہوئے بغیر، اس کے افعال میں متور اور خلل پیدا ہو جاتا ہے۔

اقسام ۱۔

سوز مزاج طحال



اسباب:

- (I) غلبہ کیفیات اربعہ
- (II) غلبہ اخلاط اربعہ

علامات:

سوز مزاج حار:

پیراس کا غلبہ ہوتا ہے، بایں پہلو میں سوزش ہوتی ہے، مقام اور پٹہ لیوں کے پھونے سے حرارت کا احساس ہوتا ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہی مائل زرد ہو جاتا ہے، براز اور بول کا رنگ سرخ، سیاہی مائل ہوتا ہے، نبض سرعت و بطور میں مختلف ہوتی ہے۔

۱۔ اس میں کیفیات اربعہ (حرارت، رطوبت، برودت، یبوست) میں سے صرف ایک کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔

۲۔ اس میں دو کیفیات (حرارت و رطوبت / برودت و رطوبت / حرارت و یبوست / برودت و یبوست) زیادہ ہو جاتی ہیں

۳۔ اس میں صرف کیفیات ہی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں، کوئی مادہ زیادہ نہیں ہوتا۔

۴۔ اس میں جسم میں اخلاط اربعہ میں سے کسی ایک خلط، یا ایک سے زیادہ اخلاط کے بڑھ جانے سے کیفیات میں کمی اضافہ ہو جاتا ہے۔

سور مزاج بارد :-

پریاس اور سوزش نہیں ہوتی، لمس سرد ہوتا ہے، ضعف ہضم کی شکایت ہوتی ہے، سقوط اشتہاء ہوتا ہے، ذکر میں آتی ہیں، لعل و زرق بھی ہوتا ہے۔

سور مزاج یا بس :-

جسم سیاہ اور لاغر ہو جاتا ہے، غم و خوف وغیرہ انفعالات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے، مقام طحال پر صلابت محسوس ہوتی ہے، قبض رہتا ہے اور بول میں رسوب نہیں ہوتا۔ سور مزاج رطب :-

مقام طحال پر لینت اور ثقل کا احساس ہوتا ہے، جسم میں استرخائی کیفیت ہوتی ہے، اور بحیثیت مجموعی جسم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، تاہم بول کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا، زبان کا رنگ سفیدی مائل سیدھے رنگ کی مانند ہوتا ہے، سور ہضم کی بھی شکایت ہوتی ہے، سور مزاج حار رطب / دسوی :-

بائیں پہلو میں ثقل محسوس ہوتا ہے، جسم میں کسی قدر ڈھیلہ پن ہوتا ہے، اور اس کا رنگ نیلگوں ہوتا ہے۔

سور مزاج حار یا بس / صفراوی :-

ہاتھ، پاؤں اور پٹلیاں گرم محسوس ہوتی ہیں، پریاس کا غلبہ ہوتا ہے، مقام طحال پر سوزش محسوس ہوتی ہے، پیشاب، بغیر رسوب کا، سرخ ہوتا ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے

سور مزاج بارد رطب / بلغمی :-

مقام طحال پر نرمی اور ثقل کا احساس ہوتا ہے، پریاس کم لگتی ہے، انگڑائیاں اور جھبائیاں آتی ہیں، بھوک زیادہ لگتی ہے، ہضم خراب ہوتا ہے، متلی کی شکایت ہوتی ہے، بول میں خلافت اور سفیدی پائی جاتی ہے،

سور مزاج بارد یا بس / سوداوی :-

مقام طحال پر صلابت اور ثقل کا احساس ہوتا ہے، پیشاب کسبزی یا سیاہی مائل آتا ہے — اور دوسری سوداوی علامات موجود ہوتی ہیں،

ملاحظہ رہے کہ سور مزاج مادی میں ثقل اور تغیر و فساد لون کے ساتھ

بعض اوقات مقام طحال پر درم، ثبور اور تھنج وغیرہ علامات موجود ہوتی ہیں۔

اصول علاج؛

- ۔ تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں
- ۔ فصد کھولیں
- ۔ تلہین و تنقیہ کا اصول اختیار کریں۔
- ۔ حسب ضرورت اخمدہ رکھیں

علاج؛

•۔ سور مزاج حار میں تعدیل مزاج کے لیے سکنجبین سادہ ۸۰ گرام، ہمراہ عرق کاسنی، عرق کدوہ ہر ایک ۸۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں، اور اگر حرارت زیادہ ہو تو شیر خرفہ ۹۰ ملی لیٹر، شامل کر کے نوش کرائیں۔
درج ذیل نسخہ بھی مفید تصور کیا گیا ہے۔
نسخہ :-

گل سرخ ۳ گرام، نیلوفر، تخم تربوز، تخم خرفہ، تخم خیار، ہر ایک ۵۰ گرام، اسقو لو قدرین، ریوند چینی، ہر ایک ۲۰ گرام، زعفران ۵۰ گرام، کافور ۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق بید سادہ اور عرق کاسنی میں گوندھ کر افراس تیار کریں اور ۳ گرام ہمراہ آب کاسنی سبز مروق و آب غلب الثعلب سبز مروق استعمال کرائیں۔
درج ذیل نسخہ بھی مفید و محرب ہے۔

نسخہ :-

طباشیر، ریوند چینی، بیج کبیر، ہر ایک ۵ گرام، عصارہ غافث، مصطلکی، منبل الطیب ہر ایک ۵۰ گرام، اصل السوسن مقشر ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر ریشم کے کپڑے میں چھان کر محفوظ کر لیں اور بوقت ضرورت ۵۰ گرام، ہمراہ سکنجبین سادہ ۸۰ گرام، استعمال کرائیں۔

•۔ سور مزاج بار دکی صورت میں سکنجبین بنوری اصولی ۸۰ گرام، ہمراہ

۶۰۰ بادیان عرق مشاہرہ ہر ایک ۸۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
نسخہ سکینین بزوری اصولی۔

بیج کرفس، بیج بادیان، بیج سوسن، تخم کرفس، بادیان، ایسٹن، تخم کشوٹ، تخم فہمکتہ،
تخم سداب، تخم سلیم، ہر ایک ۲۴ گرام، تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے ایک دن رات
سُکھا لیں۔ ۳۰ ملی لیٹر میں بھگو کر اور بقدر ضرورت آب تازہ لے کر جوش دیں، جب سیال نصف
رہ جائے نوصاف کر کے قند سفید اکلہ گرام ملا کر غربت کا قوام بنائیں۔ اور ۴۸ گرام ہمراہ عرق
شاہرہ ۶۰۰ بادیان بخوبیہ حل کر کے نوش کرائیں۔

سور مزاج بارہ بلغمی کی صورت میں یہ نفذ مفید ہے۔

نسخہ :-

بیج کبر، ستقو لو قندریون، اشتق، فلفل سیاہ، سداب، سنہ، زراوند، ساذج
ہندی، سنبل الطیب، ایرس، قند طر، تخم فہمکتہ، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر سرکہ آب برگ تباہ طر فایں گوندھ کر اقس بنائیں اور ۵۰۰ گرام استعمال
کرائیں۔

تتقیہ کے بعد درج ذیل نسخہ اقس میں مفید ہے۔

نسخہ :-

گل سرخ، ریوند چینی، سنبل الطیب، بیج کبر، الک مفصول، زرشک، ہم وزن۔
تمام دواؤں کو کوٹ کر سفوف بنائیں اور آب طافائے بے اہ اقس بنا کر حفظ کریں اور
ب ضرورت نقد ۳۰۵ گرام کھلائیں۔

درج ذیل ادویہ کا مقام طحال پر ضار دلائیں۔

نسخہ ضار :-

انجیر، قند طر، برگ سداب، ستقو لو قندریون، مغز بادام تلخ، پوست بیج کبر، شمر طر
تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر مقام طحال پر ضار دلائیں۔

• سور مزاج رطب کی صورت میں گل سرخ، ریوند چینی، سنبل الطیب،
الک مفصول، گل سرخ، زرشک، کوٹ کر آب طر فایں گوندھ کر اقس تیار کریں اور ہمراہ مار
مار العسل ۳۰۵ گرام استعمال کرائیں۔

• سور مزاج مادی سوداوی میں بائیں ہاتھ کی باسلیق یا اسلم کی فصہ کھولیں
اس کے بعد مطبوخ افیتمون سے نصف مادہ کریں،
اگر نصف بھی ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ :-

پوست ہلیدہ زرد، پوست ہلیدہ سیاہ، پوست ہلیدہ کالبی، پوست آملہ، ہر ایک ۲۲۵
گرام، اصل السوس نقشہ ۲۲۵ گرام، تربد موصوف و گرام، زنجبیل، ۱۳۵ گرام، خرقہ، دارچینی،
خیر بوا، شاجرہ، ہر ایک ۵۰ گرام، گل سرخ ۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر
دو گنا شہد ملا کر معجون بنائیں اور ۹ گرام کھلائیں،
ضما دے طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ضما د :-

پوست بیج کبر، سفوفو قندریون، فستین، ہر ایک، گرام، مرکبی، صبر سفوطری، ہر ایک
۵۰۰ گرام، تخم کرفس، نارشک، ہر ایک ۸۰۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر بھوک
کی حالت میں پھر کم سیری کی حالت میں مقام طحال پر ضما د کریں۔

ضعف طحال

WEAKNESS OF THE SPLEEN

اس مرض میں طحال کے قوائے اربعہ میں سے ایک، یا ایک سے زیادہ قوتوں میں ضعف
پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے متعلقہ افعال بخوبی انجام نہیں دے پاتیں جس کے نتیجے میں مرضی
علامات رونما ہوتی ہیں۔

اسباب :-

طحال کا سور مزاج حار / بارد

۱۔ قوائے اربعہ، قوت مجاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ، قوت دافعہ۔

(۱۱)	التهاب طحال
(۱۲)	زخم طحال
(۱۳)	اعتلاء طحال
(۱۴)	تلیف کبد
(۱۵)	سدہ باب کبد

علامات:

ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں جسم کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، بیاض چشم میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے، بطلان اشتہاء ہوتا ہے اور سودا، خون میں شامل ہو کر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور بہت سے امراض کا باعث ہوتا ہے۔

ضعف قوت ماسکیم کی صورت میں بیاض چشم میں تکدر کے ساتھ ساتھ سوداوی قے اور اسہال آتے ہیں اور دیگر سوداوی امراض ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔

ضعف قوت ہاضمہ کی صورت میں جوع البقر کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور بہت سے معوی و معدی امراض رونما ہو سکتے ہیں۔

ضعف قوت دافعہ کی صورت میں ورم طحال اور عظم طحال وغیرہ کے علاوہ ضعف قوت دافعہ کی اپنی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔

ان کے علاوہ مقام طحال پر تناؤ، بے حسی، اور کسی قدر درد بھی ہو سکتا ہے

اصول علاج:

- ۱۔ مقوی طحال ادویہ و اغذیہ استعمال کرائیں۔
- ۲۔ ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں ریاضت کی تاکید کریں۔
- ۳۔ مقام طحال پر کھردرے کپڑے سے ملیں۔
- ۴۔ بغیر پچھنے کی سنگھیاں کھینچیں۔
- ۵۔ مقوی ضاد لگائیں۔
- ۶۔ حسب ضرورت تنقیہ مواد کریں۔

.....ضعف قوت باضمہ کی صورت میں جوع البقر اور اسہال سوداوی کا اصول علاج اختیار کریں۔

ضعف قوت دافعہ کی صورت میں التهاب طحال اور عظم طحال کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج:

ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ:-

بچ کبیر، کندر، تخم کاسنی، ہر ایک اگرام، مرلی ہلبہ میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد شربت ہلیوں، شربت کاؤزبان ہر ایک ۲ ملی لیٹر، عرق شنبہ ۵، عرق کاسنی، عرق گاؤزبان ہر ایک ۶۰ ملی لیٹ۔ تمام سیال کو باہم ملا کر تخم بادر نجیویہ ۱ گرام، باہم ملا کر نوش کرائیں۔ ضعف قوت ماسکہ کی صورت میں سنقہ سوداء کے بعد یہ نسخہ مفید و مجرب۔

نسخہ :-

لا جرم مغسول، طباشیر، کل کزہ، ہر ایک انگرام، آلہ ربی ۲ عدد، ساقدہ ماگورق
نقرہ میں پیٹ کر رکھائیں، اس کے بعد شربت گذر، شربت کاؤزبان، ہر ایک ۲ ملی لیٹر کو
عق کاؤزبان ۴ ملی لیٹر میں مل کر کے تنعم شہتی، گرام چھک نوٹ کر لیں۔
..... برو دت اور رطوبت سے مارض ہونے والے متعدد سال میں درج ذیل
نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

لک مغسول، تخم ترب، فوہ: زنجبیل۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر سلجھیں
 بزوری میں ملا کر ورق نقرہ اعداد میں لپیٹ کر کھلائیں۔۔۔ اور اس کے بعد درج ذیل
 نسخہ مشروب استعمال کریں۔

لشخ مشروب :-

گل خافث ۵ گرام، پوست بجن کبر ۶ گرام، مویز منقہ ۹ دانہ، بادیان ۶ گرام۔
تمام دواؤں کو تازہ پانی میں جوش دیکر مل چھان کر سکنبہین بزوری میں حل کر کے نوش کر لیں۔

• درج ذیل ادویہ کا ضیاد بھی سودمند ہے۔

نسخہ ضیاد:-

مقل، سنبل الطیب، کزمازج، قردمانا، فقاح، اذخر، بیج کبیر، گل سرخ، ہموزن
تمام دواؤں کو کوٹ کر آب جھاؤ یا آب برگ سداب اور سرکہ میں ملا کر مقام طحال
پر ضیاد کریں۔

نسخہ ضمما:-

گل سرخ، تخم ترب، بکینج، رایتیانج، سنبل الطیب، ریگ کلخن، خاکستر پاچکدشتی
کو عرق گلاب خالص میں رگڑ کر سرکہ خالص ملائیں اور نیم گرم، مقام طحال پر ضیاد کریں۔

التهاب طحال

SPLENITIS


اس مرض میں طحال میں درم حار یا درم بارد (صلب) پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی
طبی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور امراضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض
نادر الوقوع ہے۔

اقسام:

غلبہ اخلاط کے اعتبار سے:-

التهاب طحال

Splenitis



اسباب:

۱. امراض صحامات القلب کے نتیجہ میں عروق طحالی میں انسداد
 ۲. تعفن الدم
 ۳. تقحج الدم
 ۴. حمی اجامیہ
 ۵. ضربہ و سقوطہ طحالی
 ۶. غلبہ اخلاط
 ۷. بعض متعدی امراض

علامات :-

دموی :-

مقام طحال کے ارد گرد، درد، گرائی اور تھمد کی شکایت ہوتی ہے اور طحال کے مقابل بیرونی حصہ کی جلد میں انتہائی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، سوزش اور پیاس ہوتی ہے جو چوتھے دن بخار میں شدت ہو کر کرتی ہے، بعض سرخ ہوتی ہے، پیشاب سیاہ، مائل بہ سرخی ہوتا ہے۔

صفراوی :-

گرائی اور تھمد دن بیکم ہوتا ہے، سوزش اور پیاس شدید ہوتی ہے طحال کی محاذی سطح پر ثبور پیدا ہو جاتے ہیں، بیرونی جلد پر بھی سوزش محسوس کی جا سکتی ہے، بخار ہوتا ہے جو تیسرے دن تیز ہو جاتا ہے، آنکھیں، زبان اور سارا جسم سیاہی مائل زرد ہو جاتا ہے۔

بلغمی :-

طحال بہت بڑھ جاتی ہے، درد میں خفت ہوتی ہے، زبان، آنکھیں، اور چہرہ سفیدی مائل ہوتا ہے، پپوٹوں پر تنہج ہوتا ہے، بول و براز سفید ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں، نبض بطی ہوتی ہے۔

سوداوی :-

شکم پھول جاتا ہے، طحال میں صلابت ہوتی ہے، وہ اپنے حدود سے باہر نکل آتی ہے، صلابت اور حدود سے باہر ہونے کی کیفیت، عمل بالجلس سے محسوس کی جاسکتی ہے، حجاب عاجز پر دباؤ پڑنے سے سانس منقطع چلتی ہے، غم و سوسہ زیادہ ہو تلب و ہوک بڑھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے شدید تکلیف ہوتی ہے، سورہم کی شکایت ہوتی ہے دست آتے ہیں، عروق سبائی کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، ہیم سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جس قدر طحال بڑھتی جاتی ہے، لاغری میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، پیشاب کا قوام اور رنگ معتدل ہوتا ہے، لیکن محنت و مشقت کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، تمہارے نوبت کے ساتھ اور بعض اوقات بغیر نوبت کے ہوتا ہے۔

اصول علاج :-

- _____ فصد کھولیں
- _____ منضجات استعمال کرائیں
- _____ تبرید کریں
- _____ مسہلات دیں

علاج :-

نفع مادہ کے لیے مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع :-

گل بنفشہ، بادریان، بنفشہ کاسنی، ہر ایک، گرام، کاؤ زبان ۵ گرام،
 مویز منقی ۹ دانہ، انجیر زرد ۵ عدد، تمام دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں
 اور صبح کو ٹل پھان کر خیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
 نفع مادہ کے بعد درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل :-

ہلبہ زرد ۲۴ گرام، تخم کشوث، عنب الثعلب، تخم کشوث، کشنیز،

مغز فلوس خیار شبنہ و گرام، گل خطمی، تخم خطمی، آرد جو، ہر ایک ۶ گرام، ——— تاکا
دواؤں کو آب نکوہ سبز میں پیس کر مقام طحال پر ضما د کریں۔
• غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں با سلیق یا اسلیم کی فصد کھولیں،
• مفتوح کے طور پر سکنجبین بزدوری استعمال کرائیں۔
• مسہل کے طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ مسہل :-

ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ کابی، ہر ایک .۱ گرام، نربد، گل سرخ ہر ایک ۵۲ گرام
تخم کشوٹ، انیسون، افستین، بادیان، ہر ایک ۵۲ گرام، حجرارمنی ۳ گرام، کاسنی ۴ گرام،
ریوند چینی ۹ گرام، افستیمون ۲۴۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر، گرام،
ہمراہ شربت بزوری نوش کرائیں۔۔۔۔۔ اوپر سے مارالجبب ۵، املی لیٹر نوش کرائیں۔
•۔۔۔۔۔ سہاگہ بریاں، صبرزرد، ہموزن۔۔۔۔۔ دونوں دواؤں کو مغز گھیکوار
میں سحق کریں اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور رات میں سوئے وقت ۲، گولیاں کھلائیں۔
•۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ کو بطور لیب استعمال کریں۔

نسخہ :-

اشق ۱۲ گرام، کوسرکہ ۲۲ ملی لیٹر میں جوش دیکر گلا لیں، اس کے بعد سداب، پودینہ خشک ہر ایک ۶ گرام، _____ دونوں دواؤں کو عرق کموہ سبز مرق میں پیس کر روغن گل ۶ ملی لیٹر ملا کر مقام طحال پر لیپ کریں۔

• _____ غلبہ خلط بلغمی کی صورت میں نفع مادہ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

اصل السوس، مکوہ، رازیانچ کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں
۔ تلیپین کے بے مطبوخ ہلید استعمال کرائیں، اس میں تر بد اور غاریقون کا

شاہنترہ ہر ایک ۷ گرام، آلو بخارا ۹ دانہ، تمر ہندی ۶ گرام، ترنجبین ۶ گرام، مغز فلوس
خیارشبز ۸ گرام۔۔۔۔۔ آخری تینوں دواؤں کو عرق گلاب میں اور باقی دواؤں کو
عرق کاسنی میں بھگو کر لی چھان کر نوش کرائیں۔
تنقیہ کے بعد چند دنوں تک درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست ہلکے زرد، تنکار بریاں، زنجبیل، شیطرج ہندی، سبھی سفید، زیرہ سفید
نک لاهوری، ہم وزن،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر دو گنا قند
سیاہ کہنہ میں ملا کر خوب بنالیں اور حسب ضرورت ۳۔۔۔۔۔ ۴ گرام کھلائیں۔
• التهاب دموئی کی صورت میں ہاتھ کی باسلیق یا اسیلیم کی فصد کھولیں،
• فتاب، تخم کاسنی اور آلو بخارا کا نفورع نوش کرائیں۔
• نفع مادہ کے بعد مغز فلوس خیارشبز ۶ گرام، ہمراہ آب کاسنی،
آب مکوہ، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، شیر خشک ۱۰ ملی لیٹر، روغن بادام ۳ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
• تربید کے لیے بنفشہ ۷ گرام، گل سرخ ۵ گرام، پوست بچ کبر ۶ گرام
تمام دواؤں کو رات میں ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں اور صبح کو لی چھان کر ہمراہ قرص
طباشیر نوش کرائیں۔

• آرد جو، برگ کیز ماذج، گل سرخ، ہر ایک ۳ گرام، صندل سفید ۵ گرام
اقا قیام ۴ گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو آب مکوہ اور آب کشنیز بزمروقی اور سرکہ میں
پس کر مقام طحال پر ضا د کریں،

• علیہ خلط صفاوی کی صورت میں اولاً تخم کاسنی، تمر ہندی اور
آب مکوہ کا خیساندہ نوش کرائیں، اس کے بعد قرص طباشیر ملین ۵۰۰ گرام، سنگبین ۸۰۰
ملی لیٹر سے تلین کرائیں۔ تلین کے لیے درج ذیل نسخہ بھی مفید و مجرب ہے۔
نسخہ ملکین ۱۔

زر شک، تخم خرفہ، مغز تخم خیار، مغز تخم کدو، مغز تخم خربوزہ، ہر ایک ۱۰ گرام، صمغ
عربی ۵۰۰ گرام، گل سرخ ۷ گرام، صندل سفید، طباشیر ہر ایک ۸ گرام، تخم کاسنی ۱۰ گرام،
۔۔۔۔۔ زر شک کو عرق گلاب میں لی ہیں اور باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اسی

اضافہ ضرور کر لیں۔

- تلیپین کے بعد قرص زرشک یا قرص فوہ بہراہ سلکجنین بزروری استعمال کرائیں
- ضاد کے طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

انجیر زرد (سرکہ میں جوش شدہ) اعداد، سداب، بورہ ارمنی، الکلیل الملک، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر تھند خالص ۲۴ گرام، سرکہ ۱۲ ملی لیٹر ملا کر مقام طحال پر ضاد کریں۔

- پوست بلیلہ زرد، ۶ گرام، تربد سفید ۶۰ گرام، نمک سوخچہ، فلفل سیاہ ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر فوشادر ۶۰ گرام، سہاگہ ۴۸ گرام، شورہ قلمی ۵ گرام کا جوھر حاصل کریں اس میں ملائیں اور ۳ گرام بہراہ چھاچھ ترش نوش کرائیں۔
- سہاگہ بریاں ۱۲ گرام، مغز کربجہ ۹ گرام، خر مہرہ، افستین رومی، ہر ایک ۶ گرام، اشق ۳ گرام تمام دواؤں کو لعاب گھیکوار میں ایک پہر کھل کریں اور چنے کے بقدر اقراص بنالیں، صبح، شام ایک قرص بہراہ عرق جھاؤ استعمال کرائیں۔
- التهاب کے ساتھ اگر بخار بھی ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

- گل سرخ ۸ گرام، زرشک ۵ گرام، تخم خیارین، تخم خرفہ، ہر ایک ۶ گرام، ریوند چینی طباشیر، لاکھ مغسول، زعفران، کافور قبیوری، عصارہ افستین، مائیں، ایرس، سنبل الطیب ہر ایک ۵ گرام، عصارہ غافث ۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص بنائیں اور ۵ گرام اقراص بہراہ عرق کاسنی / عرق بادیان استعمال کرائیں۔
- درج ذیل نسخہ، التهاب طحال کی جملہ انواع میں مفید تصور کیا جاتا ہے۔

نسخہ ۳۔

- سم گادسیاہ سوختہ، باریک کر کے اگر ۲۱ گرام، بہراہ سلکجنین ۲۱ گرام، ۲۱ دن تک استعمال کرائیں۔

• درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے،

نسخہ ۴۔

زراوند مدحرج، تخم کشوث، افیتون، قنطوریون، ریوند چینی، سنبل الطیب، بجن کبر،
ہر ایک ۲ گرام، انیسون ۶ گرام، اہل ۸ گرام، _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر
لعاب تخم کنوچہ میں خیر کر کے، چنے کے بقدر حبوب بنائیں اور اسے حب صبح، شام ہمراہ
عرق جھاؤ استعمال کرائیں۔

صلابت طحال


HARDNESS OF THE SPLEEN

اس مرض میں طحال میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ صلابت طحال کے زیریں حصہ
میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ دراصل التهاب طحال کا دوسرا مرحلہ ہے

اقسام:

مقام درم کے لحاظ سے۔

صلابت طحال



اسباب:

۱۔ درم طحال کا صلابت کی طرف منتقل ہونا۔

علامات:

مقام طحال پر صلابت محسوس ہوتی ہے اور یہ مستدیر، عریض، طویل دقین یا طویل
غلیظ ہو سکتی ہے، حمی رنج یا حمی غیر منتظم ہو سکتا ہے، غذا لینے کے لیے شدید تکلیف ہوتی ہے،

سورہم کی شکایت ہوتی ہے، اسہال آسکتے ہیں، جسم کا رنگ مٹیالا یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے، گردن پتلی ہو جاتی ہے، ہتھیلیاں اور زانو گرم ہوتے ہیں، جسم میں ہزالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کثرت اشتہار ہوتی ہے، غم، حزن اور وسوسہ کا غلبہ ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سیاہ یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے، خلط علیظ کے امالہ کی وجہ سے پتہ لیوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، دانتوں اور مسوڑھوں میں تامل کی سی کیفیت ہوتی ہے، پیشاب عام طور سے طبعی رنگ ہوتا ہے لیکن ریاضت کے بعد سیاہ آتا ہے۔

اصول علاج :

- _____ عمل کئی کریں
- _____ محلات استعمال کرائیں
- _____ حسب ضرورت قصد کھولیں
- _____ ملین ادویہ دیں۔
- _____ نفخ مالدہ کی تدابیر اختیار کریں۔

علاج :

- _____ صلابت طحال میں درج ذیل نسخہ جات مفید اور مجرب ہے۔

نسخہ :-

عرق حلیتیت ۱۲۵ ملی گرام، کوپانی میں ملا کر نوش کرائیں اور رفتہ رفتہ حلیتیت کی مقدار ۵۰۰ ملی گرام تک پہنچا دیں۔

نسخہ :-

نوشادر، شورہ قلمی، ہباگہ، فلفل سیاہ، ہموزن _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر چھان لیں، برگ گھیکوار مقشر کے انگلی کی طرح باریک مکڑے بنالیں اور اس سفوف میں پھر لیں، پہلے دن ایک مکڑا، دوسرے دن دو مکڑے اور تیسرے دن تین مکڑے کھلائیں۔

نسخہ :-

فلفل سیاہ، فلفل دراز، زردچوب، جواکھار، زنجبیل، چترہ، کیلہ ہم وزن۔

سہاگہ بریاں ۱۲ گرام، خردل ۶ گرام، دونوں دواؤں کو باریک پیس کر انگرام ہمراہ
آب تازہ کھلائیں۔
نسخہ :-

ایر ساہ گرام، فلفل سفید، سنبل الطیب، ناشق، ہر ایک ۵۲ گرام، سرکہ دو گنا
تمام دواؤں کو سرکہ میں کھل کر کے گولیاں بنائیں اور ۵۲ گرام ہمراہ سکجبین
بزوری استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زونا خشک، پوست بچ کبر، غلبہ الشعلب، پرسیاوشاں، تخم فنجکشت، تخم سداب،
ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوث چھان کر محفوظ کر لیں اور ہگراں، ہمراہ عرق پودینہ
استعمال کرائیں۔
نصفہ۔

صبر زرد، سہاگہ بریاں، ہم وزن، قند سیاہ دو گنا، — تمام دواؤں کی حسب دستور چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور شام کو غزالینے کے ایک گھنٹہ بعد کھلائیں، اس کے ساتھ درج ذیل شربت لیں تو مزید سود مند ہے۔

نسخہ مشروب :-

بادیان، بیج بادیان، کاسنی، بیج کاسنی، کرفس، بیج کرفس، ہرایک ۶۰ گرام، بیج کبیر
۲۲ گرام، البتیمون ۶۲ گرام، بنات سفید ۱ کلو، حسب دستور شربت بنائیں۔

گل سرخ، پوست بزم کبر، ریوند چینی، سنبل الطیب، الک مفصول، زرشک، ہم وزن
 تمام دواؤں کو پیس کر آب طرفا کے ساتھ قرص بنائیں اور ۳ گرام کھلائیں۔
 • موسم گرما ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ ۲

شیرہ عنب الثعلب ۴ ملی لیٹر، شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم خیارین، ہر ایک ۶ ملی لیٹر، شیرہ
بادیان ۴ ملی لیٹر، سکنجبین سادہ ۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔
اس موسم میں درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

تخم پنچکنت ۳ گرام، تخم خیارین کوفتہ ہر ایک ۶ گرام، بادیان ۴ گرام، مویز منقہ، ادا،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر بنات سفید ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
درج ذیل خارجی ندایر بھی سودمند ہیں۔

غلبہ خون کی صورت میں ہاتھ کے باسلیق یا رسیلم کی فصہ کھولیں۔

درج ذیل نسخہ ضما د استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د۔

مقل ۲ گرام، بورہ ارمنی، نمک ہندی، اشق، ہر ایک ۴ گرام، اشہ، کنز مازج
ہر ایک ۲ گرام، انجیر ۱۰ عدد، انجیر کو سرکہ میں پکالیں اور اشہ اور اشق کو بھی اس میں
ملائم کر لیں، پھر باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ملا لیں اور مقام طحال پر ضما د
کریں۔

نسخہ ضما د۔

صبر، مغز فلوس خیار شبنم، ریوند چینی، نمک ہندی، مکوہ خشک، ہر ایک ۳ گرام،
انجیر خشک جملہ دواؤں کے ہم وزن، تمام دواؤں کو تیز سرکہ میں پیس کر ایک کپڑے میں
لگا کر مقام طحال پر ضما د کریں،

دائیں ہاتھ کی رسیلم پر کپڑے یا کاغذ کی تہی سے داغ دیں اور اسے کچھ دنوں

تک تازہ رکھیں اور رسنے دیں۔ مفید ہے۔

نسخہ طحال

اس مرض میں جو صر طحال میں اچھا رہ کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے،

اسباب:

- (i) طحال کی قوت دافعه و باضہ کا ضعف
- (ii) طبع یا کی سمیت
- (iii) محنت و مشقت کی زیادتی
- (iv) کثرت تفکرات و زردیات

علامات:

_____ بائیں پہلو کے نیچے تمدد اور نرم درم ہوتا ہے، جو دبانے سے دب جاتا ہے، بعض اوقات دباتے وقت قراقر کی آواز بھی آتی ہے، ڈکاریں بکثرت آتی ہیں، مقام طحال پر ثقل نہیں ہوتا، _____ بعض اطباء کا خیال ہے کہ اس مرض میں طحال، غد ملعاؤ اور کبد بڑھ جاتے ہیں، خون میں پھیلاؤ اور رقت پیدا ہو جاتی ہے، سورہ منہم کی شکایت ہوتی ہے اور چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔

اصول علاج:

- _____ کا سرریاح اور مقوی طحال ادویہ استعمال کرائیں۔
- _____ مقام طحال پر مناسب لیپ کریں۔
- _____ مجمرہ ناری لگائیں۔

علاج:

- _____ مار الاصول، گلقتد، شربت دینار اور عرق بادیان وغیرہ نوش کرائیں۔
- _____ برودت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

ہیلہ زرد، ہیلہ سیاہ، ہیلہ کابل، آملہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۵۲۲ گرام،
ترید موصوف، شاہترہ، قرفہ، دارچینی، خیربوا، ہر ایک ۹ گرام، زنجبیل ۱۳۵ گرام،

فل سرخ ۳۱ گرام، شہدہ تمام دواؤں کا دو گنا — حسب دستور معجون بنائیں اور ۹ گرام استعمال کرائیں۔

• نفثہ طحال کے ساتھ اگر حرارت بھی ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

فیثکشت، کزما زج ہر ایک ۳۵ گرام، تخم کاسنی، تخم خرفہ ہر ایک ۱۳۵ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سکجین کے ساتھ اقراص بنائیں اور حسب ضرورت استعمال کرائیں۔
• اگر حرارت نہ ہو تو درج ذیل نسخہ دیں۔

نسخہ ۲۔

تخم گندنا، زیرہ مدبر بہ سرکہ، مصطکی، تخم کناں، ہلیہ، ہر ایک ۵ ر۔ ۱۰ گرام، ریوند ۱ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۱ گرام ہمراہ سکجین کھلائیں۔

• یہ نسخہ بھی نفثہ طحال میں مفید ہے۔

نسخہ ۳۔

دارچینی، زنجبیل، زیرہ سیاہ، برگ سداب، فلفل سیاہ، پودینہ خشک، پپل خرو، خردل، نمک سانہر، نمک سبھی گلابی، جواکھار کچلو، ہموزن — تمام دواؤں کو کوٹ کر سفوف بنائیں اور ۱-۳ گرام ہمراہ سکجین سادہ ۱۲ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
• یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۴۔

شورہ قلمی ۵ گرام، کاہی زرد ۳ گرام، شب یمانی ۲ گرام، نوشادر، نمک سنگ، نمک سانہر، نمک سوخچر، جواکھار، سہاگ، کف دریا، ہر ایک ۱ گرام — تمام دواؤں کا نصف حصہ لے کر عرق / روح کشید کریں پھر اس عرق / روح میں باقی نصف دوائیں ڈال کر دوبارہ عرق / روح کشید کریں، پھر اس میں مغز کرنجہ، حلیت بریاں ہر ایک ۲ گرام ڈالیں اور اس قدر کھل کریں کہ سارا عرق ان دواؤں میں جذب ہو جائے۔
اس کے بعد چھنے کے برابر گولیاں بنالیں اور ایک گولی ہمراہ سرکہ یا عرق لیموں کھلائیں۔

•۔ مقامی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں
نسخہ ۱۔

سبوس گندم ، گاؤرس اور نمک کی ٹکڑیاں کریں۔

نسخہ ۲۔
اشق کو سرکہ میں حل کر کے مقام طحال پر لپیٹ کریں۔

تفج طحال

SUPPURATION IN THE SPLEEN

اس مرض میں التهاب کے نتیجہ میں طحال میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے اور مرضی عوارض رونما ہوتے ہیں۔ یہ مرض نادر الوقوع ہے۔

اسباب:

- ۱۔ عروق طحالیہ میں انسداد
- ۲۔ تفج الدم
- ۳۔ حمیات عفونہ
- ۴۔ ضربہ و سقطہ طحالی
- ۵۔ حمی اجامیہ
- ۶۔ التهاب طحال کا ثانوی نتیجہ

علامات:

لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے ، طحال متورم محسوس ہوتی ہے جس میں پیپ کا توجہ ہوتا ہے۔ امتحان بالجس سے اس توجہ کو باسانی محسوس کیا جاسکتا ہے ، لاغری اور ضعف کے ساتھ طحال میں شدید درد اور جھنجھوتی ہے ، پیاس لگتی ہے ، پیشاب سیاہی مائل ہوتا ہے ، اس میں نکلر اور تلچٹ دکھائی دیتی ہے ، بو بھی غیر طبعی ہوتی ہے ، بعض اوقات

تے میں بھی پیپ خارج ہوتی ہے، پھوڑا پھوٹنے کی شکل میں پیپ بلم کے ساتھ خارج ہوتی ہے،
تولون میں پہنچ جانے کی صورت میں براز کے ہمراہ خارج ہوتی ہے، صفاق میں پھوٹ پڑنے کی
صورت میں، عواقب شدید ہوتے ہیں۔

اصول علاج :

- دہلیز کبد کا اصول علاج اختیار کریں،
- حسب ضرورت کئی کریں، ورم صلب مزمن میں یہ عمل ضروری ہو جاتا ہے۔

علاج :

- مارا العسل نوش کرائیں۔
- بادیان، تخم خیارین، تخم کاسنی، ہر ایک، گرام، تخم کشوث ۵ گرام، شبید
خالص ۸ ملی لیٹر، سب کو جوش دے کر مل چھان کر صبح، شام نوش کرائیں۔
- مردقین، ہمراہ شربت بزوری نوش کرائیں۔
- عروق بادیان، عرق تخم کاسنی، آب تخم کاسنی، آب تخم خیار، اونٹنی یا گدھی
کے دودھ کے ساتھ نوش کرائیں۔
- سرکہ میں جوش دی ہوئی بھوسی ہمراہ 'اشق' مقام طحال پر ضا د کریں۔
- ضا د جالینوس لگائیں، نسخہ درج ذیل ہے۔

نسخہ ضا د جالینوس :-

زنجبیل، جاؤ شیر ہر ایک ۶ گرام، صبر زرد، گندہ بہروزہ، ملک الالبنا، ہر ایک
۱۰۸ گرام، موم ۹۰ گرام، روغن سوسن ۱۱۰ ملی لیٹر، تمام دواؤں کا حسب دستور روغن
تیار کر کے محفوظ کر لیں اور گرم کر کے لگائیں۔

- تعیج کے باوجود اگر صلابت باقی ہو تو نخالہ کو سرکہ میں جوش دیکر اس میں
اشق ڈالیں اور مقام طحال پر لپیپ کریں۔ اس کے بعد عرق کبریت ۱۲۵ ملی لیٹر، پانی میں
ملا کر نوش کرائیں۔ اور رفتہ رفتہ عرق کبریت کی مقدار ۵۰۰ ملی لیٹر تک پہنچا دیں۔
- نوشادر، شورہ قلمی، سہاگہ، فلفل سیاہ، ہم وزن تمام

دواؤں کو باریک کوٹ کر چھان لیں اور برگ گھیکوار مقشہ کے باریک ٹکڑے بنالیں اور اس سفوف میں پھرائیں اور روزانہ ایک ٹکڑا کھلائیں۔

• حرارت کی صورت میں زنجبیل، سہاگر بریاں، سینہ هانگ، حلتیت ہم وزن، تمام دواؤں کو پیس کر شیرہ بنج سہا بنجہ (سیرجنہ) کے ہمراہ جنگلی بیر کے برابر خوب بنائیں اور ۱۱، حب صبح، شام کھلائیں۔
• درد کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں نسخہ:-

پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ سیاہ، پوست ہلیہ کابل، ہر ایک ۶۵ گرام، اصل اسوس مقشہ ۲۲۵ گرام، تربد سفید ۹ گرام، زنجبیل ۵۳۵ گرام، خرفہ، دارچین، خیربوا، نشاترہ ہر ایک ۵۰ گرام، گل سرخ ۳۲ گرام، تمام دواؤں کو حسب دستور ٹہمد کے ساتھ معجون بنائیں اور ۶ گرام کھلائیں۔
• درم کو پھوڑنے اور تحلیل کرنے کے لیے درج ذیل نسخہ مفید ہے۔ نسخہ:-

نفل سیاہ، نفل دراز، ہلدی، جواکھار، چترہ، کیلہ، بموزن تمام دواؤں کو پیس کر شیرہ گھیکوار کے ساتھ جنگلی بیر کے بقدر گولیاں بنائیں اور صبح، شام ۱-۱ گولی کھلائیں۔

امتلاء طحال

CONGESTION OF THE SPLEEN

اس مرض میں عروق طحالی میں خلل معنادر زیادہ خون جمع ہوتا ہے جس سے اس میں امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب:

حمیات:-

- (۱۲) حمی معمولیہ
(۱۳) حمی نفاسیہ
(۱۴) حمی اجامیہ
(۱۵) سرخبادہ
متفرقات :-

- (۱۶) احتباس طمث
(۱۷) ورید باب الکبد پردباؤ
(۱۸) تقيج الدم
(۱۹) قلب، ریم، کلیہ اور بلب کے بعض امراض یا ان کے افعال میں معمولی نقص
(۲۰) التهاب کبد

علامات :-

طحال کسی قدر بڑھ جاتی ہے، بائیں طرف پسلیوں کے نیچے ٹٹولنے سے محسوس کی جاسکتی ہے، کنارہ کھندانہ دار ہوتا ہے، اور تنفس کے ساتھ اس کی حرکت محسوس کی جاسکتی ہے، اس میں شدید درد اور چھن ہوتی ہے، دہانے سے درز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں رسوب ہوتا ہے۔ اور اس سے بدبو آتی ہے، اجتماع خون کی حالت میں معمولی اسباب سے طحال پھٹ جاتی ہے، جس سے مہلک جریان خون واقع ہوتا ہے اور مریض ہلاک ہو سکتا ہے بصورت دیگر التهاب طحال ہو کر عظم الطحال ہو جاتا ہے، یا صلابت آ جاتی ہے۔

اصول علاج :-

- رفع قبض نذایر اختیار کریں
- خون مغناد کے جریان کی نذایر کریں
- فصد کھولیں
- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں

نسخہ


نسخہ

نسخہ حب الشفار :-

عظیم طحال

اس مرض میں طحال کے حجم اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بائیں جانب پسلیوں کے

کنارے پر ٹوٹنے سے محسوس کی جاسکتی ہے



اسباب:

امراض طحال:-

۱. طحال کا ورم فلفیونی
۲. طحال کی ساخت میں نقص
۳. یرقان طحالی
۴. امتلاء طحال
۵. ضرب و سقط طحال
۶. قلت دم طحال

امراض کبد:-

۱. تصلب کبد
۲. ورید باب الکبد کا سدھ دموی،
۳. ورید باب الکبد پر دباؤ
۴. تلیف کبد

حاد، متعدی امراض:-

۱. حمی اہامیہ
۲. حمی تیغودیہ
۳. حمی نکسیہ
۴. کالازار

حمی عفنه (۱۰)

جدری (۱۱)

حصبہ (۱۲)

حمرہ (۱۳)

حمی دقہ (۱۴)

حمی عرقہ (۱۵)

امراض دمویہ :-

نقص الدم (۱۶)

ابیاض الدم (۱۷)

فقر الدم (۱۸)

آتشک (۱۹)

متفرقات :-

التهاب بطانة قلب (۲۰)

ذات الریه (۲۱)

خناق (۲۲)

وجع المفاصل (۲۳)

سدة عروقی (۲۴)

حمل (۲۵)

کساح (۲۶)

مرض باکتر (۲۷)

علامات :

حاد :-

حمی تیغودیہ کی صورت میں طحال نرم ہوتی ہے، اس لئے امتحان کے وقت ابھی طرح محسوس نہیں ہوتی، صرف مزاحمت کی زیادتی سے شناخت ہو سکتی ہے، حمی تیغودیہ کی دوسری

مخصوص علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ حمی نگیہ کی صورت میں طحال کافی بڑی ہوتی ہے، لرزہ سے بخار آتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، جسم کا درجہ حرارت ایک سیک ۱۰.۵ ہو جاتا ہے ۶-، دن بعد بحران ہو کر اتر جاتا ہے، ۷-، دن بعد مرض کا حملہ دوبارہ ہوتا ہے، نبض سریع اور پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے۔ حمی اجامیہ مزمن میں، حمی اجامیہ کی روداد ملتی ہے حمی عفنہ، ذات الریہ اور خناق کی صورت میں عظم الطال کے ساتھ ان امراض کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں،۔۔۔۔۔ مذبذبتہ و سقطہ کی صورت میں طحال پھٹ جاتی ہے، تاہم اس کا خلاف نہیں پختنا، اور نہ ہی جلد پر کوئی خاص نشان ہوتا ہے، خلاف الطال کے اندر ہی، جریان خون کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے اور طحال بڑھ جاتی ہے۔

مزمن ۱-

مقام طحال پر تناؤ، بے حسی اور کسی قدر درد ہوتا ہے، دبانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، طحال بڑھ کر بعض اوقات تمام شکم کو گھیر لیتی ہے، جسم سیاہی مائل ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق، پھیکا، منہ اور سوڑھے کی فشار مخاطی بھی پھسکی ہو جاتی ہے، بیاض چشم میں ٹکدر پیدا ہوتا ہے، سوز، ہضم اور ضعف اشتہار ہوتا ہے، قے اور براز میں سیاہی مائل مادہ خارج ہوتا ہے جس میں عفونت بھی ہوتی ہے، لاغری اور ضعف ہوتا ہے، معمولی نقل و حرکت سے تنگی نفس کی شکایت ہوتی ہے۔ پیوٹوں اور پیروں میں تھج ہوتا ہے۔

دم امیض طحالی میں طحال سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور غلیات امیض پچاس ہزار سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ قلت الدم طحالی کی صورت میں طحال آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور خون میں غلیات امیض کی مقدار کم ہو جاتی ہے، طبیعت کا رجحان جریان الدم کی طرف ہوتا ہے، تعلق الکبد کی صورت میں مرض کے انتہائی زمانہ میں طحال بڑھتی ہے، ساتھ میں قے الدم، استفاد زنی اور یرقان بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بعض اوقات استفاد الحمی ہوتا ہے، رعاف، مسوڑھوں سے جریان ہونا ہے، اخراج خون سے اکثر جسم پر دبے پڑ جاتے ہیں۔

اصول علاج :

•۔۔۔۔۔ غلظت الکبد کا اصول علاج اختیار کریں

•۔۔۔ ابتدائی ایام میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

_____ شام کو بادیان، مکوہ خشک ہر ایک ۵ گرام، مویز منی ۹ عدد، عرق مکوہ، عرق بادیان ہر ایک ۶ ملی لیٹر میں ہیں چھان کر خیرہ بنفشہ ۸ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

•۔ بارد المزاج لوگوں میں صبر زرد، سہاگہ تبلیسہ بریان، ہموزن، آب کنوار سے صلابہ کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور روزانہ دو گولیاں ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں

•۔ صبر ۶ اگر گرام، فلفل ۱۲ اگر گرام، بزرالبنج ۵۲ گرام، سہاگہ بریاں ۳ گرام،

•۔ پوست ہلید زرد، پوست بلبلیہ، زیرہ سفید، نمک سوچر، سہاگہ، بادیان، ہیل کلاں، شیرخشت، گل سرخ، ریوند خطائی، ترنجبین ہر ایک ۱۲ گرام، سنار کی ۲۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان، کر شہد ملا کر ۱۹ عدد اقراص بنائیں اور نہار منہ ہمراہ آب تازہ ایک قرص کھلائیں۔

۵۱۔ عرق لیموں کا غذی، عرق لہسن، عرق ادرک، عرق ترب ہر ایک ۱، ۱

می لیٹر، نیلا تو تیا ہ گرام، تمام دواؤں کو سیاہ رنگ کی بوتل میں ڈال کر ۴۰ دن

دھوپ اور شبنم میں رکھیں، — اس کے بعد نوشادر اگر ام کھلانے کے بعد اس بوتلی میں رکھا ہو اسیاں ۳ ملی لیٹر، چاندی کے چمچے سے نوش کرائیں، پھر بھنا ہوا چنا ۳۶ گرام کھلائیں۔
•۔۔۔ ابتدائی دنوں میں اس دوا سے تے ہوگی، پھر اسہال ہوں گے، ۲۱۔۲۰ دن میں شفا یابی ہو جائے گی۔

سہاگہ چوکیا مہبر ہر ایک ۱۲ گرام — دونوں دواؤں کو پس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور رات میں ۲ گولیاں ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔
•۔۔۔ خردل، جواکھار، شورہ قلمی، سہاگہ بریاں، نوشادر، سبکی سفید، شونیز، نمک لاہوری، نمک چوڑی، نمک ترب، ہم وزن — تمام دواؤں کا سفوف بنائیں، اور صبح، شام اگر ام کھلائیں۔
•۔۔۔ تخم خرفہ، گرام، سرکہ ۱۲ ملی لیٹر، میں تھوڑا سا پانی ملا کر کھلائیں۔
•۔۔۔ کندش ۵۰۰ ملی گرام ہمراہ قند سیاہ کھلائیں، اس میں آب ترب کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

•۔۔۔ انجیر، سرکہ میں بھگو کر کھلائیں۔
•۔۔۔ مادہ پیچ پذیر ہو چکا ہو تو درج ذیل نسخہ مہبل استعمال کرائیں۔
نسخہ مہبل۔

•۔۔۔ ہلیہ زرد ۲۴ گرام، تخم کاسنی، تخم کشوث، عنب الثعلب، شاہترہ کشیز، ہر ایک ۷ گرام، تمر ہندی ۳۶ گرام، آلو بخارا ۹ عدد، ترنجبین ۶۰ گرام، مغز فلوس خیار شبنر ۴۸ گرام، تمر ہندی، ترنجبین، مغز فلوس خیار شبنر کو عرق گلاب میں اور باقی دواؤں کو عرق کاسنی میں بھگو دیں اور صبح کو کل چھان کر نوش کرائیں۔ اور تنقیہ کے بعد چند دنوں تک درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

زرشک، تخم خیار، مغز کدو، مغز خربزہ، تخم خرفہ، ہر ایک ۱۱ گرام، صغ عربی ۴ گرام گل سرخ، گرام، طبابشیر، صندل سفید ہر ایک ۲ گرام، تخم کاسنی ۱۲ گرام، زرشک کو عرق گلاب اور سرکہ میں سخت کریں اور باقی دواؤں کو پس کر سفوف بنائیں پھر ان کی خوراک بنائیں اور روزانہ خوراک ہمراہ آب کاسنی و سکنجبین بزوری استعمال کرائیں۔

•۔ مقامی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عنب الثعلب ۱۲ گرام، آرد جو، گل بابونہ، اکیلل الملک، سنبل الطیب، ہر ایک ۶ گرام، مغز فلوس خیار شبنم ۹ گرام۔ تمام دواؤں کو عرق عنب الثعلب میں پیس کر مقامی طور پر ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

اشق ۳ گرام، صمغ عربی، کتیرا ایک ۵ گرام، زراوند مدحرج ۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ انگوری ۵ ملی لیٹر میں اس قدر کھل کر پیس کر لیس پیدا ہو جائے اس کے بعد ایک کپڑے پر یہ لیس چھڑ کر نیم گرم کر کے مقامی طور پر چپکا دیں، صحت یابی کے ساتھ ساتھ کپڑا، چھوڑتا جائے گا۔

نسخہ ۳۔

مکور، تخم خطمی، تخم خرفہ، اقاقیا، ریوند چینی، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر مقامی طور پر لگائیں۔

نسخہ ۴۔

مقل، بورہ ارمنی، اشق، نمک ہندی، ہر ایک ۵ گرام، برگ سداب ۴ گرام، مائیں خورد، ناشنہ ہر ایک ۱۰ گرام، کبریت ۵ گرام، انجیر زرد، ۵ عدد، انجیر کو سرکہ میں جوش دیں اور مقل و اشق کو اس میں لگائیں، اس کے بعد باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر اب تمام دواؤں کو ملا کر اور لپیپ کریں۔

نسخہ ۵۔

برگ سداب ۱۰ گرام، اشق، گرام، پودینہ خشک، بورہ ارمنی ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو سرکہ خالص ۲۴ ملی لیٹر میں پیس کر گرم گرم ضا د کریں۔

نسخہ ۶۔

زعفران ۲ گرام، چوب انگور خاکستر، چوب جھاؤ خاکستر، ہر ایک ۱۲ گرام، صبر زرد، بابونہ، اشق، مکوہ خشک، اکیلل الملک ہر ایک ۶ گرام، سرکہ خالص ۳۶ ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو حسب دستور ملا کر نیم گرم کر کے مقامی طور پر لپیپ کریں۔

سدہ طحال

OBSTRUCTION OF THE SPLEEN

اس مرض میں طحال اور کبد یا طحال اور فم معدہ کے درمیان واقع مجری میں سدہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب:

- درم طحال
- غلیظ فضلات کا اجتماع
- ریاح سوداوی کا احتباس
- اخلاط البعہ کی غفلت

علامات:

مقام طحال پر ثقل اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، بھوک یک بیک یا رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے، اور عام طور سے یرقان اسود ہو جاتا ہے، تشخیصی نقطہ نظر سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ دفعتاً بطلان اشتہار اس بات کی علامت ہے کہ سدہ، طحال اور فم معدہ کے درمیانی مجری میں ہے، اس کے برخلاف اگر بطلان اشتہار رفتہ رفتہ ہوا ہو تو یہ سدہ کے، طحال اور کبد کے درمیانی مجری میں ہونے کی علامت ہے، اس میں یرقان اسود بھی ہوتا ہے، اگر سدہ کے ساتھ ورمی علامات بھی ہوں تو ”سدہ ورمی“ اور اگر تھمد ہو تو ”سدہ ریچی“، اور ورم کے بغیر ثقل ہو تو یہ ”سدہ خلطی“ کی علامت ہے۔

اصول علاج:

- حسب ضرورت فصد کھولیں
- مفتحات و کاسرات استعمال کرائیں۔

•۔۔۔۔۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج:

•۔۔۔۔۔ اگر سودا آمیز خون کی وجہ سے سدا ہوا ہو تو باسلیق اور اسلم کی فصد کھولیں،
 •۔۔۔۔۔ بلغی اور سوداوی سدا کی صورت میں بادیان، نانخواہ، غلب الثعلب اور
 انیسون ہر ایک ۵۳ گرام کا جوشاندہ نوش کرائیں۔۔۔۔۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔
 نسخہ:-

•۔۔۔۔۔ قنطاریون دقیق، اصل السوس، وح،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر
 شہد ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور شربت دینار کے ساتھ کھلائیں۔
 •۔۔۔۔۔ مقام طحال پر پچھند لگائیں۔۔۔۔۔ دھک کریں۔
 •۔۔۔۔۔ مار الاصول نوش کرائیں۔

تخم سداب، نانخواہ، ہر ایک ۵۳ گرام کو پانی میں جوش دیں اور سکبجین
 حسب ضرورت ملا کر نوش کرائیں۔

•۔۔۔۔۔ تخم فنجکشت، تخم کرفس، سداب، ہر ایک ۴ گرام، فوہ، بادیان، بچ کاسنی،
 تخم قرطم، غلب الثعلب ہر ایک ۹ گرام، بچ کرفس، پرسیاوشاں ہر ایک ۲ گرام،۔۔۔۔۔ تمام
 دواؤں کو پانی میں جوش دے کر گھنڈہ علی ۸۴ گرام، سکبجین منفصلی ۴۲ گرام، حل کر کے نوش
 کرائیں۔۔۔۔۔ ۸ دن بعد حب ریوند، حیار شبنز اور شربت دینار سے تنقیہ
 کریں،

•۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ اعلیٰ درجہ کا مفتح ہے۔
 نسخہ مفتح:-

•۔۔۔۔۔ تخم کاسنی، کنماذج، ہر ایک ۵۳ گرام، تخم فنجکشت ۵۳ گرام،۔۔۔۔۔ تمام
 دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵۳ گرام، ہراہ سکبجین بزدوری استعمال کرائیں۔
 •۔۔۔۔۔ یہ نسخہ قرص بھی مفید ہے۔

کندر، ریوند چینی، انیسون، تخم کرفس، سنبل الطیب، مصطکی، اذخر، مر، فوہ، نانخواہ،
 قسط، ابہل، جنطیانا، افستین، اسارون، عصارہ خافث، ہر ایک ۵۳ گرام، قفل سیاہ،

زنجبیل ۵ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ کر حسب دستور اقراص بنائیں اور ۵/۳ گرام، ہمراہ
جوشاندہ ترمس ۵، ملی لیٹر کے ساتھ کھلائیں،
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۰۔

پرسیا و شاں، پوست بچ کبر، تخم سداب، تخم فنجکشت، زوفا، ہر ایک ۲ گرام —
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور ہمراہ شربت بزوری نوش کرائیں — یہ ایک خوراک ہے،
درج ذیل نسخہ اقراص مجرب ہے۔

نسخہ ترمس کبر۔

زراوند طویل، گرام، پوست بچ کبر، اشق، ہر ایک ۴ گرام، تخم سنہالو، فلفل سیاہ،
ہر ایک ۴ گرام، — اشق کو سرکہ کہنہ میں حل کریں اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر اس کے
ساتھ گوندھ لیں اور اقراص بنائیں اور ۵/۳ گرام ہمراہ سکجنین کھلائیں۔
اس سلسلے میں سکجنین بزوری بھی مفید ہے۔
نسخہ سکجنین بزوری اصولی۔

تخم کشوث، انیسون، بادیان، پوست بچ کبر، پوست بچ کرفس، ہر ایک ۵/۳ گرام
تخم کاسنی ۳۵ گرام — تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۱۵۰ ملی لیٹر سرکہ اور ۵۰۰ ملی لیٹر
پانی میں بھگو دیں۔ چوبیس گھنٹے کے بعد حسب دستور مصری کے قوام کے ساتھ سکجنین
تیار کریں استعمال کرائیں۔

• درج ذیل نسخہ جات خارجی طور پر استعمال کرنا سودمند ہے۔

نسخہ ضما د۱۔

تخم کرفس، انیسون ہر ایک ۵/۳ گرام، بورہ ارمنی ۵/۳ گرام، شب یمانی ۵/۳ گرام،
تمام دواؤں کو پس کر سرکہ میں پھینٹ کر طحال پر ضما د کریں۔
نسخہ ضما د۲ نطول۔

تخم کرفس ۳۵ گرام، کزمازج، بورق، شب یمانی، زفت، ہر ایک ۴ گرام، قطران ۵/۳ گرام
تمام دواؤں کو کوٹ کر سرکہ میں جوش دیں اور نیم گرم، مقام طحال پر نطول کریں،
اور اس کے ثقل کا ضما د کریں۔

حصاة طحال

STONE IN THE SPLEEN

اس مرض میں طحال میں خلط غلیظ کے، عرصہ تک رکے رہنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ بھجڑ ہو کر سیاہ، نیلی ریگ یا حصاة کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

اسباب:

- (۱) غلیظ خلط کا عرصہ تک طحال میں مجبوس رہنا۔
- (۲) ورم صلب کا تحلیل نہ ہو کر متحجر ہو جانا
- (۳) آتشک
- (۴) کبد کے بعض امراض
- (۵) ہانقراس کے بعض امراض

علامات:

مقام طحال پر خلش، درد اور ثقل کا احساس ہوتا ہے، اور بعض اوقات پیشاب کے ساتھ یا بواسیری / فصد کے خون میں بھی ریگ آنے لگتی ہے۔ اور وہ تمام مرض علائق رونما ہوتی ہیں جو حصاة الکلیہ، حصاة الکبد وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج:

- مددات، مفتحات، مجلیات اور منقیات استعمال کرائیں۔
- حصاة کلیہ، حصاة کبد اور حصاة مثانہ کا اصول علاج اختیار کریں۔

۱۷ اس کو حجارة الطحال بھی کہتے ہیں۔

علاج:

• ————— تخم کاسنی، بادیان، تخم کشوث، تخم کرفس، تخم کالنج کا شیرہ نکال کر نوش کرائیں۔

• ————— جویب ریوند اور شربت بزدی سے تنقیہ کریں۔

• ————— درج ذیل نسخہ مفید اور مجرب ہے۔

نسخہ ۱۔

شیرہ بڑ، ۵ لیٹر، آب ہندوانہ، آب زردک، آب برگ خرفہ، ۲ ایک لیٹر، آب برگ ترب، ۱۵۰۰ ملی لیٹر، آب نیشکر ۵ لیٹر، عرق گلاب ۵۰۰ لیٹر، بہن سرخ، بہن سفید، خارخسک، تخم خربزہ، تخم قرطم، تخم خیازین، عنب الثعلب ہر ایک ۶۰ گرام، تخم کشوث، بیج کبر ہر ایک ۴۸ گرام، صندل سفید ۸ گرام، خاکسی ۲ کلو گرام، نبات سفید ۵۰۰ گرام ————— تمام دواؤں کا ۵۰۰ لیٹر، عرق کشید کریں اور ۱۰۰۰ ————— ۲۵۰ ملی لیٹر بہرہ شربت کشوث ۴۸ ملی لیٹر، نوش کرائیں۔ تجرالیہود سوختہ ۱ گرام، جوارش مصطلی ۶ گرام کا اضافہ سود مند ہے۔

نسخہ ۲۔

لاجورد مغسول، بیج کبر، تجرالیہود ہر ایک ۱ گرام، شربت کشوث، سکنجبین عنصلی ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، شیرہ قرطم ۸ گرام، تخم خربزہ، گوکھرو، ہر ایک ۹ گرام، عرق گلاب ۲۵۰ ملی لیٹر، عرق مکوہ ۱۲۰ ملی لیٹر ————— تمام دواؤں کو ملا کر حسب ضرورت سکنجبین بزدی ریوندی ۴۸ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں۔

• ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ ۳۔

انجیر کو سرکہ میں جوش دے کر مقام طحال پر نہا دیں۔

• ————— خوردنی طور پر بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

امراض معدہ و امعاء

Learn Unani By Abdul Wahid Salman

معدہ و امعاء کی مختصر تشریح اور منافع

BRIEF ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF STOMACH AND INTESTINES

معدہ:

تشریح:-

یہ مجری غذائی (Alimentary Canal) کا سب سے کشادہ حصہ ہے، اور مری (Oesophagus) کے زیریں سرے اور اثنا عشری (Duodenum) کے درمیان واقع ہے، اس کا گول اور پھیلا ہوا حصہ بائیں طرف اضلاع و پسلیاں (Ribs) اور جہاب عاجز (Diaphragm) کے نیچے طحال (Spleen) کی طرف واقع ہے، اس کو تو معدہ (Fundus of the Stomach) یا طرف طحالی (Spleenic End) کہتے ہیں۔

معدہ کی ساخت میں ۴ طبقات حصہ لیتے ہیں۔

- (I) پاریطونی طبق
- (II) نسج واصل کا طبق
- (III) عضلی طبق
- (IV) مخاطی طبق

غذا اور پانی سے بھرے ہونے کی صورت میں معدہ کی لمبائی ۴۵ — ۶۰ سینٹی میٹر ہوتی ہے۔

معدہ میں درج ذیل دو سوراخ پائے جاتے ہیں۔

۱، فم معدہ Oesophageal Opening

۲، لباب

فم معدہ ۱۔

یہ سوراخ مری کے زیریں سرے اور معدہ کے مقام اتصال پر پایا جاتا ہے۔ اس سوراخ کے ذریعہ غذا مری سے معدہ میں داخل ہوتی ہے اس کو ثقبۃ الفؤاد Cardiac Orrificۃ بھی کہتے ہیں۔

منفذ بوابی ۲۔

یہ سوراخ معدے کے آخری سرے پر ہوتا ہے، یہ گول ریشوں کے ایک حلقہ سے بند رہتا ہے اس کو اڑ کو صمام بوابی (Pyloric Value) کہتے ہیں — یہ سوراخ غذا ہضم ہونے سے قبل معدہ سے اسعار کی طرف انحدار کو روکتا ہے، معدہ کا یہ سرا کبد کے فص مربعہ (Quadrate Lobe) سے ملا ہوتا ہے۔

اس کی عصبی اور دموی پرورش میں دایاں عصب راجع، بایاں عصب راجع، اعصاب شریہ صفیرہ ثلاثی اور شریان معدی ایمن والیسر، شریان شریہ معدی ایمن والیسر اور شریان طحالی سے خارج ہونے والی عروق صفیرہ، وغیرہ حصہ لیتی ہیں۔

منافع ۳۔

اس میں گیسٹرک جوس نامی ایک رطوبت بنتی ہے جس میں تیزاب، پیپ سین اور نمک ہوتا ہے۔ یہ رطوبت غذا کے طمی اجزاء کے ہضم میں معاون ہوتی ہے۔

معاء وثاق (SMALL INTESTIN) :

تشریح ۱۔

یہ معدہ کے بوابی سرے سے شروع ہو کر اعور پر ختم ہوتی ہے، یہ نہایت پیچ در پیچ اور ۶ میٹر، ۷ سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔

یہ معار درج ذیل تین حصوں میں منقسم ہے۔

1. معار اثنا عشری (Duodenum)

2. معار صائم (Jejunum)

3. معار لفائفی (Ileum)

معار اثنا عشری :-

یہ معار دقاق کا پہلا حصہ ہے، اس کی لمبائی ۱۸ — ۲۵ سینٹی میٹر ہوتی ہے، اطباء اس کو بارہ انگشت بھی بتاتے ہیں اور اسی مناسبت سے "اثنا عشری" (بارہ انگشتی) کہتے ہیں، یہ بواب سے شروع ہو کر معار صائم پر ختم ہوتی ہے، اس میں صفراء کی نالی (Bile Duct) اور بانقرا کی نالی (Pancreatic Duct) ، آکر کھلتی ہے۔

اس کی دموی اور عصبی پرورش میں شریان کبدی کی شاخ بانقرا سی اثنا عشری، شریان ماساریقی کی شاخ بانقرا سی اثنا عشری اسفل اور اعصاب راجع اور اعصاب شریکیہ حصہ لیتی ہیں۔ معار صائم :-

یہ معار اثنا عشری کے آخری سرے سے شروع ہو کر معار لفائفی سے مل جاتی ہے، اس میں گولائی، سرخی کے ساتھ کافی عروق بھی ہوتے ہیں، اس معار سے معار دقاق کا چھ حصہ بنتا ہے، معار لفائفی :-

یہ معار صائم کے آخری سرے سے شروع ہو کر اعور (Caecum) کے پاس ختم ہوتی ہے، اس سے معار دقاق کا چھ حصہ بنتا ہے۔

معار کبار :- (LARGE INTESTIN)

یہ معار کبار مجموعی طور پر ۵/۱۸ سینٹی میٹر لمبی اور معار دقاق سے زیادہ موٹی اور جھالردار ہوتی ہے، اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔

۱۔ اس کو معار غلیظ بھی کہتے ہیں۔

Caecum	اعور	(I)
Colon	قولون	(II)
Rectum	معارستقیم	(III)

اعور:-

یہ ۴-۵ سینٹی میٹر چوڑی تھیلی رونما ہوتی ہے، چونکہ اس میں درد، آئیں، سورخ ہوتا ہے اسی لئے اعور (کافی) کہلاتی ہے، اس کے پچھلے حصہ سے ۶-۵ سینٹی میٹر لمبا ورمیورم (Vermieorm Process) کی مانند ایک زائید ہوتا ہے، جس کو زائید دودید یا زائید اعور (Vermieorm Process) ہوتا ہے، جس کا فعل ہنوز نامعلوم ہے۔

قولون:

یہ سب سے بڑی معار ہے، اس کی لمبائی کم و بیش ۱۰۰ سینٹی میٹر ہوتی ہے، اس کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں۔

Ascending Colon	قولون صاعد	(I)
Transvers Colon	قولون مستعرض	(II)
Descending Colon	قولون نازل	(III)
Pelvic Sigmoid Colon	قولون عانی/سیمنی	(IV)

قولون صاعد:-

یہ حصہ اتصال دقیقی اعوری سے شروع ہو کر کبد کی زیریں سطح تک جاتا ہے جہاں یہ خم کبدی (Hepatic Flechure) بناتا ہوا بائیں جانب مڑ جاتا ہے، یہ قولونی جز، مفصلہ خاصہ، مربعہ قطنیہ اور دائیں کلیہ کی بیرونی سطح پر سہارا لیتا ہے۔
قولون مستعرض:-

یہ قسم ستری میں دائیں سے بائیں جانب مرادہ ہے طحالی تک بڑھ کر خم طحالی (Splenic Flexure) بناتا ہے، اور اس کی ابتداء خم کبدی سے ہوتی ہے۔
قولون نازل:-

یہ خم طحالی سے شروع ہو کر مدخل عانہ پر ختم ہو جاتا ہے۔

قولون عالیہ

یہ قولون نازل کا آخری حصہ ہے، یہ جو قولون نازل سے زیادہ تنگ ہوتا ہے

معارستقیم

یہ تعرج سینی سے شروع ہو کر مبرز (Anus) پر ختم ہوتی ہے، اور عام طور سے اس کی لمبائی ۵۔۲۰ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور دونوں سروں پر تنگ اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے۔

ان امعاء کی دموی اور عصبی پرورش شریان ثلاثی بطنی، شریان ماسارقی علی شریان ماسارقی اسفل اور اعصاب راجع اور صفحہ ثلاثی کی شاخوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

منافع

امعاء میں غذا کا عمل ہضم انجام پاتا ہے، اور ہضم اربعہ میں سے یہ بھی ایک مرحلہ ہضم ہے، چنانچہ یہاں اس میں تین طرح کی رطوبات، صفار، رطوبت بالغہ اور رطوبت امعاء اثر انداز ہو کر ہضم میں معاونت کرتی ہیں، یہ درحقیقت ہضم معدی کا تتمہ ہے، یعنی غذا کے جو اجزاء معدہ میں منہضم ہونے سے رہ گئے تھے وہ امعاء میں پہنچ کر ہضم ہو جاتے ہیں۔

غذازیریں امعاء میں جس قدر منحدر ہوتی جاتی ہے، اس کی رطوبتیں اور ہضم شدہ اجزاء عروق ماسارقیہ اور اس قبیل کی بعض دوسری عروق میں جذب ہوتے جاتے ہیں چنانچہ مبرز سے کچھ اوپر پہنچتے پہنچتے اس کے بیشتر غذائی اجزاء ہضم ہو کر مذکورہ عروق کے ذریعہ جذب ہو جاتے ہیں۔ اور غذا کے ناقابل ہضم اجزاء فضلہ بن کر مبرز کے ذریعہ خارج ہو جاتے ہیں۔

سوز مزاج معدہ

ILL TEMPERAMENT OF THE STOMACH

اس مرض میں معدہ کے جرم میں کسی قسم کا فساد رونما نہیں ہوتا بلکہ کیفیات یا اخلاط اربعہ میں سے کسی ایک کے غلبہ سے اس کی کارکردگی (افعال) میں کسی قدر نقص پیدا ہو جاتا ہے،

اقسام:-

سور مزاج معدہ

سور مزاج معدہ ساؤج مفرد سور مزاج معدہ ساؤج مادی سور مزاج معدہ ساؤج مرکب سور مزاج معدہ مرکب

اسباب:

- (I) معدہ کا سور مزاج ساؤج/حرارت کی داخلی و خارجی تدابیر۔
- (II) معدہ کا سور مزاج مادی، اخلاط اربعہ میں سے کسی کا غلبہ

علامات:

ملفوظ ہے کہ مذکورہ اقسام میں اول الذکر دونوں اقسام اور ان کی ذیلی ۸ انواع کثیر الوقوع نہیں ہیں۔ اس لئے یہاں سور مزاج معدہ ساؤج مرکب سور مزاج معدہ مرکب مادی کی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

سور مزاج معدہ ساؤج مرکب:-

سور مزاج معدہ ساؤج حار رطب کی صورت میں بھوک کے وقت کثرت لعاب دہن خارج ہوتا ہے، یہ نوع زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔

سور مزاج معدہ ساؤج حار یا بس میں زبان خشک ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، تمام جسم میں بیہوش ہوتی ہے، لاغری بھی ہوتی ہے، براز بھی خشک ہوتا ہے، یہ

۱۔ اس میں کیفیات اربعہ (حرارت، برودت، رطوبت، بیہوش) میں سے کوئی ایک کیفیت بغیر کسی مادہ کی بڑھ جاتی ہے۔

۲۔ اس میں کیفیات اربعہ میں سے کوئی ایک کیفیت کسی مادہ کے غلبہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔

۳۔ اس میں کیفیات اربعہ میں دو کیفیتیں (مثلاً حرارت رطوبت/برودت رطوبت/حرارت بیہوش/برودت بیہوش) کسی مادہ کے غلبہ کے بغیر بڑھ جاتی ہیں۔

۴۔ اس میں کیفیات اربعہ میں سے کوئی بھی دو کیفیتیں کسی مادہ کے غلبہ کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔

نوع دق الشیخوخت میں کثیر الوقوع ہے۔ اور مزمن ہو جانے پر عسیر العلاج بھی ہے۔
 سور مزاج معدہ سازج بارد رطب میں براز میں لینت ہوتی ہے، اشتہاء کے طبعی حالت
 میں ہونے کے ساتھ ضعف ہضم کی شکایت ہوتی ہے، جسم کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔
 سور مزاج معدہ بارد یا پس میں اشتہاء کا غلبہ ہوتا ہے، ضعف ہضم اور تھمہ کی شکایت
 ہوتی ہے، زبان خشک اور کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، نتر اشتہاء کے استعمال سے راحت ملتی ہے۔
 سور مزاج معدہ مادی مرکب ۱۔

سور مزاج معدہ حار رطب مادی (دموی) میں خلور معدہ کے وقت متلی ہوتی ہے
 اور کھائی ہوئی شے بہت جلد متعفن ہو کر تھے میں خارج ہونے لگتی ہے، لعاب دہن بکثرت
 خارج ہوتا ہے۔

سور مزاج حار یا پس مادی (صفراوی) میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ضعف اشتہاء ہوتا
 ہے، طبیعت میں کرب و اضطراب ہوتا ہے، ذائقہ تلخ اور منہ خشک ہوتا ہے، زبان اور جسم کا رنگ
 زرد پڑ جاتا ہے، ابکائیاں اور غذائینے کے بعد دغالی، تیز بُو والی یا زنگار کی مانند بدبودار
 ڈکاریں آتی ہیں، مادہ کی قلت کی صورت میں ابکائیاں غذائینے کے بعد ہی آتی ہیں۔ اور اگر مادہ
 زیادہ ہو تو تفسی عوارض بھی رونما ہوتے ہیں، مادہ کے قعر معدہ میں داگردہ معدہ کی چٹنوں
 میں سرایت نہ کئے ہو، تو غذا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ابکائیاں آتی ہیں۔ اور اگر مادہ معدہ کی
 چٹنوں میں سرایت کر گیا ہو تو ابکائیاں بکثرت آتی ہیں تاہم اس کے ساتھ مواد خارج نہیں ہوتا۔
 یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ ہر وقت متلی اور تھے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مادہ خود معدہ
 میں پیدا ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی ہونے کی صورت میں کسی دوسرے عضو سے انقباض کی علامت
 ہے۔

سور مزاج معدہ بارد رطب مادی (بلغمی) میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، لعاب دہن بکثرت
 خارج ہوتا ہے، نفخ شکم اور بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، کم دبش متلی اور تھے ہوتی ہے،
 سور مزاج معدہ بارد یا پس مادی (سوداوی) میں خلور معدہ کی حالت میں مقام معدہ
 پر سوزش ہوتی ہے، بھوک اور پیاس زیادہ لگتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے، نفخ شکم، سور ہضم
 وغیرہ عوارض ہوتے ہیں، ذائقہ کھٹا اور ترش تھے آتی ہے، طحال بڑھی ہوئی محسوس کی جا سکتی
 ہے۔

اصول علاج :

- سور مزاج معدہ سازج حار رطب میں تعدیل مزاج کریں۔
- سور مزاج معدہ سازج حار یا پس میں معدہ کی ترطیب و تبرید کریں، اس سلسلے میں رطب دواؤں میں آبنر، نطول، حمام اور مالش مفید ہے۔
- سور مزاج معدہ سازج بار و رطب میں گرم و خشک ادویہ استعمال کرائیں اسی طرح روغنوں کی معدہ پر مالش کریں۔
- سور مزاج معدہ سازج بار یا پس میں اعتدال کی حامل گرم و سرد ادویہ استعمال کرائیں اور ان ہی خواص کے حامل روغن کی معدہ پر مالش کریں
- سور مزاج معدہ حار رطب مادی (دموی) میں مقیات استعمال کرائیں اور تنقیہ مواد اور تقویت معدہ کی تدابیر کریں۔

• سور مزاج معدہ حار یا پس مادی (صفراوی) میں حسب ضرورت مقیات استعمال کرائیں، صفراوی مادہ کے دماغ کی طرف سے انصباب کی صورت میں سردی کی فصد کھولیں، کبد کی طرف سے آنے کی صورت میں دائیں باسیلق یا دائیں اسلیم کی فصد کھولیں۔ طحال کی طرف سے آنے کی صورت میں باسیلق کی فصد کھولیں، اور اعضاء میں مادہ کے بھرے ہونے کی صورت میں، مرین کی قوت اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مطبوخ فواکہ اور مارالجبن استعمال کرائیں۔

- سور مزاج معدہ بار و رطب مادی (بلغمی) میں مقیات کے ذریعہ تنقیہ بلغم کرائیں۔ سہل بلغم دوائیں کھلائیں۔
- سور مزاج معدہ بار و یا پس مادی (سوداوی) میں منبج و سہل سودا استعمال کرائیں، مطلوب حمام کرائیں، معدہ پر مناسب روغن کی مالش کریں۔

علاج :

- سور مزاج معدہ سازج حار رطب میں تعدیل مزاج کے لیے سکجین بزوری اطرینل سادہ، ہل خورد و کلاں وغیرہ استعمال کرائیں۔

سور مزاج معدہ سازج حار یا بس میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

شیر گاؤ / چھانچہ ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر، شیر تخم خرفہ، مغز تخم خیارین، مغز تخم کدو، ہر ایک ۶ گرام، مذکورہ دودھ میں نکال کر نبات سفید ۱۲ گرام، ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

گل سرخ، طباشیر، تخم خرفہ، تخم حاض، برگ مکوہ، برگ بادرنجبویہ، رب السوس خالص، ہر ایک ۵ گرام، مغز بادام مقشر، بریاں، بلبلہ زرد، ہر ایک ۵ گرام، مصطلکی ۸۵ گرام۔
تمام دواؤں کو باریک کوٹ پس کر رکھ لیں، آب سفر جل ۲ لیٹر میں جوش دیں، جب ۶، ۵ ملی لیٹر رہ جائے تو اتار کر رکھ لیں آب سیب ۲ لیٹر کو بھی آگ پر جوش دیں، جب ۶، ۵ ملی لیٹر رہ جائے تو دونوں کو ملا کر ان ہی کے ہم وزن شکر طبر ز ملا کر قوام تیار کریں، اور نیم گرم حالت میں ہی مذکورہ سفوف شدہ دوائیں ڈال کر معجون بنائیں اور ۸ گرام، نہار منہ کھلائیں۔

• سور مزاج معدہ سازج بار در طب میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

مصطلکی، انیسون، تخم کرنس سموزن کو پانی میں جوش دے کر نبات سفید حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مصطلکی ۸۵ گرام، زنجبیل، دار فلفل، جوز بوا، زرنباد، خولنجان، زیرہ سیاہ، ہر ایک ۵ گرام، پودینہ ۳۲ گرام، ہیل خورد، ہیل کلاں، ببا سہ، دار چینی، ہر ایک ۳۱ گرام، قرفل، قرفہ، زعفران، فلفل دراز، ہر ایک ۱۰ گرام، مویز منفی ۷ گرام، تمام دواؤں کو عرق گلاب ۱۱۰ ملی لیٹر میں پس کر ۱۰ گرام کھلائیں۔

• سور مزاج معدہ سازج بار دیانس میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۳۔

شربت انار شیریں، زودفا، مارا شیر، شہد خالص ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

بلبلہ سیاہ، بلبلہ کابی، بوزیدان، افستین، افستین، ہر ایک ۶ گرام، مصطلکی رومی،

عود خام، دق، ہر ایک، ۵ گرام، حب الصنوبر، نقشہ، حب الزلم نقشہ، ہر ایک ۲۵ گرام،
راسن خشک ۸ گرام، مغز پستہ، مغز بادام نقشہ ہر ایک ۱۰ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک
کوت کر تین گنا شہد ملا کر حسب دستور مجموع بنائیں اور ہمارے ۱۲ گرام کھلائیں۔

سور مزاج معدہ مادی حار رطب (دموی) میں آب ثنبت اور سکنجبین
نبردی سے قے کرائیں۔ اور درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

تر بندی، مویز منق ہر ایک ۵ گرام، انار دانہ ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو ۲۴
گھنٹے بھگائیں اور نل چھان کر نبات سفید ۲۵۰ گرام میں توام بنائیں، اس کے بعد دار فلفل،
دار جینی، عود، آملہ نقشہ، دانہ ہیل، صندل سفید، گل سرخ، سنبل الطیب ہر ایک ۴ گرام،
پیس کر ملائیں اور ۱۲ گرام ہمراہ شربت انار استعمال کرائیں۔

سور مزاج معدہ حار یا پس مادی (صفراوی) میں درج ذیل نسخہ جات
استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔
سکنجبین اور گرم پانی نوش کر کر قے کرائیں اور یہ نسخہ دیں
افستین ۹ گرام، گل سرخ ۵ گرام، صبر سقوطی ۲ گرام، پہلی دونوں دواؤں کو
پانی میں جوش دے کر صبر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔
افستین رومی ۸ گرام، گل سرخ ۶۵ گرام، دونوں کو الیٹر پانی میں
جوش دیں جب ۲۵۰ ملی لیٹر رہ جائے تو صاف کر کے نبات سفید سے شیریں کر کے نوش
کرائیں۔

نسخہ ۴۔
گل سرخ ۵ گرام، طباشیر ۸ گرام، پوست سماق، بلیہ زرد، ہر ایک ۲۵ گرام،
مصطکی، راک، ہر ایک ۲ گرام، شکر طبرزد، تمام دواؤں کے ہموزن۔ سب کو
کوٹ پیس کر سفوف بنائیں اور ۱۰ گرام ہمراہ آب سرد، صبح کے وقت استعمال کرائیں۔

•۔ سور مزاج معدہ بار در رطب مادی (بلغمی) میں درج ذیل نسخہ جات استعمال

کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم ترب، شہد، نمک، کو گرم پانی میں ملا کر نوش کرائیں تاکہ تے ہو جائے

نسخہ ۱۔

دارچینی، جوز بوا، سعد کوفی، بیسل خورد، فلفل، زنجبیل، ہر ایک ۲ گرام، کنجد سیاہ ۵ گرام، چوب چینی غرق ۲۰ گرام، — تمام دواؤں کو پیس کر حسب دستور ہمراہ شیر دگنا معجون بنائیں اور ۶-۱۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

زنجبیل بے ریشہ، حسب ضرورت کو پیس کر شیر بڑ میں گوندھ کر قرص بنائیں اور روغن گاؤں میں بریاں کر کے باریک کریں اور ۵ گرام میں برگ ستار کمی دو گنا یعنی ۱۰ گرام قرفل، مصطلی، ہر ایک ۴ گرام، شکر تری ہموزن جملہ دوا۔ — سب کو باریک پیس کر ملائیں اور ۵-۱۰ گرام ہر آہ آب تازہ، بوقت خواب استعمال کرائیں۔
• سور مزاج معدہ بار دیا پس مادی (سوداوی) میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جوشاندہ افتیمون سے سودا کا تنقیہ کریں۔

نسخہ ۱۔

بادام مقشر، پستہ مقشر ہر ایک ۳۰ گرام، افتیمون، بلبلہ کابل، بوزیدان، ہر ایک ۲۰ گرام، حب الصنوبر، حب بلساں، ہر ایک ۵ گرام، مصطلی، عود، ہر ایک ۵ گرام، شہد خالص تین گنا، حسب دستور معجون بنائیں اور نہار منہ ۱۲ گرام کھلائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

روغن بادام، روغن کدو، کی شکم پر مالش کریں سور مزاج معدہ سا ذبح جاریا پس

میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

- (۳) معده کا سور مزاج بار در طب
 (۴) فاسد اخلاط کا معده میں اجتماع
 (۵) ورم / تفرق اتصال معده
 (۶) غذائی بے اعتدالی / نقص تغذیہ
 ضعف قوت دافعہ۔
 (۷) معده کا سور مزاج بار در طب

علامات :

ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں معده، مری سے غذا کو اچھی طرح جذب نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے غذا معده میں دیر سے پہنچتی ہے۔ سینہ میں گرائی محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات کرب و اضطراب اور خفقانی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور متلی و قے بھی ہونے لگتی ہے، سرد و دوار کی شکایت ہوتی ہے، ابتدا میں معده مسترخ بھی ہو جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ مذکورہ بالا علامات رونما ہوتی ہیں۔

ضعف قوت ماسکہ کی صورت میں معده غذا کو حسب ضرورت اپنے اندر روکنے پر قادر نہیں ہوتا، چنانچہ کبھی تو مرین کو غذا لینے کے بعد اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ معمولی جہانی حرکات سے غذا باہر آ جائے گی اور کبھی غذا بہت جلد معده سے امعاء کی طرف منسری ہو جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں معده میں ارتعاشی حرکت ہوتی ہے اور خفقانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

ضعف قوت باضمہ کی صورت میں غذا پوری طرح ہضم ہو کر جز و بدن نہیں بن پاتی، جس کے سبب روز بروز لاغری اور ضعف میں اضافہ ہوتا ہے، سور مزاج حار معدی کی صورت ہو تو ترش ڈکاریں آتی ہیں جس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے، مزاج بار در کی صورت ہو تو صرف ترش ڈکاریں آتی ہیں، اسی طرح ورم معده یا غذائی بے اعتدالی کی صورت میں ان کی سرگزشت موجود ہوتی ہے۔

ضعف قوت دافعہ کی صورت میں غذا معده میں معمول سے زیادہ مدت تک رہتی ہے اور ڈکاریں کھانے کی بو محسوس ہوتی ہے۔

بہر حال جملہ اسباب میں کم و بیش ضعف اشتہار یا بطلان اشتہار کی شکایت ملتی ہے
غذائینے کے بعد گرانی یا معدہ میں سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے، ترش، دردناک، یا صرف
ترش ڈکاریں آتی ہیں، انٹرایاں اور جمائیاں آتی ہیں، خفقاں ہوتا ہے، نفخ و قراقر ہوتا ہے
رفع حاجت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہو پاتا، کبھی قبض تو کبھی اسہال ہوتا ہے، ہضم کے نقص
کی وجہ سے عام ضعف اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔

اصول علاج:

- غلبہ برودت کی صورت میں گرم ادویہ استعمال کرائیں۔
- سورمزاج حار میں بارود دوائیں استعمال کرائیں۔
- ضعف قوت جاذبہ کی صورت میں مقویات اور کاسرات استعمال کرائیں
- تنقیہ مواد کریں۔
- حسب ضرورت لینیات استعمال کرائیں۔
- کھلی فضائیں اعتدال کے ساتھ ریاضت کی ہدایت کریں۔

علاج:

- سورمزاج حار - معدہ میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست سماق، زرشک، بہدانہ، ہموزن — تمام دواؤں کو عرق بادیان میں
پیس کر سکینبین اور شربت انار ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

عرق نیلوفر، عرق بید سادہ، ہموزن، عرق کاسنی پچ حصہ، شربت انار ترش اور شربت
ہیمون ملا کر نوش کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

صندل، زرگل، طباشیر، سماق ہموزن — تمام دواؤں کو سرکہ اور عرق گلاب میں

باریک پس کر معدہ پر ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

برگ خرفہ، برگ کاہو، کشنیز سبز ہر ایک ۵ گرام، صندل سرخ، صندل سفید، ہر ایک ۸ گرام ————— تمام دواؤں کو پانی میں پس کر معدہ پر لپیپ کریں۔

• سور مزاج بارد میں داخلی اور خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کروا۔
نسخہ ۱۔

مصطکی رومی، پوست ترنج، ہر ایک ۱ گرام۔ ————— دونوں کو باریک پس کر کل تدا۔
۲۵ گرام ملا کر کھلائیں، اس کے بعد عرق بادیان نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

سنبل الطیب، مصطکی رومی، عود غرق، پوست ترنج ہم وزن۔
دواؤں کو سرکہ اور عرق گلاب میں پس کر معدہ پر ضا د کریں،
• سور مزاج رطب میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عرق گلاب میں شربت حب الہاس ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کشنیز خشک، زرگل، گلنار، سماق، ہموزن ————— تمام دواؤں کو عرق گلاب
میں پس کر، چھان کر گلقد ملا کر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

انیسون، بادیان، ہر ایک ۶ گرام، پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد غسلی ملا کر
نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گل سرخ، مصطکی رومی، انیسون ہر ایک ۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پس کر
گل قند میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد عرق بادیان نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

بادیان، ہیل خورد، تخم خربزہ، ہموزن ————— تمام دواؤں کو پس، چھان کر

شربت انار شیریں ملا کر نوش کرائیں
نسخہ ۱۔

جوارش عود ۷ گرام کھلائیں اس کے بعد انیسون ۲ گرام، بادیان ۴ گرام پان میں
پیس چھان کر شربت بزوری ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔
نیم گرم پانی میں نمک ملا کر نوش کرائیں / جو شانہ تخم مثبت نوش کرائیں یہ قے آور ہے
اور تنقیہ میں مفید ہے۔

———— درج ذیل نسخہ جات بھی مفید ہیں۔

نسخہ ۱۔
زنجبیل، فلفل سیاہ، دار فلفل، ناگ کیسہ، سازج ہندی، دارچینی، زیرہ سفید،
بادیان، ہر ایک ۵ گرام، انار دانہ ۵ گرام، نبات سفید ۵ گرام — تمام دواؤں کو
باریک پیس کر، گرم ہمراہ عرق بادیان استعمال کرائیں، مقوی معدہ اور ہاضم ہے۔

نسخہ ۱۔
زنجبیل ۳ گرام، بادیان ۵ گرام، مصلگی ۵ گرام، نبات سفید ہم وزن و۔
تمام دواؤں کو باریک پیس کر، ۲ گرام کھلائیں، رطوبت کی وجہ سے ضعف معدہ
میں مفید ہے،
نسخہ ۱۔


پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ، آملہ، بادیان، اجوانن، زیرہ سفید، نمک ہندی
نمک سیاہ، نمک سنگ، جواکھار، سہاگہ بریاں، نوشادر، فلفل سیاہ، ہیل خورد، دار فلفل
زنجبیل ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور ۱-۲ گرام بعد
طعام کھلائیں۔

سورہضم

DYSPEPSIA

اس مرض میں معدہ کی ساخت میں کسی طرح کا فتور نہیں آتا بلکہ فعل ہضم میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہو پاتی بلکہ اس میں خراب اور ردی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اقسام ۱۔



اسباب:

اعراض معدہ و امعاء۔

د، قبض

د، معدہ و امعاء کے عضوی امراض

د، قروح معدہ

د، اتساع معدہ

د، التهاب معدہ

د، معدہ و امعاء کی قوت ماسک و واقعہ کا نقص یا ضعف

د، گیسٹرک جوس اور پیپ سین کا معمول سے کم مقدار میں پیدا ہونا

د، معدہ یا اثنا عشری کی خلقی خرابی

قرحہ مضینی

کارسی نوا معدی

ویدان اعمار

قوتیج

التهاب زائدہ اعور

امراض اعصاب :-

ضعف اعصاب

اختناق الرتم

ذہنی پریشانی پست ہمتی

امراض مری :-

تشنج مری

سلجہ مری

غذائی بے اعتدالی :-

چائے اور قہوہ کا بکثرت استعمال

کثرت غذا

ایک ہی غذا کا زیادہ دنوں تک کھاتے رہنا

غذا اچھی طرح چبا کر نہ کھانا

کھانے کے دوران بار بار زیادہ مقدار میں پانی نوش کرنا

مصالحہ جات اور چرپرہی اغذیہ

متفرقات :-

غلبہ حرارت یا برودت

صفراء کے خواص میں نقص

فساد خون

مراہ، کلیہ، قلب اور ریه کے بعض امراض

فتق دیا فرغی

وجع المفاصل	۷۷
نقرس	۷۸
اذن، انف اور لوزن کے عفونی زخم	۷۹
تفج لثہ	۸۰
شرب اور دیگر منشیات	۸۱
کثرت مطالعہ	۸۲

علامات :

عام طور سے علامات، اسباب کے تابع ہوتی ہیں حرارت کی زیادتی کی صورت میں ہرازمیں شدید بدبو ہوتی ہے، تیز، بساندے ہوئے جلی ہوئی ڈکاریں آتی ہیں، برودت کی زیادتی کی صورت میں پسلیوں کے سرے کے پاس تناؤ محسوس ہوتا ہے، منگی کی شکایت ہوتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں اور معدہ میں سوزش ہوتی ہے، ضعف معدہ کی صورت میں ضعف یا بطلان اشتہار ہوتا ہے، غذا لینے کے بعد نان کے مقام پر بوجہ محسوس ہوتا ہے، انگریزیاں اور جمابیاں آتی ہیں، بعض اوقات متلی اور تھ آتی ہے۔

معدہ میں ترش رطوبت اس کا سبب ہو تو ترش ڈکاریں آتی ہیں جس کے ساتھ تھوڑی سی غذا بھی منہ میں آجاتی ہے، معدہ میں سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ سوہ ہضم حادہ۔

معدہ کے مقام پر درد، تناؤ اور ثقل محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات متلی اور تھ بھی آتی ہے، درد سر، ضعف اشتہار، سستی، ماندگی ہوتی ہے، قلت بول ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے زبان میلی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تنفس میں بدبو، خفیف بخار، پیشاب میں درد تہہ نشین دکھائی دیتا ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، پیشاب میں رطوبت بیضہ (البیومن) بھی آسکتی ہے۔ سوہ ہضم مزمن۔

فم معدہ پر گرانی ہوتی ہے، میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، نفخ ہوتا ہے، ترش یا کھاری ڈکاریں آتی ہیں، متلی اور ابکائی آتی ہے، لاغری اور بے رونقی ہوتی ہے، ضعف اشتہار قبض یا اسہال وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔

د، سورہم ضعیفی۔

قلت اشتہار بلکہ غذا لینے سے نفرت ہو جاتی ہے اور غذا لینے کے بعد مقام معدہ پر گرانی کا احساس ہوتا ہے، بعض اوقات پشت یا شانے کی طرف، ٹیس مارتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے جو دبائے یا ڈکار سے کم ہو جاتا ہے، ذائقہ خراب ہوتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، تنگی نفس، ہستی اور ضعف کی شکایت ہوتی ہے، توہم اور چڑچڑاہٹ ہوتا ہے۔ قبض بھی ہوتا ہے، شاذ و نادر متلی اور تے ہوتی ہے۔ بول میں رسوب پایا جاتا ہے۔

ج، سورہم سوزشی۔

فم معدہ پر سوزش ہوتی ہے، حلق، سینے، ہتھیلیوں اور تلوؤں میں بھی جلن ہوتی ہے۔ ضعف اور لاغری ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، متلی اور بعض اوقات تے ہوتی ہے۔

ب، سورہم عصبی۔

عصبی المزاج ہونے کی دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، غذا لینے کے بعد شکم میں درد اور قراقر ہوتا ہے۔

ج، سورہم صفراوی۔

ترش ڈکاریں آتی ہیں، سینہ میں سوزش محسوس ہوتی ہے، غذا لینے کے ۳ گھنٹے بعد معدہ میں بوجھ اور درد ہوتا ہے، خلو، معدہ کی صورت میں یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے بھوک زیادہ لگتی ہے پھر بھی سیری نہیں ہوتی، بعض اوقات پتلے صفراوی اسہال آتے ہیں۔

تفریقی علامات

سورہم مزمن	درم معدہ مزمن
۱۔ تے شاذ و نادر ہوتی ہے۔ اور تے کے بعد درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔	۱۔ تے اکثر اور بار بار ہوتی ہے اور بالعموم صبح کے وقت ہوتی ہے اس میں صرف بلغمی رطوبت خارج ہوتی ہے تے کے بعد درد میں افاقہ نہیں ہوتا۔
۲۔ مقام معدہ پر ذکات حس نہیں ہوتی۔	۲۔ مقام معدہ پر ذکات حس ہوتی ہے۔
۳۔ بخار کبھی بھی نہیں ہوتا۔	۳۔ بعض اوقات حقیف بخار ہوتا ہے۔

۴۔ عام طور سے پیاس نہیں لگتی۔	۴۔ عام طور سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔
۵۔ مرض کا اعادہ معمولی اسباب سے بھی ہو سکتا ہے۔	۵۔ مرض رفتہ رفتہ بڑھتا ہے جس کے نتیجے میں استرخار معدہ لاحق ہو جاتا ہے۔

اصول علاج:

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- قوی اربعہ کے اعتدال کی تدابیر کریں۔

علاج:

- سکخبین سادہ ۲۵ گرام، عرق گلاب ۱۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- عرق پودینہ ۴ ملی لیٹر، آب نارنج ۱۲۵ ملی لیٹر، آب لیموں کا غذی، عرق گلاب، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، عرق مکوہ، آب سنتہ ہر ایک ۱۲۰ ملی لیٹر، شربت انارین ۲۵ ملی لیٹر، نوش کرائیں۔

- بادیان، ہیل کلاں، پودینہ خشک، دارچینی، مصلیٰ رومی، فلفل سیاہ، باؤ بڑنگ، تخم کرفس، ساؤج ہندی، نانخواہ، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابل، ہر ایک ۶ گرام، زنجبیل، فلفل دراز، سہاگہ بریاں، نوشادر، ہر ایک ۳ گرام، نمک شور، نمک سیاہ، نمک لاہوری جو اکھاڑ، چوک انار ترش ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب اورک، آب پودینہ سبز، سرکہ خالص، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، میں ملا کر، عرق لیموں کا اضافہ کر کے اقراص بنائیں اور قرص بعد از غذا کھلائیں۔

- بادیان، آبریشم، طباشیر، ہیل خورد، آملہ مقشر، ہر ایک ۵ گرام بنات سفید حسب ضرورت، تمام دواؤں کو آب برگ پودینہ سبز مرقق ۸۵ ملی لیٹر میں پیس کر مربی ہلیہ ۶۰ گرام کا اضافہ کر کے حسب دستور قوام تیار کر کے استعمال کرائیں۔

تنخم

DYSPEPSIA

اس مرض میں غذا کا ہضم معدی ناقص ہوتا ہے، اور وہ معدہ میں فاسد ہو کر غیر ہضم صورت میں تھے اور اسہال کے ذریعہ خارج ہوتی ہے۔

اسباب:

۱. سور مزاج معدہ
۲. معدہ میں فاسد مواد کا اجتماع
۳. انصباب مادہ
۴. ضعف جرم معدہ
۵. سور ہضم
۶. غذا کی ترتیب و ترکیب کا نقص

علامات:

شکم میں درد گمراہی اور کرب و اضطراب کا احساس ہوتا ہے، نفخ و قراقرہ ہوتا ہے، ترش یا بدبودار ذکریں آتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے، متلی تھے اور اسہال کی شکایت ہوتی ہے، سستی اور ماندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے تاہم ضعف اور ماندگی غیر معمولی نہیں ہوتی، تھے اور اسہال میں غیر ہضم غذا خارج ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

ہیضہ
Cholera

۱۔ ابتداء میں اسہال میں برازی مواد اور تھے میں غیر ہضم غذا خارج ہوتی ہے، پھر اسہال میں چاول کی پیچ کی مانند مادہ خارج ہوتا ہے

تنخم
Dyspepsia

نقہ اور اسہال میں صرف غیر ہضم غذا خارج ہوتی ہے۔

۲۔ عوارض شدید نہیں ہوتے، اسی طرح
اور ضعف غیر معمولی نہیں ہوتا۔
۲۔ عوارض نہایت شدید ہوتے ہیں، اور
مریض بہت بُرے حال اور کمزور ہو جاتا ہے،
مخصوص جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔

اصول علاج :-

• منقیات کے ذریعہ تنقید مواد فاسد کریں اس کے بعد لطیفات طبع استعمال کرائیں۔
• قوی ارجحہ کے طبی افعال کو اقتدال پر لانے کی تدابیر کریں۔

علاج :-

• درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

سنار کی، بادیان، مکوہ، گل سرخ، ہمزون، موہیز منقی ۹ دانہ، ریونڈ چینی ۵ گرام
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد ملا کر نوش کرائیں، اس کے بعد
عرق گلاب تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

نسخہ :-

گل بنفشہ، بادیان، ہر ایک ۶ گرام، تخم کاسنی، سنار کی، گل سرخ ہر ایک ۵، ۶ گرام، موہیز
منقی ۹ دانہ، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد ۵ گرام حل کر کے
نوش کرائیں۔

نسخہ :-

انیسون، بادیان ہر ایک اگر ۱۰ گرام۔ دونوں دواؤں کو باریک پس کر جوارش عود
۶ گرام میں ملا کر کھلائیں۔

نسخہ :-

عرق گلاب، عرق بادیان، عرق مکوہ، ہمزون (۶ ملی لیٹر) میں سکینجین بزوری ۲۵ گرام حل
کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ :-

داسین، خطمی، ہر ایک ۶ گرام، دونوں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر

مکھنڈ ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، آبرلشیم، ہیل خورد، آملہ مقشر، طباشیر، ہر ایک ۵ گرام، نبات سفید دو گت، تمام دواؤں کو آب برگ پودینہ ۸۵ ملی لیٹر ملا کر مربی ہلکے ملا کر قوام تیار کریں اور استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

جوارش کمونی کھلا کر شیدہ بادیان ۵ گرام، عرق بادیان ۱۲۰ ملی لیٹر، عرق گلاب ۶۰ ملی لیٹر میں نکال کر خمیرہ بنفشہ ۲۵ گرام، سکبجین ۲۵ ملی لیٹر، شربت دینار ۶۰ ملی لیٹر، گلقد ۶۰ گرام، ہر استعمال کرائیں۔ صنف کی صورت میں گلقد اور سکبجین کو نسخہ سے حذف کر دیں۔

غذائی حساسیت

FOOD ALLERGY

اس مرض میں بعض غذاؤں کے استعمال سے کسی ظاہری سبب کے بغیر مختلف انواع کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، ویسے مریض بالکل تندرست رہتا ہے۔

اسباب:

(۱) بعض مخصوص اعضاء

علامات:

مریض اس مخصوص غذا کے استعمال سے قبل بالکل صحت مند رہتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد شکم میں شدید تشنج اور درد ہوتا ہے، بدھمی اور نفخ شکم کی شکایت ہوتی ہے، متلی اور قے آتی ہے، جسم پر پتیاں اچھل آتی ہیں۔ ابتداء میں مریض ان عوامل کا سبب نہیں تلاش کر پاتا۔ لیکن غذاؤں کے استعمال یا دیگر یومیہ معمولات پر نظر رکھنے کے بعد رفتہ رفتہ غذائی حساسیت کا سبب تلاش کر لیتا ہے۔

اصول علاج:

- ۔۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۔۔ تعدیل مزاج کی تدبیر کریں۔

علاج:

- ۔۔ پوست ہلیدہ زرد، بادیان، گل سرخ ہر ایک ۶ گرام، پودینہ خشک، ہلیدہ سیاہ، اجوائن دلیسی ہر ایک ۳ گرام، قرفل، دانہ ہیل خورد، ہر ایک ۵ گرام، ————— تمام دواؤں کا سفوف تیار کریں اور ۳ گرام، ہمراہ عرق گلاب نیم گرم، استعمال کرائیں۔
- ۔۔ ست پودینہ، صحت اجوائن، ست کا فور، ہم وزن کو ایک شیشی میں رکھ کر بند کر دیں، جب باہم مل کر رقیق ہو جائے تو، دو تین قطرے، پانی میں ڈال کر نوش کرائیں۔
- ۔۔ مریض کا غذائی چارٹ بنا کر حساس غذا کا کوئی بدل منتخب کر دیں لیکن کسی خاص غذا پر اصرار نہ کریں بلکہ اس کی مرغوب اخذیہ کھلائی جائیں۔

غذائی تسمم

FOOD POISONING

اس مرض میں غذا میں غیر طبعی تبدیلی رونما ہو کر سمیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب ایک صحت مند انسان اس غذا کو استعمال کرتا ہے تو شدید اور خطرناک عوارض سے دوچار ہوتا ہے۔

اسباب:

سالمونیلہ گروپ کا تعدیہ۔

Salmonella Typhimurium

سالمونیلہ ٹائی فیموریم

Salmonella Enteriditis

سالمونیلہ انٹر ایڈائٹس

Salmonella Choleraesius

سالمونیلہ کالرا سیس

بعض اوقات اس کا سبب اسٹیفلو کوکس بھی ہوتا ہے۔

علامات:

عام طور سے غذا کھانے کے چند گھنٹے بعد ہی تھوڑے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں، شکم میں شدید مروڑ اور درد ہوتا ہے، اسہال کی وجہ سے اسطاط طاری ہو جاتا ہے، پتیاں اچھلتی ہیں، نکلنے اور بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اسد خاد اجفان کی شکایت ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے، پیشاب میں رطوبت برینید خارج ہوتی ہے، بنفہ عنیب (اسٹیفلو کوکس) کی صورت میں علامات بہت جلد رونما ہوتی ہیں۔ اور حاد انتہاب معدہ و اسعار Gastro-Enteritis سے غیر معمولی مشابہت ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

اسہال و بائی	غذائی تسم
۱۔ تھوڑے اور اسہال سے مرض کی ابتدا ہوتی ہے۔	۱۔ مرض کی ابتداء تھوڑے سے ہوتی ہے۔
۲۔ تھوڑے میں خون نہیں آتا۔	۲۔ تھوڑے اور اسہال کے ساتھ صفراء، بلغم اور شدید صورت میں خون آمیز تھوڑے خارج ہوتی ہے،
۳۔ تھوڑے میں بھی مواد خارج نہیں ہوتا۔	۳۔ تھوڑے میں مسموم غذا خارج ہوتی ہے۔
۴۔ درد قسم شرا سیفی تک محدود نہیں ہوتا۔	۴۔ ابتداء میں درد قسم شرا سیفی تک محدود ہوتا ہے۔
۵۔ درد توجیح کی طرح ہوتا ہے۔	۵۔ درد ہمیشہ شدید ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

ہیضہ	تسم غذائی
۱۔ معدہ میں جلن نہیں ہوتی۔	۱۔ مری اور معدہ میں شدید سوزش ہوتی ہے،
۲۔ عام طور سے غذا لینے کی مدت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔	۲۔ غذا لینے کے چند گھنٹے بعد علامات رونما ہوتی ہیں۔
۳۔ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔	۳۔ تہوع اور تھوڑے تکلیف دہ ہوتی ہے۔

- | | |
|---|---|
| ۴۔ خارج شدہ مادہ چاول کی پیچ کی مانند ہوتا ہے، اور اس میں ہیضہ کا جراثیم ہوتا ہے۔ | ۴۔ خارج شدہ مادہ میں بلغم، خون اور سخی غذا کے اجزاء شامل ہوتے ہیں |
| ۵۔ شدید صورتوں میں احتباس ہوتا ہے۔ | ۵۔ احتباس بول نہیں ہوتا۔ |

اصول علاج :

• شکم سے غیر ضروری مواد کا تنقیہ کریں۔

علاج :

- جب نارنجیل کھلائیں،
- مرکی، زعفران ہر ایک ۳ گرام، مصر ۶ گرام، کو عرق گلاب میں پیس کر چنے کی برابر صوب بنائیں اور ۲ صوب ہمراہ عرق گلاب کھلائیں۔
- ست کافور، ست پودینہ، ست اجوائن، ہم وزن کو ملا کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور پانی میں دو تین قطرے پکا کر نوش کرائیں۔
- جوشاندہ مثبت سے تے کرائیں۔
- مکمل تنقیہ مواد کے بعد بجالی قوت کے لیے مفرحات و مقویات استعمال کرائیں۔

وجع المعده


GASTRALGIA

اس مرض میں غذا سے قبل، غذا کے بعد یا خلوہ معده کی حالت میں معده میں شدید یا خفیف قسم کا درد ہوتا ہے۔ اظہار جدید اس کو مرضی حالت کی ایک علامت تصور کرتے ہیں۔

اقسام :

وجع المَعْدَہ

Gastralgia



اسباب:

د ا، عمومی۔

II، امراض مَعْدَہ و امعاء۔

I، سورمزاج مَعْدَہ سازج / مادی

II، تفرق اتصال مَعْدَہ / قروح مَعْدَہ

III، مَعْدَہ کی ذکاوت حسن

IV، مَعْدَہ میں صفراء، سودایا فلیظ ریاں کا غلبہ

V، ضعف مَعْدَہ

VI، مَعْدَہ میں غیر طبعی مواد کا اجتماع / مَعْدَہ کے بیشتر امراض۔

VII، سرطان مَعْدَہ

VIII، غذائی بے اعتدالی

ب، خصوصی۔

I، وجع المَعْدَہ عَصَبی۔

II، امراض مَعْدَہ و امعاء۔

I، مَعْدَہ کی غشاء مخاطی کا ذکی الحس ہونا۔

II، خلوص مَعْدَہ

III، قروح مَعْدَہ

IV، سرطان مَعْدَہ

V، بد ہضمی

VI، خلوص مَعْدَہ کی حالت میں برن / نہایت سرد پانی نوش کرنا۔

(۷۹) التنباہ زائدہ امور

(۸۰) ضعف معدہ

(۸۱) معدہ کی ترشی

(۸۲) متفرقات :-

(۸۳) اعتناق الرم

(۸۴) سن ایاس

(۸۵) بندش حین

(۸۶) ملیریا کی مزمن سمیت

(۸۷) فکر و تردد / دماغی محنت

(۸۸) حصاة کلیہ

(۸۹) حصاة مرار

(۹۰) وجع القلب

(۹۱) نفرس

(۹۲) مام ضعف، لاغزی، سستی، کاپلی

(۹۳) غذائی بے اعتدالی

(ب) وجع المعدہ امتلائی :-

(۹۴) امراض معدہ و امعاء :-

(۹۵) سورہم

(۹۶) قبض

(۹۷) معدہ میں بلغم اور صفراء کا اجتماع

(۹۸) نقص تغذیہ / غذائی بے اعتدالی :-

(۹۹) بسیار خوری

(۱۰۰) ثقیل اور نفاخ غذاؤں کا استعمال

(۱۰۱) فساد غذا

علامات :

۱۔ عمومی :-

ڈکار آتی ہے، نواق کی شکایت ہوتی ہے، پسلیوں کی عراب اور شکم میں تناؤ محسوس ہوتا ہے، جب غذا فم معدہ سے اتر کر قعر معدہ میں پہنچتی ہے تو بائیں طرف طحال سے اوپر درد محسوس ہوتا ہے، اس طرف دہانے سے قراق کی آواز آتی ہے، سوہم کی صورت میں یا ضعف قوت دفعہ میں درد غذا لینے کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور قے یا اسہال کے بعد درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، کوڑی کے مقام پر درد اور سوزش ہوتی ہے، غذا لینے کے دو تین گھنٹے بعد درد، عام طور سے رطوبت معدہ کی زیادتی کے نتیجہ میں ہوتا ہے،

ذکاوت حس کی صورت میں اگرچہ معدہ کے افعال میں کوئی نقص نہیں ہوتا تاہم ادنی سبب سے بھی درد محسوس ہونے لگتا ہے، صفرا یا سودا کے انصباب کی صورت میں خلوہ معدہ کی حالت میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اور قے میں صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے، ریاح غلیظ کی صورت میں درد منتقل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، معدہ کے افعال کی خرابی کی صورت میں مقام درد پر دباؤ ڈالنے سے درد رفع ہو جاتا ہے، ضعف معدہ یا التهاب معدہ مزمن میں درد ثقیل اور تمددی نوعیت کا ہوتا ہے، رطوبت معدہ کے بکثرت اخراج کی صورت میں درد سوزشی قسم کا ہوتا ہے سرطان معدہ کی صورت میں درد سوزش اور چھین کے ساتھ مسلسل ہونا رہتا ہے۔
دب، وجع المعدہ عصبی :-

اس میں جوان لڑکیاں اور بوڑھی خواتین زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ درد عام طور سے تشنجی اور دورہ کی شکل میں، رات کے وقت ہوتا ہے، بعض اوقات بے قاعدہ طور پر بھی ہوتا ہے، خلوہ معدہ کی حالت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
(ج) وجع المعدہ امتلائی :-

اس صورت میں امتلاہ معدہ میں درد میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور دہانے سے درد میں کسی قدر تخفیف ہوتی ہے، مثلی تے، شکم میں مروڑ، نفخ، قراق، نرش یا جلی ہوتی

ڈکاریں وغیرہ علامات موجود ہوتی ہیں، شکم میں سوزش اور جلن ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

سورہم	وجع المعدہ عصبی
۱۔ اس نوعیت کی دواؤں سے درد ختم ہو جاتا ہے۔	۱۔ سوڈا پانی کا رب یا اسی طرح کی دوسری کھاری دواؤں کے استعمال سے بھی درد میں کمی واقع نہیں ہوتی۔
۲۔ عام طور سے ترش ڈکاریں آتی ہیں۔	۲۔ ترش ڈکاریں نہیں آتیں۔
۳۔ ترش معدی رطوبات زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔	۳۔ معدی رطوبات کے امتحان میں ترش معدی رطوبات طبعی مقدار سے کم پائی جاتی ہیں۔

تفریقی علامات

قروح المعدہ	وجع المعدہ عصبی
۱۔ ذکاوت حس پائی جاتی ہے۔	۱۔ مقام معدہ کو دبائے سے ذکاوت حس نہیں ہوتی۔
۲۔ غذا لینے کے بعد درد میں یقینی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔	۲۔ درد کا تعلق عام طور سے غذا لینے سے نہیں ہوتا۔
۳۔ تھے میں معدی رطوبات زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔	۳۔ تھے میں معدی رطوبات کی زیادتی نہیں ہوتی۔

اصول علاج:

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ سبب مرض کی تعیین نہ ہو سکنے کی صورت میں کلی علاج کریں
- ۳۔ ذکاوت حس کی صورت میں غلظت روح اور تھدر کی تدابیر اختیار کریں
- ۴۔ غلبہ صفرا کی صورت میں تنقیہ کریں۔
- ۵۔ غلبہ سودا میں اسہلیم کی فصد کھولیں۔

_____۔ سبب مرض کی عدم تعین میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نفسہ

بزر النج بریاں، دارچینی، زنجبیل حسب ضرورت۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو شہد خالص
 میں باریک پس کر مقام در پر فماد کریں اور سیکنین کو ورق گلاب یا گرم پانی میں حل کر کے نوش
 کرائیں۔

نہیں

پوست سنگ دانہ جرن استعمال کرائیں، بالخصوص مفید تصور کیا جاتا ہے، یا اسفنج کو گرم سرکہ میں بھگو کر مقام درد پر رکھیں۔

•۔ ذکاوت حس کی صورت میں درج ذیل تدابیر کریں۔

سفر

معدر کے طور پر انیون تھوڑی مقدار میں استعمال کرائیں، کالے، پائے اور ہر سیہ کھلائیں۔
 • کثرت غذا (بسیار خوری) کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

سختی۔

جواش تر ہندی ۵ گرام، شیرہ زرشک ۳ گرام، شیرہ بادیان ۵ گرام، شیرہ آلو ہنلا ۵ عدد، عرق بادیان، عرق فب الشعلب، عرق گلاب ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر میں نکال کر تھر ہندی ۵ گرام ملا کر، بل چھان کر شربت ورد مکردہ ۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
۵۔ غلہ صفا میں تنقہ کی فوض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

خز

•۔۔ برودت کی وجہ سے ضعف معدہ ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
ترہندی، مغز فلوس فیاض شبنم اور شیر نشیت کا قلعہ نوش کرائیں۔

مختار

اسعد کوئی، سنبل الطیب ہر ایک، اگر ام، ناخواد، کندر، ہر ایک ۵۰، اگر ام —

تمام دواؤں کو ہاریک میس کر شہد خالص تین گنا ملا کر روزانہ، گرام کھلائیں۔
•۔۔۔ حسب ضرورت درج ذیل نسخہ جات بھی مفید تصور کئے جاتے ہیں۔

نسخہ

ہادیان، اجوائن، نمک سیاہ ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک کر پیس کر اگر اہرام ہمراہ آب گرم استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

بادیان، نرگچور، دارچینی ہر ایک اگر کم، تمام دواؤں کو پانی ۱۲۵ ملی لیٹر میں جوش دے کر چھان کر دین میں ۲ مرتبہ نوش کرائیں۔

نسخہ ۱

نوشادر، سہاگہ بریاں، سنت پودینہ ہم وزن — تمام دواؤں کا علیحدہ علیحدہ سفوف بنا کر ۵۰۰ ملی گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

نسوخہ

سبوس باجرا ۱۲ گرام، سکجنین ساد ۱۲ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو آب برگ مکھوہ
سبز حروق، آب برگ تنبولی سبز مروق ہر ایک ۳۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائی۔

نسخہ:-

عود غرقى، دارچینی، سنبل الطیب، بادیان، سافوج ہندی ہر ایک م گرام جب دستور دی۔
نسخہ :-

4

پمپیتہ، زنجبیل ہر ایک ۶۰ گرام، نوشادر، فلفل سیاہ، ہر ایک ۱۲ گرام، نمک لاجوڑی ۳ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر عرق لیمون کاغذی میں چھنکے برابر گولیاں بنائیں اور گولیاں ہمراہ عرق بادیان ۶۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

نسختہ

زعفران اگر اgram، اجوائن خراسانی ۳ گرام، خردل ۶ گرام، تمام دواؤں کو آب
برگ مکوہ سبز مرق میں پیس کر سرکہ خالص ۶ ملی لیٹر ملا کر نیم گرم معدہ پر خضاد کریں۔

نسخہ ۱۔

سبیل خورد: ۱۰ عدد، بادیان، پودینہ ہر ایک اگر ام — تمام دواؤں کو پانی میں ملا لیں

میں جوش دے کر لی چھان کر دل میں دوبار نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

جوارش انارین و گرام کھلا کر شیرہ زرشک ۶ گرام، شیرہ آلو بخارا ۵ عدد، عرق
ہادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں نکال کر سکجنین لیمونی ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں اور غذا لینے کے نصف
ایک گھنٹے بعد سکجنین لیمونی ۲۵ گرام استعمال کرائیں۔ ——— عصبی درد معدہ میں
مفید اور مجرب ہے۔
نسخہ ۲۔

زنجبیل، اجوائن فراسانی سوختہ، ہر ایک، گرام، فلفل سیاہ، پیپل، سہاگہ ہر ایک
۵، ۳ گرام، نمک لاہوری، نمک سیاہ ہر ایک ۲ گرام، حلتیت انگرام ——— تمام دواؤں کو
باریک پس کر لعاب گھیکوار میں فالسہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور ۲ گولیاں دن میں تین
مرتبہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۳۔

زنجبیل ۴ گرام، پوست ہلیلہ زرد، نمک لاہوری، حلتیت، سہاگہ بریاں ہر ایک
۱۲ گرام، ——— تمام دواؤں کو عرق لیموں میں کھول کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں
اور ۱ گولی کھلائیں۔

وجع الفؤاد

CARDIALGIA

اس مرض میں فم معدہ میں شدید درد ہوتا ہے، فم معدہ کے قلب سے قریب ہونے
کی وجہ سے قلب، فم معدہ کے کرب و اضطراب سے بہت جلد اثر پذیر ہوتا ہے، جس کو
عام آدمی ”وجع القلب“ تصور کرتا ہے،

اللہ بہ نام عازی ہے

اسباب:

امراض معدہ و امعاء :-

- (I) فم معدہ کا سور مزاج حار
- (II) فم معدہ پر صفراء کا ترشح
- (III) خلور معدہ
- (IV) معدہ پر بلغم غفن کا گرنا
- (V) معدہ میں غلیظ بار و ریاح کا اجتماع
- (VI) بد ہضمی۔

نقص تغذیہ / غذائی بے اعتدالی :-

- (I) مرغن غذاؤں کا استعمال
- (II) چائے نوشی
- (III) ثقیل اور نفاخ غذاؤں
- (IV) امراض اعصاب / انفعالات نفسانی :-

- (I) رنج و غم
- (II) خوشی و مسرت
- (III) دماغی محنت کی زیادتی
- (IV) متفرقات :-

- (I) کبد و مرارہ کے درمیانی مجری کا انسداد
- (II) کبد میں صفراء کی زیادتی
- (III) سستی و کسلی / عام جسمانی ضعف
- (IV) فقر / ملیریا کی سمیت
- (V) احتباس طمث
- (VI) احتقان الرحم
- (VII) زائد حمل

تہا کو نوشی

علامات:

حرارتِ فمِ معدہ کی صورت میں منہ میں خشکی ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، دہانی ڈکاریں آتی ہیں، فمِ معدہ پر سرد تہا بیر اختیار کرنے اور بارش یا رگور دنی طور پر لینے سے درد میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

غلبہ خلط صفراوی میں مذکورہ علامات کے ساتھ ذائقہ تلخ ہوتا ہے زبان زرد ہو جاتی ہے اور پیشاب میں سوزش اور سرخی ہوتی ہے۔ پانخانہ کے وقت بھی سوزش کا احساس ہوتا ہے۔

غلبہ بلغم میں شکم سیری کے وقت فمِ معدہ پر درد ہوتا ہے، آنکھوں/پہوٹوں اور چہرے پر بھی علامات موجود ہوتی ہیں۔ بلغمی تھے ہوتی ہے۔

ریاح کی صورت میں ڈکاریں آنے اور ریاخ خارج ہونے سے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح درد میں شدت کے بعد اچانک تخفیف ہو جاتی ہے۔

دیگر اسباب کی صورت میں تقدمہ کے طور پر ان کی سرگزشت ملتی ہے۔

شدید صورتوں میں غشی اور برد اطراف ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے،

تفریقی علامات

قرحہ معدہ Gastric Ulcer	وجع الفواد Cardialgia
۱۔ عام طور سے قلت الدم کی روئیداد ملتی ہے۔	۱۔ عام طور سے وجع العصب کی روئیداد ملتی ہے۔
۲۔ غذا لینے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	۲۔ غذا لینے سے درد میں اضافہ نہیں ہوتا۔
۳۔ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے	۳۔ زور سے دبائے سے بھی درد میں اضافہ نہیں ہوتا۔
۴۔ عام طور سے قی الدم ہوتی ہے۔	۴۔ قی الدم نہیں ہوتا، بلکہ غلبہ بلغم کی صورت میں بلغمی تھے خارج ہوتی ہے۔

۵۔ خلل معدی کی علامات عام طور سے ۵۔ خلل معدی ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔
مرض کے حملہ کے وقت پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج :-

- ۱۔ غلبہ حرارت کی صورت میں تعدیل مزاج کریں اور مقویات معدہ استعمال کریں۔
- ۲۔ حسب ضرورت تکبید کریں۔
- ۳۔ مقویات استعمال کرائیں، ملینیات دیں/کاسرات استعمال کرائیں۔
- ۴۔ وجع المعدہ کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج :

- ۱۔ غلبہ حرارت کی صورت میں زرشک، بہدانہ، کو عرق گلاب، عرق بید سادہ
ہیں پس کر چھان کر سکجبین ملا کر نوش کرائیں۔
- ۲۔ گائے کے دہی کا پانی برف میں سرد کر کے نوش کرائیں۔
- ۳۔ طباشیر کمود، ہیل خورد ہر ایک اگر ام، مربی بہ میں ملا کر چٹائیں۔ اور
شربت انار اور عرق بید سادہ نوش کرائیں۔
- ۴۔ زلال تر ہندی، آلو بخارا، گلفند اور عرق گلاب سے طبیعت کی تلیس کریں،
- ۵۔ فشی میں حسب حالت با سلیق کی فصد کھولیں، سنگھیاں کھینچیں اور پاشویہ
کریں۔ اطراف کو خوب ملنا، پنڈلیوں پر پچھنے اور شانوں کے درمیان سنگھیاں کھینچنا بھی
سود مند ہے۔
- ۶۔ ہوش میں آ جانے کے بعد تخم ترب، تخم ثبت، تخم خریزہ ہوزن کو پانی
میں جوش دے کر شہد سے شیریں کر کے نوش کرائیں اس سے تے ہو جائے گی۔ اس کے بعد
مصلیٰ رومی نبات سفید ہم وزن کو عرق گلاب میں جوش کر کے چھان کر نوش کرائیں۔
- ۷۔ غلبہ بلغم کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱ :-

گل سرخ، زنجبیل، فلفل، زراوند طویل، دارچینی، اسارون، ہر ایک ۱۲ گرام، مصلیٰ

زرنباد، ایون، پودنیہ، ہر ایک ۶ گرام، جند بیدستر ۳ گرام تمام دواؤں کو کوٹ کر شبہد خالص، گلقد ہر ایک ۲۰ گرام کے ساتھ معجون بنائیں اور ۴ گرام کھلائیں۔
نسخہ ۱۔

زنجبیل بے ریشہ کو باریک کر کے بکری کے دودھ میں اقراص بنائیں اور روغن زرد میں بھون لیں جب سرخ ہو جائے تو باریک کر لیں اور ۵۰ گرام کو سنائے کمی ۹۵ گرام، قرفل، مصطلی ہر ایک ۴ گرام کے ساتھ ملائیں اور کسی قدر نبات سفید ملا کر کوٹ کر ۵۰ گرام، ہمراہ پانی استعمال کر لیں۔

۔۔۔۔۔ بلغمی ریکی صورت میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

سہاگہ بریاں، حلیت بریاں ہر ایک ۳ گرام، نمک سیاہ ۴ گرام، دار فلفل ۶ گرام، نوشادر، نمک لاہوری، ہر ایک ۱۲ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں اور ۲ گرام استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

حلیت اگرام، پانی میں حل کر کے نوش کرائیں / مصطلی ۳ گرام پس کر گلقد ۱۲ گرام ملا کر کھلائیں اور بادیان ۱۲ گرام، گلقد ۵ گرام، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

فاریقون مدبر ۱۲ گرام، مصطلی رومی اگرام، نبات سفید حسب ضرورت۔ تمام دواؤں کو عرق گلاب میں جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں یا بادیان، معتز فارسی ہر ایک ۶ گرام، انیسون ۳ گرام، عرق گلاب ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیکر مل چھان کر شربت دینار ۲۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

عبر اصلی۔ روزانہ ۳ یوم تک کھلائیں۔
۔۔۔۔۔ خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ حیات بھی وجع الغواہ میں مفید ہیں۔
نسخہ ۱۔

حلتیت ۱۲۵ ملی گرام، مویز منفی اعداد ——— حلتیت کو مویز منفی میں رکھ کر پانی کے ساتھ ٹھکنے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ۱۔

پودینہ، اصل السوس ہر ایک ۶ گرام ——— دونوں کو پانی ۱۳۵ ملی لیٹر میں جوش دیں
مل چھان کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گل سرخ، بادیان، ہر ایک ۴ گرام ——— دونوں کو ۱۶۰ ملی لیٹر پانی میں جوش
دے کر چھان کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

ست پودینہ، ست اجوائن، ست کافور ہموزن، ——— تمام دواؤں کو ایک
شیشی میں محفوظ کر لیں اور ۵ قطرہ۔ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

موم ۳۷۵ ملی گرام، حلتیت ۱۲ گرام، حلتیت کو باریک کر کے موم میں ملا کر پتے کے
برابر گولیاں بنائیں اور آگونی ہر آہ آب تازہ کھلائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

نمک، بھوس، اجوائن ہم وزن، پوٹلی میں باندھ کر توے پر گرم کر کے مقام درد کی
تکمید کریں، وجع الفواد ریجی میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

صندل سرخ، سماق، طاسشیر، گل سرخ ہم وزن ——— تمام دواؤں کو عرق گلاب میں
پیس کر لعاب اسپنغول ملا کر معدہ پر ضا د کریں۔ ——— وجع الفواد حار میں مفید ہے۔

نسخہ ۲۔

مصطلک روی، زرنباد، د ترکی، دارچینی ہم وزن ——— تمام
دواؤں کو عرق گلاب میں باریک کر پیس کر نیم گرم کر کے معدہ پر ضا د کریں، ریجی
میں مفید ہے۔


نسخہ ۱۔ مصلیٰ ۲ گرام ، باریک پس کر روغن بابونہ میں ملا کر نیم گرم مالش کریں۔

التهاب معدہ

GASTRITIS

اس مرض میں معدہ کی غشاء مخاطی اور اس کے غد میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے غشاء مخاطی دبیز، سخت اور خاکستری رنگ کی ہو جاتی ہے، کم دیش سفید رنگ کی غلیظ رطوبت رستی رہتی ہے، اور بعض حالات میں معدہ بھی پھیل جاتا ہے،

اقسام:



اسباب:

۱۔ التهاب معدہ حاد۔

امراض معدہ و امعاء۔

۲۔ قروح معدہ

۳۔ سرطان معدہ

۴۔ تمدن / اسل معدہ

۵۔ کسی خارجی شئی کا معدہ میں اتفاقیہ پہنچ جانا۔

متعدی امراض :-

- (I) ہیضہ
- (II) خناق و بانی
- (III) خسرہ
- ادویات/سمیات :-
- (I) کثرت ے نوشی
- (II) سنگیہ
- (III) فاسفورس
- (IV) پوٹاس
- (V) تیزاب نمک
- (VI) تیزاب شورہ
- (VII) کاشک سوڈا
- (VIII) آیوڈین
- (IX) تانبہ
- (X) قلیل المدت اختاری تبدیلیاں

Fermentative Changes

متفرقات :-

- (I) حمی قرمزیه
- (II) انفلوئنزا بطنی
- (III) نفرس
- (IV) وجع المفاصل
- (V) لایزہ مادوں کا نکلنا
- (VI) امراض کلیہ
- (VII) امراض قلب
- (VIII) امراض کبد
- غذائی بے اعتدالی :-

خراب اور ثقیل غذاؤں کا بکثرت استعمال
 ۱. ترش، شیریں اشیاء کا بکثرت استعمال
 ۲. مصالحات کی زیادتی

۳. بسیار خوری

۴. الب، التهاب معدہ مزمن۔

۵. امراض معدہ و امعاء

۶. قروح معدہ

۷. سرطان معدہ

۸. تدرن / سل معدہ

۹. دائمی قبض

۱۰. غذائی بے اعتدالی۔

۱۱. ثقیل، نفاخ، ترش اور شیریں غذائیں لینا۔

۱۲. چائے، شراب، تمبوہ اور اسی طرح کے دوسرے مشروبات کی زیادتی۔

۱۳. اخلاط۔

۱۴. اخلاط اربعہ میں سے کسی ایک کی بے اعتدالی

۱۵. متفرقات۔

۱۶. امراض قلب

۱۷. امراض کبد

۱۸. امراض ریہ

۱۹. امراض فم و مری / دانت کی خرابی

۲۰. نفرس

۲۱. وجع المفاصل

۲۲. آتشک

۲۳. سوء القنیہ

۲۴. امراض اعصاب / انفعالات نفسانی۔

۱. منع اعصاب
 ۲. رنج و غم
 ۳. کھانا کھانے کے فوراً بعد سخت دماغی محنت
 ۴. فکر و پریشانی کی حالت میں جلد جلد کھانا کھانا
 ۵. غذا لینے کے فوراً بعد جماع کرنا

علامات:

۱. التهاب معدہ حادہ

معدہ میں حرارت، سوزش اور درد ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، غذا لینے کے بعد شکم کو دبانے یا کھانسنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھوک میں کمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، کرب معدی، متلی اور تھکے کی شکایت ہوتی ہے، کبھی قبض اور کبھی اسہال ہوتا ہے، کثرت لعاب دہن یا منہ میں نرش پانی آتا ہے۔ زبان گدلی یا سرخ ہوتی ہے، کمزوری درد سر ہوتا ہے، پیشاب کم مقدار میں خارج ہوتا ہے، چربی یا غذاؤں کی خواہش ہوتی ہے خلوہ معدہ میں ڈکاریں آتی رہتی ہیں نبض سریع / بلی صغیر ہوتی ہے۔

التهاب معدہ کما حد کی صورت میں (تیزابی سمیات) معدہ میں سوزش اور شدید درد ہوتا ہے، بار بار نلے آتی ہے اس میں خون بھی آسکتا ہے، معدہ کے اندر آسٹر کرنے والی غشاء مخاطی کے ٹکڑے بھی تھے میں خارج ہو سکتے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے اور نہایت سرد پانی پینے سے کسی قدر تسکین ہوتی ہے، مرض کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات ہاتھ پیر سرد پڑ جاتے ہیں۔

التهاب معدہ حاد عام طور سے ۳-۶ یا زیادہ سے زیادہ ۸-۱۰ دن میں ختم ہو جاتا ہے، موت شاذ و نادر ہوتی ہے، تاہم کئی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔

ب. التهاب معدہ مزمن

یہ نسبتاً کثیر الوقوع صورت ہے، اس میں معدہ کی غشاء مخاطی، بالخصوص بولاب کے قریب دبیز ہو جاتی ہے، دبازت مقامی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ معدہ کے مقام پر میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، غذا لینے کے بعد درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، شکم میں

تناؤ ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے فم معدہ میں تکلیف ہوتی ہے، سویرہم، متلی، تے، پیاس کی شدت، سویرہم، بھوک میں کمی وغیرہ علامات موجود ہوتی ہیں، زبان کا درمیانی حصہ گدلا اور کنارے سرخ ہوتے ہیں، ہتھیلی اور تلوؤں میں جلن ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے منہ میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ پیشاب سرخ رنگ کا، قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، جلد میں بھست، ہستی، ماندگی، بے خوابی، درد سر، ضعف، سینہ میں سوزش، اختلاج، معمولی بخار، وغیرہ علامات ملتی ہیں، منہ سے بکثرت لعاب خارج ہوتا ہے۔

عام طور سے اس صورت میں وریڈوں میں سدہ پیدا ہو جاتا ہے یا معدہ کی دیوار میں ریشہ دار ساخت پیدا ہو جاتی ہے، مزمن سویرہم اور استرخاء معدہ بھی ہو سکتا ہے۔ التهاب معدہ حاد/مزمن کا سبب اگر غلبہ اغلاط ہو تو ان کی مناسبت علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ التهاب معدہ دموی میں کم و بیش بخار ہوتا ہے، پیاس سے ساتھ بے چینی ہوتی ہے، بھوک بالکل زائل ہو جاتی ہے، صغراوی صورت میں مذکورہ علامتوں کے ساتھ نفع شکم بھی ہوتا ہے، یعنی صورت میں بخار خفیف ہوتا ہے، قہقہ کی کثرت ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، زبان سفید، چہرہ پر تہج پیدا ہوتا ہے، سوداوی صورت میں آنکھوں میں خشکی ہوتی ہے، جسم کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، فاسد خیالات کا غلبہ ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

انتہاب معدہ حاد Acute Gastritis	انتہاب معدہ سمی Toxic Gastritis
۱- علامات کا آغاز شدت سے نہیں ہوتا۔	۱- علامات ابتداء سے ہی شدید ہوتی ہیں۔
۲- علامات مرض غذا لینے کے ایک گھنٹہ کے بعد ہی عام طور سے نمایاں ہوتی ہیں۔	۲- مرض کی علامات عام طور سے ایک گھنٹہ کے اندر ہی رونما ہونے لگتی ہیں۔
۳- منہ، حلق اور مری طبعی حالت میں ہوتی ہے۔	۳- منہ اور حلق میں اجتماع خون ہوتا ہے۔
۴- حرارت زیادہ ہوتی ہے۔	۴- حرارت، طبعی حرارت سے کم ہوتی ہے۔
۵- عام طور سے قبض ہوتا ہے۔	۵- عام طور سے اسہال آتا ہے۔

- | | |
|---|--|
| <p>۶۔ تھے میں خون اور بلغم و فیروزہ شال ہوتے ہیں۔</p> <p>۱۔ تھے کے مادہ میں زہریلا مواد خارج ہوتا ہے۔</p> <p>۸۔ شدید تقاہت اور اطراف کے برد کی شکایت ہوتی ہے۔</p> | <p>۶۔ تھے میں خون شال نہیں ہوتا۔</p> <p>۷۔ تھے کے مادہ میں زہریلا مواد خارج نہیں ہوتا۔</p> <p>۸۔ شدید تقاہت نہیں ہوتی۔</p> |
|---|--|

التهاب باریطون حاد

Acute Peritonitis

- ۱۔ مرض کا آغاز تھے سے نہیں ہوتا۔
- ۲۔ تھے میں عام طور سے سبزی مائل مادہ خارج ہوتا ہے۔
- ۳۔ درد پھیلا ہوا ہوتا ہے
- ۴۔ نفخ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ قبض ہوتا ہے۔
- ۶۔ چہرے پر کرب و اضطراب کے نقوش نمایاں ہوتے ہیں، رخسارے سرخ ہوتے ہیں اور مریض چت لیٹا، پاؤں موڑے پڑا رہتا ہے۔

التهاب معدہ حاد

Acute Gastritis

- ۱۔ علامت کی ابتداء عام طور سے تھے سے ہوتی ہے۔
- ۲۔ تھے میں عام طور سے صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے۔
- ۳۔ درد معدہ تک محدود ہوتا ہے
- ۴۔ نفخ شکم عام طور سے نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو بہت خفیف۔
- ۵۔ امداد کا فعل طبعی ہوتا ہے، بعض اوقات قبض یا اسہال کی شکایت ہوتی ہے۔
- ۶۔ چہرہ زرد ہوتا ہے اور مریض کی کوئی مخصوص وضع نہیں ہوتی۔

اصول علاج:

- _____ اصل سبب مرض کا ازار کریں
- _____ پیاس رفع کرنے کا تدبیر کریں
- _____ غلبہ اخلاط کی صورت میں خلط کی رعایت کے ساتھ فصد کھولیں، سنگمیاں کھینچیں۔

- _____ ملینات استعمال کرائیں
- _____ ملطقات، مفتحات، منبجات اور مقویات استعمال کرائیں۔

علاج:

- _____ غلبہ حرارت کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولیں، دموی خلط کے غلبہ کی صورت میں زیادہ مقدار میں اور غلبہ صفرار کی صورت میں قلیل مقدار میں خون نکالیں۔
- اگر فصد کھولنا ممکن نہ ہو تو دونوں شانوں کے درمیان سنگھیاں کھینچیں، التہاب اگر معدہ کے پچھلی طرف ہو تو معدہ کے اوپر سنگھیاں کھینچنا زیادہ سودمند ہے۔
- _____ پیاس کی تسکین کے لیے عرق مکوہ کو برف سے ٹھنڈا کر کے تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔
- _____ رفع قبض کے لئے مغز فلوس خیار شبز کو زلال تر بندھا، آب برگ منب
- التغلب بسز مروق، آب برگ کا سنی بسز مروق میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- _____ فصد کھولنے کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

گل نیلوفر ۵ گرام، تخم کاسنی ۶ گرام، عرق کاسنی، عرق مکوہ، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، تمام دواؤں کو ان دونوں عرقیات میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر بنات سفید ۳۰ گرام یا شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

_____ غلبہ خلط دموی کی صورت میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

تخم کاسنی، مکوہ، گل نیلوفر، ہر ایک ۵ گرام، اصل السوس مقشر ۶ گرام _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلفند حسب ضرورت سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

زرشک، بہدان، تخم کاسنی نیم کوفتہ، تخم خیار نیم کوفتہ، ہم وزن، غلاب ولایتی ۵ عدد، آلو بخارا ۷ عدد _____ تمام دواؤں کو عرق مکوہ میں بھگو کر مل چھان کر شربت میلو منتر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے، خاکسی ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

شاہتہ، تخم کاسنی، تخم خیار، ہر ایک ۵/۴ گرام، صلب ۵ عدد، تمام دواؤں کو عرق
مکھوہ میں جگھو کر مل چھان کر مغز تخم تربوز اور نبات سفید حسب ضرورت ملا کر لوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صندل سرخ، گل سرخ، رسوت زرد، گل ارمنی ہم وزن، تمام دواؤں کو عرق گلاب
اور عرق مکھوہ میں حل کر کے معدہ پر نیم گرم ضاد کریں۔

نسخہ ۲۔

مغز فلوس خیار شبنم، بالونہ، رسوت زرد، خضلی، ہم وزن، تمام
دواؤں کو آب کشینز سبز مرق میں پس کر روغن گل ملا کر نیم گرم کر کے ضاد کریں۔

نسخہ ۳۔

صندل سفید، سعد کوفی، گل بالونہ، برنجاسف، گل ارمنی ہم وزن، تمام
دواؤں کو عرق برگ مکھوہ سبز مرق میں پس کر نیم گرم ضاد کریں۔
• غلیظ خلط صفراوی میں داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۴۔

تخم خرفہ، مغز تخم کدو، مغز تخم تربوز ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کا شیرہ
پانی میں نکال کر آب برگ کاسنی سبز مرق، آب برگ مکھوہ سبز مرق ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، شربت
انار/ترہندی کا زلال ۲۲ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

مغز فلوس خیار شبنم ۵ گرام، آب برگ کاسنی سبز مرق، آب برگ مکھوہ سبز مرق،
ہر ایک ۲۵ ملی لیٹر میں مل چھان کر روغن بادام شیریں ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۶۔

تخم خرفہ ۵ گرام، کو مادر القرع، آب خیار میں پس کر آب برگ کاسنی سبز مرق ۲۵
ملی لیٹر ملا کر نبات سفید حسب ضرورت سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۷۔

گل سرخ ۶ گرام، تخم خیار، اصل السوس ہر ایک ۳ گرام، سنبل الطیب، زعفران ہر ایک

۶ گرام، گوند کیترا ۵ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی کی مدد سے اقرص بنائیں،
 اور ۳۔۔۔ ۴ گرام ہمراہ آب برگ مکوہ سبز مروق ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
 • خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صندل سرخ، صندل سفید، ہموزن کو عرق مکوہ سبز مروق، آب کاسنی سبز مروق میں پیس کر
 روغن گل ملا کر نیم گرم ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

برج ہارنگ، برج خرفہ، برج خطمی، آرد جو، طحلب، ہموزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو
 پانی میں پیس کر نیم گرم کر کے معدہ پر ضا د کریں۔

نسخہ ۳۔

مکوہ خشک، گل بابونہ، سنبل الطیب، اکیلل الملک، صندل سرخ، ہر ایک ۶ گرام،
 مغز فلوکس خیارشبنہ ۱۲ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو آب برگ مکوہ سبز مروق میں پیس کر نیم
 گرم ضا د کریں۔

• غلبہ بلغم کی صورت میں داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

بیج بادیان، بیج کرفس، تخم کاسنی، پیرائندہ، ہموزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں
 جوش دے کر گلقد سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

بیج بادیان، بیج کرفس، اصل السوس، بیج کاسنی ہموزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو
 آب مکوہ سبز مروق میں جوش دے کر گلقد حسب ضرورت ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

عنب الثعلب، گل بنفشہ، اصل السوس، ہر ایک ۴ گرام، بیج کبر ۵، ۴ گرام،
 بادیان ۶ گرام، تخم کشوٹ ۳ گرام (پوٹلی میں بندھا ہوا)، موزہ منقہ ۱۰ عدد۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو
 پانی میں جوش دے کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز قلوب خیار شبنم ۵ گرام کو آب برگ مکوہ سبز مرق میں مل چھان کر مصطکی، فستقین، سنبلی الطیب، بورہ ارمنی حسب ضرورت حل کر کے نیم گرم معدہ پر ضاد کریں۔

نسخہ ۲۔

اذخر، سنبلی الطیب، سعد کوئی، گل بابونہ ہم وزن، تمام دواؤں کو آب برگ مکوہ سبز مرق میں پیس کر روغن گل ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔

نسخہ ۳۔

جدوار، مرکی، زعفران، صبر زرد، ہموزن، تمام دواؤں کو آب برگ مکوہ سبز مرق میں پیس کر روغن گل ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔

نسخہ ۴۔

سعد کوئی، اذخر، سنبلی الطیب، چوب انگور خاکستر ہودن کو سرکہ میں پیس کر ضاد کریں۔

نسخہ ۵۔

روغن مصطکی اور روغن سنبلی سے تریح کریں۔
• غلیظ سودا کی صورت میں داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آب برگ مکوہ سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق میں عرق بادیان حل کر کے گلقد کے ساتھ شیری میں کریں اور نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

حنبل، القلیب، پرائنڈ، شاہترہ، گل سرخ، تخم کاسنی، تخم خربوز، ہموزن، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر خربت بنووری حسب ضرورت حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

تخم کرنس، انیسون، بادیان ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر بنات سفید حسب ضرورت سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

گل سرخ ۲۵ گرام، سنبل الطیب، اصل السوس مقشر ہر ایک ۱۲ گرام، 'افستین روی' مصطکی ہر ایک ۶ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر آب برگ مکوہ سبز مرق کی مدد سے اقراص بنائیں اور ۳۔۔۔۔۔ ۹ گرام کھلا کر شربت بزوری ۱۸ ملی لیٹر، عرق بادیان ۱۲ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صبر، افستین، سنبل الطیب، سعد کونی ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر نیم گرم ضاد کریں۔
نسخہ ۱۔

سنبل الطیب، صبر، تخم کتاں ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر قیرو طی منز ساق گاؤ، روغن گل، موم سفید میں ملا کر نیم گرم لگائیں۔
نسخہ ۱۔

گل بنفشہ، آرد جو، ہر ایک ۱۰ گرام، گل سرخ ۵ گرام، تخم خطمی، صبر زرد، مرکبی، حصص کی، افستین، زعفران، سعد کونی، انثر، تخم حلبہ ہر ایک ۲ گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب مکوہ سبز مرق، ۶۰ ملی لیٹر، لعاب تخم کتاں ۱۲ ملی لیٹر، روغن گل ۱۳ ملی لیٹر، سرکہ ۱۵ ملی لیٹر ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔
نسخہ ۱۔

اوشنی کا دودھ، بکری کا دودھ، روغن بیدانجیر، روغن لوبان ہر ایک ۶ ملی لیٹر، تمام دواؤں کو ملا کر آگ پر رکھیں، جب تھوڑا سا روغن اڑ جائے تو اجوائی خراسانی، زنجبیل ہر ایک ۴ گرام باریک پیس چھان کر تھوڑا تھوڑا ملائیں۔ جب تمام دوائیں اچھی طرح مل جائیں اور دودھ کی مائیت ختم ہو جائے تو آگ سے نیچے اتار لیں اور نیم گرم ضاد کر کے اوپر سے روئی باندھیں۔
نسخہ ۱۔

شق، جاوشیر، برگ جھاق، جدوار خطائی، گل غافث، صبر زرد، ہر ایک ۳ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو آب برگ مکوہ سبز میں پیس کر روغن گل ۱۲ ملی لیٹر ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔
۔۔۔۔۔ دیگر اسباب کی صورت میں ان کی رعایت سے نسخہ تجویز کریں۔

دبیلۃ المعده

PHLEGMONOUS GASTRITIS

اس مرض میں معدہ میں گرم مواد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان میں ورم اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب:

امراض معدہ و امعاء:

۱. گرم مواد کا معدہ میں اجتماع

۲. التهاب معدہ قسمی

۳. التهاب معدہ مزمن

۴. سورہ مضغ

مستقرقات:

۱. سم انفار/دار چکنا وغیرہ

۲. قرعہ خبیثہ

۳. عفونی بخار

۴. ایام کی خرابی کی وجہ سے نفث الدم

۵. فدائی بے اعتدالی/ترش اشیاء کا بکثرت استعمال

علامات:

ابتداء میں التهاب معدہ کی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد دبیلہ بن جاتا ہے، جس کی

یہ دراصل التهاب معدہ حاد ہی کی ایک نوع ہے جس کو ہم معدہ فلفونی یا صدیہ کہہ جاسکتا ہے۔

جب سے معدہ میں شدید درد، تے، بخار، اور ہڈیاں ہوتا ہے، بعض اوقات بے ہوشی واقع ہو جاتی ہے۔ مکمل مع پائے جانے کی صورت میں بخار اور درد میں افاقہ ہو جاتا ہے تاہم دلیل پھوٹنے وقت لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ روٹھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، براز کے ساتھ پیپہ دھون آمیز مواد خارج ہوتا ہے۔ دست بھی آسکتا ہے۔ پیاس، سوزش اور سقوط اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے پانی نوش کرنے اور ترش اور چٹیشی غذائیں لینے کے بعد شانوں کے درمیان یا عظم القص کے نیچے یا ناف کے اوپر شدید درد ہوتا ہے، بدبودار ڈکاریں آتی ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، ہر حال لرزہ آنے اور براز کے ساتھ صدیدی مواد خارج ہونے کے بعد عوارض میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے

اصول علاج:

- _____ منضبات استعمال کرائیں۔
- _____ فصد کھولیں
- _____ التہاب معدہ حاد کا اصول علاج اختیار کریں۔
- _____ مبروات / مفتحات دیں، اور ردی مواد کو بذریعہ اسہال خارج کرنے کی تدابیر کریں۔

علاج:

_____ داخلی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم کتان، تخم خطی، تخم کنوچہ ہر ایک ۳ گرام _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر
بکری کا دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مار العسل میں رائی تھوڑی مقدار میں ملا کر نیم گرم نوش کرائیں اس سے دلیل پھوٹ جائے گا۔ انجیر اور منق بھی کھلاتے رہیں۔

نسخہ ۳۔

دلیل پھوٹ جانے کے بعد آتش جو یا مار العسل نیم گرم نوش کرائیں یا آب برگ کا سنی سبز

مروق میں ایارج فیقرا حل کر کے تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔
نسخہ ۴

دم الاخوی، گلنار، کھربا، گل سرخ، گل ارمنی، کندر ہم وزن — تمام دواؤں کو
حسب دستور کوٹ چھان کر پانی میں اقراص بنائیں یا اسی کا سفوف ۳۔ ۷ گرام کھلائیں، اندمال
زخم میں بے حد مفید ہے۔
— خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵
تخم حلبہ، تخم کنوچہ ہر ایک ۶ گرام، مغز بادام تلخ ۶ عدد، — تمام دواؤں کو باریک
پیس کر روغن بیدانجیر میں ملا کر ضا د کریں۔

نسخہ ۶
گل بابونہ، تخم خلی، اشتق، مرکبی، اکیلل الملک ہم وزن — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر
نیم گرم ضا د کریں۔

نسخہ ۷
صبر، انستین، اشتق، گوگل ہم وزن — تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر روغن بید
انجیر حل کر کے نیم گرم ضا د کریں۔

نسخہ ۸
کاسنی دشتی، حلبہ، کنوچہ ہم وزن — تمام دواؤں کو کبیری کے دودھ میں پیس کر
روغن کنجد ملا کر نیم گرم ضا د کریں۔

نسخہ ۹
گل سرخ، طباشیر، سماق، صندل سفید، ہر ایک ۲ گرام — تمام
دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ ۶ ملی لیٹر، روغن گل ۳ ملی لیٹر میں ملا کر معدہ پر لیپ
کریں۔

قلق معده

IAC TATION OF THE STOMACH

اس مرض میں معده میں کرب اور قلق محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض بھیڑے نہیں بیٹھتا اور کڑوئیں بدلتا رہتا ہے۔

اسباب:

- (I) ضعف معده
- (II) متلی پیدا کرنے والے مواد کا معده میں اجتماع

علامات:

معده میں شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، چنانچہ جو ہر معده اور قعر معده میں تے آور مواد کے اجتماع کی وجہ سے بے چینی اور فم معده پر مواد کے اجتماع کی وجہ سے متلی آتی ہے اکثر اوقات خفقاں ہو جاتا ہے، چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات سرد و دوار کی شکایت بھی ہوتی ہے۔

اصول علاج:

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- تنقیہ خلط غالب کریں۔
- مناسب غذا رکھیں۔

علاج:

تنقیہ مواد کی غرض سے گرم پانی اور سکجین سے تے کرائیں۔
برودت معده کے لیے شربت سیب یا شربت ہی کے ساتھ آب خیار نوش

کرائیں۔

_____ طباشیر اور قند کے ساتھ جو کاستو استعمال کرائیں۔

_____ کافور، پوست کدو، گل سرخ، مندل کو پانی میں پس کر معده پر ضا د کریں۔

اختلاج معده

اس مرض میں معده میں معده میں اختلاجی حرکت ہوتی ہے، اور اس کی یہ حرکت عضلات کی پھڑکنے کے برخلاف خفقات قلب سے مشابہ ہوتی ہے، جب یہ اختلاجی حرکت قم معده یا معده کے بالائی حصہ میں ہوتی ہے تو قم معده کے تعلق اور قرب و اتصال سے قلب میں خفقاتی کیفیت کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔

اسباب:

امراض معده و امعاء۔

(۱) گرم اور تیز مواد کا معده میں اجتماع

(۲) سرد مواد کا معده میں اجتماع

(۳) دیدان شکم، جو قبض کی حالت میں امعاء پر صفراء کے غیر معمولی ترشح سے

معده میں چلے جاتے ہیں۔

علامات:

معده میں خفقات قلب سے مشابہ اختلاجی حرکت محسوس ہوتی ہے، متلی اور تپتی آتی ہے، قبض ہوتا ہے، امعاء میں درد محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات غشی بھی واقع ہوتی ہے، غلطی اذیت کی صورت میں اس کی مخصوص علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ دیدان کی صورت میں قلب تنفس مسلسل متلی کے ساتھ ساتھ معده میں سرسراہٹ / دغدغہ محسوس ہوتا ہے، معده کو پھوڑنے کی سی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

اصول علاج:

- _____ تنقیہ کی تدابیر کریں
- _____ حقنوں کے ذریعہ تلمین شکم کریں۔
- _____ قاتل و مخرج دیدان ادویہ استعمال کرائیں۔

علاج:

- _____ زیرہ، انیسون، بادیان، مصطلکی رومی کندر، کر دیا کا سفوف بنا کر نبات نعید سے شیریں کر کے کھلائیں۔
- _____ درج ذیل ادویہ کا حقنہ لینے اختیار کریں۔

نسخہ:-

انجیر ۱۰ عدد، سپستاں ۳۰ عدد، عناب ۲۰ عدد، موزہ منقی ۶ گرام، ہابونہ، خار خشک اکلیل الملک، کرنب، شبت، چقندر ہر ایک ۶۰ گرام، سبوس قطعی، ہر ایک ۵۰ گرام، _____ تمام دواؤں کو پوٹلی میں باندھ کر پانی انیٹر ۵۰۰ ملی لیٹر میں جوش دیں جب پانی نصف رہ جائے تو مل چھان کر آب کامہ، پتہ بط ہر ایک ۲ گرام، شکر سرخ ۳۶ گرام، بورق ۵ گرام، روغن نعندہ ۳۶ ملی لیٹر ملا کر نیم گرم کر کے حقنہ کریں۔

_____ دیدان کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

سرخ، باؤ بڑنگ مقشر ہر ایک ۵ گرام، تربد موصوف، مقل ازرق ہر ایک ۸ گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد ملا کر استعمال کرائیں، ملحوظ رہے کہ یہ ایک خوراک ہے۔

نسخہ:-

صبر، شحم منقل، شونیز، انستین، زہرہ گاؤ، آب برگ شفتالو _____ تمام دواؤں سے حسب دستور شافہ بنا کر کام میں لائیں۔

_____ دیدان کے مزید نسخے دیدان معاصر کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

خارشِ معدہ

PRURITIS OF THE STOMACH

اس مرض میں معدہ میں خارش اور دغدغہ محسوس ہوتا ہے، اور مریض مضطرب و پریشان دکھائی دیتا ہے۔

اسبب:

امراضِ معدہ و امعاء۔

- ۱. تیز اور چرپرے مواد کا معدہ پر ترشح
- ۲. معدہ کی اندرونی سطح کی چھوٹی چھوٹی پھینیاں
- ۳. قبض
- ۴. اسہال
- ۵. متفرقات:-

- ۱. ثقیل غذاؤں کا استعمال
- ۲. خارش پیدا کرنے والے جراثیم۔

علامات:

معدہ میں خارش، جلن اور دغدغہ ہوتا ہے، بعض اوقات متلی اور تے بھی آجاتی ہے، درد ہوتا ہے، براز میں غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے۔

اصول علاج:

تھقیہ مواد کریں۔

۱۔ دغدغہ معدہ بھی کہتے ہیں۔

۔۔۔۔۔ مقویات معدہ استعمال کرائیں

طلاج:

مقویات معدہ کے لیے نصیحت معدہ میں مذکورہ مقوی ادویہ استعمال کرائیں۔

حرقت معدہ

HEART BURN

اس مرض میں معدہ کی اندرونی فشار مخاطی میں انتہائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، شدید عوارض کی صورت میں خراش اور قروح بھی ہو سکتے ہیں۔

اسباب:

امراض معدہ و امعاء:-

1. فم معدہ میں کسی خام رطوبت کا بند ہو کر حرارت کے زیر اثر ترش ہو جانا
2. فم معدہ کی طرف طحال کا نہایت ترش اور تیز سودا دفع کرنا۔
3. حموضت معدہ کی زیادتی
4. سوراخ مزمن

عصبی عوامل:-

1. عصبی ہیجان / غصہ، چڑچڑاپن

2. رنج و غم۔

3. تفکرات

خدائی بے اعتدالی:-

1. فساد غذا / خام ثقیل غذاؤں کا استعمال
2. ترش اشیاء / رنگ مرچ، مصالحہ، اچار، چٹنی وغیرہ کا بکثرت استعمال
3. غذا کا وقت سے نہ لینا۔

۱۲. چائے، کافی، کثرت سے نوش کرنا۔

ادویات / منشیات۔

۱۳. ترشی پیدا کرنے والی دواؤں کا استعمال

۱۴. تمباکو خورانی، سگریٹ نوشی۔

۱۵. کثرت سے نوشی۔

متفرقات۔

۱۶. جگر کے بعض امراض۔

علامات:

معدہ میں سوزش اور جلن ہوتی ہے، جو غم معدہ پر ہونے کی صورت میں قلب تک کو متاثر کر دیتا ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، انفع شکم ہوتا ہے، ترش تھوک آتا ہے، ترشی کا اثر خون میں ہو جانے کی صورت میں تمام جسم میں شدید جلن، بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، بعض اوقات معدہ میں ریاحی نوعین کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ خفیف درد سرا، قبض اور اسہال ہوتا ہے، سہمہم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔

اصول علاج:

_____۔ مقیات کھلائیں / نوش کرائیں

_____۔ فصد کھولیں

_____۔ قبض کی صورت میں ملینات استعمال کرائیں۔

_____۔ مقویات معدہ استعمال کرائیں

_____۔ ضما درکھیں

علاج:

_____۔ سوداوی مواد کی انصہاب کی صورت میں اسیلیم یا اسلیق کی فصد کھولیں۔

_____۔ خدائے مغلط کی صورت میں تھکے کرائیں چنانچہ آب برگ، ترب، شہداد

پانی ملا کر نوش کرائیں اس کے بعد حلق میں پھریری کریں تاکہ تے ہو جائے۔
 • داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

عرق گلاب ۱۷۵ ملی لیٹر میں شربت انارین ۳۵ ملی لیٹر ملا کر تخم کنوچہ ۴ گرام چھڑک کر
 نوش کرائیں، سور مزاج حار میں مفید ہے۔

نسخہ ۲۔
 لعاب اسپنول، عرق گلاب میں نکال کر شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں۔
 نسخہ ۳۔

بکری کا دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں آب انارین تازہ ۷۵ ملی لیٹر، نبات سفید حسب ضرورت
 حل کر کے نوش کرائیں۔
 نسخہ ۴۔

آب انار، آب سیب ہم وزن میں شربت نیلوفر یا حصہ ملا کر نوش کرائیں۔
 نسخہ ۵۔

ختمش سفید، تودری سفید ہر ایک ۱۰ گرام، کنجد سفید ۳۵ گرام، شکر طبرزد ۵۰ گرام،
 تمام دواؤں کو باریک کر کے ۱۔ ۲ گرام کھلائیں اور اوپر سے عرق بادیان یا شربت
 انارین ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
 نسخہ ۶۔

ہیل خورد، طباشیر، پودینہ خشک، زیرہ سفید بریان، بادیان، گل سرخ، ہر ایک
 ۶ گرام، تمام دواؤں کا سفوف بنا کر شکر سفید ۳۵ گرام ملا کر ۶ گرام، ہمراہ آب تازہ
 دن میں دو مرتبہ استعمال کرائیں۔ عرق معذہ کے قبض میں مفید ہے۔

نسخہ ۷۔
 کنجد سفید، نبات سفید کھلانے کے بعد روضی کنجد ۳۵ ملی لیٹر نوش کرائیں، کثرت سے نوش
 کی وجہ سے عارض ہونے والے حرقت معذہ میں مفید ہے۔
 • خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۸۔

گی سرخ، مصطکی، ہر ایک ۳ گرام، صبر زرد، مرکی، ہر ایک ۲ گرام، پھرائتہ ۶ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پس کر قیر و ملی موم خام اور روغن گل میا ملا کر معدہ، نف معدہ پر ضاد کریں۔ نسخہ ۱۔

صندل سفید، مصطکی، عود، کندر، زرگی، ہمزون — تمام دواؤں کو عرق کلاب میں پس کر روغن گل ملا کر معدہ پر ضاد کریں۔

قروح معدہ

GASTRIC ULCERS

اس مرض میں بواب (Pylorus) کے پاس، معدہ کی پچھلی دیوار میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ابتداء میں معدہ کی چھوٹی چھوٹی شرائین مسدود ہوتی ہیں اس کے بعد رطوبت معدی (Gastric Juice) کی تیزی یا غیر منہضم غذا کی وجہ سے فشار و غلاظی میں زخم پڑ جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ عضلی طبقہ اور بیرونی حصہ میں بھی پھیل جاتے ہیں، یہ زخم گول یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں، اور شاذ و نادر میں معدہ کی اگلی دیوار پر بھی اس طرح کے زخم ہوتے ہیں۔

اسباب:

امراض معدہ و امعاء۔

۱، سوہضم مزمن

۲، التهاب معدہ مزمن

۳، معدہ کی شرائین میں سکہ پڑ جانا

۴، معدہ کے عضلات کا مقامی تشنج

۵، شکم کے عضلات پر زور پڑنے والا پیشہ (شلا حملی / بار برداری)

متفرقات۔

۱، بعض اطباء اس کی دو اقسام ۱، حاد ۲، مزمن کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا پیرا کرشیجہ

۱. غذائی بے افدالی / مکی شری اور ثقیل غذاؤں کا استعمال
 ۲. اکال محسوس
 ۳. ایام کی خرابی کی وجہ سے نفث الدم
 ۴. حمیات عفونیہ
 ۵. حاد / اکال / اخلاط کا غلبہ یا انصباب

علامات:

حاد:

یہ صورت عورتوں میں ۲۰۔۳۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے، اس میں قروح چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، شدید نوعیت کا ایک ہی مقام پر چھپیدتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے، غذائینے کے بعد درد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، درد کا دائرہ اثر عظم القفس (Sternum) کے نیچے اور نرم معدہ پر ہوتا ہے جس کی ٹیسس پشت اور پبلیوں تک پہنچتی ہیں، لیکن فوراً ہی تپے ہو کر غذا جب معدہ سے خارج ہو جاتی ہے تو درد میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یک بیک خون آمیز تپے ہوتی ہے، اشتہار میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن غذائینے کے بعد کی تکالیف کا تصور کر کے مریض غذائینے سے استرازا کرتا ہے، قبض ہوتا ہے، لازمی غذا کی مقدار نہ لینے کی وجہ سے ضعف، لاغری اور سوراخ فیہ وغیرہ عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، برد اطراف اور حسر التنفس ہو سکتا ہے۔

مزمن:

اس صورت میں عام طور سے قرح صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ مردوں میں ۲۰۔۵۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے، دائمی قبض اور مزمن ضعف ہضم کی شکایت ہوتی ہے، غذائینے کے ۲۔۳ گھنٹے بعد شکم بے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے، ویسے بھی ہمہ وقت میٹھا میٹھا درد ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات معدہ کی بڑی شریان کے انشقاق سے خالص دھوی تپے ہوتی ہے اور کبھی براؤ کے ساتھ سیاہی مائل خون خارج ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

التهاب معده مزمن	قروح معده
۱۔ بالغ اور عمر دراز مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔	۱۔ بالغ لوگوں خاص طور سے عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔
۲۔ مرض کا سبب قلب، کبد یا کلیہ ہوتا ہے	۲۔ مرض ابتدائی حیثیت رکھتا ہے۔
۳۔ غذا لینے کے بعد درد میں خفیف اضافہ ہوتا ہے۔	۳۔ غذا لینے کے بعد درد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔
۴۔ معده کو زیادہ دبائے سے درد میں خفت پیدا ہوتی ہے۔	۴۔ معده کو زیادہ دبائے سے درد میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔
۵۔ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔	۵۔ پیاس مفقود ہوتی ہے۔
۶۔ زبان پر سفید فرجی ہوتی ہے۔	۶۔ زبان سرخ اور چمکدار ہوتی ہے۔
۷۔ تے الدم شاذ و نادر ہوتی ہے۔	۷۔ تے الدم عام طور سے ہوتی ہے۔
۸۔ تے عام طور سے طبعی ہوتی ہے اور ریح کے وقت کثیر الوقوع ہے۔	۸۔ تے، غذا لینے کے بعد ہوتی ہے۔
۹۔ لاغرا جلد نہیں ہوتی۔	۹۔ لاغری اور ہزال بڑی سرعت سے ہوتا ہے

تفریقی علامات

قروح اثنا عشری	قروح معده
۱۔ بظاہر صحت مند لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔	۱۔ ضعیف اور سوء الحظیہ والی عورتوں میں ۲۰-۳۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے
۲۔ غذا لینے کے ۲-۳ گھنٹے بعد دہلیز قسم تحت النظار لین میں شدید درد ہوتا ہے۔	۲۔ قسم شراب سیفی میں، غذا لینے کے فوراً بعد شدید درد ہوتا ہے۔
۳۔ یکایک شدید براز الدم ہوتا ہے، ویسے تے الدم بھی ممکن ہے۔	۳۔ یکایک تے الدم ہوتا ہے ویسے براز الدم بھی ممکن ہے۔

اصول علاج:

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- منجحات، منقحات یا مملات استعمال کرائیں
- مدرات اور ملیحات کے ذریعہ تنقیہ مواد کریں۔

علاج :

- داخلی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گل ارمنی، دم الاخوین، گلنار، کندر ہر ایک انگرام — تمام دواؤں کو بالکل باریک پس کر شربت انجہار ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔

نسخہ ۲۔

دم الاخوین، کہربا، گل ملتان، گل ارمنی ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک پس کر ۲ گرام، شربت خشخاش ۱۲ ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں۔

نسخہ ۳۔

گلنار، گل سرخ، دم الاخوین، کندر، کہربا، سنگراحت ہم وزن — تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے ۳ گرام، رب بھی یا رب سیب حسب ضرورت میں ملا کر صبح، دوپہر، شام کھلائیں۔

نسخہ ۴۔

کتیرا، گل سرخ، گلنار، ریش برگد، اتاقیا، کہربا، زعفران، حب الّاس، صمغ عربی، ہر ایک ۳ گرام، خشخاش ۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر آب سماق کی مدد سے ۲ گرام کی اقراص بنائیں۔ اور سایہ میں خشک کر کے حسب ضرورت ۲ قرص ہمراہ سرد پانی کھلائیں، ماباد اصل تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

- خارجی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵۔

مردار سنگ، ہم گرام، سفیدہ کا شغری ۲ گرام، زعفران، افیون، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، قیروطی روغن گل، اور موم خام میں ملا کر معدہ پر لگائیں۔

نسخہ :-

صندل سرخ، گلنار اعلیٰ ارمنی، رسوت زرد، آقا قیا ہم وزن — تمام دواؤں کو
آب برہی گلاب میں پس کر خاد کریں۔

استرخار معدہ

GASTROPTOSIS

اس مرض میں معدہ کی ساخت یا اس کو دیگر اعضاء سے باندھنے والے رباطات
میں استرخار پیدا ہو جاتا ہے، اور معدہ کی قوت دفعہ میں نمایاں طور پر ضعف پیدا
ہو جاتا ہے۔

اسباب :

امراض معدہ و امعاء :-

1. سوزہیم مزمن۔

2. معدہ / زائدہ امور کا غلط آپریشن

3. معدہ میں فاسدرطوبوں کا اجتماع۔

4. معدہ کی رباطات کا استرخار

5. ورم معدہ مزمن۔

متفرقات :-

6. حیات حادہ

7. دماغی و جسمانی محنت

8. عفونت ساریہ

9. زہا بیطسی قوما

10. حمی معویہ

11. حاد سمی امراض

غذائی بے اعتدالی / پر خوری / رد غنی، زیادہ شیریں اور لزج اشیاء کا بکثرت استعمال	(۱۵۶)
شراب نوشی	(۱۵۷)
نزله و ہائیمہ	(۱۵۸)
وجع المغاصل	(۱۵۹)
ضعف، اعصاب	(۱۶۰)
فقر الدم	(۱۶۱)
سل ریوی / دق	(۱۶۲)
عام ضعف	(۱۶۳)
سرطان	(۱۶۴)
قروح	(۱۶۵)
کبد کا خارجی دھاؤ۔	(۱۶۶)

علامات :-

رطوبی مواد کے معدہ میں اجتماع کی صورت میں استرخا ہوتا تو معدہ ضعیف ہو جاتا ہے
فسلہ سہم کی شکایت ہوتی ہے، سید آگے کی طرف ابھرا ہوا اور پشت دب جاتی ہے، رباطات
کے مسترخی ہو جانے کی صورت میں، جس طرف کا رباط ڈھیلا ہو جاتا ہے اس کی مقابل جانب
بوجھ محسوس ہوتا ہے، چنانچہ اوپر کے رباط کے مسترخیا ہونے پر معدہ نیچے کی طرف ٹکٹا ہے
اور ان کے مقام پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پیچھے کے رباط کے مسترخیا ہونے کی صورت میں
معدہ آگے اور پیچھے کی طرف، دائیں طرف کے رباط کے مسترخیا ہونے پر بائیں جانب بوجھ محسوس
ہوتا ہے، اور اس کے برعکس صورت میں دائیں طرف بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

معدہ کی قوت دافعہ کمزور ہو جاتی ہے مقام ناف پر درم محسوس ہوتا ہے، بواب
بے بند ہو جانے کی صورت میں معدہ کے اندر دفاعی حرکت دودیا ہوتی ہے۔ اور آگے کے
ججاری کے انسداد کی وجہ سے غذا امعاء میں نہیں جاسکتی، اور بالعموم دوسرے تیسرے دن،
جھاگ دارتے ہو جاتی ہے، ریاح، درد شکم اور قبض ہوتا ہے، وزن میں کمی واقع ہونے
الگتی ہے۔ سستی، ماندگی اور غنودگی ہوتی ہے، جلدی شور و نما ہوتے ہیں، تسم دلموی

کی علامات پائی جاسکتی ہیں۔

اصول علاج:

- فالح اور استرخار کا اصول علاج اختیار کریں۔
- دلک کریں،
- قابض اور خوشبودار دوائیں استعمال کرائیں۔

علاج:

- بہمن سرخ، صندل سرخ، صندل سفید، کشنیز بریاں، حب الّاس، پودینہ، پوست پستہ (بیرون)، پوست اترج، پوست بلیہ زرد، ہر ایک ۵ رس گرام، پوست سنگدانہ، مرغ خانگی، طباشیر ہر ایک ۹ گرام، گل سرخ ۵ رس گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شربت فواک کے ساتھ حسب دستور معجون بنائیں اور ۷۔۱۲ گرام کھلائیں۔
- عود ہندی ۵ رس، انگرام، قرفل ۵ رس، انگرام، قافلہ صغار، قافلہ کبار، سنبل الطیب ہر ایک ۷ گرام، زعفران ۵ رس گرام۔ تمام دواؤں کو ہر ایک پس کر، شہد خالص تین گنا میں ملا کر ہر ایک مناسب مشروب ۱۲ گرام کھلائیں۔
- بلیہ، بلیہ، فلفل سیاہ، فلفل دراز، زنجبیل، سعد کوفی، سنبل الطیب، شیطرج ہندی، ہر ایک ۵ رس گرام، تخم گندنا، تخم شبت ہر ایک ۱۲ گرام، غبث الحدید بدبر ۳۰ رس گرام، شہد خالص کف گرفته ۳ گنا، روغن گاؤ، حسب ضرورت، آخر الذکر دونوں دواؤں کے ملاوہ دواؤں کو ہر ایک پس چھان کر آخر الذکر دونوں دواؤں میں حسب دستور جوارش تیار کریں اور ۷۔۹ گرام کھلائیں۔
- پوست اندرون سگ، دانہ مرغ پروردہ (خانگی) کو گوشت سے علیحدہ کر کے خشک کریں اور ہر ایک پس کر حسب ضرورت ۳ گرام، اطریفل کبیر، گرام میں پیٹ کر خربت حب الّاس ۲۵ ملی لیٹر کے ہمراہ نوش کرائیں۔
- گل سرخ ۵ رس، ۲۲ گرام، گنار، مصطکی ہر ایک ۵ رس گرام، فسنجین، صبر، ہر ایک ۹ گرام، سنبل الطیب، قرفل، سعد کوفی ہر ایک ۸ گرام۔ تمام دواؤں کو ہر ایک

- ہیں کرمق گلاب میں حل کر کے معدہ پر ضا د کریں۔
 —۔۔۔۔۔ جوز السرو، مازو، ترمس، حب الاس ہم وزن — تمام دواؤں کو آب
 برقی سرو میں باریک پیس کر معدہ پر ضا د کریں۔
 —۔۔۔۔۔ روغن مصطکی، روغن نارون کی معدہ پر ماش کریں۔
 —۔۔۔۔۔ فالج اور استرخار میں مذکور دوائیں استعمال کرائیں۔

انقلاب معدہ

INVERSION OF THE STOMACH

اس مرض میں معدہ کا، غذا کو نیچے کی طرف دفع کرنے کا طبعی فعل انجام پذیر نہیں ہوتا
 اور وہ منہ کی طرف لوٹ کرتے کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

اسباب؛

۱۔ اثنا عشری اور صائم کی خراش۔

علامات؛

شکم میں سوزش اور درد ہوتا ہے، تشرش اور چرپر پری اشیاء کے استعمال سے درد اور
 سوزش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منہ کے راستے غذائی مادہ خارج ہوتا ہے، خراش کی صورت میں
 تے کے ساتھ قشور بھی خارج ہوتے ہیں۔

ایلاؤس	تفسیریاتی علامات	انقلاب معدہ
Ileus		Inversion of the Stomach
۱۔ تے میں بدبودار پاخانہ خارج ہوتا ہے۔		تے میں غذائی مادہ خارج ہوتا ہے

یہ دراصل امعاء کی بیماری ہے لیکن جن امعاء میں واقع ہوتی ہے وہ معدہ سے کسی قدر
 قریب ہیں اگلے اطباء نے معدہ کے امراض میں بیان کیا ہے۔ (مؤلف)

جس میں بدبو نہیں ہوتی

کیونکہ خلاصہ کیلو س عروق ماساریعہ کے ذریعہ
جذب ہو چکا ہوتا ہے اور فضلہ بچ رہتا
ہے، جو بلاشبہ برا ہے۔

۲۔ سوزش اور درد میں اضافہ نہیں ہوتا

۲۔ ترش اور چرہ پر غلغلہ سے سوزش

اور درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ تھے میں غذائی مادہ کے ساتھ اعداد کے

قشور بھی خارج ہوتے ہیں۔

۴۔ تھے میں قشور خارج نہیں ہوتے۔

اصول علاج؛

۱۔ لیسہ دار ادویہ و اغذیہ استعمال کرائیں

۲۔ خلبہ اخلاط کی صورت میں منفعیات اور مسہلات استعمال کرائیں۔

۳۔ سچ اعداد کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج؛

۱۔ بہدانہ، ریشہ خطمی، ہرایک ۶ گرام کا آب مکوہ بنز مروق ۵، ۱۰ ملی لیٹر میں

عاب نکال کر لگی ارمنی، گل ملانی ہرایک ۲ گرام باریک پس کر چھڑک کر نوش کرائیں، دونوں گل
کی بجائے سبوس اسپنول بھی چھڑکنا سودمند ہے۔

۲۔ تخم بارتنگ بریاں، تخم ریحاں، اسپنول مسلم تمام دواؤں کو روغن بادام

شیریں میں چرب کر کے عرق مکوہ کے ساتھ نوش کرائیں۔ (پھنکائیں)

۳۔ تخم ریحاں مسلم، کیترا، تخم کنوچہ ہم وزن، گل ملانی، نصف حصہ، سبوس

اسپنول دو حصہ، تمام دواؤں کو باریک پس کر ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔

۴۔ صغ عربی، کیترا، تخم ریحاں ہم وزن تمام دواؤں کو عرق بارتنگ

میں حل کر کے مل چھان کر روغن بادام شیریں کا اضافہ کر کے استعمال کرائیں۔

۵۔ مصطکی رومی، ہیل خورد، پوسٹ بیرون پستہ، صغ عربی، کیترا ہموزن،

تمام دواؤں کو پس کر شربت سیب حسب ضرورت میں ملا کر چٹائیں۔

_____ اسپنول، تخم ریحان، تخم بدترنگ، بہدانہ، ہم دزنہ _____ تمام دواؤں کو
مرق گلاب اور عرق بید مشک میں بھگو کر مل چھان کر شربت خشکاش اور روغن بادام شیریں کا
حسب ضرورت اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

• _____ تخم بانگ ۶ گرام، گامے کے دہی ۲۵۰ گرام میں گھول کر روغن بادام شیریں
۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• _____ سچ اعداد کے ذیل میں بیان کردہ نسخہ جات استعمال کرائیں۔

سرطان معدہ

CANCER OF THE STOMACH

اس مرض میں معدہ کی فشار مخاطی میں سرطانی ورم پیدا ہو جاتا ہے، جو بعد
میں معدہ کی تمام ساختوں میں پھیل جاتا ہے، معدہ کا زیریں حقہ اور بواب میں اس کا
اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مرض مردوں میں ۵۵ — ۶۵ سال کی عمر میں، خون کے
گروپ "A" کے لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب:

۱، کسی حاد، اکال مادہ کا معدہ پر ترشح۔

۲، التهاب معدہ حاد و مزمن

۳، حرقتہ معدہ

۴، تیز، گرم اشیاء کا عرصہ تک استعمال۔

۵، وراثت

۶، دم محرق

۷، فقر الدم

۸، خون کا گروپ "A"

علامات:

قسم شراسینی میں درد ہوتا ہے، متلی اور تے آتی ہے، بطلان اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے، قلت خون اور دن بدن لاغری اور ضعف ہوتا جاتا ہے، چہرہ پر بے رونقی بلکہ مردنی چھائی ہوتی ہے، شکم میں ابھار محسوس ہوتا ہے، ابتداء میں درد میں زیادہ شدت نہیں ہوتی، لیکن بعد میں مقام معده پر برگیں چبھنے کا سادہ ہوتا ہے، شدید سوزش اور جلن ہوتی ہے۔ غذا لینے کے بعد درد، سوزش اور کرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ابھی مذکور ہوا کہ قسم شراسینی میں ایک طرح کا ابھار پیدا ہو جاتا ہے، تاہم اگر سرطان فم معده کے قریب ہے تو ابھار غیر محسوس ہوتا ہے، فم معده میں ہونے کی صورت میں ابھار قابل حرکت ہوتا ہے، بواب کے قریب ہو تو معده کی تغنیم ہوتی ہے، اور ابھار ناف کے قریب، درمیانی خط کے دائیں طرف ہوتا ہے۔

سرطان، بواب کے قریب ہو تو اس کی علامات قرصہ اثنا عشری سے مشابہ ہوتی ہیں، اسی طرح فم معده سے قریب ہونے کی صورت میں سرطان فشاء مخاطی مری سے مشابہ ہوتی ہیں، بواب سے قریب ہونے کی صورت میں غذا لینے کے بعد تے ہوتے ہیں، غذا اور تے میں خارج شدہ مواد کا تناسب برابر ہوتا ہے، تے میں غذا کے ساتھ دموی مواد بھی خارج ہوتا ہے، فم معده کے قریب ہونے کی صورت میں لقمہ نگلنے کے بعد معده میں بہت مشکل سے جاتا ہے۔ اور کچھ منٹوں کے بعد ہمتے ہو جاتی ہے، معده کے ساخت کے تامل اور تغصن کے مرحلے میں تے میں خون اور سرطانی ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

تفصیلی علامات

سرطان معده	قروح معده
۱- موروثی سرطان کی سرگزشت ملتی ہے	۱- قلت خون یا خلوروز کی سرگزشت ہوتی ہے
۲- ۴۵-۶۵ سال کی عمر میں ہوتا ہے	۲- نوجوانی میں کثیر الوقوع ہے۔
۳- درد ہمیشہ قاطع نوعیت کا ہوتا ہے	۳- درد دوری اور غذا لینے کے بعد عوارض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
۴- زور سے دبانے سے درد میں اضافہ	۴- درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نہیں ہوتا۔

۵۔ مرض کے آخری مرحلے میں تے ہوتے ہیں

۶۔ تے میالی، خون آمیز اور قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔

۷۔ تے سے درد میں تخفیف نہیں ہوتی۔

۸۔ قسم شراسیفی میں سلعاتی اجہار ہوتا ہے

۹۔ نقص تہذیر سرطانی۔

سرطان معدہ

۱۔ ابتداء معدی علامات موجود ہوتی ہیں۔

۲۔ تے الدم ہوتا ہے۔

۳۔ غذا لینے کے بعد معدی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۴۔ سلعہ ایک ہوتا ہے۔

۵۔ قابل حرکت ہوتا ہے۔

سرطان معدہ

۱۔ عام جسمانی ضعف ہوتا ہے۔

۲۔ بوجھ، ثقل اور عصبی نوعیت کا درد نہیں ہوتا۔

۳۔ تموج نہیں ہوتا۔

۴۔ سلعہ کا نبضہ سامنے ہوتا ہے۔

۵۔ سلعہ قابل حرکت ہوتا ہے

۶۔ نشست صدری رکبی سے قبضہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔

۷۔ خرخر نہیں ہوتا اور بالفرض ہوتا بھی ہے

۵۔ دیگر معوی علامات کے ساتھ ابتداء سے

ہمکنے ہوتے ہیں۔

۶۔ تے میں شوخ، سُرخ خون، زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

۷۔ تے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۸۔ قسم شراسیفی میں سلعہ نہیں ہوتا۔

۹۔ قلت خون۔

سرطان کبد

۱۔ ابتداء کبدی علامات ہوتی ہیں۔

۲۔ تے الدم نہیں ہوتا۔

۳۔ غذا لینے کے بعد معدی علامات میں اضافہ نہیں ہوتا۔

۴۔ سلعہ متعدد ہوتا ہے۔

۵۔ سلعہ غیر متحرک بلکہ قائم ہوتا ہے۔

انورسما بطنی

۱۔ عام صحت، معتدل ہوتی ہے

۲۔ درد ناقب اور نیچے، رانوں تک بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

۳۔ تموج نمایاں ہوتا ہے۔

۴۔ سلعہ کا نبضہ پھیلا ہوا۔

۵۔ سلعہ ایک جگہ قائم رہتا ہے۔

۶۔ کمی نہیں واقع ہوتی۔

۷۔ خرخر دوہرا ہوتا ہے۔

تو صرف ایک۔

اصول علاج:

_____ التهاب معدہ مزمن کا اصول علاج اختیار کریں، _____ بحیثیت مجموعی یہ مرض لا علاج تصور کیا جاتا ہے۔

علاج:

- _____۔ مچون سنگ دانہ، ہ گرام، معجون دبیدالورد ۵ گرام کھلائیں اور عرق برنجاسف ۱۰۰ ملی لیٹر، شربت کاسنی ۲۵ ملی لیٹر مل کر کے صبح کو نوش کرائیں۔
- _____۔ غذا کے بعد صبح، شام جوارش انارین ۱۰ گرام کھلائیں۔
- _____۔ مجبوری کی حالت میں علیہ کریں،

ضعف اشتہار

ANOREXIA

اس مرض میں بھوک (اشتہار) میں کمی واقع ہو جاتی ہے، _____ ملحوظ ہے کہ سبب کے خفیف ہونے کی صورت میں ضعف اشتہار اور سبب کے قوی ہونے کی صورت میں بطلان اشتہار ہوتا ہے۔

اسباب:

امراض معدہ و امعاء۔

۱. سور مزاج معدہ حار/بارد
۲. غم معدہ کی حس کا بطلان

۳۔ بعض اظہار اس کو عرضی علامت تصور کرتے ہیں۔

- (۱۴) معدہ میں بلغم لزج کا اجتماع
 (۱۵) معدہ میں صفراوی / نمکین خلط کا اجتماع
 (۱۶) معدہ میں اخلاط کا تعفن
 (۱۷) سمومیت معدہ کی کمی
 (۱۸) دق معدہ / سرطان معدہ
 (۱۹) دیدان امعاء
 غذائی بے اعتدالی۔
 (۲۰) روغنی / ثقیل، نفاخ غذاؤں کا بکثرت استعمال
 (۲۱) بکثرت چائے نوش کرنا۔
 (۲۲) گرم دشیہیں اشیاء کا بکثرت استعمال
 انفعالات نفسانی۔
 (۲۳) رنج و غم کی زیادتی
 (۲۴) فرحت و مسرت کی زیادتی۔
 منشیات۔
 (۲۵) تنباکو
 (۲۶) افیون
 (۲۷) شراب
 (۲۸) چرس
 عصبی عوارض۔
 (۲۹) مراق
 (۳۰) اختناق الرحم
 متفرقات۔
 (۳۱) حمیات عادہ
 (۳۲) جسم میں رطوبت کی زیادتی / تمام جسم میں بلغم خام کا اجتماع۔
 (۳۳) فضلات کے تحلیل و اخراج میں کمی۔

(۱۶)	بے خوابی
(۱۷)	فقر الدم
(۱۸)	بعض امراض کبد / ضعف کبد، سده کبد / سرد ماسارنقا
(۱۹)	سده طحال
(۲۰)	احتباس طمث
(۲۱)	پیاس کا غلبہ
(۲۲)	مسامات بدن کا بند ہونا۔

علامات:

فم معدہ کے سور مزاج حار سادہ کی صورت میں دخانی ڈکاریں آتی ہیں، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، سرد پانی نوش کرنے سے کسی قدر بھوک کا احساس ہوتا ہے، فم معدہ کی حس کے بطلان میں ہضم اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، صرف اشتہاء متاثر ہوتی ہے، معدہ میں بلغم لزج کے اجتماع کی صورت میں پیاس اور سوزش کا فقدان ہوتا ہے، گرم اخذیہ سے شکم میں درد اور نفخ ہوتا ہے، متلی اور تھمد کی شکایت ہوتی ہے، صفراوی یا نمکین غلط کے اجتماع کی صورت میں معدہ میں سوزش ہوتا ہے۔ ذائقہ تلخ یا نمکین ہوتا ہے، عام طور سے متلی اور تھمد کی شکایت ہوتی ہے، سرد پانی نوش کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ خلطی تعفن کی صورت میں متلی ہوتی ہے، تھمد اور پاخانہ میں شدید بدبو ہوتی ہے، بعض اوقات منہ سے بھی خراب بو آتی ہے، بلغم خام کے اجتماع کی صورت میں بلغمی علامات کے علاوہ وقوع مرض سے قبل ریاضت لگنے کی بلغمی غذاؤں کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے، امراض کبد کی صورت میں کبد معدہ سے کیلوس کو ابھی طرح جذب نہیں کر پاتا اور معدہ میں اختلاؤں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ضعف اشتہاء کے علاوہ لاغری ہوتی ہے، سفید، سبز یا زرد رنگ کے اسہال آتے ہیں، عصبی عدم / ضعف اشتہاء کی صورت میں بظاہر کبد اور معدہ کے افعال طبعی طور پر انجام پذیر ہوتے ہیں، نوجوان عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔

اصول علاج؛

- سود مزاج حار سادہ کی صورت میں سرد قابض دوائیں استعمال کرائیں۔
- صفراوی/لمکین خلط کے اعتلار کی صورت میں تھے اور اسہال کے ذریعہ معدہ کا تنقیہ کریں۔ معدہ میں متعفن خلط کے اجتماع کی صورت میں بھی یہی تدابیر کریں۔
- جسم میں اعتلار بلغم کی صورت میں ملینتا استعمال کرائیں۔
- فم معدہ کے حص میں ضعف کی صورت میں منقیات کے بعد مقویات استعمال کرائیں، محرکات بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

علاج؛

- حرارت کی صورت میں درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ہلبیلہ کابل، حود، صندل، زرشک، ہم درن — تمام دواؤں کو عرق گلاب میں بھگو کر مل چھان کر بنات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

جوارش انارین کھلا کر عرق کاسنی، عرق گلاب، عرق کیوڑہ ہر ایک ۵ ملی لیٹر میں خربت انار شیریں ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

- برودت کی صورت میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پودینہ، زنجبیل، فلفل، دارچینی، تولنجان — تمام دواؤں کو عرق گلاب میں ہلکے کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

انیسوں ۲ گرام، باریک پس کر سیب مربی میں ملا کر کھلائیں اور اس کے بعد عرق دارچینی یا عرق اجوائن نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

مصطکی، فرنجشک، پودینہ، — تمام دواؤں کو باریک پس کر مرہ انناس میں ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔
زنجبیل، فلفل، آملہ ہر ایک ۵ گرام، دار فلفل ۱۰ گرام، پوست ہلیہ زرد، تربہ، ہر ایک ۵ گرام، نمک ۲۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر عرق لیموں میں جگلی بیر کے بقدر خوب بنائیں۔ اور ۱ — ۲ حبوب استعمال کرائیں۔
نسخہ ۲۔

پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ سیاہ، آملہ، نمک سیاہ، صغتر فارسی، بادیان — تمام دواؤں کو باریک پس کر عرق لیموں میں خوب بنائیں اور ۱ — ۴ گرام ہمراہ پانی نیم گرم رات میں کھلائیں۔
نسخہ ۳۔

قرنفل ۲ گرام، دار فلفل، ہیل خورد، زیرہ سفید، دار چینی، ہر ایک ۴ گرام، ساق، انار دانہ، زنجبیل، نان خواہ ہر ایک ۸ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۶ گرام صبح، شام کھلائیں۔
• درج ذیل نسخے بھی مجرب ہیں۔

نسخہ ۴۔
فلفل سیاہ، شیطرج، نان خواہ، ہر ایک ۵۰۴۴ گرام، فلفل دراز، ہر ایک ۲۴۴۴ گرام، پوست ہلیہ زرد ۵۰۴۴ گرام، زنجبیل ۵۰۴۴ گرام، نمک سیاہ ۲۵ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پس کر تین مرتبہ عرق لیموں میں تراور خشک کرنے کے بعد ۵۰۴۴ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۵۔
سعد کوفی، دار چینی، جوز بوا، فلفل سیاہ، ہیل خورد، زنجبیل، ہر ایک ۱۲ گرام، کنبد مقشر، ۵۰ گرام، چوب چینی ۱۲۵ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ کر دو گنا فہد میں گوند ۵۰۴۴ گرام کھلائیں۔

فساد شہوت

DYSOREXIA

اس مرض میں غیر طبعی اور ردی الکلیفیت اشیار کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، عام طور سے جن کا غذائی استعمال مناسب نہیں ہوتا، مثلاً مٹی، کوئلہ، ٹھیکری، گچ، چونا، کاغذ اور روئی وغیرہ،

اسباب:

- (۱) معدہ میں ردی بلغمی اخلاط کا اجتماع۔
- (۲) ایام حمل میں حیض کے خون کا وہ حصہ جو جنین کی غذا بن سکا ہو اس کا معدہ میں تراوش پانا۔
- (۳) جسم میں کیلشیم کی کمی۔
- (۴) اعتناق الرحم

علامات:

غیر طبعی اور ردی الکلیفیت اشیار، مثلاً مٹی، کوئلہ، ٹھیکری وغیرہ کھاتا ہے، جسم کا رنگ خاکستری ہو جاتا ہے، براز میں خاکستری رنگ کا خارج ہوتا ہے۔

اصول علاج:

- _____ معدہ کی اصلاح کی تدابیر کریں۔
- _____ مقویات معدہ استعمال کرائیں
- _____ حسب ضرورت مقیات اور مسہلات استعمال کرائیں
- _____ کیلشیم کی کمی کو دور کریں۔

علاج:

- _____ فاسد مواد کے افراج کے لیے نمک اور نیم گرم پانی سے قی کرائیں،
- _____ اسہال کے لئے گلفند، خیارشبنز اور روغن بادام ملا کر استعمال کرائیں
- _____ مقوی معدہ کے طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جوارش مصطکی ۱۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

شریت مندل، شربت سیب، شربت انار نوش کرائیں۔
_____ درج ذیل نسخہ جات بھی مفید اور مجرب ہیں۔

نسخہ ۳۔

زرنباد، تخم کرفس، نانخواہ، ہر ایک ۵ گرام، کندر ۵ رو، اگر ۵ گرام، کنجد مقشر ۵ گرام،
بنات سفید ۲۵۰ گرام _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر دے۔ ۱۰ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۴۔

جفت بلوط، ۲۸ گرام، صبر ۵ گرام، خشیش غافث ۲۰ گرام، پنج اذخر ۱۱ گرام، مرکی، ۱۱ گرام
تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر پانی الیٹریٹ میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو اتار کر محفوظ
کر لیں اور ۲۰۰ ملی لیٹر تین دن تک نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

نمک حسب ذائقہ، فلفل، دونوں کو پانی میں جوش دیں، اس کے بعد اس میں تیتڑ، کبوتر،
بٹیر، اور مرغ کے چوزے کی ہڈیاں بھون کر ڈالیں اور خوب جوش دیں، بعد میں اس کا وہی شوربہ
نوش کرائیں اور ہڈیاں چبوائیں _____ مذکورہ پرندوں کی ہڈیاں بریان اور صفوت کر کے
کھلانا بھی سودمند ہے۔

نسخہ ۶۔

مصطکی، زیرہ، نانخواہ، کر دیا ہر ایک ۵ رو، گرام، تخم کرفس، جفت بلوط، ہلید، سعد کوئی،
نصاع، زرنباد، ہر ایک ۵ رو، گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ کر غہد اور شکر کے قوام میں

حسب دستور معجون بنائیں۔ اور ۵ گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ہیل خورد، ہیل کلاں، دج، عود بلساں، عود خام، مصطکی رومی، خبث الحدید مدبر، ہر ایک ۵ گرام، ہلیہ سیاہ، ہلیہ کابی، عاقر قرحا، میویرج ہر ایک ۲ گرام، نان خواہ، زیرہ کرمائی، اینسون، نمک نفطی، کبابہ، ہر ایک ۳ گرام، صبرستوطی ۲۸ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر محفوظ کر لیں اور جملہ دواؤں کے تین گنا شہد خالص کے قوام میں ملائیں اور حسب دستور معجون بنائیں اور بعد غذا ۱۰ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

مصطکی رومی، فلفل سیاہ، نان خواہ، کباب چینی، زیرہ سیاہ مدبر، زیرہ سفید مدبر، نر دیا، گل سرخ، پوست ترنج، تخم کاسنی، بادیان، کندر، کشنیز خشک، اور پنجوبہ، گل گاؤزباں، ررنباد، سنبل الطیب ہر ایک ۳۰ گرام، دارچینی، زنجبیل، ہیل خورد، ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں اور شہد خالص ۲۸ گرام، قند سیاہ ۶۰۰ گرام کا قوام بنائیں، اور سرد ہونے پر مذکورہ سفوف کردہ دوائیں ملائیں۔ ۵ گرام ہر ایک عرق بادیان استعمال کرائیں۔

۔۔۔ خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صبرستوطی، فوفل، قصب الزریرہ، ہر ایک ۵ گرام، سنبل الطیب، مصطکی رومی، ہر ایک ۵ گرام، مرکبی، گرام، نارمشک ۵ گرام، نارودین ۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن نارودین / روغن قسطین ملا کر بعد غذا نم معده پر ضا د کریں

جوع الکلب

CANINE APPETITE

اس مرض میں بھوک حد طبعی سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور باوجود زیادہ غذا

ملا اس کا دوسرا نام شہوت کلبیہ ہے۔

لینے کے، مریض کو سیری نہیں ہوتی، بلکہ کتوں کی طرح غذا پر حریص رہتا ہے۔ اور اپنے نوٹوں کی پروا کئے بغیر ہاتھ صاف کئے جاتا ہے۔

اسباب:

- (۱) فم معدہ کا سور مزاج بار دغیر مفرط،
- (۲) فم معدہ پر طحال کی طرف سے ترش سوداوی خلط کا معمول سے زیادہ انصباب
- (۳) دماغ کی طرف سے فم معدہ پر ترش بلغمی خلط کا انصباب
- (۴) معدہ اور تمام جسم کا سور مزاج حار
- (۵) دیدان امعاء
- (۶) ضعف ہضم مزمن
- (۷) ورم معدہ مزمن
- (۸) استرخاء معدہ
- (۹) زمانہ حمل
- (۱۰) زمانہ نقاہت مرض

علامات:

فم معدہ کے سور مزاج بار دغیر مفرط کی صورت میں حرص غذا کے ساتھ نفع شکم ہوتا ہے، پیاس میں قلت اور طبعیت میں لینت ہوتی ہے۔ لعاب دہن بکثرت خارج ہوتا ہے، فم معدہ پر طحال کی طرف سے ترش سوداوی خلط کے غیر معمولی طور پر انصباب کی صورت میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پیاس کم لگتی ہے، خلور معدہ میں فم معدہ میں شدید سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے، جو کسی شے کے کھانے پر ہی فرو ہوتی ہے، براز غذا کے تناسب سے زیادہ آنا ہے، بدن لاغر ہوتا ہے۔

دماغ کی طرف سے فم معدہ پر ترش بلغمی خلط کے انصباب کی صورت میں، شہوت کلیہ سے قبل نزلہ کی روئیداد ملتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، براز غذا کے تناسب سے زیادہ مقدار میں اور پتلا خارج ہوتا ہے۔

معدہ اور تمام جسم کے سوز مزاج حار کی صورت میں پیاس کا خلیہ ہوتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، کم و بیش قبض رہتا ہے اور جسمانی لاغری پائی جاتی ہے۔
دیدان اموار اور دوسرے معدی مجموعی امراض کی صورت میں ان کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج:

- _____۔ نم معدہ کے سود مزاج بارد غیر مفرط کی صورت میں خفج کے بعد حیت
ایارج سے تنقیہ مواد کریں۔ اس کے بعد مقویات معدہ استعمال کرائیں۔
_____۔ تنقیہ سودا کریں چنانچہ باسلیق اور اسیلیم کی فصد کھولنا مفید ہے،
_____۔ طحال پر سنگھیاں لگائیں۔
_____۔ دماغ کی طرف سے مواد کے انصباب کی صورت میں نزله کا اصول علاج
اختیار کریں۔
_____۔ معدہ اور جسمانی حرارت کی صورت میں قابضات استعمال کرائیں۔
_____۔ دیدان اعمار کی صورت میں اس کا علاج کریں۔

علاج :

- بادام مقشر، کیترا ہموزن — دونوں کو باریک پیس کر لعل اسپنول کے ساتھ گوندہ کر ۴ گرام کی اقراص بنائیں۔ اور ۲ قرص کھلائیں۔
- بادام مقشر، مغز صنوبر، کیترا، گل ارمنی بم وزن — تمام دواؤں کو کوٹ کر سرکہ اور دنبہ کی چکتی کی چربی میں گوندہ کر اقراص بنائیں اور ۵ رو ۱۰ گرام کھلائیں۔
- زنجبیل، فلفل سیاہ، دار فلفل ہر ایک ۲۲ گرام، ہلی کلاں، جوز ہوا، خرفہ، ہر ایک ۲۸ گرام، سقونیہ شوی ۸ گرام، قند سفید ۱۵۰ گرام، شہد حسب ضرورت — تمام دواؤں سے حسب دستور جوارش تیار کریں اور ۱۲ گرام کھلائیں،
- جوارش کونی، گرام کھلاکھی اور مویز منقی ۹ عدد، انجیر دلائی ۲ عدد برنجاسف، برگ سداب، زنجبیل، نانخواہ، مخم قرطم ہر ایک ۴ گرام کے جو شانہ میں

•۔ ست پودینہ، حلیت خالص، نوشادر مدبر، شورہ قلمی ہر ایک ۵۰۰
 ملی گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق بادیان کے ساتھ کھلائیں، جو ع الکلب بارد میں
 مفید ہے۔

• آب بہہ ترش، سرکہ خالص، ہر ایک ۵۰۰ ملی لیٹر، دونوں کو ملا کر محفوظ کر لیں اور سنبل الطیب ۵ گرام، مصطکی رومی ۵۰۳ گرام، عود چینی ۵۰۲ گرام، تخم کمرن ہادیان، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، بیج کبر ۵۰۰ گرام، تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر مذکورہ آب بہہ ترش و سرکہ کے مرکب میں رات بھر بھگوئے رکھیں۔ اور صبح کو جوش دے کر دو حصے کر لیں، ایک حصہ میں شہد خالص اور دوسرے میں شکر سفید ڈال کر قوام تیار کریں۔ اور باری باری دونوں میں سے کھلائیں۔ جو ع الکلب سوداوی میں مفید ہے۔

•۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

سنبل، قرنفل، جاسمفل، اور گل سرخ ہم وزن کو پانی میں پیس کر صاف کریں۔

نسخہ :-

بادر نجبویہ، پرسیاوشاں، ہر ایک ۲۷ گرام کو فرق گلاب میں پس کر معہہ اور
طحال پر ضاد کریں۔

نسخہ

روغن حب الّاس کہ سارے جسم پر مالش کریں۔

منصور

سنبل الطیب، عود خام، گل سرخ، مصطکی — تمام دواؤں کو پس کر قیروطی
موم خام اور روغن چینی ملا کر معده پر لگائیں۔

جوع البقر

BULIMIA

اس مرض میں معدہ کی اندرونی سطح کی غشاء مخاطی میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار غذا کی خواہش ہوتی ہے، اور تھوڑی غذا کھانے کے بعد خراش رفع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اشتہار معدی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اعضاء کی غذائی ضرورت رفع نہیں ہوتی، دوسرے لفظوں میں اعضاء آہٹائی بھوکے ہوتے ہیں۔

اسباب:

امراض معدہ وامعاء:

- (۱) معدہ کی مزین سوزش نزلی
- (۲) معدہ میں غلیظ / لیسیدار بلغم کا اجتماع
- (۳) معدہ میں سوداوی مادہ کا اجتماع
- (۴) معدہ کا سور مزاج بارد
- (۵) قم معدہ کے تمام اجزاء کی برودت مفرط
- (۶) معدہ کی غشاء مخاطی کی طبعی حرکت کا بڑھ جانا
- (۷) دیدان امعاء۔
- (۸) قم معدہ میں رقیق صغریٰ مادہ کا نفوذ کرنا۔
- (۹) ضعف قم معدہ
- (۱۰) تذرن معوی۔

متفرقات:

- (۱) عصبی و نفسیاتی نقائص
- (۲) کثرت جماع
- (۳) سور مزاج کبد

- (۱۴) عرصہ تک بھوکا رہنا
 (۱۵) تدرن ربوی
 (۱۶) غوطہ جھوٹی
 (۱۷) حیاتِ حادہ۔

علامات:

معدہ کی سوئی نزلی / فم معدہ میں رقیق صفراوی خلط کے نفوذ کرنے کی صورت میں نزلادی صفراوی علامات پائی جاتی ہیں، سوزشی ڈکاریں آتی ہیں۔ منہ خشک ہوتا ہے اور رنگار کی مانند بدبو آتی ہے، کم و بیش متل اور ابکائی کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ فم معدہ میں غلیظ، لزج، بلغم جھٹ جانے کی صورت میں فم معدہ کی حس باطل ہو جاتی ہے بلغمی علامات مثلاً کھٹی ڈکاریں، بدہضمی، نفخ، شکم، لعاب دہن کی کثرت، پیاس کی قلت وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ تقاہت بھی ہوتی ہے۔ فم معدہ کے تمام اجزاء کی برودت مفرط کی صورت میں غذائی لقمہ بھی حلق سے اترنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ برودت کی وجہ سے فم معدہ کی حس اور قوت جذب، دونوں باطل ہو جاتی ہیں، فم معدہ کا طس سرد ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، لاغری میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات فشی بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ بھوک کے باوجود غذا کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔

اصول علاج:

- _____ منضجات و منقیات استعمال کرائیں۔
- _____ مقویات معدہ و قلب استعمال کرائیں۔
- _____ فشی کی صورت میں وقتی تدبیر کے طور پر ہاتھ پیروں، خاص طور سے ہتھیلیوں اور تلوں کو ملیں۔ سرد پانی کا چہرہ پر چھینٹا ماریں۔ عطریات سنگھائیں۔
- _____ دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج:

- _____ سہاگ، گرام، اجوائی، خراسانی، حرار، غفل سیاہ ۳۶ گرام، صبر مقوطہ ۳۶

۴ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر شیر گھیکوار میں گوندھ کر چنے کے برابر جوب بنائیں اور
جوب براہ آب تانہ کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ آب برگ پودینہ، بنزدوق، آب اہوک، آب چیتہ مشغوی، ہر ایک ۶۰ ملیٹر
سرکہ خالص ۱۲۰ ملیٹر، نبات سفید ۹۰۰ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں سے حسب دستور خربت کا تمام
تیار کریں اس کے بعد زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، برگ سداب، ناغواہ، معتز فارسی ہر ایک ۶ گرام،
کو باریک پس کر پڑے سے چھان کر تھوڑا تھوڑا اس میں ملائیں۔ اور ۲۰۔۔۔۔۔ ۵۰ گرام کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ آب سیب، آب پودینہ، آب انناس، آب ہی، آب انارین، آب تنبول،
عرق میوئی شرقی و کاغذی، عرق کیوڑہ، عرق بید مشک ہر ایک ۵۰ ملیٹر،۔۔۔۔۔ آب ہدان ۲ لیٹر
۸۵۰ ملیٹر۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو ٹکائی پر جوش دیں، جب ۱۰۰۰ ملیٹر عرق رہ جائے تو خربت
تنبول، شہد خالص کے ساتھ قوام بنائیں اور بیل کلاں، جوز ہوا، بباہ، خولجان، عود زنجبیل،
اسارون، دارچین، قرفل، پوست تربچ، پوست بیدستر، مشک ہر ایک ۵۰۰ گرام، مردار ناسفتہ
، گرام، جنبر اشہب، جذ بیدستر، مشک ہر ایک ۵۰۰ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر
اس میں ملائیں اور ۱۰۰۰ گرام استعمال کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گل سرخ، عود، سنبل الطیب، مسک، رامک، بادرنجبویہ، ہر ایک ۱ گرام، زعفران ۳۵۰
گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر مقام معدہ پر ضا کریں، فشی کی صورت میں مفید ہے۔

نسخہ ۲۔

عرق گلاب، کافور، زعفران، گل سرخ،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پس کر قم معدہ پر

ضاد کریں۔

نسخہ ۳۔

گل سرخ، سنبل الطیب، مصطکی، عود فرق، عرق گلاب میں پس کر قم معدہ پر لگائیں۔

نسخہ ۴۔


عطر جنبر، عطر ہال ہر ایک ۲ ملیٹر، زعفران، کہاہ، عود، سنبل الطیب، مندل سفید،
ہر ایک ۳ گرام کو باریک پس کر کے لکڑی تیار کریں اور لگائیں۔

نفسخہ۔
لا غور، محل سرخ، کو حوق ملاب میں ذلل کر ایک شیشی میں محفوظ کر کے سٹھکائی۔

POLYDIPSLA

عطش مفرد

اقسام



اسباب :

سورہ مزاج عضوہی :-

(۲) سوزناج معدہ مار

(۵) صور مزاج متعدد عاری یا بس

۱۔ اس میں خون کے غلیظ قوام کو طبعی قوام پر لانے کے اور نفوذ کے قابل بنانے کے لیے پانی کی طبعی خواہش ہوتی ہے، جو سرد پانی کے نوش کرنے سے عام طور پر (دقتی طور پر) رفع ہو جاتی ہے، بعض اہلہ اس کو بھی عطش کا ذب سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اعضاء کی احتیاج کے مطابق پانی کی خواہش "عطش مطردہ صائق" ہے۔

مے خارجی اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے، سو پانی نوش کرنے سے بھی فروجیں ہوتی، بعض اظہار کا میل ہے کہ خلا علیہذا کو دلیع کرنے کی غرض سے بار بار پانی کی خواہش معطش معطر کا ذب ہے۔

- سور مزاج کبد (۱۱)
 سور مزاج کلیہ (۱۲)
 سور مزاج ریه (۱۳)
 سور مزاج دماغ (۱۴)

اخلاط

- سودائے محترق (۱۵)
 بلغم شور / بلغم جہی / بلغم حلو (۱۶)
 صفراء (۱۷)
 خون (۱۸)
 سیات / ادویات / اغذیہ (۱۹)
 لبن (۲۰)
 حلیت (۲۱)
 اعلیٰ درجہ کی شراب (۲۲)
 سم افکار (۲۳)
 فریون (۲۴)
 برف (۲۵)
 ہوام گزیدگی (۲۶)
 خلیط، لیسدار، گرم اغذیہ (۲۷)
 مسہلات کا بکثرت استعمال (۲۸)
 ستفرقات (۲۹)

- سرمسام حار (۳۰)
 مانیا (۳۱)
 قلوب (۳۲)
 خفقان حار (۳۳)
 التهاب کبد (۳۴)

- (۱۷) سُدہ کبد و اسار یقا۔
 (۱۸) معدہ میں غلیظہ، نمکین مادہ کا اجتماع
 (۱۹) استسقاء
 (۲۰) ذیابیطس
 (۲۱) ذات الریہ
 (۲۲) قلب کی حدت
 (۲۳) ہیضہ
 (۲۴) قوارج
 (۲۵) تدرن
 (۲۶) بدہضمی
 (۲۷) اسہال
 (۲۸) بریان خون
 (۲۹) پسینہ کی زیادتی
 (۳۰) حیات حادہ اور بحران
 (۳۱) کثرت بیداری

علامات :

علامات کا انحصار بڑی حد تک اسباب پر ہوتا ہے، سو مزاج عضوی کی صورت میں اس کی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں، معدہ میں ردی، غلیظہ اخلاط کے اجتماع کی صورت میں سرد پانی سے قطعاً تسکین نہیں ہوتی، بلکہ کسی قدر اضافہ ہی ہو جاتا ہے، البتہ گرم پانی سے قدرے راحت و تسکین حاصل ہوتی ہے، یا پیاس پر سختی سے روک لگانے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ مادہ صفراوی کی صورت میں ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔

اصول علاج :

_____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

- _____ حرارتِ معدہ کی صورت میں سرد و تر دوائیں استعمال کرائیں
- _____ یہوست کی صورت میں وطبات سود مند ہیں۔
- _____ سوزشِ معدہ کی صورت میں سرد لعابات مفید ہیں
- _____ حسبِ ضرورت مقیات اور منجیات بھی استعمال کرائیں۔

علاج:

- _____ یہوستِ معدہ کی وجہ سے عطشِ مغرط میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

عرقِ گلاب، عرقِ بید خشک، ہوزن میں سکجین (حسب ضرورت) ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

آبِ انار ترش / شیرہ تخمِ قزقہ / زلالِ تر ہندی نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

شربتِ نارنج، لعابِ اسپنول، لعابِ ہمدانہ، ہم وزن میں ملا کر نوش کرائیں / شیرہ قزقہ میں
شربتِ بنفشہ حل کر کے پلائیں۔

نسخہ ۴۔

مغزِ تخمِ خیارین، صمغِ عربی، کیترا، ہر ایک ۵۰ گرام، مغزِ تخمِ کدوئے شیریں، گرام،
طباشیر ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر چھوٹے چھوٹے جوب بنائیں
اور زبان سے نیچے رکھ کر چوسنے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ۵۔

صندل کو باریک پس کر عرقِ گلاب اور روغنِ بادام میں ملا کر اس میں کپڑا تر کر کے
معدہ پر رکھیں۔

- _____ فلیٹ مادہ سبب مرض ہو تو درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

ہسن، چند جو۔ شہد میں ملا کر چبانے کی ہدایت کریں

نسخہ ۷۔

زنجبیل، فلفل سیاہ، قرفل، دارچینی، ہر ایک ۴ گرام مغز بادام، مغز چنغوزہ ہر ایک ۴ گرام ————— تمام دواؤں کو باریک پس کر صغ عربی ۵۰۰ گرام، ترنجبیس ۲۵ گرام میں ملا کر جو ب بنائیں اور زبان کے نیچے رکھ کر لعاب نکلنے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ۱۔

زنجبیل، قاقلسغار، زیرہ کرمانی، ہر ایک ۳ گرام، یارج فیکرا ۲ گرام، گل سرخ، اصل السوس ہر ایک ۲ گرام، بیج عطیشیا، تخم کرنس، ستونیا مشوی ہر ایک ۵ گرام، نک فطی ۱۰ گرام، افیتون، افستین روی، ہر ایک ۵ گرام ————— تمام دواؤں کو کوت پس کر شراب ملا کر آب برگ ترنج کے ساتھ جو ب بنائیں اور ۵۰۰ گرام تک کھلائیں۔

• حرارت اعضاء کے نتیجہ میں عطش مغرط ہو تو درج ذیل نسخہ جات

استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز تخم کدو، مغز تخم خیار، مغز تخم خرفہ، کنیرا، طباشیر ہر ایک ۶ گرام، کافور ۱ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر لعاب اسپغول میں اقراص بنائیں اور ۳۰۰ گرام ————— ہر ایک عرق نیلووفر / شربت انار استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عرق کلاب، عرق کاسنی، آب انار ترش ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر میں سکنجبین سادہ ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

• یہو ست اعضاء کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عرق نیلووفر میں زرشک پس کر ملائیں اور شربت انار کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آب انگور تازہ، آب بھی، آب سیب، آب ریاس، زلال ترہندی ہم وزن میں نبات سفید حسب مزودت ملا کر شربت عرق بید سادہ کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آرد جو، خطی، اسپنول، مایٹھا، ہم وزن کو آب برگی بارتنگ میں چس کر سنے پر ملا کر کریں۔

نسخہ ۱۔

بکری کے تازہ دودھ میں آب اندازاً ل کر دہی بنائیں اور اس میں تھوڑا سا کافور ملا کر سر پر لگائیں اور خشک ہونے پر بدل دیں۔ اس کے بعد پانی نیم گرم سے دھو ڈالیں۔

• گرم اشیاء اور شراب کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات مفید ہیں نسخہ ۱۔

مار الشعیر نوش کرائیں بر شیرہ خرفہ، شبرہ چنار آب تربوز، میں نبات سفید حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

لعاب اسپنول، لعاب بہدان میں مار القرق اور آب تربوز ملا کر نوش کرائیں۔

نفخ شکم

FLATULENCE

اس مرض میں غلیظ ریاح شکم میں جمع ہو کر کرہ (گول) کی طرح ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں جس سے مریض مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔

اسباب:

۱۔ اخلاط

- | | |
|-----|--------------------|
| ۱۲۔ | بلغم غلیظ |
| ۱۳۔ | صفرا / خون کا غلبہ |
| ۱۴۔ | سودا کا غلبہ |

۱۵۔ اس کو اچھا رہ بھی کہتے ہیں۔

امراض معدہ و امعاء ۱۔

- ۱۔ ورم معدہ
- ۲۔ قروح معدہ
- ۳۔ سلعہ معدہ
- ۴۔ معدہ و امعاء کی قوت کا ضعف/سقوط
- ۵۔ برودت معدہ و امعاء
- غذائی بے اعتدالی ۱۔
- ۶۔ ثقیل، نفاخ اور سرد اشیاء کا استعمال
- ۷۔ غذا لینے کے دوران بکثرت پانی نوش کرنا
- ۸۔ چائے نوشی
- متفرقات ۱۔
- ۹۔ ضعف کبد
- ۱۰۔ التهاب کبد
- ۱۱۔ التهاب مرارہ
- ۱۲۔ بعض امراض رگم
- ۱۳۔ بعض امراض طحال
- ۱۴۔ نقرس
- ۱۵۔ حمی موسویہ
- ۱۶۔ زیادہ میٹھنا
- ۱۷۔ غذا لینے کے بعد فوراً سو جانا
- ۱۸۔ حبصی المزاج ہونا
- ۱۹۔ انفعالات نفسانی

علامات ۲

غذا لینے کے چند گھنٹے بعد اور بعض اوقات ویسے ہی شکم بھول جاتا ہے اور پسلیوں

اور شکم کے نیچے کھینچاؤ محسوس ہوتی ہے، نفخ کی زیادتی کی صورت میں شکم میں درد بھی ہوتا ہے۔
ریاح کی حرکت کی وجہ سے قراقر کی آواز سنائی دیتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، ڈکاروں کے بعد
حوار میں کسی قدر تخفیف ہو جاتی ہے۔ شدت کے وقت وجع الصدر، ضیق
انفیس، کثرت لعاب اور خفقان وغیرہ علامات رونما ہوتی ہیں۔ اعضاء کی طبعی کارکردگی اور
غذائی خواص کو مد نظر رکھتے ہوئے سبب کا تعین نہایت آسان ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر نفلخ
تقلیل غذائیں یا معمولی غذا کو غیر معمولی مقدار میں کھانے کے بعد یہ حواریں رونما ہوں تو اس کو
نفخ شکم غذائی تصور کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی روئیداد نسلے تو نفخ شکم انفعالی یا اعضاء
تصور کرنا چاہیے۔

اصول علاج؛

- ۔ منفعات نوش کر اگر شربت اصول اور حب ایارج وغیرہ کے قدیمہ
خلط غلیظ کا تنقیہ کریں۔
- ۔ ضعف اعضاء کی صورت میں تقلیل غذا کریں
- ۔ مقویات معدہ و اعضاء استعمال کرائیں
- ۔ دیگر اعضاء کی مشارکت کی صورت میں ان اسباب کا ازالہ کریں۔

علاج؛

- ۔ برودت کی صورت میں درج ذیل نسخہ ہات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پودینہ، ہادیان، اذیسون، زیرہ، پوست ترنج، دارچینی، زرنب، نان خواہ، مندل
ہر ایک ۶ گرام، آٹھ مرلی ۴ عدد، تمام دواؤں کو باریک پس کر، دو گنا شہد
ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، صغتر، نان خواہ، تخم کرفس ہم وزن، تمام دواؤں کو
باریک پس کر مل چھان کر ۳ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

صعتر فارسی، افستین رومی، خولنجان، اشنہ حسب ضرورت ————— تمام دواؤں کو
باریک میں کر شبید ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

انیسون، زیرہ ہل کلاں، ہل خورد، اجوائن، اجمود ہرایک ۶ گرام، قزفل ۵ گرام
زنجبیل، پیل ہرایک ۱ گرام، نبات سفید حسب ضرورت ————— تمام دواؤں کو باریک میں کر
سفوف بنائیں۔ اور ۳ گرام کھلائیں۔
————— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ تکمید ۱۔

انیسون، صعتر فارسی، مرزنجوش، مصطکی رومی، زیرہ سیاہ ————— تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر اس میں کھڑا ہو کر شکم پر تکمید کریں۔

نسخہ تکمید ۲۔

بابونہ، تخم ترب، تخم شبت، عنب الشعلب، خاکس، نمک شور، ————— تمام
دواؤں کو باریک میں کر کپڑے میں باندھ کر نیم گرم تکمید کریں۔
• ————— غلیظ خلط بلغم کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم کرنس، صعتر فارسی، ہرایک ۶ گرام، بادہ بنجوبیہ، تخم قرطم، ہرایک ۹ گرام،
تمام دواؤں کو عرق بادیان میں جوش دے کر ۱ چھان گلفندہ ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

بادیان ۶ گرام، زیرہ سفید، انیسون، ہرایک ۳ گرام، پودینہ خشک ۴ گرام —————
تمام دواؤں کو عرق کلاب ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دے کر ۱ چھان کر شربت بزوری حار
۳۵ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

پودینہ خشک، ۱۰ گرام، سماق ۵ گرام، فلفل سیاہ ۳ گرام، نمک سیاہ ۲ گرام،
————— تمام دواؤں کا سفوف بنائیں اور ۳۰۰ — گرام ہمراہ عرق بادیان / عرق مکوہ

استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مصطکی ۱ گرام، زیرہ سفید ۲ گرام کو باریک پس کر گلقتند ۲۵ گرام میں ملا کر کھلائیں۔
ادراس کے بعد عرق بادیان نوش کرائیں۔

• _____ قلبہ صفراء کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زود فائستین، صغیر فارسی، تخم کرفس، زیرہ سفید حسب ضرورت _____ تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔
• _____ غلبہ سودا کی صورت میں یہ نسخہ دیں۔

نسخہ ۱۔

زراوند، تخم شبت، تخم سداب، نان خواہ، انیسون، پودینہ خشک _____ تمام
دواؤں کو باریک پس کر استعمال کرائیں۔
• _____ فساد غذا کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان ۲ گرام، مصطکی ۱ گرام کو باریک پس کر گلقتند ۲۵ گرام میں ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

نمک، زیرہ سفید، اجوائن خراسانی، مکوہ، بادیان _____ تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر گلقتند ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان ۶ گرام، زیرہ سفید ۲ گرام، اجوائن خراسانی ۲ گرام، _____ تمام
دواؤں کو عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر، عرق گلاب ۶۵ ملی لیٹر میں باریک پس کر نبات سفید
۱۲ گرام مل کر کے نوش کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل تدبیر اختیار کریں۔

نسخہ تکمید ۱۔

نمک، اجوائن، باجرہ، مکوہ، زیرہ ہم وزن کو باریک پس کر کپڑے میں باندھ کر نیم گرم

تکمید کریں۔

• درج ذیل نسخہ جات بھی مفید ہیں۔

نسخہ ۱۔

زنجبیل، تنکار مشوی، شب بیریان، نفل سیاه، نفل دراز، کاکڑاسکھی،
بہارنگی، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ سیاه، شیطرج، قرنفل ہم وزن — تمام
دواؤں کو باریک پیس کر عرق لیون میں جٹکی بیر کے بقدر خوب بنائیں اور کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

تم کرفس، انیسون، مصطکی، حرمل، زعفران ہر ایک ۵ گرام، سببگ، ہلیلہ، آملہ،
ہلیلہ ہر ایک ۵۳۰ گرام، بکینج، مقل، ہر ایک ۵۳۰ گرام، پودینہ، قسطا، زرنباد، درونج،
اسارون ہر ایک ۵۳۰ گرام، مقل اور بکینج کو پانی میں حل کریں اور باقی دواؤں کو باریک پیس
باہم ملا کر چنے کے بقدر خوب بنائیں اور ۱-۲ گولیاں کھلائیں۔

کثرت جشا

EXCESS OF ERUCTION

اس مرض میں معدہ کی ریاح منہ کے راستے خارج ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں دکار

کہتے ہیں۔

کثرت جشا

اقسام ۱۔

جشا فیزیکی

جشا طبی

۱۔ یہ اقلہ ال کے ساتھ ہوتی ہے، یہ صورت عام طور سے پانی کو سرعت سے پیئے اور جلد جلد غذا
کھانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ہوا بھی معدہ میں چل جاتی ہے اور خلق و طم معدہ
میں تھمد پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت اس ہوا کو واپس نکال دیتی ہے، اس سے تھمد
زائل ہو جاتا ہے۔ اور مہضم میں کوئی نقص نہیں آتا۔

۲۔ اس میں کثرت دکار ہی آتی ہے، جو غذا کی زیادتی یا فساد کا نتیجہ ہوتی ہے۔

اسباب .

امراض معدہ :-

۱. معدہ میں غیر طبعی، ردی اخلاط کی پیدائش
۲. ضعف معدہ
۳. برودت معدہ
۴. التهاب معدہ
۵. نفخہ معدہ
۶. متغیر قات :-
۷. غذا کی زیادتی
۸. غذا کا فساد
۹. عجلت کے ساتھ خورد و نوش
۱۰. غلبہ اخلاط

علامات :

بکثرت ڈکارس آتی ہیں، سوہنٹم، سوزش، اور شکم میں درد دیرہ علامات پائی جاتی ہیں
التهاب معدہ کی صورت میں معدہ کا ورم نمایاں ہوتا ہے ساتھ ہی ڈکار آتی ہے، برودت
معدہ کی صورت میں بھوک زیادہ لگتی ہے، منہم ضعیف ہوتا ہے اور براز منقطع نوعیت کا
خارج ہوتا ہے، ضعف معدہ کی صورت میں باضمہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ فڈالینے کے
بعد شکم میں درد لگن ہوتا ہے، معدہ میں حار اخلاط کی صورت میں دھانی ڈکاریں آتی ہیں، اور
ڈکار کے وقت حلق میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ ترش بلغمی رطوبت کی صورت میں ترشی
نمایاں ہوتی ہے۔

اصول علاج :

۔۔۔۔۔ اصل بب مرض کا ازالہ کریں۔

- کاسر ریاح ادویہ استعمال کرائیں۔
- غذائی بے اعتدالی کو دور کریں۔
- ————— منقیات استعمال کرائیں / فصد کھویں۔

علائقہ:

• غلبہ برودت کی صورت میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

غار لقیون ۲ گرام، زعفران، تربید، ہر ایک ۴ گرام، مسطکی رومی، ہیل کلاں، زمرہ، ہر ایک ۱ گرام
نبات سفید ۲ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر ۶۔ ۱۰ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

نمک ۱۰ ہوری، نمک سیاہ، فلفل سیاہ، حلیقہ، کلونجی، زیرہ، زنجبیل تمام
دواؤں کو باریک پس کر غذا سے قبل اور غذا کے بعد ٹھوڑا سا کھلائیں۔

نسخہ ۳۔

انیسون، صعفران، اجوائن خراسانی، زیرہ، پودینہ، ہم وزن — تمام دواؤں کو
پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

انیسون، تخم شبت، صعفران، ہر ایک ۲ گرام، مسطکی رومی ۱ گرام۔ تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

دار فلفل، زنجبیل ہر ایک ۲ گرام، کو باریک پس کر شبد خالص ملا کر چٹائیں اس کے بعد
برگ سداب، خولنجان، تخم قزطم ہر ایک ۲ گرام کو آب تارہ میں جوش دے کر مل چھان کر شبد
خالص ۲۵ ملی لیٹر سے شیریں کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔

نسخہ ۶۔

قرنفل، غرطل، پودینہ ہم وزن (۵۰ گرام) — تمام دواؤں کو باریک پس کر
گلقد ۲ گرام میں ملا کر چٹائیں۔

نسخہ ۱۔

اجوائن خراسانی سرکہ میں بھگو کر تھک کریں اور سفوف بنا کر استعمال کرائیں۔
نصرہ خون کی صورت میں درن ذیل نسخہ بات استعمال کرائیں

نسخہ ۲۔

بیل کلاں، بادیان، پودینہ کو عرق کلاب میں جوش دیگڑل چھان کر گھٹند ۱۲ گرام حل کر کے
نوش کرائیں۔
نسخہ ۳۔

بادیان ۳ گرام، باریک پس کر گھٹند ۱۲ گرام میں ملا کر کھلاں اور اس کے بعد عرق کلاب ۱۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں
مذہبہ صغریٰ میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

تخم خرفہ، تخم خربزہ، کو عرق کلاب میں پس کر شربت انگور خام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

زالال آلو بخارا عرق کلاب میں تیار کر کے آب انار میں اور سکجبین ملا کر نوش کرائیں۔

فواق

HICCUP

اس مرض میں حجاب حاجز (Diaphragm) کے یک لخت زرد سے

سکڑنے کی وجہ سے ہر ایک لخت جھجھ (Larynx) کے سوراخ میں داخل ہوتی ہے

اور وہ چونکہ اس کے لیے پورے طور پر آمادہ نہیں ہوتا اس لیے لسان السزمار

(Vocalcords) کی ڈوریوں میں جھٹکا لگتا ہے اور ہچکی کی محسوس آواز پیدا ہوتی ہے،

اسباب:

۱۔ اسلہ یہ دراصل حجاب حاجز کا تشنج مرض ہے، بعض اطباء نے اس کو "علامت" تصور کیا ہے۔

امراض معدہ و اعوار :-

۱. گرم اور تیز مواد کا نم معدہ پر اثر کرنا
۲. غلیظ ریات کا نم معدہ، معدہ کے بلقیات یا مری میں مختلس ہو کر تھک کا باعث

ہونا :-

۱. فم معدہ کی شدید خشکی، بیہوشی معدہ

۲. التهاب معدہ

۳. معدہ کی فشار مخاطی کا لزج

۴. سحج اعوار

۵. معدہ کا سود مزاج بارد

۶. تخم

۷. بد ہضمی

۸. مہیض

۹. نفخ شکم

۱۰. التهاب زائدہ

۱۱. دماغی و اعصابی امراض :-

۱۲. سلعہ دماغ

۱۳. صرع

۱۴. اختناق الرعم

۱۵. غذائی بے اعتدالی :-

۱۶. حریف اور چرپریری اشیاء کا بکثرت استعمال

۱۷. بچوں میں زیادہ غذا لینا

متفرقات :-

۱۸. کثرت استفراغ

۱۹. حیات / امراض حادہ

۱. ذیابیطس
۲. نفکس
۳. التهاب کلیہ
۴. تسم بول
۵. التهاب کبد
۶. التهاب باریطون
۷. فتق
۸. احشائے صدر کے بعض دیگر امراض
۹. قلبی صدر
۱۰. موسم سرما

علامات :

عام طور سے وقوع مرض سے قبل سبب مرض کی روئیداد ملتی ہے ، مثلاً حار ، حریت غذا یا گرم دوا اس مرض کا سبب ہو تو مریض غذا سرد دوائی کی روئیداد سنائے گا کہ اس عمل کے بعد کما فواق عارض ہوا ہے ۔ بہر حال ایسی صورت میں سفراوی یا سوداوی قے آتی ہے اس کے بعد فم معدہ میں سوزش محسوس ہوتی ہے ۔ اور فواق کی شکایت ہو جاتی ہے ۔

فم معدہ ، طبقات معدہ یا مری میں غلیظاریاح کے محسوس ہو کر تھمدگی صورت میں تھڑ ، بد بھٹی وغیرہ کے بعد فواق کی شکایت ہوتی ہے ، کثرت استفراغ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے ، معدہ میں غلیظ طبعی رطوبات کے چپٹ جانے کی صورت میں معدہ میں گرانی ہوتی ہے ۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں ، فساد ہضم ہوتا ہے ، لعاب دہن میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد فواق عارض ہوتا ہے ، رطوبات اعلیہ کے فنا ہو جانے کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جائے تو بھی فواق ہوتا ہے ، اس میں کثرت استفراغ کی روئیداد ضرور ملتی ہے ، غلیظ غذاؤں کی صورت میں اس کے استعمال کے فوراً بعد یہ مرض عارض ہوتا ہے ۔

حمیات حادہ اور بھوستہ کی صورت میں بھی فواق عارض ہوتا ہے ۔ اور ان امراض کا سرگوشٹ سے جب کٹے ہو جاتی ہے ۔

- ## علاج:

- جریف اور گرم خلط کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کریں۔
- نسخہ ۱۔
آب نیم گرم میں سکبجین سادہ ملا کر نوش کرائیں اور نئے کرائیں، اس کے بعد لعاب اسپنغول اور روض بادام نوش کرائیں۔
- نسخہ ۲۔
لعاب بہدان، لعاب اسپنغول ہر ایک ۵ گرام، عرق کلاب میں نکال کر روض منفرد و کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
- نسخہ ۳۔
زرشک، بہدان، سردساق، بودینہ خشک، تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک ۴ گرام، — تسام دو اؤن کو عرق کلاب، عرق بید سادہ ہر ایک ۸۵ ملی لیٹر میں ہیں چھان کر شربت انار میں ۲۵ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
- نسخہ ۴۔
آب ترنج تازہ میں بودینہ تازہ، زرشک، بہدان، باریک پیس کر شربت انار میں ملا کر تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔
- نسخہ ۵۔

طباشیر گبود، زہر مہ، زرشک، تمام دواؤں کو باریک پس کر شربت نارنج ملا کر پشائیں۔

نسخہ ۱۔

مارا الشعیر میں شہید و تخم خرفہ، لعاب سیغول، سکببین نعنای ملا کر تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

غلیظہ ریاح کی صورت میں درج ذیل مسوجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مصطکی رومی، زہرہ سفید، زنجبیل، پودینہ خشک، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر ۴ گرام روزانہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بیج کرفس، بیج بادیان، بیج کاسنی، انیسون، بادرنجبویہ، ہم وزن، مویرمنقی ۹ دانہ، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلفندہ مسل ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جذبیدستر، اسارون، ہر ایک اگرام، کو باریک پس کر شہید ۲ گرام، سرکہ ۲ ملی لیٹر میں ملا کر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

برگ پودینہ، قرفنل، ہیل کلاں، مصطکی رومی، تمام دواؤں کو باریک پس کر آب برگ تبول بنٹک میں جوب بنائیں اور ۲ گرام ہمراہ آب نیم گرم صبح، شام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

مصطکی رومی ۲ گرام، عود غرق نیم کوفتہ، ہیل خورد، پودینہ خشک، ہر ایک ۲ گرام، انیسون ۲ گرام، تمام دواؤں کو عرق بادیان ۵، ۱ ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر گلفندہ مسل ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

قسطاخ، پوست ہیل کلاں، ریشہ نارجیل، تمام اشیاء کو باریک پس کر

حقتہ میں بھر کر نوش کرنے کی تاکید کریں۔

• معدہ کی بیسوخت کی صورت میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

لعاب: بیدار، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز تخم بوز، غرق کلاب میں نکال کر شربت نیلوفر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

تخم باریتنگ، بیاں، گرام، باریک پیس کر مکھن ۱۲ گرام میں ملا کر پیائیں۔

نسخہ ۳۔

مارالشعیرہ میں روغن بادام شیریں، شربت نیلوفر لمائیں اور ٹھنڈا سا تخم رسیاں چھڑک کر نوش کرائیں۔

• برودت کی صورت میں یہ نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

انیسون، راسن، تخم کرفس ہر ایک ۶ گرام، پانی ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

پوست بیرون پستہ، تخم کرفس، اذخر ہر ایک ۴ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نذایر اختیار کریں

نسخہ ۶۔

روغن قنطار، روغن سوسن، روغن بابونہ، کوگرم کر کے معدہ پر ملیں۔

نسخہ ۷۔

تخم کرفس، انیسون، تخم بادرنجبویہ، برگ تلمی، جند سیدستر، مصطکی رومی — تمام دواؤں کو باریک پیس کر قیروطی میں ملا کر لگائیں۔

• رطوبت کی صورت میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۸۔

اصل السوس، زوفافشک، ہیل خورد، پرسیاوشاں — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شہد سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ:

پودینہ خشک، نانخواہ، معتر فارسی، بادیان کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلتند ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ:

جبیدہ بستر، شونیز ہر ایک، گرام کو باریک پس کر شہد خالص میں ملا کر چٹائیں۔
کثرت غذا کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
نسخہ:

نک اور نیم گرم پانی باہم ملا کر نوش کرائیں اس سے تھپ ہو جائے گی، اس کے بعد گلتند سبکین عرق گلاب میں حل کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ:

کندرہ گرام، راسن، تخم تمام ہر ایک ۳ گرام، پودینہ، برگ سداب ہر ایک ۲ گرام،
معتر فارسی، نانخواہ ہر ایک ۵ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں پس کر اقراس بنائیں۔
اور ۴ گرام ہمراہ آب زیرہ استعمال کرائیں۔

قے

VOMITING

اس مرض میں معدہ، اپنے جوف سے کسی غیر موافق چیز کو منہ کے ذریعہ خارج کرنے کے لیے دفاعی حرکت کرتا ہے جس سے وہ چیز جوف معدہ سے خارج ہو جاتی ہے۔

قے

اقسام:

قی بالواسطہ

قی بلا واسطہ

قی بلا واسطہ / براہ راست دماغ میں مرکزے پر اثر انداز ہوتا۔
قی انعکاسی طور پر / بالواسطہ مرکزے کا متاثر ہونا۔

اسباب:

بلا واسطہ:-

2. بعض ادویات مثلاً ایچ مارین۔

3. تمباکو

4. تسم بول

5. زیا بیٹس شکاری

6. التهاب کلیہ

7. حمی دبائیہ کا ابتدائی مرحلہ

8. حمل

بالواسطہ:-

امراض معدہ:-

1. ورم معدہ

2. معدہ میں سوزش پیدا کرنے والے زہر / معدہ کی خشار مخاطی کا ورم

3. تضیق ہواب

4. قروح معدہ / سرطان معدہ

5. احتناق الدم انفعالی

6. ثقیل اور دیرمضہ غذاؤں کا معدہ میں فساد

7. استرخار معدہ

امراض اعمار واحشاش:-

1. شدید چوٹ، زخام طور سے شکم اور خصیہ کی شدید چوٹ

2. سعال حاد

3. التهاب شعی

4. تدرن

- عمل (۴)
 رحم کا میلان خلعی (۵)
 قویج صغریٰ (۶)
 قویج کلوی (۷)
 دیدان اعجاز (۸)
 سدہ اعجاز (۹)
 التهاب زائده امور (۱۰)
 التهاب باریطون (۱۱)
 امراض دماغ (۱۲)
 نزف دماغی (۱۳)
 سلعہ دماغ / خراج دماغ (۱۴)
 تزعزع الدماغ (۱۵)
 دماغ کا سور مزاج حار (۱۶)
 سرسام (۱۷)
 شقیقہ (۱۸)
 صرع (۱۹)
 اختناق الرعم (۲۰)
 مرض بحار (بحری سفر میں عارض ہونے والا مخصوص مرض) Sea Sickness (۲۱)
 حواس خمسہ میں سے کسی کی پراگندگی (۲۲)
 سکتہ (۲۳)
 متعدی امراض (۲۴)
 جدری (۲۵)
 حصب (۲۶)
 ہیضہ (۲۷)
 سمیات (۲۸)

افیون	۱۰۰
چرس	۱۰۰
ہینگ	۱۰۰
کلوروفارم	۱۰۰
ہمارایمک	۱۰۰
شراب	۱۰۰
متعرقات	۱۰۰
بعض سواریاں	۱۰۰
جھولا جھولنا	۱۰۰
غلبہ اخلاط	۱۰۰

علامات :

معدہ میں سوزش پیدا کرنے والے سیات کے خوردنی استعمال کی صورت میں فوراً تے ہوتے ہیں، قسم شرابی میں شدید سوزش کے ساتھ درد ہوتا ہے تے میں ناہضم غذا، خون اور رطوبت مخاطیہ خارج ہوتی ہے اور زہر کی مخصوص بو آتی ہے، تے کے کیماوی امتحان سے زہر کی نوعیت معلوم اور واضح ہو جاتی ہے۔

التهاب معدہ کی صورت میں بار بار اور شدید تے ہوتے ہیں، تے کے ساتھ تلی بھی ہوتی ہے، شکم میں درد ہوتا ہے، غذا لینے کے فوراً بعد تے ہوتے ہیں جس میں ناہضم غذا رطوبت مخاطیہ خارج ہوتی ہے، تے کے بعد عوارض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔

التهاب معدہ مزمن میں پہلے تلی اس کے بعد تے ہوتی ہے، قسم شرابی میں درد محسوس ہوتا ہے، ریاح کی زیادتی ہوتی ہے، تے میں کسی قدر ہضم شدہ مادہ خارج ہوتا ہے ساتھ ہی رطوبت مخاطیہ سے ملا جلا نرش پانی کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے

فروع معدہ کی صورت میں غذا لینے کے بعد شکم میں درد محسوس ہوتا ہے اور غذا لینے کے ایک گھنٹہ کے اندر تے ہو جاتی ہے جس میں ٹک کانیزاب اور کسی قدر دوسری مواد شامل ہوتے ہیں تے کے بعد عوارض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔

تعبیق بواب کی صورت میں متواتر تے آتی ہے، قبض بھی ہوتا ہے اور بچوں میں لاغری کا خاص طور سے مشاہدہ ہوتا ہے۔

سدہ امعاء کی صورت میں سدہ کی پیدائش کے کچھ دیر بعد تے ہوتے ہیں، تے میں شدت اور توانر ہوتا ہے، ابتدا میں تے کے ساتھ معدی مواد خارج ہوتا ہے بعد میں رطوبت مخاطیہ اور صفراء خارج ہوتا ہے۔ طمنا ہرے کرتے کی مدت کا انحصار سدہ کے مقام پر ہے، چنانچہ سدہ جس قدر معدہ سے قریب ہوتا ہے، انٹی ہی جلدی تے آتی ہے۔ انتہا ب زائدہ کی صورت میں تے میں عام طور سے شدت نہیں ہوتی، شدید عوارض میں سدہ امعاء کی سی علامتیں رونما ہوتی ہیں۔

انتہا ب باریطون کی صورت میں تے کے ساتھ شکم میں شدید درد ہوتا ہے اور مراق میں سختی ہوتی ہے۔

تولج صفراوی اور قولنج کلوی میں تے کے ساتھ مخصوص نوعیت کا درد ہوتا ہے چنانچہ صفراوی میں یرقان کی علامات بھی پائی جاتی ہیں اور شکم کے بالائی حصہ میں درد ہوتا ہے، اور قولنج کلوی میں شکم کے زیریں حصہ میں درد ہوتا ہے جس کی سیس کج ران اور خضیوں تک پہنچتی ہیں۔ دیدان کی صورت میں تے کے ساتھ بعض اوقات حیات اکہچے بھی خارج ہوتے ہیں۔ امراض دماغ و اعصاب میں تے سے قبل تسلی نہیں ہوتی بلکہ یک بیک تے آتی ہے، اور تے آنے سے قبل تک مریض کوتے کا احساس نہیں ہوتا، اس میں عام طور سے درد صر بھی ہوتا ہے۔

نز دماخی کی صورت میں دماغ موخر میں نزن ہو تو تے آتی ہے، شقیقہ میں تے سے قبل تسلی کی شکایت ہوتی ہے۔

اختناق الرحم کی صورت میں بغیر تسلی کے تے آتی ہے، درد بھی نہیں ہوتا، تے میں غذا کا کچھ حصہ خارج ہوتا ہے، اور بار بار تے کے باوجود عام سہانی نشوونما میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غلبہ اخلاط کی صورت میں اگر صفراء کا غلبہ ہو تو تے میں صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ذائقہ تلخ اور زبان خشک ہوتی ہے، معدہ میں سوزش ہوتی ہے، غلبہ بلغم کی صورت میں ذائقہ میں ترشی شوربت اور شیبہ بھی ہوتی ہے، بکثرت لعاب دہن خارج ہوتا ہے، شکم میں نفخ و قراقرز ہوتا ہے، پیاس میں شدت نہیں ہوتی۔

قلب سودار کی صورت میں پیاس منقود ہوتی ہے، ذائقہ بکھا ہوتا ہے، انتفاخ معدہ و طحال کی شکایت ہوتی ہے۔

امعاء و قاق میں مرض کی صورت میں غذائینے کے ۳ گھنٹے کے بعد تے جرتے ہیں اگر غذائینے کے ۴۔ ۵ گھنٹے بعد تے ہو تو یہ معار کبار کے امراض کی علامت ہے، امراض معدہ میں غذائینے کے ایک گھنٹہ کے اندر اندر تے، کثیر الوقوع ہے۔

تفسیر یقی علامات

تے دماغی

- ۱۔ تے سے قبل جی نہیں ملتا۔ خالی معدہ کی صورت میں خشک آبکیاں آسکتی ہیں۔
- ۲۔ خلور معدہ میں بھی جرتے ہیں۔
- ۳۔ طبیعت حسب معمول رہتی ہے۔

تے معدی/کبدی

- ۱۔ ابتداء میں جی ملتا ہے، اس کے بعد جرتے ہیں۔
- ۲۔ خلور معدہ میں نہیں جرتے۔
- ۳۔ تے آنے کے بعد طبیعت سبک ہو جاتی ہے۔

- ۴۔ نقابت اور ضعف بالکل نہیں محسوس ہوتا۔
- ۵۔ درد محسوس نہیں ہوتا۔

- ۴۔ تے کے بعد کسی قدر نقابت اور ضعف کا احساس ہوتا ہے۔
- ۵۔ کبد اور معدہ کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے۔

- ۶۔ تے کی خواہش نہیں ہوتی۔
- ۷۔ زبان صاف ہوتی ہے۔
- ۸۔ تنفس بدبودار نہیں ہوتا۔
- ۹۔ قبض ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ پانی نہیں آتا۔
- ۱۱۔ درد سرا بتدا ہی سے ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ آنکھیں صاف یا سرخ ہوتی ہیں۔
- ۱۳۔ غذا سے رغبت ہوتی ہے۔
- ۱۴۔ گردن پر ضاد مفید ثابت ہوتا ہے۔

- ۶۔ شکم دبنے سے تے کی خواہش ہوتی ہے۔
- ۷۔ زبان میل ہوتی ہے۔
- ۸۔ تنفس بدبودار ہوتا ہے۔
- ۹۔ مروڑ اور اسہال ہو سکتا ہے۔
- ۱۰۔ حسب مادہ منہ میں پانی آتا ہے۔
- ۱۱۔ تے کے بعد درد سر ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ آنکھیں زردی مائل ہو جاتی ہیں۔
- ۱۳۔ غذا سے نفرت ہوتی ہے۔
- ۱۴۔ لم معدہ پر ضاد مفید ہوتا ہے۔

اصول علاج :

- _____۔ مریض کو انقی وضع میں آرام سے ٹائیں
- _____۔ قے شدید ہو تو پہلے اس کو روکنے کی تدابیر کریں ورنہ اصل سبب مرض کے ازالہ پر توجہ دیں۔
- _____۔ معدہ میں صفراء کی تولید کی صورت میں منقیات استعمال کرائیں۔
- _____۔ مادہ مرض کے قعر معدہ میں ہونے کی صورت میں مطبوخ بلیہ سے تنقیہ کریں اس کے بعد تعدیل مزاج کریں۔
- _____۔ صفراء و مادہ کے ساتھ اگر قبض بھی ہو تو زلال تمر ہندی استعمال کرائیں۔
- _____۔ بلغمی مادہ کی صورت میں منقیات استعمال کرائیں۔
- _____۔ سوداوی مادہ کی صورت میں (اگر یہ مادہ احتراق خون کا نتیجہ ہو تو) دائیں بائیں یا اسلیم کی فصد کھولیں۔
- _____۔ دماغی تے، اگر نزلہ کے معدہ پر انقباض سے ہو تو اس کا مخصوص علاج کریں۔
- _____۔ فساد غذا کی صورت میں تے آور تدابیر اختیار کریں۔
- _____۔ مادہ کا انقباض کبد، طحال یا مرارہ سے معدہ پر ہو رہا ہو تو تے بند نہ کریں بلکہ تے آور تدابیر اختیار کر کے تمام مادہ کا تنقیہ کریں اور حسب طاقت باسلیق کی فصد کھولیں۔ اور تعدیل مزاج کریں۔
- _____۔ بحری سفر یا کسی اور سواری کی صورت میں مینات استعمال کرانے کے بعد ترش اشیاء استعمال کرائیں۔
- _____۔ دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج :

- _____۔ غلبہ صفراء کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات / تدابیر اختیار کریں۔
- نسخہ ۱۔ _____۔ سکببیں، گرم پانی اور نمک کے ذریعے کرائیں یا مطبوخ بلیہ سے تنقیہ کرنے کے بعد

تعدیل مزاج کرنے کی فرض سے شربت سیب، شربت انار، شربت ہی، عرق گلاب اور عرق پھوسہ
میں حل کر کے نوش کرائی۔

نسخہ ۱۔

زرشک، گرد ساق، ہر ایک ۶ گرام، پیس کر سکجین، شربت انار، ہر ایک ۱۵ ملی لیٹر میں
ٹا کر تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔

نسخہ ۱۔

زالال ترمندی ہمراہ نبات سفید نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گرد ساق، کشنیز شک، تخم گلاب، طباشیر ہم وزن، _____ تمام دواؤں کو کوٹ کر
شربت انار ترش، شربت سیب یا شربت ہی ترش کے ساتھ نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شربت سیب، شہیدہ غفرہ، بی کا فور، ۵۰ ملی گرام ٹا کر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ست پودنیہ، ست اجوائی، ست کا فور ہم وزن کے چند قطرے پانی میں ڈال کر نوش کرائیں

نسخہ ۱۔

انار دانہ ترش، مونیر مانا، ہر ایک ۵۰ گرام، زیرہ سیاہ ۵۰۰ گرام _____ تمام
دواؤں کو کوٹ پیس کر ۵۰۰ گرام ہمراہ شربت انار استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

منٹل سفید، زبر جہرہ، ساق، زرشک، انار دانہ ترش، طباشیر، زرد، ہر ایک ۱ گرام،
_____ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر میں ٹا کر چٹائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست بیرون پستہ، طباشیر، ہر ایک ۲ گرام، بیل خوردست پوست، گرد ساق ۲
زرد، ہر ایک ۱ گرام کو باریک پیس کر ب۔ انار ترش میں ٹا کر عروق بنائیں اور دن میں تین بار چٹائیں۔

نسخہ ۱۔

حب الرمان، شربت نارنج میں حل کر کے چٹائیں۔ اس کے بعد بیل خورد، زرشک کو عرق

پودینہ میں پیس کر چائیں۔

• غلبہ بلغم کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم شبت، سکجین، صلی کا جو شانہ نوش کرا کرتے کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم ترب، خردل، نمک، — کرپانی میں جوش دے کر نوش کرائیں، اس سے طبقات
معدہ میں سرایت کیا ہوا بلغم بھی خارج ہو جاتا ہے۔

نسخہ ۱۔

قرنفل، عود، مصطکی، پودینہ خشک، ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر ۵۳
گرام میں گلتند ۵۰ گرام ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

ناگ کیسر، دارچینی، ہیل خورد، بلبلہ سیاہ، زنجبیل ہم وزن — تمام دواؤں کا
سفوف تیار کر کے ہم وزن شکرتری ملا کر ۳ گرام بہراہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، پودینہ خشک، زیرہ سفید، ہر ایک ۳ گرام، ہیل کلان نیم کوختہ ۵ عدد، —
تمام دواؤں کو عرق گلاب میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بنفشہ حل کر کے نوش کرائیں۔
• غلبہ سودا کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زرشک، ۵۳ گرام، تل سرخ ۱۸ گرام، مصطکی رومی، عود، قرفہ، سنبل الطیب، پست
بیرون پستہ، زیرہ کرمائی بدیر، فرنجشک، ہر ایک ۵۳ گرام — تمام دواؤں کو باریک
پیس کر سفوف بنائیں اور ۹ گرام، ہمراہ گلتند سفر جلی ۵۳ گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عرق گلاب ۸۵ ملی لیٹر، عرق بید مشک ۶۰ ملی لیٹر میں شربت مندل ترش ۳۵ ملی لیٹر حل
کر کے تخم فرنجشک ۶ گرام چھل کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زہر مہرہ، لاجورد مفسول، پوست لیموں کا غدی، ایک اگرام پس کرغیرہ صندل سفید،
صندل سرخ ملا کر کھلائیں۔

• ————— معدہ کی ترشی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جوزبوا، ۲ گرام، قزفل، ۴ گرام، دارچینی، طباشیر، تالیسفر، ناگ کیسہ، شیطرح، ہلیلہ
زرد، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ کالی، ہلیلہ، آملہ، زنجبیل، زیرہ کرمانی، فلفل، دار فلفل، ہر ایک ۶ گرام
نبات سفید، ۸ گرام ————— تمام دواؤں کو باریک پس کر حسب دستور اطر فیل بنائیں اور
۵ رم گرام استعمال کرائیں۔

• ————— تھے دماغی نزلاوی میں یہ نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

ربا ہلیلہ، مصطکی رومی، کندر، برشعش استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پیاز سنگھائیں۔

• ————— بحری سفر کی صورت میں تھے ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

انار دانہ، طباشیر کبود، زرشک ترش، دانہ ہیل خورد، پوست سماق، قفل سیاہ،
پوست بیرون پستہ، کشنیز خشک، ہر ایک ۱۲ گرام، نمک سیاہ، نمک لاہوری ہر ایک ۵ گرام
تمام دواؤں کو سفوف کی طرح باریک کریں اور اگرام حسب ضرورت کھلانے رہیں۔

• ————— اگر تھے کسی طریقہ سے بندہ ہو رہی ہو تو خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال

کرائیں۔

نسخہ ۱۔

رائی اگرام کو سرکہ خالص میں پس کر ہم معدہ پر ضا د کریں اور دس منٹ کے بعد
ضاد کو اتار دیں۔

• ————— دیگر اسباب کی صورت میں ان کا مخصوص علاج کریں۔

قی الدم

HAEMATEMASIS

اس مرض میں معدی، مری، کبد، حوال یا تنفسی اعضا کے علاوہ دوسرے حصوں سے خون بذریعہ قے خارج ہوتا ہے۔

اسباب:

امراض مری:

۱. سرطان مری
۲. اینورسما مری میں اشتقاق
۳. مری کے دوری کا اشتقاق
۴. خارجی چیزوں کا مری میں چبے جانا

امراض معدہ:

۱. التهاب معدہ
۲. قروت معدہ
۳. سرطان معدہ
۴. ضربہ و سقوط معدہ
۵. متکلس شریان معدہ
۶. اینورسما معدہ میں اشتقاق

امراض اثنا عشری:

۱. قروح اثنا عشری
۲. سرطان اثنا عشری

۱۱. حصاة مرره جس سے اثنا عشری مجروح ہو گیا ہو

امراض کبد :-

۱۲. تعلب کبد

۱۳. صفرا کبد

۱۴. سده ورید باب الکبد

۱۵. ورید باب الکبد پرد باؤ

امراض خون :-

۱۶. استقربوط

۱۷. فرغورا

۱۸. ابیاض الدم

۱۹. فقر الدم مہلک

متعدی امراض / حیات حادہ :-

۲۰. ہدري

۲۱. حصہ

۲۲. آتشک

۲۳. ہیضہ

۲۴. می اجابیہ

۲۵. موتی حمرد

۲۶. می اصفر

سمیات :-

۲۷. شکیا

۲۸. کاشک

۲۹. تیزاب

۳۰. شراب

متفرقات :-

۱۰. نکلنا ہوا خون
۱۱. رطوبت
۱۲. نفث الدم
۱۳. منہ اور حلق سے سیلان خون۔
۱۴. انتہاب کلیہ
۱۵. یرقان مزمن
۱۶. احتقان الرم
۱۷. مریض
۱۸. تیز صفراوی مادہ
۱۹. انتہاب بانقرا
۲۰. حیض، ہوا سیری خون کا احتباس

علامات :-

سرطان مری کی صورت میں سرطان میں قروح پیدا ہو کر اس کی چھوٹی، بڑی عروق شریانی پھٹ جاتی ہیں۔ اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ قروح اور طبعی تک کو متاثر کرتے ہیں، ان میں قی الام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرض سے قبل مسہر ایلیح کی شکایت ہوتی ہے، اور جلد ہی نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔

ایسورسما اور طبعی کے مری میں دباؤ کی صورت میں خونی خون کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہلاکت بھی زیادہ یقینی ہوتی ہے، دوا کی مری کی صورت میں بھی دریدہ دل میں احتقان خون کے باعث انشقاق ہو کر زیادہ مقدار میں خون خارج ہوتا ہے۔

انتہاب معدہ کی صورت میں خونی خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور وہ رطوبت مخاطیہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، قسم شرابیہ میں دھن رہتی ہے، دبانے پر درد اور قتل ہوتی ہے ڈاکٹر جی آئی بی، دوسرا اور ضعف ہوتا ہے۔

انتہاب معدہ مزمن کی صحت میں قسم شرابیہ پر دباؤ ڈالنے سے درد ہوتا ہے، فذالینے کے بعد درد میں اضافہ ہوتا ہے، قتل ہوتے آتے ہیں۔

قروح معدہ کی صورت میں معمولی نزف کی صورت میں تے میں سیاہی مائل خاکی خون خارج ہوتا ہے، کسی بڑی شریان کے پھٹ جانے کی صورت میں تے میں خون زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، اور وہ سیاہی شکل میں یا لوتھڑوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ قی الدم سے قبل قروح معدہ کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں، ابتدا میں متلی اور تے کے ساتھ شکم میں درد ہوتا ہے، براز سیاہ آتا ہے قسم شر اسینفی پر درد ہوتا ہے جو عام طور سے فحروف خفیری کے بالکل نیچے ہوتا ہے۔

سرطان معدہ کی صورت میں قی میں سیاہی مائل خاکستری رنگ کا خون خارج ہوتا ہے قسم خرا سینفی پر درد ہوتا ہے، بطلان اشتباہ کی شکایت ہوتی ہے، اور لاغری اور ضعف نمایاں ہوتا ہے۔

دیگر اسباب کی صورت میں ان کی مخصوص علامات کے ساتھ قی الدم ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ تے الدم میں خارج ہونے والا خون کبھی تو مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم کبھی فلیظ ہوتا ہے تو کبھی رقیق، بعض اوقات جھاگدار ہوتا ہے اور غذا کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور بعض اوقات شدت کی تے کے ساتھ اور کبھی محض اچھو کے ساتھ آتا ہے۔

تفسیر قی علامات

قی الدم	نفس الدم
۱۔ خون تے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔	۱۔ خون کھانسی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔
۲۔ خون میں جھاگ عام طور سے نہیں ہوتا	۲۔ خون کے ساتھ عام طور سے جھاگ دار تھوک ملا ہوتا ہے۔
۳۔ خون خالص بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس کے ساتھ اکثر غذائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔	۳۔ خون خالص بھی ہو سکتا ہے لیکن بالعموم اس کے ساتھ بلغم بھی پایا جاتا ہے۔
۴۔ خالص اور زیادہ مقدار میں خون خارج ہو تو اس کی کیفیت کھاری ہو سکتی ہے، ورنہ عام طور سے تیزابی ہوتی ہے۔	۴۔ خون کھاری ردمل کا حامل ہوتا ہے۔
۵۔ خون خارج ہونے سے قبل قتل، کرب، معدہ میں گرانی، دوران سہ اور بعض اوقات	۵۔ خون خارج ہونے سے پہلے سے سرخ و برقی ہے، جو نفث الدم کی مخصوص علامت ہے۔

غش طاری ہوتی ہے۔

- ۶۔ تے میں عام طور سے بلغم خارج نہیں ہوتا۔
- ۷۔ قی الدم کے ساتھ برازیسیاہ رنگ کا آنا ہے۔
- ۸۔ مریض درد شکم کی روئیداد سنا ہے۔
- ۹۔ درد کرب، معدہ میں ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ خون کے خوردبینی معائنہ میں تدری جراثیم اور لچکدار ریشے وغیرہ نہیں دکھائی دیتے
- ۱۱۔ امراض معدہ، کبد، خصوصاً تلیف کبد کی یقینی طور پر روئیداد ملتی ہے، خواہ جسمانی معائنہ کرنے پر کوئی دوسری علامت نہ ملے۔
- ۶۔ خدیدہ دوسرے کے بعد کئی دنوں تک بلغم میں تھوڑا تھوڑا خون خارج ہوتا ہے۔
- ۷۔ نفث الدم کا خون نکل لینے کی صورت میں ہی برازیسیاہ آتا ہے۔
- ۸۔ مریض کھانسی کا تذکرہ کرتا ہے۔
- ۹۔ درد کرب سینہ میں محسوس ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ تدری جراثیم اور لچکدار ریشے پائے جاتے ہیں۔
- ۱۱۔ وجع المفاصل، یاد، سعال، رات میں بکثرت پسینہ خارج ہونا، اور قلب دریا کی علامات پائی جاتی ہیں، جسمانی معائنہ میں ان کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔

اصول علاج :

- زیادہ مقدار میں خون آنے کی صورت میں مریض کو نہایت احتیاط کے ساتھ چت ٹائیں اور نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگادیں۔ منہ کے رستے غذا ہرگز نہ دیں، بلکہ حقنہ غذائی کے ذریعہ تغذیہ پہنچائیں۔

- داخلی طور پر قابض اور حاسب دوائیں استعمال کریں۔
- امار کی غرض سے ہاتھ کو نفل تک اور پاؤں کو ران تک باندھ دیں۔
- پنڈلیوں پر پچھنے اور سنگیاں کھینچیں،
- قبض کی صورت میں حقنہ کریں۔
- قروح و ثبور مودی سبب مرض ہوں تو باسلیق کی فصد کھولیں اور تھوڑی تھوڑی دوا نوش کرائیں۔

- امتلاء خون کی صورت میں فصد کے ذریعہ زیادہ مقدار میں خون نکالیں اور

شائعوں کے درمیان نیز مقام معدہ پر قابض غذا رکھیں
 • قی الدم کبدی میں دائمی باسلیق کی اور طحالی میں بائیں اسلیم اور دماغی میں قیضال
 کی فصد کھولیں۔

• مقام طحال پر بلا شرط یا مع الشرط سنگیاں لگائیں۔
 • عضو ماؤف کی رمایت سے علاج کریں۔

علاج:

• قروح و ثبور معدہ میں حقنہ کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

کبر با ۳ گرام کو شربت انجبار ۱۲ ملی لیٹر میں گوندہ کرغزہ، خشکاش، بارتنگ، حب الاس
 ہر ایک ۵ گرام کا وزن کیوڑہ، عرق کلاب، عرق بارتنگ ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر میں شیشہ نکال کر، شربت
 حب الاس ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے تخم شربتی، تخم بارتنگ ہر ایک ۵ گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔
 قروح و ثبور معدہ میں حقنہ کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

کبر با ۳ گرام باریک پس کر شربت حب الاس کے ہمراہ نوش کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

گلنارہ تشاہ کندر، صغ عربی، گل ارمنی ہم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے ۵۰ گرام،
 شربت سیب مل ملا کر چٹائیں۔
 نسخہ ۱۔

مویز تخم کے ساتھ اور بر شعثا استعمال کرائیں۔

• درج ذیل نسخہ جات قی الدم کا جملہ انواع میں مفید ہیں۔

نسخہ ۱۔

اقا قیاندہ ورد، گل ارمنی، گلنار فارسی، بزر ابیخ، صغ عربی ہر ایک ۳ گرام، انیسوی ۵۰ گرام،
 تمام دواؤں کو پس کر لعاب اسپغول کے ساتھ ۵۰ گرام کے خوب بنائیں اور ایک حب
 استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

سنگ براحث باریک پیس کر ۶ گرام، ہمراہ حویرہ نشاستہ، روغن بادام اور نبات سفید صبح مشام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم حماض، ہارنگ، ہر ایک ۵ رو، اگرام، طباشیر، مروارید، شاخ گوزی سوختہ ہر ایک ۶ گرام، نشاستہ، کیترا، ہر ایک ۳ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر لعاب اسپغول میں اترام بنائیں اور ۵ رو، اگرام ہمراہ شربت حب الاس استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کندر، کبریا، دم الاحویں، کلنا فارسی ہر ایک ۳ گرام، گل ارغنی، شب یمانی، افیون، دارچینی ہر ایک ۵ رو، اگرام، تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے ۳ گرام کھلائیں اس کے بعد لعاب بہداز عرق گاؤ زبان میں نکال کر نوش کرائیں۔
خارج طور پر درج ذیل تدابیر و نسخے جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست انار ترش سوختہ، باریک کر کے شہد میں ملا کر شکم اور سینہ پر ضا د کریں۔

نسخہ ۱۔

صندل سفید، فوفل، کافور، عرق کاسنی اور عرق گلاب میں پیس کر معده اور مقام کبد پر ضا د کریں۔

نسخہ ۱۔

مازوسبز، برگ ببول، برگ بید، پانی میں پیس کر معده پر ضا د کریں، اور خشک ہونے پر ضا د تبدیل کر دیں۔

نسخہ ۱۔

اقاقیا، گل نار فارسی، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک ۶ گرام کو پانی میں پیس کر معده پر ضا د کریں۔

نسخہ ۱۔

صندل، اقاقیا، سک، ہم وزن کو آب مورد میں پیس کر معده پر ضا د

کریں۔
شعبہ ۱۔

برگ کاسنی سبز، برگ شاہنزد، گل ارمنی، گل بنفشہ، تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک ۲ گرام
تمام دواؤں کو آب برگ سادہ میں پیس کر ضاد کریں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض امعاء

Learn Unani By Abdul Waris Salman

التهاب امعاء

ENTERITIS

اس مرض میں امعاء کے تمام طبقات - اور ان کی خشار مخاطی میں بالخصوص التهاب پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ساخت ڈھیل پڑ جاتی ہے، ان کی سطح پر رطوبت مخاطیہ منجمد ہو جاتی ہے اور ان میں تغیر رونما ہوتا ہے، امعاء کے قدد، اور عروق خون سے متلی ہو جاتی ہیں، شدید حالات میں خشار مخاطی پر خراش اور قرح رونما ہوتا ہے۔

اقسام

تقسیم اولیٰ

التهاب امعاء مزمن
Chronic Enteritis

التهاب امعاء حاد
Acute Enteritis

تقسیم ثانی

التهاب امعاء اقليمي
Regional Enteritis

التهاب امعاء قولون متفرض
Ulcerative Colitis

التهاب امعاء نزلي
Catarrhal Enteritis

التهاب امعاء فلفموني
Phlegmonous Enteritis

التهاب امعاء خفائي/دفتيريائي
Diphtheric Enteritis

اسباب:

امراض معدہ و امعاء۔

بہ اس کے مزید انواع ہو سکتی ہیں، مثلاً التهاب نامرد و مہ، جن کا ذکر علیحدہ سے کیا گیا ہے۔

۳. التهاب معدہ
۴. سوربیم
۵. برودت اعمار
۶. قرحہ و ضربہ اعمار
۷. اعمار کا سلفہ
۸. قبض سے اعمار میں خراش پیدا ہونا
۹. اعمار میں صفراوی حصاۃ
۱۰. سخت براز کا اعمار میں احتباس
۱۱. دق الاسعار
۱۲. بیضہ
۱۳. زجیر
- متعريفات :-
۱. عضوی یا غیر عضوی کی پیادہ سمیت
۲. اختصار اور لازرع مادوں کی پیدائش کے لیے راہ ہموار کرنے والے فعلی نقائص
۳. قریبی اعضاء کے درم کا اعمار پر منطبق ہونا۔
۴. غذائے ابدالی
۵. ذات الریہ
۶. خناق
۷. حمی صویہ
۸. التهاب کبد / باب الکبد میں اجتماع خون
۹. کسی خارجی شے کا اعمار میں اٹکنا
۱۰. سردی میں بھیگنا / سرد تدا بیر اختیار کرنا
۱۱. بعض امراض قلب

علامات؟

حاد:-

امعاء میں قویجیسا یا شتری درد محسوس ہوتا ہے، نفخ شکم ہوتا ہے، بعض اوقات قبض ہوتا ہے درد عام طور سے ملغم آمیز اسہال آتے ہیں۔ بخار ۱۰۳ ڈگری فارن ہیت تک۔ لوزہ کے ساتھ ہوتا ہے، تپلی اور چمکی آتی ہے، قے بھی آتی ہے، زبان سرخ، خشک، سیاہ ہو جاتی ہے۔ پیاس کا نلیہ ہوتا ہے، ناف کے اطراف میں ہونے والا درد، دبائے اور حرکت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مریض پر سکیرے پڑا رہتا ہے۔

مزمن:-

بعض اوقات قبض اور کبھی اسہال آتے ہیں، جن میں آؤں شامل ہوتے ہیں، دفع حاجت کے وقت مرڈ ہوتا ہے۔ نفخ شکم ہوتا ہے، امتحان بالجس میں درم محسوس کیا جاسکتا ہے۔ نیچر کے طور پر واسیر ہو سکتی ہے۔

خصوصی علامات:-

انتہاب امعاء نزلی:-

براز میں لمبی اخلاط خارج ہو جاتے ہیں، شدید حالتوں میں سطحی فشار مخاطیہ

کامقشر (Desquamation of Surface Epithilium) ، زنف الدم

اور درم رخود فیروہ علامات پائی جاتی ہیں

انتہاب امعاء دفتھیریالی/خثاقی/کاذب فشالی:-

اس میں لیفینی انتہاب (Fibrinous Exudate) پر مشتمل ایک فشار

کاذب پیدا ہو جاتی ہے، براز کے ساتھ مخاط اور بن خارج ہوتا ہے۔

دیگر اقسام کو مستقل امراض کے ذیل میں (انتہاب قولون، انتہاب زائده دیدیو فویس)

لاحظہ کریں:-

تفسیر تقی علامات

انتہاب امعاء حاد Acute Enteritis	انتہاب صفان حاد Acute Peritonitis
۱۔ مرض کا حمل نسبتاً آہستہ آہستہ ہوتا ہے،	۱۔ مرض کا آغاز قشریہ سے ہوتا ہے اور
۲۔ حرارت سہا ڈگری فارن ہیت تک	۲۔ حرارت طبعی ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔

- | | |
|---|---|
| ۲۔ اسہال آتے ہیں۔ | ۳۔ شدید قبض ہوتا ہے۔ |
| ۴۔ تھے جوتی ہے، جس میں کسی مخصوص مادہ کے اخراج کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی۔ | ۴۔ تھے میں سبزی مائی مادہ خارج ہوتا ہے۔ |
| ۵۔ خفیف نفخ شکم ہوتا ہے | ۵۔ نفخ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ نبض ضعیف اور سریع چلتی ہے | ۶۔ نبض صلب اور خفیف چلتی ہے، |
| ۷۔ تنفس بطنی مدری ہوتا ہے | ۷۔ تنفس مدری ہوتا ہے۔ |
| ۸۔ شدید نقاہت یا برد اطراف نہیں ہوتا۔ | ۸۔ شدید نقاہت اور برد اطراف ہوتا ہے۔ |
| ۱۔ Acute Enteritis | ۱۔ Acute Poisoning |
| مرضی علامات آہستہ آہستہ کمودار ہوتی ہیں | مرضی کا حملہ یک بیک ہوتا ہے۔ |

ہی

- | | |
|--|--|
| ۲۔ علامات معوی پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ | ۲۔ علامات معدی پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ |
| ۳۔ معدی علامات زیادہ شدید نہیں ہوتیں۔ | ۳۔ معدی علامات نسبتاً شدید ہوتی ہیں۔ |
| ۴۔ جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ | ۴۔ جسمانی حرارت طبعی حرارت سے کچھ کم ہو گئی ہے |
| ۵۔ تھے میں کوئی مخصوص مادہ خارج نہیں ہوتا۔ | ۵۔ تھے میں خون آئینہ بلغم خارج ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ تھے میں زہریلے اجزاء نہیں ہوتے۔ | ۶۔ تھے میں زہر خارش ہوتا ہے۔ |
| ۷۔ منہ اور حلق طبعی حالت میں ہوتے ہیں | ۷۔ منہ اور حلق میں عام طور سے اختلاج الدم ہوتا ہے۔ |
| ۸۔ نقاہت زیادہ نہیں ہوتی۔ | ۸۔ نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ |

اصول علاج:

- خفیف صورتوں میں صرف تعدیل غذا پر اکتفا کریں
- خراش اسہال کا اندیشہ ہو تو طبیعات استعمال کرائیں۔
- احتیاس کی تدابیر کریں اور مسکنات استعمال کرائیں۔

۔ مزن نزلاوی صورت میں قابضات و ماعان عفونت ادویہ استعمال کرائیں
حقتہ بھی مفید ہے۔

علاج:

۔ حسب ضرورت اعمار کے تنقیہ کے لیے یہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

روغن بیدانجیر ۵ ملی لیٹر۔ دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں ملا کر نیم گرم نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

نک ۱۲ گرام، روغن بیدانجیر ۳۵ ملی لیٹر ملا کر ہر دوسرے تیسرے دن حقتہ کریں۔

نسخہ ۳۔

آب برگ شبت سبز مروق، آب برگ کھوہ سبز مروق، شربت دینار ہر ایک ۲۰ ملی لیٹر، ملا کر
شام نوش کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

مفر فلوس خیارشبنز، غلب الثعلب خشک، آرد جواہر اکمل، اسنبل العیوب، اکلیل الملک، ہر ایک
۶ گرام، رسوت، جیدار ہر ایک ۳ گرام، آب غلب الثعلب سبز مروق میں پس کر روغن گل ۲۵ ملی لیٹر ملا کر
نیم گرم غذا کریں۔

نسخہ ۵۔

آرد ماش کو دودھ میں گوندھ کر نمک طعام، زنجبیل، برگ شبت ہر ایک ۱۲ گرام، حلیقیت
۶ گرام، باریک پس کر اس میں ملا کر روغن کی طرح صرف ایک طرف پکائیں اور دوسری طرف روغن گل چھڑ کر
گرم گرم مقام ماؤن پر باندھیں۔

۔ اسہال روکنے کی ضرورت ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

آب برگ کاسنی سبز مروق، آب برگ کھوہ سبز مروق، ہر ایک ۲۰ ملی لیٹر میں آب ہلکا سا ملا کر
۵۰ ملی لیٹر، شربت حب الاس ۲۵ ملی لیٹر میں کھجور کے نوش کرائیں۔ مناسب مقدار میں پانی ملا کر

کے ساتھ کافور، گرام، ہیل خود، بادیان، گل سرخ، کشنیز شک۔۔۔ تمام دواؤں کا سفوف بنا کر کھلائیں اور مذکورہ مشروب پلائیں۔

اسہال


DIARRHOEA

اس مرض میں اسرار و قاق کے فعل یا ساخت میں خرابی کی وجہ سے ان کی حرکت دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے سبب غذا کی مائیت کم جذب ہوتی ہے اور وہ اسہال کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔۔۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ حرکت دودھ میں زیادتی کی صورت میں اسہال کی تعداد میں اور ترشح کی زیادتی کی صورت میں براز کی مقدار میں اور حرکت دودھ اور ترشح، دونوں کی زیادتی کی صورت میں اسہال کی تعداد اور براز کی مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اقسام:-

(ا)

(باعتبار عوارض)



(ب)

اقسام بلحاظ اخلاط

Billous Diarrhoea	۱۔ اسہال صفراوی
Hemorrhagic Diarrhoea	۲۔ اسہال دمی
Mucous Diarrhoea or Phlegmatic Diarrhoea	۳۔ اسہال بلینی
Malarious Diarrhoea	۴۔ اسہال سوداوی

(ج) اقسام شرکی

۱۔ اسہال کبدی Hepatic Diarrhoea-

|

۲۔ اسہال معدی

۳۔ اسہال معوی Intestinal Diarrhoea

۴۔ اسہال دماغی Nervous Diarrhoea

۱۔ اسہال کبدی دسوی

۲۔ اسہال کبدی صفراوی

۳۔ اسہال کبدی قیمی

۴۔ اسہال کبدی فضائی

۵۔ اسہال کبدی صدیدی

۶۔ اسہال کبدی خاشری

(د) اقسام لونی

۱۔ اسہال ابیض Alba Diarrhoea

۲۔ اسہال اخضر Greenous Diarrhoea

۳۔ اسہال فسل Carnosa Diarrhoea

۴۔ اسہال مصلی Serous Diarrhoea

اسباب:

۱۔ اس کو قیام کبدی بھی کہتے ہیں

۲۔ نقص اعمار سے آنے والا اسہال — ذوسنطار یا مے معوی، کچھ اعمار اور زلق اعمار اس کی

تین بڑی اقسام ہیں، ان کا ذکر طبع سے کیا گیا ہے۔

۳۔ اس کو ذوسنطار یا مے کبدی بھی کہتے ہیں۔

امراض معدہ و امعاء :-

1. سوز مزاج معدہ
 2. معدہ کی شکن اور چینٹوں کا زائل ہونا۔
 3. ضعف معدہ
 4. سودا کا خم معدہ پر کثرت ترشح
 5. لیسہ اور رطوبتوں کا معدہ کی سطح پر چمٹ جانا جس سے اس کی چمٹ بھر جائے۔
 6. معدہ و امعاء کے داخلی طبقات میں ثبوت و قروح
 7. معدہ کا درم عار
 8. صفرا کا امعاء پر ترشح
 9. دیدان امعاء
 10. اسہار کی ساخت کی خرابی
 11. بواسیر
 12. زحیر
 13. بردت شکم
 14. دق الامعاء
- ### متفرقات :-

1. غذائی بے اقتدالی
2. سیات
3. بعض متعدی امراض
4. کبد و طحال کے بعض امراض
5. تدرن ریوی
6. موسکی تغیرات
7. انفعالات نفسانی
8. ایام حل
9. بچہ میں دانت نکلنا۔

۵. طیریا
۶. حق موویہ
۷. سدہ ورقہ ماسارقیہ
۸. دماغی نوارل
۹. مسہلات کا استعمال

علامات :

عمومی علامات :-

شکم میں نفع و قرار، مردرد اور درد ہوتا ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، تیل کی شکایت ہوتی ہے، زبان میل ہوتی ہے، بعض اوقات پتلے، جھاگدار دست آتے ہیں، اسی طرح کبھی مٹیالے یا زردی مائل ہوتے ہیں۔

خصوصی علامات :-

اسہال حاد :-

مریض کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے درد اور مردرد کے ساتھ یا ان کے بغیر اسہال آتے ہیں، زبان میل ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، بعض اوقات تے بھی آتے ہیں جسمانی حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، براز زردی مائل مٹیالے یا جھاگدار آتے ہیں۔ بعض اوقات پردوں میں تشنج اور لنز ہوتا ہے۔

اسہال مزمن :-

دن میں تین چار مرتبہ مردرد کے ساتھ نیلے یا خاٹے آتے ہیں، جو بعض صورتوں میں کئی سال تک آسکتے ہیں۔

اسہال کبدی :-

اس میں اسہال کے ساتھ کبدی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسہال کبدی دوسری میں دوسری علامات ملتی ہیں، مقام کبد پر جھٹ، انتہاب اور تفرق اتصال کبد کی روئی یاد ملتی ہے، براز میں غیر مخلوط خون آتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ اسہال کبدی صفراوی میں صفراوی علامات کے ساتھ قوت داغہ کا قوی ہونا خاص علامت ہے۔ اسہال کبدی بھی دہلیہ کبد کی

ردیداد ملتی ہے، اور برازیں قحج خارج ہوتی ہے۔ اسہال کبدی خسالی میں اسہال کا رنگ گوشت کے دھون جیسا ہوتا ہے۔ اسہال کبدی مدیدی میں برازیں زرد آب خارج ہوتا ہے اور کبدی علامتوں کے ساتھ خون اور دیگر اخلاط کے احتراق کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ اسہال کبدی خاثری میں دبیلہ کبد کے انفجار، سدہ کبد کے کھلنے کی کیفیات کے ساتھ اسہال میں درد (چٹ) خارج ہوتا ہے، اسہال معدی۔

اسہال عام طور سے غذا کے بعد آتے ہیں اور برازی مادہ عام طور سے خام اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، مریض کا جسمانی رنگ سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ اسہال معدی۔

شدید درد ہوتا ہے، براز کے ساتھ آؤں خارج ہوتی ہے، اجابت دوری نہیں ہوتی ضعف تعابیت کا غلبہ بھی نہیں ہوتا، تاہم مزمن صورت میں برازی زیادہ ہو، پانی چا سکتی ہے اور ضعف بھی ہو سکتا ہے۔ باقی علامتوں کو، تفریق علامات کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

تفصیلی علامات

اسہال کبدی	اسہال معدی
1۔ عام طور سے درد نہیں ہوتا، بالفرض ہوتا بھی ہے تو بہت ہی معمولی اور کبد کے اطراف تک محدود ہوتا ہے۔	1۔ شدید درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اعمار کی شکایت ہوتی ہے تو درد مستقل رہتا ہے۔
2۔ خون دورہ کے ساتھ آتا ہے۔	2۔ دورہ نہیں ہوتا، بلکہ اجابت بلا سکون آتی رہتی ہے۔
3۔ مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے۔	3۔ مریض جلد کمزور نہیں ہوتا۔ مزمن صورت میں ہو سکتا ہے۔
4۔ برازیں بدبو زیادہ ہوتی ہے۔	4۔ برازیں بدبو زیادہ نہیں ہوتی۔ تاہم کبھی صورت میں ضرور ہوتی ہے۔
5۔ مزمن صورت میں ہی آؤں خارج ہوتی ہے۔	5۔ برازیں آؤں خارج ہوتا ہے۔
6۔ اسہال عام طور سے رات میں آتے ہیں۔	6۔ اسہال عام طور سے دن میں آتے ہیں۔

- | | |
|---|----------------------------------|
| ۷۔ برازی میں خون کیل مقدار میں آؤں، ملا | ۷۔ خاص خون زیادہ مقدار میں یافتی |
| ہوا خارج ہوتا ہے۔ | اسہال آتے ہیں۔ |
| ۸۔ مریض کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ | ۸۔ مریض کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ |

اصول علاج:

- ۱۔ اسہال کا علاج عام طور سے قابضات اور مغلطات سے کیا جاتا ہے لیکن اگر ان سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو مخدرات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- ۲۔ مادہ کو دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے مدرات، معرقات، مفتحات اور مقہیات استعمال کرائیں۔
- ۳۔ مریض کو سلانے کی تدابیر کریں۔
- ۴۔ صفراوی اسہال کی صورت میں جب تک ضعف کا خوف نہ ہو، اسہال بند نہ کریں۔
- ۵۔ اسہال سوداوی کی صورت میں پائیں ہاتھ کی باسیلق کی فصد کھولیں۔ طحال پر مسخات قابض سے منکور کریں، مجھڑ ناری بلا شرط لگائیں۔
- ۶۔ ذر سنطار یا بے کبدی میں باسیلق کے ذریعہ خون خارج کریں۔
- ۷۔ اسہال کبدی بھی میں دیلہ کبد کا اصول علاج اختیار کریں۔
- ۸۔ اسہال کبدی صدیدی میں دائیں جانب کی ایسٹم کی فصد کھولیں۔
- ۹۔ حسب ضرورت مسکات و معدلات استعمال کرائیں۔

علاج:

سود مزاج رطب معدہ کی صورت میں رطوبات کی تجفیف اور تسکین کے لیے

درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ ۱۔

مجموع ظاسفہ، جوارش حود، سفوف قطیانا و غیرہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مویز منقی کوٹ کر ۹۔ ۱۴ گرام کھلائیں۔

ہلے زرد، انا ترش، باریک چیں کر نبات سفید کے ساتھ کھلائیں۔۔۔ صفر

پوست اتار، جب اللہ اس، مویز عنقی بر ایک درم کرام، — تمام دواؤں کو
کوٹ کر رب بھی کے ساتھ استعمال کرائیں۔

جوارش آلا، گرام کھلا کر شیرہ تخم خرد سیاہ، شیرہ زرشک، شیرہ تخم کاجو، شیرہ
صندل سفید ہر ایک ۳ گرام، عرق کلاب، عرق کھنڈر ہر ایک ۵ ملی لیٹر میں نال کر شربت
استحبابہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں

چهار تخم ۱۲ گرام کو ورق کدو ۸۵ ملی لیٹر میں جوش دیں اور سرد کر کے محفوظ کر لیں، اور شربت بنفشہ ملا کر نوش کرائیں

منع عربی، اسپنول، بارتنگ، برایک و گرام کو شربت مندل ۲۵ ملی لیٹری مل کر کے نوش کرائیں۔

افیون، ہائیڈرل، نارگیل کھنہ، کات بم وزن ————— تمام دواؤں کو آب برگ
بیری سبز روق میں پس کر موٹھ کے برابر اقرص بنائیں اور ۱-۲ قرص استعمال کرائیں۔

مغز خستہ ہامیں، مغز خستہ آم، پوست افروٹ سوختہ، خستہ کوکنار، شاخ گوزن
سوخستہ، ابلجک بریان، موچہ بریان، کوکنار بریان، ہر ایک درہ گرام، بلیہ سیاہ، بادیان،

انار دانہ، کشنیز خشک، صمغ عربی، تخم حماض، زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، زنجبیل، اسپنول، بارتنگ،
تخم ریجان، نشاستہ، ہر ایک، گرام، گل دھاوا، کرتازج، آملہ بیلگری، رال، کات سفید، کتیرا،
مغز تخم کوہنج، پوست ہیل کلاں، زرنباد، گلنار، ہر ایک ۲ گرام۔ اسپنول، بارتنگ،
تخم ریجان کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں اور ان تینوں دواؤں کو ٹاکر ۵۰۰م۔ ۹
گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۰۔

تخم خرفہ بریاں، گلنار فارسی، تخم حماض، طباشیر، گل ارمنی، ہر ایک ۴ گرام، گل سرخ، شادہ،
حب الاس، نشاستہ، دم الانخویں، ہر ایک ۴ گرام، کندر، انیسون، ہر ایک ۱ گرام۔ تاکر ۵۰۰م۔
کو باریک پس کر ۱۰۔ ۱۰ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۱۔

سائیں موچرس، گل دھاوا، مصطکی رومی، بیلگری تازہ، رال، کوکنار، نیم بریاں، جھون۔
تمام دواؤں کا سفوف بنائیں اور ۱ گرام صمغ، شام استعمال کرائیں،
۱۔ مضموی اشتراک سے عارض ہونے والے اسہال کی ادویہ طبعیہ سے
تحریر کی جا رہی ہیں۔

۱۔ اسہال معدی میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۲۔

شکر، سہاگ، انیسون، مصطکی بم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر پھینک
کے برابر محبوب بنائیں اور انکی گولی براہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۳۔

پوست بلیہ زرد، پوست بلیہ سیاہ، پوست آملہ، دار فلفل، زنجبیل، بڑی کابی، گل ارمنی
زرنباد، ہیل خورد، سنبل الطیب، خولنجان، شیطرج، ہر ایک ۱ گرام، موہن منقہ ۱۰ گرام، خمٹ
الحدیہ ہر (روغن بادام میں)، ہم وزن جملہ ادویہ۔ شہد خالص تمام دواؤں کی دھنا۔
حب دستور محبوب بنا کر ۶ ماہ تک اتناج کے گودام میں رکھیں اس کے بعد استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۴۔

گل ارمنی ۲ گرام، انیسون خالص، ۱ گرام، گلنار فارسی ۱ گرام، زعفران ۱ گرام۔ تمام

دواؤں کو باریک پیس کر زردی بیفہ سرخ میں کھل کر کے مونج کے برابر جموب بنائیں اور ۱۲۵ ملی گرام
ہرہ عرق بادیان فوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

شیرہ آملہ ۶ گرام، کبریا، یشب، گل گاؤزبان، ہر ایک ۵۰۰ گرام، طباشیر، گل ارمنی، رفقہ
سعد کونی، سادج ہندی، سنبل الطیب، گل سرخ، معطلی ہر ایک ۵۰۰ گرام، ابریشم خام ۵۰۰ گرام
جبات سفید تین گنا۔ تمام دواؤں کو پیس کر صوب دستور مجموعی بنائیں اور ۵۰۰
گرام کھلائیں۔

• ذر سنطار یا سے کبدی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

نشاستہ، طباشیر، عصارہ لیمون، الیس، دم الاخوی، ریونڈ چینی، گلنا فارسی، گل ارمنی کو
باریک پیس کر آب ہارنگ میں چنے کے برابر جموب بنائیں اور ۲ صوب صبح، شام کھلائیں۔ اسہال
کبدی (دموی) (انشقاق عروق کبد) میں مفید، قابض اور مدلل ہے۔
نسخہ ۱۔

کا فور، طباشیر، مندل، زہر مرہ، سائیدہ، ہر ایک ۳ گرام، نشاستہ، صغ عربی ہر ایک ۶ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ کر صوب دستور جموب بنائیں اور استعمال کرائیں۔ اسہال
کبدی صفراوی میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

جوارش آملہ ۵ گرام کھلا کر شیرہ مندل، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک ۲ گرام، عرق گلاب ۱۳۵ ملی لیٹر
میں نکال کر شربت انا شیر یا ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے فوش کرائیں۔ اسہال کبدی فحالی میں سودمند
• دیگر اسباب کی صورت میں ان کی رعایت سے نسخہ تجویز کریں۔

زلق امعاء

LIENTERIC DIARRHOEA

اس مرض میں غذا امعاء میں طبعی حرکت تک نہیں ٹھہرتی بلکہ بہت جلد پھیل جاتی ہے۔

اسباب؛

امراض معدہ و اعصاب۔

۱. تیز، حاد موہکی وجہ سے اسہار کی اندرونی سطح پر خجور پیدا ہونا
۲. اسہار کی بیرونی سطح کے خجور
۳. اسہار کا سور مزاج رطب
۴. اسہار میں فاسد رطوبتوں کا اجتماع
۵. اسہار میں آنے والے اعصاب کا مفلوج ہونا۔
۶. اسہار کا ضعف

علامات؛

اسہار کی اندرونی سطح کے خجور کی صورت میں براز میں غذا معمولی ہضم کے بعد خارج ہوتی ہے اس کے ساتھ خجور کا زرد آب بھی خارج ہوتا ہے، اس میں غذا کے گزرنے کے وقت درد ہوتا ہے۔ سر اور چہرہ کی طرف سوزش صعود کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سرد پانی نوش کرانے سے سوزش میں وقتی طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے۔

اسہار کی بیرونی سطح پر خجور کی صورت میں غیر منہضم اسہال آتے ہیں، براز کے ساتھ زرد آب خارج نہیں ہوتا۔ شکم میں چھن اور سوزش ہوتی ہے، درد کا کوئی مخصوص مقام نہیں ہوتا، بلکہ بالارٹاف، زیر ناف یا پہلو میں محسوس ہوتا ہے۔

اسہار کے سور مزاج رطب میں عام صحت مندی کے باوجود اسہار میں غذا کم ٹھہرتی ہے اسہار میں فاسد رطوبتوں کے اجتماع کی صورت میں براز کے ساتھ رطوبت خارج ہوتی ہے۔ غیر منہضم غذا بھی خارج ہوتی ہے، معدہ کے صحت مند ہونے کے باوجود اسہار میں غذا قلیل مدت کے لیے ٹھہرتی ہے۔

— صفت اسہار اور اسہار کے اعصاب کے مسترخی/مفلوج ہو جانے کی صورت میں ان کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج؛

- تیز اخلاط کی صحت میں فصد کھولیں، اور صغریٰ سہل استعمال کرائیں۔
- مسکات و مسردات استعمال کرائیں
- اختلاج و طوبت کی صحت میں تے اور اسہال کرائیں۔
- سوہ مزاج رطب سادہ کی صحت میں بجھفات استعمال کرائیں۔
- ضعف/فالج اعصاب اعصار کی صحت میں فالج کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج؛


- جوارش انارین ۵ گرام کھلا کر بہدانہ، تخم خرفہ سیاہ، مندل سفید، ہر ایک ۳ گرام کا پانی میں شیرہ نکال کر شربت حب الّاس ۲۵ ملی لیٹر ملا کر صبح کو نوش کرائیں۔
- شام کو مالتی بسنت ۲ گرام و شربت انار ترش ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں۔
- پوست ہلیہ زرد، گرام، ہالون، حب الّاس، سماق، مائین ہر ایک ۵۰ گرام ہالون کے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر، ہالون ملا کر، گرام روزانہ کھلائیں۔
- تخم ریحان، تخم بارتنگ، اسپنول، تخم کنوچہ بریاں کو روغن گل میں برب کر کے کھلائیں، سہل دوا لینے کی صحت میں مفید ہے۔

زحیر

DY SENTERY

اس مرض میں معاء مستقیم اور قولون کے آخری حصہ کی دوی، شدید اتہابی یا تفتہری اذیت و تکلیف کو دفع کرنے کے لیے مضطربانہ حرکات ہوتی ہیں۔ جس سے بار بار حاجت اور کونج Tenuamus کے ساتھ تلیل مقدار میں آؤں یا تھوڑی مقدار میں خون آمیز، لیسہ اور طوبت خارج ہوتی ہے۔

اقسام:



اسباب:

امراض معدہ و امعاء:-

۱. شہد اور تیز اخلاط کا معاد مستقیم پر بکثرت ترشح

۲. التهاب امعاء

۳. سبب امعاء

۴. فتور امعاء

۵. براز کا معاد و قاق میں عکس ہو جانا

۶. یرو دت سے معاد مستقیم کا متاثر ہونا

۷. خلیطہ بنفم یا سدوں کا معاد میں اجتماع

۸.

آرپی ٹیوس ہوتی ہیں اور مقعد میں بوجھ کا احساس ہوتا ہے، نان کے اطراف میں، قولون کے تفریح بینی کے مقام پر درد کا احساس ہوتا ہے۔ دبائے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 درجہ حرارت جسمانی ۱۰۲ ڈگری فارن ہیت تک ہو جاتا ہے، شدید لاشی ہوئی ہے، جلد گرم اور خشک ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، چہرہ تشکر، کسی قدر سرخ اور آنکھیں سرخ و چمکدار دکھائی دیتی ہیں، پیشاب قلیل مقدار میں، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ نبض سریع و ملبہ جلتی ہے۔
 زحیر مزمن ۱۔

مرور اور دستوں میں کمی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ عرصہ تک قبض بھی ہو سکتا ہے، زبان سرخ اور چمکدار ہوتی ہے اور کبھی پھٹ جاتی ہے۔ اسہال عام طور سے نیم سیال بدبودار، فشار مخاطی کے چھپوڑے، صمدیہ اور خون آمیز ہوتا ہے، چہرہ بے رونق، پھیلا ہوتا ہے، لافری نمایاں ہوتی ہے۔
 زحیر صادق ۱۔

بیشر۔ علامات زحیر حاد کی سی ہوتی ہیں، (بلکہ بعض اظہار زحیر حاد کو ہی زحیر صادق بھی کہتے ہیں۔) دستوں میں صفراوی / بلغم شور کا مادہ خارج ہوتا ہے، اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے، صفراوی مادہ کی صورت میں سوئی جھنجھے کا سادہ ہوتا ہے، حرارت اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، نبض سریع اور متواتر جلتی ہے، اسہال میں خون اور صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے، شرج میں سوزش ہوتی ہے۔ اور سرد تداپیر سے راحت ملتی ہے بلغمی مادہ کی صورت میں برازی آؤں خارج ہوتا ہے، سوزش بھی کم ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ نہیں ہوتا، نفخ و قراقر ہوتا ہے، نبض جلی جلتی ہے۔
 زحیر کاذب ۱۔

اعضاء میں سدہ پڑ جانے کی وجہ سے رفق حاجت کے وقت کونٹھنا اور زور لگانا پڑتا ہے، درد ہر وقت رہتا ہے، دائیں یا بائیں کوٹھے کو دبائے سے سدہ کی سختی محسوس ہوتی ہے، بہت کوشش کے بعد بھی قھوڑ آؤں اور خون آمیز براز خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات بکری کی شگینیوں کی طرح براز خارج ہوتا ہے، تولید ریاہ کی وجہ سے اعضاء میں تھکاوٹ ہوتا ہے۔

بیلیسری :-

یہ قولون کی مخصوص زحیر ہے، مگر بعض حالتوں میں ملاء نغائف کا زیریں حصہ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، مرئیاتی نقطہ نظر سے اس میں معادہ کفشا، نغائید میں اذیمیائی بیہیت پیدا ہو جاتی ہے اور موت الفساج کا عمل لگتا ہوتا رہتا ہے، جو علیحدہ ہو کر برازیں خارج ہوتا رہتا ہے۔ تفصیلی علامات تو باقی علامات کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

امبیائی :-

مرئیاتی نقطہ نظر سے اس کے اشیام معادہ کے تحت الفطامی جلتے میں روک کر لحمی مادوں کو تحلیل کرنے والے خامرات (Proteolytic Ferments) پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اور نتیجہ کے طور پر یہاں انتہائی اذیمیائی حالت پیدا ہو جاتی ہے، امعاء کی دیوار کی لچک موزوم ہونے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ وہاں قروح پیدا ہو جاتے ہیں اور برازیں خون اور مخاطی اجزاء کا مشابہہ کیا جاسکتا ہے۔ — تفصیلی علامات — تفصیلی علامات کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

زحیر درمی :-

امعاء اور مقعد میں درم کے ساتھ ثقل نہیں اور مردڑ ہوتا ہے، تمدد بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً پرد باؤ پر نہنے کی صورت میں پیشاب میں دشواری ہوتی ہے، لحمی ہوتا ہے، بعض منشاری چلتی ہے۔

زحیر وبائی :-

زحیر وبائی کے طور پر پھیلتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، رین کے منہ سے ناگوار بھوکا اٹھتا ہے۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے، جلد میں پھیپھڑیاں ہوتی ہیں، خارش اور سوزش کی شکایت ہوتی ہے، عام طور سے ہر اجابت کے بعد قشی طاری

ہو جاتی ہے

زحیر قحطی :-

شکم میں بوجھ، درد اور مردڑ ہوتا ہے، ہنے کی مانند خشک براز آتا ہے، مرض کے وقوع سے قبل خشک ادویہ داغ دیے یا خشک تدابیر کی روئیداد ملتی ہے۔

زحیر بردی :-

دفعہ مرض سے قبل متعدد اسما میں برودت پہنچنے کے اسباب کی روئیداد
ملتی ہے، گرم تدابیر سے راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔
تفریقی علامات

زحیر کاذب

۱۔ اسما میں سدون کی علامات ملتی ہیں۔

۲۔ سدہ کے اخراج کے بعد راحت
ملتی ہے۔

۳۔ براز کے ساتھ خارج نہیں ہوتے
اور بالقرض خارج بھی ہوں تو توڑے
تھوڑے، خارج ہوں گے۔

زحیر ایسبائی

Amoebic Dysentery

۱۔ گرم ملکوں میں کثیر الوقوع ہے۔

۲۔ ایسبائی جراثیم خارج ہوتے ہیں۔

۳۔ مرض آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے۔

۴۔ نامناسب علاج ہونے کی صورت میں
کچھ عرصہ بعد عود کر آتا ہے۔

۵۔ مرد کی نسبت درد زیادہ ہوتا ہے

جوانان کے اطاف میں مرکوز ہوتا ہے۔

۶۔ انہیں حصرہ حرقیہ میں یا تمام اہل
میں ہوتا ہے۔

۷۔ اجابت کی تعداد کم اور مقدار زیادہ

زحیر صادق

۱۔ اسما پر حاد، صفراوی، بلیغم شورجیہ

اخلاط کا ترشح یا اجتماع اس کا سبب ہے
اور اس جیسی علامات رونما ہوتی ہیں۔

۲۔ حرارت کے اسباب کے دور کرنے
کے بعد راحت ملتی ہے۔

۳۔ تخم کنوپہ، اسپغول اور تخم ریحاں
کھلانے پر وہ براز کے ساتھ ایک ساتھ خارج
ہوتے ہیں۔

زحیر جراثیمی

Bacillary Dysentery

۱۔ معتدل، بارد ملکوں میں کثیر الوقوع ہے

۲۔ براز میں شیشیلا کے جراثیم خارج ہوتے
ہیں۔

۳۔ مرض کا مہل نہایت سرت سے ہوتا ہے

۴۔ عام طور سے دوبارہ نہیں ہوتا۔

۵۔ شکم میں درد، شدید اینٹھن اور مروڑ

ہوتا ہے۔

۶۔ درد عام طور سے بائیں حصرہ حرقیہ
میں مرکوز ہوتا ہے۔

۷۔ اجابت کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن

- نقد از زیادہ ۱۰۔ ۵۔ تک ہو جاتی ہے۔
 براز میں بطن غلیظ یا محض مائیت الدم
 کی آمیزش ہوتی ہے۔
 ۹۔ جو نہیں ہوتی۔
 ۱۰۔ شدید وبائی ہوتا ہے۔
 ۱۱۔ بخار اور جسمانی ضعف شدید ہوتا ہے۔
 ۱۲۔ قروح الامعاء اور دیلا ایک ہوا سکا
 نہیں ہوتا بلکہ مفصل ماؤن ہونے سے
 استفادہ کے امکانات ہوتے ہیں۔
 ۱۳۔ مدار کے مرکبات مفید ہوتے ہیں۔
 ۱۴۔ کم عریجے زیادہ مبتلا ہونے میں۔
 ۱۵۔ مدت حضانہ ۱۲ گھنٹے سے ۹ دن تک۔
- زحیر**
 ۱۔ مرض کا آغاز شدت سے ہوتا ہے۔
 ۲۔ جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 ۳۔ جسمانی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔
 ۴۔ براز کی مقدار کم (جراثیمی) اور تعداد
 کم (اسبیادی) ہوتی ہے۔
 ۵۔ براز میں بطن، خون اور مخاطی اجزاء
 شامل ہوتے ہیں۔
 ۶۔ زحیری جراثیم پائے جاتے ہیں۔
 ۷۔ سے غیر موجود ہوتے ہیں۔
- ہوتی ہے۔
 ۸۔ خون اور بطن کی آمیزش ہوتی ہے۔
 ۹۔ متعفن دموی ہو ہوتی ہے۔
 ۱۰۔ مقامی ہوتا ہے۔
 ۱۱۔ شدید حالات میں معمولی بخار ہوتا ہے۔
 ۱۲۔ قروح الامعاء ہوتا ہے اور دیلا
 الکبد کے امکانات ہوتے ہیں، درم زائدہ
 اور بھی ہو سکتا ہے۔
 ۱۳۔ مدار کے مرکبات کی بجائے تیزاب،
 گندہک میں حل کی ہوئی کوئین پیفید ثابت
 ہوتی ہے۔
 ۱۴۔ مرد، جوان زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔
 ۱۵۔ مدت حضانہ ۲۰۔ ۹ دن تک
- اسبال بوا میری**
 ۱۔ بوا میری سرگندہ شت ملتی ہے۔
 ۲۔ حرارت طبعی ہوتی ہے۔
 ۳۔ جسمانی علامات زیادہ شدید نہیں ہوتیں۔
 ۴۔ براز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
 ۵۔ براز میں محض خون خارج ہوتا ہے۔
 ۶۔ زحیری جراثیم مفقود ہوتے ہیں۔
 ۷۔ سے پائے جاتے ہیں۔

اصول علاج

- — مرض کی خفیف صورتوں میں مزلق و طین دواؤں سے اعجاز کا تنقیہ کریں۔
- — نسبتاً شدید صورتوں میں مزقات کے بعد مسکن اعجاز اور حابسات استعمال
- کرائیں تاہم حابسات و قابضات کے استعمال میں کمال احتیاط لازمی ہے۔
- — حابسات کے ساتھ لعابات کا مال میل ضرور رکھیں۔
- — معارستقیم میں اتنا آب کی صورت میں حسب ضرورت و مہلت استعمال کرنا
- کھولیں۔ کر کے نیچے مع الشرط سنگیاں کھینچیں۔
- — مطلقیات، مقیات، منضجات اور محملات استعمال نہ کریں۔
- — درد کی تسکین کی تدابیر کریں۔
- — حسب مادہ کج اعجاز کا اصول علاج اختیار کریں۔
- — مزمن صورتوں میں حقہ استعمال کرنا۔

علاج

- — ذخیر کا ذب میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔
- نسخہ ۱۔
- — روغن بادام ۱۸ لیٹر، دن میں دوبار نوش کرائیں
- تین دن بعد یہ نسخہ دیں۔
- نسخہ ۲۔
- — روغن بید بخیر ۸ لیٹر، دودھ ۲۵۰ لیٹر میں ملا کر نبات سفید ۲۵ گرام سے
- خیریں کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔
- نسخہ ۳۔
- — عاب ریشہ قطعی ۵۰ گرام، عرق گلاب ۸۵ لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ لیٹر
- منزل غلوس خیارشبنز ۵۰ گرام، روغن بادام ۱۲ لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- نسخہ ۴۔

سپستان، ریشہ خطی، ہر ایک ۱۲ گرام، گل بنفشہ ۵۲۲ گرام — تمام دواؤں کو نیم گرم پانی میں بھگو کر صبح کو ل چھان کر نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

لعاب ریشہ خطی، شیرہ بادیان، شیرہ حب الّاس ہر ایک ۵۲۲ گرام کو عسریٰ گاؤ زبان ۱۳۵ ملی لیٹر میں نکال کر گلتند ۲۵ گرام حل کر کے، تخم ریحاں ۵۲۲ گرام اور اسپنول مسلم ۲ گرام اور پر سے چھڑک کر صبح، شام نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

لعاب ریشہ خطی نیم گوتہ ۱۲ گرام، لعاب بہدان شیریں ۵۲۲ گرام، لعاب اسپنول ۲ گرام گلتند ۲۰ گرام، شیرہ مغز بادام منشہ ۵۲۲ گرام، شیرہ بنفشہ ۵۲۲ گرام عرق گاؤ زبان کے ساتھ نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

تخم کنوچہ، تخم ریحاں، اسپنول مسلم ہر ایک ۲ گرام ردفن بادام شیریں میں چرب کر کے براہ عرق گلاب استعمال کرائیں۔

— زحیر صادق میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ردفن بید انجیر سے تنقیہ اعمار کریں اور یہ نسخہ دیں۔

رال ۵۲۲ گرام، شکر سفید ۲۲۲ گرام، کوکنار اعدد — تمام دواؤں کا سفوف بنا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم فوفہ، تخم خشخاش، ہر ایک ۵۲۲ گرام، زناستہ ۳۳۳ گرام، تخم ریحاں، تخم کنوچہ تخم حماض، حب الّاس، شاہ بلوط، گل ارمنی، طباشیر ہر ایک ۱۱۱ گرام، صغ عربی ۲۵۲ گرام اسپنول ۲۲۲ گرام — اسپنول کے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹیں اور طباشیر، خشخاش اور گل ارمنی کے علاوہ تمام دواؤں کو بریاں اور باہم ملا کر ۵۲۲ گرام براہ شربت حب الّاس

استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

زرنہاد بریاں ۵۰۰ ملی گرام، ہرآہ آب سرد استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

شنگرن، سہاگ، افیون، مصطکی ہم وزن ————— تمام دواؤں کو پس کر کے
کے برابر خوب بنائیں اور ایک ٹولی صبح، شام کھلائیں۔

نسخہ :-

گل ارمنی، حب الاس، کبہ با، جفت بلوط، تخم ختمش سفید، ہر ایک ۴ گرام، دم الاخویں
مصغ عربی، کزماذج، اقا قیا ہر ایک ۳ گرام، بیخ انجبار، گلنار فارسی ہر ایک ۶ گرام،
افیون ۵۰۰ ملی گرام، زعفران ۱ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص بقدر مرمر
بنائیں۔ اور ایک قرص کھلا کر اوپر سے بادیان ۵ گرام، بیخ انجبار، ریشہ خطمی ہر ایک ۶ گرام
کو پانی میں پس کر شیرہ نکال کر خمیرہ بنفشہ ۵۰۰ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
• ————— زحیر بلغمی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

زنجبیل، بادیان، بیلگری، ہر ایک ۵ گرام، بنات سفید ۱۰ گرام ————— تمام دواؤں کا
سفوف تیار کریں اور علی الترتیب ۶، ۴، ۱۲ گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

زیرہ سفید ۴ گرام، اجوائن ۵ گرام، افیون ۲۵۰ ملی گرام ————— تمام
دواؤں کو ہر ایک پس کر ۳ خوراک بنائیں اور آب برنج سانچے کے ہمراہ تین دن استعمال
کرائیں۔

• درمی صورت میں یہ نسخہ جات خارجی طور پر استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

ردغن گل سرکہ میں ملا کر کپڑا تر کر کے مقعد پر رکھیں۔

نسخہ :-

صندل سفید، صندل سرخ، آب کاسنی، اور آب مکوہ میں پس کر تھوڑا سا کانوہ

حل کر کے طلا کریں۔

نسخہ ۱۔

مردار سنگ باریک پس کر زردی، بیضہ مرغ اور روغن گل میں گھینپ کر طلا کریں۔

نسخہ ۲۔

تخم خطی، تخم خبازی، تخم حلبہ، تخم کتان، بنفشہ، گل بابونہ، برگ کونب — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر، لچھا کر نپول کریں۔

نسخہ ۳۔

عس مقشہ، گل مرغ، اسپغول، آب مکوہ میں پس کر روغن گل ملا کر مقعد پر خداد کریں۔

۔۔۔۔۔ زحیر دہائی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

تخم زنجشک کو حق بید مشک، حق کیوٹہ، برای ۵۰ لیٹر میں چھڑک کر شربت سیب ۲۵ لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

شربت انار، شربت لیموں، برای ۲۵ لیٹر، حق کلاب ۳۰ لیٹر میں ملا کر بالنگو چھڑک کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۶۔

برف کے نہایت سرد پانی میں سرکہ کہنہ ۲۵ لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ حسب ضرورت درج ذیل نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

نسخہ ۷۔

تخم تر ہندی مقشہ ۵۰ عدد کو باریک کریں۔ اور لیوں کو اوپر کی طرف سے کاٹ کر بیج نکالیں اور تخم تر ہندی کا سفوف اس میں ڈال دیں۔ اور آگ پر رکھیں۔ جب لیوں جوش میں آجائے تو جوشنے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ۸۔

تخم ترب بریاں ۶ گرام پس کر ہم وزن شہد خالص ملا کر چائیں۔

نسخہ ۱۔ زنجبیل، گرام، بادیاں، گرام، نمک سیاہ، کوکنار، ہر ایک اگرام، طہیت سفید، گرام،
 تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے ایک برتن میں پانی ڈال کر چھٹے پر پڑھائیں،
 جب خوب گرم ہو جائے تو مذکورہ دوائیں اس میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور سرد ہونے پر
 چٹائیں۔

سحج امعاء

اس مرض میں امعاء کی اندرونی سطح پر استر کرنے والی فشاہ مخاطی خراش پیدا
 ہو جانے کی وجہ سے اتر جاتی ہے، جس کے سبب نفلی یا دوسری تیز خلط کے گزرنے سے
 امعاء میں تکلیف ہوتی ہے اور ان کی اندرونی سطح چھل جاتی ہے۔

اسباب

۱. تیز صفراوی مادہ کا امعاء پر انصباب
۲. بھم شور، بھم لرنج کا امعاء کی سطح کو پھیل دینا۔
۳. سودائے مقرر لذائق کا امعاء پر انصباب
۴. غلیظ، سخت اور کھردرا نا ہموار براز
۵. کھلا ادویہ
۶. مسبل ادویہ
۷. نقص تغذیہ / قذاللبے اقدالی
۸. کثرت سے نوشی
۹. دق الامعاء
۱۰. قروح الامعاء
۱۱. التهاب معدہ

(۱۴)	برصت معدہ
(۱۵)	سرطان معدہ
(۱۶)	سد الامعاء
(۱۷)	سوء ہضم
(۱۸)	التهاب کبد
(۱۹)	حمی معویہ
(۲۰)	ذات الریہ
(۲۱)	زحیر
(۲۲)	خناق
(۲۳)	ہیضہ

علامات |

امعائی حصہ کے اعتبار سے۔

سج، اگر بالائی حصہ امعاء میں ہو تو درد شدید اور نافت کے اوپر ہوتا ہے،
 نون، آئوٹ اور امعاء کی اندرونی فشار خلی کے سانچے براز کے ساتھ ابھی طرح طے ہوتے
 ہوتے ہیں۔ کرب اضطراب ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے
 سج کے زیریں امعاء میں ہونے کی صورت میں درد میں شدت نہیں ہوتی،
 درد زیر نافت ہوتا ہے۔ خون، آئوٹ و غیرہ براز سے قبل یا بعد آتا ہے، عام طور سے
 ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اور بالقرین ملا بھی ہو تو ابھی طرح گڈمڈ نہیں ہوتا۔
 سج کے اودہ مستقیم میں ہونے کی صورت میں خون اور آئوٹ کے ساتھ
 شحمی اجزاء بھی خارج ہوتے ہیں۔

قرون اور امور میں سج کی صورت میں خون اور امعاء کی اندرونی فشار خلی
 کے سانچے کے ساتھ لیسلی رطوبت خارج ہوتی ہے۔
 اسباب کے اعتبار سے۔

طلبہ صغیر کی صورت میں زرد رنگ کے اسہال آتے ہیں۔ اسہال میں اولاً

صفراء، خریطہ، امعاء کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کے بعد خون، خریطہ امعاء اور لزوجات کے ساتھ خارج ہوتا ہے، مقعد میں سوزش ہوتی ہے، شدید اضطراب اور کرب ہوتا ہے پیاس کا ظہور ہوتا ہے۔

ظہر بطن کی صورت میں خون اور آؤں کے ساتھ بطن خارج ہوتا ہے، یعنی اسہال آتے ہیں، ریاح اور قراقر کی شکایت ہوتی ہے، امعاء کے کسا ایک حصہ میں ثقیل، دہن شکل ہونیوالا درد ہوتا ہے۔

ظہر سودائے محترق لزاج کی صورت میں زیر مزین کی شکایت ہوتی ہے، خون اور آؤں کے ساتھ سوداوی مادہ خارج ہوتا ہے، براز کا رنگ کالی شراب کی تھکٹ جیسا ہوتا ہے۔ کرب و اضطراب کے ساتھ تڑپا دینے والا درد ہوتا ہے۔ جس کے سبب فشی بھی واقع ہو سکتی ہے،

سما دواؤں میں ان کی سرگزشت / مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں، _____ ادویہ مسہلہ کے استعمال کی صورت میں بھی صورتیں پائی جاتی ہیں۔
ثقل کی بیہوشی کی صورت میں قبض ہوتا ہے، امعاء سے خشک براز خارج ہوتا ہے، نیز یابس، قابض اشیاء کے استعمال کی رویت یاد دہنی ہے۔

ظہر نابہ کے امراض مادہ کے بعد کچھ امعاء، ردی تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح کچھ کے ابتدائی مرحلے میں ہی مرہ سودار کا اسہال بھی خراب علامت میں تصور کیا جاتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ خلط کی رعایت کرتے ہوئے منفع، مسہل اور تبرید کا اصول اختیار کریں۔
- _____ امعاء میں براز کے اعتبار کی صورت میں مزلقات استعمال کریں۔
- _____ کچھ، بالائی امعاء میں ہو تو خوردنی دوائیں استعمال کریں، کیونکہ خوردنی دوائیں جلد اثر انداز ہوتی ہیں، اور زیریں امعاء میں ہو تو حقنہ کریں اس سے جلد شفا حاصل ہوتی ہے۔
- _____ امعاء کی عروق کے منہ کھلنے یا سطح پر خراش کی صورت میں منزیات دیں۔
- _____ کچھ کا مادہ رقیق اور سیال ہو تو مغلطات استعمال کریں اور اگر تیز ہو تو محذر ادویہ بھی نسخہ میں شامل کریں۔

- ۔ غلبہ صفراء کی صورت میں باسلیق کی نفعہ کھولیں۔
- ۔ درد کی صورت میں دافع درد دوائیں استعمال کرائیں۔
- ۔ سخی دواؤں کے استعمال کی صورت میں مقیات دیں۔

علاج |

•۔ سچ اسرار صفراء میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صغ عربی، کیتراؤ زرد، نشاستہ، ہر ایک ۱ گرام، سبوس اسپنول، پارتنگ
ہر ایک ۲ گرام، براہ دہی ۲۰۰ گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

کبر باشمی، تخم حمان، بیلگری، کات سفید، ہم وزن ————— تمام دواؤں کا
سفوف تیار کر کے ۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۳۔

پوست خشخاش باریک پیس کر شربت سیب یا شربت انجبار ملا کر چٹائیں۔

نسخہ ۴۔

مازو، عذب، ہر ایک ۱ گرام، صغ عربی ۲ گرام، افیوی ۵ گرام، ————— تمام
دواؤں کو باریک پیس کر چنے کے بقدر خوب بنائیں۔ اور ۱ — ۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۵۔

جو بریاں، تخم خطی، زرد، پوست خشخاش، ————— تمام دواؤں کو پانی
میں جوش دے کر مل چھان کر شربت حب الاس حسب ضرورت شال کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۶۔

ریشہ خطی، بیدانہ، بیج انجبار نیم کوفتہ، تخم خرفہ نیم کوفتہ، ————— تمام
دواؤں کو عرق گاؤ زبان، حق گلاب میں بھگو کر مل چھان کر ربی ہر شیریں ملائیں اور
اسپنول مسلم و تخم ریاں چھڑک کر نوش کرائیں۔

•۔ خارجی طور پر درج ذیل ضاد لگائیں۔

نسخہ

فل ارمنی، صندل سفید، زرورد، اقاقیا، عرق حب الّاس میں ہیں کرمخا دکریں۔
 _____ خلیہ بلغم کی صورت میں درج ذیل نوجبات استعمال کرائیں۔

نسخہ

تخم ریحان بریان، تخم کنوچ بریان ہر ایک، گرام، کشنیز خشک، بلوط، ہر ایک ۵۰۰ گرام،
(سرکہ میں تر کر کے خشک کرنا) حب الہاس ۵۰۰ گرام، شکار ۵۰۰ گرام — تمام دواؤں کو
نیم کو ب کر کے صبح کو، گرام ہر روز آب سیب کھلائیں۔

نسخہ

ہیلہ سیاہ، روضہ گادوں میں بریاں کردہ، بادیاں ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے نبات سفید دو گنا ملا کر محفوظ کر لیں اور ۶-۷ گرام بہرہ عرق بادیاں استعمال کرنا۔
منفوخہ۔

2

منع عربی بریان، بلبلہ لابی مدفن گاؤں میں بریان شدہ، مصلیٰ، ہر ایک ۵۰ گرام، تخم تان بریان، تخم کنوچہ بریان، تخم اسپندان بریان، ریونڈ پیچیف، انیسون، ہر ایک ۱۰ گرام — اسپندان کے علاوہ تمام دواؤں کا ہر ایک سفوف تیار کریں اور اس میں اسپندان شامل کر کے ۱۰ گرام ہمراہ غربت حب الہی استعمال کریں۔

نسخہ

بلبلہ سیاح، مویز منقی کے جو شاندار میں مغز طلوس خیاب شہزاد اور دغمن بادام حل کر کے نوش کرائیں۔

•۔۔۔۔۔ غلبہ سودا کی صورت میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں ۔

مخبر

زیرہ سفید، زیرہ کرمانی، ایسون، دانہ، ہیل کلاں، ناخواہ، تھم کرفس، تھج، ہرایک
گرام، فترنفل ۵ گرام، زنجبیل گرام، بنات سفید ۵ گرام ————— تمام دواؤں کو باریک
پیس کر ۶ گرام استعمال کرائیں۔

سفر

صنّع عربی، گل ارنی، تخم کنوچہ بریاں، تخم رسیاں بریاں، ۱۲ گرام، —————، نمام دواؤں کو

برایک پیس کر اسپنول بریاں ۵۰ گرام ملا کر روضہ گل میں چرب کر کے ۱۰ گرام، ہمراہ شربت
جب آلاس استعمال کرائیں۔
_____ نقل کی صورت میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گائے کے دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں ترنجبین خراسانی ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
ترنجبین کی عدم دستیابی کی صورت میں روضہ گاؤں روضہ بادام برایک ۲۵ ملی لیٹر کے ساتھ
استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم کتان نیم کوفتہ، اسپنول مسلم، تخم خطمی، تخم کنوچہ _____ تمام دواؤں کو حرق کوه
میں تر کر کے مل چھان کر لعاب استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم کتان، تخم حلبہ، حبہ الرشاد _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر
صاف لعاب حاصل کریں۔ اور روضہ کنجد و شہد خالص کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

لعاب ہیدازہ، اسپنول اریثہ خطمی، اشیرہ تخم خیاری شربت بنفشہ اور روضہ بادام مل
کر کے نوش کرائیں۔

د _____ بہل دوائے استعمال کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

اسپنول، گرام، تخم کنوچہ، تخم ریاں، بارسنگ، تخم خشکاش، صغ عربی، گل ارغوا
برایک ۵۲ گرام، تخم حماض، تخم خرد، نشاستہ، برایک ۶ گرام پہلے بھجوں کو بریاں کریں
اور سوائے چہار تخم (تخم ریاں، اسپنول، تخم کنوچہ، تخم بارسنگ) کے جملہ دواؤں کو کوٹ کر
چھان کر چہار تخم ملا کر محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت ہمراہ آب سرد کھلائیں۔

اس مرض میں فاسد اور غیر منہضم مواد، قوت دافعہ کے زور سے متحرک ہو کر معدہ اور اسحاق کی راہ، تے اور اسپال کی صورت میں خارج ہوتے ہیں، ان میں غذا کا لطیف حصہ تے کے ذریعہ اور کثیف حصہ اسپال کے ذریعہ خارج ہوتا ہے، تے میں خارج ہونے والا مادہ صفراوی اور اسپال میں خارج ہونے والا مادہ بلغمی ہوتا ہے۔ اراضیات نقطۂ نظر سے ابتدائی ادیت معارف دقاق کے زیریں حصہ میں حادث التباب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، علاوہ ازیں معارف کبار بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہیں، بہر حال اس التباب کے ساتھ شدید امتلاء کے علاوہ زیادہ مقدار میں مائع تراوش کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، جس میں طویل مقدار میں رطوبت بیضیہ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ خلل اور سطحی شمرہ کے اوپر نقشہ شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قشور شرعی مائع (سیال) میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجہ میں براز چاول کی تیج کی مانند ہو جاتا ہے۔

اسباب

اس کا اصل سبب ریغیشتم ہیفہ (*Vibrio Cholerae*) ہے،

درج ذیل اسباب، اسبابِ معذہ کے ذیل میں آتے ہیں۔

۱۔ غذائی جے اے ای / فوڈ ایڈیٹو۔

انفعالات نفسانی

۴. فاد آب و هوا

(۱۵) سو، میفرم

۱۰۔ اس کے درج ذیل چار انواع انسانوں میں بیعت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔

۱۰. تکان
۱۱. ایام ہیضہ میں تیز مسہلات کا استعمال
۱۲. موسمی اثرات و تغیرات

علامات

علامات کو درج ذیل چار درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱. زمانہ سرایت

اس درجے میں عام ضعف، بستی، ماندگ اور سوزہنم کی خفیف شکایات ہوتی ہیں۔

۲. مرحلہ استفراغ Stage of Evacuation

اس مرحلے میں عام طور پر صبح کے وقت خلاف معمول دو، چار اسہال آتے ہیں۔

مریض ابتداء میں کچھ محسوس نہیں کر پاتا۔ لیکن رفتہ رفتہ دستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے بعد تھے شروع ہو جاتی ہے، تھے میں ابتداء میں معدہ میں موجود اشیاء اور مواد خارج ہوتا ہے اس کے بعد بغیر کسی کوشش کے فوارہ کی مانند زیادہ مقدار میں مائی رطوبات خارج ہونے لگتی ہیں۔ اسہال میں ابتداء میں صفراء آمیز براز خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد (جیسا کہ ذکر ہوا) چاول کی پیچ کی مانند سیال خارج ہوتا ہے، مریض بار بار پانی طلب کرتا ہے اور پیچے کے بعد فوراً تھے کر دیتا ہے، ہاتھ پیروں کے عضلات میں دردناک تشنج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، شکم کے عضلات میں صلابت ہوتی ہے، احتباس بول کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ مرحلہ ۲-۱۵ گھنٹے تک رہ سکتا ہے۔

۳. درجہ بکھوٹ Stage of Collapse

اس درجہ میں ضعف و نقاہت انتہا درجہ کی ہوتی ہے، اور جسم کی باہری

سطح پر خون کی رسد محدود ہو جانے کی وجہ سے برد (ٹھنڈ) کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور مریض کا جسم چھونے پر سرد معلوم ہوتا ہے۔ خون کا دباؤ اشدال سے کم ہو جاتا ہے، نبض لیتن، ضعیف، اور بلی چلتی ہے، بعض اوقات نبض غیر محسوس ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ نیلا اور لب و سونڈے سفید پڑ جاتے ہیں۔ آنکھیں دھنس جاتی ہیں، پلکیں نیم وا، اور منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، آواز خفیف سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوتی ہے، گویا کنویں کی گہرائی سے آرہی ہو، جلد کی مخصوص چمک غائب

ہو جاتی ہے، شکم، زانو، اور شانے کی جلد کو انگوٹھے اور انگشت شہادت سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر چھوڑ دینے پر جلد اپنی اصل وضع پر معمول کے مطابق تیزی سے جھپٹی آتی۔ بلکہ نہایت آہستہ آہستہ آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جسم میں پانی کی غیر معمولی کمی ہے جو شدید صورتوں میں انسان کے جسم کے فی کلوگرام وزن میں ۱۰ ٹی لیٹر ہوتی ہے۔ پانی کی شدید کمی کی صورت میں ہاتھوں کی جلد سکڑ جاتی ہے۔ مذکورہ علامتوں کے باوجود ذہنی اختلال نہیں ہوتا۔ یہ مرحلہ ۱۵—۲۸ گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔

۲. درجہ رد عمل Reactive Stage

اس مرحلے میں رفتہ رفتہ عوارض میں تخفیف ہونے لگتی ہے، چہرے پر زردی نکلنے لگتی ہے، بردی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور جسم گرم ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں کی چمک اور تمام پست طاقتیں بتدریج بحال ہونا شروع ہوتی ہیں، بعض اوقات رینے کے عمل کی شدت کی وجہ سے دوبارہ یہ دایران درجہ کی شکایت ہوتی ہے، جسمانی حرارت میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جسم میں یوریا کی زیادتی اور کبد کی کارکردگی کے درست ہونے کی وجہ سے کچھ کیفیت رونما ہوتی ہے اور دل کے ٹپل ہونے سے موت واقع ہو سکتی ہے، دوسری پیچیدگیوں کی صورت میں احتباس بول، التهاب معدہ و امعاء، ذات الریہ، قروح قریبہ، اسہال ادم اور بول الیم ہو سکتا ہے۔

تقریبی علامات

اسہال دہائی	پیشہ
۱- مرض مقای ہو تا ہے۔	۱- مرض وبا کی صورت میں ہوتا ہے۔
۲- برازی میں چوہے کی طرح طبیعی برازی کی بو ہوتی ہے۔	۲- برازی میں بو نہیں ہوتی۔
۳- برازی میں غیر منہضم غذا، بلغم اور مٹواہ شامل ہوتا ہے۔	۳- برازی میں چاول کی کچھ کی مانند رطوبت خارج ہوتی ہے۔
۴- قے اور اسہال کے ساتھ درد ہوتا ہے۔	۴- قے اور اسہال میں درد نہیں ہوتا۔
۵- پیشاب زلال نہیں ہوتا۔	۵- پیشاب زلال ہوتا ہے۔
۶- احتباس بول نہیں ہوتا۔	۶- احتباس بول ہوتا ہے۔

- ۷۔ براز میں ہیضہ کا جراثیم پایا جاتا ہے۔
۸۔ نقابت غیر معمولی اور طویل ہوتی ہے۔
- ہیضہ**
- ۱۔ ابتداء میں براز اورتے میں غیر منہجم غذا خارج ہوتی ہے، اس کے بعد چا دل کی پیچ کی مانند سیال خارج ہوتا ہے۔
۲۔ عوارض نہایت شدید ہوتے ہیں۔
۳۔ براز میں ہیضہ کے جراثیم ہوتے ہیں۔
- ہیضہ**
- ۱۔ حلق میں درد نہیں ہوتا۔
۲۔ براز چا دل کی پیچ کی مانند رقیق اور سفیدی مائل خارج ہوتا ہے۔ اس میں بو اور خون وغیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی، مردہ اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔
۳۔ طبقہ ملتئم میں التهاب نہیں ہوتا۔
۴۔ موت کے بعد وریدوں میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔
۵۔ براز میں ہیضہ کا جراثیم ہوتا ہے۔
- ۷۔ ہیضہ کا جراثیم نہیں پایا جاتا۔
۸۔ نقابت معمولی اور عارضی ہوتی ہے۔
- خفقہ**
- ۱۔ تے اور اسہال میں صرف غیر منہجم غذا خارج ہوتی ہے۔
۲۔ عوارض زیادہ شدید نہیں ہوتے، ضعف و نقابت بھی غیر معمولی نہیں ہوتی۔
۳۔ ہیضہ کا جراثیم نہیں ہوتا۔
- سنگلیا کا زہر**
- ۱۔ تے سے قبل حلق میں درد ہوتا ہے۔
۲۔ براز خوب رنگین، بدبودار، خون آمیز اور مردہ کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔
۳۔ طبقہ ملتئم میں التهاب ہوتا ہے۔
۴۔ موت کے بعد وریدوں میں خون کا اجتماع نہیں ہوتا۔
۵۔ زہریلا مواد ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ جسم میں ہوئی پانی کی کمی کو پورا کرنے کا ہر ممکن طریقہ اپنائیں۔
۲۔ تنقیہ مواد ہو چکا ہو تو ادویہ تریاقیہ استعمال کرائیں۔
۳۔ مددہ میں دوا نہ رکھی ہو تو دوا کی مقدار کم کر کے تعداد میں اضافہ کر دیں۔
۴۔ اسہال اورتے کو اس وقت تک بند نہ کریں جب تک غیر معمولی ضعف کا

انڈیشہ ذر ہے۔

- ایسی ہمدایر اختیار کریں جس سے مریض کو نیند آجائے۔
- پیاس کے غلبہ کی صورت میں ہاتھ پیروں پر کپڑا سرد کر کے رکھیں۔
- غشی کی صورت میں اطراف کی مالش کریں اور گلخنی سنگھائیں۔
- نمک اور پانی کا محلول استعمال کرائیں

علاج ۱

- معمولی صورتوں میں نمک، گلوکوز اور پانی کا محلول نوش کرائیں۔ اور محلول ۱۰۔
- ملی لیٹر فی کلوگرام جسم کے وزن کے حساب سے ۶ گھنٹہ کے اندر نوش کرائیں۔
- نارجیل دریائی، جدوار، سفیدی، پیپیتہ دلائی، کافور، زہر مہرہ خطائی، فادزہر
- حیوانی ہر ایک ۱۲۵ ملی گرام۔ تمام دواؤں کو عرق کیوڑہ میں گھس کر سکجین، لیمونی
- ۲۵ گرام ملا کر ایک گھنٹہ کے وقفہ سے ۳۔ ۴ مرتبہ کھلائیں۔
- زہر مہرہ خطائی، طباشیر ہر ایک اگر ام کو پیس کر جوارش عود ترش، گرام
- میں ملا کر تھوڑا تھوڑا کھلائیں اور اوپر سے شیرہ زرشک، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک ۳ گرام
- شیرہ آلو بخارا ۵ عدد، عرق بادیان، عرق مکوہ، عرق گلاب، عرق بید مشک، ہر ایک ۵ ملی لیٹر
- میں نکال کر شربت غورہ ۲۵ ملی لیٹر، سکجین سادہ / لیمونی ۳۶ گرام میں ملا کر تھوڑا تھوڑا
- نوش کرائیں۔

- جدوار، نارجیل دریائی، پیپیتہ۔ ہر ایک اگر ام کو باریک پیس کر حوالش ترش
- ۲۵ گرام میں ملا کر تھوڑا تھوڑا کھلائیں۔ اور عرق گلاب ۱۰۰ ملی لیٹر میں سکجین ۲۵ گرام حل کر کے
- وقفہ سے نوش کرائیں۔

- ست اجوائن، ست کافور، ست پودینہ ہم وزن کو ایک شیشی میں بند کر کے
- رکھیں، جب رقیق ہو جائے تو ایک بوتلی میں عرق گلاب اور روغن بادیان ۲۵ ملی لیٹر کے ساتھ ملائیں
- اور تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ۳۶ ملی لیٹر تک نوش کرائیں۔

- سبزی کنول گٹھ، داند ہیل خورد، زرشک، پوست سماق، طباشیر، کشنیز
- مشہ ہر ایک اگر ام۔ تمام دواؤں کو عرق نعناع میں پیس مچان کر خربت انارہ ۲

لی لیٹر ملا کر ۲ — ۳ گھنٹے کے وقفے سے نوش کرائیں۔

• ہیل خورد، دارچینی ہر ایک ۱۲۵ گرام، برادہ صندل سفید، زرشک، انار و انیش، ہر ایک ۵۰ گرام، آلو بخارا، بادیان ہر ایک ۵۰ گرام، پودینہ اکو گرام، طہاشیر ۵۰ گرام، کافور قیسوری ۵۰ گرام، سوائے کافور کے تمام دواؤں کو ۱۰ لیٹر پانی میں ۲۴ گھنٹے بھگو کر لی چھلکے عرق کشید کریں۔ اور کافور کو ایک چوٹی میں بانڈھ کر پچھ کے منہ میں رکھیں اور یہ عرق ۲۵ لیٹر ہمراہ شربت لیمونی حسب ضرورت ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے نوش کرائیں۔

• حلیقیت، کافور، انیون، فلفل سیاہ، ہم وزن کو باریک پس کر چنے کے برابر خوب بنائیں اور کھلائیں۔ اسی نسخہ میں زنجبیل اور جودار خطائی کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

• ست اجوائی ۱ گرام، ست کافور ۲ گرام، ست پودینہ ۳ گرام، انیون خاص ۴ گرام، قرفنل، گرام۔ انیون اور قرفنل کو باریک کر لیں اور تمام دواؤں کے ساتھ ایک شیشی میں رکھیں۔ اور چند قطرے عرق بادیان میں ٹپکا کر ایک گھنٹے کے وقفے سے نوش کرائیں۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

• مٹی ار مٹی، بری سور کو سرکہ میں پس کر پاؤں پر لپیٹ کریں۔
• گرم روغن میں کپڑا بھگو کر معدہ کے مضطرب پر رکھیں، اور دم و روغن بنفشہ سے قرد ملی تیار کر کے مہدام اعصاب پر ضا د کریں، ہاتھ پیروں کے تشنج میں مفید ہے۔
• حق کلاب اور سرکہ سنگھائی اور ان کو جوش دے کر کپڑا بھگو کر تکید کریں۔
• زنجبیل ۱۲ گرام کو باریک پس کر روغن دہنتوں ۶۰ لیٹر میں گرم گرم ملا کر ہاتھ پیروں کی مالش کریں۔


مغص

GRIPES

اس مرض میں اسماں یا مخصوص امعاءے دقاق میں درد اور مروڑ ہوتا ہے، تاہم یہ درد قویٰ ہے کم شدید ہوتا ہے۔

قام

معص



اسباب

- (۱) اسعار کا سود مزاج حار سادہ
- (۲) تیز صفراء کا آنتوں پر ترشح
- (۳) اسعار میں ریح خلیقا کا مقبض ہو جانا
- (۴) خام، ایسہ بلغم کا اسعار سے چٹ جانا
- (۵) بلغم شور بولتی کا اسعار پر انقباض
- (۶) کچ اسعار
- (۷) زحیر
- (۸) قویج
- (۹) دیدان اسعار
- (۱۰) ادویہ مسهل / ثقیل غذاؤں کا استعمال / تبار منہ سرد پانی نوش کرنا
- (۱۱) خشک براز کا اسعار میں اختباس
- (۱۲) بد بھنی / نفع شکم

علامات

معص ریگی میں نفخ شکم، قراقر ہو تا ہے، ریح خارج ہونے کے بعد درمی افاقہ ہو جاتا

اسے اسباب کے اعتبار سے اس کی مزید تقسیم کی جا سکتی ہے۔

ہے، نیز کثیر الرطوبت، خام پھل، سبز ترکاریاں، یا کثیر الکھیت اور ردی الکھیت غذاؤں کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے۔

معنی مزاجی عارسان میں ادویہ حریفہ اور گرم غذاؤں کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے، شکم میں گرانی نہیں ہوتی بلکہ مرن سوزش و تشنگی محسوس ہوتی ہے،

معنی بلغمی بورتی میں تشنگی اور سوزش محسوس ہوتی ہے، گرانی کا احساس بھی ہوتا ہے، قراقر ہوتا ہے، رفع حاجت کے وقت میرز میں کسی قدر سوزش محسوس ہوتی ہے، تے اور براز میں بھی بلغم شور خارج ہوتا ہے۔ معنی بلغمی خمی میں بوجھ میں خدرت ہوتی ہے، درد ایک ہی مقام پر قائم رہتا ہے، بعض اوقات براز میں بلغم غلیظ کا اخراج ہوتا ہے۔

معنی برازی میں تولید نفلی کی علامات پائی جاتی ہیں۔

معنی دیدانی میں دیدان امعاء کی علامات پائی جاتی ہیں اور اوقات دیدان کا اخراج بھی ہوتا

ہے،

معنی صفراوی میں شدید تشنگی اور سوزش کے ساتھ کسی قدر گرانی ہوتی ہے، مریض مضطرب اور بے چین ہوتا ہے، اور بعض اوقات معنی سے قبل ٹھہد اور پس جیسی گرم اشیاء کے استعمال کی روئیداد بھی ملتی ہے۔

معنی سردی، ورمی اور قرمی میں احتباس نفل، التهاب امعاء، قروح امعاء و فیبرہ کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔

امعاء باخصوص امعاء وفاق میں مروڑ اور درد محسوس ہوتا ہے، درد کی شدت سے بعض اوقات مریض مضطرب اور کربناک ہو جاتا ہے اور مقام معدہ کودباتا ہے۔ یہ درد عام طور سے صبح کے وقت، خلور معدہ میں ہوتا ہے، بعض اوقات تھوکی کثرت سے آتا ہے اور متاثرہ مقام چمکنے سے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

قولنج

معنی

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ۱۔ شکم میں درد اور مروڑ ہوتا ہے۔ | ۱۔ شکم میں نہایت شدید درد ہوتا ہے۔ |
| ۲۔ عام طور سے تھمدیا تناؤ نہیں ہوتا۔ | ۲۔ تھمدیا تناؤ ہوتا ہے۔ |

- ۳۔ قبض ہو سکتا ہے اور کبھی اسہال بھی ہوتا ہے۔
 ۴۔ مرض اسہال دقاق ہوتا ہے۔
 ۳۔ خدیہ قبض ہوتا ہے۔
 ۴۔ مرض ردۃ قولون میں ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
 ۲۔ مucus ریکی میں کاسر ریاح دواؤں کے ساتھ منضج بلغم ادویہ بھی استعمال کرائیں۔
 ۳۔ ضعف معدہ کی صورت میں مقویات معدہ استعمال کرائیں۔
 ۴۔ خلط خام بلغمی میں اگر مادہ بالائی امعاء میں ہو تو مقیات استعمال کرائیں۔
 ۵۔ خلط خام بلغمی اگر زیریں امعاء میں ہو تو حقنہ دیں اس کے بعد مقیات بلغم استعمال کرائیں۔

- ۱۔ سور مزاج عارضہ میں تعدیل مزاج کریں۔
 ۲۔ مucus صفراوی/ سوداوی میں منفعیات صفراء/ سودا استعمال کرائیں، سودا کی صورت میں حقنہ اور تے کرانا زیادہ سود مند ہے۔
 ۳۔ دیدان امعاء، ریح الامعاء، زحیرہ دم، اور احتباس براز و فیروزہ کی صورت میں اصل سبب کا ازالہ کریں۔

علاج

- ۱۔ مucus ریکی میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، تخم کشوث، زیرہ سیاہ ہوزن ————— تمام دواؤں کو عرق بادیان میں ہیں
 چھان کر گھنڈہ ۲ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مصطکی روی اگرام، باریک پیس کر گھنڈہ ۲ گرام میں ملا کر کھلائیں اور عرق بادیان نوش
 کرائیں۔
 نسخہ ۳۔

شک ۲۵۰ ملی گرام، پس کر لگند ۲۵ گرام میں ملا کر کھلائیں اور بادیان اور زیرہ باریک
پس کر عرق بادیان کے براہ نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

اسطوخودوس، صغتر فارسی، تخم کرفس کو پانی میں جوش دے کر چھان کر لگند ۲۵ گرام،
ملا کر نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

کندر، تخم شبت، بادیان ہر ایک ۲۵ گرام، تخم کرفس ۱۰ گرام، نان خواہ ۵۰ گرام و
تمام دواؤں کو باریک پس کر پانی میں گوندہ کر اتراس بنائیں اور ۵۰ گرام 'براہ عرق بادیان
استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

تخم مولی مشوی ۱۰ گرام، باریک پس کر شہد میں ملا کر بار بار چٹائیں۔
نسخہ ۱۔

نک سیاہ، حلیقہ خالص، ہم وزن کو باریک کر کے اگرام کھلائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

باجرے کے آنے کی نک ملا کر روٹی پکائیں، جب ایک طرف سے پک جائے تو نیم گرم حالت
میں ہی تکید کریں۔
نسخہ ۱۔

آرد جو، زیرہ، تخم بید انجیر ہم وزن کو پانی میں پس کر نیم گرم کر کے شکم پر خاد کریں۔
_____ مضمض صفراوی میں درج ذیل نسخے استعمال کریں۔
نسخہ ۱۔

اسپنول مسلم، تخم ریحان، تخم بارتنگ، ہم وزن کو روضی گل میں مدھن کر کے عرق کلاب کے
ساتھ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

کلاب بیدانہ، کلاب خطی، عرق ملاؤ زبان میں نکال کر روضی با دام شیریں ملا کر نوش کرائیں

نسخہ ۱۔

عرق کلاب ۱۰ لیٹر، آب اتارہ ۸۰ لیٹر میں اسپنول ۹ گرام چھڑک کر روغن گل ۶ لیٹر، بنات سفیدہ ۲ گرام اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

تخم کاہوتقشہ، تخم قرظہ، افیون ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک پس کر لعاب اسپنول میں ۱۔ اگر ام کے جوب بنائیں اور ۲ — جوب تک کھلائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

برہم ستاسبز، کو باریک پس کر روغن گل ملا کر شکم پر پیپ کریں
_____ معنی بلغمی میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

زیرہ، تخم خیار نیم کوفتہ، ہم وزن کو عرق بادیان میں جوش دے کر ل چھان کر شربت بنفشہ ملا کر اوپر سے اسپنول چھڑک کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

نانخواہ ۳ گرام، حب بلساں ۹ گرام، دونوں کو باریک پس کر ۵ گرام ہمراہ آب نیم گرم عرق بادیان استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

جوارش مصطفیٰ / مارا اصل نوش کرائیں / عرق نانخواہ اور عرق قرفل استعمال کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں


نسخہ ۷۔

روغن گل ناف کے گرد لٹائیں۔

قولنج

COLIC

اس مرض میں احشاء بطنی (Abdominal Viscera) خصوصاً قولون (خصوصاً قولون) کے غیر اختیاری عضلات میں غیر منظم تشنج اور شدید درد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی احتباس برازی کی بھی شکایت ہوتی ہے۔



لہ اس مرض کا اثر قولون پر ہی ہوتا ہے۔

لہ اس میں مرض کا مرکز کوئی دوسرا عضو ہوتا ہے لیکن ثانوی طور پر قولون تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔
 لہ اس کے دونوں انواع بعض اوقات سیدی کے ذیل میں آ سکتی ہیں، ملاحظہ ہے کہ اس تقسیم میں صرف اضافہ کی گنجائش ہے۔

اسباب

قولج ذاتی۔

۱۔ قولج ذاتی سازج۔

۲۔ قولج کا سوزاج سادہ عاریا میں

۳۔ بیرونی ہوگی حرارت

۴۔ قولج ذاتی مادی۔

۵۔ غیر سدی۔

۶۔ رصاص کی سمیت

۷۔ نحاس کی سمیت

۸۔ سدی۔

۹۔ سدی وری۔

۱۰۔ غلبہ اخلاط

۱۱۔ سدی ریجی۔

۱۲۔ غلبہ ریاح

۱۳۔ سدی دیدانی۔

۱۴۔ دیدان اصغار

۱۵۔ سدی التوائی۔

۱۶۔ التواء اصغار

۱۷۔ سدی ثقلی۔

۱۸۔ غذاؤں کی خشکی

۱۹۔ مقدار غذا کی کمی

۲۰۔ قولج کی حرارت و بہت

۲۱۔ قولج میں قوت حس کی کمی

۲۲۔ ادوار ہول کی کثرت

۱۴۴) دوزش کی زیادتی

۱۴۵) کثرت حمل

تولج عری۔

تولج کلوی

۱. حصاة الکلیہ

۲. ضربہ دستقط کے بعد دسویں لوتھڑے کا کلیہ یا حالب سے گزرنا

۳. التهاب حوض کلیہ

۴. التهاب مدیدہ کلیہ

۵. تملک کلیہ

۶. سلعہ کلیہ

تولج مثانی

۱. حصاة شادہ

۲. ضربہ دستقط شادہ

تولج رجمی

۱. مسرہ الطیف

۲. اتصاق الرجم

۳. سیلان الرجم

۴. التهاب بطانہ رجم

۵. سلعات الرجم

۶. استفاط عمل

تولج کبدی

۱. التهاب کبد

تولج معدی

۱. شدید بدہضمی

۲. اتصاق معدی

۱۰. التهاب معدہ

۱۱. نزف الدم معدی

تولخ مراری

۱۲. حصاة مراره

۱۳. حصاة قنات صفراوی

۱۴. التهاب مراره

۱۵. قنات صفراوی کا سرطان

۱۶. قنات صفراوی کے پاس غدہ لغادیہ کا تضخم

متفرقات :-

۱۷. تیز مسہلات

۱۸. شکمیا / ائمہ کا زہر

۱۹. انفعالات نفسانی

علامات |

لموارد ہے کہ یہاں، صرف تولخ ذاتی کی علامات تحریر کی جائیں گی، تولخ مرضی کا تفصیلی تذکرہ ان اعضاء سے متعلق امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔
۱. عمومی علامات :-

ابتداء میں براز طبعی عادت سے کم مقدار میں، خشک آتا ہے، اجابت معمول کی نسبت کچھ دیر میں ہوتی ہے، قلت اشتہار پھر بطلان اشتہار ہوتا ہے، مرض اور شیریں اشیاء سے نفرت اور ترش اور شور اشیاء کی طرف رقت ہوتی ہے، مرض اور شیریں اشیاء کے کھانے کے بعد طبیعت مائلن کرتی ہے، ضعف ہوتا ہے، شکم میں ہر وقت ہنٹھن اور مردرد ہوتا ہے، کمر اور پندلیوں میں درد محسوس ہوتا ہے، پانی پینے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔
اس کے بعد اعراض شدت اختیار کر لیتے ہیں، براز اور ریاح کا اخراج قطعاً بند ہو جاتا ہے، ڈکار و فیہ بھی نہیں آتی۔ شکم میں ناف کے اطراف میں نوکیلی چیز کے جھنکے کی مانند نوبتی درد اور مردرد محسوس ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، شدت درد کی وجہ سے مریض ترپنے لگتا ہے۔

بعض اوقات قشعریرہ، سرد پسینہ آتا ہے، برد اطراف ہوتا ہے۔ پیشاب سرخ آتا ہے بعض اوقات احتباس کی شکایت ہوتی ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ سوزھوں پر بیگنی یا نیلی لکیریں پڑ جاتی ہیں، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، خصوصاً کلائی کے عضلات مفلوج سے ہو جاتے ہیں۔ شدید نفع شکم ہوتا ہے، براز خارج کرانے کی تدبیر میں خلیط، لیسدار رطوبات اور کبری کی میٹھنی کی طرح بستہ براز خارج ہوتا ہے، بعض اوقات کف دار براز خارج ہوتا ہے، بعض اوقات طبعی، صغریٰ، کراٹی، زنگاری یا سوداوی نئے شروع ہو جاتی ہے۔

۱۰، خصوصی علامات۔

۱۱، غیر سدی۔

تویخ نخی۔

تویخ کی عام علامتوں کے ساتھ متلی زیادہ ہوتی ہے، تے بھی آتے ہیں، تنفس میں تنگی ہوتی ہے، جسم کارنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، ہونٹ نیلے ہوتے ہیں، سوزھوں پر بیگنی رنگ کی دھاریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ متفکر نظر آتا ہے، شکم کو دبانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

تویخ رصاصی۔

تویخ کی عام علامتوں کے علاوہ شکم میں تشنج، ہاتھ پیروں اور پشت میں درد ہوتا ہے، لاغری وضعف ہوتا ہے، سوزھوں پر نیلی دھاریاں پڑ جاتی ہیں، کلائی کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں،

۱۲، سدی۔

سدی درمی۔

۱۳، درمی دسوی۔

تویخ کی علامات آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں، براز کا احتباس بھی بتدریج ہوتا ہے، اسباب گرائی ہوتی ہے، ایک ہی مقام پر ٹیس، انتہاب کے ساتھ تشنجی درد محسوس ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، عروق متلی ہوتی ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے، شدید عوارض میں احتباس بولی ہوتا ہے، ذائقہ شیریں، چہرہ سرخ، اور ہلکوں پر بھر بھرا ہٹ ہوتی ہے، بعض اوقات شکم میں شدید حرارت اور سرخی محسوس ہوتی ہے۔ برد اطراف ہوتا ہے۔

۱۴، درمی صغریٰ۔

درد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے، تسلی اور نفع کی شکایت ہوتی ہے، تھپی
 زردی یا سبزی مائل صفراء خارج ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ ذائقہ تلخ ہوتا ہے، خند
 نہیں آتی سوزش اور جلن ہوتی ہے، صفراء کے اخراج کے بعد راحت ملتی ہے، ماسی طرح سرد معمولات
 سے بھی سکون ملتا ہے، درد میں تیسرے درجے کی شدت ہوتی ہے، عوارض کے دیر پا ہونے کی صورت میں
 یرقان، التهاب امعاء اور فشی کے امکانات ہوتے ہیں۔
 رقی، درجی بلغمی۔

عوارض میں سکون ہوتا ہے، سوزش معدوم ہوتی ہے، منہ میں تری اور ذائقہ میں
 شدت کا غلبہ ہوتا ہے، کسندی اور امعاء میں لہجنا زیادہ گرائی ہے، شکم میں ہر وقت
 میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے جو کسی شے کے خورد ہونے کے وقت کسی قدر بڑھ جاتا ہے، شاذ تھا
 چھوٹے پر نرم اور متغیر محسوس ہوتا ہے، چہرے پر بھر بھراہٹ اور ڈھیلے پن نمایاں ہوتا ہے،
 بعد میں شدت کا درد ہوتا ہے، قبض بھی اس قدر ہوتا ہے کہ براز، ریاح یا کسی اور خلط کا اخراج
 نہیں ہو پاتا، بھلاہ اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے۔ بالفرض براز خارج بھی ہوتا ہے تو پھولا
 پھولا، جھاگدار اور طبعی آئینہ نش کے ساتھ ہوتا ہے۔
 دلا، وری سوداوی۔

شکم میں دفعتاً تلخ ہوتا ہے، پیاس میں صفراوی کی نسبت شدت نہیں ہوتی،
 ترش ڈکھریں آتی ہیں، ذائقہ بھی ترش ہوتا ہے، طحال کے ماؤف ہونے کی سرگزشت ملتی ہے،
 برازیادہ یا سیاہی مائل خارج ہوتا ہے، بعض اوقات نمی رعب ہوتا ہے۔
 سدا ریجی۔

شکم میں نفخ و قراقر ہوتا ہے، جو ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
 مرد اور تسلی کی شکایت ہوتی ہے، گل کرڈ کار نہیں آتی تاہم ڈکار آنے پر کسی قدر راحت محسوس
 ہوتی ہے، رین سیدھا کڑا ہونے پر قادر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جھینا ہوا ایک ہی جگہ پر ٹھہرا
 ہوا درد محسوس ہوتا ہے، اور وہاں پھونے سے نفخ اور ابھار کا پتہ چلتا ہے، مقام درد کو دبائے
 پر راح ملتی ہے، دودھ کے طویل ہونے کی صورت میں چہرہ متفکر، جسم سرد ہوتا ہے، نبض
 ضعیف چلتی ہے، نفاخ غذاؤں اور سرد غذاؤں کی روئیداد ملتی ہے۔
 سدا دیدانی۔

خلو، معدہ کی حالت میں درد میں بہت شدت ہوتی ہے، طبیعت مالش کرتی ہے،
تویح کے وقوع سے قبل برازیں، دیہان امعاء یا اس کے لاردا کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

معدی ۲ التوائی۔

علامات یک بیک رونما ہوتی ہیں، درد یکساں اور بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے،
درد ایک ہی جگہ مرکوز ہوتا ہے، خدیجہ جدوجہد، ضربہ و سقوط اور بھاری بھرکم بوجھ اٹھانے کی
روئیداد ملتی ہے،

معدی ثقلی۔

ابتداء میں براز خشک، مٹھلی دار آتا ہے، خشک غذاؤں کے استعمال کی روئیداد
ملتی ہے، امعاء میں گرانی کا شدید احساس ہوتا ہے، درد کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے
کہ گویا آنت پھٹی جا رہی ہے، اسباب کے اعتبار سے کیفیات میں اختلاف ممکن ہے، تاہم
بنیادی عوارض کم و بیش یکساں ہوتے ہیں۔

بعض اوقات انفعالات نفسانی سے بھی تویح عارض ہو جاتا ہے، اس میں نفع شکم
بھی ہوتا ہے، درد پہلو بدلتا ہوا، پشت اور سینہ کی طرف سے منتقل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے،
شکم کو دبانے سے راحت ملتی ہے، سبب کے ختم ہونے پر درد از خود ختم ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

وجع الکلیہ

- ۱۔ ابتداء میں ریت یا کوئی خلط ملا ہوا پیشاب
خارج ہونے کی سرگزشت ملتی ہے۔
- ۲۔ درد کلتین کے مقام پر، ربرڑھ کی جڑی
کے دائیں بائیں، کمر کے قریب، پیچھے کی طرف
ہوتا ہے۔

- ۳۔ خلو، معدہ میں کم نہیں ہوتا۔

تویح

- ۱۔ عام طور سے متواتر تھوڑی ردی غذاؤں
کے استعمال، نفع و قراقر اور احتیاس براز و فرج
علامات درویداد ملتی ہے۔
- ۲۔ درد عام طور سے ناف کے نیچے سے
شرع ہو کر ناف کے اطراف میں، دائیں بائیں
پھینا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور لبتا شکم کے
اٹھے اور پیرو کی طرف مائل رہتا ہے۔
- ۳۔ خلو، معدہ میں درد میں سکون ملتا ہے
اور غذا لینے کے بعد عوارض میں شدت ہوتی ہے،

- ۱۔ درد قحطی سے ہی عرصے میں شدت سے
دفعاً شروع ہوتا ہے۔
- ۲۔ درد قحطی تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ
ظہور پذیر ہوتا ہے۔
- ۳۔ قلت بول یا احساس بول کی شکایت
ہوتی ہے، اور اس میں ریت اور خون کی آمیزش
ہوتی ہے۔
- ۴۔ سفر اوی تے آنے سے درد میں تخفیف ہوتی
ہے۔
- ۵۔ مفتت دواؤں سے راحت ملتی ہے۔
- ۶۔ قبض اور قراقرہ نہیں ہوتا۔
- ۷۔ عام طور پر مردوں میں، بچپن اور جوانی
میں کثیر الوقوع ہے۔
- ۸۔ شدید قبض اور قراقرہ ہوتا ہے۔
- ۹۔ ہر عمر اور ہر جنس میں ہو سکتا ہے، نحاس
اور رصاص کا کام کرنے والوں میں کثیر الوقوع
ہے۔

تعریفی علامات

التهاب حول الاعور

- ۱۔ قبض ہوتا ہے۔
- ۲۔ سلعہ بتدریج ردیما ہوتا ہے اور
اس میں نا ہواریت ہوتی ہے۔
- ۳۔ خون اور طبعم کی آمیزش نہیں ہوتی۔
- ۴۔ قشریرہ اور پسینہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ تے میں برازی مادہ خارج نہیں
ہوتا۔
- ۶۔ برد اطراف اور نقاہت میں شدت
نہیں ہوتی۔

قورنج التوائی

- ۱۔ مکمل طور پر سدالامحار ہوتا ہے
- ۲۔ سلعانی کیفیت یک بیک نمایاں ہوتی
ہے اور سلعہ معمولی شکل کا ہوتا ہے۔
- ۳۔ برازی خون اور طبعم کی معمولی سی
آمیزش ہوتی ہے۔
- ۴۔ قشریرہ اور پسینہ نہیں ہوتا
- ۵۔ تے میں برازی مادہ خارج ہوتا
ہے۔
- ۶۔ یکایک برد اطراف اور نقاہت کا
ظہور ہوتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ مزاج کی حالت میں اسماء کے صاف کرنے اور قوت میں اضافہ کا خیال رکھیں۔
- _____ مادہ مرض اخراج پر آمادہ ہو اور سدہ زیادہ قوی نہ ہو تو مسہلات استعمال کرائیں۔
- _____ مادہ کے قوی ہونے کی صورت میں ابتداء میں خفیف حقنہ اس کے بعد تیز حقنہ دیں۔
- _____ حمی کی حالت میں تیز حقنہ سے احتراز کریں۔
- _____ قوی ورمی میں دائیں ہاتھ میں باسلیق اور اکمل کی فصد کھولیں۔ اور احتیاطاً بول بھی ہو تو صافنی کی فصد کھولیں۔
- _____ قوی ورمی صغریٰ میں خلط اور مزاج کی تبدیلی کریں۔ اجابت کی تلپیں کی تدابیر کریں۔
- _____ قوی ورمی طفلی میں حقنہ کے بعد معجون تربہ وغیرہ استعمال کریں۔
- _____ قوی ورمی سوداوی میں منقعات و مسہلات سودا استعمال کرائیں۔
- _____ قوی ورمی میں کاسرات استعمال کرائیں۔
- _____ قوی ورمی میں مزلق لعاب اور روغن وغیرہ نوش کرائیں۔
- _____ قوی التوائی میں مریض کو پشت کے بل لٹا کر اس کی دونوں پٹیاں مضبوط باندھیں، شکم، پشت، پہلو کو آہستگی کے ساتھ لی کر ای کے ہاتھ پیراٹھائیں اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہلائیں۔ تاکہ التوائی معار اپنی جگہ پر آجائے اور درد میں سکون ہو۔
- _____ قوی ورمی نحاسی اور رصاصی میں حقنہ آیزن اور کیمیکہ کا اصول اختیار کریں۔

علاج |

• _____ ورمی میں حقنہ کے بعد تلپیں کی فرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آب برقی مکوہ سبز مردق، آب برقی کاسنی سبز مردق، آب انار، آب کالج، میں مغز

فلوس خیارشبز اور روغن بادام کا اضا ذکر کے نوش کرائیں۔
زمانہ و تزیادہ میں درج ذیل میں نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

منز فلوس خیارشبز ۳ گرام، لکفندہ ۲۵ گرام، شیر فشت ۲۵ لیٹر، آب کوہ ۱۰ آب
کاسنی ہر ایک ۱۲۰ لیٹر، حق کلاب ۵، ۱ لیٹر، میں ملا کر، مل چکان کر روغن بادام ۶ لیٹر کا
اضافہ کر کے نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل تداویز کریں۔

نسخہ ۱۔

روغن گل، سرکہ میں کپڑا کر کے دم پر رکھیں۔

نسخہ ۲۔

مندل سفید، مندل سرخ کلاب میں پس کر مٹا د کریں۔

نسخہ ۱۔

گل بنفشہ، تخم خلی، گل بابونہ، آرد جو، باریک پس کر تھوڑی موم خام اور روغن گل میں
ملا کر صاب تخم کتان ملا کر مرہم بنائیں اور مقام دم پر مٹا د کریں۔

نسخہ ۱۔

بنفشہ، منب الشعلب، خلی، خبازی، جو منقشہ، گل خیرہ، ہوزن کو پانی میں جوش
دے کر آبز ن کرائیں۔

نسخہ ۱۔

روغن بنفشہ، روغن زیتون، روغن بابونہ، ملا کر نیم گرم مالش کریں۔

نسخہ ۱۔

مثبت، اذخر، اکیل الملک کو پس کر نیم گرم مٹا د کریں۔

تولج ورمی بلغمی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

حق کلاب، حق کوہ ہر ایک ۵ لیٹر میں روغن بید انجر ۲ لیٹر مل کر کے
نوش کرائیں۔ اس سے بلغم کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔

نسخہ ۱۔

سنائے کی ۱ گرام، گل بنفشہ، گل سرخ، بادیان، ہر ایک ۱ گرام، تخم قرطم ۵۰ گرام
انیسویں ۳ گرام، مویز منقی ۳۵ گرام، تمام دواؤں کو حق مقلب اور حق مکوہ میں
جوش دے کر ل چھان کر روغن بیدانجیر ۴ لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جوارش مصطفیٰ ۱ گرام کھلا کر، بادیان ۱ گرام، تخم قرطم ۳ گرام، انیسویں ۳ گرام کو
حق مکوہ میں پس کر ل چھان کر شہد خالص ۲۵ لیٹر ملا کر تخم حرف ۳ گرام چھڑک کر نوش
کرائیں۔ تنقیہ و بلغم کے بعد اس کا استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

منز بادام باریک پس کر شہد میں ملا کر ۲۵ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

سبوس گندم، منز تخم قرطم کو پانی میں جوش دے کر ل چھان کر شہد خالص، منز
بادام شیریں ملا کر حسب دستور حریرہ تیار کریں اور کھلائیں۔
• خارجی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بجری کے مرارہ کے پانی میں بورہ ارمنی حل کر کے ناف کے ارد گرد طلا کریں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، برادہ شاخ گوزن، شحم خنظل، پانی میں باریک پس کر ناف کے اطراف میں
ضما کریں۔

• قویخ ریچی میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زیرہ، انیسویں، بادیان، تخم کرنس، پوست نیک کبر، بیخ بادیان، عنب الثعلب،
گل سرخ، ہر ایک ۱۰ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان کر روغن بادام
اور شہد خالص حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

برگ سداب، پودینہ خشک، فلفل سیاہ، نای خواہ، کرویا، کاشم، زنجبیل، دارچینی،
دار فلفل ہوزن، — تمام دواؤں کو کوت چھان کر شہد خالص تینہ گنا ملا کر صحت بنائیں اور
استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زیرہ کرمانی، صغیر فارسی، شونیز، ہر ایک ۴ گرام، پانی الیڑ ۵۰۰ ملی لیٹر میں جوش دیں
جب ۵۰۰ ملی لیٹر رہ جائے تو لی چھان کر ۹۰ ملی لیٹر، ہمراہ روغن بید انجیر ۹۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
نسخہ ۲۔

قرنفل، دانہ ہیل، ہر ایک ۲ گرام، عرق بادیاں، عرق کلاب ہر ایک ۸۵ ملی لیٹر، مید جوش
دیں اور لی چھان کر شہد خالص سے شیری کر کے چند بار نوش کرائیں۔
نسخہ ۳۔

فلفل سیاہ، سہاگ چوکی، صبر زرد، حلیت، ہوزن، — تمام دواؤں کو ہدیک
پس کر لعاب ٹھیکوار میں چنے کے بقدر گولیاں بنائیں اور ۲ گولیاں صبح، شام ہمراہ عرق بادیاں
استعمال کرائیں۔
نسخہ ۴۔

حلیت، منہ تخم بید انجیر، منہ کر بخوہ، زنجبیل، کندش ہوزن، — تمام
دواؤں کو باریک پس کر لعاب ٹھیکوار میں گوندہ کر جنگل بیر کے برابر صوب بنائیں اور ایک
حب ہمراہ آب نیم گرم، صبح، شام کھلائیں۔
نسخہ ۵۔

صوب بید انجیر خاکستر، کھلا کر عرق بادیاں نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زرد صوب، ہالون، زنجبیل، ہوزن، — تمام دواؤں کو باریک پس کر انہیں حل
کر کے مقام درد پر ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

مونگ کے آٹے کی روٹی ایک طرف پکا کر دوسری طرف روغن بید انجیر حل کر زنجبیل، حلیت

ہیں کرا چھڑک کر نیم گرم مقام دہ پر نگید کریں۔

نسخہ ۱۔

آب برگ بیدانگیر ۳۰ ملی لیٹر، روغن چنبیلی ۲۰ ملی لیٹر، روغن کو ملا کر خوب پکائیں، جب
مرق روغن رہ جائے تو اتار کر صاف کر کے نیم گرم طلا کر لیں۔

_____ قویج ثقلی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

تخم کتان، تخم طیبہ، حب الرشاد، ہر ایک ۳۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی
۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو ترنجبین خراسانی ۵۰ گرام، روغن کجند ۳۰ ملی لیٹر،
حل کر کے ۲۰ ملی لیٹر کے بقدر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

تخم شبت کو پانی میں جوش دے کر یارج فیتراہ ۵۰ گرام، روغن بیدانگیر ۳۰ ملی لیٹر حل
کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

گل بنفشہ ۵۰ گرام، اصل السوس ۳۰ گرام، سویر منقہ ۱۵ عدد _____ تمام دواؤں کو پانی
۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیں، جب ۵۰ ملی لیٹر رہ جائے تو لچھان کر مغز غلوس خیارشبز ۵۰ گرام، روغن
بادام ۱۰ ملی لیٹر حل کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

شیر گاؤ ۵۰ ملی لیٹر، روغن ندد ۱۲۵ ملی لیٹر، ترنجبین ۲۰ گرام _____ تمام
دواؤں کو ملا کر چھان کر نیم گرم نوش کرائیں۔

نسخہ ۶۔

گل سرخ، تخم خرفہ مقشر ہر ایک ۲۰ گرام، مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، مغز بیدانہ،
نشاستہ، گلانیلو فر، ہر ایک ۵۰ گرام، کشنیز خشک، مصطکی روئی، ہلہ شیر، کیترا ہر ایک ۲۰ گرام،
مغز جمال گوشت مدبر ۲۰ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب اسپنول میں چنے
کے ذریعہ اقواس جائیں ادا ۱۔ ۲ گرام کھلا کر حق غلاب میں ونبات سفید حل کر کے نوش کرائیں۔

_____ قویج التوائی میں اصول علاج کے ذیل میں بیان کردہ تدبیر اختیار کریں، اور ۔

درد کے لیے نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ریونڈ، بیلہ زرد، مغز بادام شیریں ہر ایک ۵ گرام، انزروت ۵ گرام، زعفران ۱ گرام،
تمام دواؤں کو باریک پس کر حسب ضرورت استعمال کرائیں۔
فتق کی صورت میں یہ نسخہ خاد استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

کلی سرخ، جوز السرد، مصطکی ہموزن کو پانی میں پس کر خاد کریں۔
تو لچنخا کا میں یہ نسخہ دیں۔

نسخہ ۳۔

آب کوہ بزمروق، ۱۰۰ لیٹر میں شربت دنیا ۲۵ لیٹر ص کر کے نوش کرائیں

نسخہ ۴۔

جوارش کوئی ۵ گرام، براہ عرق بادیات ۱۰ لیٹر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵۔

قرظہ، قرفی، دارچینی، سیلین، سنبل الطیب، زنجبیل، جوز بوا، مصطکی، سیل خورد کلاں،
حب بلساں، زعفران ہر ایک ۵ گرام، ستمونیا مدبر ۶ گرام، تربد موصوف، حب النیل، ہر ایک ۱۰ گرام،
بنات سفید ہم وزن جملہ ادویہ ————— تمام دواؤں کو باریک پس کر معجون بنائیں اور ۵۰۰
گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

گندھک آلسار مدبر ۵۰۰ گرام صبح شام کھلائیں۔ اس کو وقتہ درد کی حالت میں دیں۔
خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ ۷۔

پانی گرم میں صابون حل کر کے روغن بید انجیر ۲ لیٹر، روغن تارہین، ۵ لیٹر ملا کر

حفظہ کریں۔

نسخہ ۸۔

گرم پانی میں آبن کرائیں۔

• قویج بھامی میں مذکورہ تدابیر کے ساتھ خود ذی طبع پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
نسخہ ۲۔

قرہ سفید، سورنجان فیریں، حب الفیل، ہر ایک ۵ گرام، ستارہ کی، بلیلہ زرد، ہر ایک
۲۰ گرام ——— حمام عداؤں کو ہر ایک پیس کر روغن ہادام میں چرب کر کے، براہ آب نم گرم
کھائیں۔ اس سے تنقیہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد چند دنوں یہ نسخہ استعمال کریں۔
نسخہ ۳۔

مجوی سورنجان، حب سورنجان کھائیں۔
خارجہ طبع پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔
پوست خشک، ۲۰ گرام، حق مقلب ۵۰۰ ملیٹر میں جوش دے کر ٹکور کریں۔ مسک
دے۔

ایلاؤس

ILEUS

اس مرض میں عمار دقاق میں التوائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا مادہ براز کے محتس ہونے سے
قویج سے مشابہ مرضی علامات رونما ہوتی ہیں لیکن براز مبرزگی بجائے (ایلاؤس) منہ سے
خارج ہوتا ہے۔

اسباب

۱. قویج کے جمل اسباب
۲. سور مزاج عمار دقاق سازج / مادی
۳. التباہ عمار دقاق۔

۴. بعض اہلہار ایلاؤس اور قویج التوائی ایک ہی مرض تصور کرتے ہیں۔ تاہم اہلہار کے قدم کے یہاں
ایلاؤس ایک مرض ہے۔

۱. قروح معاد دقاق۔
 ۲. سرطان معاد دقاق
 ۳. ریاح غلیظہ کا معاد دقاق اعتبار
 ۴. گرم / سرد ادویہ اور سکوم

علامات

دھان کے اوپر شدت کا درد ہوتا ہے، مقام ماؤن پر بندی سی محسوس ہوتی ہے۔
 شکم پھول جاتا ہے، پچکیاں آتی ہیں، کرب، خفقان، فشی کی شکایت ہوتی ہے، بے خوابی،
 برد اطران ہوتا ہے، نبض ضعیف چلتی ہے، سقوط قوت اور تھج اطران چشم کی شکایت ہوتی ہے،
 سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حقنہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرض کا اثر معاد دقاق
 میں ہوتا ہے جہاں حقنہ اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ اور مبرز کے راستے کچھ بھی خارج نہیں ہوتا،
 بار بار تھے آتی ہے، جس میں براز خارج ہوتا ہے۔

اصول علاج

۱. قورچ کی نسبت زیادہ قوی علاج کریں۔
 ۲. حقنہ کی نسبت خوردنی ادویہ استعمال کرائیں، بعض اطباء مہل ادویہ
 کے استعمال کو مفتر تصور کرتے ہیں۔
 ۳. عملیہ راپریش کریں۔
 ۴. شکم پر سنگیاں کھجوائیں۔

علاج

تخم کرنس، انیسون، ہر ایک ۸ گرام، اسنتین ۲۲ گرام، سلیفہ ۵ گرام، جند بیدستر،
 مرصاف، انیون، فلفل ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵ گرام
 استعمال کرائیں۔



۱. قورچ، بالخصوص قورچ التوائی کا اصول علاج / علاج اختیار کریں

سدا الامعاء

INTESTINAL OBSTRUCTION

اس مرض میں امعاء کے ہماری میں جزوی یا کلی طور پر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، —
یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام



امراض معدہ و امعاء۔

1، دبیلة المعدة

2، سلة معدہ

3، التواء امعاء

ۛ اطباء نے اس کی بعض انواع کا ذکر جیسے سے کیا ہے۔

دیدان امعار
 سلسلہ امعار
 امعار کی دیوار کا مفلوج ہونا
 زیر وزن
 سرطان امعار
 امعار میں لیسہ اور براز کا احتباس
 بواسیر

متفرقات :-

حصہ صغریہ
 انتہاب باریطون
 رحم یا عانہ کا سلسلہ
 ناف تل جانا
 غذائی بے اعتدالی

علامات

مرضی علامات کا انحصار عام طور سے مقام مرض پر ہوتا ہے، چنانچہ بالائی حصہ کی امعائی رکاوٹ عام طور سے بہت جلد ترقی کرتی ہے، اور آغاز کے اعتبار سے اس کی نوعیت حاد ہوتی ہے، نیز یہ اسفل حصہ کی رکاوٹ کی نسبت زیادہ مکمل ہوتی ہے، اس کے برخلاف معام اسفل کی رکاوٹ بتدریج پیدا ہوتی ہے اور عموماً یہ رکاوٹ نامکمل ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی کم شدید اور کم ہلاکت خیز ہوتے ہیں۔

سد الامعاء حادہ

یک بیک عموماً ناف کے اطراف میں شدید درد ہوتا ہے۔ جب بدستور قائم رہتا ہے، معتدل کی راہ، براز اور ریاح کا اخراج نہیں ہو پاتا، ابتداء میں تے میں صمدہ سمجھا جیات خارج ہوتے ہیں، دوسری تے میں صغریٰ مادہ خارج ہوتا ہے، اس کے بدترے میں برازی مادہ خارج ہو سکتا ہے، شکم میں تناؤ ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ اور منہ خشک ہوتا ہے، نقاہت و کمزوری ہوتی

ہے، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض صغیر اور سرخ چلتی ہے، اسباب کے اعتبار سے دھنسی تے بھی ہو سکتی ہے۔ شدید برد اطراف ہوتا ہے
سدالامعار مزمن۔

سلعہ کی صورت میں درد مقامی ہوتا ہے، تھراقر ہوتا ہے۔ تے آتی ہے اور پتلے اسہال آنے کے بعد عوارض ختم ہو جاتے ہیں، اور شفا حاصل ہو جاتی ہے۔
بیمینیت مجبوری اس مرض کا انجام خراب ہوتا ہے۔ مریض ابتداء مرض میں ہی کمزور ہو جاتا ہے، مزمن صورت میں التهاب بدلیطون کی شکایت ہو جاتی ہے اور التواء معار یا فتن کی صورت میں اسعار کا وہ حصہ دھنسی تغذیہ کے فقدان کا وجہ سے مردار ہو جاتا ہے۔ بالائی حصہ معار میں ہونے کی صورت ۱۔ ۱۰ دن میں موت واقع ہو جاتی ہے۔

تقریبی علامات

تقریبی معوی	سدالامعار
۱۔ اسعار غیر منظم	۱۔ شدید قبض ہوتا ہے
۲۔ درد دوری ہوتا ہے۔	۲۔ درد ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔
۳۔ دبائے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔	۳۔ دبائے سے درد میں افادہ نہیں ہوتا۔
۴۔ برازی تے نہیں ہوتی۔	۴۔ برازی تے ہوتی ہے۔
۵۔ برد اطراف زیادہ نہیں ہوتا۔	۵۔ شدید برد اطراف ہوتا ہے۔
تقریبی کبدی	سدالامعار
۱۔ براز مٹیالے رنگ کا خارج ہوتا ہے۔	۱۔ شدید قبض ہوتا ہے
۲۔ درد مرارہ سے شاذ کی طرف بڑھتا ہوا دوری ہوتا ہے۔	۲۔ درد مقامی اور ہمیشہ ہوتا ہے۔
۳۔ دبائے سے درد میں افادہ ہوتا ہے۔	۳۔ دبائے سے درد میں افادہ نہیں ہوتا۔
۴۔ برازی تے نہیں ہوتی۔	۴۔ برازی تے ہوتی ہے
۵۔ پیشاب میں صفراء کی آمیزش ہوتی ہے۔	۵۔ پیشاب قلیل مقدار میں ہوتا ہے۔
۶۔ عام طور سے یرقان بھی ہوتا ہے۔	۶۔ یرقان نہیں ہوتا۔

تفریقی علامات

قبض مزمن

- ۱۔ قبض کی روئیداد ملتی ہے۔
- ۲۔ عام طور سے تہدد اور نفخ نہیں ہوتا۔
- ۳۔ اور بالعرض ہو بھی تو بہت طعیف ہوتا ہے۔
- ۴۔ سہ روزی موجود ہوتا ہے۔
- ۵۔ مسہلات کے استعمال سے عوارض میں کمی آتی ہے۔
- ۶۔ براز آتے نہیں آتی۔
- ۷۔ علامات شدید نہیں ہوتیں۔

سدالامعاء

- ۱۔ مرض کا حملہ عام طور سے یک یک ہوتا ہے۔
- ۲۔ شکم میں تہدد یا نفخ ہوتا ہے۔
- ۳۔ شکم کے معائنہ بالمس سے برازی سہ محسوس نہیں ہوتا۔
- ۴۔ مسہلات سے عوارض میں اناتہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات اضافہ ہو جاتا ہے۔
- ۵۔ برازی آتے آتی ہے۔
- ۶۔ شدید نقاہت اور برد اطران ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ درد کی شدت کو کم / ختم کرنے کے لیے مخدرات و مسکنات استعمال کرائیں۔
- ۲۔ حقنہ کریں۔
- ۳۔ مریض کی نقاہت کو دور کرنے کی تدابیر کریں۔
- ۴۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۵۔ قونج / ایلاؤس کا اصول علاج علاج اختیار کریں۔
- ۶۔ عملیہ کریں۔

علاج

- ۱۔ تسکین درد کے لیے افیون ۵۰ ملی گرام، ۲ گھنٹے کے وقفے سے کھلائیں۔
- ۲۔ روضی بادام شیریں ۳ ملی لیٹر، روضی زیتون ۱۲ ملی لیٹر، دودھ گرم می ڈالی کر نوش کرائیں۔ تفصیق یعنی میں مفید ہے۔
- ۳۔ قوت کی بحالی کے لیے دوا المسک یا حب جواہر حسب مزوت استعمال کرائیں۔


- تبا کو ۲۵ گرام۔ پانی میں جوش دے کر چھای کر حقنہ کریں۔ التوار امعاء کی وجہ سے عارض ہونے والے سد الامعاء میں مفید ہے۔
- تخم کتان، الخیر ہر ایک ۱۲ گرام، آرد گندم ۲۵ گرام، سہاگہ ۲ گرام۔ تمام دواؤں کو گوندھ کر پوتلی بنا کر شکم پر باندھیں۔
- آرد باجیہ، بورہ ارمنی، سبوس گندم، گل بابونہ، میوزک کی حسب دستور پوتلی بنا کر گرم گرم باندھیں۔
- شدید صورت میں تشخیص کے بعد آپریشن کریں۔

قبض

CONSTIPATION

اس مرض میں امعاء خصوصاً معاں مستقیم کی قوت دافوہ ضعیف ہو جاتی ہے، یا کسی اور وجہ سے فضلہ امعاء میں دیر تک پڑا رہتا ہے، قبض دراصل اس صورت کا نام ہے جب رنج حاجت کے آٹھ گھنٹے بعد کھائی گئی غذا اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر خارج نہ ہو۔

اقسام



اسباب

عمومی :-

نقص تغذیہ :-

۱. روغنی اور ثقیل غذاؤں کا بکثرت استعمال

۲. ترکاریوں کا عدم استعمال

۳. زیادہ خشک غذائیں

۴. ترش اشیاء کا بکثرت استعمال

۵. چائے و قہوہ نوشی۔

امعاء کی حرکت دودھ کا نقص :-

۱. دماغی کام کی زیادتی

۲. ضعف اعصاب

۳. سلسلہ دماغ

۴. عقلی، عصبی ضعف

۵. مانیجولیا

۶. نقص الدم

۷. عام جسمانی ضعف

۸. حیات حادہ

۹. قابض ادویہ

۱۰. خصیتہ الرحم اور بعض امراض کلیہ

۱۱. لمر پر کس کر پٹی باندھنا۔

صفراء اور امعاء کی رطوبت کی کمی :-

۱. سوء مزاج کبد

۲. ضعف کبد

۳. کبد اور کلیہ کے راستے جسمانی رطوبات کا بکثرت اخراج

۴. سہ کی زیادتی

خصوصی :-

۱. قبض امعائی

۱. امعائی قوت دافعہ کا ضعف۔
۲. امعاء کی حرکات متعکسہ کا ضعف۔
۳. قوت ماسک کی زیادتی۔
۴. امعاء کا بے قاعدہ انقباض۔
۵. امعاء کا تھینکنا۔

۲. قبض قولونی

۱. معاء مستقیم اور قولون مانی کی قوت دافعہ کی کمزوری۔
۲. قولون کے راستے میں رکاوٹ۔

علامات

مقررہ وقت پر رنج حاجت نہیں ہوتی۔ براز دیر میں خارج ہوتا ہے، یا براز طبعی تناسب سے کم ہوتا ہے، زبان پر فرجی ہوتی ہے، ذائقہ خراب ہوتا ہے، سورہضم، نفخ شکم اور صدام کی شکایت ہوتی ہے، براز بدبودار اور خشک ہوتا ہے، فقر الدم، بے خوابی، بعض اوقات جسم میں خارش ہوتی ہے، سستی، ماندگی، حواس میں کمزوری، جمائی، انگرٹائی، اور اعضاء شکنی ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

قبض قولونی

۱. معاء مستقیم میں براز موجود ہوتا ہے۔
۲. برازی سد سے قولون در کی میں محسوس ہوتے ہیں۔
۳. حقن یا شاذ سے ہی قبض رنج ہوتا ہے،
۴. براز قولون مانی یا معاء مستقیم میں دیر تک پھرا رہتا ہے۔

قبض امعائی

۱. صبح کو رنج حاجت کے بعد میرزا کا انتہائی کرنے پر معاء مستقیم خالی ہوتا ہے۔
۲. استمان بالجلس میں برازی سد سے قولون مستعرضہ / قولون مانی میں محسوس ہوتے
۳. غذائی تبدیلی یا خفیف طین سے قبض رنج ہو جاتا ہے۔
۴. غذائے یرم کو امعاء میں سے گزرنے میں کافی وقت ملتا ہے۔ یہ صورت

سدا لامعار	تفریق علامات	ایکس رے سے واضح ہوجاتی ہے۔ قبض مزمن
۱۔ مرض کا تھیک بیک ہوتا ہے		۱۔ قبض کی روئیداد ملتی ہے۔
۲۔ شکم میں نہ ناصغ ہوتا ہے		۲۔ نفخ یا تھمد و سدوم یا بہت معمولی ہوتا ہے۔
۳۔ تقابہت اور برد اطراف نمایاں ہوتا ہے		۳۔ جسمانی علامات شدید نہیں ہوتیں۔
۴۔ تھے براز کا ہوتی ہے۔		۴۔ تھے نہیں ہوتی۔
۵۔ مسہلات کے استعمال سے عوارض میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔		۵۔ مسہلات کے استعمال سے عوارض میں افادہ ہوجاتا ہے۔
۶۔ سدہ برازی نہیں ہوتے۔		۶۔ استحان بالجس سے سدہ برازیہ محسوس ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- ۱۔ قویج کا اصول علاج اختیار کریں۔
- ۲۔ مزمن قبض میں جلاب سے احتراز کریں۔ کیونکہ مسہل کے استعمال سے امعار خالی ہوجاتی ہیں۔ پھر ان میں فصد جمع ہوکر خارج ہونے کے لیے عام طور سے ۲۴۔۴۸ گھنٹے درکار ہوتے ہیں جو قبض مزمن کے لیے مضر ہے

علاج

نسخہ ۱۔

بادیان ۵ گرام، تخم کشوث ۲ گرام، سویز منقہ ۹ عدد — تمام دواؤں کا عرق
بادیان ۵۰، املی بیڑی شیرہ نکال کر غیرہ بنفشہ ۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔ • — حسب
ضرورت طریقہ ملین ۱ گرام کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

نسخہ ۲۔

مصطکی ردی ۱ گرام، عصارہ ریوند ۱۲ گرام، صبر ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک

پس کر پانی میں گوندھ کر جوار کے برابر جنوب بنائیں اور ۵ جوب بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

نکسرخ، مصطکی رومی بم وزن — دونوں دواؤں کو باریک کر کے شہد تین گن کا اضافہ کریں، ادویات کو ۱۲ گرام کھلا کر گرم پانی نوش کرنے اور سو جانے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ۱۔

پوست ہیل زرد، پوست ہیلہ سیاہ، نمک سنار کی، — تمام دواؤں کا سفوف تیار کریں اد ۱۲ گرام ہر آہ آب نیم گرم استعمال کر دلائیں۔

نسخہ ۱۔

قرنفل ۲ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۳ گرام، نکسرخ ۶ گرام، پوست ہیلہ زرد، کشمش سبز، ہر ایک ۱۲ گرام، سنار کی ۵ گرام، تربخین مصفی ۲۲ گرام، گلقد ۲۵ گرام — کشمش اور گلقد کے ملاوہ تمام دواؤں کو پس کر ان دونوں دواؤں میں خوب ملائیں اد ۹ گرام بوقت خواب کھلائیں۔ — دائمی قبض میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

منز با دام ۱۲ عدد، مویز منقی، ہیل خورد ہر ایک ۱۰ عدد، سنار کی ۱۲ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پس کر گلقد ۲۵ گرام میں ملا کر جنگلی بیر کے بقدر جنوب بنائیں۔ اد ۱۔ ۲ جوب ہر آہ تازہ دودھ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

اسپنول ۶ گرام ہر آہ آب تازہ، بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

سنار کی ۳۶ گرام، تخم گندناہ ۲ گرام، منقل ۳۳ گرام، بادیان، پوست ہیلہ سیاہ، ہر ایک ۱۲ گرام، پوست ہیلہ زرد، ہیلہ، آملہ، ہر ایک ۹ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں۔ اد ۹ گرام بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

نکسرخ، بنفشہ ہر ایک ۱۲ گرام، بنات سفید ۲۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کر ۵ گرام ہر آہ حق بادیا نیم گرم بوقت خواب دیں۔

نسخہ ۱

پوست بلیہ ہر دو اسٹائن کی، ہر ایک دو گرام، زیر دسیا، نو سرنگ، پودینہ خشک، معطرگی رومی،
 ہر ایک ۲ گرام، نرگچہ، بادیان، ہر ایک ۲ گرام، سہاگ بریاں، ۲ گرام، زنجبیل ۲ گرام، تمام
 دواؤں کو باریک پس کر پانی میں گوندھ کر پنے کے برابر صوب بنائیں اور حسب ضرورت ۱-۲ جموب
 کھلائیں۔

۲۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
 نسخہ ۱۔

روغن سوسن، روغن نار دین، ہوزن — کو نیم گرم کر کے شکم پر مالش کریں۔

نسخہ ۱۔

نمک ۲ گرام، روغن بید انجیر، دلی لیٹر، ف بون ۲ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی
 لیٹر میں ملا کر حقنہ دیں — شدید قبض میں مفید ہے۔
 نسخہ ۱۔

بادیان، صبر، چوبے کی میٹلیناں ہر ایک ۱ گرام کو پانی میں پس کر نان کے نیچے خاد کریں
 قبض کے ساتھ احتباس بول اور نفخ شکم میں مفید ہے۔

التهاب قولون

COLITIS

اس مرض میں قولون میں التهاب پیدا ہو کر مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

التهاب قولون

اقسام

التهاب قولون تقری

Ulcerative Colitis

التهاب قولون غامی، ملنی

Mucous Colitis

التهاب قولون تقری حسی

التهاب قولون تقری حاد

اسباب

د، التهاب قولون مخاطی / بلغمی :-

امراض معدہ دامعار :-

۱. قولون کا سور مزاج بار در طب
۲. قولون اور اطراف میں بلغمی رطوبتوں کا اجتماع
۳. قولون کا استرخار اور ضعف
۴. دائمی قبض

متفرقات

۱. قوی جرثومہ
۲. شکم سے دیگر اعضا کا استرخار
۳. مسف مہمی

ب، التهاب قولون تقرجی

امراض معدہ دامعار :-

۱. قولون کی قوت دافعت کا ضعف
۲. قولون سے طبی برائیم
۳. عفوئی فساد
۴. کامرضاتی برائے میں تبدیل ہو جانا

علامات

د، التهاب قولون مخاطی / بلغمی :-

قبض اور سور ہضم کی شکایت ہوتی ہے، شکم میں بے پیمائی ہوتی ہے۔
براز میں بکثرت بلغم شامل ہوتا ہے، ۲۴ گھنٹے میں ۲-۴ اسہال آتے ہیں جن میں اسہار کی
اندرونی فشار مخاطی کے اجزاء خارج ہوتے ہیں، استمان بالہس میں قولون معدہ کی طرف
سخت معلوم ہوتا ہے، اور دبائے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورت
مہمی المزاج عورتوں اور بچوں میں کثیر الوقع ہے۔

ب، التنباب قولون تقرحی:

۱، حادہ:

مرض اچانک رونما ہوتا ہے، اس کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، تھی ہوتا ہے تنفس میں بدبو ہوتی ہے۔ اسہال ہوتا ہے، جس میں بھورے رنگ کا خون، آؤں اور پیپ وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔

۲، مزمن:

تنبی یا اسہال آتے ہیں، مغم ہوتا ہے، ضعف دلاغری ہوتی ہے، بطلان اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، نفزالدم ہوتا ہے، برازی میں خون، آؤں اور پیپ کا اخراج ہوتا ہے، مرض کا بار بار اعادہ ہوتا ہے۔

اصول علاج

- _____ منفع و مسبل استعمال کریں۔
- _____ التنباب قولون تقرحی میں قروح الامعاء کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج

• شیرہ زرد درد، شیرہ دانہ پیل خورد ہر ایک ۲ گرام، پانی میں نکال کر طباشیر کبود اگرام پس کر، چھڑک کر نوش کرائیں۔

• _____ تخم کنوچہ، تخم ریحاں، تخم بارتنگ، حب الاس ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر، لچھان کر شربت حب الاس ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• _____ تخم ریحاں بریاں، تخم مرو بریاں ہر ایک ۲ گرام، شاہ بلوط، کشنیز خشک دسکر میں زرد خشک کردہ، بریاں، ہر ایک ۱۱ گرام، حب الاس، گنار، ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر، گرام، ہر ایک شربت حب الاس ۳۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔ التنباب قولون خفلی میں مفید ہے۔

• _____ بہدانہ ۳ گرام، زرد درد، بارتنگ، حب الاس، زرد خشک، ہر ایک ۲ گرام کو

۱۔ گلارمنی، نشاستہ بریاں، صمغ عربی بریاں، ہر ایک ۴ گرام، طباشیر
مکبود ۱۳ گرام، تمام دواؤں کو باریک کر کے محفوظ کر لیں اور اسپینول، تخم ہارنگ، تخم مانگو،
تخم ریحاں ہر ایک ۲ گرام کو روغن گلاب میں چرب کر کے باریک کر دے دواؤں کو ملا کر ۸ گرام ہر دہ
لعاب ریشہ خطی استعمال کرائیں۔


جوارش آله / جوارش انارین / معجون سنگ دانه کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ حب الّاس، پوست انار، جفت بلوط، ہر ایک ۲ اگرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شب بیاہی، کاغذ سونٹھ، زعفران خالص، سفید کاشغری ہر ایک اگرام ہیں کراس میں ملائیں۔ اور حقنہ کریں۔

APPENDICITIS

اس مرض میں زائدہ امور میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، جو بعد میں مقعر ہو جاتا ہے، یہ مرض ترقی یافتہ قوموں اور نوجوان مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔

التياب زائده احوار



اسباب |

امراض معدہ و امعاء۔

۱. بطن مزمن
۲. اجسام غریبہ کا زائدہ میں پہنچ کر محسوس ہو جانا۔
۳. زائدہ کی صلاحیت
۴. زائدہ کا تضیق اور بندش۔
۵. تھقی مادہ کا زائدہ تک اثر کرنا۔
۶. ویدان امعاء
۷. غذائی بے اعتدالی۔

ثقیل، قابض اور ردی غذاؤں کا استعمال

بیکٹیریائی سرایت۔

۱. بی کولائی
۲. اسٹریپٹوکوکس
۳. بیسیلائی تیفوئید
۴. اکی نووائی کوسس
۵. متفرقات۔

نقرس

دوج المفاصل

منقار جوت

دانت صاف کرنے والے برش کے ہال۔

زائدہ کی دھوی رسد میں فتور۔

علامات |

حادثہ۔

سمیت کی وجہ سے نہایت شدید علامات رونما ہوتی ہیں، ناف کے اطراف میں پھیری سے کانٹے جانے کا سا احساس ہوتا ہے۔ یہ درد اچانک شروع ہوتا ہے، مریض درد کی شدت سے تڑپتا ہے۔ مریض قی نہ تو نظر سے ابتدائی مرحلے میں انتہا ب صرف مخا طی اور تحت المخاطی لبقا کی حد تک محدود رہتا ہے۔ فشار مخا طی میں آماکس اور اوڈیمیا کے علاوہ شدید انتہا ہوتا ہے، مخا طی ریش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سطح پر لیفین کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، زائدہ کو کانٹے پر اس کے جوف سے صدیدی رطوبت خارج ہوتی ہے۔

د، التهاب زائدہ اعور حاد نزلی۔

زائدہ کا پورا حصہ اور اس کی عضلی دیوار میں دبیز ہو جاتی ہیں اور ان میں ریش دار ساخت بھی پیدا ہو جاتی ہے، مرض کا حملہ اچانک ہوتا ہے، ابتدا میں ناف کے دائیں جانب، اچانک نہایت شدید درد اٹھتا ہے۔ جو دائیں طرف کچ ران کے علاوہ شکم کے دوسرے اعضاء میں بھی پھیل جاتا ہے، یہ درد عام طور سے کولے کے اگلے بالائی گوشے سے ناف کی جانب تقریباً ۱۰ سینٹی میٹر کے فاصلے پر مرکوز ہوتا ہے، نقل و حرکت سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے مریض چنٹ لیٹے رہنے نیز دائیں پیر کو اوپر کی جانب کھینچنے سے عافیت محسوس کرتا ہے، بطن دبانے سے سخت اور تنہا ہوا محسوس ہوتا ہے، عانہ پر دباؤ ڈالنے سے درد محسوس ہوتا ہے۔ قبض، بعض اوقات امہال کی شکایت ہوتی ہے، لرزہ کے ساتھ بخار ہوتا ہے، متلی اور قے آتی ہے، تقطیر ابول اور سلسل ابول، یا عسر ابول وغیرہ عوارض رونما ہو سکتے ہیں، نبض سریع چلتی ہے۔

ب، التهاب زائدہ اعور حاد غائری

اس صورت میں عام طور سے زائدہ کا بیدی حصہ متاثر ہوتا ہے، اس میں علامات و نشانات رونما ہوتی ہیں۔ آہستہ معارف زائدہ میں شدید درد ہوتا ہے، بطنی دیوار میں صلابت ہوتی ہے قے آتی ہے، درجہ حرارت معتدل اور نبض حسب معمول / طبعی چلتی ہے۔

ج، التهاب زائدہ اعور حاد تقرجی و تقرجی۔

اس میں مذکورہ بالا علامتوں کے ساتھ شدت یا خفت کے ساتھ درد کے مرکزی مقام پر نرم سلو کی مانند کسی قدر ابھار سا محسوس ہوتا ہے، جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مقام مرض کو ٹھوکے پر بھد بھد کی آواز آتی ہے۔ لرزہ اور تشویر ہوتا ہے۔

مرضیاتی نقطہ نظر سے زائدہ کو کاٹنے پر مخصوص تقریقی علامات موجود ہوتی ہیں۔
عزمن ۱۔

اس میں زائدہ احمورۃ اندر فشار ملتبہ ہو کر پھول جاتی ہے اور اس کی نالی بند ہو جاتی ہے اور دردم ختم ہونے کے بعد زائدہ بالکل مسدود ہو جاتا ہے، اس میں صلابت بھی پیدا ہو سکتی ہے، — مرضیاتی نقطہ نظر سے تکاثری (Proliferative) تبدیلیاں اور نسج الحاتی میں اضافہ بطور خاص رونما ہوتا ہے۔

انتہاب زائدہ احمور کی ایک صورت اور بھی ہوتی ہے جس کو "مختشر" کا نام دیا جاتا ہے، اس میں احمور کے انتہاب کا اثر یا ریلٹون، اختار اور دیگر اعضاء میں بھی پھیل جاتا ہے،

تقریقی علامات

التهاب زائدہ احمور	حصة مراره
۱۔ تسلی اور تے ہوتی ہے۔	۱۔ تسلی اور تے بکثرت ہوتی ہے۔
۲۔ درد کی ٹیس کوٹھے کے لگے بالائی ٹوٹے سے ناف کی جانب قریباہ رہ سینڈیٹ کے فاصلے پر مرکوز ہوتی ہیں۔	۲۔ درد کی ٹیس دایں کندھے اور پشت تک جاتی ہیں۔
۳۔ درد کی شدت سے مریض تڑپتا ہے۔	۳۔ درد کی شدت سے مریض بیہوش ہو سکتا ہے۔
۴۔ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تقریقی مرحلے میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور یرقانی علامات رونما نہیں ہوتیں۔	۴۔ مذکورہ علامتوں کے ساتھ یرقانی علامات یقینی طور پر پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج

- _____۔ مرض کے حملے کے وقت تسکین درد کی تدابیر کریں۔
- _____۔ مینات استعمال کرائیں اور قبض نہ ہونے دیں۔
- _____۔ حقنہ کریں۔
- _____۔ قویج اور انتہاب اسحاق کا اصول علاج اختیار کریں

• درج ذیل نسخہ جات بھی مفید ہے

نسخہ ۱۔

حب تنکار ۲ عدد ہر تیسرے دن بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

حب کبد ۲ عدد، بعد از طعام دیں۔

نسخہ ۳۔

بج کاسنی، گل بنفشہ ہر ایک، گرام، بادیان، کاؤزبان، ہر ایک ۵ گرام، مویز منقہ ۹

عدد۔ تمام دواؤں کو شام کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر آب برگ مثبت

مروق، آب برگ کاسنی، آب برگ مکوہ سبز مروق ہر ایک ۳۶ ملی لیٹر، خمیرہ بنفشہ ۵۰ گرام کے ساتھ

صبح، شام نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

ددار الملک ۵ گرام، کھلا کر بادیان ۵ گرام، مکوہ خشک ۳ گرام، مویز منقہ ۹ عدد،

کوفق مکوہ، حق برنجاسف ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر میا پس کر خمیرہ بنفشہ ۵۰ گرام ملا کر شام کو

کھلائیں۔

نسخہ ۵۔

آرد نخود ۱۲ گرام، شیر زقوم حسب ضرورت میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور استمال

کرائیں۔

• آرد ماش کی حسب دستور ایک طرف پکی ہوئی روٹی بنا کر درم پر بانڈھیں

دق امعاء

INTESTINAL TUBERCULOSIS

اس مرض میں تندرانی مادہ (جرثومہ سل) Tubercle Bacilli کے امعاء

پر اثر انداز ہونے کا وجہ سے ان کی طبی کارکردگی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض

مرض میں ثانوی حیثیت سے اور بچوں میں ابتدائی سرایت سے پیدا ہوتا ہے، اور معادہ دقانی

کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

۱. گائے کے دودھ کے ساتھ نکلے جانے والے جراثیم سل کا امعاء کی ساختوں میں سرایت کر جانا۔
۲. تدرک ریوی میں بیسیلائی ملغمہ نکلنے کی وجہ سے امعاء کا متاثر ہونا۔

علامات

ابتداء میں تدرکی مادہ سیرز غدد اور لمفاوی غدد پر اثر انداز ہوتا ہے، چنانچہ ثبور سل ان جگہوں پر شہری استر کے پیچے رونما ہونے کے بعد متعجب ہو جاتے ہیں، اور اس متعجب (سیری مادہ) کی پیدائش کے بعد وہاں کی غشاء مخاطی تیزی سے فنا ہونے لگتی ہے اور چھوٹے چھوٹے (Crateriform) قروح بن جاتے ہیں، قروح کے گرد بیسیلائی کے بلا واسطہ بہت سرعت کے ساتھ انتشار کی وجہ سے بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے مذکورہ کیفیت اور تبدیلیوں کا خوردبینی معائنہ میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

ابتداء میں بخار نہیں ہوتا۔ باضمرہ خراب ہوتا ہے، قلت / ضعف اشتہا ہوتا ہے، بکثرت ریاح بنتی ہے، شکم میں درد اور نفخ ہوتا ہے، بزال اور عام ضعف کی شکایت ہوتی ہے۔ مصادق کے متاثر ہونے کی صورت میں قبض اور امعاء کبار کے متاثر ہونے کی صورت میں اسہال آتے ہیں۔

اصول علاج

- ۱۔ مادہ سل کے دفعیہ کنڈایر کریں
- ۲۔ قروح الامعاء میں مذکور کنڈایر اختیار کریں۔

علاج

یشب بزر، صدف، زہر مہرہ خطائی، کہر بائے شمعی، شاخ مرجان حیلہ ادویہ مملول

کشتہ مرجان، ہر ایک ۳ گرام، طباشیر، ست لکھو اصل خانہ ساز، ہیل خورد، ہر ایک ۱۲ گرام —
تمام دواؤں کو باریک پس کر کپڑے سے چھان کر محفوظ کریں اور ۳ گرام، ہموزن نبات سفید
ملا کر صبح، شام کھلائیں اس کے بعد عرق گاؤز بان ۴۰ ملی لیٹر، عرق بید مشک ۲۵ ملی لیٹر، عرق
کلاب ۳۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

• — قرص طباشیر کا فوری اعداد، شربت جب الاس / شربت انجبار ۲۵ ملی لیٹر
صبح، شام استعمال کرائیں۔

• — بیج مہدیوی، بیج جرجہ ہر ایک ۱۲ گرام، فلفل سیاہ ۵ عدد، — تمام
دواؤں کو باریک پس کر ٹونگ کے برابر صوب بنائیں اور غذا کے بعد دن میں حسب ضرورت
کھلائیں۔


• — طباشیر، بیلگری، پوست سنگ دانہ مرغ، پوست بیرون پستہ کاسفوف
بنا کر ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔

• — نقاہت کی حالت میں انوشہاروئے موسوی ۳ گرام غذا کے نصف گھنٹہ
بعد دیں۔



دیدان امعار

HELMINTHS

اس مرض میں بطنی رطوبات کے حرارت خسر مزہ کے اثر سے امعار میں متغصن ہو جانے
کی وجہ سے دیدان پیدا ہو جاتے ہیں، — بعض اطباء کا خیال ہے کہ یہ دیدان امعار
میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کے تخم یا بیجے، ترکاریوں، پان اور خورد و نوش کی دوسری اشیاء
کے ساتھ باہر سے انسانی جسم میں پہنچتے ہیں اور امعار میں رہ کر نشوونما پاتے ہیں، تاہم
اطباء کا یہ گروہ بھی اس بات کا معترف ہے کہ معانی طفیلے اپنی غذا اور پناہ کے لئے
فلیظ بطن کے محتاج ہوتے ہیں۔



ان کی پیدائش بالائی امداد میں ہوتی ہے
 ان کے سرک اور منیر کے کیڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش معار مستقیم اور اس کے اطراف میں ہوتی ہے۔
 ان کے فیقہ نما۔۔۔ ہوتے ہیں، ان کی پیدائش امور اور فلولون میں ہوتی ہے۔



اسباب

۱. بعضی رطوبات کی زیادتی / امار میں فضلات کا تعفن
۲. فاسد غذاؤں کا استعمال
۳. تخر
۴. ہیضہ / سودہ ہضم
۵. پھلوں / ترکاریوں کا بکثرت استعمال خصوصاً موسم خریف میں خام ترکاریوں اور پھلوں کا بے احتیاطی سے استعمال۔
۶. غلاظت میں نشے پر چلنا۔

رقیہ، خیریں اشیاء کا بکثرت استعمال
میدے کی روٹی / چکنا گوشت۔

علامات |

عمومی علامات ۱۔

درد شکم ہوتا ہے، تسلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، اسہال، قبض یا سوراہہ ہضم ہوتا ہے، مقعد کے پاس خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے، سوتے میں دانت بچکتے ہیں، منہ سے رال نکلتی ہے، فقر الدم، ضعف اور نقاہت ہوتی ہے، سدا لا معار ہو سکتا ہے، بھوک گھٹتی ہے، خلوہ معدہ کی حالت میں شکم میں سوزش محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات تشنگی دورے پڑتے ہیں، چہرے اور رنگوں کا رنگ تغیر ہو جاتا ہے اور ان میں بھر بھر لہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خصوصی علامات ۱۔

۲۔ دیدان طوال ۱۔

فم معدہ میں سوزش اور دغدغہ محسوس ہوتا ہے، معص کی شکایت ہوتی ہے۔ ہر وقت خاص طور سے خلوہ معدہ کی حالت میں طبیعت مالش کرتی ہے، نقصان اشتہار ہوتا ہے، غذا خاص طور سے روغنی غذاؤں سے جی اچھتا ہے، ہچکیاں آتی ہیں، بعض اوقات خشک کھانسی ہوتی ہے۔ قبض یا اسہال کی شکایت ہوتی ہے، خفقانی علامات رونما ہو سکتی ہیں، کسٹھدی ہوتی ہے، بعض مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات آنکھیں سرخ یا تیرہ ہو جاتی ہیں۔ شکم میں استسقاء نوعیت کی کشیدگی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ کیڑوں کے بڑے ہو جانے کی صورت میں نبض ضعیف چلتی ہے، ظاہر بدن میں بردت کا احساس ہوتا ہے، جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور منہ یا مقعد کے راستے کیڑا خارج ہو سکتا ہے۔ دیدان صغار ۱۔

مقعد میں خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے، براز نرم ہوتا ہے، پشت اور پسلیوں کے کنارے کے پیچے گرانی محسوس ہوتی ہے، براز میں کیڑے خارج ہوتے ہیں، درد شکم تشنگی دورے، ناک میں خارش اور جببوسے دہن وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔ دیدان عراض ۱۔

بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کے باوجود ضعف قوت کا احساس ہوتا ہے، شکم میں مروڑ اور کرب ہوتا ہے، خلوہ معدہ کی حالت میں ناف کے اطراف میں اذیت رساں خفیف حرکت محسوس ہوتی ہے، مقعد اور ناک میں خارش ہوتی ہے، اسہال آتے ہیں، سر خصوصاً چند یا ریا فوخ، میں درد ہوتا ہے، _____ بعض اوقات دموی براز آتا ہے، پتیاں اچھلتی ہیں، تشنہ دور سے پڑتے ہیں۔ بدحواسی اور پریشانی ہوتی ہے۔ براز میں کھولکا اخراج ہوتا ہے،

اصول علاج

بخثت تولید بلغم کا ازالہ کریں۔

_____ قاتل و مخزج دیدان ادویہ کے استعمال سے قبل ۳ دن تک تازہ دودھ

بنات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔ اور اس کے بعد قیمہ یا کباب کھلائیں۔

_____ دواؤں کے استعمال کے وقت مریض کے مزاج اور موسم کو ضرور ملحوظ رکھیں،

_____ کھانسی اور غمی کے وقت اس طرح کی دوائیں استعمال کرانے سے احتیلا برتیں۔

_____ دوا خلوہ معدہ کی حالت میں ناک بند کر کے استعمال کرائیں۔

_____ بعض اطباء دوا کے استعمال سے قبل بخثت جسمانی نقل و حرکت کی

ہدایت کرتے ہیں۔

علاج

_____ مریض کا مزاج گرم ہو تو درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

آب برگ شفتالو، آب پوست درخت شہتوت، آب برگ شہتوت ہوزن نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

پوست درخت شہتوت، پوست انا ز نرش کو گرم پانی میں ۲۲ گھنٹے بجگوئی اور آب

برگ شفتالو ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

بڑنگ کا بی مقشر، پوست بیلہ زرد، آلمہ منقی ہر ایک ۲۵ گرام، تربد موصوف

۲۵ گرام، بنات سفید ۱۰ گرام، ——— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۲۲ گرام ہرہ گرم پانی استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

نمک سنگ، بڑنگ کاہلی، قنبیل، پست پیلہ زرد بموزی ——— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ددغ گاوی کے ساتھ ۱۰ گرام کھلائیں۔
سود مزاج بارد کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
نسخہ ۲۔

ترہ ۲ گرام، باؤ بڑنگ، قنبیل، مغز تخم کرنجہ، ہر ایک ۵۰۰ گرام، حب انیل ۳ گرام، مغز اخروٹ ۵ گرام، نمک سیاہ ۱ گرام ——— تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر سفوف بنائیں اور کھلائیں۔
نسخہ ۳۔

اجرائق خراسانی، زیرہ کرمانی، مغز کرنجہ، پلاس پا پڑا، قنبیل، باؤ بڑنگ، ہر ایک ۵۰۰ گرام ——— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قند سیاہ میں ملا کر ددرتبہ کھلائیں۔
نسخہ ۴۔

باؤ بڑنگ، مغز چہار تخم، خرما، قند سیاہ ہر ایک ۲۵ گرام کو کوٹ کر شہد میں بھون بنائیں اور کھلائیں۔ اور تمام دن کچھ بھی کھاتے کو نہ دیں۔
نسخہ ۵۔

سبز منقہ میں باؤ بڑنگ بھر کر ۱۰۔۲۰ عدد کھلائیں۔
۱۔ دیدان کی مختلف انواع میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
نسخہ ۶۔

باؤ بڑنگ، سرخس، شج، کیلہ، ترمس، کالادانہ، قسط طح، ترہد موصوف، نمک ہندی ——— تمام دواؤں کو باریک پیس کر کھلائیں، دیدان طوال کے لیے قاتل و خراج ہے۔
نسخہ ۷۔

باؤ بڑنگ مقشہ، سرخس ہر ایک ۵۰۰ گرام، ترہد موصوف، مقل ازرق ۵۰ گرام۔

تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور کھلائیں۔۔۔۔۔ دیدان صوار
میں مفید ہے۔
نسخہ ۱۔

پوست انار ترش، ۱۲۵ گرام، قند سیاہ بکڑ ۱۱ گرام، پلاس پابندہ، پوست پیچ بیلن،
برایک ۳ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی ۱۵۰۰ ملی لیٹر میں جوش دیں، جب ۱۰۰۰ ملی لیٹر رہ جائے
تو چھان کر محفوظ کر لیں اور صبح کو نہار منہ ساری دوا کھلا کر مریض کو چھل قدمی کی ہدایت کریں۔
دیدان صغار و عراض کے لیے مخرج وقتاً آتا ہے۔
نسخہ ۱۔

کیلہ ارو، تربہ، برایک ۱۲ گرام، نمک سیاہ ۶ گرام، قسط تلخ ۸ گرام۔۔۔۔۔ تمام
دواؤں کو برایک چھل کر تازہ دودھ ۲۰۰ ملی لیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔۔۔۔۔ اس سے
دیدان صغار مر جائیں گے۔ اس کے بعد شیخ، شفتالو، ترس، کلوچی، صغیر فارسی وغیرہ مہلات
استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

نارجل ہندک، جوزا، نبات سفید کے ساتھ کھلائیں۔۔۔۔۔ دیدان صغار
میں مفید ہے۔
نسخہ ۱۔

برج آڑو ۳۶ گرام، باؤ بڑنگ ۹ گرام۔۔۔۔۔ دونوں کو پانی میں بھگو کر مل چھان کر
۲۰۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ دیدان صغار کے لئے خوردنی نسخہ سے زیادہ خارجی ادویہ مفید ہیں، ذیل
میں اسکا نوعیت کے چند نسخہ جات تحریر کئے جا رہے ہیں۔
نسخہ ۱۔

رسوت کو پانی میں چس کر مقعد پر طلا کریں۔

نسخہ ۱۔

رسوت، نر کچور، کیلہ، باؤ بڑنگ کو کوٹ کر لٹائے کے پتہ میں ملا کر کپڑا تر کر کے
مقعد میں محمول کریں۔

نسخہ ۱۔

مہر، شونیز ہر ایک ۲ گرام، حصفض ۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر
آب برغ شفتالو میں چھوٹی چھوٹی گولیوں جیسا شاذ بنا کر روغن گاؤں میں برب کر کے مقعد میں
حمل کریں۔

نسخہ ۱۔

موم، خا کا فقیہ بنا کر مقعد میں حمل کریں۔

نسخہ ۱۔

جدوار، سرکہ کہنہ میں مٹس کر روٹی میں لگا کر مقعد میں رکھیں۔

نسخہ ۱۔

گوشت کا ٹکڑا نمک لگا کر مقعد میں رکھیں اور تھوڑی دیر بعد نکال لیں، دیدان اس
میں لٹوٹ ہوئے۔

نسخہ ۱۔

ارنڈ کی کوئیل باتھ سے مل کر مقعد میں رکھیں۔

نسخہ ۱۔

نارون کو روٹی میں لت کر کے حمل کریں۔

نسخہ ۱۔


آب پودینہ، گائے کا پتہ، روغن تخم شفتالو کو ملا کر حمل کریں

درم مقعد

RECTITIS

اس مرض میں درم / التهاب کی وجہ سے مبرز منطبق ہو جاتا ہے، جس سے مریض کو
جابت کے وقت شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، مقعد میں سوزش اور درد ہوتا ہے
جس کی ٹیسس پشت تک پہنچتی ہیں۔

اقسام :-



سباب |

امراض معدہ و امعاء

۱. شقاق مقعد
۲. قروح مقعد
۳. مکره مقعد
۴. مقعد پر چوٹ لگنا
۵. خون بواسیر کا بند ہو جانا
۶. قبض
۷. دیدان امعاء
۸. بواسیر / ناسور کا آپریشن

متفرقات

۱. خون / صفراوی خون کا غلبہ
۲. سودا / بلغم کا غلبہ
۳. سوزاکی جراثیم
۴. تیز مہل
۵. کثرت سے نوشی
۶. مرچ و مصالحہ / ثقیل اسفناخ غذاؤں۔

علامات

مقعد اور اس کے ارد گرد سوزش، جلن اور رفع حاجت کے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے، مقعد میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ اس کی ٹیس میں ماند اور پشت تک محسوس ہوتی ہیں، پیشاب بار بار قطرہ قطرہ آتا ہے، قبض اور خمس ریاہ ہو سکتا ہے، زحیر اور غصہ ہو کر برازیں سیاہی مائل بلغم خارج ہو سکتا ہے،
 درم مقعد حار میں بخار ہوتا ہے، درد اور سوزش وغیرہ عوارض میں شدت ہوتی ہے، مقام ماؤف پر سرد دھائی لگنے سے درد میں سکون ہوتا ہے۔ درم مقعد کی یہی نوع کثیر النوع ہے۔
 درم مقعد بارد بلغمی میں حرارت کی علامات کثیر مفقود ہوتی ہیں، درم، زخونیت کا ہوتا ہے۔ اور گرم دواؤں / تدابیر سے راحت ملتی ہے، درم مقعد بارد صلب میں صلابت کے ساتھ مقعد کی حس زائل ہو جاتی ہے۔

تقریبی علامات

زحیر	درم مقعد حار
۱۔ غیر معمولی حس ہوتی ہے۔	۱۔ معار مستقیم میں کوئی غیر معمولی حس نہیں ہوتی۔
۲۔ جسمانی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔	۲۔ جسمانی علامات نہیں ہوتیں۔
۳۔ بطن میں شدید درد ہوتا ہے۔	۳۔ معار مستقیم میں شدید درد ہوتا ہے۔
۴۔ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	۴۔ حرارت میں بہت ہی خفیف اضافہ ہوتا ہے۔
۵۔ اسہال ہوتا ہے۔	۵۔ قبض ہوتا ہے۔
۶۔ نفخ اور درد ہوتا ہے۔	۶۔ شکم میں نفخ اور درد نہیں ہوتا۔
التهاب حول مقعد	درم مقعد
۱۔ مرض کا آغاز درد اور ذکات حس سے ہوتا ہے۔	۱۔ مرض کا آغاز درد اور غصہ سے ہوتا ہے۔

- ۲۔ براز میں خون یا سیاہی مائل بلغم خارج ہوتا ہے۔
 ۳۔ قشریرہ اور پسینہ نہیں ہوتا، خفیف بخار ہو سکتا ہے۔
 ۴۔ مقعد کے پردے میں انتہائی علامات نہیں ہوتیں۔
 ۵۔ معار مستقیم کی غشاء مخاطی ماؤف ہوتی ہے۔
- ۲۔ دونوں مفقود ہوتے ہیں
 ۳۔ قشریرہ، بخار اور پسینہ ہوتا ہے۔
 ۴۔ بیرونی جانب التباب --- ہوتا ہے
 ۵۔ معار مستقیم کے قریب خراج ہو سکتا ہے۔

بولاسیر

- ۱۔ دردی نسبت مروڑ نمایاں ہوتا ہے
 ۲۔ براز میں خون اور سیاہ بلغم کی آمیزش ہوتی ہے۔
 ۳۔ مرض کی بیرونی علامات نہیں ہوتیں
 ۴۔ معار مستقیم کی غشاء مخاطی ماؤف ہوتی ہے۔
- ۱۔ مروڑ کی نسبت درد شدید ہوتا ہے۔
 ۲۔ براز میں خالص خون شامل ہوتا ہے۔
 ۳۔ سے ہوتے ہیں
 ۴۔ معار مستقیم کی اوردہ میں توسع۔

اصول علاج

- ۱۔ درم مقعد حار میں یا سلیق کی فصد کھولیں۔ کر پر پچھنے لگائیں۔ تعلیق کریں اور منضجیات و مسہلات خلط حار استعمال کرائیں۔ تعدیل مزاج کرائیں۔
 ۲۔ نطول و آبرزن کرائیں۔
 ۳۔ ابتدا مرض میں مادہ کے امالہ کی تدابیر کریں۔
 ۴۔ درم بارد بلغمی میں مقیات، منضجیات و مسہلات بلغم استعمال کرائیں اس کے بعد محلل مرہم رکھیں۔
 ۵۔ درم بارد صلب میں محلل طینات استعمال کرائیں، حسب ضرورت صاف کرنا یا سلیق کی فصد کھولیں۔

۔۔۔۔۔ دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج |

۔۔۔۔۔ منفع و مسهل خلط حار استعمال کرائیں اور اس کے بعد درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔۔۔۔۔ تخم خیارین، تخم کاہوک عرق بادیان میں شیره نکال کر تخم ریحان یا اسپنول چھڑک کر، شربت عناب سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔۔۔۔۔ آلونجارا ۱۰ عدد، عناب ۲ عدد، کو عرق گاؤ زبان یا پانی میں بھگو کر، مل چھان کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔۔۔۔۔ گل بنفشہ، گل نیلوفر ہر ایک، گرام، تخم کاسنہ گرام، عناب، آلونجارا ہر ایک ۵ عدد، تمام دواؤں کو نیم گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر ۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔۔۔۔۔ برگ خطی، برگ عنب الثعلب، بنفشہ، عدس مقشرہ بموزن ۱۰۰ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں خوب جوش دیں، اس کے بعد روغن بنفشہ، روغن بابونہ، اور زردی و سفید کا بیضہ مرزہ تال کر خوب ملائیں اور اس کا ضماد کرائیں۔

نسخہ ۵۔۔۔۔۔ گل خطی سفید، برگ خطی، ہم وزن ۱۰۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر روغن بنفشہ ملا کر درم پر لگائیں۔

نسخہ ۶۔۔۔۔۔ زردی بیضہ مرزہ، روغن گل، شحم بط میں تھوڑا سا زعفران ملا کر چند بار لگائیں۔

۔۔۔۔۔ درم مقعد بلغمی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

مقل (حسب ضرورت)، کو باریک پس کر روغن گل اور زردی بیضہ مرغ میں ملا کر متاثر مقام پر ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

گل بنفشہ، بابونہ، اکلیل الملک، صلبہ، تخم کتان، برگ خلی ہر ایک ۵ گرام، گل خلی گل سرخ ہر ایک ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں خوب پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو نیم گرم ضا د کریں۔

۔۔۔۔۔ درم مقعد صلب میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

سفیدہ کاشغری، زفت رومی، مردار سنگ ہم وزن — تمام دواؤں کو تھوڑا زعفران ملا کر باریک کریں۔ اور زردی بیضہ مرغ، شحم لط اور روغن گل ملا کر حسب دستور مرہم بنائیں اور استعمال کرائیں۔ ہفتہ بعد اس میں مقل کا اضافہ کر لیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخے بھی مفید اور مجرب ہیں۔

نسخہ ۴۔

آب برگ کشنیز سبز، روغن گل، سفیدی بیضہ مرغ، کو باہم ملا کر کپڑا تر کر کے درم پر رکھیں۔

نسخہ ۵۔

برگ پتھند، چوب زرد کو باریک پس کر روغن گل ملا کر ضا د کریں۔

نسخہ ۶۔

پیاز کو روغن گاؤں بریاں کر کے شحم کلیہ بزئیں باریک کر کے طلا د کریں۔

نسخہ ۷۔

تخم خلی، اسپنول، کوکنار، ہر ایک ۶ گرام، کدو ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر آبدست کرائیں۔

نسخہ ۸۔

کاغذ اگرام، روغن گل، ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر مقعد پر لگائیں۔
نسخہ ۱۔


بنفشہ، خطمی، خبازی، صنب اشعلب، ہر ایک ۲۵ گرام کو پانی میں جوش دے کر آبزہ
کرائیں۔

لواسیر

PILES

اس مرض میں مقعد کی عروق کے منہ پر غیر طبعی اچھار (سے) پیدا ہو جاتے ہیں جس کی
وجہ سے مقعد میں درد، گرانی، خارش محسوس ہوتی ہے۔ اور پاخانہ کے بعد یا پاخانہ سے
پہلے خون کے قطرے نکلتے ہیں۔

۱۔ اقسام بلحاظ شکل و شباهت۔



۲۔ اقسام بلحاظ مفتوح و دسمہ۔



۳۔ ٹولوی و مسہ، یہ رنگ اور صلابت میں چنے یا سور کے برابر ہوتی ہے، حدیہ رحمیہ اس کا
دوسرا نام ہے۔

۴۔ یہ حمل سرکی، ازغولی رنگ کی، انگور سے مشابہ ہوتی ہے۔



اسباب

۱. سوداوی خون
۲. صفرا و مہرق
۳. بلغمی خون
۴. گرم ادویہ / اغذیہ
۵. ثقیل نفاخ اغذیہ
۶. قبض
۷. رودہ مستقیم میں خراش
۸. حریف غذا میں لینا
۹. ترک ریاضت / زیادہ عرصہ تک بیٹھے رہنے کا عمل
۱۰. سوداوی مزاج
۱۱. نناک جگہ پر بیٹھنا۔
۱۲. کثرت سے نوشی
۱۳. خوف و غم
۱۴. ایام حمل
۱۵. کبد، طحال کے بعض امراض
۱۶. بعض اطباء کے مطابق، وراثت

علامات

اس کا سراگول اور سرخ، بڑا ریک اور سبز، نیم پختہ توت کی مانند لمبی اور نرم ہوتی ہے۔
 لکھ اس میں درخت کھجور کی طرح بہت سی شاخیں ہوتی ہیں۔
 مے یہ انجیر سے مشابہ، گول اور چٹھی ہوتی ہے۔
 تہ یہ چھو ہارے کی طرح سخت اور لمبی ہوتی ہے۔

مقعد کی عروق کے منہ پر غیر طبعی انفرادی (ابھار / مسہ) پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مقعد میں درد، گرانی اور سوزش محسوس ہوتی ہے، رنج حاجت سے قبل یا بعد میں قطرہ قطرہ خون ٹپکتا ہے، بعض اوقات اخراج خون کی مقدار ۲۰۰ ملی لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ رنج حاجت کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو رنج حاجت کے بعد کچھ دیر تک برقرار رہتا ہے۔ مسوں کے متورم ہو جانے یا ان پر مفلحہ مامروہ کا دباؤ پڑنے کی صورت میں درد اور سوزش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قبض ہوتا ہے، نقصان اشتہار اور سوریہم کی شکایت ہوتی ہے، شکم میں گرانی رہنے لگتی ہے، اعضا شکنی ہوتی ہے جو سوکر لٹھنے کے بعد نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، سستی کی وجہ سے معمولات میں جی نہیں لگتا، جسم کا رنگ زرد، سبزی مائل ہو جاتا ہے، زبان سیاہ ہو جاتی ہے، نچلے ہونٹ میں سفیدی جھلکنے لگتی ہے، ضعف کی وجہ سے خفقاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، معدہ، کبد اور قلب میں اختلاج پیدا ہو جاتا ہے، قوت جماع میں ضعف پیدا ہو جانے کی وجہ سے جماع کے بعد ۲۴ گھنٹہ اور غیر معمولی ضعف محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات بالوں کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور ان کی جڑوں میں خارش محسوس ہوتی ہے۔ بال عام طور سے گرنے لگتے ہیں۔ چہرے، بالخصوص پپوٹوں پر بھر بھراہٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات خصبہ، شانہ اور کریں بھی درد ہوتا ہے، شدید صورت میں سوداوی درد سر عارض ہوتا ہے، غشی کے گلے ہونے لگتے ہیں اور اچانک ریاض قوت ہو جاتا ہے۔

غلبہ خون غلیظ کی صورت میں سوزش اور خارش کی نسبت گرانی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے خلاف منراوی خون کے غلبہ کی صورت میں گرانی کی نسبت سوزش، غلش اور درد زیادہ ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

جرمان الدم صوی
Intestinal Hemorrhage
۱۔ تے نہیں ہوتے
۲۔ درد بطنی ہوتا ہے

بواسیر

۱۔ مقعد کی عروق کے منہ پر سے ہوتے ہیں۔
۲۔ معار مستقیم میں گرانی اور بوجھ ہوتا ہے۔

- | | |
|---|---|
| <p>۲۔ عام طور سے اسہال کی شکایت ہوتی ہے</p> <p>۳۔ سیاہ خون براز میں ملا ہوا ہو سکتا ہے۔</p> <p>۵۔ جسمانی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں</p> | <p>۲۔ قبض ہوتا ہے۔</p> <p>۴۔ سرخ خون، براز کی بیرونی سطح سے ملا ہوا ہوتا ہے۔</p> <p>۵۔ عام طور سے جسمانی علامات مفقود ہوتی ہیں۔</p> |
|---|---|

تفریقی علامات

سرطان امعاء

- ۱۔ سرطان / سرطانی نقص تغذیہ کی سرگزشت ملتی ہے۔
- ۲۔ اجابت فیتے کی طرح ہوتی ہے۔
- ۳۔ الم قاطع ہوتا ہے۔
- ۴۔ براز میں خون اور مٹم خارج ہوتا ہے۔
- ۵۔ معار مستقیم میں سرطانی سلوہ ہوتا ہے۔

بواسیر

- ۱۔ آرام و آرائش اور کبڈ کے امراض کی سرگزشت ہوتی ہے اور نقص تغذیہ نہیں ہوتا۔
- ۲۔ اجابت طبعی ہوتی ہے۔
- ۳۔ معار مستقیم میں درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔
- ۴۔ امعاء سے عام طور پر جریان الدم ہوتا ہے۔
- ۵۔ معار مستقیم میں مے موجود ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- ۱۔ مادہ کے غلبہ، عوارض کی شدت، عادتاً جاری رہنے والے خوں / زرد آب کے بند ہو جانے کی صورت میں فصد کھولیں، پچھنہ لگائیں، تعلیق کریں، مہل بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔
- ۲۔ بواسیر کا علاج کرتے وقت کبڈ اور امعاء کے مزاج کی اصلاح کریں۔
- ۳۔ مادہ کے تحلیل کی تدابیر کریں۔
- ۴۔ استلاء عروق مقعد کی صورت میں مفتحات عروق استعمال کرائیں۔

_____ شدت درد کے وقت مسکنات درد استعمال کرائیں۔
 _____ حسب ضرورت عملیہ کریں / مسوں پر ایسی دوائیں لگائیں جو ان کو خشک کر کے گرا دیں۔

_____ سیلان کی زیادتی کی صورت میں حابسات خون استعمال کرائیں۔
 _____ عملیہ وغیرہ کے بعد گوشت اگانے والی دوائیں استعمال کرائیں۔
 _____ حابسات کا استعمال اس وقت تک نہ کریں، جب تک غلیظ اور سیاہ خون خارج ہوتا رہے۔ نیز حرارت غالب ہو، اور ضعف طاری نہ ہو، _____ کیونکہ اس ردی خون کے اخراج کی وجہ سے اکثر اوقات دوسرے سوداوی امراض سے نجات مل جاتی ہے۔

_____ مسوں کو گراتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام مسوں پر بیک وقت اس طرح کی دوا نہ لگائیں بلکہ ایک مے کو ساقط کریں، اس کے بعد دوسرے، تیسرے _____ وغیرہ کو۔

علاج |

_____ بہت پس خون، مسوں کے اختلاار اور دردناکی کی صورت میں باسلیق، صافن یا مابض کی نصف کھولیں، دونوں سرین کے درمیان پھنک لگائیں، دچی کے مقام پر، بوا سیر کے آس پاس یا مسوں پر جو تکیں لگائیں۔
 _____ مسوں کے منہ کو کھولنے کے لیے درج ذیل تدابیر اور ادویہ مفید ہیں۔

نسخہ ۱۔

ابتداء میں گرم پانی سے آب دست کرائیں، اس کے بعد شبت اور خطی کے حوشانہ سے تکبید کر کے روفن خستہ شفتالو یا مغز ساق گاؤ کی مالش کریں، اس کے بعد پیاز کو روفن زرد میں بریاں کر کے پتھال کبوتر، سداب باہم ملا کر مقعد پر باندھیں۔

نسخہ ۲۔

شحم حنظل، ۱۰ گرام، بادام تلخ ۴ گرام، کو باریک پیس کر، ۱ گرام سفوف کا حول کریں۔ اور ہر پانچویں گھنٹے حول تبدیلی کریں _____ سے کام نہ کھولنے میں مفید ہے۔

_____۔ مقعد پر مصالح اور تازہ گوشت اگانے کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال

کوی۔

نسخہ ۱۔

کندر، دم الاخوین، کبریا، زعفران، سفیدہ کاشغری، افیون، ہم وزن تمام دواؤں کو زردی بیضہ مرعہ یا روغن بنفشہ میں ملا کر مقام بواسیر پر لگائیں۔

نسخہ ۲۔

رسوت، کات سفید، کافور، مکھن میں ملا کر لیپ کریں۔

_____۔ تسکین درد کے لیے درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مرہم سفید اب کا فوری لگائیں۔

نسخہ ۲۔

روغن گل ۲۵ ملی لیٹر، مغز استخوان کا ۳۲ گرام، موم سفید ۵۰ گرام، سفیدہ کاشغری، مردار سنگ، ہر ایک ۲۰ گرام، منق ۵۰ گرام، اتاقیا، کندر، دم الاخوین، مرصاف، ہر ایک ۸ گرام، افیون ۳۵۰ ملی گرام _____ تمام دواؤں کا حسب دستور مرہم بنائیں اور استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

برگ کرنب شگفتہ کو پکا کر گھلا دیں، پھر ہاون میں ڈال کر روغن گل ۳۵ ملی لیٹر، زردی بیضہ مرعہ ۱ عدد، افیون ٹھوڑی مقدار میں _____ تمام دواؤں کو خوب ملائیں اور استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

نخ حلبہ، اکیلیل الملک، بابونہ، برگ کرنب ہوزن _____ تمام دواؤں کو آگ پر پکا کر جلائیں، اس کے بعد ہاون دستہ میں پیس کر مرہم کی طرح بنائیں پھر افیون ۵۰ گرام، زعفران ۵ گرام، آب پیاز میں حل کر کے ملائیں اور زردی بیضہ مرعہ شامل کر کے خوب گھوٹیں، اور ایک کپڑے پر لیپ کر کے روغن گل سے چرب کریں اور مقعد پر باندھیں۔
_____۔ حابس خون کے طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست انار خشک باریک پیس کر دبی میں ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز تخم نمکولی پختہ، صبر زرد، غلغل سیاہ ہم وزن ——— تمام دواؤں کو خوب باریک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور بوقت خواب ۲ اقسام ہر آہ آب نیم گرم کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

رسوت ۱۰، اگر ام، آب برگ ککروندہ میں بھگو کر لی چھان کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جثت الحديد مدبر، شراب کبند می حل کر کے نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل دوا میں استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز تخم ارند دشتی، کو باریک پیس کر ٹکیہ کی طرح بنائیں۔ اور روغن گل سے چرب کر کے مسوں پر رکھ کر باندھیں۔

نسخہ ۱۔

مردار سنگ، رسوت، کافور ہم وزن ——— تینوں دواؤں کو روغن گاؤں میں حل کر کے مسوں پر لگائیں۔

نسخہ ۱۔

جگنو سر بریدہ، الیوا، سفیدہ کاشغری، باہم ملا کر مسوں پر لگائیں۔ اس سے مے گر بھی جاتے ہیں۔

۔۔۔۔۔ بواسیر دموی میں درج ذیل نسخہ جات بھی مفید و مجرب ہیں۔

نسخہ ۱۔

مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، مغز تخم شفتالو، رسوت خالص، ہر ایک ۲۰ گرام، ——— تمام دواؤں کو باریک پیس کر جنگلی بیر کے بقدر خوب بنائیں اور اجب صبح، شام ہر آہ آب تازہ استعمال کرائیں۔ قبض کی صورت میں عرق بید سادہ ۵۰ ملی لیٹر، شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست ہلیدہ کاہلی، ہلیدہ سیاہ، پوست بلیڈ، آملہ، ہر ایک ۵ گرام، بادیان، کالج ہریک
۶ گرام، تخم مکوہ، گل ارمنی، ہر ایک ۱۲ گرام، برگ سنائے کی ۵ گرام — تمام کو باریک
پیس کر سفوف تیار کریں اور ۴ — ۶ گرام ہمراہ آب تازہ یا شربت انجبار استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

ہلیدہ، ہلیدہ، آملہ، گوگل ہم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شہد خالص
حسب ضرورت ملا کر کھلائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

تخم کندنا ۵ گرام، پانی ۲۵ ملی لیٹر میں خوب جوش دیں۔ جب ۵۰ ملی لیٹر رہ جائے
تو چھان کر روغن کچھ ۲۵ ملی لیٹر میں خوب پکائیں جب پانی جل جائے تو تخم کتاں ۱۸ گرام،
گوگل ۲۰ گرام باریک پیس کر ملائیں اور گھینپ کر مسوں پر لگائیں۔ اور پیاز باریک
تراش کر روغن تلخ میں بریاں کر کے مسوں پر باندھیں۔

نسخہ ۴۔

کات سفید ۲ گرام، نیلہ تھو تھا بریاں ۱۰ گرام، چھالیہ سوختہ ۲ عدد، بکری کے پیر کی
بڈی سوختہ ۱۲۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور لعاب دہن
میں ملا کر ضماد کریں۔

نسخہ ۵۔

گوگل، سیندور، دونوں کو خوب باریک پین کر پانی میں حل کر کے مسوں پر لگائیں،

نسخہ ۶۔

آب تازہ کر ملا، روغن کتاں، — دونوں کو ملا کر پکائیں، جب پانی جل جائے
تو روغن محفوظ کر لیں اور مسوں پر لگائیں۔

نسخہ ۷۔

برادہ باقھی دانت، برادہ لوہا، — دونوں کو باریک پیس کر مسوں پر لگائیں۔

نسخہ ۸۔

زہر مبرہ خطائی، رسوت زرد، سبوس اسپغول ہر ایک ۳ گرام، سفیدی بیضہ
مزنہ اعداد، میں پس کر دغن گل ملا کر ضماد کریں۔
نسخہ ۱۔

برقی کلر دندہ، برگ امتناس، برگ گندنا، برگ پالک ہر ایک ۵۰ گرام، مقل
ارزق ۶۰ گرام، کیلہ ۵۰ گرام ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر بھپارہ کر لیں۔
نسخہ ۱۔

کرماج، مازوئے سبز، اسپغول مسلم، رسوت زرد، ہر ایک ۱۲ گرام، گلنار فارسی ۵ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر آبدست کرائیں۔

روح البوابیہ

اس مرض میں غلیظ ریح، عضوتناسل اور مقعد کی جانب اتر کر مقعد کے مسوں میں اجمار اور نفخ پیدا کر دیتی ہے، جس سے مریض مضطرب اور کر بناک ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ امراض مقعد میں سے نہیں ہے، صرف لفظی مشارکت کی وجہ سے اطباء اس کو بواسیر کے بعد ذکر کرتے ہیں۔

اسباب

غلیظ سوداوی خلط
ثقیل اور نفاخ اشیاء کا بکثرت استعمال۔

ۛ اس کو "بواسیر رکی" کہنا زیادہ مناسب ہے، بعض اطباء نے یہی نام لکھا ہی ہے۔

علامات |

غلیظ ریح سوداوی، جو بہت مشکل سے تحمل پذیر ہوتی ہے، پھل، ناف، اور گلتین کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، جس سے نفخ و تراقیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مقعد میں اس ریح کے اترنے کی صورت میں سورہم ہوتا ہے، ضعف باہ، جماع میں کم لذت اور جماع کے بعد شدید ضعف و نقاہت وغیرہ عوارض رونما ہوتے ہیں انزال کے وقت مقعد اور زہار میں معمولی درد محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات مقعد میں اختلاج ہوتا ہے، براز نرم اور بلبہ دار خارج ہوتا ہے، اس کے باوجود رفع حاجت کی خواہش بدستور رہتی ہے، معدہ اور صدر میں سوزش اور جلن ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کسندی ہوتی ہے، انگڑائیاں اور جمائیاں بکثرت آتی ہیں۔ ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ حلق میں کوئی شئی لگتی محسوس ہوتی ہے۔ جس کو مریض "آخ" "آخ" کر کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب سے بیداری کے بعد جسم بھاری معلوم ہوتا ہے، شدید صورتوں میں بالوں کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، بال گرنے لگتے ہیں اور ان کی جڑوں میں شدید غارش ہوتی ہے، چہرے کا رنگ زرد، سبز، سیاہ، پتیل یا سیدہ کی مانند ہو جاتا ہے، بعض اوقات درد سر، دوران سر، قوہ لچ اور شب کوری وغیرہ عوارض بھی رونما ہوتے ہیں

اصول علاج |

..... منہج و مہل استعمال کرائیں۔

..... کا سرریاح ادویہ کھلائیں ان میں مدات بول بھی ضرور شامل کریں۔

..... دلب اور حمام کرائیں۔

..... باسلیق کی فصد کھولیں۔

..... مسکن درد ادویہ استعمال کرائیں

علاج |

..... جب افسیموں سے سودا کا تنقبہ کریں اور افسیموں ہمراہ ارا بخین استعمال

کرائیں، اور درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست بلیہ زرد، پوست بلیہ کابی، پوست بلیہ، آملہ، بلیہ سیاہ، گاؤ زبان، گل سیوتی ہر ایک ۶ گرام، گل سرخ ۱۲۰ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر حسب دستور عرق کشید کریں اور نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

پوست بچ کبر ۱۳ گرام، صندھ فارسی ۶ گرام۔ دونوں کو باریک پس کر ۶ گرام، براہ آب نیم گرم کھلائیں۔

نسخہ ۳۔

صبر ۶ گرام، تخم اسپندان، جاؤ شیر، اشق، مقل، غارقیون، عصارہ فافٹ، ہر ایک ۵ گرام، سکینج ۱ گرام، تخم حنظل ۳ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر آب گندنا میں گوندہ کر ۲ گرام کے خوب بنائیں اور ۲-۳ خوب استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

گوئل، مصطلی، ہر ایک ۱ گرام، باریک کر کے اطر فیقل کشنیزی ۲ گرام، میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد موثر منفی ۱۰ عدد، گاؤ زبان ۶ گرام، عرق مکوہ میں جوش دے کر مل چھان کر بنات سفید ملا کر تودری سفید ۴ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

بلیہ، بلیہ، آملہ، موصلی سفید، ہر ایک ۶ گرام کو باریک کر کے براہ آب سرد استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

زرباد، درونج، بلیہ زرد، بلیہ سیاہ، شیطرج، عاقر قرسا، فلفل، دار فلفل، تخم گندنا، مقل نیم وزن۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر نوشادر ملا کر آب گندنا اور موثر میں خوب بنائیں اور ۶ گرام کھلائیں۔ بوا سیر ریجی کے ساتھ درد میں مفید ہے۔

نسخہ ۷۔

حلیت بریاں ۵۰۰ ملی گرام، بچ کبر ۱۳ گرام، دونوں کو باریک پس کر گلقتند ۱۲ گرام

نسخہ :-

نسخہ

شتقاق مقعد

اس مرض میں مفعد میں انشقاق ہو جاتا ہے، اور اجابت کے دقت شدید درد اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ مرض عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

امراض متعدده و امعاء رده۔

قبض

(۵) بو اسیر / نوا حیر

(III) **منقعد کی حرارت اور پیوست**

۱۵۰

(۱۶) مفعد پر چوٹ لگنا۔

(۷۷) اسپہال

متفرقات :-

۱۲. مقعد کی عروق کے منہ کی طرف خون کا شدت سے مندفع ہونا / امتلاء عروق

مقعد۔

- ۱۰۔ درم مقعد حار/بارد/ریاحی
 ۱۱۔ خارجی برودت
 ۱۲۔ خشک، تیز، معالک دار اغذیہ
 ۱۳۔ تیز اور اکال ادویہ
 ۱۴۔ رفع حاجت کے وقت زور لگانا۔

علامات

رفع حاجت کے وقت مقعد میں شدید درد اور سوزش ہوتی ہے قبض کی صورت میں براز خشک ہو سکتا ہے مقعد کے سور مزاج حاریا بس میں مقعد اور اس کے اطراف میں خشکی اور التهاب ہوتا ہے۔ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اور سرد تدا بیر سے راحت ملتی ہے، انتشار عروق مقعد کی صورت میں شقاق کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے، دیگر اسباب کی صورت میں ان کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج

- ۱۔ سور مزاج حاریا بس میں تبدیلی مزاج کریں۔
- ۲۔ غلبہ خون اور صفراء کی صورت میں حسب دستور تنقیہ کریں۔
- ۳۔ انتشار عروق مقعد کی صورت میں با سلیق صافن کی منہد کھولیں۔
- ۴۔ قبض کی صورت میں ملینات استعمال کرائیں۔
- ۵۔ التهاب مقعد کی صورت میں اس کا مخصوص علاج کریں۔
- ۶۔ دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج

- ۱۔ تبدیلی مزاج کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شریت بنفشہ، شربت نیلوفر، شربت انار، ہم وزن عرق بیدمشک میں ڈال کر نوش کرائیں۔

۔۔۔ قبض کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

روغن بید انجیر ۳۶ ملی لیٹر، شیر گاؤ ۲۵۰ ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں، اس کے بعد خیرہ بنفشہ کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

گل بنفشہ، تخم خطی، ہر ایک، گرام، گاؤ زبان، گل نیلوفر، ہر ایک ۵ گرام، — تمام دواؤں کو پانی میں ہلک کر مل چھان کر گل قند آفتابی ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

ہلیلہ کابل ۳۰ گرام، سکینچ ۹ گرام، حرف ۶ گرام، گوگل ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر آب گندنا میں گولیاں بنائیں اور ۶-۹ گرام، ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

۔۔۔ درج ذیل نسخہ جات مفید اور مجرب ہیں۔

نسخہ ۴۔

تخم خرد سیاہ، عرق گلاب میں پس کر شربت بنفشہ ملا کر اسپنول چھوڑ کر نوش کرائیں۔ بہترین مرہم ہے۔

نسخہ ۵۔

راتینج، زفت، ہر ایک ۱ گرام، روغن بنفشہ اور مرغ کی پیرلی میں پگھلائیں اور زردی بیضہ مرغ اور قھوڑا حیون ملا کر خوب گھینپ دیں اور مرہم کے بطور استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

تخم کنوچہ، ایک حصہ، تخم کتاں ۲ حصہ، — دونوں دواؤں کو باریک کر کے تازہ دودھ میں جوش دیں جب گاڑھا ہو جائے تو ہادوں میں ڈال کر سفیدی بیضہ مرغ اور روغن گل ملا کر خوب ملائیں اور بطور مرہم استعمال کرائیں۔

نسخہ ۷۔

زعفران، مرکی، کندر، کوآب برگ کاسنی بزمیں پس کر روغن گل ملا کر صاف کریں۔
نسخہ ۱۔

سرطان نہری کے اطراف صاف کر کے پس کر شہد خالص میں ملا کر لگائیں۔

نسخہ ۲۔
صدف سوختہ، قشار، کندر، فبار آسیہ، سرمہ سیاہ، — تمام دواؤں کو
باریک پس کر مقام شقاق پر درور کریں۔

استرخا مقعد

LOOSENESS OF SPHINCTER OF ANUS

اس مرض میں معائے مستقیم کا بعض حصہ یا اس کی فشار مخاطی مسترخ ہو جاتی ہے،
جس کی وجہ سے بلا ارادہ براز اور ریاح کا اخراج ہوتا ہے۔

اسباب

امراض معدہ و اعما۔

۱. معدہ کا سور مزاج استرخائی۔
۲. رطوبت / رطوبت آمیز حرارت کی زیادتی۔
۳. معدہ کا سور مزاج بارد سادہ
۴. بواسیری علیہ / ناسور مقعد کا علیہ لا علیہ پر پریش ہو کر
۵. مقعد کے عضلات قابضہ کا کسی سبب سے ڈھیلا ہو جانا۔
۶. پشت پر چوٹ لگنا جس سے وہاں کے عصب کا مبدار ماؤف ہو جائے۔
۷. مقعد کے عصب / عضلہ کا باہر کی طرف تہ دیا نہینچاؤ۔
۸. قبض۔
۹. چھانک جگہ پر بیٹھنا / سردی / سردی اختیار کرنا۔
۱۰. درم مقعد

(۱۴) ضعف اعصاب

علامات

مقعد کی خشار مخاطی یا معاد مستقیم کا بعض حصہ مسترخ ہو جانے کی وجہ سے براز اور ریاح کا بغیر ارادہ اخراج ہوتا ہے، سور مزاج بار در طب میں داخلی یا خارجی طور پر سرد و تر نذاہیر اختیار کرنے کی روئیداد ملتی ہے، لمس سرد ہوتا ہے اور استرخاء بندرت واقع ہوتا ہے۔

استرخاء رطوبی مائل بر حرارت میں لمس گرم ہوتا ہے، اور مرض کا وقوع قریباً بندرت واقع ہوتا ہے، مگر بڑے چوٹ لگنے یا بواسیر و ناسور مقعد کے عملیہ کی صورت میں مرض دفعتاً رونما ہوتا ہے۔ عصب یا عضلہ کے خارجی طرف تمدد اور کھینچاؤ کی مقعد میں استرخائی کیفیت کی بجائے کسی قدر صلابت پائی جاتی ہے۔ دیگر اسباب کی صورت میں ان کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج

_____ سور مزاج رطوبی استرخائی میں شغبات اور مہلات کے ذلیعہ مادہ مرثیہ کا تنقیہ کریں اس کے بعد تبدیلی مزاج کے لیے گرم معجونات کھلائیں۔
_____ آہن کرائیں۔

_____ پشت اور زیریں ہروں پر مناسب روغنوں کی مالش کریں۔
_____ عصب یا عضلہ کے تمدد کی صورت میں ابتداء میں مرخی اور ملین شحم اندو غنوں کی مالش کریں اس کے بعد تحلیل و تلطیف کا حامل قابض اور محرک دوائیں استعمال کرائیں۔
_____ دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

_____ بواسیر/ناسور مقعد کے عملیہ کی صورت میں استرخاء مقعد ہو تو یہ جلد

علاج پذیر نہیں۔

علاج

_____ استرخاء مقعد فاطمی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

ثبت، پنج بادرنجبویہ، ریحان، حب الغار، افستین روی، پوست انار، زرنب،
تخم مویز، گل بابونہ، ہر ایک ۳۵ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں خوب جوش دے کر
آبزین کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم انار، پوست انار ترش، حب الّاس، اذخر، خطلی، قسط ہر ایک ۲۵ گرام، کو
پانی میں اچھی طرح جوش دے کر آبزین کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جند بیدستر، فرنیون، نرگس، بابونہ، قسط اور نار دین کے روغن کی پشت اور
زیریں ہروں پر مالش کریں۔

۔ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل نسخہ جات استعمال کرا سکتے ہیں۔

نسخہ ۱۔

سنبل الطیب، مرکلی، قسط، جوزالہر، ہموزن کو پانی میں اچھی طرح جوش دے کر
آبزین کرائیں۔

نسخہ ۱۔

نام، برگ شاہسفرم، برگ غار، تخم ترب، ہر ایک ۲۵ گرام کو پانی میں اچھی طرح
جوش دے کر آبزین کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کرمازج، سنبل الطیب، فونل، مازو، گل سرخ ہر ایک ۶۰ گرام، اہبل ۱۲۰ گرام،
اذخر ۳۵ گرام، مرکلی ۲۵ گرام۔ تمام دواؤں کو خوب جوش دے کر آبدست کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پوست انار، قسط، مقل، زیرہ سفید، اذخر، کندر، حب الّاس، ہموزن۔ تمام
دواؤں کو باریک پیس کر منقعد پر چڑکیں۔

نسخہ ۱۔

پوست انار، مازو، جھنت بلوط، خر مہرہ سوختہ، سرطان سوختہ، معدف سوختہ،

کاغذ سوختہ، تمام دواؤں کو خوب باریک کر کے، مقعد پر روغن گل لگانے کے بعد اس کو چڑکیں۔

خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔


نسخہ:-

کرمازج، افسنتین رومی، ایرسا، سعد کوئی، ہر ایک ۳ گرام، زیرہ کرمانی، نانا خواہ،
تودری، یوزیدان، گل سرخ ہر ایک، گرام، مصطکی، لسان العصفور، معتر فارسی، زودفا خشک،
ہر ایک ۱ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر ہموں جلا ادویہ سفوف ہلیہ کا بلی ملائیں۔
اور تمام دواؤں کے بقدر شکر طبرزد ملا کر محفوظ کر لیں اور ۴ گرام صبح اور بوقت خواب
کھلائیں۔

خروج مقعد

PROLAPSUS ANI

اس مرض میں معیار مستقیم کی خشاء مخاطی یا اس کے سارے طبقات کا کچھ حصہ مقعد
سے باہر نکل آتا ہے۔ رفع حاجت، کھانسنے، زور سے ہنسنے اور دیرینہ کھڑے رہنے
میں خروج کثیر الوقوع ہے۔



اسباب

امراض معدہ و معار۔

۱. دم مقعد
۲. استرخاء مقعد

- (۱۰) براہیر
(۱۱) قبض مزمن
(۱۲) اسہال مزمن
(۱۳) دیدان اسہار
(۱۴) زحیر
(۱۵) براز کا خشک ہونا
(۱۶) متفرقات :-
(۱۷) عظم غذا مذی
(۱۸) ضیق مجری البول
(۱۹) حصاة مشاء
(۲۰) مسہل ادویہ کا استعمال
(۲۱) شہیقہ
(۲۲) عام ضعف

علامات |

ابتدائی مرحلے میں صرف رفع حاجت کے وقت کا بچ باہر نکل آتی ہے، لیکن جب مرض مستحکم ہو جاتا ہے تو زیادہ دیر تک کھڑے رہنے، زور سے کھانسنے، ہنسنے اور کوئی بھی زور کا کام کرنے سے مقعد باہر آ جاتی ہے، بعض اوقات اس میں قروح بھی پڑ جاتے ہیں، جس سے غیر معمولی درد ہوتا ہے۔

خروج مقعد استرخائی میں مقعد باسانی اور جلدی سے اندر لوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر استرخائی کیفیت غیر معمولی ہو تو اندر نہیں لوٹ پاتی، اگر مصب کے کٹ جانے سے استرخائی کیفیت رونما ہوتی ہے تو بھی لوٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔

خروج مقعد درجی میں مقعد کا اندر لوٹنا بہت دشوار ہوتا ہے اور درج مقعد کی وجہ سے عوارض میں بھی شدت ہوتی ہے۔

خروج مقعد زحیری میں زحیری روئیداد ملتی ہے۔

دیگر اسباب کی صورت میں ان کی اپنی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں۔ — یہ
مرض بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اصول علاج |

- 1. — مقعد کو اندر کی طرف لوٹا کر لنگوٹ باندھیں۔
- 2. — استرخاء کی صورت میں فالج کا اصول علاج اختیار کریں، — یہاں
ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ استرخاء کے مستحکم ہونے کی صورت میں یا کسی عصب کے
کٹ جانے کے نتیجے میں مارض ہونے والا خروج مقعد عام طور سے علاج پذیر نہیں ہوتا۔
- 3. — دافع الم ادویہ استعمال کرائیں۔
- 4. — دم کی صورت میں مملل اور ام تدابیر اختیار کریں۔
- 5. — زحیری میں، زحیر کا اصول علاج اپنائیں۔
- 6. — کالچ کو اندر داخل کرنے کے بعد قابض دواؤں کے جو شانہ میں آئیں
کرائیں۔
- 7. — اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج |

خروج مقعد استرخائی میں درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ ۱۔

گلنار، پوست انار، مازو، زر ورد، ہوزن — تمام دواؤں کو باریک میں کر
ایک کپڑے پر پھیلا کر مقعد پر رکھیں اور مقعد کو اندر کی طرف لوٹا کر لنگوٹ باندھ دیں۔

نسخہ ۲۔

گلنار، مازو، سرمہ، پوست انار، شب یانی، صدف سوختہ، سفیدہ کاشغری۔
ہم وزن، — تمام دواؤں کو خوب باریک میں کر مقعد پر چھڑک کر لنگوٹ باندھ دیں۔

نسخہ ۳۔

پوست انار، برگ آس سبز، گل سرخ، جفت بلوط، کاغذ سوختہ، شاخ گوزن سوختہ،

سم ہر سوختہ، گلنار فارسی، مازو، شب سیمانی ہم وزن — تمام دواؤں کو پانی میں خوب جوئش دے کر آہرن کرائیں۔

۔۔۔ فروع مقدمہ درمی میں درج ذیل نسخہ جات / مذاہب اختیار کریں۔

نسخہ

خجازی، تخم حلی، برگ کرنب، برگ شلم، تخم کتان، بالود مبوزن کو پانی میں جوش دیں۔
اور مقعد کو اندر کی طرف لٹوا کر اس کا آئرن کر انیں۔

نسخہ ۱

موسم کو روغنِ بابونہ، روغنِ شہت میں گچھلا کر قیرِ مٹی کے طور پر ملیں اور جب ورم میں نرمی آجائے تو موقعہ کو اندر کر کے لنگوٹ باندھ دیں، اس کے بعد شاہِ بلوط، گھنٹار، مارو بہم وزن کے جو شانہ میں آہرن کرائیں۔

نسخہ

مغز، فلوس، خیار، شبنم، حب، مزدت کو آب، مکوہ، سبزمی، حل کر کے مفعد پر لیپ کریں۔
تھیل ورم کے لیے بے مثال ہے

خروج مقتدر ہیری میں درج ذیل نسخہ مفید ہے۔

نسخہ

ودرغ سوختہ، کندر، مردار سنگ، ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک کر کے
مقعد پر بھڑکیں۔

..... درج ذیل نسخہ جات بھی سبب کی حمایت کے ساتھ مفید ہیں۔

منصور

برج بھول، شر بھول، گل دھاوا، — تمام دھاؤں کو پانی میں جوش دے کر
آپ دست کرائیں۔

[illegible]

یہ کہ انہ، بزرگ جامن، پوست جامن، پوست بھول کو پانی میں جوش دیکر آبدست کر لیا۔



فعلی سرخ، عدس مقشر، حب الشعرب، سماق، ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی

میں جوش دے کر آئین کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مدس مقشر، پوست انار، جفت بلوط، جوزالسرد — تمام دواؤں کو باریک ہیں کر
آب برگ مورد میں حل کر کے روغن گل ملا کر لوہے کے برتن میں رکھ کر گھونٹیں اور مقعد پر ضا د کریں۔

نسخہ ۲۔

حب الاس، مصطکی روی، گلنار فارسی، ہم وزن — آب برگ مورد میں ہیں کر مقعد پر
ضا د کریں۔

نسخہ ۳۔

سنائے گی، برگ بھنگ، ہم وزن کو دودھ میں باریک ہیں کر مقعد پر لگائیں۔

نسخہ ۴۔

جوزالسرد، حب الاس، افاقیا، عصارہ لیمۃ التیس، مازوسبز، حب ضرورت —
تمام دواؤں کو باریک ہیں کر مقعد پر چھڑکیں۔

نسخہ ۵۔

پوست انار خشک، مازو، شاہ بلوط، مدف سوختہ، خرہرہ سوختہ، سرطان سوختہ،
عصارہ لیمۃ التیس، پلاس، سموزن — تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر آب مورد میں ترک کر کے
خشک کریں اور پھر باریک ہیں کر محفوظ کر لیں۔ اور مقعد کو روغن مغز تخم شفتالو سے مدھن کر کے
یہ سفوف چھڑکیں۔


ناصور مقعد

FISTULA IN ANO

اس مرض میں مقعد کے کنارے پر گہرے اور خبیث زخم پیدا ہو کر متغین ہو جاتے ہیں۔
رودہ مستقیم بھی غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے، اس سے ہر وقت پیپ یا درد آب
رستار ہتا ہے، ان سے مریض کو ہر وقت، خاص طور پر رنج حاجت کے وقت غیر معمولی
تکلیف ہوتی ہے۔

اقسام

ناصور مقعد



اسباب

امراض معدہ و اعصاب :-

۱. حوالی بزرگ اخراج

۲. مقعد کا علیہ

۳. بواسیر

۴. قروح مقعد

۵. قبض

۶. تیز مسہل کا معدہ و اعصاب پر ردی اثر کرنا۔

مستفرقات :-

۱. ثقیل، نفاخ غذاؤں کا بکثرت استعمال

۲. بکثرت شراب نوشی

لے اس ناصور کا منہ باہر اور اندر معالیم میں، دونوں طرف کھتا ہے، اس لئے اس کو 'ناصور مقعد مکمل' کہتے ہیں۔

لے اس کی پہلی قسم ناصور مقعد نافذ ناکمل بیرونی میں ناصور کا منہ باہر ہی کی جانب کھلتا ہے، اور دوسری قسم ناصور مقعد نافذ ناکمل اندرونی میں ناصور کا منہ اندر معالیم میں کھلتا ہے۔

۹۔ گرم معالحو کا بکثرت استعمال

علامات

فاسد گوشت اور زخم سے زرد آب یا گوشت کے دھون جیسی رطوبت رستی رہتی ہے، پیپ یا خون بھی آسکتا ہے، لیکن یہ صورت ناصور نافذہ یا ناصور فیروزہ بیرونی میں پیش آتی ہے۔ رفع حاجت کے وقت مقعد میں سوزش، درد اور جلن کا احساس ہوتا ہے، ریاخ اور براز فیروختاری طور پر خارج ہوتا ہے، نامکمل ناصور اندرونی کی صورت میں براز کے ساتھ خون، پیپ وغیرہ خارج ہوتی ہے،

محفوظ رہے کہ حکماء نے ناصور مکمل / نافذہ کو بہت ردی تصور کیا ہے اسی طرح تجویف مقعد سے دور واقع ہونے والا ناصور بھی خراب تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے علیہ میں تمام عضلہ مقعد یا اس کے بیشتر حصے کے کٹ جلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

تفریق علامات

ناصور مقعد نامکمل	ناصور مقعد مکمل
۱۔ ریاخ یا براز اس راہ خارج نہیں ہوتا۔	۱۔ ریاخ اور براز وغیرہ غیر ارادی طور پر خارج ہوتا ہے، بشرطیکہ ناصور کا سوراخ کشادہ ہو،
۲۔ ناصور میں داخل کی گئی سلائی دوسری طرف نہیں پہنچتی۔	۲۔ ناصور میں سلائی اور مقعد کی راہ انکلی داخل کرنے پر دونوں مل جلتے ہیں

اصول علاج

_____ عملیہ کریں، بالخصوص ناصور نافذہ مکمل میں عملیہ کے علاوہ دوسرا طریقہ سودمند ثابت نہیں ہوتا۔

_____ ناصور نافذہ نامکمل بیرونی میں شیاغات استعمال کرائیں۔

_____ قبض کشادوائیں کھلائیں۔

_____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج |

• _____ ناصور نافذ نامکمل بیرونی کی صورت میں مریض کو پشت کے بل ٹائیں ہریں کے نیچے تکیہ رکھ کر ناصوری زخم کو دبا کر مواد غلیظ کو خارج کریں اور نقتیلہ جانے کی گنجائش ہو تو نقتیلہ کو آب صغ میں ہلکو کر شیان غرب کے سفوف میں لت کر کے ناصور میں رکھیں اور اگر نقتیلہ جانے کی گنجائش نہ ہو تو شیان غرب کو گھس کر اس کے ۲-۳ قطرے ناصور میں ٹپکائیں۔ اور دوا کے خشک ہونے تک مریض کو یونہی پڑا رہنے دیں، یہ عمل دن میں دوبار کریں، نسخہ شیان غرب درج _____ ہے۔ صبر، کندر، دم الاخوین، انوروت، گلنار فارسی، سرمہ، شب ہر ایک ۵۳ گرام، زنگار اگرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شیان بنائیں۔

• _____ ناصور مقعد میں خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ جات مفید ہیں۔
نسخہ ۱۔

ہیل خورد ۵۲ گرام، مصطکی رومی ۳۰ گرام، جرب حبینی ۵، گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اگرام کھلائیں۔
نسخہ ۲۔

بادیان ۳۰۰ گرام، گاؤزبان ۲۵۰ گرام، ہیل کلاں ۳۰ گرام _____ تمام دواؤں کا حسب دستور عرق کشید کریں اور ۶۰ ملی لیٹر روزانہ نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

طبایشیر، ہیل خورد، جلدوار، سہاگہ، توتیا سبز، رسکپور، شنگرف ہر ایک ۶ گرام ہلید سیاہ ۱۲ گرام، مغز تخم سلاطین، اگرام، سم الغار ۵۰ گرام _____ تمام دواؤں کو آب لیموں میں سخت کر کے چنے کے برابر صوب بنائیں اور اچھ روزانہ کھلائیں۔
نسخہ ۱۔

پوست پنج کبر ۳ گرام، صغ فارسی ۵۰ گرام باریک پیس کر کھلائیں۔
_____ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صبر زرد، مرکی، کندر، دم الاخویں، زعفران، انزروت زرد — تمام دواؤں کو باریک پس کر بطور ذرور استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

زرد چوب، مردار سنگ ہر ایک ۶ گرام، جوش دے کر روغن گل ۶ ملی لیٹر، موم خام زرد ۲ گرام ملا کر خوب پکائیں۔ جب پانی اڑ جائے تو جملہ دواؤں کو خوب گھینیں، اور مرہم کے طور پر لگائیں۔

نسخہ ۱۔

دم الاخویں و سرمہ، شب پیانی، گنار ہر ایک ۱۲ گرام، صبر زرد، انزروت زرد، کندر ہر ایک ۹ گرام، زنگار ۲۰ ملی گرام، — تمام دواؤں کو باریک پس کر قیر و ملی موم خام اور روغن بنفشہ میں ملا کر تانصور پر لگائیں۔

نسخہ ۱۔

برگ نیم ۱۲ گرام پس کر بے بھاجو ۲ گرام ملا کر نیم کی کونپل کے پانی میں لیپ کی طرح تیار کریں اور تانصور میں بھر دیں۔

نسخہ ۱۔

پوست انار ترش، جو مقشر بریاں، برنج بریاں — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر آبن کر لیں۔

نسخہ ۱۔


برگ مورد، سعد کوفی، پوست انار ترش، جفت بلوط کے جوشاندہ میں آبن کر لیں۔

حکۃ مقعد

PRURITIS ANI

اس مرض میں مقعد میں ہر وقت خارش محسوس ہوتی رہتی ہے، جس سے شدید تکلیف اور اضطراب ہوتا ہے، بیشتر اطباء نے اس کو بواسیر کا مقدمہ تصور کیا ہے۔

تقسیم بلحاظ اسباب



اسباب

۱. سوزش پیدا کرنے والی مراری خلط کا غلبہ
۲. بلغم شورکارودہ مستقیم میں احتباس
۳. سوداوی خون کا مقعد پر انصباب۔
۴. دیدان امعاء
۵. قبض / بدہضمی
۶. حمل
۷. قرع مقعد

علامات

مقعد اور اس کے اطراف میں خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے، خارش کی وجہ سے مریض مضطرب ہوتا ہے اور اس کو کسی پہلو میں نہیں آتا۔
 حکۃ مقعد خلطی میں برازیں مراری یا بورقی خلط موجود ہوتی ہے، غلبہ خون کی صورت میں سوزش کے ساتھ گرانی بھی ہوتی ہے۔ حکۃ مقعد ویدانی میں برازیں دیدان یا اس کے اٹے موجود ہوتے ہیں، حکۃ مقعد قرونی میں، مقعد کا زخم اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔

اصول علاج

_____ خلط دموی کے غلبہ کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولیں، حسب ضرورت
 شانوں کے درمیان چمکنے لگائیں، جو تک لگائیں، اور مرد و مسکن دوائیں استعمال کرائیں
 _____ مراری، بورقی مادہ کے بالائی انحصار سے انصباب کی صورت میں فصد

اور اسپہال کے ذریعہ متقیہ کریں۔

• ————— مقیات استعمال کرائیں۔

• ————— حقنہ اور حمل استعمال کرائیں۔

• ————— قرص اور ویدان کی صورت میں ان کا مخصوص علاج کریں۔

علاج |

• ————— غلیظ خون کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شب یمانی بریاں، قطران ہموزن ————— دونوں کو ملا کر ۵۲ گرام، ملائم کپڑے میں رکھ کر حمل کریں،

• ————— بلغم شور کے رو دہ مستقیم میں احتباس کی صورت میں یہ نسخہ دیں۔

نسخہ ۱۔

سفوف گندنا ۳۶ گرام، مومیائی ۲۵ گرام، موم ۵۲ گرام، روضن نار دین ۵۵
لی لیٹ میں ملا کر مقعد پر لپیپ کریں۔

نسخہ ۱۔

نر کچور، جاؤ شیر، صبر، شحم خنظل، مقل، اناردانہ، ————— تمام دواؤں کو کوٹ کر
تھوڑا سا پسٹ ہلیہ زرد ملا کر دوبارہ کوٹیں، جب خوب باریک ہو جائے تو حسب دستور
شیاف بنا کر استعمال کرائیں۔

• ————— درج ذیل نسخہ جات بھی مفید اور مجرب ہیں۔

نسخہ ۱۔

روضن بادام تلخ، زردی بیضہ مرزہ بریاں، ————— دونوں کو باہم ملا کر مقعد
پر لپیپ کریں۔

نسخہ ۱۔

جددار خالص کو سرکہ میں گھس کر اس میں روٹی تر کر کے حمل کریں۔

نسخہ ۱۔

آب انار ترش میں خہد ملا کر مقعد پر لگائیں۔

نسخہ ۱۔

بلبلہ کابلہ، ایارج قیقرا، غار لقیون — تمام دواؤں کو پانی میں گھس کر مقعد پر لگائیں، بورتی غلط سے عارض ہونے والے حکم مقعد میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

آب برگ پودینہ سبز، میں ایلو اعل کر کے مقعد پر لگائیں۔

نسخہ ۱۔

صبرزد، ۲ گرام، زوفا خشک ۲۵ گرام، سرکہ، آب انار میں حل کر کے روغن گل ملا کر لگائیں۔

خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

غار لقیون، عاقر قرحا، سعد کونی، ہر ایک ۲ گرام، سنائے کھی، گل سرخ، ہر ایک ۶ گرام، مغز بادام تلخ ۳ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ کر شہد تین گنا ملا کر محفوظ کر لیں، اور ۴ گرام ہمراہ عرق عذاب اور عرق پودینہ استعمال کرائیں۔

Learn Unani Pharmacy

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض بانقراس

Learn Unani By Abdul Waris Salman

بانقراس کی مختصر تشریح اور منافع

BRIEF ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF PANCREAS

تشریح |

یہ ایک غدود ہے، اس کی شکل کتے کی زبان سے مشابہ ہوتی ہے، یہ معدہ اور بائیلون کے پیچھے بطن کی پچھلی دیوار پر واقع ہے، اس کی لمبائی ۵ سینٹی میٹر، چوڑائی تقریباً ۳ سینٹی میٹر، دبازت ۵ سینٹی میٹر اور وزن ۸۰ گرام ہوتا ہے، اس کے درج ذیل چار حصے ہوتے ہیں۔

Head	سر	(۱)
Neck	گردن	(۲)
Body	جسم	(۳)
Tail	دم	(۴)

اس کی ساخت میں درج ذیل دو قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں۔

Endocrine Cells خارجی خلیات (۵)

Exocrine Cells داخلی خلیات (۶)

Pancreatic اس میں دو قنات بھی ہوتی ہیں جن کو علی الترتیب قنات بانقراس

Accessory Pancreatic Duct اور قنات بانقراس اضافی

منافع |

بانقراس سے رطوبت بانقراس خارج ہوتی ہے جو قنات صفراوی کے ذریعہ


سدا اثنا عشری (Duodenum) میں جاتی ہے،

خارجی خلیات بانقراس، رطوبت بانقراس پیدا کرتے ہیں یہ رطوبت Alkaline ہوتی ہے، جس میں ٹریپس، لائیپیز اور ایمائی لیزر پائے جاتے ہیں۔
داخلی خلیات بانقراس سے انسولین نام کی ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے، یہ رطوبت جسم میں کاربوہائیڈریٹس کا استمار کرتی ہے اور شکر کا توازن قائم رکھتی ہے۔

التهاب بانقراس

PANCREATITIS

اس مرض میں بانقراس کی ساخت اور اس کی کارکردگی میں کسی قدر نقص آجانے کی وجہ سے مرض اور کچنی غذاؤں کے سبب میں خاص قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔



اسباب

امراض بانقراس :-

1. ضرب و سقوط بانقراس

2. حصاة بانقراس

3. سرطان بانقراس

امراض مزمنہ :-

4. التهاب مزمن

۱۶. حصۃ مرارہ
لیفیلی و جرثومی امراض۔

۱۷. درم اصل الاذن

۱۸. حمی تیغودیہ

۱۹. جدری

۲۰. حصہ

۲۱. انفلونزیا

۲۲. حمی ایامیہ

۲۳. متفرقات۔

۲۴. نزف الدم

۲۵. قرعہ اشنا عشری

۲۶. بکثرت شراب نوشی

۲۷. حمی صفراوی

۲۸. سوء ہضم

۲۹. تعصب شرابین عمومی

علامات |

حاد:-

مرض کا حمل یک بیک ہوتا ہے، فم معدہ اور اس کے مقابل پیچھے، سینہ کے نیچے حصہ میں شدید اشتعال پذیر درد ہوتا ہے، یہ درد کندھوں تک پھیل جاتا ہے۔ عروقی حرکت کے سقوط کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ نبض ضعیف ہوتی ہے، ضغط الدم انقباضی ہوتا ہے، فشی طاری ہو سکتی ہے۔ مفلوج ایلاؤس قبض صفراوی تے قام طور پر واقع ہوتی ہے، امعاء کی حرکت دودید زائل ہو جاتی ہے، نفخ شکم ہونے کے سبب بجانے سے ڈھول جیسی آواز آتی ہے، زیر بشرہ سیف درد ناک اور سختی محسوس ہوتی ہے، پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اقدال سے کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات حمی بھی ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد

ناف کے اطراف میں خاکستری سبز رنگ کا حلقہ نکلا : ہوئے لگتا ہے ، بعض اوقات یہ حلقہ قطعی حصہ میں ظاہر ہوتا ہے ۔

سفید دموبیت (Leucocytosis) بول ٹکری اور یرقان ہو گیا ہو سکتا ہے ۔
تحت الحادہ ۔

جملہ علامات میں تخفیف ہوتی ہے ، شکم کے بالائی حصہ میں وقفہ وقفہ سے درد ہوتا ہے ، معمولی تہج اور نوزل ادم ہوتا ہے ، بار بار حملہ کی وجہ سے تلیف بانقراں ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے ۔

مزمن ۔

مرض کی تشخیص بہت مشکل سے ہوتی ہے ، محمی کے ساتھ اگر قارورہ میں شکر آ رہی ہو ، شکم میں درد ہو تو اس طرف رہنمائی ہو سکتی ہے ، تاہم علامات اتنی واضح نہیں ہوتیں ۔ بار بار تھلی وجہ سے بانقراں میں تلیف ہوتی ہے ، رہ رہ کر درد ہوتا ہے ، درد کی المناکی ناف کے اوپر دائیں جانب ہوتی ہے ، یہی درد قطعی حصہ اور بائیں شانے تک جا سکتا ہے ، بعض اوقات جراثیم مشترک صفراوی بالکل مسدود ہو جاتی ہے ، ان حالات میں عظم مرارہ تلیف کبد کی شکایت ہوتی ہے ، بطن کے درمیان اور بالائی حصہ میں ابھار ہوتا ہے ، توبید ریاہ ہوتی ہے ، متلی ، تے اور اسہال کی زیادتی ہے ۔ بعض اوقات ذیابیطس بھی ہو جاتا ہے ۔ جسمانی امتحان سے صرف بے قاعدہ یرقان اور وقفہ دار یرقان معلوم ہوتا ہے ، بعض اوقات جلد کا رنگ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے ۔

اصول علاج |

- ۔ صفراوی خلط کو اعتدال میں لانے کی تدابیر کریں ۔
- ۔ شراب نوشی ترک کرائیں ۔
- ۔ قروح امعاء کا ازالہ کریں / اصل سبب مرض کا دفعہ کریں ۔
- ۔ کاسروہ مضم ادویہ استعمال کرائیں ۔
- ۔ تقویت معدہ پر خصوصی توجہ دیں ،
- ۔ التهاب مرارہ کا اصول علاج اختیار کریں ۔

علاج |

۔ قرص ۱ (بمقدور) عدد ۱۰ ہر روز بوجھانہ بادیان ۵ گرام، پودینہ خشک ۵ گرام،
مویز منق ۹ عدد، آلو بخارا ۵ عدد استعمال کرائیں۔

۔ قرص ۲ عدد ہر روز درج ذیل مجموعہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مجموعہ ۱۔

سنبل الطیب، مصطکی، زعفران، اذخرکی، اسارون، قسط شیریں، دارچینی، فانت،
تخم کشوت، فوہ، لک، تخم کاسنی، تخم کرنس، زراوند طویل، حب بلسا، عود غرق، قزقل، ہیل خورد،
ہر ایک ۵ گرام، گل سرخ، نم وزن جلد ادویہ ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہید
خالص تین گنا کے قوام میں حسب دستور مجموعہ بنائیں۔

۔ زنجبیل نیم کوفتہ، پودینہ خشک، ہر ایک ۵ گرام، فلفل سیاہ نیم کوفتہ، ۵ گرام،
نوشادر ۱ گرام، زیرہ سفید ۳ گرام، بادیان نیم کوفتہ ۵ گرام ————— تمام دواؤں کو
رات میں گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں اور بعد غذا حب متقویٰ معدہ ۲ عدد
کھلائیں۔

۔ رات میں درج ذیل جوارش استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

زرشک ۱۱ گرام، مربی آملہ، مربی ہلیہ، ایک ۵ گرام، عرق کلاب، عرق بید مشک،
شربت انار شیریں، شربت انار ترش ہر ایک ۱۱۰ ملی لیٹر: ————— قند سفید ۵ گرام —————
زرشک اور دونوں مربی چات کو عرق کلاب میں پیس کر باقی ادویہ کو ملا کر حسب دستور قوام بنائیں۔

ذیابیطس

DIABETES

س مرض میں پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے اور خون میں شکر کی مقدار معمول سے
زیادہ ہو جاتی ہے۔ ————— واضح رہے کہ عام حالات میں غذا سے حاصل کی ہوئی

شکر، گلوکوز کی شکل میں خون میں شامل ہو جاتی ہے اور بائقرا میں چند خصوصی خلیے Leucocytes ہوتے ہیں، جن سے انسولین نامی مادہ خارج ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے جو اس میں موجود گلوکوز کو ایندھن یا قوت کے طور پر جسم میں استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے اور خون میں گلوکوز کے تناسب کو حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتا، لیکن اگر بائقرا سے طبعی مقدار میں انسولین خارج نہ ہو، یا پیدا ہی نہ ہو تو پھر خون میں گلوکوز کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زائد شکر کلیتین (گردے - Kidney) کے راستے پیشاب میں خارج ہوتی ہے۔

اقسام | ذیابیطس

ذیابیطس سادہ	ذیابیطس شکاری
Diabetes Insipidus	Diabetes Mellitus

اسباب |

اس مرض کے یقینی سبب کی نشاندہی کے بارے میں اطباء مختلف الرائے ہیں، تاہم درج ذیل اسباب اس مرض کا سبب قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

۱. دماغ کے بطن چہارم کے قاعدے میں یا اس کے قریب کسی طرح کا نقص یا گزند۔
۲. بائقرا کا چھوٹا ہونا / انسولین کا حسب ضرورت پیدا نہ ہونا
۳. ضعف اعصاب
۴. انفعالات نفسانی / غم و غصہ وغیرہ
۵. غذا میں شکاری مادے / کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کی زیادتی۔
۶. فریبی / سن مڑا
۷. دماغی کام کی زیادتی
۸. کثرت سے نوشی

لے اس کو کثرت بول کہنا زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اس پر ذیابیطس کی تعریف بالکلیہ صادق نہیں آتی۔

علامات | صادق/شکری۔

اس کی عام علامات، پیشاب کی زیادتی، بار بار آنا، عام ضعف، تھوڑا کام کر کے تھک جانا، بھوک زیادہ لگنا، پیاس کی زیادتی، اور وزن کا کم ہونا ہیں۔

یہ مرض عام طور سے غیر محسوس طور پر شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ علامات بھی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتیں، پیاس معمول سے زیادہ لگتی ہے، نیز پیشاب بھی بار بار اور معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، رات میں پیشاب کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، لاغری اور ضعف و کمزوری کی شکایت ہوتی ہے۔ پیشاب میں شکر آتی ہے۔

مرض کے مکمل طور پر جاگزیں ہو جانے پر منہ خشک رہنے لگتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے پیشاب کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا وزن مخصوص ۱۰۳۵-۱۰۴۵ ہوتا ہے، اور شدید صورت میں ۱۰۶۰ سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، رات کی نسبت دن میں پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات غیر مختون لوگوں میں تحلیل کے دبانہ میں شکر کی فراش کی وجہ سے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ذائقہ شیریں ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریاں آتی ہیں، بعض اوقات شہوت کلیہ جیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، عام طور سے قبض کی شکایت ہوتی ہے، شیریں اخذیہ کی طرف رجعت ہوتی ہے، لاغری، ضعف، پست ہمتی اور سستی میں آئے دن اضافہ ہوتا جاتا ہے، صداغ اور دوران سر ہوتا ہے۔ مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے، جسم میں خشکی آ جاتی ہے، غارش ہوتی ہے، کھاتے وقت جسم سے بھوس سی جھڑتی ہے، برد اطراف ہوتا ہے، تمام اعضاء رُمبہ پر بھی خراب اثر پڑتا ہے۔ قوت مدافعت کم ہو جانے کی وجہ سے نقدیہ بہت ہوتا ہے، جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں، جن کا اندام مال بمشکل ہوتا ہے، خون میں شکر کی زیادتی کا وجہ سے زہریلے اثرات (نمودار ہونے لگتے ہیں، چنانچہ غنودگی، بے ہوشی، بطلان عمل کلیہ و فیوہ عوارض رونما ہونے لگتے ہیں۔ اس مرض میں آنکھوں پر خاص طور سے خراب اثر پڑتا ہے، بصارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، طبقہ شبکیہ کی شرائین پھٹ سکتی ہیں، اور شدید عارضہ کے طور پر موت واقع ہو سکتی ہے۔

کاذب / سادہ :-

پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیشاب بار بار اور طبعی مقدار سے ۵۔۔۔ گنا زیادہ خارج ہوتا ہے اس طرح ۲۴ گھنٹے میں کوئی ۸۔۔۔ لیٹر خارج ہو جاتا ہے، اس کا رنگ خفیف زردی مائل سفید ہوتا ہے، وزن مخصوص ۱.۰۱-۱.۰۵ تک ہو جاتا ہے، نیز اس میں شکر یا رطوبت بیضہ شامل نہیں ہوتی، منفع اور لاغری ہوتی ہے۔ جلد خشک ہو جاتی ہے، قبض کے باوجود ہاضمہ درست ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

بول سگری

- ۱۔ سمر لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔
- ۲۔ ضرب، دوائیں، جنون وغیرہ
- ۳۔ شکر کی مقدار میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔
- ۴۔ یہ عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔
- ۵۔ علامات مبہم ہوتی ہیں۔

۶۔ عوارض شاذ و نادر ہوتے ہیں

تسم بولی قوما

Uraemic Coma

- ۱۔ التهاب کلیہ کی روئیداد ملتی ہے۔
- ۲۔ پیشاب میں رطوبت بیضہ کا اخراج ہوتا ہے۔
- ۳۔ خفیف ہڈیان یا تشخ سے قوما ہوتا ہے۔

ذیابیطس شکر / صادق

- ۱۔ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ اسباب نامعلوم
- ۳۔ پیشاب میں شکر کی مقدار میں کسی قدر ہی اختلاف ہوتا ہے۔
- ۴۔ پیشاب بکثرت آتا ہے۔ شہوت کلیہ اور جوع البقر کی سی کیفیت ہوتی ہے۔
- ۵۔ عصبی اور جلدی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔
- ۶۔ سل ودق کثیر الوقوع ہے۔

ذیابیطس قوما

Diabetic Coma

- ۱۔ ذیابیطس کی روئیداد ملتی ہے۔
- ۲۔ پیشاب میں شکر خارج ہوتا ہے۔
- ۳۔ غنودگی ہوتی ہے اس کے بعد متعبد
- تخلیف کے بعد قوما ہوتا ہے۔

۴۔ پیشاب مقدار میں خارج ہوتا ہے بلکہ احتسابی کیفیت ہوتی ہے۔
۵۔ رینے کے پاس سے پیشاب کی مخصوص بو آتی ہے۔

۶۔ نبض قوی اور محکم چلتی ہے۔

۷۔ چہرہ موی نہیں ہوتا۔

نقص سکرالدم

Hypoglycemic Coma

۱۔ انسولین کی کمی اور نقص تغذیہ کی روئیداد ملتی ہے۔

۲۔ نہیں پائے جاتے

۳۔ یہ شکایت نہیں ہوتی۔

۴۔ بھوک لگتی ہے۔

۵۔ ازدواجی النظر اور ارتکاز کی شکایت ہوتی ہے۔

۶۔ تھکے کی شکایت نہیں ہوتی۔

۷۔ درد شکم کی روئیداد نہیں ملتی۔

۸۔ جلد رطب ہوتی ہے۔

۹۔ نہیں پائی جاتی۔

۱۰۔ تنفس اچھلا ہوتا ہے۔

۱۱۔ نبض صلب چلتی ہے۔

۱۲۔ سباتی کیفیت غیر معمولی ہوتی ہے۔

۱۳۔ عضلاتی پٹرکن ہوتی ہے۔

۴۔ پیشاب مقدار اور تعداد میں زیادہ، بلا ارادہ خارج ہوتا ہے۔

۵۔ تنفس اور پیشاب میں شکر کی بو ہوتی ہے۔

۶۔ نبض ضعیف اور صغیر چلتی ہے۔

۷۔ چہرہ موی نہیں ہوتا۔

زیابیطسی قوما

Diabetic Coma

۱۔ انسولین کی کمی یا غذائی عوارض پائے جاتے ہیں۔

۲۔ عوارض تغذیہ پائے جاتے ہیں

۳۔ پیاس اور کثرت بول کی شکایت ہوتی ہے۔

۴۔ فساد اشتہاء ہوتا ہے۔

۵۔ بصارت دھندلی ہو جاتی ہے۔

۶۔ عام طور سے تھکے کی شکایت ہوتی ہے۔

۷۔ درد شکم کی روئیداد ملتی ہے۔

۸۔ جلد خشک ہوتی ہے۔

۹۔ اخطاطی علامات پائی جاتی ہیں۔

۱۰۔ تنفس گہرا ہوتا ہے۔

۱۱۔ نبض سریع اور خصل چلتی ہے۔

۱۲۔ رینے کو عام طور سے بیدار کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۔ عضلاتی پٹرکن نہیں ہوتی۔

- | | |
|---|--|
| ۷۔ تشنج ہو سکتا ہے۔ | ۱۳۔ تشنج نہیں ہوتا۔ |
| ۱۵۔ نہیں ہوتا۔ | ۱۵۔ تنفس میں اسی ٹوٹی ہوتا ہے۔ |
| ۱۶۔ درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ | ۱۶۔ جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ |
| ۱۷۔ پیشاب میں شکر نہیں ہوتا اور پھر منی ہو بھی تو دونوں پس (+) ہوتی ہے۔ | ۱۷۔ پیشاب میں شکر فوراً پس (++++) ہوتی ہے۔ |
| ۱۸۔ غیر موجود۔ | ۱۸۔ بول غلوئی () |
| ۱۹۔ خون میں شکر کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ | ۱۹۔ خون میں شکر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ |
| ۲۰۔ غیر معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ | ۲۰۔ دریدی گلووز سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ |
| ۲۱۔ افادہ کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ | ۲۱۔ دواؤں سے افادہ کی رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ |

اصول علاج |

- ۱۔ اس کا مکمل اور شافی علاج ہنوز دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم کم شدید صورتوں میں محض غذائیں مناسب تبدیلی اور پابندی سے اس مرض کے عوارض سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔
- ۲۔ شدید صورتوں میں ادویاتی علاج ضروری ہے۔
- ۳۔ جسم کے لیے درکار حراروی غذائیں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین (طحیہ) اور شحم کے تناسب اور جسمانی وزن پر خصوصی توجہ دیں، بلکہ رلیض کے لیے غذاؤں کے استعمال اور احتیاط کا ایک چارٹ بنادیں، ان احتیاطی تدابیر سے معالج میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔
- ۴۔ انسولین کی ضروری مقدار بہم پہنچانے کی تدابیر کریں۔

علاج |

- ۱۔ ذیابیطس صادق / شکر میں درج ذیل نسخے استعمال کریں۔

نسخہ ۱۔

آب کدو، آب خیار، آب انار ترش ہم وزن — تمام کو ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

منز پنہ دانہ ۵، گرام ۲۴ گھنٹے گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر محفوظ کر لیں اور گلوہ خشک باریک پس کر ۶ گرام کھلا کر یہ خیس اندہ نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

بیضہ سرخ کو ۲۴ گھنٹہ سرکہ میں بھگو کر زردی اور سفیدی کھلائیں

نسخہ ۴۔

پوست فالسہ سیاہ، ہم کوب کر کے ۲۰ گھنٹے تک پانی میں بھگوئے رکھیں۔ اسے بعد مل چھان کر صبح کو نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

برگ جامن، خستہ جامن، مکوہ خشک، کشتہ قلعی، مرجان خاکستر، صدف دریائی سودہ، اصل السوس مقشر، کثیرا، صمغ عربی، مروارید ناسفتہ، نیلوفر، گاؤزبان، گل سرخ، گلنار فارسی، تخم خشماش سفید، گل ارمنی، ہر ایک ۲۵ گرام، ایفون ۲۰ گرام — ایفون سے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ایفون ملائیں اور ۶ خوراک بنائیں اور اخوراک صبح، شام ۱۰ د آب تازہ کے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۶۔

منز خستہ جامن ۶ گرام، ایفون اگر — دونوں کو باریک کر کے ۲ گرام صبح، شام

کھلائیں۔

نسخہ ۷۔

خستہ جامن، گھوئے خشک ہر ایک ۵۰ گرام، تخم خشماش، تخم خرفہ، تخم کاہو، گلنار فارسی، گل گاؤزبان، گل سرخ، اصل السوس مقشر ہر ایک ۱۲ گرام، مرجان خاکستر، صدف دریائی، کشتہ قلعی، ہر ایک ۶ گرام، ایفون خالص ۹ گرام — ایفون کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک کر کے ایفون ملائیں اور ۵، اگر صبح، شام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۸۔

برگ گڑ مار بوٹی ۳ گرام، زنجبیل ۵ گرام، مغز خستہ جامن، گرام — تمام دواؤں کا
سفوف بنا کر دو خوراک بنائیں اور صبح، شام کھلائیں۔
نسخہ ۱۔

مغز تخم ترمہندی، مغز تخم انبہ، مغز خستہ جامن، پوست انار ہم وزن — تمام
دواؤں کا سفوف بنا کر ۳ — ۶ گرام استعمال کرائیں۔
• ذیابیطس سادہ میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔
سعد کونی، کندر، مصطکی رومی، جفت بلوط، تخم خشتاش سفید، لباشیر، کشیز خشک،
گلنار فارسی، گل سرخ، گل ارمنی، تاج، ہر ایک ۳ گرام، — تمام دواؤں کو باریک کوٹ
چھان کر بنات سفید ہم وزن ملا کر، گرام ۴ ہزارہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۲۔

مرکی، کندر، آقا قیا، شیا ف ماشیا۔ ہر ایک، گرام، شب میانی، گرام، تخم خطی، تخم ریحا
راسن، پوست ہلیلہ کاہی ہر ایک ۳ گرام، بنات سفید ہم وزن جلد ادویہ — تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر، گرام ۴ ہزارہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
• انسولین کی کمی کو دہر کرنے کی تدابیر کریں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض غده در قیہ

Learn Unani By Abdul Waheed Salman

اس مرض میں غدہ درقیہ (Thyroid gland) میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔
 یہ مرض عورتوں میں بسن ایاس میں کثیر الوقوع ہے۔

درم غده درقیه (۱)
بعض سموم (۲)
تفج (۳)

کسٹھندی اور مکان کا احساس ہوتا ہے، معمولی ریاضت یا جسمانی نقل و حرکت سے اختلافی اور خفقاتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تنفس میں دشواری ہوتی ہے، آنسوؤں میں ورم ہو جاتا ہے، وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، اعصابی ضعف کی وجہ سے رعبہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور سے قے کی شکایت ہوتی ہے، مریض کی آنکھیں ابھری ہوئی اور گلابولہ ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شکم میں درد بھی ہو سکتا ہے۔

[illegible]

- _____ معضیات استعمال کرائیں۔
- _____ مفرحات قلب اور مقویات اعصاب _____ استعمال کرائیں۔
- _____ ہضم کو بہتر بنائیں۔

علاج |

_____ مڈرے طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

نشاستہ، مغز تخم کدو، کیترا، رب السوس، خشکاش، مغز تخم خیارین، تخم خرفہ، ہر ایک ۵۔۱۰ گرام، اجوائن خراسانی، گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ چکان کریم وزن بنات سفید میں سفوف بنائیں ۵۔۱۰ گرام ہمراہ آب خشکاش یا آب تازہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

بادیان، انیسون نیم کوب، ہر ایک ۵ گرام کو پانی میں جوش دے کر اس میں تخم خربوزہ، تخم خیارین، ہر ایک ۱۰ گرام پس کر بنات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
_____ مقوی کے طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

بنفشہ ۹ گرام، عیزا شہب ۵۔۱۰ گرام، کیترا ۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

کبریا، گلاؤ زبان اردارید، مغز تخم کشیز، بہن سرخ، پوست ترنج، گل سرخ، ابرشم مقرض ہم وزن _____ تمام دواؤں کو باریک کر کے شہد کے قوام میں معجون بنا کر ۱۰ گرام استعمال کرائیں۔ _____ مزید نسخجات ضعف قلب وغیرہ کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

_____ ہضم کی بہتری کے لیے امراض معدہ و امعاء میں درج نسخے استعمال

کرائیں۔

اوزیمائے مخاطی

MYXOEDEMA

اس مرض میں غدہ درقیہ (Thyroid Gland) کے انحرار (Secretion) میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کے سبب فاسد مادہ انسیجیٹا اور زیر جلد جمع ہو جاتا ہے۔

اسباب

(ا) اسباب معدہ (Predisposing Causes) :-

- ۱۔ درانت
- ۲۔ خلقی
- ۳۔ غوطہ کے مقامی المذوت علاقے
- ۴۔ خواتین
- ۵۔ ۳۵ سال کے بعد کی عمر
- ۶۔ افلاس و غربت
- ۷۔ اسباب واسلہ۔

(ب) اسباب واسلہ۔ (Pituitary Hypothalamic Disease) غدہ درقیہ کے بعض امراض

- ۱۔ غدہ درقیہ کے آپریشن کے بعد
- ۲۔ متافی غدہ درقیہ ادویہ کی زیادہ مقدار
- ۳۔ ۳-۴-۵ کے افزائیں کی
- ۴۔ (Para-Aminosalicylic Acid) Pas.
- ۵۔ بعض دوائیں مثلاً سلفونا مائیڈ،

علامات

مرضی علامات اس وقت تک غیر محسوس ہوتی ہیں تا وقتیکہ مرض خوب نمایاں نہ ہو جائے، اس کے بعد علامات واضح ہو جاتی ہیں، ابتداء میں وزن بڑھ جاتا ہے، چہرہ جذبات سے عاری اور شل اتھرازی () سے مشابہ ہوتا ہے، ناک اور ہونٹ متورم ہوتے ہیں۔ چہرے اور پیٹوں پر تپج ہوتا ہے، رخسارے پر مخصوص قسم کی جھریاں ہوتی ہیں، رنگ نمایاں طور سے زرد ہوتا ہے، بعض اوقات کسی قدر تیز سرخ چمکتی بھی ہوتی ہے، ہونٹوں کا رنگ سرخ یا کبودی ہوتا ہے، جسم کی جلد عام طور پر دبیز ہوتی ہے، پیروں میں اوذیریائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں شدید درد ہوتا ہے، پسینہ کم آتا ہے یا بالکل نہیں آتا، جلد خشک اور پھلکے دار ہو جاتی ہے، بال بھرنے لگتے ہیں، جس سے سر پر ایک تیلی سی پوشش رہ جاتی ہے، بعض اوقات ضعف، اور ابرو، نیز پلکوں کا گنچ پیدا ہو جاتا ہے، ناخن ٹھٹھ کر بھر بھر سے ہو جاتے ہیں، مخاٹی افسیہ میں بھی یہی تغیرات نمایاں ہوتے ہیں، زبان بڑی اور موٹی ہو جاتی ہے، دانت بوسیدہ یا ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

مریض کا عصبی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، وہ سست اور بے پروا نظر آتا ہے، کستی کے ساتھ سوچ سوچ کر بولتا ہے، گویا کہ اس کی موٹی زبان نطق میں میکانی طور پر مزاحم ہوتی ہے، لیکن گفتگو کے ساتھ آنکھوں کی حرکت اور اظہار کے عضلات کی حرکت کی کستی عصبی عضل آلہ کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے، جبل الصوت کے متورم ہو جانے سے آواز بھرائی ہوتی ہے۔

حافظ کمزور ہو جاتا ہے، مریض اکثر چڑچڑا، سنکی، بایکس اور خواب ناک ہو جاتا ہے۔ توہم، خبط اور تشنج بھی ہو سکتا ہے، درد سراور مفعلی درد بھی ہوتا ہے، کمزوری کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔

مرض کے ارتقائی مرحلے میں وجع القلب، عظم القلب اور بطور قلب Brady Cardia کی شکایت ہوتی ہے، تصلب الشریان ہوتا ہے، نبض ضعیف یا بلی ہوتی ہے۔ سقوط اشتہار، ضعف اشتہار، قبض اور درم جگر ہوتا ہے، پیشاب رقیق ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں رطوبت بیضیہ بھی ہوتی ہے۔ شکر کی برداشت زیادہ ہو جاتی

ہے، چنانچہ اس کی زیادہ مقدار لینے سے بھی پیشاب میں شکر ظاہر نہیں ہوتی، عورتوں میں کثرت حیض اور عدم حیض کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے پر غدہ درقیہ بالعموم چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔

تفرضی علامات

غوط جھوٹا

Exophthalmic Goitre

- ۱۔ غدہ درقیہ بڑا ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوران خون تیز ہوتا ہے۔
- ۳۔ جلد رقیق (تپلی) گرم اور غیر معمولی پسینہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ طبیعت ضعیف ہوتی ہے۔
- ۵۔ غدہ درقیہ کا استعمال زیادہ مفید نہیں ہوتا۔

اذیمائے مخاطی

Myxoedema

- ۱۔ غدہ درقیہ چھوٹا ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوران خون سست ہوتا ہے۔
- ۳۔ جلد دبیز، سرد اور خشک ہوتی ہے
- ۴۔ طبیعت معطل ہوتی ہے۔
- ۵۔ غدہ درقیہ کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے

اصول علاج

- _____ قبض نہ ہونے دیں۔
- _____ مقوی قلب دوائیں کھلائیں۔
- _____ مدرات استعمال کرائیں۔

علاج

_____ مدرات کے طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، انیسون نیم کوب، ہر ایک، گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان میں اس کے بعد اس پانی میں تخم خیارین، تخم عربوزہ، ہر ایک ۱۰ گرام پس چھان کرنات سفید سے شیریں کر کے فوٹل کرائیں۔

نسخہ ۲۔

نشاستہ، مغز تخم کدو، کیترا، رب السوس، خشکاش، مغز تخم خیاریں، تخم خرفہ، ہر ایک، اگر اگرام، اجوائن خراسانی، گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ہسوزن نبات سفید ملا کر سفوف بنائیں۔ اور ۵۰ گرام ہر راہ آب خشکاش استعمال کرائیں۔
 ————— مقویات قلب کے طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بنفشہ ۹ گرام، منہ ۵ روہ گرام، کیترا ۲ گرام ————— تمام دواؤں کو باریک میں کر
 صبح، دوپہر، شام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

کاؤزبان، کھربا، بید، مروارید ناسفتہ، ابریشم مقرض، شب میانی، ہر ایک ۵۰ گرام،
 گل ارمنی، کشیز خشک بریاں، ہر ایک ۵۰ گرام، تخم فرنجشک، سعد کوفی، لباشیر، کافور، ہر ایک
 اگر اگرام، ————— تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے نبات سفید ۵۰ گرام میں ملا کر دو بارہ
 سفوف تیار کریں۔ اور ۳ گرام صبح، شام کھلائیں۔
 ————— ضعف قلب کے ذیل میں بیان کردہ دوا میں استعمال کرائیں

Learn Unani By Abdul Qadir Saman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض کلیہ و حالب

Learn Unani By Abdul Wahid Salman

کلیہ اور حالب کی مختصر تشریح اور منافع

کلیہ تشریح

گروے کلیہ ۲ عدد ہوتے ہیں، یہ دونوں کیلے پچھلی دیوار بطن کے سامنے، باریطون کے پیچھے دائیں، بائیں واقع ہیں، دایاں کلیہ بائیں کلیہ سے کچھ نیچے واقع ہے، کیونکہ دائیں طرف کبد جیسا بڑا غدہ ہے، کلیہ کی لمبائی ۱۰-۱۲ سینٹی میٹر، چوڑائی ۴-۶ سینٹی میٹر اور دبازت ۳-۴ سینٹی میٹر اور وزن ہوتا ہے، یہ کلیہ ایک لیفی غلاف

(Fibrous Capsule) میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں شحم بھی پایا جاتا ہے،

اس کی اگلی اور پچھلی دو سطحیں ہوتی ہیں اور اندرونی و بیرونی دو کنارے ہوتے ہیں۔

دائیں اور بائیں کلیتین کے اگلے مجاوات مختلف اور پچھلے مجاوات یکساں ہوتے

ہیں، نیز ان کے اوپر غدہ فوق الکلیہ (Supra Renal Gland) پایا جاتا

ہے، اس میں ناف الکلیہ (Hilus of Kidney) ہوتا ہے، یہ اندرونی

کنارے کا وسط والا حصہ ہے، اور سامنے سے پیچھے علی الترتیب دریدہ الکلیہ

(Renal Vein) اور شریان الکلیہ (Renal Artery) داخل

ہوتی ہے اسی طرح حوض حالب (Pelvis of Ureter) بھی اسی سے

بھرتا ہے، اعصاب شریکیہ، ضغیرہ ثلاثی کی شاخوں کے ذریعہ اور اعصاب مقابل شریکیہ،

عصب راجح سے آتے ہیں، اہم شریان کلیوی کی شاخیں ناف الکلیہ میں داخل ہوتی ہیں۔

منافع

اس عضو میں خون کا تصفیہ ہوتا ہے، یعنی جسم کے خون میں شامل تمام مائی فضلات یہاں صاف ہو کر جلیدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دموی حنہ کلیہ کی غذا بنتا ہے اور مائی اجزاء حالبین کی طرف مندفع ہو جاتے ہیں۔

حالبین

یہ دو عضلی نجاری ہیں، جو کلیتین سے شروع ہو کر ناف الکلیہ (Hilus of Kidney) سے مشانہ تک جاتے ہیں، اس کی لمبائی ۲۵ سینٹی میٹر ہوتی ہے، اس کا بالائی سرا پھیلا ہوا، حوض حالب () کہلاتا ہے نیز بالائی نعت حصہ کیو اربطن مندم پر اور باقی حصہ عانہ (Pelvic) میں رہتا ہے، اس کی دموی اربطی پیرورش شرائین اور اوردہ Gonadal and Inferior Vesical Arteries خبیثہ الرحم ویشانی اسفل۔ اور اعصاب مستقلہ (Autonomic Nerves) اور اعصاب حسیہ سے ہوتی ہے۔

ملاحظہ رہے کہ حالبین میں تین طبقے ہوتے ہیں بیرونی طبقہ ریشہ دار، درمیانی طبقہ مٹلی اور اندرونی طبقہ مخاطی ہوتا ہے۔


منافع

اس کے راستہ میں کلیہ سے بچھنے ہوئے مائی اجزاء مشانہ میں آکر پکتے ہیں۔

سوز مزاج کلیہ

اس مرض میں حرارت یا برودت کے غلبہ کی وجہ سے کلیتین کا مزاج خراب ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں ان کے طبعی افعال متاثر ہو جاتے ہیں۔

اقسام



اسباب

- (۱) سور مزاج حار / بارد سازج
(۲) غلبہ اخلاط اربعہ / سور مزاج حار / بارد مادی

علامات

سور مزاج سازج کی صورت میں داخلی یا خارجی طور پر حرارت یا برودت کی روئیداد ہوتی ہے، سور مزاج حار سازج میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیشاب سُرخ یا زرد، سوزش کے ساتھ آتا ہے۔ مقام کلیہ پر گرمی محسوس ہوتی ہے، ہزار اور پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، باہ میں بھی اضافہ محسوس ہوتا ہے۔

سور مزاج بارد سازج میں مقام کلیہ سرد ہوتا ہے، پیشاب سفید رنگ کا آتا ہے، پیاس میں شدت نہیں ہوتی۔ پشت ٹخنہ اور فیصاف ہوتی ہے نیز ضعف باہ ہوتا ہے، سور مزاج حار دموی کی صورت میں مقام کلیہ پر سرخی نمایاں ہوتی ہے، کلیہ میں درد اور گرانی محسوس ہوتی ہے، اور غلبہ خون کی دوسری مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ سور مزاج حار صفراوی میں غلبہ صفرا کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔ سور مزاج بارد بلغمی میں مقام کلیہ پر ثقل محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ غلبہ بلغم کی دوسری مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

— سور مزاج بارد سوداوی میں امراض طحال بالخصوص ضعف طحال کی علامات کے ساتھ ساتھ غلبہ سودا کی اپنی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج |

- سور مزاج حار سا ذج میں سرزدندہ اہر اختیار کریں۔
- سور مزاج دموں میں باسلیق کی فصد کھولیں اور تعدیل مزاج کریں۔
- سور مزاج صفاوی میں تنقیہ و تبرید کا اصول اختیار کریں۔
- سور مزاج بلغمی سوداوی میں تنقیہ اور تعدیل مزاج کریں۔ سور مزاج سوداوی میں ضعف طحال کی رعایت بھی ضروری ہے۔

علاج |

- سور مزاج حار سا ذج میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

دوغ ترش، آب انار شیریں، آب انار ترش، ہم وزن کونبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

شیرہ خرفہ، شیرہ آب زرشک، شیرہ تخم خمش، لعاب بیدانہ، ہر ایک ۳ گرام، شربت سندل ۴ اعلیٰ لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

- سور مزاج بارد سا ذج میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

منز پستہ، نارجل، چلفوزہ، بادام، فندق، خود بریاں، کشمش، لکھنڈ مصلیٰ کے ساتھ سب دستور استعمال کرائیں۔

- سور مزاج حار مادی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بورہ سندل، گلنار، گرد سماق ہر ایک ۱۰ گرام، طباشیر، تخم حامض، کشنیز، گل سرخ،

گل ارمنی، ہر ایک ۳۲ گرام، کافور ۵۰۰ ملی گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شیرہ
تخم خرفہ میں ملا کر اقراص بنائیں اور ۵۰۰ گرام براہ شربت انار ۲۴ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

مغز تخم خیار، مغز تخم خیار زہ، مغز تخم کدو، ہر ایک ۳۵ گرام، تخم خبازی، تخم خطمی، ہر ایک
۵۰۰ گرام، مغز بادام شیریں مقشر ۳۵۰ گرام، صمغ آلو، کثیرا ہر ایک، گرام، رب السوس
۱۰۰ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر محفوظ کر لیں اور ۵۰۰ گرام براہ شیرہ
تخم کافور ۲۴ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

• سور مزاج بارد مادی میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۲۔

زردی بیضہ مرغ نیمبرشت کور و فن گاؤں میں ملائیں اور تخم جرجیر اور نمک ہر ایک
۱۰۰ ملی گرام ملا کر بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز پیستہ، مغز بادام، مغز حبۃ المحضرا، مغز جلیغوزہ، مغز حب الزلم، مغز
حب البطم، مغز فندق، مغز اخروٹ، مایہ رو بیاں، شقائق، خولجان، تودری سرخ،
تودری زرد، بہمن سرخ، بہمن سفید، کچھ مقشر، زنجبیل، دارچینی، ہر ایک ۵۰۰ گرام، کباب چینی
تخم کدو، حب انقلقل، قرنفل، سعد کوفی، زرنیاد، درونج عقری، تخم بلبلون، تخم اسپست،
تخم شلیم، تخم پیاز، لسان العافیہ، ہر ایک ۵۰۰ گرام، دارقلقل، بسباسہ، جوز بوا، ہر ایک
۵۰۰ گرام، خصیۃ الثعلب، نار جیل تازہ، مغز سرکھشک، خشکاش ہر ایک ۳۵۰ گرام، نضاع خشک،
قصیب گاؤ، بوزیدان، سورنجان ہر ایک ۴۰۰ گرام، زعفران، مایہ شہرہ اوائی، مصطکی، ہر ایک
۱۳۰۰ گرام، عود خام ۹۰ گرام، درق طلار ۳۰ عدد، درق نقرہ ۵۰ عدد، عنب الثعلب،
۵۰۰ گرام، مشک خالص، ۱۰۰ گرام، شہد خالص تین گنا — تمام دواؤں سے
حب دستور معجون بنائیں۔

• خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضماد ۱۔

اسپیغول، آرد جو، کشیز خشک ہم وزن — تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر


روغن پستہ، روغن نارجیل، روغن بادام، روغن جندبیدستر،۔۔۔۔۔ تمام
دواؤں کو ملا کر مقام کلیہ پر مالش کریں۔۔۔۔۔ قوی الاثر بنانے کے لیے کافور کا اضافہ
کر سکتے ہیں۔
نسخہ مالش ۱۔

ضعف کلیہ

اس مرض میں کلیہ کے طبعی افعال میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اقسام

ضعف کلیہ



اسباب ۱

- | | |
|---------------|-----|
| سور مزاج کلیہ | (۱) |
| بزال کلیہ | (۲) |
| کثرت جماع | (۳) |
| کثرت بول | (۴) |
| التهاب کلیہ | (۵) |

- (vi) ضربہ و سقوط کلیہ
 (vii) حصاة الکلیہ
 (viii) حمالی (بار برداری)
 (ix) بکثرت پیدل سفر کرنا
 (x) گھوڑ سواری۔

علامات

مقام کلیہ پر مستقل لیکن خفیف درد ہوتا رہتا ہے، جس میں زمین کی طرف جھکنے اور کروٹ لینے کی صورت میں نسبتاً اضافہ ہو جاتا ہے، پیشاب بار بار قلیل مقدار میں، غسالی آتا ہے، قوت باہ ضعیف ہو جاتی ہے، بے صارت بھی متاثر ہوتی ہے، سر میں ہر وقت درد محسوس ہوتا ہے، مزمن صورت میں اطراف اور جسم پر بھر بھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
 ضعف عضلات کلیہ اور مجاری کے اتساع کی صورت میں «در دہشت خفیف ہوتا ہے، ضعف اشتہاء ہوتا ہے، غذا کے ہضم ہونے اور عروق تک پہنچنے سے قبل ہی عام طور سے پیشاب مائل ہوتا ہے، اور ہضم کبدی اور غذا کے عروق میں پہنچنے کے بعد پیشاب کا رنگ غسالی ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ رہے کہ بول غسالی بسا اوقات بحران کا نتیجہ ہوتا ہے، چنانچہ بحران کی صورت میں بول غسالی کے بعد راحت اور سکون کا احساس ہوتا ہے، اس کے برخلاف ضعف کلیہ میں لاغری اور ضعف کا احساس ہوتا ہے۔

پیشاب میں درد اور رسوب وغیرہ کا میز نہ ہونا عدم نفع مادہ اور مجاری بول میں فتور کی علامت ہے۔

اصول علاج

- ۔۔۔۔۔ تعدیل مزاج کریں
- ۔۔۔۔۔ حسب ضرورت مادہ کا تنقیہ کریں، چنانچہ غلبہ خلط دموی میں باسلیق کی فصد کھولیں اور غلبہ خلط بلغمی میں تفتے کے ذریعہ تنقیہ مواد کریں۔
- ۔۔۔۔۔ سبب مرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے مضیقات، مقویات استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ ضداد و فیبرہ کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج

۔۔۔۔۔ صنف کلیہ کے ساتھ حرارت ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

دم الاخوین، گنار، گل ارمنی، صمغ عربی، معصارة لحية التيس ہر ایک ۳ گرام۔
تمام دواؤں کو باریک کر کے شیرہ بارتنگ ۲۴ ملی لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
۔۔۔۔۔ تقویت کلیہ کے لیے درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

مغز چلفوزہ، مغز پستہ، مغز حب السنہ، کنبہ مقشر، مغز فندق، مغز حب العنقل،
مغز جنتہ الخضر، تخم خشاش، خونجان، دارچینی، موجرس، ہر ایک ۵ رس گرام، مغز نارجیل،
بہمن سرخ، بہمن سفید، تودری سرخ، تودری زرد، دانہ ہیل خورد، دانہ ہیل کلاں ہر ایک
۵ رس گرام، شقائق، تخم کرفس، لسان العصافیر، درونج، پودینہ، مصطکی رومی، طباشیر،
تال مکھانا، کبابہ، بسباسہ، زنجبیل، دار فلفل، پوست اترج، قرنفل، خشک مربی، براہ
چوب، زرد نیاد، تخم ترنج، تخم بلیون، تخم شلم، آب جریہ، ہر ایک ۲ گرام، سنبل الطیب،
عنبر اشہب، زعفران ہر ایک ۱ گرام، چوب چین ۵ رس گرام، کشمش ۵ رس گرام، خرطے فربہ
۱۲ گرام، مویز منق ۱۱ عدد، قند، شہد ہر ایک ۲۵۰ ملی لیٹر، ترنجبین ۵ رس گرام۔
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر، قوام بنا کر حسب دستور معجون تیار کریں اور ۲۴ گرام استعمال
کرائیں۔

نسخہ ۳۔

مغز بادام، مغز گردگان، مغز جنتہ الخضر، مغز حب الزلم، مغز پستہ، مغز نارجیل،
مغز فندق، مغز حب العنقل، مغز چلفوزہ، تخم خشاش، تخم پیاز، تخم شلم، تخم اسپتہ،
تخم بلیون، خونجان، شقائق، خرفہ، کبابہ، دارچینی، بہمن سفید، بہمن سرخ، زنجبیل،
دار فلفل، کنبہ مقشر، تودری سرخ، تودری زرد، ہوزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
شہد خالص تین گنا کے ساتھ حسب دستور معجون بنائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم نشاۃ، حب الغلغل، تودری سرخ، تودری سفید، حب السنہ، بوزیدان،
جوز، جوز ہندی، مغز بادام مقشر، مغز فندق، زعفران، آرد برنج، آرد باقلا، آرد نخود،
ہم وزن — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن زرد / روغن بادام میں چرب کریں کشتہ
خالص دو گنا میں ملا کر معجون بنائیں۔ اس کے بعد مغزیات صلاہ کر کے اضافہ کریں۔ اور زعفران
۲ گرام، مشک خالص ۱ گرام، عرق گلاب میں حل کر کے مزید ملائیں اور ۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

طباشیر، گل ارمنی، صمغ عربی، گل مختوم، گل قبرسی، گل سرخ، گلنار، مندل سفید،
اقاقیا، بید سودہ، رب السوس، شادنج عدس مغسول، تخم خرفہ مقشر، خار شک پروردہ،
ست گلو، ست سلاجیت، قلعی کشتہ، مروارید ناسفتہ، ہر ایک ۲ گرام، مغز تخم خیارین، تخم
نشاۃ، ہر ایک ۲ گرام، مغز تخم کدو، نشاۃ، مغز بادام، مغز فندق، مغز چغوزہ، موچرس
۱ ایک ۲ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ اور ۳ — گرام ہر
آب تازہ استعمال کرائیں۔

— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د۱۔

مندل سفید، گل سرخ، اقا قیا، رامک، حب الآس، آب برگ مورد — تمام
دواؤں کو آب برگ مورد میں پیس کر کر پڑھا کریں۔

نسخہ ضما د۲۔

گل سرخ، طباشیر، برگ سماق، مندل سفید، عصارہ لحيۃ التیس، گل ارمنی،
گل مختوم، برگ مورد ہم وزن — کو آب برگ مورد میں پیس کر مقام کلیہ پر ضا کریں۔

نسخہ آبرن ۱۔

بابونہ، اکلیل الملک، خار شک خوردہ، پانی میں جوش دے کر سرکہ ملا کر آبرن کرائیں۔
نسخہ آبرن ۲۔

لحيۃ التیس، خرنوب، جوز السرد، پوست انار، گل سرخ، بیج عویج کے جوشانہ
میں آبرن کرائیں۔

ریج الکلیہ

اس مرض میں کلیہ کے ارد گرد اور کرگاہ میں کھینچاؤ پیدا کرنے والا درد ہوتا ہے اور مریض مضطرب و بے چین ہو جاتا ہے۔

اسباب |

۱. ریح غلیظہ
۲. اخلاط غلیظہ
۳. غلیظ اور نفخاغ افذیہ کا استعمال

علامات |

کلیہ کے قریبی حصوں اور کرگاہ میں تشنجی درد ہوتا ہے جس کے ساتھ گرانی اور حصۃ کلیہ وغیرہ کی مخصوص علامات قلعی منقود ہوتی ہیں۔ درد میں کسی قدر انتقالی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ بھوک کی حالت میں عوارض میں تخیف اور شکم سیری نیز سوراہنم کی صورت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اصول علاج |

- ۱۔ مدرات اور کاسرات استعمال کرائیں۔
- ۲۔ ریح البواسیر کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج |

- ۱۔ حب القرطم ۱۱ گرام، کرنس ۲ گرام، شکر سرخ ۲۲ گرام، — قسم
- دواؤں کو کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور گرم گرم نوش کرائیں۔

• پوسٹ بیج بادیان، بیج کاسنی، بیج کبر، بیج کرنس، ہر ایک ۱۰ گرام، سداب
انیسون، فوہ، تخم کرنس، ہر ایک ۱۰ گرام، انجیر زرد ۵ دانہ، مونیز منقہ ۲۲ گرام، — تمام ملا کر
کوپانی میں جوش دے کر مل چھان کر شہد خالص ۳۶ ملی لیٹر، روغن بید انجیر ۱۰ ملی لیٹر اضافہ
کر کے نوش کرائیں۔

_____ خارجی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسوز مضامین۔

زردی بیضہ اعداد، زرد چوب مسوق ۳ گرام، کنویں کا پانی ۱۲ ملی لیٹر، کسی قلعہ دار برتن میں آگ پر رکھیں اور لوہے کے دستے سے خوب ملیں، جب عکڑھا ہو جائے تو مقام ماؤف پر خندا کریں۔ اور اوپر سے برگ پان باندھیں۔

نسختہ مضامین :-

لوہان پانی میں پیس کر مقام درد پر لپیپ کریں۔

نسخہ مضامین

زیرہ، شبیت، تخم سداب، بابونہ ————— تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر
مقام کلیہ پر خاد کریں۔

نسخہ نمبر :-

ہمک، سبوس گندم، گاؤرس سے تکمید کریں۔

نویز تکمیل:-

آرد ماش میں غلوڑا سا انگوزہ، زنجبیل، تخم شبت میں کر، پانی میں ملا کر گوندھیں اور ایک طرف سے بچتے اور دوسری طرف سے خام روٹی تیار کریں، خام جاببہ دھن با بوند یار دھن گل چوڑ کر نیم گرم متاثرہ مقام پر باندھیں۔

نسخہ آئینہ

گل پلاس، گل مصعف، برگ سداب، تخم ثبث ہم وزن — تمام دواؤں کو پانی میں جوئی دے کر آہزن کرائیں۔

نسوی آبرن بر

بروں جنگ، بروں کرنہ، بروں شہت ہر ایک ۵۰ گرام، تخم کتان، بادیاں، خاریک


خورد، حب القلت، بابون، ہر ایک ۳۹ گرام — تمام دواؤں کو پانی ۳ لیٹر میں جوش دے کر
۲۰ لیٹر گرم پانی میں ملا کر آبزین کرائیں۔
منفوخ آبزین ۱۔

گل بابون، اکیلل الملک، تخم شبت، سنبل الطیب، سعد کوفی ہم وزن — تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر حسب دستور آبزین کرائیں۔

التهاب کلیه

NEPHRITIS

اس مرض میں التهاب / درم کی وجہ سے کلیہ کے افعال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ
مقام کلیہ پر درد اگرائی، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ، بردا طراف، قشریہ مع مٹی، غنودگی
اور نڈیان وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔



اسباب |

غلبہ اخلاط ۱۔

۱۔ ان کا تذکرہ طبعہ سے کیا جائے گا۔

۱. غلبہ خون

۲. غلبہ سفراء

۳. غلبہ سوداء

فساد اخلاط

۱. خون کی کثیت اور کیفیت میں فرق آنا۔

۲. عفونت خون۔

امراض کلیہ

۱. حماة کلیہ

۲. ضربہ دستقلہ کلیہ

۳. ضعف قوت دافعہ کلیہ

۴. حدت مزاج کلیہ

۵. کلیہ پر عمل برای

امراض مشانہ

۱. اختباس بول

۲. التهاب مشانہ

سمیات

۱. زہریلی ہواؤں کے اثرات

۲. روغن تارپین۔

۳. کارباک ایسڈ

۴. تیلنی کھی کا لامنا

۵. کثرت سے نوشی

امراض جلد

۱. اکڑیما

۲. حرق النار

حاد/متعدی امراض

- جدری ۱،
 حصہ ۱،
 خناق و بانی ۱،
 ہیضہ ۱،
 آنشک ۱،
 حمی معویہ ۱،
 حمی اجامیہ ۱،
 سرسام ۱،
 سرخ بخار ۱،
 زرد بخار ۱،
 جراثیمی تعدیہ ۱۔

Bacillus Haemolytic

خون پاش ہنقہ سنجیہ ۱،

Strepto Coccus ۱،
 متفرقات ۱۔

- سردی لگنا ۱،
 اشتلاہ جسمانی ۱،
 وزنی چیزوں کا کرپر باندھنا ۱،
 مال برداری ۱،
 کسی دوسرے مقام سے مادہ مرض کا منتقل ہونا ۱،
 مجاور اعضاء کا مرض ۱،
 معدنی و برقی شعاعوں کے اثرات ۱،
 حمل ۱،
 نفاس ۱،
 نفرس ۱،
 میث و عشرت کی زندگی ۱،

۱۰. فاقہ کشی
۱۱. التهاب غدہ قدامیہ

علامات

حادثہ۔

کلیہ اور اعشار میں سوزش ہوتی ہے، سوزش کی وجہ سے بعض اوقات مریض کے جسم پر کپڑا ڈالنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ماؤن کلیہ کے مقام پر ثقل کے ساتھ خفیف درد ہوتا ہے، دبانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مثلی اور تھے کی شکایت ہوتی ہے، لہرہ کے ساتھ بخار آتا ہے، پیاس اور شدید بے قراری ہوتی ہے، بیش تنابی (Hypertension) کی وجہ سے درد سہ ہوتا ہے، قلب کا بایاں اذن بڑھ جاتا ہے، اور قلب کی آواز دوسری سنائی دیتی ہے، بیش تنابی کی وجہ سے مینائی میں غلغلہ، ٹیج اور قوما ہو سکتا ہے، ابتداء میں چہرے پر بھر بھراہٹ اور پوٹوں میں، تیج ہوتا ہے، دونوں کلیہ کے التهاب کی صورت میں آنکھیں تیج کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں اور استسقاء ہو کر سارا جسم تیج ہو جاتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا، بدبودار، زردی، سرخی یا سیاہی مائل خارج ہوتا ہے، جس میں رطوبت بیضہ، رسوب، اور قشور وغیرہ موجود ہوتے ہیں، رات میں پیشاب کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، عام طور سے کھانسی، ذات الحسب اور ذات الریہ وغیرہ بھی پایا جاتا ہے، — شدت مرض میں احتباس بول ہو جاتا ہے اور اعشار میں پانی بھر جاتا ہے، برد اظراف ہوتا ہے۔ شفا یابی کی صورت میں ادرار بول ہوتا ہے، خون میں سوڈیم اور یوریا کا تناسب اعتدال پر آ جاتا ہے، عوارض میں شدت باقی نہیں رہتی، رفتہ رفتہ استسقاء اور تیج کی علامات غائب ہو جاتی ہیں، اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

نحت الحادہ۔

رطوبت زلالی (رطوبت بیضہ) خارج ہوتی ہے، جس میں قشور کلیہ شامل ہوتے ہیں جو عادمورت کے برخلاف غیر واضح ہو جاتے ہیں، اور خون کی موجودگی، خود بینی امتحان سے ہی معلوم کی جاسکتی ہیں، بعض اوقات پوٹوں پر تیج ہوتا ہے اور کبھی تیج مفقود ہوتا ہے، دیگر عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔

مزمن :-

علامات آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہیں، بعض اوقات برسوں تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ابتداء میں بعض بظاہر صحت مند معلوم ہوتا ہے، صرف سرعت تنفس کی علامت ملتی ہے، بعض اوقات بے رونقی، ضعف، بھم، بیزردگی اور خستہ جلد کی علامات ملتی ہیں، نعلی اعضاء میں درد ہوتا ہے، کھانسی، ارماف اور تے الدم ہو سکتی ہے۔ عوارض کے شدید ہونے کی صورت میں ہزال نمایاں ہوتا ہے، تاہم آماس کی وجہ سے بسا اوقات پتہ نہیں چلتا۔ چہرے پر بھر بھراہٹ ہوتی ہے اولاً بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، رطوبت بیضہ کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں رطوبت بیضہ زیادہ شامل ہو جاتی ہے، توت باصرہ میں فرق پڑ جاتا ہے، سور القنیہ، بیش تناب، اور تشنج ہو جاتا ہے، بے خوابی اور درد سر کی شکایت ہوتی ہے، شریانی ساخت میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ احتباس ابول کے نتیجہ میں لسم بول اور سبات ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔

صلب :-

انتہاب صلب طبعی کی صورت میں پشت میں گرانی محسوس ہوتی ہے، کلیہ نیچے کی طرف کھینچا ہوا محسوس ہوتا ہے، چہرہ، آنکھوں اور سارے جسم میں بھر بھراہٹ ہوتی ہے پیشاب کی ضرورت بار بار نہیں محسوس ہوتی، اس کا قوام غلیظ ہوتا ہے، گرم تدابیر سے راحت ملتی ہے، نین بلی، سترخی اور سنی رقیق و سرد ہوتی ہے۔

بلغم کی صورت میں پشت پر گرانی نسبتاً خفیف ہوتی ہے، مقام طحال پر مہجن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے، پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، پشت خمیدہ ہو جاتی ہے، سر میں اور ران میں افراد بے حس ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بیشتر زیریں اعضاء کے لاغری اور ناطاتی ہو جاتی ہے، مایغریا اور دوسری سوداوی علامات بھی رونما ہو سکتی ہیں۔

تقریبی علامات

انتہاب کلیہ مزمن	انتہاب کلیہ حاد
۱۔ انتہاب کلیہ حاد کی سرگزشت ملتی ہے۔	۱۔ شدید برودت یا حاد، متعدی مرض کی سرگزشت ملتی ہے۔
۲۔ پیشاب کی مقدار طبعی یا زیادہ ہوتی ہے۔	۲۔ پیشاب کی مقدار کم ہوتی ہے۔

۲۔ پیشاب کے وزن مخصوص میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

۳۔ بالعموم دھوی نہیں ہوتا۔

۵۔ مرض کا زنجار سست ہوتا ہے۔

۶۔ علامات ابتداء سے ہی فیروا خ یا

خفیف ہوتی ہیں۔

۷۔ حرارت طبعی ہوتی ہے۔

۸۔ رطوبت بیضہ نسبتاً کم ہوتی ہے۔

احتقان کلیوی

Congestion of Kidneys .

۱۔ وریڈی دوران خونی میں رکاوٹ کی روئیداد ملتی ہے۔

۲۔ حواریں میں شدت نہیں ہوتی۔

۳۔ پیشاب کا وزن مخصوص طبعی ہوتا ہے۔

۴۔ پیشاب میں رطوبت بیضہ قلیل مقدار میں خارج ہوتی ہے۔

۵۔ پیشاب میں قشور نہیں ہوتے۔

۶۔ پیشاب میں دھوی اجزاء نہیں ہوتے۔

۷۔ حرارت طبعی ہوتی ہے۔

۸۔ استسقاء نہیں ہوتا۔

۱۔ پیشاب کا وزن مخصوص زیادہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ پیشاب دھوی ہوتا ہے۔

۵۔ مرض کی رفتار تیز ہوتی ہے۔

۶۔ علامات ابتداء سے شدید

ہوتی ہیں۔

۷۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے۔

۸۔ پیشاب میں رطوبت بیضہ زیادہ

ہوتی ہے۔

التهاب کلیہ حاد

Acute Nephritis

۱۔ بردت یا کسی حاد، شدید مرض کی روئیداد ملتی ہے۔

۲۔ شدید درد سراسرے و فیرہ

۳۔ پیشاب کے وزن مخصوص میں اضافہ

ہو جاتا ہے،

۴۔ رطوبت بیضہ زیادہ خارج ہوتی

ہے۔

۵۔ پیشاب میں قشور موجود ہوتے ہیں

۶۔ پیشاب دھوی ہوتا ہے۔

۷۔ حرارت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

۸۔ استسقاء بہت نمایاں ہوتا ہے۔

اصول علاج

۱۔ مددات استعمال کرائیں۔

- _____ مکیات و طبیعات استعمال کرائیں۔
- _____ باسلیق / صافن کی فصد کھولیں۔ / مقام کلیہ پر سیکیاں کھنچوائیں۔
- _____ فلبہ لغم کی صورت منفع اور مسهل کا اصول علاج اختیار کریں۔
- _____ صلب ضرورت دنگ اور نگید کریں۔
- _____ حورض کی تخفیف کی نذر پیر کریں۔
- _____ جرثومہ کی صورت میں مانع تعفن اور مانع جراثیم ادویہ کا استعمال کرائیں۔
- _____ اسہال قوی، غیر معمولی جسمانی حرکات اور قوی الاثر محلل دوائیں ہرگز استعمال نہ کرائیں۔

علاج |

- _____ باسلیق یا صافن کی فصد کھولنے کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بہدانہ، خطی، ہر ایک ۳ گرام کا پانی میں شیرہ نکال کر شربت بنفشہ، شربت خنکاش ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

حناب، کاسنی، مکہ خشک، ہر ایک ۳ گرام _____ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر صبح کو ۵ چھان کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

_____ القباب حاد میں درج ذیل نسخہ جات مفید اور مجرب ہیں۔

نسخہ ۲۔

تخم خنکاش سفید، کشیزہ خشک، عدس مقشر، حناب، دانہ بیرون کردہ، ہر ایک ۲۰ گرام تمام دواؤں کو ۲ لیٹر پانی میں بھگوئیں۔ اور پکائیں۔ جب پانی نصف رہ جائے تو شکر حب ضرورت ڈال کر قوام تیار کریں اودہ، گرام ہر ایک شیرہ تخم خیار، شیرہ تخم غریبوزہ، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ خرفہ نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

گل بنفشہ، گل خطی، مکہ خشک، تخم خیارین، ہر ایک ۲ گرام، حناب ۵ عدد،

سپستان ۱۱ عدد، ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ۱ لیٹر چھان کر گھٹند ۳۳ گرام،
حل کر کے خاکسی ۵ گرام چھڑک کر صبح، شام نوش کرائیں، ————— نفیج مادہ میں مفید اور مجرب ہے۔
نسخہ ۱۔

مذکورہ بالا نسخہ میں مغز فلوں خیار شبنز ۶۰ گرام، تربجبین ۸۰ گرام، سبز بادام شیرین
۵ عدد اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ تبریلہ ۱۔
بہدانہ ۳ گرام، گل خطی ۳ گرام، مناب ۵ عدد، عرق مکوہ، عرق شاہترہ ہر ایک
۶۰ ملی لیٹر میں جوش دے کر ۱ لیٹر چھان کر شیرہ تخم خیارین ۳۰ ملی لیٹر، شربت بنفشہ ۲۰ ملی لیٹر،
اسپنول مسلم ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

آب مکوہ سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر، شربت بنفشہ ۲۰ ملی لیٹر،
سے شیریں کر کے خاکسی ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

تخم خرفہ سیاہ، تخم خشکاش، تخم کاہو، تخم خیارین، ہر ایک ۳ گرام ————— تمام دواؤں کا
پانی میں شیرہ نکال کر شربت آلو بخارا ۲۵ ملی لیٹر کے برابرہ نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

شاخ اگلوہ کو پانی میں جوش دے کر نمک اندرائی چھڑک کر ۹ دن نوش کرائیں۔
۔۔۔۔۔ درم بلخی میں درج ذیل ۳۰ نبات استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

عسل خیار شبنز ۳۸ ملی لیٹر، عسل انجیر ۱۲ ملی لیٹر، ————— دونوں کو ملا کر دھوپ
میں رکھ دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو ایک چائے چمچ بھر کھلائیں۔
نسخہ ۱۔

تخم کرفس، انیسون، بلیمون، ہر ایک ۳ گرام، خار خشک، پر سیاوشاں، ہر ایک
۱ گرام، ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ۱ لیٹر چھان کر شربت بزدلی، شربت
دینار ہر ایک ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم کرنس، انیسون، تخم کتاں، پرسیا و شاں ہر ایک ۵ گرام کے جو شانہ میں لگھند
۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درم صلب میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

تخم خٹلی، تخم کتاں ہر ایک ۲ گرام، تخم حلبہ ۴ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
شیرہ تخم خیاریں، شیرہ تخم خربزہ ہر ایک ۶ گرام کے ہمراہ نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

تراشہ کدوئے تر، تراشہ خیار، گل بید، برگ خبازی۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو
کوٹ کر عصا حاصل کریں اور نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ جات بھی مفید ہیں۔

نسخہ ۴۔

تخم خربزہ، تخم خیاریں، خار خشک ہر ایک ۵ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں
پیس کر چھان لیں اور شربت بزوری معتدل ۴۴ لیٹر حل کیے نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ اندمال کے لیے درج ذیل نسخہ کھلائیں۔

نسخہ ۵۔

تخم کتاں، تخم خشکاش، کاکچ، نشاستہ ہر ایک ۵ گرام، گل ارمنی ۴ گرام۔۔۔۔۔
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۵ گرام کھلا کر شربت بزوری ۲۲ لیٹر نوش
کرائیں۔

۔۔۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضاد ۱۔

آرد جو، مکوہ خشک، صندل سرخ، تخم کاسنی ہر ایک ۶ گرام، آب مکوہ تازہ مرق،
آب کاسنی بزر، ہر ایک ۲۲ لیٹر میں پس کر ضاد کریں۔

نسخہ ضاد ۲۔

سرمیں کبوتر ۶ گرام، فبار آسیا، آرد کرسنہ ہر ایک ۵ گرام، انجیر زرد ۳ عدد

تمام دواؤں کو ماء العسل میں جوش دے کر نیم گرم ضاد کریں۔
نسخہ ضاد۔

بنفشہ، آرد جو خضلی، صندل، ماشیا، تراشہ کدو، ہم وزن آب لکھو، سبز مروق،
آب کشیز، سبز مروق، آب برگ خرن، گلاب، سرکہ میں پس کر ضاد کریں۔
نسخہ ضاد۔

مبشت، بابونہ، ہر ایک ۴ گرام، تخم کتان، تخم حلب، ہر ایک، اگرام، تخم خبازی، تخم غلی،
ہر ایک ۲۵ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر آب بادیاں میں ملا کر ضاد کریں۔
درم بلغی میں مفید ہے۔
نسخہ ضاد۔

بابونہ، اکیلل الملک، تخم کتان، حلب، خضلی، نقل، اشق، — تمام دواؤں کو باریک
پس کر منز ساق گاؤں میں خوب ملا کر ضاد کریں۔
نسخہ ضاد۔

اکیلل الملک، بابونہ، حلب، تخم کتان، آرد جو، ہوزن — تمام دواؤں کو پانی میں
پس کر روغن کجد ملا کر ضاد کریں / زعفران، مصطکی، روغن ہم وزن پس کر ضاد کریں۔
نسخہ مالش۔

روغن بابونہ، روغن قزطم ملا کر مالش کریں۔
نسخہ مالش۔

روغن گل، روغن بنفشہ، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، نیم سوم و اگرام پچھلا کر نیم گرم، مقام
کلیہ پر مالش کریں۔
نسخہ تکمید۔

روغن قسط، روغن ثبت ہم وزن اد آب گرم سے تکمید کریں۔
نسخہ نطول۔

بابونہ، خار خشک، تخم کتان، بنفشہ، بسننج، انجیر، حلب، ہم وزن کو پاؤں میں جوش
دے کر مل چھان کر نطول کریں۔
نسخہ آبرن۔

گل بابونہ، اکیلل الملک، سبوس گندم، جو مقشر، غنب الثعلب، تخم خطی، ہم وزن، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر آبزین کریں۔

نسخہ آبزین ۱۔

تخم کرنس، انیسون، پرسیا و شاں، بابونہ، برگ سداب، اکیلل الملک، ثبوت، تخم حلبہ، انجیر، کرنب — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر آبزین کرائیں، نسخہ آبزین ۲۔

بابونہ، خارحک، بنفشہ، تخم کتاں، بسفاج انجیر، حلبہ، ہم وزن کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر آبزین کرائیں۔ نسخہ آبزین ۳۔

سبوس گندم، جو مقشر، غنب الثعلب، اکیلل الملک، بابونہ، تخم خطی، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر آبزین کرائیں۔

التهاب حوض کلیہ

PYELITIS

اس مرض میں حوض کلیہ میں التهاب پیدا ہونے کی وجہ سے مرضی عوارض رونما ہوتے ہیں۔ عورتوں میں دوران حمل یہ مرض کثیر الوقوع ہے۔

التهاب حوض کلیہ

اقسام ۱

التهاب حوض کلیہ مزمن
Chronic Pyelitis

التهاب حوض کلیہ حاد
Acute Pyelitis

اسباب ۱

التهاب کلیہ - جاب ہی دراصل التهاب حوض کلیہ کے اسباب، یہ مختصراً تحریر ہے۔

Sterile Pyuria	د
التهاب شانہ	د
التهاب خدہ قدیمیہ	د
حمیات حادہ	د
درم مزمن	د
ای کولائی (E. Coli) تعدیہ	د
Strepto Coccus Faecalis	د
Mycobacterium T.	د
حصاة الکلیہ	د
علامات	د
حادہ	د

مرض کا حملہ یکبارگی ہوتا ہے، درد سر، کسندی، ضعف، اشتہار، حملہ سختی میں درد، تشویر ہوتا ہے، مقام گردہ پردہانے سے بھی درد محسوس ہوتا ہے، بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، زبان خشک، سفید اور بعض اوقات غار دار ہو جاتی ہے، حمی ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ کے درمیان، اختلاف کے ساتھ ہوتا ہے، شانہ میں خراش یا تحریک کے سبب ہر ۲۰-۲۵ منٹ پر پیشاب ہوتا ہے، قوام غلیظ ہوتا ہے، بعض اوقات شکم میں التهاب زائدہ امور جیسا درد محسوس ہوتا ہے، پیشاب میں رطوبت، بیضیہ، خون، یا صمدی خلیات خارج ہونے میں۔ پیشاب میں کثافت اور رسوب کو باسانی دیکھا جاسکتا ہے، اور اس میں شری ہوئی پھلی جیسی بدبو آتی ہے،

خواتین میں حمل کے دوران یہ مرض کثیر الوقوع ہے، چنانچہ التهاب کے ابتدائی مرحلہ میں لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، مقام گردہ پردہانے سے درد محسوس ہوتا ہے۔ بخار آلود پیشاب، بار بار آتا ہے، اس کے شدید عوارض میں نسیم بول بھی ہو سکتا ہے۔

بچوں میں التهاب عرض کلیہ میں ضعف، اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، نشوونما میں نمایاں طور پر فرق پڑتا ہے، تپ ہوتی ہے، حمی کے ساتھ تشنج بھی ہوتا ہے، بعض بچوں

میں یرقان بھی ہوتا ہے، سارے شکم میں درد اور تخلیف کے ساتھ بار بار پیشاب آتا ہے۔
 بعض اوقات بول فی الفراش (Enuresis) بھی ہوتا ہے، شدید عوارض
 میں بول الدم بھی ہو سکتا ہے۔ شعاعی امتحان (Radiological Examination)
 میں بحری بول کے قدیر سے یہ پیدا ہونے والی تشریحی اور فعلی بد وضعی کو آسانی دیکھا جاسکتا ہے۔
 مزمن۔

محیثیت مجموعی صحت خراب ہوتی ہے۔ سلسل البول کی شکایت ہوتی ہے،
 قطن کے حصص خامری میں درد ہوتا ہے، صدارع کے ساتھ خفیف بخار بھی ہو سکتا ہے، پیشاب
 میں رطوبت بیغیہ، جلدی خلیات اور خون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ زیادہ و صہ تک مرض
 کو برقرار رہنے کی صورت میں قسم بول کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔

تقریبی علامات

التهاب حوض کلیہ	التهاب مثانہ
۱۔ کمر میں درد ہوتا ہے	۱۔ مثانہ اور قفیب میں درد ہوتا ہے۔
۲۔ پیشاب میں تیزابیت۔	۲۔ پیشاب میں الکی۔
۳۔ پیشاب میں صیدی اجزاء زیادہ۔	۳۔ پیشاب میں صیدی اجزاء کم ہوتے ہیں۔
۴۔ پیشاب کی حاجت ہر ۲۰-۲۵ منٹ پر	۴۔ پیشاب کی حاجت نسبتاً کم ہوتی ہے۔
۵۔ پیشاب میں مادہ فریبی زیادہ	۵۔ پیشاب میں مادہ فریبی کم ہوتا ہے۔
۶۔ پیشاب میں بطنی اجزاء کم	۶۔ پیشاب میں بطنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں
۷۔ پیشاب کرتے وقت درد نہیں ہوتا	۷۔ پیشاب کرتے وقت سوزش اور درد محسوس ہوتا ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ التهاب کلیہ کے ذیل میں بیان کردہ اصول علاج اختیار کریں۔

علاج

- ۱۔ آتش جو میں شربت نیلو فرم ۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• گل خطی، کھور خشک ہر ایک ۶ گرام، تخم خیارین نیم کوفتہ ۵ گرام، عرق مکوہ، عرق کاسنی، ہر ایک ۵ ملی لیٹر میں جوش دیں، اور شربت نیلو فر ۲۳ ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

• تخم خردسیاہ، تخم کاجو، تخم خیارین، خشکاش، ہر ایک ۴ گرام —————
تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت آلو بخارا ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
• صاب ۱۰ عدد، صنب اشعلب، تخم کاسنی، ہر ایک ۶ گرام ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر لچھان کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
• خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د۔

گل بنفشہ، گل خطی، اکیلل الملک، صنب اشعلب خشک، ہر ایک ۶ گرام، آرد جو ۱۲ گرام
تمام دواؤں کو آب مکوہ سبز مرق میں پیس کر صناد کریں۔
نسخہ آیزن۔

سبوس گندم، جو مقشر، تخم خطی، صنب اشعلب، اکیلل الملک، بابونہ ہر ایک ۱۲ گرام
تمام دواؤں کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دے کر ۲۰ لیٹر گرم پانی میں ملائیں اور آیزن کرائیں۔
نسخہ قیروطی۔

۴۴ گرام، کورودن بنفشہ، رودن گل ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر میں پچھلا کر مقام کلیہ پر
نیم گرم مالش کریں۔
نسخہ حمام۔

شب یانی، کبریت کو پانی میں ملا کر غسل کرائیں۔
• انتہاب کلیہ کا علاج اختیار کریں۔

تشم کلیہ

FATTY KIDNEY

اس مرض میں مجری بول میں انتہاب ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں

یہ مرض جوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب |

۱. التهاب کلیہ حاد
۲. تقرح کلیہ مزمن
۳. فساد دموی
۴. عروق لمغاد یہ کاجری بول میں انشقاق
۵. فربیا بیطس
۶. حیات عفونیہ
۷. آتشک
۸. یکبارگی برودت کے اثرات
۹. کثرت سے نوشی
۱۰. نامعلوم طور پر، نمایاں سبب کے بغیر

علامات |

التهاب کے کچھ عرصہ بعد چہرہ متورم اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ متلی اور تپے آتی ہے، نقرالدم کی شکایت ہوتی ہے، پپوٹوں، پیروں اور غوطوں میں عجیبی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، استسقاء طحی نمایاں ہوتا ہے، پیشاب سفید، ثقیل اور کم مقدار میں خارج ہوتا ہے، اس میں رطوبت سیفیہ کی زیادتی کے سبب انجمادی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، رات کا پیشاب بہت ہی سفید ہوتا ہے اور دن میں دموی آمیزش ہوتی ہے، ————— بعد الموت گردہ کے معائنہ سے وہ بڑا اور سفید دکھائی دیتا ہے۔ مرض کے آخری درجات میں منوالکلیہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔

تفریقی علامات

کلیہ سیضا کبیر

تشم کبیر

۱۔ التهاب کلیہ حاد کی ہرگز شکایت نہیں ہے،

۲۔ گردہ کرنے والے امراض یا تیج کی

موجودگی یا سرگزشت ملتی ہے۔

۲۔ استسقاء بتدریج ہوتا ہے۔

۳۔ علامات قسم بولی بالعموم مفقود

ہوتی ہیں۔

۴۔ اسہال شدید ہوتا ہے۔

۵۔ چہرہ تشخی ہوتا ہے۔

۶۔ دموی اور شخی قشور خارج ہوتے

ہیں۔

۷۔ جگر اور طحال کی جسامت زیادہ

ہوتی ہے۔

تشخم کلیہ

۱۔ کمزور کرنے والے امراض اور تشخم

کا سرگزشت ملتی ہے

۲۔ استسقاء بہت نمایاں ہوتا ہے۔

۳۔ کبد بڑا ہوتا ہے۔

۴۔ بول کا وزن مخصوص ۱.۰۱ — ۱.۱۵

۵۔ بول میں رطوبت زلالیہ زیادہ

خارج ہوتی ہے۔

۶۔ قشور شخی موجود ہوتے ہیں۔

۷۔ چہرہ شخی ہوتا ہے۔

۲۔ استسقاء جلد ہوتا ہے۔

۳۔ علامات قسم بولی بالعموم موجود

ہوتی ہیں۔

۴۔ اسہال عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔

۵۔ چہرہ زرد ہوتا ہے۔

۶۔ زجاجی، بشری اور حبیبی قشور

خارج ہوتے ہیں۔

۷۔ جگر اور طحال کی مقدار طبعی ہوتی ہے۔

کلیہ احمر صغیر

۱۔ اچھی صحت کی سرگزشت ملتی ہے۔

۲۔ استسقاء کم یا بالکل نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ کبد چھوٹا ہوتا ہے۔

۴۔ بول کا وزن مخصوص ۱.۰۵ — ۱.۱۰

۵۔ بول میں رطوبت زلالیہ کم خارج

ہوتی ہے۔

۶۔ قشور زجاجی اور حبیبی ہوتے ہیں۔

۷۔ چہرہ زرد ہوتا ہے۔

اصول علاج

۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

۲۔ التباہ کلیہ عار کا اصول علاج اختیار کریں۔

۳۔ دفع قبض کی تدابیر کریں۔

علاج |

- _____ گل بنفشہ، گل خطلی، مکوہ خشک، تخم خیارین ہر ایک ۵ گرام، عناب ۵ عدد،
 سہمتاں ۹ عدد، _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھائی کر گلیقند ۲۵ گرام
 ملا کر اوپر سے خاکسی ۵ گرام چڑکی کر نوش کرائیں _____ منفع ہے۔
 _____ مذکورہ نسخہ میں مغز قلوں خیار شبنم ۶۰ گرام، ترنجبین ۵۰ گرام، مغز بادام
 شیریں ۵ عدد اضافہ کر کے نوش کرائیں _____ مہل ہے۔
 _____ ہمدانہ ۳ گرام، گل خطلی ۴ گرام، عناب ۵ عدد، عرق کوہ عرق شاہترہ،
 ہر ایک ۵ لیٹر میں جوش دے کر شیرہ تخم خیارین ۳ لیٹر، شربت بنفشہ ۲۵ لیٹر، اسپغول
 مسلم ۵ گرام کا اضافہ کر کے نوش کرائیں _____ برد ہے۔
 _____ پانی میں کبریت اور شب بیاہی ملا کر حل کرائیں۔
 _____ زعفران، مصطلی نیم وزن کو پس کر مقام کلیہ پر ضا د کریں۔
 _____ گل بابونہ، اکلیل الملک، سوس گندم، جو مقشہ، عنب الشلب، تخم خطلی،
 تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر آبزین کرائیں۔

تجب کلیہ

MULTIPLE KIDNEY ABSCESS

اس مرض میں دونوں یا ایک کلیہ میں مختلف حجم کے متعدد چھوٹے چھوٹے جوب اور شول
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ کلیہ کا حجم اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے، غلاف الکلیہ دبیز ہو کر کلیہ سے چپک
 جاتا ہے، اس کی رابطی ساختوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شرائین کی دیواری دبیز ہو جاتی ہیں،
 اور بعض مقامات پر وریڈیا بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ _____ یہ مرض نادر الوقوع ہے۔
 تاہم عورتوں کی نسبت مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب |

۱۔ التهاب کلیہ

- تشم کلیہ (۱۵)
 امتلاء عروق مزمن (۱۶)
 تصلب شرائین (۱۷)
 صفراوی اور یورقی مادہ کا اجتماع (۱۸)
 آتشک (۱۹)
 نفرس (۲۰)
 سیسہ کی سمیت (۲۱)
 شدید محنت و ریاضت (۲۲)
 بکثرت سے نوشی (۲۳)
 غذا کی زیادتی (۲۴)
 گوشت اور گرم مصالحہ کا بکثرت استعمال (۲۵)

علامات |

مرض کی علامات بہت سست رفتار سے، کافی عرصہ بعد رونما ہوتی ہیں، ابتداء میں کستی، کسندی، تلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، مقام کلیہ پر، ایک یا دونوں طرف نفل کے ساتھ درد ہوتا ہے، دغدغہ اور سوزش ہوتی ہے۔ اور کلیہ کی سطح ناہموار ہو جاتی ہے، زیادہ مقدار میں بار بار زرد رنگ کا پیشاب ہوتا ہے، پیشاب میں خون اور پیپ بھی آسکتی ہے، رطوبت بیضیہ قشور اور رسوب بھی شامل ہوتا ہے۔ _____ رغن میں اضافہ کی صورت میں ضعف اور کستی کا غلبہ ہوتا ہے، جلد بے رونق اور خشک ہو جاتی ہے، رمان کی شکایت ہوتی ہے، ضعف اشتہا ہوتا ہے۔ بصارت کمزور ہو کر زائل ہو سکتی ہے۔

شرائین کی دیواریں دبیز ہو جاتی ہیں، قلب بھی موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی آواز خفیف اور دوسری آواز تیز، سنائی دیتی ہے، فشاء الریہ، صفاق اور دوسری اخشیہ ماتیہ میں بھی التهاب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ _____ بالعموم شریان دماغی سے پھٹ جانے، کسی عضو رئیس میں التهاب یا قسم بولی سے مرین ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔

اصول علاج |

_____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

_____ حقنہ لینے دیں۔

علاج |

_____ شاہترہ ۶ گرام، آلو بخارا ۷ عدد، سپستان ۹ عدد _____ تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ترنجبین ۴ گرام ملا کر نوش کرائیں۔
_____ بنفشہ، نیلوفر، خطمی، ہر ایک ۶ گرام، خشکاش ۵ گرام، _____ تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
_____ تخم خربوزہ ۳۵ گرام، مغز تخم خیبارین ۵۰ گرام، مغز تخم کدو، تخم خرفہ
تخم خطمی، بزر الہنج، مغز بادام مقشہ، کیترا، نشاستہ، رب السوس، تخم خشکاش، تخم کرنس،
گل ارمنی، ہر ایک ۷ گرام، طباشیر ۵۰ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر گولیاں
بنائیں، اور ۵۰ گرام ہر شربت خشکاش و شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

تشمع کلیہ

WAXY KIDNEY

اس مرض میں جو ہر کلیہ میں نشاستہ کی مانند، فاسد مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔
جو ابتداء میں عنایت بولیہ (اکا باریک شدہ انین پر
اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بعد کلیہ کے دوسرے اجزاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔

اسباب |

۱. التهاب کلیہ

۲. تدرن کلیہ

۱. تدریج غلی
۲. تفرج
۳. سور مزاج اجابی
۴. آتشک
۵. صفراوی اور سودی مادہ کا اجتماع
۶. بزم من اشتلاء عروقی
۷. قلب شرائین
۸. نقرس
۹. شدید محنت و ریاضت
۱۰. غذا کی زیادتی
۱۱. کثرت سے نوشی
۱۲. گرم مصالحات کا بکثرت استعمال
۱۳. سیسہ کی سمیت

علامات |

پیشاب کا مقدار میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے تاہم اس میں مادہ بویہ کی کمی کی وجہ سے نقل اضافی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پیشاب کا رنگ زرد، شفاف ہوتا ہے، رطوبت بیضہ ابتداء میں معمولی طور سے اور بعد میں نمایاں طور سے پائی جاتی ہے، عام ضعف اور لاغری ہوتی ہے رین کے بدن کا رنگ زرد ہوتا ہے، فقر الدم ہوتا ہے، چہرے پر تسبیح ہونے کے باوجود استسقاء علامات مفقود ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں استسقاء بھی ہو سکتا ہے، بغیر درد کے پانی جیسے اسہال آتے ہیں، جگر اور طحال بڑھ جانے کی وجہ سے مختلف مقامات سے جریان الدم ہوتا ہے، خفیف عوارض میں عظم القلب، ورم شبکیہ اور قسم بولی غیر موجود ہوتے ہیں، شدید عوارض میں یہ صورتیں نمایاں ہوتی ہیں، فوق الکلیہ کے متاثر ہونے کی صورت میں ضغطہ دموی کم ہو جاتا ہے، اور نبض کا تناؤ بالعموم کم ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

تشخیص کلیہ

التهاب کلیہ حاد

- ۱۔ سردی یا کسی شدید مرض کی سرگزشت ملتی ہے۔
- ۲۔ علامات بہت جلد شروع ہوتی ہیں۔
- ۳۔ پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ پیشاب دھوی ہوتا ہے۔
- ۵۔ پیشاب میں دھوی اور زہا جی قشور خارج ہوتے ہیں۔
- ۶۔ پیشاب کے ثقل اضافی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
- ۷۔ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ۸۔ قسم بولی کے علامات شاذ پائی جاتی ہیں۔

- ۱۔ کمزور کر سیکے والے امراض اور قحط کی سرگزشت ملتی ہے۔
- ۲۔ علامات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں۔
- ۳۔ پیشاب کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ پیشاب دھوی نہیں ہوتا۔
- ۵۔ پیشاب میں شقی قشور خارج ہوتے ہیں۔
- ۶۔ پیشاب کے ثقل اضافی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
- ۷۔ حرارت جسمانی طبعی ہوتی ہے۔
- ۸۔ قسم بولی کے علامات بالعموم موجود ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- _____ شفا یابی کی توقع اگرچہ کم ہوتی ہے، تاہم ابتداءً زرد و دھیم غذائیں کھلائیں۔
- _____ مرکبات فولاد دیں۔

_____ تبدیل آب و ہوا کی ہدایت کریں۔

- _____ آتشک یا تفرح غلام کی صورت میں ان کا علاج کریں اور اصل سبب مرضی

کا ازالہ کریں۔

علاج


- _____ چھ اونس ۱۲ گرام، زنجبیل ۵ گرام، ریونڈ غلطی ۲ گرام کومات میں پانی میں جگو کر صبح کو لیں چھان کر نوش کرائیں۔

• پوست بلیڈ سیاہ، بلیڈ، آلہ، زنجبیل، دار فلفل، برنج کابی، گل ارنی، زنبلاو
سنبل الطیب، پیل خود، شیطری، خونہان، برایک و گرام، مویر منقی ۲ گرام، نجث الحدید بر
ہدوغن بادام ۶۰ گرام، شہد دوگنا — تمام دواؤں کا حسب دستور مجموعہ بنا کر ۶ ماہ تک
معدہ کا ڈھیری میں دھن کر دیں اور ۱۵ گرام استعمال کرائیں۔
• نجث الحدید مدبر بردغن بادام کو فرق پیاز ۵۰۰ ملی لیٹر میں پکائی جب
خشک ہو جائے تو ۲۰۰ ملی لیٹر میں پکائی اور ۵۰۰ ملی گرام براہ بردغن گاؤ استعمال کرائیں۔

ہزال الکلیہ

RENAL ATROPHY

اس مرض میں کلیہ کے شئی اجزاء کم یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزال
کیفیت رونما ہوتی ہے۔



اسباب |

۱. سوز مزاج کلیہ حار
۲. سوز مزاج کلیہ بارد
۳. سوز مزاج کلیہ یا پس
۴. کثرت استفراغ
۵. کثرت جماع
۶. شراب نوشی
۷. ضعف مجر

(۱۲) بعض قلبی امراض۔

(۱۳) بیضہ

(۱۴) حیات و بایہ

علامات |

درد سر ہوتا ہے، پشت اور کمر میں میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، پیشاب سفید، بار بار اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، جس میں رطوبت، بیضہ، شال ہوتی ہے، قوت شہوانی ضعیف ہو جاتی ہے، جسم لاغر ہوتا ہے، ضعف بصارت کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب روکے کی ارادی فوت زائل ہو جاتی ہے، پشت اور کمر سرد محسوس ہوتی ہے، شدید عوارض میں لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، پیاس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی حاجت بار بار محسوس ہونے کے باوجود، تھوڑی مقدار میں سرخی مائل، خارج ہوتا ہے، چہرہ بے رونق اور بھر بھرا ہوتا ہے، رفاف کی شکایت ہوتی ہے، اور قسم بولی کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔

اسول علاج |

- _____۔ نزال کے اصل سبب کا ازالہ کریں۔
- _____۔ مقویات کھلائیں
- _____۔ مسہلات استعمال کرائیں۔
- _____۔ آئرن اور صناد بروئے کار لائیں۔

علاج |

- _____۔ تسمین کلیہ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ۔

منز بادام، مغز فندق، مغز اخروٹ، برنج، نخود مقشر، مغز پستہ، ہر ایک ۲۵۰ ملی لیٹر میں پیس چھان کر نشاستہ، شکر سفید ۱۰ گرام _____ تمام دواؤں کو دودھ ۲۵۰

کا اضافہ کر کے حسب دستور حریرہ تیار کریں۔ اور روض زرد ۲۲ ملی لیٹر سے بچھار کر استعمال کریں۔

نسخہ ۱۔

بہوب کبیرہ گرام کھلا کر مذکورہ بالا نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ ۲۔

تخم خشکاش، مغز تخم کدو، مغز نیمبہ دانہ، ہر ایک ۹ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں کر چھان کر شیر گاؤ ۲۵۰ ملی لیٹر، ترنجبین خراسانی ۲۲ گرام ملا کر حریرہ تیار کریں اور روض زرد ۲۲ ملی لیٹر سے بچھار کر نوش کریں۔

نسخہ ۳۔

مغز نارجیل، مغز فندق، مغز پستہ، مغز چغوزہ، مغز اخروٹ اور بادام، ہر ایک ۱۲ گرام تمام دواؤں کو کوٹ کر نمبہ خالص ۶۰ ملی لیٹر ملا کر محفوظ کر لیں اور ۱۲ گرام کھلا کر بشیرہ گاؤ ۲۵۰ ملی لیٹر نوش کریں۔

نسخہ ۴۔

بیسفہ مرغ نیمبرشت / دوا ترنجبین کھلائیں۔
حقنہ کے طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کریں۔

نسخہ حقنہ ۱۔

کلمہ بیش، نخود، لوبیا، باقلا، گندم، ہم وزن، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر محفوظ کر لیں اور روض نارجیل، روض پستہ، روض فندق، روض مغز اخروٹ، روض بادام، روض حب قرطم، روض کنجد، مغز ساق گاؤ، مغز ساق بیش (وغیرہ) حسب ضرورت مذکورہ جو شانہ میں حل کر کے حقنہ کریں۔ تسین مکہ میں مجرب ہے۔

نسخہ حقنہ ۲۔

شیر میش کو صاف کر کے خوب کوٹیں اور گوشت سرین ۲۵۰ گرام، شیر گاؤ ۳۰۰ ملی لیٹر، برنج ۲۰ گرام، تمام اشیاء کو ایک برتن میں رکھ کر اس قدر پانی ڈالیں کہ وہ ڈوب جائیں، اب آگ پر رکھ کر پکائیں جب ہر می ہو جائے تو ۱۸ ملی لیٹر پانی صاف کر کے شحم ۶۰ گرام، روض بادام، روض مغز اخروٹ، ہر ایک ۳۵ ملی لیٹر شامل کر کے

نسخه مضاد

زعفران، مصطلک ہم وزن کو پس کر مقام کیہ پر خاد کریں۔

RENAL COLIC

اس مرض میں متواتر / شدید بخشی درد ہوتا ہے، جس کی تکلیف سے مریض بے قرار ہو جاتا ہے، اور معالجہ کے طرف سے ذرا بھی بے توجہی دیگر شدید عوارض کا سبب بنتی ہے

امراض کلیہ :-

۱. سور مزاج کلیہ
 ۲. ہزال کلیہ
 ۳. ضعف کلیہ
 ۴. التهاب کلیہ
 ۵. قروح کلیہ
 ۶. رشح کلیہ
 ۷. مزہ و سقطہ کلیہ
 ۸. حصاة کلیہ (رل یا حصاة کا حوض کلیہ یا غالب میں احتباس)
 ۹. امراض معدہ و امعاء
 ۱۰. سقوط اشتہار

۱. ضعف، صغیم
۲. تولید ریاح
متفرقات ۱۔

۱. سرد، غلیظ اشیار کا بکثرت استعمال
۲. کثرت جماع سے عام جسمانی ضعف

علامات ۱

کمر میں مقام گردہ کے پاس دورہ کی شکل میں بہت شدید، نشعوی قسم کا درد ہوتا ہے، بعض اوقات یہ درد متواتر، یا تشبیہی ہوتا ہے۔ یہ درد قسم قطنی سے شروع ہو کر سامنے کی جانب، ناف کی سمت اور ران یا خصیوں کی طرف دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خصیہ درد کے ساتھ اوپر کی جانب چڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اکثر درد کے آغاز کے ساتھ تے بن ہو جاتی ہے، لرزہ آتا ہے، مرین کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور کسی قدر انحطاط طاری ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اگر قطرہ قطرہ پیشاب خارج بھی ہو تو اس میں خون اور پیپ کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ برد اطراف ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پیشاب میں قشور کی بجائے قلیں موجود ہوتی ہیں، جن سے حصاة کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، خون کی کمی و بیشی سے حصاة کے حجم اور اس کی خراش اور کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، بعض میں ارضعیف ہوتی ہے۔

ریاحی درد کی صورت میں ثقل نہیں ہوتا، مقام درد میں تغیر بھی نہیں ہوتا، متاثرہ جانب کا پیرسٹن ہو جاتا ہے، حصاة کے حالب سے شانہ میں آجانے کی صورت میں درد موقوف ہو جاتا ہے۔ حصاة کے حوض الکیہ میں اپنے مقام پر ہی متحرک ہو جانے کی صورت میں درد کمر میں ٹھہر جاتا ہے، حصاة کے شکستہ ہو جانے کی صورت میں بھی درد موقوف ہو جاتا ہے، اور اس کا تیس خصیوں اور ران تک نہیں جاتی۔ مرین کے جسم کا درجہ حرارت ۱۰۲، ۱۰۳ تک ہو جاتا ہے، یہ بخار لرزہ کے ساتھ آتا ہے، حوض الکیہ میں التهاب صدیدی کی صورت میں بار بار لرزہ سے بخار چڑھتا ہے، حصاة کے حوض الکیہ میں

ملفوظ ہونے کی صورت میں، ماؤن کلیہ کے مجری بول کے بند ہو جانے سے احتیاس بول اور توسع الکلیہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ شدید عوارض میں قسم بول ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- _____ مکانات استعمال کرائیں۔
- _____ مدرات استعمال کرائیں۔
- _____ حسب ضرورت نطول کریں۔
- _____ ملینات استعمال کرائیں۔
- _____ آبرزن کرائیں۔

علاج

_____ حصاة الکلیہ کے نتیجہ میں عارض ہونے والے وجع الکلیہ میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

پرسیاوشاں، تخم خربوزہ، ہر ایک ۸ گرام، حب قرطم، بادیان ہر ایک ۹ گرام، پودینہ، گرام، انیسون، تخم ترب، ہر ایک ۴ گرام، بھکرہ، کرنس ہر ایک ۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر گھنڈہ ۲۴ گرام حل کر کے محفوظ کر لیں اور تخم کرنس، فود، ہر ایک ۱ گرام، تخم خربوزہ ۳ گرام، _____ تمام دواؤں کو باریک کر کے کھلائیں، اس کے بعد مذکورہ بالا مشروب نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

شورہ قلی ۶ گرام، نوشادر، حیرالیہود، سہاگہ ہر ایک ۶ گرام، ریشا اعدد، بلادربے کلاہ، ۶ گرام، _____ شورہ قلی کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک کر رکھیں اور شورہ کلاہ کو تمام دوائیں رفتہ رفتہ ڈالیں پھر باریک پس کردہ ۱۲ گرام ہرلہ دودھ کی لسی کھائیے

نسخہ ۳۔

مغر پنبد دانہ، مغز خشک دانہ، نخود، ہر ایک ۵ گرام، _____ تمام دواؤں کا پانی میں

شیرہ نکال کر شربت بردری ۲۲ لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 ریح کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

منز بادام، حب القلت، ہر ایک ۸ گرام، منز تخم کدو، منز تخم تربوز، زعفران،
 منز دانہ ہیل خورد، ہر ایک ۳ گرام، پوست خربوزہ شیریں ۹ گرام، دارچینی، درق
 نقرہ، خادزہ حیوانی ہر ایک ۱ گرام، منز پستہ، منز تخم خیارین۔ منز تخم خربوزہ ہر ایک
 ۵ گرام، مشک خالص ۲، اگر ۱ گرام، مقرب کلاں خاکستر ۲ عدد، زردی بیضہ مرغ،
 (روغن بادام میں بریاں شدہ) عدد، عرق گلاب ۲۵۰ ملی لیٹر، نبات سفید ۳۰۰ گرام،
 حب القلت کو جوش دے کر اس پانی میں نبات سفید کا قوام تیار کریں اور باقی دوائیں
 پس کر ملائیں اور حسب دستور قوام تیار کریں اور ۵ گرام ہر گاہ درج ذیل عرق
 استعمال کرائیں۔

نسخہ عرق ۱۔

گاؤ زبان، پودینہ بستانی، زیرہ سیاہ، صغیر، بیج کبر، بیج بادیان، بیج کاسنی،
 اجوائن، ہر ایک ۸ گرام، ہیل خورد، بادیان، دارچینی ہر ایک ۳۰۰ گرام، اذخر ۶۰ گرام،
 تمام دواؤں کا ۵ لیٹر عرق کشید کریں۔

نسخہ ۲۔

منز بادام مقشہ ۱۲ گرام، دانہ ہیل خورد ۹ گرام، مصطکی رومی ۱۰۸ گرام،
 برگ سنارنگی ۶۰ گرام، نبات سفید ۵ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف
 بنائیں اور ۹ گرام ہر گاہ شیر گاؤ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

جوارش کوئی ۱۲ گرام کھلائیں اور اس کے بعد بادیان، کشوٹ، انیسون ہر ایک
 ۵ گرام، کا عرق بادیان، عرق کور ہر ایک ۶۵ ملی لیٹر میں شیرہ کالیں اور مل چھان کر گلقد
 غیرہ بنفشہ ہر ایک ۸ گرام ملا کر شربت دینار ۴۸ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

برگ شبت، تخم خیارین، تخم فک دانہ، تخم رس، برنما سف، مکوہ مشک، پوست خربوزہ

ہر ایک ۵ گرام، رات کو تمام دواؤں کو گرم پانی میں جگودیں اور صبح کو ل چھان کر شربت
بزوری ۴۸ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• انتہاب کلیہ کی صورت میں فصد کھولنے کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیے۔
نسخہ تبرید ۱۔

حناب، بہدانہ، ہر ایک ۲ گرام کا حق کا وزن ۱۴۵ ملی لیٹر میں شیرہ نکالیں اور
شربت بنفشہ ۲۲ ملی لیٹر ملا کر خاکسی، گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

• اسباب مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل نسخہ جات بھی مفید و
مغرب ثابت ہو سکتے ہیں۔
نسخہ ۲۔

پوست بلیہ، پوست بلیہ، آملہ، قلعہ دراز ہر ایک ۳ گرام، گل سرخ،
کبریا شمع ہر ایک ۴ گرام، دانہ ہیل خورد، ابریشم ہر ایک ۶ گرام، گل کا وزن، مرجان ہر ایک
۲ گرام، حجر الیہود ۳۰۲ گرام، مردارید ۵۰۰ ملی گرام۔ حجر الیہود کو عرق کلاب اور
خالص سہ آتشہ ۲۵۰ ملی لیٹر میں تین دن کھل کر پیں اور باقی دواؤں کو باریک کر کے اس میں
ملائیں اور شہد خالص ۲۵۰ ملی لیٹر میں حسب دستور معجون بنا کر ۳ گرام کھلائیں۔
نسخہ ۳۔

آملہ، زردچوبہ، ہر ایک ۸ گرام، دونوں دواؤں کو پیس کر شہد میں ملائیں اور ۵۲ گرام
ہمراہ شربت بزوری ۲۴ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
نسخہ ۴۔

برگ سنار، صبر، نوشادر، حنظل ہر ایک ۱۲ گرام، گل مار ۶ گرام۔ تمام
دواؤں کو لعاب گھیکوار میں سخت کر کے بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور اگولی کھلائیں، اس کے
بعد دودھ ۲۰۰ ملی لیٹر میں روغن زرد حل کر کے نوش کرائیں۔
نسخہ ۵۔

حلبہ، نانخواہ، تخم گدر، تخم کرفس، سداب، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو
پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

• خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ مالش۔

کافور اگرام، سرکہ ۱۵ ملی لیٹر میں حل کر کے مقام درد پر مالش کرائیں۔

نسخہ نطول۔

پرسیاوشاں، بید انجیر، خار خشک، بابونہ، بنفشہ، اکلیل الملک، کرفس، گل خلی،
حب القلت، حلیبہ، پوست تنج بادیان، تخم کشوث، تخم کتان، کاکج بری، برنجاسف،
گل سرخ، انیسون، ہر ایک ۴ گرام، پوست فروزہ، سبوس گندم، ہر ایک ۸ گرام، تخم بیون،
۱۱ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نطول کریں۔

نسخہ نطول۔

گل ٹیسو ۵ گرام، شبت تازہ، پرسیاوشاں خشک، بادیان، کرفس، حلیبہ تازہ۔
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نطول کریں۔

نسخہ تکمید۔

کونار سلم ۱۲ گرام، گلاب خالص ۳ گرام، عرق گلاب میں جوش دے کر اس میں
پڑا بھلو کر تکمید کریں۔

نسخہ تکمید۔

گل ٹیسو ۸ گرام، پرسیاوشاں ۶ گرام، شبت تازہ، بادیان، کرفس، حلیبہ،
ہر ایک ۴ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ٹل چھان کر تکمید کریں۔

نسخہ ضاد۔

کوب خشک، برنجاسف، سعد کوئی، مرزنجوش، ہر ایک ۹ گرام۔ تمام دواؤں کو
پیس کر روغن گل ۴ ملی لیٹر میں ملا کر نیم گرم ضاد کریں۔

نسخہ ضاد۔

زردی بیضہ مرغ کوتا جس کے برتن میں ڈال کر آبخ پر رکھیں اور ہلدی، پانی میں
پیس کر اضافہ کر کے مرہم بنائیں اور ضاد کریں۔

نسخہ آبرزن۔

بابونہ، شبت، خلی، برگ کرنب، پودینہ، حسب ضرورت، ۲ لیٹر پانی میں جوش دے کر
ن چھان کر ۱۵ لیٹر گرم پانی میں ملا کر آبرزن کرائیں۔

قروح الکلیہ

RENAL ULCERS

اس مرض میں کلیہ میں التهاب یا ثبور متفرع ہو جاتے ہیں، جن سے شدید عوارض رونما ہوتے ہیں۔

اسباب |

۱. التهاب کلیہ
۲. مزبہ کلیہ
۳. حصاة الکلیہ
۴. دبیلہ کلیہ
۵. التهاب شانہ
۶. تفع الدم
۷. بورتی و صفراوی خلط
۸. خلط لزج کو طییدہ کرتے وقت زخم بن جانا
۹. فراسس اور ولذاع ادویہ
۱۰. مجاورہ اعضاء کا درم
۱۱. کثرت سے نوشی
۱۲. برودت
۱۳. پسینے کے طبعی اخراج میں رکاوٹ،

علامات |

ماؤن کلیہ کے مقام پر درد ہوتا ہے، جو غالب کے متوازن، شانہ تک بڑھتا ہے اور بعض اوقات خصیہ اور کچھ ران تک پہنچ جاتا ہے۔ خصیہ اوپر کھینچا جاتا ہے،

اور متاثر جانب ران بے حس کی ہو جاتی ہے، متلی تے اور پیاس ہوتی ہے، لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، قبض اور نفخ شکم ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے جس میں خون، پیپ اور قرص کے قشور شامل ہوتے ہیں، احتیاس بول بھی ہو سکتا ہے، نبض سریع، صلب اور ممتلی ہوتی ہے۔

جرم کلیہ میں قرص ہونے کی صورت میں ثقل اور تھمد کے بغیر، مقام کلیہ سے چھوٹی پسلیوں خلف تک درد محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب میں خون، پیپ، بال جیسے اجزاء اور گوشت کے اجزاء خارج ہوتے ہیں، پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، متلی اور پیاس کی شکایت ہوتی ہے۔ انفتاح عروق کی صورت میں درد کے بغیر پیشاب میں تھوڑا تھوڑا خون خارج ہوتا ہے، اترج فشار کلیہ کی صورت میں بخار ہوتا ہے، اضطراب کے ساتھ شدید درد اور سوزش ہوتی ہے، نبض صلب ہوتی ہے، اکال مادہ کی صورت میں پیشاب میں قشور کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لحم کلیہ میں اترج کی صورت میں معمولی درجہ کا درد اور سوزش ہوتی ہے۔

تفصیلی علامات

قروح المثانہ

- ۱۔ پیشاب دشوار کیسے خارج ہوتا ہے۔
- ۲۔ پیشاب میں سفید، بڑے بڑے اور غلیظ قشور خارج ہوتے ہیں۔
- ۳۔ ماند، کچ ران اور قلیب کی جڑ میں شدید درد ہوتا ہے۔
- ۴۔ پیشاب میں خون قلیل مقدار ہوتا ہے اور پیپ وغیرہ اچھی طرح ملی نہیں ہوتی۔
- ۵۔ بدبو شدید ہوتی ہے۔

قروح الکلیہ

- ۱۔ بالعموم پیشاب درد کے بغیر آسانی خارج ہوتا ہے،
- ۲۔ پیشاب میں سرخ قشور خارج ہوتے ہیں۔
- ۳۔ پشت کے پاس خیف درد ہوتا ہے۔
- ۴۔ پیشاب میں پیپ، خون وغیرہ خوب اچھی طرح ملے ہوتے ہیں۔
- ۵۔ بدبو کم ہوتی ہے۔

اصول علاج

۔۔۔۔۔ تبدیلی مزاج کے بعد باسلیق کی فصد کھولیں۔

- _____ مقیات استعمال کرائیں۔
- _____ مدرات استعمال کرائیں۔
- _____ تسکین درد کی تدابیر اختیار کریں۔

علاج ۱

_____ تسکین درد کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بزرالینج ۵۰۰ ملی گرام، ایفون ۲۵۰ ملی گرام، تخم خیار ۷ گرام، تخم کامبر، تخم فرد۔
ہر ایک ۲۵ گرام۔ _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں اور ۵-۳ گرام کھلائیں۔
_____ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بلبلہ، بلبلہ، آملہ، کشنیز خشک، رازیانہ ہر ایک ۶۶ گرام، بڑی کابی منشہ نیم کونڈہ
۲۲ گرام۔ _____ تمام دواؤں کو پانی میں بھلگو کر ہوا دار جگہ رکھیں۔ اور صبح کو ٹی چھان کر
نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

منف تخم تربوزہ، ۳۵ گرام، منف تخم خیارین، کاسج ہر ایک ۵۰۰ گرام، منف تخم لدو،
بزرالینج، تخم فرد، تخم خطی، منف بادام منشہ، کیترا، نشاستہ، اصل السوس، صغ عربی،
تخم کرفس، دم الاغویہ، ایفون، ہر ایک، گرام، طباشیر ۷۰۰ گرام۔ _____ تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر لعاب بیدانہ میں حبوب بنائیں اور تخم خیار، کشنیز خشک، خار خشک، تخم خشتاش ہر ایک
۶ گرام کو پانی میں پس کر شیرہ حاصل کریں اور حبوب، گرام کے ساتھ استعمال کرائیں۔ شیرہ کو نہایت سفید
سے شیریں کر سکتے ہیں۔

نسخہ ۱۔

سنگ جراثیم، بیج بند، تالمکھانہ، تخم فرد، صغ پلاس، کیترا، موکھرو، ہوزن۔ _____
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شکر سفید تمام دواؤں کے ہم وزن ملا کر ۵-۳ گرام ہمراہ لسی
شیرہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

طباشیر، منغ عربی، نشاستہ، کیترا، ہر ایک، گرام، تخم فوفہ، ۵۰ ر. ۱۰ گرام، ریونڈ
چینی، مامیراں چینی، ہر ایک ۵۰ ر. ۲ گرام، زرشک بیدانہ ۲۲ گرام، کنبہ سفید بریاں ۵۲ گرام،
گوکھرو خوردنی، مغز تخم خیار، مغز تخم بادرنجب، ہر ایک ۵۰ ر. ۲ گرام، بنات سفید ۶۰ گرام —
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۵۰ ر. ۱۰ گرام، ہر گاہ لعاب اسپنول ۵۰ ر. ۱۰
گرام، صبح کو اور، گرام، ہر گاہ آب سرد بوقت خواب کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

مروارید ناسفتہ، طباشیر سفید، ہر ایک ۲۲ گرام، سنگ سرمائی، جرابیہود، ہر ایک
۶ گرام، غلب الشبیب ۱۲ گرام، منغ عربی ۳ گرام، غلاب خالص، بید مشک، قند سفید،
شہد خالص، ہر ایک ۲۵۰ گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور باریک پس کر غیرہ
تیار کریں اور ۶ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۳۔

کندر، دم الاخوین، گل ارمنی، کاغذ سوختہ، ہر ایک ۱ گرام — تمام دواؤں کو باریک
پس کر شیرہ تخم خیار میں ملا کر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔

تخم کتان، تخم خلی، تخم حلبہ، ہر ایک ۶ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر
بنات سفید ۲۲ گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ آبرزن ۱۔

گل بنفشہ، گل بابونہ، اکلیل الملک، خار خشک، جو، گل سرخ، ہر ایک ۲۶ گرام،
برگ بید، اسفاناخ، برگ گل سرخ، تخم کنوچ، ہر ایک ۱۲ گرام، کدو کے ٹکڑے — تمام
دواؤں کو آب کنیر میں جوش دے کر آبرزن کرائیں۔

نسخہ آبرزن ۲۔

خار خشک، بابونہ، پرسیاوشاں، حجازی، ہم وزن — تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر آبرزن کرائیں — شدید درد کی صورت میں کوکنار کا اضافہ کریں۔

مذکورہ سابق ادویہ کا نطول کرائیں۔

حصاة کلیہ

RENAL CALCULI

اس مرض میں گروسے میں پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجہ میں شدید، غیر طبعی علامات رونما ہوتی ہیں۔ (درجہ کا نظام غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے۔
میکوین :-

حصاة کلیہ کا فعلی سبب حرارت اور مادی سبب غلیظ اور لیسدار رطوبت ہے، یہ رطوبت بلفم، غلیظ خون یا کوئی اور لزج چیز ہو سکتی ہے، چنانچہ حرارت کی وجہ سے جب اس مادہ کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے تو اجزائی تصور کے نتیجہ میں وہ حصاة (پتھری) کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

حصاة کی پیدائش کے لیے مادہ کا زیادہ غلیظ اور لیسدار ہونا ضروری ہے، چنانچہ کم لزوجت کی صورت میں اس میں بستی بھی رفتہ رفتہ ہوتی ہے، جسے طبیعت رمل (ریگ) کی صورت میں تھوڑا تھوڑا دفع کرتی رہتی ہے۔ اور اس کو حصاة کی شکل اختیار کرنے کا موقع نہیں دیتی اور جب کبھی ان کے اخراج میں کمی واقع ہوتی ہے، رمل (ریگ) جمع ہو کر حصاة کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

در اصل ہر حصاة میں کسی عضوی مادہ (Organic Material) کا

مرکزہ (Nucleus) ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے نمکیات تہہ بہ تہہ

جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تمام نمکیات پیشاب میں قلمی شکل (Crystalline Form)

میں ہوتے ہیں اور حصاة میں Amorphous Granules کی شکل میں جمع


ہوتے ہیں۔
جائے پیدائش :-
درجہ جرم کلیہ

(آ)، حوض الکلیہ
 حصّۃ الکلیہ کی تختوں بالعموم حوض الکلیہ
 میں ہوتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں میں کثیر الوقوع ہے یہ تناسب ۲:۱م کا
 ہے، اور پچاس فیصدی، تیس سے پچاس سال کے لوگوں میں ہوتا ہے۔
 حجم کے اعتبار سے ہم ان کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بڑے حصّۃ، جو غالب میں
 داخل نہیں ہو سکتے، اور کلیہ میں ساکت پڑے رہتے ہیں۔ اور بالعموم ان سے کسی طرح کی مرضی
 علامات بھی رونما نہیں ہوتی، انہیں حصّۃ ساکت کہتے ہیں۔
 حصّۃ کی دوسری قسم وہ ہے جو آسانی جالبین میں جا سکتی ہے، انہیں حصّۃ صغیرہ
 کہہ سکتے ہیں۔ بالعموم یہی مرض کا سبب بنتے ہیں۔

(د) اقسام باعتبار حجم



(ب) اقسام باعتبار کثرت و قلت



شناخت :-

۱. حامض بول :-

حصاة کی یہ قسم گول یا بیضوی، بھورا یا دانے دار، بھاری، سخت اور اوسط درجہ کی ہوتی ہے، اس کا رنگ بھورا زردی مائل یا سرخ ہوتا ہے، یہ ایک سے زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، سب سے چھوٹی حصاة، دانہ ختمش کے برابر ہوتی ہے، عام طور سے یورک ایسڈ یا یورٹیس کے ساتھ ملی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ رد عمل حوضی وسط (Acid Medium) میں ہوتا ہے، یہ حصاة چار سفید، کلیہ میں بنتی ہے۔

۲. حصاة توشیہ :-

حصاة کی یہ قسم کثیر الوقوع ہے، یہ انتہائی سخت، کھردری اور بعض اوقات کانٹے دار ہوتی ہے، جس کو (Malbery Stone) کہا جاتا ہے، یہ شدید خراش (Irritation) پیدا کرتی ہے، کھردری اور کانٹے دار ہونے کی وجہ سے اس سے خراش پیدا ہو کر خون نکلنے لگتا ہے، جو اس پر جم جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے، کئی ہوئی سطح مختلف تہوں میں نظر آتی ہے، تاہم اس کی بیرونی سطح عام طور سے یورٹیس (Urates) سے پوشیدہ رہتی ہے، اس کا رد عمل اتعلی وسط (Alkaline Medium) میں ہوتا ہے، یہ ساتھ فی صدمہ گردے میں بنتی ہے۔

۳. حصاة قیولیہ :-

اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، سطح چکنی اور چاک کی مانند خستہ ہوتی ہے، باسانی ٹوٹ جاتی ہے، یہ دانہ مڑے بیضہ مرنگ کے برابر ہو سکتی ہے۔

اسباب |

نظام ہضم :-

۱. نظام ہضم کے مختلف غذائی تغیرات میں نقص

امراض اعصاب :-

امراض کلیہ و مجری بول :-

Nephro Cirrhosis

ضمور کلیہ

دفعہ کلیہ

مجری بول کا تعدیہ

High Concentration of Urinary Salts

Hydronephrosis

استسقاء کلیہ

Pyonephrosis

ریم کلیہ

سلانی کے ٹائیکے کا جذب نہ ہونا۔

ضرر کلیہ

امراض مفاصل :-

دفعہ المفاصل

نقرس

غذائی بے اعتدالی :-

بکثرت گوشت خوری

بکثرت میوہ جات اور ترکاری کھانا

پانی اور دوسری سیال اشیا کا کم استعمال کرنا

حش یا شیریں اشیا کا بکثرت استعمال

ثقیل غلیظ اور معدنی اجزاء کی بکثرت شمولیت والا پانی نوش کرنا

حیاتین کمی۔

تفرقات :-

Para Thyroid Tumours

جارا لدرتی سلعات

Prolonged Immobility

طوالت یافتہ عدم حرکت

حالت استراحت کی صورت میں بھی تھوڑا سا جھکاؤ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مرضی علامات بالعموم مفقود ہوتی ہیں۔

حصاة توشیہ چونکہ بہت زیادہ خراش آور ہوتی ہے اس لیے درد زیادہ ہوتا ہے اور بول الدم ہوتا ہے۔

تولج اور حصاة الکلیہ میں بعض اوقات معالج کو اشتباہ ہو سکتا ہے، لہذا ذیل میں تفریقی و تشخیصی علامات درج کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تولج عمومی

تولج کلیوی

۱۔ پیشاب طبعی ہوتا ہے

۱۔ تقطیر البول اور اس میں خون یا

پیپ کی آمیزش ہوتی ہے

۲۔ خفصیوں میں درد نہیں ہوتا

۲۔ خفصے منقبض اور ان میں درد ہوتا ہے

۳۔ قسم سہری میں شدید درد ہوتا ہے

۳۔ حالبین، خفصیوں اور خفصیب میں

درد ہوتا ہے

۴۔ درد میں نشتریت نہیں ہوتی

۴۔ بوجہ، نشتریت کا احساس ہوتا ہے

۵۔ تے نہیں ہوتی

۵۔ تے ہوتی ہے۔

۶۔ ران میں حذر نہیں ہوتا

۶۔ ران میں نمایاں حذر ہوتا ہے

تشخیص کو مزید یقینی بنانے کے لیے در ذیل ٹسٹ کئے جاسکتے ہیں۔

بول، خورد بینی کا شفعہ، قلیں، بورک ابید، آگزیسٹ

Urine Culture Test R.B.C. and Puscells Crystals-Uric Acid Oxalic

Radiography

Plan X-Ray for Renal Region

کلیوی خطے کے لیے شعاعی امتحان۔

Intra Venous Pyelography

دروں دریدی کلیہ نگاری۔

اصول علاج |

- _____ مقیات، مفتحات اور مدرات استعمال کرائیں تاہم اس میں احتیاط لازم ہے۔
- _____ مفتحات استعمال کرائیں۔
- _____ حقنہ لینہ کریں۔
- _____ حسب ضرورت ہاسلیق کی فصد کھولیں۔
- _____ آبرزن، سنگیدہ، نطول اور قطور و غیرہ نڈا ایر اختیار کریں۔
- _____ مسکنات استعمال کرائیں۔

علاج |

- _____ گل داؤد کا ۱۸ گرام کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
- _____ جواکھار ۵ گرام، ہم وزن شکر میں ملا کر استعمال کرائیں۔
- _____ جبر الیہود ۱ گرام، پیس کر کھلائیں۔
- _____ خار خشک ۱۲ گرام، جوہر نوشادر، دانہ بیل خورد، کشتہ قلعی، کا فور،
- برایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر ۲۵۰ ملی گرام کی _____ ۴۸ پڑیاں بنائیں اور
- پوست خود ۳ گرام، شب بیری بیاں ۱ گرام شیر محوؤ ۲۵۰ ملی لیٹر، مٹی کے ایک کورے
- کوزے میں بھگوئیں اور صبح کو ل چھان کر نڈا کودہ سفوف کی ایک پڑیہ اس میں ملائیں اور صبح کو
- نوش کرائیں، شام کو ایک پڑیہ ہمراہ عرق بادیاں ۲۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
- _____ سنگ ہرای، جبر الیہود، کشتہ قلعی، مغز بادام، مغز تخم خربزہ، مغز تخم خیار،
- پرسیاوشاں، تخم کرفس، ناغخواہ، زیرہ سفید، پوست بیضہ مرغ سوختہ، عقرب
- سوختہ، خار خشک، جواکھار ہم وزن _____ تمام دواؤں کا سفوف بنائیں اور ۱ گرام ہراہ
- آب برگ تحوب ۲۴ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
- _____ نوشادر، شورہ قلعی، جواکھار، مولی کھار، تخم خربزہ، پوست خربزہ،
- جنتیانہ، خار خشک ہر ایک ۵ گرام، جبر الیہود، کالج ہر ایک ۵ گرام، فلفل، دار فلفل،
- زنجبیل، ہر ایک ۱ گرام، ریوند خطائی، عقرب سوختہ ہر ایک ۶ گرام _____ تمام دواؤں کو

باریک پس کر شہد تین گنا ملا کر، گرام استعمال کرائیں
 ۱۔ سر پھو کہ سفید ۵۳ گرام، سیندھانک ۵۱ گرام، کلثی ۲۲ گرام، تینوں
 دواؤں کو ۳۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو چھان کر تین مرتبہ نوش کرائیں،
 یہ دوا تین دن سے زیادہ نہ نوش کرائیں۔

۲۔ مفز خشک دانہ، مفز خستہ آلو بالو، ہر ایک ۱۲ گرام، سنگ سرمہ ہی،
 حجر الیہود، حب القلن، بادیان ہر ایک ۲۲ گرام، تخم کرنس، تخم کشوت ہر ایک ۲۶ گرام، مفز
 تخم خربزہ، مفز تخم خیارین، مفز تخم کدو، کاج ہر ایک ۱۲ گرام، شہد خالص ۶۰ ملی لیٹر۔
 تمام دواؤں کو باریک پس کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۲۴ گرام ہر روز عرق غار شتر
 و خار خشک استعمال کرائیں۔

۳۔ حجر الیہود ۲ گرام، سنگ سرمہ ہی، سہاگہ بریاں، کلثی، نوشادر، شب
 یمانی بریاں، کاج، تخم ترب، تخم شبت، زیرہ سفید، ریونڈ چینی، کباب چینی، شورہ قلمی،
 دانہ ہیل کلاں، جوا کھار، ہر ایک ۶ گرام، نبات سفید ۸۵ گرام، تمام دواؤں کو
 کوٹ چھان کر ۲۰۰ گرام ہر روز آب ترب نوش کرائیں۔

۴۔ عقرب سوختہ ۳ گرام، حجر الیہود، سنگ سرمہ ہی ہر ایک ۱۲ گرام،
 کلثی ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر آب ترب سبز اور روغن بادام شیریں
 میں تین دن سخت کریں اور شیر خشت ۱۲ ملی لیٹر، ترخمین خراسانی، نبات سفید ہر ایک
 ۶۰ گرام ملا کر سفوف بنائیں اور ۳ گرام کھلائیں۔

۵۔ تخم ترب، کلثی، حجر الیہود، سنگ سرمہ ہی ہر ایک ۱۲ گرام، تمام
 دواؤں کو باریک پس کر شربت کشوت ۱۲۱۲ میٹر ملا کر چٹائیں، اور تخم خیارین،
 مفز تخم قرطم، مفز تخم خربزہ، خار خشک، بادیان ہر ایک ۶ گرام، حب کاج ۲ گرام کو ۲۵۰
 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں اور گھنڈہ آفتابی ۲۴ گرام حل کر کے مل چھان کر نوش کرائیں۔

۶۔ مفز تخم خربزہ ۸ گرام، مفز تخم خیار ۹ گرام، مفز بادام مقشر، گلاب
 ہر ایک ۵ گرام، زعفران ۶ گرام، قنب الثعلب، گرام، تخم بیون ۱۰ گرام، حجر التیس،
 ۲۴ گرام، درق طلا، درق نقرہ ہر ایک ۳ گرام، زردی بیضہ مرغ ۵۵۵۵، نبات سفید
 دو گنا، تمام دواؤں کا حسب دستور معجون بنائیں اور ۹ گرام کھلائیں۔

گل ٹیسو ۸۰ گرام، پرسیاوشاں ۳۶ گرام، جب القلت، تخم شبت، تخم خربزہ،
گل آکھ ہر ایک ۲۴ گرام، تمام دواؤں کو ۱۰ لیٹر پانی میں جوش دیں، جب
تہائی رہ جائے تو مقام درد پر نطول کریں۔
نسخہ نطول :-


گل میو، گل بابونہ، تخم خیارین، تخم خربزہ، ہر ایک ۲ گرام کو پانی میں جو شہ
دے کر نطول کریں۔
نسخہ آہرن ہ۔

بابونہ، شہت، خطمی، برگ کرنب، پودینہ _____ تمام دواؤں کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر پانی گرم، ۱۰ لیٹر میں ڈال کر آہزن کرائیں۔

سیدہ کلیہ

اس مرض میں مجاری کلیہ میں سدے پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اقسام ۱-



اسباب |

۱. خلیظ، یسدا ر اخلاط
۲. التهاب درم

علامات |

مقام کلیہ پر گرانی محسوس ہوتی ہے، پیشاب رقیق اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے، مقام کلیہ درد اور تکلیف بھی محسوس ہو سکتی ہے، بخار ہوتا ہے، درمی میں اس کی روئیداد ملتی ہے۔

اصول علاج |

- درم کی صورت میں التهاب / درم کلیہ کا اصول علاج اور علاج اختیار کرنا۔
- خلیظ یسدا ر اخلاط کی صورت قاطع اور ملطف ادویہ دیں۔
- منقعات دیں۔

علاج |

• حب بلساں، عود بلساں، دارچینی، بادیان، بادام تلخ، تخم کرفس، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر لچھان کر شربت بزدوری ۲۴ ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

• فطر اسابیون، جعدہ جمیلی، فارلقیون مغزی، کبابہ، بادیان، امیون، افستین روی، حب بلساں، عود بلساں، تخم کرفس، بادام تلخ، دارچینی، خونجان، تخم ملیون، عود صلیب، مغز حب الملح، برگ کبر، اسارون، فجاج اذخر، دج ترکی، کاشم روی، مقل ارزق، ہم دزن کو کوٹ کر چھان کر تین گنا شہد ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۰۰ ملی لیٹر، گرام ۶ ہمارہ درج ذیل عرق نوش کرائیں۔

نسخہ عرق ۱۔

حب بلساں، عود بلساں، کاشم روی، تخم کرفس، دج ترکی، ہر ایک ۶ گرام،

اسارون، نقاح اذخر، انیسون، ہر ایک ۵۰ گرام، عود صلیب ۵۰ گرام — تمام
دواؤں کو پانی میں بھگو کر حسب دستور ۲۵۰ ملی لیٹر عرق کشید کریں۔ اور ۶۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
۔ — بادیاں، نخود، انیسون ہم وزن، بادام تلخ نصف حصہ — تمام دواؤں کو
پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

تدرن کلیہ

RENAL TUBERCULOSIS

اس مرض میں ابتدائی یا ثانوی تعدیہ کی وجہ سے کلیہ میں دقتی عوارض رونما ہوتے
ہیں۔

اسباب

Microbacterium Tuberculosis

خورد جرثومی تدرن

۱،

Sterile Pyuria

عقیم تلح البول

۲،

تدرن رلیوی سے بالواسطہ

۳،

تدرن غد دلمغایہ سے بالواسطہ

۴،

علامات

مکرمین ثقل کے ساتھ درد ہوتا ہے، کثرت بول کی شکایت ہوتی ہے، وقفہ سے
بخار بھی ہوتا ہے، پیشاب میں رطوبت، بیضیہ، مدیری خلیات اور کرات حرا پائے جلتے
ہیں، — دقتی عصا رگی موجود ہوتے ہیں — بعض اوقات مرض کی کوئی
ظاہری علامت موجود نہیں ہوتی، صرف پیشاب کا معائنہ کرنے یا
ذریعہ ہا مرض کا پتہ چلتا ہے۔

تفریقی علامات

سرطان کلیہ	تدرن کلیہ
۱۔ سرطان کی سرگزشت متعجب ہے	۱۔ تدرن کی سرگزشت متعجب ہے
۲۔ پیشاب میں رومی اجزاء پائے جاتے ہیں	۲۔ پیشاب میں رومی اجزاء پائے جاتے ہیں
۳۔ رومی رسلہ میں ذکات میں مضمون ہوتا ہے	۳۔ دبائے سے رومی میں درد محسوس ہوتا ہے
۴۔ خضیبہ یا فہرہ مذی میں کوئی مرض نہیں ہوتا	۴۔ خضیبہ یا فہرہ مذی میں تدرن ہوتا ہے
۵۔ رومی علامات موجود نہیں ہوتی	۵۔ تدرن رومی
۶۔ عی دقہ دیر میں ظاہر ہوتا ہے	۶۔ عی دقہ جلد ظاہر ہوتا ہے
۷۔ رسلہ بالعموم بڑا ہوتا ہے	۷۔ رسلہ شاذ و نادر ہوتا ہے

اصول علاج

- ۱۔ درم کلیہ صلب کا اصول علاج اختیار کریں۔
- ۲۔ محلل اضمحہ استعمال کریں۔
- ۳۔ تدرن عمومی / دقہ میں مستعمل دوائیں استعمال کریں۔

علاج

- ۱۔ تخم خطی، تخم کتاں، تخم خیارین، تخم تر بوز، ہر ایک ۶ گرام، تخم حلبہ ۲ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان کر نوش کریں۔
- ۲۔ بید، کبریا، سرطان سوختہ ہر ایک ۵ گرام، نبات سفید دو گنا۔
- ۳۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اقراص بنائیں اور ۲ گرام ہمراہ نقوع گلو، سبز، خشکاش، ہر ایک ۲ گرام، اور شربت اعجاز ۲۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کریں۔
- ۴۔ طباشیر کبود، برادہ مندل سفید، کبریا، تمبی، دم الاخوین، سرطان سوختہ، کافور خالص، دانہ ہیل کلاں، زہر ہرہ خطائی، نشاستہ، ہر ایک ۲ گرام، بادیان ۲ گرام، گل ارمنی، ست گلو، ہر ایک ۳ گرام، کشتہ ابرک سفید، صمغ عربہ، ہر ایک ۳ گرام، کشتہ عقیق، ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر لعاب گاؤز بان۔

کے ساتھ ۳ گرام کی اقراص بنائیں اور آقرص صبح، شام، ہمراہ شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر، شربت گل بانہ ۱۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

_____۔ مرجان، بے، ابرک سفید مقرر، مروارید ناسفتہ، برادہ نقرہ،
برادہ طلا، سرطان سوختہ ہر ایک ۳ گرام _____ تمام دواؤں کو آب میمون کا خد ہی میں
دو دن کھل کریں، تیسرے، چوتھے دن لعاب صبر میں کھل کر کے اقراص بنائیں اور ہر گ
علا ب کوٹ کر ۶۰ گرام کی دو گویاں بنائیں اور ان اقراص کے درمیان رکھ کر بوتہ میں گل حکمت
کریں، اور ۶ پیرا پلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال کر عرق علا ب میں ایک دی کھل
کر کے محفوظ کر لیں اور ۱۲ ملی گرام ہمراہ شیر خرمہ استعمال کرائیں۔
_____۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخ مضاد

اکلیل الملک، بابونہ، حلبہ، خضلی، حوکل، اشق، ہم وزن کو پانی میں جوش دیکر
اسی میں پیس کر صفا کریں۔

نسخہ مالش :-

روحن قسط یا روضن بابونہ کی مقام کلیہ پر مالش کریں۔

•۔۔۔۔۔ تدرن ریه کے ذیلی میں بیان کردہ علاج اپنائیں۔

تسمبول

URAEMIA

اس مرض میں پیشاب کے کئی اجزاء، دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے بیش تنائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور عصبی نظام مختل ہو جاتا ہے۔

اسباب

امراض کلیہ۔

٢، الكتاب الكبير

۱. نزال کلیہ
 ۲. جریان الدم
 ۳. کلیہ کا مرض کیسوی
 ۴. تمدن کلیہ
 ۵. استقار الکلیہ
 ۶. امراض مشانہ و۔
 ۷. احتیاس البول
 ۸. عدم تولید بول
 ۹. امراض حالبین و۔
 ۱۰. انسداد حالبین
 ۱۱. بطلان حالبین
 ۱۲. متفرقات و۔
 ۱۳. انسداد مرارہ
 ۱۴. نفث الدم
 ۱۵. سور مزاج کبد
 ۱۶. رطوبت مائیه کا بکثرت اخراج
 ۱۷. انتقال الدم
 ۱۸. الکلی کا بکثرت استعال

علامات |

مستقل درد سر اور دوڑا ہوتا ہے، کرب و اضطراب اور عضلاتی ریشہ ہوتا ہے
 مرین دن میں اونگھتا ہے اور رات میں بے خوابی کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے، بعد میں
 مجنوط الحواس ہو جاتا ہے، نسیان ہوتا ہے، سمیت بول کی وجہ سے فنودگی اور
 بے ہوشی ہوتی ہے، تنگی تنفس کی وجہ سے مرین اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ معدی و معوی
 اختلالات بھی ہوتے ہیں، مثلاً پیاس کی شدت، قلت اشتہار، متلی تے، اور قسم شراسینی میں

درد، اور اسہال و غیرہ، بالعموم جسم لافز ہو جاتا ہے، تنفس میں مخصوص بو ہوتی ہے۔ اور مخصوص ذائقہ کا احساس بھی ہوتا ہے، نظام دوران خون میں فساد کی وجہ سے امراض قلب بھی رونما ہوتے ہیں۔ محدود قلبی میں درد ہوتا ہے، نمایاں قلت الدم کی شکایت ہوتی ہے قوت سامعہ اور بامرہ بھی متاثر ہوتی ہے، کھانسی اور ذات الریہ بھی ہو سکتا ہے، جلدی کیفیات مثلاً بوجست، خشونت اور خارش ہوتی ہے، جلدی تقشر، اکڑیا، شری، اور التهاب جلد ہوتا ہے، پیشاب کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، آخر میں احتباس البول ہوتا ہے اور تشنج یا سبات ہو کر مرین مر جاتا ہے۔

تفریقی علامات

سبات فالجی

- ۱۔ امراض نظام دوران خون یا ضربہ کی سرگزشت طبعی ہے
- ۲۔ تشنج نہیں ہوتا۔
- ۳۔ خراٹے بدقت آتے ہیں۔
- ۴۔ ایک طرف فالج اور تشنج ہوتا ہے۔
- ۵۔ پیشاب طبعی ہوتا ہے۔
- ۶۔ پتلیاں منسط اور غیر مساوی ہوتی ہیں۔
- ۷۔ تشنج نہیں ہوتا۔
- ۸۔ مرین کے پسینہ اور پیشاب میں فیڑی بو نہیں ہوتی۔
- ۹۔ پتلیاں روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔

سبات ذیابیطس

- ۱۔ ذیابیطس کی سرگزشت ہوتی۔

تسم بول

- ۱۔ کلوی امراض، بالخصوص التهاب کلیہ کی سرگزشت طبعی ہے
- ۲۔ تشنج ہوتا ہے۔
- ۳۔ تیز خراٹے اور سانپ کی پھنکار کی سی آواز آتی ہے۔
- ۴۔ فالج نہیں ہوتا۔
- ۵۔ پیشاب میں رطوبت بیضیہ اور قشور آتے ہیں۔
- ۶۔ پتلیاں منسط یا طبعی ہوتی ہیں۔
- ۷۔ تمام جسم پر تشنج ہوتا ہے۔
- ۸۔ مرین کے پسینہ اور پیشاب میں مخصوص بو ہوتی ہے۔
- ۹۔ پتلیاں روشنی سے متاثر ہوتی ہیں۔

تسم بول

- ۱۔ امراض کلیہ بالخصوص ورم کلیہ کی سرگزشت ہوتی ہے۔

- | | |
|---|---|
| ۲۔ پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے۔ | ۲۔ پیشاب میں رطوبت بیضیہ اور قشور خارج ہوتے ہیں۔ |
| ۳۔ پیشاب کثیر مقدار میں اور بلا ارادہ خارج ہوتا ہے۔ | ۳۔ پیشاب قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے یا احتباس بول ہوتا ہے۔ |
| ۴۔ مرض کی ابتدا غنودگی یا شدید تکلیف سے ہوتی ہے۔ | ۴۔ مرض کی ابتدا خفیف ہذیان یا تشنج سے ہوتی ہے۔ |
| ۵۔ عام لافری ہوتی ہے۔ | ۵۔ عام تھک ہوتا ہے۔ |
| ۶۔ تنفس اور پیشاب میں شکر کی بو آتی ہے۔ | ۶۔ مریض کے پاس سے پیشاب کی بو آتی ہے۔ |
| ۷۔ چہرہ مومی نہیں ہوتا۔ | ۷۔ چہرہ مومی ہوتا ہے۔ |
| ۸۔ نبض ضعیف اور صغیر ہوتی ہے۔ | ۸۔ نبض قوی اور مستکی ہوتی ہے۔ |

اصول علاج |

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ مدرات اور معرقات استعمال کرائیں، مہلات دیں۔
- ۳۔ مصفیات استعمال کرائیں۔
- ۴۔ نمکید کریں / عام حار کرائیں۔
- ۵۔ تعلیق کریں، نصد کھولیں، سنگیاں کھجوائیں۔

علاج |

- ۱۔ شیرہ تخم خیاریں، شیرہ تخم خارفسک، شیرہ تخم کاسنی، مکوہ نیم وزن میں شربت بنو ذری ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- ۲۔ مغز فلوں خیارشہد ۶۰ گرام کو پانی میں حل کر کے نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

امراض مثانہ

Learn Unani By Abdul Waqar Salman

مثانہ کی مختصر تشریح اور منافع

تشریح |

مثانہ ایک عضلی تھیلی ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے، اس کی ساخت میں اغشیہ اور ریشہ دار طبقہ ہوتا ہے۔

مثانہ، عانہ میں واقع ہے اور نسج لیلی (Fibrous) سے ملفوف ہوتا ہے۔ اس کی شکل، عمر، جنس اور خالی دھڑے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایام طفولیت میں یہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، اور عانہ سے اوپر شکم میں پیونچا ہوا ہوتا ہے جو انی میں خلوہ کی صورت میں شلت شکل کا ہوتا ہے، اور عانہ کے اندر ہی رہتا ہے اور معمولی طور پر بھرے ہونے کی صورت میں گول اور غیر معمولی طور پر بھرے ہونے کی صورت میں بیضوی شکل کا ہو جاتا ہے اور شکم میں ناف کے پاس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا راس (Apex) ارتفاق العانی (Pubis Symphysis) کے نیچے واقع ہے، اور قاعدہ (Base) پیچھے معارستقیم کے سامنے واقع ہوتا ہے، اس میں ۱ بالائی، ۲ زیریں پہلوی سطحیں ہوتی ہیں۔ منقہ مثانہ سے مخرج البول شروع ہوتا ہے۔

دموی پرورش :-

اس کی دموی پرورش شرائین خامری باطن، بالائی وزیریں مثانی شاخوں (Vesical

Branches) اور صفہ مثانیہ (Vesical Pleyus) کے ذریعہ ہوتی ہے۔

عصبی پرورش :-

عصبی پرورش اعصاب شریکیہ اور اعصاب مقابل شریکیہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔

منافع

اس میں پیشاب اکٹھا ہوتا رہتا ہے، غنق المثانہ کا عضلہ عام طور سے سکڑا رہتا ہے لیکن پیشاب سے پر ہو جانے پر یہ عضلہ مسترخ ہو جاتا ہے اور مثانہ بھی سکڑنے لگتا ہے۔ جس سے پیشاب خارج ہوتا ہے۔

التهاب مثانہ

CYSTITIS

اس مرض میں مثانہ یا غنق مثانہ میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں، یہ مرض بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔ اور نہایت مہلک تصور کیا جاتا ہے۔

اقسام

التهاب مثانہ حاد
التهاب مثانہ مزمن

اسباب

- ۱۔ عصبی امراض۔
- ۲۔ ہزال النخاع
- ۳۔ امراض کلیہ۔
- ۴۔ التهاب حوض کلیہ

امراض مثانہ۔

- ۱۔ حصاة مثانہ
- ۲۔ ضربہ مثانہ

۱۱. ضعف شانه
 ۱۲. احتباس بول
 ۱۳. مثانہ اور قولون کا التواء
 ۱۴. سلعہ خزانہ
 ۱۵. امراض اعصاب و تناسل :-
 ۱۶. درم اچیل
 ۱۷. درم رحم
 ۱۸. سلعہ رحم
 ۱۹. سلعہ خصیتہ الرحم
 ۲۰. غنم غدہ مذی
 ۲۱. انقلاب رحم
 ۲۲. امراض مجری بول :-
 ۲۳. قروح مجری بول
 ۲۴. امراض مفاصل :-
 ۲۵. وجع المفاصل
 ۲۶. نقرس
 ۲۷. امراض معدہ و امعاء :-
 ۲۸. درم مقعد
 ۲۹. امراض غدہ غیر ناقلم :-
 ۳۰. ذیابیطس
 ۳۱. غذائی بے اعتدالی :-
 ۳۲. پر خمدی

متفرقات :-

۱. تیز و خراش آرد ادویہ / اخذیہ

۴۔ غلبہ برودت (سردی لگنا، پانی میں بھیگنا،

۵۔ غلبہ بلغم

۶۔ سوزاک

علامات

تعدیہ سے بچنے کے لیے مشانہ میں قدرتی طور پر قوت مدافعت موجود ہے جس کے سبب حاد تعدیہ کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، تاہم حاد التهاب ہو تو، درج ذیل علامات ملتی ہیں۔

مرض یکبارگی شروع ہوتا ہے حرقشی (_____) یا مجانی حصہ میں چھن کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، حادہ میں بھی درم آجاتا ہے، بعض اوقات سرخی باہر سے بھی معلوم ہوتی ہے، درم کی وجہ سے پاخانہ بھی بند ہو سکتا ہے، معاد مستقیم تک درم کے اثر انداز ہونے سے بار بار رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، ریٹینے پر خون اور آنوں آئیز تھوڑا سا پر از خارج ہوتا ہے۔ معاد مستقیم میں انگلی داخل کرنے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے یا بالکل رک جاتا ہے، زرد لگانے پر پیشاب کے چند قطرے نکل آتے ہیں، پیشاب بار بار جلن کے ساتھ آتا ہے، بول میں ابتداء میں تیزابیت ہوتی ہے۔ بعد میں غلیظ، بلغم آمیز یا خون آمیز خارج ہوتا ہے۔ مشانہ میں پیشاب کا جمع ہونا طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے اور رین کو پیشاب کی شدید حاجت ہوتی ہے، لہذا کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتا ہے، زبان سیاہ ہوتی ہے، متلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، مشانہ کے ساتھ بحری بول کی دیوار میں بھی انتہائی کیفیت پائی جاتی ہے، غدہ ندی پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے جس کی سمیسیں ران تک جاتی ہیں۔ شدید پیاس ہوتی ہے، بعض اوقات جسم سے سرد پسینہ خارج ہوتا ہے، نبض ضعیف ہوتی ہے، ——— عدم شفا کی صورت میں ۱۲-۱۴ یوم میں رین فوت ہو جاتا ہے۔

مزمن

علامات میں شدت نہیں ہوتی، البتہ پیشاب بار بار ضرور آتا ہے، جس کا رد عمل کھاری ہوتا ہے، اس میں پیپ اور مخاط بھی پائی جاتی ہے۔ پیشاب کرنے کے باوجود پیشاب کی حاجت

نسوس ہوتی ہے۔ درم کے بڑھ ہونے کی صورت میں چھو کر بھی محسوس کیا جاسکتا ہے، خفیف صورت میں میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے۔ شانہ کی دیوار دبیز اور لیغیتی رہتی ہے اور بعض اوقات پیشاب کا بہاؤ مخالف سمت میں ہونے لگتا ہے۔

انتہاب شانہ

- ۱۔ حرارت طبعی ہوتی ہے
- ۲۔ الم قاطع ہوتا ہے
- ۳۔ درد دوری ہوتا ہے
- ۴۔ پیشاب طبعی ہوتا ہے

- ۱۔ حرارت زیادہ ہوتی ہے۔
- ۲۔ الم حرقتی ہوتا ہے۔
- ۳۔ درد ہمیشہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ پیشاب میں بلغم اور پیپ خارج ہوتی ہے۔

- ۵۔ دورہ کے وقت پیشاب کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔
- ۶۔ پیشاب کی حدت سے سوزش و درد میں اضافہ نہیں ہوتا۔

- ۵۔ پیشاب کرتے وقت سوزش اور درد ہوتا ہے۔
- ۶۔ پیشاب کی حدت سے سوزش اور درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

انتہاب کلیہ حاد

- ۱۔ درد پشت میں ہوتا ہے
- ۲۔ درد زیادہ شدید نہیں ہوتا
- ۳۔ پیشاب کرنے وقت کسی قدر درد ہوتا ہے
- ۴۔ پیشاب میں مخاط اور پیپ کی مقدار کم ہوتی ہے
- ۵۔ رطوبت زلالیہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے
- ۶۔ پیشاب دسوی ہوتا ہے
- ۷۔ پیشاب میں قشور نشانی ہوتا ہے۔
- ۸۔ استفادہ ہوتا ہے
- ۹۔ جسمانی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں

انتہاب شانہ حاد

- ۱۔ درد شانہ اور قیض میں ہوتا ہے
- ۲۔ درد شدید، سوزش اور جلن ہوتی ہے
- ۳۔ پیشاب کرتے وقت سوزش ہوتی ہے
- ۴۔ پیشاب میں مخاط اور پیپ زیادہ شامل ہوتا ہے
- ۵۔ رطوبت زلالیہ بہت کم ہوتی ہے۔
- ۶۔ پیشاب مموٹا فیر دسوی ہوتا ہے
- ۷۔ پیشاب میں قشور نہیں ہوتے۔
- ۸۔ استفادہ نہیں ہوتا
- ۹۔ جسمانی علامات نسبتاً خفیف ہوتی ہیں

اصول علاج |

• ابتدائی مرحلے میں قصہ کھولیں اور تلیسین طبع کی تدابیر اختیار کریں۔

• نطول کریں۔

• ضہاد کریں۔

• مقیات اور محلات استعمال کرائیں۔

علاج |

• مرض کی ابتدا میں مریض کے قوی کو مد نظر رکھتے ہوئے باسلیق کی قصہ کھولیں، تین دن بعد مابقی کی قصہ کھولیں۔

• تلیسین کے لیے مغز فلوس خیاریں ۱۲ گرام آب غلب الثعلب ۲۳ ملی لیٹر میں حل کر کے روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔ اس کے بعد لعاب بہدانہ شیرہ خشک ہر ایک ۶ گرام کو شربت آلو بخارہ ۲۳ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔ تبدیلی مزاج کے لیے مجرب و مفید ہے۔

• مغز تخم خیاریں، مغز تخم خربوزہ، ہر ایک ۴ گرام، تخم قطی، تخم خبازی، تخم کنوب، تخم تنہاں ہر ایک ۶ گرام تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف کی طرح بنائیں اور حبلہ، پرسیاوشا، ہر ایک ۶ گرام کے جوشاندہ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اعلیٰ درجہ کا محلل اور ام ہے۔

• خارخک، خستہ آلو پاو، ہر ایک ۶ گرام، تخم خربوزہ ۵۶ گرام، بادیاہ ۹

گرام تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے طق غلب الثعلب ۵۷ ملی لیٹر میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

• تخم خیاریں، تخم خربوزہ، مغز تخم کدو شیریں، تخم خرفہ ہر ایک ۶ گرام، غلب

الغلب خشک ۵ گرام تمام دواؤں کا پانی میں شیرہ نکال کر آب کو، سبز مردق ۴۸ ملی لیٹر، شربت فاس ۲۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• کرم کلمہ اور چنے کا پانی نوش کرائیں۔

• تخم خیاریں، خارخک، تخم خربوزہ، ہر ایک ۳ گرام کا شیرہ پانی میں نکال کر

آب کاسنی بزمردق، آب عنب الثعلب بزمردق ہر ایک ۴۰ ملی لیٹر، شربت بزدوری ۲۵ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں۔

____۔ مزمع صورت میں درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں۔

نسخہ

عنب اشعلب خشک، تخم خیارین، خار خشک، ہر ایک ۶ گرام، پانی میں جوش دے کر
 مل جھان کر شربت بزردی ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ

تخم خیارین، پر سیا و شاں، مغز فلوس خیار شبنم ہر ایک ۶ گرام، ایسون، ہیون، ہر ایک ۴ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر روغن بادام ۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ دار

اکلیل الملک، تخم حلبہ، ہر ایک ۴ گرام، تخم کتان، تخم خطمی، تخم قرطم، خارخوص، پرسیاوشاں، ہر ایک ۶ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان کر نوش کرائیں۔
•۔۔۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل ادویات و تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ مضامین۔

بابوند، کور خشک، اسپنول، تخم ریحاں، آرد جو، گل خطی، ہر ایک مہ گرام، رستہ انگرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کمر آب مکوہ سبز، روغن گل اور سرکہ میں ملا کر خدا کرے۔

النسبۃ ضارہ

آب کھور سبز، آب برنج کاسنی، موسم، روغن گل، روغن بنفشہ، ہم وزن کی قیروملی
بننا کر خضاد کریں۔

نسوة ضمادہ۔

برگ کرنب، بابونہ، مسک، شلم، موم اور روغن گل کا حسب دستور مضاد لگائیں۔

نسخہ مضامین۔

آرد جو، تخم کتان، گل خطمی، گل سرخ، گل بابونه، غیب الثعلب خشک، اکلیل الہک
رزنجوش ہر ایک ۴ گرام، رسوت زرد ۲ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پیسٹ

۵ لیٹر ملا کر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو زردی بیضہ سرخ ۲ عدد، روغن گل ۲۲ لیٹر
سن کر کے ملائیں اور مقام شانہ پر خداد کریں۔ شدت درد کی صورت میں اس نسخہ میں
افیرن خالص ۲۵۰ لی گرام شامل کر لیں۔

احتباس کی صورت میں درج ذیل مراد استعمال کریں۔

نسخہ مضاد ۱۔

کچھ مقشر کو تارہ دودھ میں پس کر خداد کریں۔

نسخہ نطول ۱۔

پرسیاوشان، گل سرخ، گل خطمی، ہر ایک ۲۲ گرام، تخم ترب ۲ گرام، عنب الثعلب
۲۲ گرام۔ تمام دواؤں کو ۵ لیٹر پانی میں جوش دے کر مقام شانہ پر نطول کریں۔
نسخہ نطول ۱۔

بنفشہ خطمی، خبازی، کوکنار، ہر ایک ۲۲ گرام کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دے کر
نطول کریں۔

نسخہ نطول ۱۔

بابونہ، اکلیل الملک، حلبہ، تخم خطمی، تخم کتان، حب قطم، خار خشک، پرسیاوشان،
ہر ایک ۲۲ گرام، کو ۶ لیٹر پانی میں پکا کر چھان کر شانہ پر نطول کریں۔
نسخہ نطول ۱۔

پوست خشناس ۲۲ گرام، ۳ لیٹر پانی میں جوش دے کر نطول کریں۔

نسخہ آبزن ۱۔

خطمی، خبازی، بنفشہ ہر ایک ۶۰ گرام کو پانی ۲ لیٹر میں جوش دے کر ۲۰ لیٹر گرم
پانی ملا کر آبزن کرائیں۔

نسخہ آبزن ۱۔

ہیون، انیسون، ہر ایک ۲۲ گرام، تخم خیارین، پرسیاوشان، مغز فلوں خیار شبنز،
ہر ایک ۲۲ گرام۔ تمام دواؤں کو ۵ لیٹر پانی میں جوش دے کر ۲۰ لیٹر چھان کر ۲۰ لیٹر
پانی ملا کر آبزن کرائیں۔

نسخہ الش ۱۔

رد من بنفشہ کی عانہ پر مالش کریں۔

نسخہ ۱۔

جند بید سنز، حلتیت خالص، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
پچھلے ہوئے مغز ساق گاؤ ۲ گرام، روغن سوسن ۲۴ ملی لیٹر میں ملا کر نیم گرم مالش کریں۔
۔۔۔۔۔ زخم کی صورت میں قرص کبر با ۵۰۰ گرام کھلائیں
۔۔۔۔۔ پچکاری کے لیے درج ذیل ادویہ شامل کریں۔

نسخہ پچکاری :-

سفیداب، کندر، رال سفید، صمغ عربی، نشاستہ، انزروت، سنگ جراحہ،
گلنار، مازو، ایفون، سلیخ، کیترا، ہر ایک حصہ، کات ہندی، دم الاخوین، برگ نیم ہر ایک حصہ
شیر خسر میں حل کر کے پچکاری کریں۔

۔۔۔۔۔ التهاب مثانہ میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مرکی، زعفران ہر ایک ۶ گرام، مغز تخم خیار، مغز تخم خربزہ، مغز تر بوزہ، تخم کتان،
بادیان، ہر ایک ۵۰۰ گرام، خشتا ش سفید ۱۰ گرام، کیترا، صمغ عربی، نشاستہ، مغز بادام تلخ،
ہر ایک ۲۶ گرام، مغز چلغوزہ ۱۸ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر لعاب اسپغول
ملا کر اقراص بنائیں اور ۵۰۰ گرام ہمراہ شربت خشتا ش ۲۶ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
نسخہ ۱۔

مومیالی، انگرام، شادوئج عدسی مغسول، تخم کرفس، دم الاخوین، ہر ایک ۶ گرام، صمغ عربی
۵۰۰ گرام، کاکچ ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف کی طرح بنائیں۔
اور ۲ گرام، ہمراہ شربت خشتا ش ۲۶ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

جرب مثانہ

VESICAL IRRITABILITY

اس مرض میں مثانہ میں خارش محسوس ہوتی ہے جو کچھ ران اور قصبہ کی بڑک

بھیل سکتی ہے۔

اسباب

1. تیز، شور یا بورتی فضلات کا خٹانہ پر غلبہ۔
2. ویدانہ امعاء
3. بواسیر
4. حموضت بول
5. غراش اور مادہ کا پیشاب یا خارج ہونا۔
6. نظام اعصاب کے بعض امراض۔
7. سورہضم
8. نتور الرحم
9. ایام حمل
10. کلیہ، مثانہ اور نائزہ کے بعض امراض۔

علامات

خٹانہ، کچھ ران، قنصب کی جڑ میں غراش محسوس ہوتی ہے، قنصب کو سہلاتے رہنے میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب بدبودار اور سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اس میں نکالی رسوب بھی موجود ہوتے ہیں، جو بعض اوقات چادل کی میچ کے مانند اجزاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رنج حاجت شدید غراش اور تکلیف سے ہوتی ہے، شدت درد سے مریض چیخ اٹھتا ہے، خروج المقعد کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، مریض روز بروز مایوس اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔

اصول علاج

1. اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
2. تعدیل مزاج کریں۔

۔ لعاب استعمال کرائیں۔

للاج

۔ نشاستہ، کیترا، صفی عری ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک کر کے لعاب ہیدانہ اور لعاب اسپنول کے ہمراہ کھلائیں۔

۔ دم الاخوین، گنار، شب یمانی، ہر ایک ۵-۱۰ گرام، کیترا ۵-۱۲ گرام صفی عری ۵ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اقراص بنائیں اور شربت مورد کے ساتھ استعمال کرائیں۔

۔ مغز تخم خرلوزہ ۳۸ گرام، مغز تخم خیاریں ۱۸ گرام، تخم خلی، مغز تخم کدو، مغز بادام شیریں، نشاستہ، رب السوس، خشکاش سفید، تخم کرفس، گل ارمنی ہر ایک ۵ گرام، بزر النخ ۴ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر لعاب اسپنول میں ملا کر اقراص بنائیں اور ۵ گرام کھلائیں۔

۔ بنادق البزور ہمراہ شیرہ تخم خیاریں کھلائیں۔

۔ انیسون، پوست خج بادیان، زودنا خشک ہر ایک ۵ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شہد خالص ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ قسطورہ۔

شیاف ابیض، شیر زنان میں حل کر کے احلیل میں ٹپکائیں۔

نسخہ ۱۔

آب شہد، آب شکر یا چوب زرد سوختہ کو ۲ گھنٹے پانی میں بھگو کر مقلط کر لیں اور ۲-۳ قطرے احلیل میں ٹپکائیں۔

نسخہ پیکاری ۱۔

گل ارمنی، شاخ گوزن سوختہ کندر، سفید آب حسب ضرورت شیر زنان ۱۰ مل، کر کے احلیل میں پیکاری کریں — انزال متحرک میں مفید و مجرب ہے۔

وجع المشانہ

اس مرض میں شانہ اور اس کے اطراف میں شدید درد محسوس ہوتا ہے جس سے مریض بے تاب ہو جاتا ہے۔

اسباب

۱. حرارت / برودت شانہ
۲. حصاة مشانہ
۳. قروح مشانہ
۴. التهاب مشانہ
۵. جرب مشانہ
۶. خلع مشانہ
۷. ریح مشانہ
۸. انجماد الدم فی المشانہ
۹. احتباس البول
۱۰. بحران بول

علامات

شانہ کے مقام پر پیرو میں شدید درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس قصبہ، کچ ران، اور خصیوں تک پہنچتی ہیں۔ وجع المشانہ بحران میں درد اور ادرار بول وغیرہ علامات نمایاں ہوتی ہیں، سوزش کے ساتھ زرد رنگ کا پیشاب خارج ہونا ساتھ ہی غلیظ پیاس اور مشانہ، لمس حار محسوس ہونا حرارت مشانہ کی علامات ہیں، برودت شانہ کی صورت میں پیشاب سفید ہوتا ہے اور سردتدایر کی روئیداد ملتی ہے، حصاة مشانہ، قروح و جرب مشانہ

خلع مثانہ اور ریج المثانہ میں ان امراض کی اپنی مخصوص علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔

اصول علاج

- ۔۔۔۔۔ بول بھرائی میں مہرات بول استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ برودت مثانہ کی صورت میں ادویہ حارہ استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ حرارت مثانہ کی صورت میں سرد اور مرخی ادویہ استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ ٹیکید کریں / آہزن کریں۔
- ۔۔۔۔۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج

- ۔۔۔۔۔ حرارت مثانہ کی صورت میں شیرہ تخم خزنہ، شیرہ تخم خیاریں، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز تخم کا ہوئے مقشر، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک ۲ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۴ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ آب کدو ۵۴ ملی لیٹر ہمراہ سنگبین نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ برودت مثانہ کی صورت میں ریج بادیان، پودینہ، انیسون، تخم گدر، برگ سداب، کرکس ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر شربت دینار ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ برودت کی صورت میں یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

- گل خطی ۳ گرام، گل بابونہ، عنب الثعلب ہر ایک ۴ گرام، خار خشک ۶ گرام۔
- تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر لچھان کر نبات سفید ۸ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضداد ۱۔

- صندل، فوفل، آرد جو، آب عنب الثعلب، آب کاسنی یا آب کشینز میں پیس کر ضاد کریں۔
- دفع المثانہ حار میں مفید ہے۔

نسخہ نمناوہ۔

عنب الثعلب، آرد جو، سبوس گندم، بنفشہ، فوفلی، ہر ایک ۵، ۱۰ گرام، خطمی، عکرام،
تمام دواؤں کو آب بید میں پیس کر روغن گل، سرکہ خالص ہر ایک ۶ ملی لیٹر ملا کر فیلٹر کریں۔
روح المٹانہ حار میں محرب ہے۔

نسخہ نمکیدہ۔

برنجاسف، پودینہ، برگ سداب، شبت، جند بید ستر اور حلیت کو پوٹلی میں باندھ کر گڑھا
روغن مالش۔
روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن نیلوفر باہم ملا کر مٹانہ پر مالش کریں۔

نسخہ دیگر۔

روغن سوسن، روغن نرگس، ہر ایک ۶ ملی لیٹر، فرنیون ۳ گرام، ملا کر مٹانہ
پر مالش کریں۔

نسخہ آبرزن۔

بنفشہ، نیلوفر، تخم خطمی، عنب الثعلب ہر ایک ۸، ۴ گرام کو ۲ لیٹر پانی میں جوش
دیے۔ پھر مل چھان کر ۱۰ لیٹر گرم پانی میں ملا کر آبرزن کرائیں۔
نسخہ قطورہ۔

روغن کدو یا روغن بنفشہ کو اخیل میں ٹپکائیں۔

حصاة مثانہ

CYSTIC CALCULI

اس مرض میں مثانہ میں سیاہی، خاکستری یا سفیدی مائل بڑی اور سخت قسم کی حصاة پیدا
ہو جاتی ہیں، جن سے بعض اوقات پیشاب کی سی بو بھی آتی ہے، ان حصاة کی وجہ سے سفید، سیاہ
خاکستری یا سنہری مائل پیشاب خارج ہوتا ہے، احتباس یا مر البول کے ساتھ مثانہ اور اس کے

نٹے ٹیکوین حصاة کی کیفیت ”حصاة الکلیہ“ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ تحریر کی جا چکی ہے۔

اطراف میں درد اور نقل ہوتا ہے۔

اسباب |

1. ثقیل، نفاق اور معدنی اشیاء کا بکثرت استعمال
2. ترش یا شیریں اشیاء کا کثرت استعمال
3. پانی اور دوسری سیال اشیاء کا قلت استعمال
4. ضربہ، سقوط مثانہ
5. مجری بول کا تعدیہ
6. وجع المفاصل
7. فقرہ
8. عمل انہضام کے مختلف مراحل میں کسی طرح کا نقص۔
9. التهاب مثانہ
10. میوہ جات اور ترکاری کا کثرت استعمال
11. سوء مزاج کبد
12. آتشک۔

علامات |

مثانہ اور اس کے ارد گرد درد ہوتا ہے، قصبہ کی جڑ میں خارش محسوس ہوتی ہے، جس کے سبب مریض قصبہ کی جڑ اور پیڑ کو سہلانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات شہوت کے بغیر انتشار اور نعوظ ہوتا ہے، جواز خود ختم ہو جاتا ہے، سیاہی مائل خاکستری یا سنہری مائل سفید پیشاب آتا ہے، اس میں رقت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، مثانہ میں نقل محسوس ہوتا ہے، عسر البول اور احتباس البول میں ہو سکتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد بھی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔

حنق مثانہ میں حصی کے پھنس جانے سے پیشاب یک بیک بند ہو جاتا ہے، حصاۃ کی خشونت کی وجہ سے بول الدم بھی ہو سکتا ہے، بار بار عسر البول ہونا حصاۃ مثانہ کے

چھوٹے ہونے کی علامت ہے، اسی طرح پیشاب میں ریگ کا اخراج حصّۃ کی نرمی اور اس کے ٹوٹنے کی علامت ہے، _____ حصّۃ شاذ کی وجہ سے حالبین اور خبیہ میں ثقل ہوتا ہے، خروج متعدد بھی ہو سکتا ہے، _____ اطراف کا سرد ہو جانا، قشویہ، شدید حمی، سر میں ہلکاپن، مسلسل صفادی تے، فواق، زبان کی خشکی، عثونت اور زیر ناف درد علامات مندرجہ تصور کی جاتی ہیں۔

ایکسے سے تشنیم نفین طور پر ہو جاتی ہے۔

اصول علاج |

- _____ مفتحات اور مدرات استعمال کرائیں۔
- _____ مسکن درد ادویہ استعمال کرائیں۔
- _____ عاذ کے قریب مناسب روغنیات کی مالش کرائیں۔
- _____ نمکید اور نطول کا اصول اختیار کریں۔
- _____ احتیاس بول کو زائل کرنے کے لیے فاشاطیر استعمال کریں۔

علاج |

- _____ شورہ قلبی، حجر الیہود، سنگ سراہی، سہاگہ بریاں، جواکھار، ہر ایک ۳ گرام، عقرہ سوختہ، مغز جنم کر بخوہ ہر ایک ۵ گرام _____ تمام دواؤں کو باریک پس کر ۳ گرام کھلانیہ اس کے بعد درج ذیل خیماندہ نوش کرائیں۔

نسخہ خیماندہ ۱۔

- خار خشک خورد، ابہس، کالج، تخم کاسنی، ہر ایک ۵ گرام کو عرق کدو ۴۵ ملی لیٹر میں پس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت بزوری ۳۶ ملی لیٹر حل کر کے آب برگ ترب سبز مرق ۱۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

_____ درج ذیل نسخہ اخراج حصّۃ اور شدید وجع المثانہ میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

- بیل خورد مع پوست، پکھان بید، اصل السوس، بادیان، خار خشک، برگ بان،

جوانہ، پوست بخیہ انجیر ہر ایک ۵ گرام، دار فلفل ۱ گرام — تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو دل چھان کر نمک کرب ۱۲۵ ملی گرام تا ۱ گرام کھلا کر جوشاندہ نوش کرائیں۔

_____۔ حجر الیہود، سنگ سرہاسی، شوره قلمی، بکباب چینی، زیرہ سفید، شبنم،
خارخسک خورد ہر ایک ۶ گرام، نبات سفید ۴۲ گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
سفوف بنائیں اور ۴ گرام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کرائیں۔

•۔ حیرالبہود، سنگ سرماہی، جواکھار، بادیان، نمک ترپ ہر ایک ۳ گرام ،
نخودسیاہ ۵ گرام ، خارنسک، مغز بادام، مغز تخم خیارین، مغز تخم خربزہ ، ہر ایک ۱۲ گرام ،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام صبح ، شام کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ شورشِ قلبی... گرام کو کڑھائی میں آگ پر رکھیں، جب گل جائے تو بلا در ۱۲۰ گرام ڈال کر لوہے کی سلاخ سے پھرتے رہیں۔ جب بلا در حل جائے تو درج ذیل دواؤں کا سفوف ڈال کر سلاخ سے چلاتے رہیں اور سرد ہو جانے پر اتار کر محق کریں اور ۲ گرام ہمراہ لسی استعمال فرمائیں۔

سفوف -

نوشادر، سہاگ، فندق، ۲ عدد، حرا الیہود ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک کر کے ملائی
 . _____ جنٹیاننا، پوسٹ خربوزہ، نوشادر، شورہ تلی، جواکھار، تخم ترب، منہر تخم خربوزہ،

خارشک ہر ایک ۵۳ گرام، حب کالج، تھرایہود ہر ایک ۵۳۰ گرام، فلفل، دار فلفل، زنجبیں ہر ایک ۹ گرام، عرق سوختہ، ریوند ہر ایک ۹ گرام، شہد تین گنا — تمام دواؤں کو باریک پس کر شہد میں ملا لیں اور ۳۰ گرام کھلائیں۔

•۔ مغز بادام، کلتق، ہر ایک ۸ گرام، پیوست خربوزہ، جرایمہود ہر ایک ۱ گرام،

منز تخم کدو، منز تخم تربوز، هرايك ۴ گرام، منز پسته، منز تخم خياري، منز تخم خربوز، منز عصاره،

هبنر بر ایک گرم، دانه پیل خوردہ گرم، غاز ہر معدنی، ورق نقرہ، دارچین ہر ایک ۳۰ گرم

شک اگر ام، مغرب سوختہ کھاں ۲ عدد، زردی بیضہ ربع، روغن بادام میں بریاں شدہ

۲ عدد، روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر، _____ حسب دستور ادویہ کو کوٹ چھان کر محفوظ کر لیں،

ملحق کو پانی میں جوش دیں اور شیرہ نکال کر بنات سفید ۳۰۰ گرام کے قوام میں ڈالیں اس کے

نفون شدہ دوائیں ملا کر خوب چلائیں۔ ۵ گرم گرام ہمراہ عرق کاسنی نوش کرائیں۔
 • اندر جو ریوند خطائی، شورہ تلمی، شب یمانی بریاں، بنات سفید ہم وزن
 تمام دواؤں کا سفوف تیار کریں اور ہم گرام صبح کو ہمراہ شیرہ ترب کھلائیں۔

قروح مشانہ

CYSTIC ULCERS

اس مرض میں مشانہ میں زخم ہو جاتا ہے اور اس کے عصبی معنو ہوئے نیز پیشاب سے
 نذر ہوتے رہنے کے سبب مشکل سے مندرج ہوتا ہے۔

اسباب |

۱. حصاة مشانہ
۲. ورم و ثبور مشانہ
۳. صفراوی مادہ سے فحاش ہونا۔
۴. حرلیف اخلاط / ادویات
۵. قروح کلیہ میں مذکور اسباب

علامات |

پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، عر ابول ہوتا ہے، پیشاب
 میں پیپ، قشور اور اسی جیسی دوسری چیزیں خارج ہوتی ہیں، عانہ اور کچ ران میں درد
 اور قیض کی بڑی غد کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت درد میں اضافہ
 ہو جاتا ہے۔ اور اس کی طبی مقدار میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بخار ہوتا ہے۔

اصول علاج |

• قروح کلیہ کا اصول علاج اپنائیں۔

- _____ منقعات، منقیات اور مدملات استعمال کرائیں۔
- _____ باسلیق کی فصد کھولیں
- _____ تعدیل مزاج کے لیے مقیات استعمال کرائیں۔
- _____ لمینات کھلائیں۔

علاج

- _____ تنقیہ کے لیے مار السکر / مار العسل نوش کرائیں۔
- _____ مدلی کے طور پر زرد بھر با، قرص کا کچ یا قرص طباشیر ہر اہ شربت ختمش استعمال کرائیں۔
- _____ طباشیر، مروارید، ہیل کلاں ہم وزن کاسفوف بنا کر ۳ گرام، ہر اہ شیرہ برگ سپستان ۲۰ ملی لیٹر، نوش کرائیں۔
- _____ گل خلی، آملہ، خار خشک، کشیز خشک ہر ایک ۶ گرام، کات سفید ۴ گرام۔
- _____ تمام دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح کو دل چھان کر نوش کرائیں۔
- _____ پر سیا دشاں ہر اہ مار العسل استعمال کرائیں۔
- _____ مومبائی اگر اہ، شاذخج عدسی مفصول، تخم کرفس، نشاستہ، دم الاخویہ ہر ایک ۵ گرام، کا کچ، گرام، صمغ عربی ۵۰۳ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف کی طرح بنائیں اور ۳ گرام ہر اہ شربت ختمش ۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔
- _____ مرکی، زعفران، ہر ایک ۵۰۱ گرام، مغز تخم کتاں، مغز تخم خرفہ، مغز تخم خیار، مغز تخم نربوز، مغز تخم خربزہ، بادیاں، ہر ایک ۵۰۳ گرام، کیترا، صمغ عربی، بادام تلخ، نشاستہ، ہر ایک ۲۰۳ گرام، مغز چلفوزہ ۵۰۱ گرام، ختمش سفید ۵۰۱ گرام۔ تمام کو کوٹ کر صمغ عربی، لعاب اسپنول کی مدد سے افراص بنائیں اور ۵۰۳ گرام ہر اہ شربت ختمش ۲۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
- _____ مغز تخم خیار ۵۰۳ گرام، تخم کا کچ ۵۰۱ گرام، شہد خج، تخم کرفس، دم الاخویہ، صمغ عربی، بنزر البیج، گل ارمنی، ہر ایک ۵۰۳ گرام، افیون اگر اہ۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس، افراص بنائیں اور مناسب شربت کے ساتھ ۵۰۳ گرام کھلائیں۔

• ————— مغز تخم خیار، مغز تخم خرپزہ، مغز تخم بادرنگ، مغز تخم کدو، ہر ایک ۵ ر، ۱ گرام، نشاستہ ۴۰ گرام، اصل السوس ۳۰ گرام، تخم خرفہ ۵ ر، ۱ گرام، مغز بادام شیریں، مغز فندق بریاں ہر ایک ۵ گرام، مغز حلغوزہ ۱۰ گرام، تخم کرفس، دو تو، تخم جرجیر، مغز حب الملحب، ہر ایک ۵ ر، ۱ گرام، تخم حمام، مغز بادام تلخ، کیترا، صمغ عربی، بزر الہنج، افیون ہر ایک ۳ گرام، نخود سیاہ ۵۳ گرام، زعفران ۵ گرام ————— تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ پیس کر میفینج کے ہمراہ ۲۷ گرام کی اقسام بنائیں اور آب ترب، آب کرفس یا آب نخود سیاہ ۵ کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

• ————— خارجی طور پر درج ذیل تدابیر/ادویات استعمال کرائیں۔
نسخہ ضاد۔

آرد جو کو سرکہ اور شراب میں ملا کر مٹا د کریں۔

نسخہ قطور۔


انزروت، دم الاخوی، کندر، سفیداب، صمغ عربی، افیون، نشاستہ، ہم وزن کو کوٹ چھان کر شیاف بنا کر محفوظ کریں، اور حسب ضرورت شیرازی میں حل کر کے احلیل میں پکائیں۔

نسخہ مالش۔

میعہ سائلہ ۵۳ گرام، پیسہ مرغابی ۵ ر، ۱ گرام، موم سفید، استار، روغن بنفشہ حسب ضرورت، تمام دواؤں کو حسب دستور پگھلا کر متاثر مقام پر بلکے طور پر ملیں۔

انتفاخ مثانہ

اس مرض میں مثانہ میں ریاہ بھر کر نمود اور انتفاخ پیدا کر دیتی ہیں اور مرضی علامات رو بہا جوتی ہیں



اسباب

- i. ثقیل، نفاخ اور دیرسہم غذاؤں کا بکثرت استعمال
- ii. مثانہ میں رطوبات بلغمیہ کا اجتماع
- iii. ضعف حرارتِ مثانہ
- iv. ریح البواسیر

علامات

انتفاخِ مثانہ غذائی میں قراقر ہو تا ہے اور کھنچاؤ کے ساتھ نفخ، ادھر ادھر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ رطوبی کی صورت میں نفخ ادھر ادھر منتقل نہیں ہوتا۔ کھنچاؤ کے ساتھ گرانی بھی ہوتی ہے، ریح البواسیری میں بواسیر کی سرگزشت ملتی ہے، پیشاب میں دشواری ہوتی ہے۔

اصول علاج

- ۔۔۔ عمل انہضام کو بہتر بنائیں۔
- ۔۔۔ منہج اور مسہل استعمال کرائیں / مقیات استعمال کرائیں
- ۔۔۔ دُک، تگید اور ضما د وغیرہ استعمال کرائیں
- ۔۔۔ آبز ن کرائیں
- ۔۔۔ بواسیری ریحی کا اصول علاج اختیار کریں۔

علاج

- ۔۔۔ باد الاصول، روغن بید انجیر کے ساتھ نوش کرائیں

• تخم خربوزہ، خار خشک خورد ہر ایک ۶ گرام، گل سرخ، بادیان ہر ایک ۴ گرام،
 تمام دواؤں کو عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر محفوظ کر لیں اور
 تخم کشوت، زیرہ سیاہ، انیسون ہر ایک ۳ گرام پس کر جوشاندہ میں ملائیں اور شربت دہیہ
 یا گلفندہ ۸۰ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

• عصارہ برگ سداب، پودینہ خشک، برگ شہت ہر ایک ۳ گرام، جندبیدستر
 کے پانی میں جوش دے کر شربت دینار ۳۶ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں۔
 ریح البواسیری کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گل خضلی ۳ گرام، بادیان، مانخواہ ہر ایک ۴ گرام، تینوں دواؤں کو پانی میں
 جوش دے کر مل چھان کر شربت بنفشہ ۳۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 • خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ مالش ۱۔

روغن بان، روغن زنبق میں تھوڑا زعفران، مشک اور حلتیت خالص ملا کر شانہ
 پر مالش کریں۔

نسخہ تکیید ۱۔

سبوس گندم پوٹلی میں باندھ کر گرم کر کے تکیید کریں۔

نسخہ ضاد ۱۔

سداب، پودینہ، شہت، جندبیدستر ہر ایک ۹ گرام کو پانی میں پس کر
 شانہ پر ضاد کریں۔

نسخہ قے ۱۔

نمک طعام، خسر دل، دونوں نو بار یک پس کر گرم پانی میں ملا کر نیم گرم نوش
 کرائیں تاکہ قے ہو جائے۔

نسخہ ۱۔

حلق میں بال کی پھریری سے تحریک پہنچا کرتے کرائیں۔

انجماد الدم فی المشانہ

اس مرض میں مشانہ میں خون جم جاتا ہے جس کے نتیجہ میں چہرے پر زردی، کرب و اضطراب وغیرہ علامات رونما ہوتی ہیں۔

اسباب |

- (I) ضربہ و سقوطہ
- (II) کبد اور کلیہ سے خون کا انصباب ہو کر مشانہ میں منجمد ہو جانا۔
- (III) حمالی / بار برداری

علامات |

چہرے پر زردی چھائی ہوتی ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے، برد اطراف ہوتا ہے، سرد پینہ خارج ہوتا ہے، نبض ضعیف، منواترا اور صغیر چلتی ہے، خون منجمد میں سمیت پیدا ہونے کی وجہ سے لرزہ کے ساتھ شدید بخار ہو سکتا ہے، غشی بھی طاری ہو سکتی ہے تنفس بہت خفیف ہوتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ مقطعات استعمال کرائیں
- _____ مفتحات اور مدرات کھلائیں
- _____ مناسب ادویہ کو اجیل میں ٹپکائیں / نطول کریں۔

علاج |

- _____ تاج کے طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

سداب بری، برنجاسف، تخم ترب، تخم کرنس ہر ایک ۶ گرام — تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر سکبجین منصل سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
نخودسیاہ ۳۰ گرام میں شوربہ مرغ ملا کر جوش دیں اور ہمراہ سکبجین
بزوری نوش کرائیں۔

ابھل، حلیتیت، فوہ، اشق ہم وزن — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
جبوب بنائیں اور ۵۰۰ گرام، ہمراہ مار الاصول نوش کرائیں۔
مرکی ۵۰۰ گرام ہمراہ آب کرنس استعمال کرائیں۔
پوست زنج کبر، قردمانا، حب بساں، زراوند مدحرج، فوہ، تخم کرنس
دوقو، ہم وزن — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۵۰۰ گرام ہمراہ
مار الاصول استعمال کرائیں۔

پنیرمایہ خرگوش ۶ گرام، حلیتیت خالص ۳ گرام، دوقو، پودینہ خشک
ہر ایک ۳ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵۰۰ گرام ہمراہ سکبجین ترشش،
دن میں ۳ بار استعمال کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ نطول و قطور ۱۔

پنیرمایہ خرگوش خاکسز، درخت انگور کے پانی میں حل کر کے نطول کریں اور اھیل
میں پیکائیں۔

نسخہ نطول و قطور ۲۔

چوب انجیر سوختہ، چوب گز سوختہ — دونوں دواؤں کو پانی میں حل کر کے نطول اور

قطر کریں۔

بول فی الفراش

BED WETTING

اس مرض میں مہندہ، حالت میں پیشاب نکل جاتا ہے، یہ مرض لڑکیوں کی نسبت لڑکوں

بالخصوص عصبی المزاج لڑکوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب |

۱۔ امراض راس :-

۱. ضعف اعصاب

۲. ضعف دماغ

۲۔ امراض مثانہ :-

۱. ضعف مثانہ

۲. برودت مثانہ

۳. خراش مثانہ

۴. حدت بول

۵. حصاة مثانہ

۶. استرخام مثانہ

۷. صفر مثانہ

۸. التهاب مثانہ

۱۔ امراض اعضائے تناسل :-

۱. غلاف خلفہ کا لمبا ہونا

۲. حشفہ میں خراش / ورم

۲۔ امراض معدہ و امعاء :-

۱. قبض

۲. خروج المقعد

۳. سورہنہم

۴. دیدان امعاء

متفرقات :-

۱. مدر اشیاء کا استعمال

۴۔ شانہ کے مقابل مہرے کاٹل جانا۔

۵۔ خارجی بروودت

۶۔ وراثت

۷۔ عصبی المزاج ہونا۔

۸۔ شانہ کے مجاور اعضاء کا درم۔

علامات

فیبرہ کی حالت میں پیشاب نکل آتا ہے۔ شدید عوارض میں رات میں دو تین بار پیشاب ہو جاتا ہے، تاہم ہر رات پیشاب خارج ہوتا ضروری نہیں ہے۔ بول فی الفزاش کے بیشتر اسباب میں ان کی مخصوص علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً بروودت شانہ میں سور مزاج سرد کی علامتیں ملتی ہیں، پیشاب بالکل سفید ہوتا ہے، اس میں سوزش اور جلن نہیں ہوتی پشت کے مہرے کے ٹل جانے کی صورت میں، مہرہ کی بلندی نمایاں ہوتی ہے، حرارت شانہ کی صورت میں حرارت کی علامات ملتی ہیں۔ پیشاب رنگین ہوتا ہے اور گرم اشیاء اور گرم تدابیر سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصول علاج

۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

۲۔ رات کے وقت کھانا کھانے سے احتراز کرائیں اور پانی تو بالکل ہی نہ نوش کرائیں، چنانچہ شام کی غذا ہ بجے شام کو کھانے کی عادت ڈلوائیں۔

۳۔ گرم تدابیر اختیار کریں۔

۴۔ مقوی اعصاب غذائیں استعمال کرائیں۔

۵۔ تقویت شانہ کی تدابیر کریں۔

۱۔ علاج

۱۔ جوارش جالبینوس حسب عمر ملے تا، گرام، روزانہ رات میں کھلائیں۔

_____۔ معجون کندر حسب عمر ۱ تا ۷ گرام، روزانہ رات میں کھلائیں۔
 _____۔ کندر، کلجین، جفت بلوط، حب الّاس، ہم وزن میں، ہم وزن شکر سفید
 ملا کر ۲۔ تا ۳ گرام، صبح، شام کھلائیں۔
 _____۔ مصطکی رومی، سعد کوفی، ہلید سیاہ، کندر، کلجین، جفت بلوط ہم وزن
 سفوف کر کے اس کے سہ چند شہد خالص ملا کر حسب عمر ۲ تا ۳ گرام نوش کرائیں۔
 _____۔ برودت مثانہ کی صورت میں اطرینل صغیر اور اطرینل کبیر حسب عمر کھلائیں
 _____۔ دیدان امصار کی صورت میں کیلہ مصفی ۱۲ گرام، گلقد ۱۲ گرام، ملا کر
 کھلائیں۔

_____۔ حرارت مثانہ کی صورت میں طباشیر، گل ارمنی، تخم خرقہ، گلنار، تخم کاہو،
 کی قرص بنا کر حسب عمر استعمال کرائیں۔
 _____۔ زیرہ، کندر، حب الّاس، ہر ایک ۱۰۔ گرام کوٹ چھان کر شہد ۵۲ ملی لیٹر
 میں قوام تیار کریں اور ۷ گرام کھلائیں۔
 _____۔ جفت بلوط، کندر ہر ایک ۲۲ گرام، خصینۃ الثعلب، ہر بار شمع، ہر ایک
 ۵۰۰ گرام، ہلید سیاہ بریاں، ہلید کابلی بریاں، ہر ایک ۱۰ گرام، سوزن منقی، عرق گلاب
 میں جوش شدہ ۲۵۰ گرام معجون بنا کر ۷ گرام ہمراہ شربت مندل اور عرق گلاب استعمال کرائیں۔
 _____۔ برودت اور استرخار کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

جب دبیدستر، حاشا، جفت بلوط، عاقر قرحا، قسط، ہم وزن _____ تمام
 دواؤں کو کوٹ چھان کر آب حب الّاس سبز میں ملا کر ۶ گرام بوقت خواب استعمال کرائیں۔
 _____۔ کبجد سیاہ، ناخواد، ہم وزن _____۔ دونوں دواؤں کو کوٹ کر دونوں
 کے ہم وزن قند سیاہ ملا کر محفوظ کر لیں اور حسب عمر ۳۔ ۷ گرام کھلائیں۔
 _____۔ کبجد ۱۲ گرام، مغز خستہ جامن ۶ گرام، _____۔ دونوں کا شیرہ نکال کر شربت
 انار شیر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

_____۔ گلنار، کزمازج، ہر ایک ۵ گرام، کشیز خشک بریاں، گل ارمنی، صبح عربی،
 ہر ایک ۱۰ گرام، جفت بلوط ۸ گرام، کندر ۱۳ گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف

۱۰ این اور ۲۵ — ۶ گرام استعمال کرائیں۔

تقطیر البول

DRIBBLING

یہ مرض دراصل احتباس بول اور سلسل بول کی درمیانی کیفیت ہے، اس میں مثانہ میں پیشاب نہیں رک پاتا اور کئی قدر، ارادی طور پر تکلیف کے ساتھ ٹپکتا رہتا ہے، — یہ مرض نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب :

۱۔ امراض مثانہ :-

۱. استرخاء عضلات مثانہ
۲. فالج عضلات مثانہ
۳. خدر عضلات مثانہ
۴. التهاب مثانہ
۵. ضعف عضلات مثانہ
۶. قروح مثانہ
۷. جرب مثانہ
۸. حدت بول
۹. کثرت بول

۲۔ امراض کلیہ :-

۱. التهاب کلیہ
۲. قروح و شمر کلیہ
۳. سور مزاج حار کلیہ
- ۴۔ امراض اعضاء تناسل :-
۱. لحم زائد

۱. قروح غدہ مذی
۲. درم اعلیٰ
۳. کثرت جماع
۴. اعتناق الرحم
۵. امراض معدہ و امعاء
۶. ویدان امعاء
۷. قروح امعاء
۸. عصبی مراکز کا متاثر ہونا۔

متفرقات :-

۱. ذیابیطس
۲. ضعف
۳. آپریشن
۴. عرصہ تک صاحب فراش ہونا۔
۵. نشانہ کے مجاور اعضاء میں التهاب، قروح، شپور، اور دبیلہ
۶. سرد یا گرم اشیاء کا استعمال
۷. ضعف قوت دافعہ۔

علامات

پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ دیر تک ٹپکتا رہتا ہے اور مریض کو نشانہ میں پیشاب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، حدت اور حرارت کی صورت میں پیشاب زرد یا سرخ ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، غلیظ صفرا، گرم تدابیر اور کثرت جماع کی سرگزشت ملتی ہے بار بار پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت جوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔

ضعف نشانہ اور ضعف قوت دافعہ کی صورت میں سوزش اور پیاس نہیں ہوتی،

بکار لگ سفید ہوتا ہے اور سرد تدا بیر کی سرگزشت ملتی ہے۔
 آلات بول کے متاثر ہونے کی صورت میں ضعف قوی کی عمومی علامات ملتی ہیں، قروح
 و بشور اور حصاۃ اعضاء بول نیز مجاری آلات بول کے امراض کی اپنی مخصوص علامات
 ہوتی ہیں۔

اصول علاج |

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۲۔ حسب ضرورت منقبضات، مسہلات اور مقیات استعمال کرائیں۔
- ۳۔ طلاء کریں
- ۴۔ ضاد کریں۔
- ۵۔ عمل انہضام کی بہتری کی تدابیر کریں۔

علاج |

- ۱۔ حدت بول کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم خرفہ، تخم کاہو، تخم خشکاش، تخم خرپڑہ، مغز تخم کدو، مغز تخم تربوز، ہر ایک
 ۴ گرام، تخم خیبارین ۶ گرام — تمام دواؤں کا شیرہ نکال کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

حب القلت، دوقو، کالج ہر ایک ۴ گرام، عرق شاہترہ ۱۲۵ ملی لیٹر میں شیرہ
 نکال کر شربت بزوری باردہ ۴ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

طباشیر، کشنیز، صندل سفید، گلنار، صمغ عربی، تخم حماض، گل ارمنی، ہر ایک
 ۴ گرام، صمغ عربی کے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب کاہو میں ملائیں۔ عیوہ سے
 صمغ عربی بھی عرق کاہو میں حل کریں اور اقراص بنا کر مناسب بدقہ کے ساتھ استعمال
 کرائیں۔

• _____ ضعف قوت ماسکہ کی حرارتی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

گلنار، افاقیا، ہر ایک ۵ ر۔ ۱۰ گرام، قصب الزبیرہ، تخم حماض، صندل سفید،
صندل سرخ، حدس مقشر، صمغ عربی، ہر ایک، گرام، کندر ۵ ر ۳ گرام، حب الآس ۱۰ گرام،
تمام دواؤں کو باریک پیس کر عرق گلاب خالص میں ملا کر ۵ ر، ۱۰ گرام کھلائیں
_____ برودت کی وجہ سے عارض ہونے والے ضعف قوت ماسکہ میں درج ذیل

نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کندر، جفت بلوط، خونمان، خرفہ، حب الآس، حب الرشاد، سعد کوفی، سادی
الوزن _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر محفوظ کریں اور ۵ ر ۱۰ گرام، ہمراہ شراب
بھنہ پکا کر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

حب الآس، پودینہ، کندر، مرکی، بسباسہ، سعد کوفی ہر ایک ۵ ر ۱۰ گرام،
سندروس ۱۰ گرام، راسن، حب الملب، ہر ایک ۵ ر ۲ گرام، بہمن سرخ ۲ ر ۱۰ گرام، بلیہ
کابلی بریاں ۵ ر ۳ گرام، اطر نیل ۵ ر، ۱۰ گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد
میں ملا کر محفوظ کریں۔ اور ۵ ر ۱۰ گرام کھلائیں۔

• _____ ریاحات غلیظہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، نانخواہ، خونمان، بسفانج، اسطوخودوس، پودینہ، سنبل الطیب
پوست ہلید زرد، نمک لاہوری ہر ایک ۵ ر ۱۰ گرام، دارچینی، ارشدہ، افسیون، جوزبوا،
زرنباد، درونج عقری، برگ سناہ کی، پوست ترنج، پوست لیموں کاغذی، خیربوا،
پوست ہلید، آملہ، زنجبیل، انیسون، قرفل، بسباسہ، قرفہ، عود غرق، مصطکی رومی،
سعد کوفی، ہیل کلاں، دار فلفل، فلفل سیاہ، وچ ترکی، مرکی، ہر ایک، گرام، فلفل سفید،
۲ ر ۱۰ گرام، نمک سیاہ ۴ گرام، نمک شور ۵ ر، ۱۰ گرام _____ تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر چنے کے برابر خوب بنائیں اور اجدد صبح، شام عرق بادیان، عرق گلاب ہر ایک

- ۶۰ لیٹر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
 • —————۔ مثانہ میں استرخائی صورت پیدا ہو جانے میں ابخیر اور موبز منقی وغیرہ کھلائیں۔
 • —————۔ تسخین اور جلاء کے مقصد سے کندر، سعد کوئی، ہم وزن کوٹ چھان کر
 شہد خالص ۴۰ لیٹر ملا کر چٹائیں۔
 یہ نسخہ بھی مفید ہے۔
 نسخہ ۱۔

- حب الرشاد، خردل، کندر، ہر ایک ۶ گرام، منہ خربوزہ ۴۰ گرام، سعد کوئی،
 ۹ گرام، —————۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد خالص ملا کر، ۴۰ گرام ہمراہ روغن بید
 انجیر حسب ضرورت، استعمال کرائیں۔
 • —————۔ حسب سبب مرض روغن سداب اور روغن نار دین کی مالش کریں۔
 • —————۔ نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔

سلسل البول

INCONTINENCE OF URINE

اس مرض میں بے ارادہ اور بغیر خواہش پیشاب خارج ہوتا ہے،

اسباب

- ۱۔ امراض مثانہ۔
- ۲۔ حصاة مثانہ
- ۳۔ التهاب مثانہ
- ۴۔ ضعف عضلات مثانہ
- ۵۔ برودت مثانہ
- ۶۔ حرارت مثانہ
- ۷۔ خلع مثانہ

متغزقات ۱۔

(I) زوال فقار (مٹانہ کے مقابل، مہرہ کاٹل جانا،

(II) ضربہ و صدمہ اعصاب

(III) فالج جسم اسفل

(IV) مٹانہ کے مجاور اعضاء کا ورم

(V) ویدان اعمار

(VI) ذیابیطس

(VII) مدرات کا استعمال

(VIII) احتیاط کے بعض عوارض

علامات |

حصاة مٹانہ اور التهاب مٹانہ کی صورت میں ان کی مخصوص علامات موجود ہوتی

ہیں۔

برودۃ مٹانہ کی صورت میں سورمزاج بارد کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں، پیشاب سفید اور کسی سوزش کے بغیر خارج ہوتا ہے۔ حرارت مٹانہ کی صورت میں پیشاب رنگین ہوتا ہے، سوزش بھی ہو سکتی ہے، گرم ندابیر سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، زوال فقار کی صورت میں مہرے کی وضع غیر طبعی ہوتی ہے، ضربہ و صدمہ اعصاب، فالج جسم اسفل، ویدان اعمار اور ذیابیطس میں ان کے مخصوص عوارض بھی موجود ہوتے ہیں۔ مدرات کے استعمال کی صورت میں، ان کی روئیداد ملتی ہے۔

اصول علاج |

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ سورمزاج بارد رطب مٹانہ میں گرم اور قابض دوائیں استعمال کرائیں۔
- ۳۔ سورمزاج حار یا بس مٹانہ میں بارد، رطب دوائیں استعمال کرائیں۔
- ۴۔ اندر کی طرف زوال فقار کی صورت میں مجاحم کے ذریعہ اصل مقام پر

لانے کی تدابیر کریں۔

علاج |

۔۔۔۔۔ برودت، استرخاء اور ضعف مثانہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال

کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مصطکی، کندر، انگرام، باریک کرکے گلقتہ ۵ گرام یا اطریشل سفید ۶ گرام، یں

ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

معجون فلاسفہ ۹ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

جفت بلوط، حب الآس، گلنار ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر سفوف

بنائیں اور ۶ گرام ہمراہ گلقتہ ۱۲ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

کندر، سعد، خونچان، زیرہ کرمانی، شاہ بلوط، حب الآس، شہدادہ، ہر ایک

ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور ۵ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

مویز منقی، ۹ دانہ، کنجد مقشر، جتہ الخضر ہم وزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو

حسب دستور استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ سور مزاج حار مثانہ میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

صغ عربی ۳۳ گرام، کندر ۵ گرام، گل ارمی، حب الآس، خار شک، مصطکی،

کشیزہ ہر ایک، گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ۶ گرام

ہمراہ مناسب بدرقہ استعمال کرائیں۔۔۔۔۔ شدت حرارت کی صورت میں مصطکی کو

حذف کر دیں۔

نسخہ ۱۔

کشنیز (سرکہ میں بھگو کر بریاں کردہ) کبریا، شاہ بلوط، عدس مقشر ہر ایک، گرام، نبات سفید ۲۲۵ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شربت اتا ترش ۱۲ ملی لیٹر کے ہمراہ ۶ گرام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

تنخم خنشاں، تنخم کا ہو، طباشیر، گلنار، گل ارمنی، تنخم خرفہ ہر ایک ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اقراص بنائیں اور ۵۰۰ گرام کھلائیں۔
ضعف اعصاب کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

فلفل سیاہ، فلفل سفید، سنبل الطیب، بہمن سرخ، بہمن سفید، دارچینی، تھقلی، حب بلساں، اسارون، ایرسا، عود بلساں، یوسنٹ بلبہ سیاہ، بلبہ کابل، بلبہ، بسباسہ، سعد کونی، ہر ایک ۶ گرام، زنجبیل، زعفران خالص، ہر ایک ۱۲ گرام، جدوار شیریں ۳۶ گرام، ایون خالص ۶۰ گرام۔ تمام دواؤں کو طبعیہ علیحدہ پیس کر رکھیں۔ ابریشم مقرض، بادرنبویہ، ہر ایک ۸ گرام کو عرق بادیان ۳ لیٹر میں ۲۴ گھنٹے تک بھگوئیں پھر اس قدر جوش دیں کہ نصف رہ جائے۔ اس میں مغز پستہ، مغز بادام شیریں ہر ایک ۶۰ گرام کا شیرہ نکالیں پھر شہد تین گنا نیز باریک شدہ دواؤں کو ملا کر حسب دستور قوام بنائیں اور ۱۲ گرام صبح، شام کھلائیں۔

ضعف مثانہ کی صورت میں ہر تال کو گھیکوار کے گودہ میں کشتہ کریں۔

قلی ۱۲ گرام گلا کر سیما ۶ گرام ملائیں اور پیس کر محفوظ کر لیں، اس کے بعد کشتہ ہر تال ۳۶ گرام، سفوف قلی و سیما ۶ گرام، ہیل خوردہ ۵۰۰ گرام، مصطکی رومی، خستہ جامن، ہر ایک ۹ گرام۔ تمام دواؤں کو پیس کر باریک کریں اور ۵۰۰ گرام ہمراہ شربت اتا رکھلائیں۔

درج ذیل نسخہ جات بھی اطباء کے معمولات مطب میں شامل رہے ہیں۔

نسخہ ۴۔

کندر، گلنار، گل ارمنی، گل سرخ، سعد کونی، تنخم فنجشک، جب الاس، خولنجان،

صمغ عربی، ہم وزن — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۲ گرام صبح، شام
کھلائیں۔
نسخہ ۱۔

پوست ہلیہ کابل، پوست ہلیہ، گلنار، آملہ خشک، جفت بلوط، گل سرخ، ہم وزن
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن گل سے چرب کر کے تین گنا نبات سفید ملا کر
قوام تیار کریں اور ۹ گرام کھلائیں۔
نسخہ ۲۔

طباشیر، ست سلاجیت، ست گلوہ، سبوس اسپنول، کندر، نقاقل، برادہ
صندل سفید، بہمن سفید، ہر ایک ۱۰ گرام، یشب سبز، کہربا، مے شمس، یا قوت سرخ،
کشتہ پوست بیض، مرغ، کشتہ قلعی، زہرہ ہرہ خطائی ہر ایک ۳ گرام، ثعلب ۱۲ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۳ گرام ہمراہ شربت انار دلاتی
۲۴ ملی لیٹر کھلائیں۔
نسخہ ۳۔

گلنار، کزمازج، ہر ایک ۵ گرام، کشنیز خشک بریاں، صمغ عربی، گل ارمنی، ہر ایک
۱۰ گرام، کندر ۳۰ گرام، بلوط ۲۰ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں
اور ۶ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
نسخہ ۴۔

اسطوخودوس، کندر، سنبل الطیب، زیرہ سیاہ، جفت بلوط، سعد کوفی، ہر ایک
۵۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر شہد کے ہمراہ معجون بنائیں اور ۳ گرام
صبح، شام کھلائیں۔
نسخہ ۵۔

منزبادام، جفت بلوط، ہر ایک ۵ گرام، گل ارمنی ۶ گرام، گاؤزبان، نشاستہ،
ہر ایک ۳ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ایک خوراک بنائیں اور کھلائیں۔
نسخہ ۶۔

سعد کوفی، اسطوخودوس

شہد خالص کے توام میں ملا کر ۵ روہ گرام استعمال کرائیں۔
نسخہ ۱۔

کنجد سیاہ، اجوائن ہم وزن کو پیس کر قند سیاہ کے ہمراہ غلغلہ بنا کر، گرام کھلائیں،

نسخہ ۲۔
پوست میضہ مرغہ کو روغن کاڑیں بریاں کر کے سفوف بنائیں اور ۵ روہ ۳ گرام روزانہ
کھلائیں۔

عسر البول

DYSURIA

اس مرض میں درد و تکلیف اور دشواری سے پیشاب خارج ہوتا ہے۔

اسباب

۱۔ امراض مثانہ۔

(۱) التهاب مثانہ

(۲) حصاة مثانہ

(۳) نفقہ مثانہ

(۴) استرخام مثانہ

(۵) ضربہ مثانہ

(۶) تشنج مثانہ

(۷) مثانہ میں خون یا پیپ کا اجتماع۔

(۸) مثانہ میں عرصہ تک پیشاب کا اجتماع۔

(۹) مثانہ کا سور مزاج حار

لہٰذا اسے اسر البول بھی کہتے ہیں۔

دفعہ، نشانہ کا سور مزاج بارد

دفعہ، خلع نشانہ

۱۔ امراض مجری بول

دفعہ، لحم زائد

دفعہ، تضیق مجری بول

دفعہ، تشنج مجاری بول

دفعہ، خلط لزج کا مجاری بول سے چمٹ جانا

دفعہ، خلط حاد کا مجاری بول میں سوزش پیدا کرنا

۲۔ امراض کلیہ

دفعہ، التهاب کلیہ

دفعہ، حصاة کلیہ

۳۔ امراض معدة و امعاء

دفعہ، ورم امعاء

دفعہ، زحیر

۴۔ امراض اعضاء تناسل

دفعہ، ارتفاع خصیہ

دفعہ، اختناق الرحم

دفعہ، نزول الرحم

دفعہ، ورم رحم

دفعہ، سلعات خصیۃ الرحم

دفعہ، بشور و قروح احلیل

دفعہ، ورم غدہ قدامیہ

۵۔ امراض صدر و ریہ

دفعہ، عر التنفس

دفعہ، ضیق النفس

حادثہ متعدی ۲ مراضی ۱۔

۱. تب محرقہ اسہالی

۲. حمی قرمزیہ

۳. ہیضہ

۴. سوزاک

متفرقات ۱۔

۱. نشانہ کے محاذی فقرات کا ٹل جانا

۲. پشت اور مانہ کے زخم

۳. اعصاب و رباطات میں امتلاء و یلغم

۴. شدت حرارت

۵. پسینہ کی زیادتی

۶. ضعف حس

۷. نشانہ کے قریبی اعضاء کا شدید التهاب

۸. حمل

علامات |

اعضائے بول میں درد، ثقل اور تھمد ہوتا ہے، متلی اور تھنے کی شکایت ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کی دھار سیدھی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات یہ یک دم خارج ہوتا ہے، اور کبھی تھوڑا تھوڑا، ابتداء میں رک کر اور بعد میں کھل کر آسکتا ہے،

کلیہ، نشانہ اور مجری بول کے قروح کی صورت میں درد ہوتا ہے، پیشاب میں پیپ اور قشور خارج ہونے ہیں، موت القوت (نشانہ میں تمدد و تشنج ہو کر اس کی قوت دافعہ کا زائل ہو جانا) میں سوزش بالکل نہیں ہوتی، یا بہت معمولی ہوتی ہے، عسر البول ہوتا ہے، نشانہ پر مارنے سے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، استرخاء نشانہ کی صورت میں، نشانہ دبانے سے پیشاب خارج ہوتا ہے، تاہم پیشاب کی دھار نیز نہیں ہوتی اور رلیض کو نشانہ میں پیشاب کی موجودگی

کا احساس رہتا ہے۔ تشنج مثانہ و مجاری بول کی صورت میں، تشنج کی مخصوص علامات موجود ہوتی ہیں۔ پیشاب دھار کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ خلط لزج کی صورت میں آرام پسندی، نرک ریاضت، یا غلیظ و لیدار غذاؤں کے استعمال کی سرگزشت ہوتی ہے، مانہ میں ثقل محسوس ہوتا ہے، پیشاب میں خام خلط بھی خارج ہوتی ہے۔

خلط حاد کی صورت میں گرم تدابیر کی روئیداد ملتی ہے، پیشاب سرخ ہوتا ہے، نائزہ کی نالی کے کنارے میں سوزش محسوس ہوتی ہے، مریض کی قوت برداشت قوی ہوتی پیشاب طبعی رفتار سے خارج ہوتا ہے۔ تعین اور خشکی کی صورت میں پیشاب میں حدت اور سوزش ہوتی ہے، قلیل مقدار میں مثانہ میں پیشاب ہو تو خارج نہیں ہوتا، مرطوب تدابیر سے نفع پہنچتا ہے۔ ضعف حس کی صورت میں پیشاب میں سوزش اور ملین محسوس نہیں ہوتی، اور مریض کو اخراج کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لحم زائد کی صورت میں عسر البول ہوتا ہے، لحم زائد اگر تضییع کی نالی میں ہو تو قاتنا طیر داخل کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، سبب مرض کے مثانہ سے نیچے ہونے کی صورت میں مثانہ اور عانہ میں بوجھ، درد اور تھمد ہوتا ہے، سبب مرض اگر مثانہ سے اوپر ہے تو مثانہ پیشاب سے قریباً خالی ہوتا ہے اور پشت پر ثقل محسوس ہوتا ہے، درم مجاور مثانہ، مزبہ مثانہ اور عمدہ احتباس بول کی صورت میں ان کی سرگزشت ملتی ہے۔

اصول علاج |

- اصل سبب مرض کے ازالہ کی تدابیر کریں۔
- مدرات بول استعمال کرائیں۔
- التهاب کلیہ، التهاب مثانہ یا حصاة کلیہ و المثانہ کی صورت میں ان امراض کے ذیل میں بیان کردہ اصول علاج اختیار کریں۔
- مجاری بول کی لیدار رطوبت کے فقدان کی صورت میں مجاری بول کے تغذیہ کی تدابیر کریں۔
- تکمید، ضداد، نطول اور آبز ن کرائیں۔

علاج |

۔۔۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ قطور:-

مجاری بول میں لحم زائد کی صورت میں روغن نرگس، روغن چنبیلی میں روغن گل،
جند بیدستر اور مشک ملا کر اعلیل میں ٹپکائیں اور پیڑو پر ملیں۔

نسخہ نطول:-

مشادہ پر گرم پانی کا نطول کریں / نیم گرم پانی میں آہرن کرائیں۔

نسخہ قطور:-

روغن ناروین، روغن قسط، روغن بیدانجیر اور روغن سداب میں جند بیدستر
اور فرنیون ملا کر پیڑو پر ملیں۔

نسخہ نطول و آہرن:-

تخم حنظل، تخم کتاں، تخم حلبہ، حب قرطم، برگ کرنب، ہم وزن ————— تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نطول کرائیں۔ اور اسی جوشاندہ میں آہرن کرائیں۔

نسخہ قطور:-

شیات ایمن، شبیر زن کو روغن گل میں حل کر کے اعلیل میں ٹپکائیں۔

نسخہ ضاد:-

حب الفار، شب یمانی، حماما، اکلبل الملک، آرد نخود سیاہ، بابونہ ہر ایک
۳۶ گرام، تخم کرفس بستانی، ددقو، تخم کرفس کوہی، تخم ترب ۴۴ گرام ————— تمام
دواؤں کو باریک پس کر آب کرنب ارمنی، روغن بلباں، روغن سوسن میں ملا کر ضاد کریں۔

نسخہ ضاد:-

شورہ قلمی، ۴ گرام، تخم نیل ۱۲ گرام، ————— دونوں دواؤں کو پانی میں پیس کر
پیڑو پر ضاد کریں۔

نسخہ ضاد:-

شورہ قلمی کو عرق لیموں میں حل کر کے ضاد کریں۔

نسخہ تکمید ۱۔

سبوس گندم ۳۶ گرام ، ننگ ۱۲ گرام ————— دونوں کو سرکہ خالص میں پیس کر پوٹلی میں باندھ کر کسی قدر اور سرکہ میں تر کر کے گرم گرم تکمید کریں۔

نسخہ تکمید ۲۔

گلی میس کو پانی میں جوش دے کر اس کے ثفل سے تکمید کریں۔

• ————— خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

ضرب و منقطع کی صورت میں ماء الاصول میں روغن بید انجیر ڈال کر نوش کرائیں۔

• ————— مفتق مثانہ کے غفلہ ماسکے کے منزع فی ہونے کی صورت میں معجون بلا دری اور معجون فلاسفہ کھلائیں۔ اسی مقصد کے لیے درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

دارچینی ، سعد کونی ، سنبل الطیب ، سلیفہ ، قرففل ، بسیاسہ ، ہر ایک ہم وزن ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

• ————— مجاری بول میں لیسیدار رطوبت کی کمی یا نقدان کی صورت میں تغذیہ مجاری بول کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

لعاب اسپغول ، لعاب بہدانہ ، صمغ عربی کو شربت بنفشہ / شربت خشماش / شربت عناب کے ساتھ نوش کرائیں۔

• ————— درج ذیل نسخہ ادرا ر بول میں مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

خارخک ، بادیان ، زیرہ سفید ، حبر الیہود ، سورہ قلمی ، تخم خیارین ، تخم خربوزہ ، تخم خرفہ ، تخم کاسنی ، ہر ایک ۱۲ گرام ، ریوند چینی ، ہیل خورد ، صمغ عربی ، ہر ایک ۶ گرام ، تخم گدڑ ، تخم قلم ، تخم کرنس ، ہر ایک ۵۰ گرام صمغ عربی کے ملاوہ تمام دواؤں کو پیس کر اور صمغ عربی کو پانی میں حل کر کے اقرا ملائیں اور ۳ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

• ————— مجاری بول میں رطوبات لزوج کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عنصل بریاں ۵۱۳ گرام، شب میانی، گرام، دونوں کو سرکہ میں پکائیں پھر مل چھان کر
شہد خالص ملا کر قوام تیار کریں اور مرہین کو تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔
بہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱۔

قحط کرنس، بادیان، کردانا، زیرہ، نانخواہ، ہر ایک ۵ گرام، سنبل الطیب، گل سرخ،
وج، فودہ، ریوند چینی ہر ایک ۵۔۵ گرام، مویر منقی ۲۰ گرام، اصل السوس مقشر ۱۰ گرام، انجیر
زرد ۵ عدد، ————— تمام دواؤں کو ۱۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو
مل چھان کر ۱۲ ملی لیٹر، ہمراہ روغن میدا انجیر ۶ ملی لیٹر، صبح کو نوش کرائیں۔
————— پوست درخت سپتال، ۲۵۰ گرام کو پانی میں جوش دیں جب نصف
رہ جائے تو شکر سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔


————— جو اکھار، ریوند چینی، شورہ قلمی، بادیان، نمک ترب، ہر ایک ۲ گرام، تمام
دواؤں کو باریک کر کے نبات سفید ۸ گرام ملا کر سفوف بنائیں اور ۱ گرام، صبح، شام، ہمراہ
آب تازہ استعمال کرائیں۔

————— خار خشک کلاں، قندریون، مغز تخم خربزہ ہر ایک ۲ گرام، بسفاج بریا،
۸۵ گرام، تخم گور ۲۲۵ گرام ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵ گرام کھلائیں۔ اس سے
بعد تخم کدو، تخم خیارین، خار خشک ہر ایک ۲ گرام کا پانی میں شیرہ نکال کر شربت بزوری ۸۴
ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

احتباس بول

URINARY RETENTION

اس مرض میں پیشاب مشانہ میں جمع ہوتا رہتا ہے لیکن مشانہ کے فعل میں
خلل واقع ہونے کے سبب اس کا طبعی طور پر اخراج نہیں ہو پاتا،



اسباب |

۱۔ امراض راس :-

۱. شدید صدمہ

II. غشی

III. تزعزع الدماغ

IV. نزف

V. مرکزی نظام اعصاب کے بعض امراض

VI. نخاعی حصہ میں ضرب یا جراحت

VII. عصبی ہیجان

۲۔ امراض مثانہ :-

I. ضعف مثانہ

II. فالج مثانہ

III. ضرب مثانہ

IV. حرارت وحدت مثانہ

V. اختباس بول ارادی

VI. استرخاؤ مثانہ

VII. التهاب مثانہ

۳۔ امراض مجبری بول :-

I. انشقاق مجری بول

II. اختباس حصاة

۱۱. التهاب مجری بول

۱۲. تضیق مجری بول

۱۳. سلعہ مجری بول

۱۴. تسد دنا نژہ

۱۵. لحم زائد

۱. امراض معدیۃ و امعاء

۱. تھمد امعاء

۲. ورم امعاء

۳. امراض کلیہ

۱. ضعف کلیہ

۲. التهاب کلیہ

فتور قوی

۱. قوت حساسہ کا متاثر ہونا

۲. قوت محرکہ کا فتور

۳. ضعف قوت دافعہ

حاد / متعدی ۲ امراض

۱. ہیضہ

۲. حمی محرقہ اسہالی

۳. سوزاک

۴. حمی قرمز

متفرقات

۱. شدید استفراغ

۲. سیال اشیاء کا عدم اشتعال

۳. اسقاط حمل

۴. اختناق الرحم

- (I) درم غدہ قد امیہ
(II) قسم
(III) ضیق النفس
(IV) زخم کبج ران
(V) شدید تحریک سے مرکز بول میں رکاوٹ (اعضاء بول یا مقعد کے آپریشن میں)
(VI) قطنی مرکز کا تھک جانا۔
(VII) ظہری حصہ میں ضرب، جراثیم۔
(VIII) غلبہ خلط حار / خلط بارد۔
(IX) غلبہ خلط لزج۔

علامات

عظم حانہ کے اوپر درد ہوتا ہے، اور مریض کو پیشاب کی ہر وقت حاجت کا احساس ہوتا ہے، عظم حانہ کے اوپر قرع (Percussion) کرنے سے نشانہ کے پھیلے ہونے سے، ٹھوس آواز آتی ہے، پیشاب کا رنگ گہرا اور غلیظ القوام ہوتا ہے۔ جس کے سبب اس کے ثقل اضافی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، نشانہ میں نفخ، ثقل، صلابت اور درد ہوتا ہے۔ قلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے۔

عنفی و ظہری نغاعی حصہ میں ضرب یا جراثیم کے باعث عارض ہونے والے احتباس بول میں مرضی علامات یک بیک نمودار ہوتی ہیں۔ اور انسداد کی جملہ علامتیں مفقود ہوتی ہیں۔ درد اور تشنج ہوتا ہے، بتدریج مرضی علامات رونما ہونے کی صورت میں نشانہ کے بہت زیادہ پھیل جانے پر بھی درد نہیں ہوتا۔ اور احتباس کے برقرار رہنے اور نشانہ کے پھیل جانے پر پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے۔ سوزاک کی صورت میں شدید احتباس بول ہوتا ہے، یہ جوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔ استرخاء، عضلات نشانہ کی صورت میں پیشاب میں دھار نہیں بنتی، لچم زائد کی صورت میں زائدہ کو قاشا طیر سے محسوس کیا جاسکتا ہے، نشانہ میں صلابت ثقل، تمدد اور شدید درجہ ہوتا ہے،

خلط حار کی صورت میں پیشاب میں حدت ہوتی ہے، رنگ سُرخ ہوتا ہے اور قیض کے سرے پر شدید سوزش ہوتی ہے، خلط بارد کی صورت میں پیشاب سفید، غلیظ، یارقیق ہوتا ہے، خلط لزج کی صورت میں پیشاب میں خام رطوبات خارج ہونے اور ثقیل و غلیظ اغذیہ کے استعمال کی سرگزشت ملتی ہے، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کی روئیداد ملتی ہے۔ اور عانہ میں ثقل محسوس ہوتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- _____ لحم زائد کی صورت میں مرخیات کے جو شانہ سے آہزن کرائیں۔
- _____ مثانہ اور قیض کے درمیانی مجری میں لیسیدار رطوبت کی زیادتی کی صورت میں اعلیٰ درجہ کے مدرات استعمال کرائیں۔
- _____ ضعف قوت دفعہ کی صورت میں آہزن کی حالت میں مثانہ کو دبائیں اور قوت دفعہ کو قوی کرنے والے روغنیات کی مالش کریں۔
- _____ ضربہ و سقطہ کے نتیجہ میں اگر تشنج یا ہلہل ہو تو باسلیق کی فصد کھولیں،
- _____ مثانہ کی حص میں ضعف کی صورت میں خوشبودار دواؤں کا ضما د کریں اور زعفران یا روغن بلساں اَحلیل میں ٹپکائیں۔

علاج |

- _____ ضعف مثانہ کی صورت میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۰

دارچینی، سنبل الطیب، سعد کوفی، سلیمہ، قرفل، جوز ہوا، زرنب، بسباسہ، ہر ایک اُگرام _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۱

معجون اذرا راتی اور معجون فلاسفہ ۶ _____ ۱۲ گرام کھلائیں۔

_____ حرارت کی صورت میں درج ذیل نسخہ اپنائیں۔

نسخہ ۱۔

لعاب اسپنول ۶ گرام، لعاب بہدانہ ۳ گرام نکال کر شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر مخل کر کے نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ حصۃ المٹانہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ اپنائیں۔

نسخہ ۱۔

انیسون، دو تو ہر ایک ۴ گرام، تخم کر فض، تخم شلجم صحرائی ہر ایک ۶ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو جوش دے کر شربت بزوری حارہ ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ استرخاء اور تشیخ کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

دارچینی، سعد کوفی، سنبل الطیب، بے باسہ ہر ایک ۵ گرام، پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

بادیان، بنفشہ، غلب الثعلب خشک، بیج بادیان، بیج کاسنی، ہر ایک ۶ گرام تخم قرطم ۶ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر کھنکھندہ ۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ احتباس بول میں درج ذیل نسخہ جات بھی مفید و مجرب ہیں۔

نسخہ ۱۔

حجریہ بود ۴ گرام، شورہ قلمی ۸ گرام، آب برگ مولیٰ میں کھل کر کچے پانچ سیر اُبلوں کی آگ دیں، یہ عمل تین مرتبہ دہرائیں اور اگر ہمراہ شیرہ کاسنی استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جواکھار، نمک ترب، شورہ قلمی ہم وزن، پس کر ۳ گرام ہمراہ شیرہ بز استعمال

کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جواکھار، شورہ قلمی، بادیان، نمک ترب، ریوند چینی ہم وزن، باریک پس کر

بنات سفیدہ ۸ گرام، کسے سفوف میں ملائیں اور ۴ گرام صبح، شام ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

شورہ قلمی مصفی، خردل ہم وزن، ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں سخت کر نہار منہ نوش کرائیں۔

نسخہ ۱-
روغن بید انجیر، ۵/۳ ملی لیٹر، پانی میں ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲-
شورہ قلمی اگر ام، پس کر روغن گاؤ، ۱۲ ملی لیٹر اور شکر سفید ۸ گرام، ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۳-
سقولو قند ریون، مغز تخم خربزہ، ہر ایک ۲۴ گرام، بسفانج بریاں ۴ گرام، تخم گزر بری ۳ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۵ گرام کھلا کر عرق مکوہ ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔ عرق مکوہ کی بجائے شیرہ تخم کدو، شیرہ تخم خیارین، شیرہ خار خشک ہر ایک ۳ گرام، پانی میں نکال کر شربت بزوری ۸/۴ ملی لیٹر، حل کر کے نوش کرا سکتے ہیں۔

نسخہ ۴-
خار خشک کلاں ۱۲ گرام، زنجبیل ۶ گرام، روغن بید انجیر ۶ ملی لیٹر، پانی الیٹر، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تول چھان کر نوش کرائیں۔
خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵-
خطمی، خجازی، بنفشہ، حلبہ، بابونہ، شہیت، پرسیاوشاں ہر ایک ۱۲ گرام، گل کسمب، گل پلاس، سبوس گندم ہر ایک ۳۶ گرام — تمام دواؤں کو الیٹر پانی میں جوش دے کر ۲۰ لیٹر گرم پانی میں ملائیں اور اس میں مریض کو ۱۰ منٹ تک آبن کرائیں۔

نسخہ ۶-
تخم کتاں، تخم حلبہ، حب قرطم، برگ کرنب، تخم خطمی ہر ایک ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو الیٹر پانی میں جوش دیں پھر ۲۰ لیٹر گرم پانی میں ملا کر مریض کو آبن کرائیں۔
تو قسطور ۱-

سیلاب ۲ گرام اکیلل میں ٹپکائیں۔

نسخہ طلا ۱۔

شورہ قلبی، کا فورہم وزن، پانی میں پیس کر ناف پر طلا کریں۔

نسخہ ضداد ۱۔

بابونہ، حب الغار، شب یمانی، اکیلل الملک، حماما، آرد نخود سیاہ، ہر ایک ۳ گرام، تخم ترب، تخم کرنس کوہی، تخم کرنس بستانی، دو قو، ہر ایک ۲۴ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب کرنس ارمنی، روغن بلساں اور روغن سوسن حسب ضرورت، میں ملا کر ضداد کریں۔

نسخہ ضداد ۱۔

حب النیل ۱ گرام، شورہ قلبی ۵ گرام کو باریک پیس کر روغن بلساں میں حل کر کے پیڑو پر ضداد کریں۔

نسخہ ضداد ۱۔

شورہ قلبی ۳ گرام، حب النیل ۲ گرام، کا فورہ ۳۶ گرام — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر ضداد کریں۔

نسخہ ضداد ۱۔

سوسن، اکیلل الملک، شمع ارمنی، شبت ہم وزن کو پانی میں پیس کر ضداد کریں۔

نسخہ مالش ۱۔

روغن بنفشہ، اور روغن کدو ملا کر مٹانہ پر مالش کریں۔

نسخہ نطول ۱۔

گل ٹیسو کو پانی میں جوش دے کر پیڑو پر نطول کریں۔

نسخہ تکبید ۱۔

شورہ قلبی ۶ گرام، تھوڑے سے پانی میں حل کریں اور کیڑے کی ایک گدی بنا کر نیم گرم تکبید کریں۔

نسخہ تکبید ۱۔

گل ٹیسو کو پانی میں جوش دے کر ثقل سے تکبید کریں۔

۔۔۔۔۔ لحم زائد اور احتیاس بول انسدادی میں قاتنا طیر سے استعمال کریں۔

بول الدم

HAEMATURIA

اس مرض میں پیشاب کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے، جس کے سبب پیشاب کا رنگ عنالی (لبکا گلابی، گوشت کا دھون) یا گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔

اسباب |

۱۔ مراض کلیہ

- (I) حصاة کلیہ
- (II) تدرن کلیہ
- (III) استسقاء کلیہ
- (IV) التهاب کلیہ
- (V) سرطان کلیہ
- (VI) ضربہ کلیہ
- (VII) ہزال کلیہ
- (VIII) سلعات کلیہ
- (IX) ضعف کلیہ

۲۔ مراض حالب

- (I) حصاة حالب
- (II) سرطان حالب
- (III) لحم زائد

۲۔ مراض مشانہ

- (I) سلعة کلیہ

۱۰۰. سرطان مثانه
 ۱۰۱. سرطان غده قدامیه
 ۱۰۲. سرطان بشره مخاطیه
 ۱۰۳. تدرن غده قدامیه
 ۱۰۴. حصاة مثانه
 ۱۰۵. التهاب مثانه
 ۱۰۶. مزه وسقطه مثانه
 ۱. امراض مجری بول :-
 ۱. التهاب مجری بول
 ۲. احتباس حصاة
 ۳. امراض قلب و دوران خون :-
 ۱. التهاب بطانیة القلب
 ۲. تکلس شریانی
 ۳. امراض خون :-

۴. امراض معدة و امعاء :-
 ۱. سرطان معاء مستقیم
 ۲. قروح امعاء
 ۳. تدرن امعاء
 ۴. التهاب زائده اعور
 ۵. احتباس دم بواسیر

۵. امراض اعضاء تناسل :-
 ۱. احتباس دم حیض

II, کثرت جماع
حاد / متعدی ۲ مراض ۱۔

I, حمی اجامیہ

II, حمی زرد

III, جدری

IV, حصہ

انفعالات نفسانی ۱۔

I, خوشی و مسرت

II, رنج و غم

۱ مراض ۲ اعصاب ۱۔

I, کزاز

متفرقات ۱۔

I, امتلا دم

II, بھاری چیزیں اٹھانا

III, کودنا پھاندنا

IV, سورمز آج سرد و خشک

V, شدید سردی

VI, غلبہ رطوبت

VII, گرم ادویہ اور اغذیہ

علامات

بول الدم کے ساتھ عام طور پر دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں مثلاً درد،
بھار، اور کثرت بول وغیرہ، اور ان علامات سے مقام مرض کی تعیین کی جاسکتی ہے،
لیکن بعض اوقات بول الدم کے سوائے اور کوئی علامت نہیں ہوتی، تاہم قارورہ کے

رنگ، خون آنے کی تقدیم و تاخیر، پیشاب میں خون کی مقدار و زلال اور مقام درد سے مقام مرض کی تعیین بآسانی کی جاسکتی ہے۔

پیشاب کا رنگ :-

سرخ خون کا آنا، سیاہی مائل خون آنا یا قلیل مقدار میں خون آنا، مرض

مشانہ کی علامت ہے،

خون کی تقدیم و تاخیر :-

اگر پیشاب کے اخیر میں خون آتا ہے یا پیشاب کے آخری حصہ کا رنگ پہلے سے زیادہ گہرا ہے تو یہ یقینی طور پر، مرض کے مقام مشانہ کی علامت ہے، پیشاب کے باقی حصہ کا بالکل صاف ہونا بھری بول یا غدہ قد امیہ سے خون آنے کی علامت ہے، تاہم مشانہ میں کافی مقدار میں جریان خون کی صورت میں بھی پیشاب کا رنگ یکساں ہوتا ہے، پیشاب میں خون کی مقدار :-

پیشاب میں خون کی بہت زیادہ مقدار سلعہ مشانہ یا سلعہ کلیہ کی علامت ہے، سلعہ حلیہ یا سرطان مشانہ میں بھی ذمعتاً بہت زیادہ خون آتا ہے، اس کے ساتھ درد نہیں ہوتا، بعض اوقات سخت سخت سے پیشاب میں خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ سلعہ یا حصہ کی بہت واضح علامت ہے۔

زلال :-

پیشاب میں، خون کی مقدار سے زیادہ زلال، کلیہ سے خون آنے کی

علامت ہے۔

مقام درد :-

جسم کے ایک طرف، آخری ضلع اور عضلہ مقوم العمود سے زادیہ میں درد ہو، جو عرف الحرقہ (سے ہوتا ہوا کچراں) سے ہوتا ہو، تو یہ مشانہ سے خون آنے کی علامت ہے، اگر بول الدم کے ساتھ کثرت بول بھی ہو۔ اور پیشاب کے بعد قصبہ میں درد ہو تو یہ بھی مشانہ سے خون آنے کی علامت ہے۔

دیگر علامات :-

(کلیہ) سے آنے والا خون پیشاب میں ملا ہوتا ہے ، اور اس میں کلیہ کے قشور بھی پائے جاتے ہیں۔

مثانہ سے آنے والا خون ، پیشاب کے بعد خالص خون ہوتا ہے یا آخری پیشاب میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں خون کے منجھ مٹھڑے بھی ملتے ہیں۔

مجری بول سے آنے والا خون ، پیشاب سے پہلے ، آخر پیشاب میں یا پیشاب کے بعد قطرے قطرے یا دھار کی شکل میں آتا ہے۔ غده مذی سے آنے والا خون ، پیشاب کے بعد اور قلیل مقدار میں آتا ہے۔

ذیل میں مقام مرض کے اعتبار سے چند تقریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تقریقی علامات

بول الدم (مثانی)

- ۱۔ مرض مثانہ کی سرگزشت ملتی ہے۔
- ۲۔ خون قارورہ کے بعد آتا ہے
- ۳۔ پیشاب میں منجھ خون کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔

- ۴۔ درد مثانہ ، درد قصب ہوتا ہے
- ۵۔ مثانہ میں بشرہ مثانی ملتا ہے

حمر الدم بولی

- ۱۔ حمی اجامیہ کا نتیجہ ہوتا ہے
- ۲۔ کریات حمراء کی قلت ہوتی ہے
- ۳۔ مادہ ملونہ دمویہ کی کثرت ہوتی ہے

- ۴۔ حجرۃ الدم بولی سے قبل معمولی قشریرہ ، یرقان دمعدی خلل ہوتا ہے
- ۵۔ مادہ ملونہ تہ نشین رہتا ہے

بول الدم (کلوئی)

- ۱۔ کلوئی ، دموی مرض کی سرگزشت ملتی ہے
- ۲۔ خون قارورہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے
- ۳۔ پیشاب میں رطوبت ، میصنہ و قشور دموی ہوتا ہے۔

- ۴۔ درد کمر ہوتا ہے

- ۵۔ پیشاب میں بشرہ کلوئی ملا ہوتا ہے

بول الدم

- ۱۔ عام طور سے مرض کلیہ کا نتیجہ ہوتا ہے
- ۲۔ پیشاب میں کریات حمراء کی کثرت ہوتی ہے
- ۳۔ پیشاب میں مادہ ملونہ دمویہ کی قلت ہوتی ہے۔

- ۴۔ بول سے پہلے درد کمر کی شکایت ہوتی ہے۔

- ۵۔ پیشاب جمع رکھنے سے مادہ ملونہ تہ نشین ہو جاتا ہے

۶۔ پیشاب جمع رکھنے سے متغیر نہیں ہوتا | ۷۔ اکثر یکایک تغیر ہو جاتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ فصد کھولیں۔
- _____ حجامت کریں
- _____ خوں میں حدت کی صورت میں مثانہ پر سرد عرقیات کا نطول کریں۔
- _____ نفث الدم کا اصول علاج اختیار کریں۔
- _____ حابسات دم کے ساتھ مسکنات استعمال کرائیں
- _____ عروق اعضا بول میں تاکل کی صورت میں تزوج کبہ و مثانہ کا اصول علاج اختیار کریں۔
- _____ بول غسالی کی صورت میں ضعف کبد اور ضعف کلیہ کا اصول علاج اپنائیں۔
- _____ بول شعری کی صورت میں حصاة الطیہ و المثانہ کا اصول اختیار کریں
- _____ نیز ملطف اور قاطع مدرات بول استعمال کرائیں۔

علاج |

- _____ احتباس دم کے لیے درج ذیل نسخہ نوش کرائیں۔
- نسخہ ۱۔
- گل ارمنی، دم الاخوین، سنگ جراحی، صمغ عربی، کیترا، شادنج عدسی مغسول، ہر ایک اگرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پھنکائیں۔ _____ اس کے بعد تخم خشخاش، تخم خرفہ ہر ایک ۶ گرام، کاسچ ۵ گرام _____ تمام دواؤں کو پانی میں پیس چھان کر شربت حب الاس ۲۴ ملی لیٹر شامل کر کے تخم بارتنگ ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- _____ منہز تخم خیبار ۲۲ گرام، کیترا، نشاستہ، گلنار، مک، صمغ عربی، دم الاخوین، ہر ایک ۵۳ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب خرفہ میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور ہمراہ شربت عناب کھلائیں۔
- _____ چاکسو مدبر ۲ عدد، باریک کر کے پھنکائیں اس کے برادہ صندل، _____

پانی میں بھگو کر مل چھان کر بوقت خواب نوش کرائیں۔
 شربت عناب میں خیساندہ کشنیز، جل کر کے نوش کرائیں مفید و مجرب ہے۔
 گل ارمنی، صمغ عربی، ہر ایک ۵، ۳ گرام، روغن بادام میں چرب کر کے
 شربت عناب / شربت خضخشاں کے ساتھ استعمال کرائیں۔

تخم بارتنگ بریاں، اسپغول بریاں، تخم ریحان بریاں، ہر ایک ۵، ۴ گرام
 تمام دواؤں کو روغن بادام میں چرب کر کے شربت انجیر کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
 طباشیر، کیترا، زرشک بیدانہ، تخم حماض، تخم کشنیز، صندل سفید،
 گل ارمنی، گلنار، صمغ عربی، ہر ایک ۴، ۲ گرام، تخم خیار، تخم خرفہ، سنگھاڑا، خارخسک،
 کشتہ قلسی، ہر ایک ۶۰ گرام، اسپغول، کھربا، ہر ایک ۱۲ گرام، اسپغول کے ملاوہ
 تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق بید مشک اور لعاب اسپغول کے ساتھ اقراص
 بنائیں اور ۵، ۴ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

شاذ بلخ مغسول، دم الاخویں، شب یمانی، بد، کھربا، گلنار، گل قمری،
 تخم خرفہ، گل ارمنی، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۵، ۴ گرام
 ہمراہ آب سماق استعمال کرائیں۔

کھربا، شبنم، بد سوختہ مغسول، تخم خرفہ مقشر، کشنیز خشک
 بریاں، صمغ عربی بریاں، بزرالنج سفید، لک مغسول، تخم خرفہ مقشر، کشنیز خشک، کیترا،
 ہر ایک ۵ گرام، شاخ گوزن سوختہ، تخم حماض، پوست بیضہ مریض سوختہ، گل ارمنی،
 خرہرہ سوختہ، گلنار فارسی، مشک، ہر ایک ۳ گرام، مصطکی بریاں، انیون، زعفران،
 ہر ایک ۱ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب خرفہ میں گوندھ کر اقراص بنائیں
 اور ۵، ۴ گرام ہمراہ شربت عناب استعمال کرائیں۔

تخم خرفہ، مغز تخم خیار، مغز تخم بادبرنگ، اسپغول، ہر ایک ۵، ۱۰ گرام،
 کیترا، نشاستہ، ہر ایک ۴ گرام، اقا قیا، گل قمری، ہر ایک ۱ گرام، کھربا ۵، ۴ گرام، اسپغول
 کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک پس کر لعاب اسپغول میں ملا کر ۴، ۵ گرام کی اقراص
 بنائیں اور اقراص ہمراہ آب خرفہ استعمال کرائیں۔

شب یمانی بریاں، قند سیاہ کھنہ، ہم وزن کو کوٹ کر چنے کے

برابر گویاں بنائیں اور روزانہ ایک گولی استعمال کرائیں۔
 ۱۔ شاخ گوزن سوختہ، کیترا، ہم وزن رب آس کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
 ۲۔ اقا قیا، جفت بلوط، اظفار الطیب، راکم، کندر ہم وزن۔ تمام
 دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵۰ ملی گرام، ہمراہ آب سرد استعمال کرائیں۔
 ۳۔ دم الاخوین، سنگ براجت، گل ارمی، کات سفید، کندر، صغ عربی،
 کیترا، شب بمانی بریاں، نبات سفید، ہم وزن کا سفوف بنائیں اور ۹ گرام ہمراہ آب
 خرفہ استعمال کرائیں۔

۴۔ مربی آملہ اور مربی سیب کھلائیں۔
 ۵۔ دوب گھاس سفید ۱۲ گرام کو فلفل سفید دکھنی کے ہمراہ پانی میں پیس کر
 نوش کرائیں۔

۶۔ چھوٹا کریل پانی میں پیس کر مل چھان کر نوش کرائیں۔
 ۷۔ کل سرخ، اقا قیا، صندل تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر بلور
 ضاد لگائیں۔

۸۔ امتلا ریارت اخلاط کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولیں۔
 ۹۔ کلیہ اور مثانہ وغیرہ کے کسی شرکی مرض کی وجہ سے یہ عارض ہوا ہو، نیز
 مادہ کا تنقیہ مقصود ہو تو صافن کی فصد کھولیں فصد سے قبل مسکنات
 ضرور استعمال کرائیں۔ مثلاً شربت نیلوفر، شربت عناب وغیرہ،
 عانہ پر پچھنہ لگانا بھی سود مند ہے۔

حرقۃ بول

BURNING MICTURATION

اس مرض میں پیشاب کرتے وقت اور اس کے بعد سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے
 اور قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے۔

اسباب |

۱۔ امراض مثانہ :-

- (۱) جرب مثانہ
- (II) بشور مثانہ
- (III) التهاب مثانہ
- (IV) حدت بول
- (V) کثرت بورتیت

۲۔ امراض کلیہ :-

- (۱) التهاب کلیہ
- (II) قروح کلیہ

۱۔ امراض مجاری بول :-

- (۱) جرب و بشور مجاری بول

۱۔ امراض اعضاء تناسل :-

- (۱) کثرت جماع کے سبب مجاری بول کی رطوبت لزج کاکم ہونا یا زائل ہونا۔
- (II) قروح قینیب۔
- (III) بعض امراض رجم

۱۔ امراض معد لا و امعاء :-

- (I) قبض
- (II) بواسیر
- (III) سورہضم
- (IV) ویدان امعاء

متفرقات :-

- (I) حار المزاج ہونے کے ساتھ حار المزاج غذاؤں اور دواؤں کا استعمال۔
- (II) مدرات قویہ

علامات |

پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ کچھ دیر تک ٹپکتا ہے، رنگت زرد یا سرخ ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، حرارت مزاج کی صورت میں سوزش کے ساتھ پیشاب زرد یا سرخ ہوتا ہے اور گرم اشیاء کھانے کی سرگزشت ہوتی ہے، قروح اور جرب کی صورت میں پیشاب میں پیپ قشور، یا خون شامل ہوتا ہے، مجری بول میں رطوبت کی کمی یا فقدان کی صورت میں بخف نمدابیر کی سرگزشت ملتی ہے، التهاب کلیہ کی صورت میں، اس مرض کی علامات مخصوصہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ ادویہ عارضہ کی صورت میں، ان کے استعمال کی روداد ملتی ہے،

اصول علاج |

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- عمل مہتمم کی اصلاح کریں۔
- سرد و تندابیر اختیار کریں۔
- مصفیات کھلائیں۔

علاج |

- مرض کی ابتداء میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

تنخم خیبارین، تنخم خرپڑہ، خار خسک، ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کا پانی میں شیدہ نکال کر شربت بزوری معتدل ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

ربوند خطائی، شورہ، برگ حنا، ہر ایک ۷ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۲۵ گرام، صبح کو گرم پانی میں بھگو دیں اور شام کو اس کا زلال، شربت بزوری ۲۴

ہی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 صبح کو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
 نسخہ:-

درخت کیلہ کے تنے پر شام کو تھوڑا سا شگاف لگا کر اس کا پانی حاصل کریں
 اور صبح تک جمع شدہ پانی نوش کرائیں۔

• صندل زرد، صندل سرخ، صندل سفید، ہر ایک ۲۵۰ ملی گرام،
 تخم کاسنی، کافور، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، نبات سفید ۲۵ گرام۔ نبات سفید
 کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک پس کر، نبات سفید کو پانی میں گھول کر کئے مذکورہ سفوف
 چھڑک کر نوش کرائیں۔

• کشیز خشک، گل نیلوفر، آملہ مقشر، ہر ایک ۶ گرام، صندل سفید
 ۴ گرام۔ تمام دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت
 نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

• لعاب اسپنول ۱۲ گرام، روغن گل ۶ ملی لیٹر ملا کر استعمال کرائیں۔
 • لعاب اسپنول، خار خشک، ہر ایک ۶ گرام، خار شتر ۴ گرام۔
 تمام دواؤں کا پانی میں شیرہ نکال کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ استعمال
 کرائیں۔

نسخہ:-


تخم خیارین، اسپنول ہر ایک ۶ گرام، گل خطمی ۳ گرام، عرق شاہترہ ۱۲۰ ملی لیٹر،
 اسپنول کے علاوہ تمام دواؤں کو عرق شاہترہ میں جوش دے کر نبات سفید ۱۲ گرام
 سے شیریں کریں۔ اور اسپنول چھڑک کر نوش کرائیں۔

• کباب چینی، کتیرا ہر ایک ۳ گرام، دونوں دواؤں کا سفوف بنائیں،
 اور کھلائیں اس کے بعد کاکچ، حب القلت، تخم خیارین، ہر ایک ۶ گرام کو عرق
 کاسنی ۱۷۵ ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بزدوری بارد ۴۸ ملی لیٹر سے
 شیریں کر کے نوش کرائیں۔

سوزاک

GONORRHOEA

اس مرض میں مجری بول کی غشاء مخاطی میں التهاب ہو جاتا ہے جو متعدی و متفرج ہو کر قریبی نمد دیک پہنچ جاتا ہے، اور بعض دوسرے مرضی عوارض کا باعث ہوتا ہے۔



اسباب

۱۔ مراض ۲۔ عضائے تناسل ۱۔

۱۔ بنقہ سوزاک نائیسیریا سوزاک Gonococcus Neisseria
۲۔ سے متاثر شخص سے جنسی روابط۔ Gonorrhoeae

۳۔ مریض کا لباس پہن لینا۔ (انڈر ویر وغیرہ)

۴۔ جلن

۵۔ جماع ناقص

۶۔ اختلام ناقص

۷۔ افلام بازی

۸۔ مجامعت کے بعد عضو مخصوص کا اچھی طرح نہ دھونا

۹۔ سیلان الرحم کی مریضہ سے مباشرت

۱۰۔ حالت جیفی میں جنسی روابط

متفرقات

۱۱۔ دراشت

کثرت سے نوشی / مرچ مصالحہ کا بکثرت استعمال

علامات |

حادثہ ۱-

سوزاک حادثہ کو تین درجات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا درجہ ۱-

نقہ سوزاک نائیسیریا سوزاک Gonococcus Neisseria

(Gonorrhoeae) (کریات زوجہ) سے متاثر شخص سے جنسی روابط

— کے عموماً دوسرے یا تیسرے دن یا زیادہ سے زیادہ پانچویں دن احلیل میں
التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب میں خارش، گدگدی اور سوزش محسوس ہوتی
ہے، التهاب کی وجہ سے احلیل کا منہ سرخ، کشادہ اور متورم معلوم ہوتا ہے، اور اس میں
ایک طرح کی رطوبت بھری ہوتی ہے، جو حشفہ کو کچر کر دبانے سے خارج ہوتی ہے،
ابتداء میں اس کا رنگ ہلکا نیلگوں خاکستری یا سبز ہوتا ہے۔ یہ حالت عموماً تین چار
دن تک رہتی ہے۔

دوسرا درجہ ۲-

رطوبت غلیظ ہو کر پیپ سے مشابہ ہو جاتی ہے اور خود بخود زیادہ مقدار
میں خارج ہوتی ہے، دہانہ احلیل کے کنارے متورم ہو جاتے ہیں، کچر ران کے غدود
بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پشت، کمر اور کولہوں میں تناؤ کے ساتھ شدید
درد ہوتا ہے، تمام نظام بدن میں خلل واقع ہو جاتا ہے، قبض ہوتا ہے، ضعف
اشتہار کی شکایت ہوتی ہے، جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات
مجری بول کے متورم ہو جانے سے احتباس، جریان خون اور قلت الدم وغیرہ
شکایات ہو جاتی ہیں۔ اذعیہ منی اور اغدیہ کوس وغیرہ میں بھی التهابی کیفیت
پیدا ہو جائے تو اس مرحلے میں بالعموم ازالہ مرض کی توقع نہیں ہوتی۔ بصورت دیگر
یہ تکلیف دو تین ہفتہ تک رہتی ہے۔

تیسرا درجہ ۳-

علاماتِ داءِ ارض میں تخفیف ہونے لگتی ہے، پیشاب کے وقت سوزش اور درد، خفیف ہوتا ہے، پیپ کم مقدار میں خارج ہوتی ہے، بروقت مناسب علاج سے مرض سے شفا یابی ہو جاتی ہے۔

مزمن :-

طویل عرصہ تک کم و بیش پیپ آتی رہتی ہے، بعض اوقات پیشاب کرتے وقت سوزش اور درد محسوس ہوتا ہے، تاہم کوئی دوسری مرضی علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔
کچھ عرصہ بعد مجری بول کے آس پاس رطوبتیں جمع ہونے لگتی ہیں، جس کے سبب اچیل تنگ ہو جاتا ہے۔ تقطیر البول ہوتا ہے۔

عورتوں میں سوزاک کی ابتداء میں مجری بول، عنق الرحم، اور فرج میں سوزش ہوتی ہے، رطوبت خارج ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے، شفران میں ورم ہوتا ہے، مجری بول کا منہ منورم، سرخ اور اس کے کنارے باہر کی طرف اُٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پیپ خارج ہوتی ہے، عنق الرحم بھی ملتبہ ہوتا ہے، اس سے پیپ آتی ہے، شفران کے فدد بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات سوزش کا اثر قاذف اور خصیتہ الرحم تک پہنچ جاتا ہے، اور بار بطون میں مقامی التهاب پیدا ہو جاتا ہے، وضع حمل کے وقت اگر ماں کا سوزاک مادہ نومولود کی آنکھوں میں لگ جائے تو آنکھوں میں نہایت شدید التهاب ہوتا ہے۔ اور مختصر عرصہ میں ہی نومولود کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

سوزاکِ مادہ (کریات زوجیہ) خون میں شامل ہو کر جسم کے اعضاء بعیدہ کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، عام طور پر یہ جراثیم جوڑوں (مفاصل) میں اپنے مراکز قائم کر لیتے ہیں اور گھٹنے، کہنی، سٹھنے اور گولہ کے جوڑ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جسم پر پھوڑے، پھنسیاں نکل آتی ہیں، بعض اوقات ورم بطنہ قلب، بول الدم، احتباس بول، التهاب مثانہ، ورم خصیہ، اور نامردی بھی ہو جاتی ہے۔

اصول علاج |

- ۔ ابتداً درمیں نفیض مدرات اور مسکنات استعمال کرائیں۔
- ۔ مصفیات خون استعمال کرائیں۔
- ۔ دافع جراثیم ادویہ کھلائیں۔
- ۔ قصد کھولیں
- ۔ تھے اور اسہال کی تدابیر کریں۔
- ۔ حسب ضرورت، دواؤں کو احلیل میں ٹپکائیں۔

علاج |

۔ شدتِ مدت کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱:-

تخم خرفہ، تخم کاہو، اسینغول، ہمدانہ ہر ایک ۱۲ گرام کا پانی میں شیشہ کالیں اور شربت بنفشہ یا شربت خنشا ش ۱۲ ملی لیٹر سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۲:-

بنادق البنزور ۱۲ گرام، شیرہ تخم خیاریں ۶۰ ملی لیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳:-

تخم خیاریں، تخم خریزہ ہر ایک ۶ گرام، برادہ صندل ۵ گرام، تخم کاسنی، تخم کاہو، ہر ایک ۴ گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر شربت بنزوری ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴:-

پوست فالسہ ۱۲ گرام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو لچھان کر شربت بنزوری ۸ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۵:-

روغن صندل ۱ ملی لیٹر، بتاشہ میں ڈال کر کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

تخم خرفہ، تخم خیار، تخم کاسنی، تخم کاہو، ہر ایک ۹ گرام، مغز تخم کدو، مغز تخم خربزہ
تخم خشکاش ہر ایک ۵ گرام، ہیل خورد، کشنیز، ہر ایک ۲ گرام — تمام دواؤں کو باریک
پیس کر شربت نیلو فراد و عرق بید مشک، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر کے ساتھ کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

تخم کاسنی ۵ گرام، عرق گاؤ زبان ۱۲۰ ملی لیٹر میں پیس کر مل چھان کر شربت
بزوری ۴۸ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

شیرہ خار خشک، شیرہ خطی، ہر ایک ۵ گرام، شیرہ تخم خیارین ۹ گرام، شیرہ
زیرہ سفید ۴ گرام، شیرہ تخم کاسنی ۵ گرام، پانی میں پیس کر حاصل کریں اور شربت
مندل ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۴۔

خار خشک، تخم خرفہ، تخم کاہو، تخم کاسنی، کشنیز، آملہ، مندل سفید، ہر ایک ۵ گرام
تمام دواؤں کو رات میں گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت فالسہ
۳۶ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۵۔

کباب چینی ۹ گرام، گیرد ۲۴ گرام، کافور خالص ۲ گرام — تمام دواؤں کو
باریک پیس کر ۶ گرام صبح، شام کھلائیں۔

نسخہ ۶۔

شب سیرانی، کباب چینی، ہیل خورد، طباشیر، پوست درخت فالسہ، پھلی کیکر خام،
شورہ قلمی، مصطکی رومی، نبات سفید، ہم وزن کو کوٹ چھان کر ۳ گرام، بکری کے دودھ کے ساتھ
استعمال کرائیں۔

نسخہ ۷۔

روغن مندل، روغن بلساں ہر ایک ۲ ملی لیٹر کو طرک گاؤ زبان ۱۲۰ ملی لیٹر شربت
بزوری ۳۶ ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ:-

روغن بہروزہ، روغن صندل، روغن کباب چینی، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر، روغن السی،
روغن زیتون ہر ایک ۶ ملی لیٹر۔ تمام روغنیات کو باہم ملا کر محفوظ کر لیں اور
دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں کسی قدر پانی ملا کر ۲ قطرہ روغن مذکور ڈال کر صبح، شام نوش
کرائیں۔

نسخہ:-

سنگ جراثیم، دم الاخوین، سرمہ سفید، تخم خربوزہ، تخم نیار، ہر ایک ۱۲ گرام،
بہروزہ مصفی ۳۶ گرام، ہیل خورد، بزر الہنج، ہر ایک ۶ گرام، کا فور ۲ گرام، نبات سفید،
۱۴۵ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں اور تخم نیار، تخم کا ہو،
تخم خشخاش، تخم خرفہ، ہر ایک ۵ گرام کا شیرہ نکال کر نبات سفید ۲۸ گرام حل کر کے
محفوظ کر لیں اور ۷ گرام سفوف کھلا کر شیرہ مذکور نوش کرائیں۔

نسخہ:-

شب سفید، نیلا توتیا ہموزن کا سفوف بنائیں اور ۲۵۰ ملی گرام بالائی میں
پیسٹ کر کھلائیں اور اس کے فوراً بعد بھنیں کے تازہ دودھ ۵۰۰ ملی لیٹر میں لیموں اعداد
نچوڑ کر نوش کرائیں۔

نسخہ:-

سنگ جراثیم، کات سفید، طباشیر، دم الاخوین، گل ارمنی، صغ عربی، کبر شمع
کا فذ سوختہ، خار خشک، ریش برگد، گل سرخ، سرمہ سیاہ، مغز تخم خیبار، مغز تخم کدو
شیریں، مغز تخم بھوا، مغز تخم خربوزہ، ہر ایک ۲۴ گرام، ست سلاجیت ۱۲ گرام،
بہروزہ ۳۶ گرام، تمام دواؤں کا سفوف بنا کر محفوظ کر لیں اور رات میں
گل سرخ ۸ گرام، کشنیز خشک، تخم کاسنی، ہر ایک ۱۲ گرام کو پانی میں ترکیں، صبح کو
مل چھان کر مذکورہ سفوف ۹ گرام کھلا کر خیساندہ نوش کرائیں۔

نسخہ:-

طباشیر کبود، کباب چینی، ہیل کلاں، ست بہروزہ، ہر ایک ۶ گرام، نبات
سفید ۲۴ گرام، روغن صندل ۲۲ ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر روغن صندل

میں ملائیں اور ۲ گرام صبح، شام کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

ریوند خطائی، زیرہ سفید، بہدانہ، اصل السوس، کاسنی ہر ایک ۴ گرام، شورہ قلعی ۵ ر، ۱ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۸ خوراک بنائیں اور ایک خوراک ہمراہ لسی استعمال کرائیں۔

• سوزاک مزمن میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کباب چینی، سنت گلور، طباشیر، ہیل خورد، ہر ایک ۴ گرام، سلاجیت ۶ گرام، کشتہ قلعی ۶ گرام — تمام دواؤں کو پس کر ۱۳ خوراک بنائیں۔ اور ایک خوراک صبح، شام ہمراہ لسی استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

برگ آم، بہروزہ، موم خالص، ہر ایک ۵۰۰ گرام، نوبان، کباب چینی، رال سفید، ہر ایک ۲۵۰ گرام، مصطکی رومی، سندروس، حب بلسا، ہر ایک ۳۵ گرام، تمام دواؤں کو گل حکمت کر کے دس سیر کوٹوں کی آگ سے بطریق بتال خیر روغن نکالیں اور محفوظ کر لیں اور اعلیٰ لیٹر صبح، شام ہمراہ شب یمانی، طباشیر اور کبری کا دودھ نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

طباشیر، سنت بہروزہ، ہیل کلاں، کباب چینی ہر ایک ۶ گرام، نبات سفید ۶ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پس کر روغن صندل ۱۲۵ ملی لیٹر ملائیں اور ۲ گرام بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

صندل سفید، ہیل خورد، طباشیر کمبود، بہروزہ خشک، بہویر، دار چینی، نبات سفید، ہر ایک ۴ گرام — تمام دواؤں کو باریک پس کر اس میں روغن صندل روغن بہروزہ، ہم وزن اس قدر ملائیں کہ ادویہ چرب ہو جائیں اور ۵۰۰ گرام کی بکیاں بنائیں اور حسب ضرورت انکیہ ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

کبریت، زرنج، صدف خالص، سم الفار، ہر ایک ۲ گرام، سہاگہ چوکیہ ۸ گرام،
شورہ قلمی، شب یمانی، ہر ایک ۲ گرام، جوز قلمی ۵ گرام، — تمام دواؤں کو باریک
پیس کر لعاب ٹھیکوار میں خوب سحق کریں اور اقراص بنا کر بوتہ میں لگ حکمت کر کے ۵ سیر
آبلوں کی آگ دیں پھر پیس کر ۵ — ۱۲۵ ملی گرام بالائی میں پیسٹ کر کھلائیں۔
• قرصہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

لوبان کوڑیہ ۲۴ گرام، ریوند چینی ۱۲ گرام، سلاجیت ۶ گرام، شب یمانی
بریاں — ۱۲ گرام، کباب چینی ۳۶ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
روغن کباب اور روغن بہروزہ ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر میں ملائیں اور ۲-۳ گرام صبح، دوپہر
ہمراہ شیرگاہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

بہروزہ ۲۴ گرام کو کپڑے میں چھان کر گائے کے دودھ الیٹر میں ڈال کر خوب
پکائیں اور منہ بند کر دیں، جب دودھ کا کھویا بن جائے تو اتار کر ۵-۶ گرام کے بقدر گولیاں
بنائیں اور ایک گولی روزانہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

سلاجیت، لوبان سفید، ست بہروزہ، ہر ایک ۱۲ گرام، موصل سیاہ، موصلی
سفید، آملہ، ہر ایک ۶ گرام، کات سفید، طباشیر، ہیل خورد، ہر ایک ۵ گرام، گشتہ قلمی
۳ گرام، نبات سفید دو گنا — تمام دواؤں کو باریک کر کے ۹ گرام ہمراہ
آب تازہ کھلائیں۔

نسخہ ۱۔

اصل السوس ۲ گرام، ہیل کلاں ۴ گرام، شورہ قلمی ۶ گرام، سمندر سوکھہ، زیرہ
سفید، ہر ایک ۸ گرام، ریوند خطائی ۱۰ گرام، نبات سفید ۴۰ گرام — تمام دواؤں کو
کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۹ گرام کھلائیں۔

• پچکاری کے طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

نسخہ پچکاری ۱۔

رسوت مگرام، شب یمانی، توتیا سبز، ہر ایک اگرام، عورت کے دودھ میں حل کر کے
پچکاری کریں۔

نسخہ ۱۔

کیترا ۲ گرام، نٹا سنہ، گل ارمی، ہر ایک اگرام، کافور، ملی گرام، سفید
.. ملی گرام، — تمام دواؤں کو پیس کر عورت/بکری کے دودھ میں حل کر کے پچکاری
کریں۔

نسخہ ۲۔

توتیا بریاں، شب یمانی بریاں، کاغذ سوختہ، کات سفید، رسوت، مردار سنگ،
زبان سنگ سوختہ، دم الاخوین، سفیدہ کا شغری، حب النیل ولایتی، ہم وزن کو باریک
کوٹ چھان کر — ۲ گرام آب جغات ۲۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے صبح، شام پچکاری
کریں۔

Learn Unani By Abdul Karim Salmaan

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض اعضائے تناسل

Learn Unani By Abul Waris Salman

اعضائے تناسل کی مختصر تشریح اور منافع

مردوں اور عورتوں کے اعضائے تناسل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، یہاں صرف مردوں کے اعضائے تناسل کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے، کیونکہ عورتوں کے اعضائے تناسل اور امراض کے موضوع پر علیحدہ سے کتابیں موجود ہیں، اور یہ بالکل مختلف موضوع ہے۔

مردانہ اعضائے تناسل :-

یہ درج ذیل اقسام کے ہوتے ہیں

۱. ظاہری اعضائے تناسل

۲. باطنی اعضائے تناسل

ظاہری اعضائے تناسل یہ ہیں :-

۱. قنیب Penis

۲. مجری ابول Urethra

۳. خصیتیں Testes

۴. افیدوس Epididymis

۵. کیس خصیہ Scrotum

باطنی اعضائے تناسل درج ذیل ہیں :-

۱. غدہ منویہ Prostate Gland

Vasdeferens	(i),	قناة منویہ
Seminal Vasicle	(ii),	خزاعہ منویہ / ادعیہ منویہ
Ejaculatory Duct	(iii),	قناة دافعه

ظاہری اعضاء تناسل:

قضیب :-

قضیب، نسج العاشیہ (Erectile Tissue) سے بننے والے درج ذیل تین طویل اسطوانی اجسام سے مل کر بنا ہے۔

(i), وسطی جسم

(ii), اسفنجی جسم

(iii), اجرنی جسم

مذکورہ بالا تینوں اجسام لمفوف اور جلد سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔

قضیب کی جڑ فشار عجانیہ (Perineal Membrane) اور ایک معلق اسطوانی جسم سے متصل ہوتی ہے، اسفنجی جسم (Corpus Spongiosum) سے

زیریں جانب بصلہ فشار عجانیہ (Bulb of Perineal Membrane) سے متصل ہوتا ہے، اسی جسم سے مجرا بولی گور کر منفذ بولبیہ ظاہرہ

External Urethral Orifice پر نکلتا ہے، اجرنی اجسام Corpora

Cavernosa قضیب کی پشت پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کے

لگے سرے حشفہ (Glance Penis) کے ساتھ مدغم ہوتے ہیں اور پشت کی

طرف اتمام عانہ (Pubis Symphysis) کے نیچے ایک دوسرے سے جدا ہو کر

قضیب کی ساقیں (Crura of the Penis) بناتے ہیں، یہ عضلات درکیہ

اسفنجیہ سے اور جسم قضیب لغافہ سطحیہ کے غشائی طبقہ سے پوشیدہ ہوتا ہے،

قضیب کے اوپر بغیر بال کی دقیق جلد ہوتی ہے جو حشفہ کے سرے پر قلفۃ الحشفہ

(Prepuce) نامی غلاف بناتی ہے۔

قضیب کی دموی اور عصبی پرورش شریان استیجائی باطن (Internal

Pudendal Artery) کی شاخوں کے ذریعہ اور عصب عجانیہ اربیہ

Ilio Inguinal Nerve کے ذریعہ ہوتی ہے۔

مجرى البول ۱۔

اس کی لمبائی کم و بیش ۲۰ سینٹی میٹر ہے، اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے،

Prostatic Urethra	مجرى بول مذوی
Membrandus Urethra	مجرى بول فشرائی
Spongy Urethra	مجرى البول اسفنجی

مجرى البول مذوی، مجرى البول کا چوڑا اور پھیلا ہوا حصہ ہے اور اس کی لمبائی ۲ سینٹی میٹر ہوتی ہے، اسی میں قناتہ دافعہ ہوتے ہیں۔ مجرى البول فشرائی، مجرى البول کا نسبتاً سخت اور تنگ حصہ ہے، یہ ۴ م عائد سے ۳ سینٹی میٹر کے فاصلہ پر حفرہ عجانیہ فائره (Deep Perineal Pouch) سے گزرتا ہے، اس کے پیچھے و بیرونی جانب دو عدد غدہ ودی (Bulbo Urethral-Glands) ہوتے ہیں، جن سے ایک لیسڈار رطوبت رستی رہتی ہے۔ اور مجرى البول کو تر رکھتی ہے۔ مجرى البول اسفنجی، کاٹا ہری منفذ تنگ ہوتا ہے اس کی لمبائی ۱۶ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور حجم اسفنجی کے قریب پوری لمبائی میں پائی جاتی ہے۔ ان کی دموی پرورش شریانی استجائی باطن کے ذریعہ ہوتی ہے۔

خصیتین ۱۔

ان کی تعداد ۲ ہے، یہ بیضوی شکل کے، کیس خصیہ (Scrotum) میں جبل المنی (Spermatic Cord) کے ذریعہ لٹکے رہتے ہیں، ہر خصیہ کی لمبائی ۲.۲ — ۶ سینٹی میٹر، چوڑائی ۲.۲ سینٹی میٹر اور دبائت ۳.۲ سینٹی میٹر ہوتی ہے، خصیہ درج ذیل تین افشیہ سے ملفوف ہوتا ہے۔

Tuniclaginalis	طبقة غمدیہ، (بیرونی فشر)۔
Tunica Albuginia	طبقة بیضیاء (درمیانی فشر)۔
Tunica Vasiculosa	طبقة عروقہ، (اندرونی فشر)۔

طبقة غمدیہ دو مزید طبقات میں منقسم ہو جاتا ہے، ایک طبقة خصیہ کو اور دوسرا

کیسہ خصبہ کو استر کرتا ہے، ان دونوں طبقات کے درمیان مائی رطوبت رستی رہتی ہے،
 _____ طبقہ بیضاء، طبقہ غدیہ کے خصبہ پر استر کرنے والی خشاہ کی اندرونی سطح سے
 چسپاں رہتا ہے، _____ طبقہ عروقیہ، طبقہ بیضاء کے اندر پایا جاتا ہے، اس میں خصبہ
 کی عروق پھیلی ہوتی ہیں۔ _____ ان کے دموی اور عصبی پرورش شریان الخصبہ
 Testicular Artery، کی شاخوں اور اعصاب شرمکیہ کے ریشوں سے
 ہوتی ہے۔

اغدیہ دوس۔

یہ خصبہ کے پچھلے کنارے پر لمبا، چسپا ہوا، متصل ہوتا ہے، اس میں
 سرجم اور ڈم تھیں جھے ہوتے ہیں، اس کا سر، خصبہ کے بالائی حصہ سے اپنی اندرونی
 نالی کے ذریعہ ملتا رہتا ہے، اور پیچ در پیچ ہو کر کم و بیش ۶ ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے،
 اس کے زیریں حصہ (دم) سے بھری منی (Vas Deferens) شروع ہوتا ہے۔
 کیس خصبہ۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک قیلی ہے جس میں خصبہ اور جبل المنی
 مغفوف ہوتے ہیں، یہ کیس / قیلی ایک درمیانی فاصل کے ذریعہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا
 ہے۔ اور اس طرح دونوں خصبوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، اس کے طبقات میں غفلہ ڈارٹس
 ہوتا ہے۔

باطنی اعضائے تناسل:

غددِ ودی۔

غددِ ودی (Bulbourethral Glands) دو، چھوٹی چھوٹی

گول۔ زرد رنگ کی گلیاں ہیں، یہ مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی ہیں، اور خشاہ بھری ابول
 کے پیچھے اور بیرونی جانب پائی جاتی ہیں۔ ان میں ۵ تا ۲ سینٹی میٹر لمبی نالی ہوتی ہے، جو
 ان غد کے ذریعہ پیدا ہونے والی رطوبت کو بھری ابول میں پہنچاتی ہے۔

غدد مذی۔

اس غدہ کی ساخت یعنی عضلی ہوتی ہے، اور بھری ابول کے ابتدائی

حصہ کا احاطہ کرتا ہے، اس کا محل وقوع جونی عانہ میں معیار مستقیم کے سامنے اور لحام عانہ کے پیچھے، نیچے والا حصہ ہے، اس کی شکل مخروطی، وزن ۸ گرام، لمبائی ۵ سینٹی میٹر، چوڑائی ۵ سینٹی میٹر اور دبازت ۵۔۷ سینٹی میٹر ہوتی ہے، اس میں قاعدہ ایک راس، نیچے مقدم، موخو، دو زیریں جانبی سطحیں ہوتی ہیں، یہ ایک ریشہ دار غلاف

(Prostatic Sheth) میں طفون ہوتا ہے، اس کے بالائی جانب

منق مشانہ اور اومیہ منی، زیریں جانب عضلہ خاصرۃ البول (Sphinctor)، آگے اور جانبی طرف عضلہ رافعة المقعد اور پیچھے معیار مستقیم ہوتا ہے۔

اس کی دموی اور عصبی پرورش شریان خامری باطن اور عصبی صغیرہ خامریہ کی شاخوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

قناة منی

یہ دراصل ایک تنگ منلی قناة ہے، جونی الحقیقت قناة اُمیدوس کا بڑھاؤ ہے جو اُمیدوس کے زیریں حصہ سے شروع ہو کر کیس خیمہ، قناة اربی (Inguinal Canal) اور حانہ () سے قناتہ دافعہ کو جاتی ہے، اس کی لمبائی ۵۔۷ سینٹی میٹر ہے، اومیہ منی۔

یہ شانہ کے قاعدہ کے پیچھے، غدہ منی کے اوپر تر ہے طور پر واقع ہے، یہ دراصل دو غشائی تھیلیاں ہیں۔ ان کی ساخت میں غدہ کی ساخت بھی پائی جاتی ہے، ابھی میں خیموں سے پیدا ہونے والی منی جمع ہوتی ہے اور بذات خود اس میں ایک قسم کی رطوبت پیدا ہو کر منی کے ساتھ ل جاتی ہے، اومیہ منی کے ملنے ایک قناة شروع ہو کر جرجا البول میں منق مشانہ سے آگے کھلتی ہے، اس کی ساخت میں کچھ عضل ریشے ملتے ہیں۔ جن کے سکڑنے سے منی خارج ہوتی ہے۔

اس کی دموی اور عصبی پرورش شریان مثالی اسفل اور شریان مستقیم متوسط اور عصب صغیرہ حانیہ (Pelvic Plexus) کا شاخوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

قناتہ دافعہ۔

یہ عرف بولی (Urethral Crest) کی چوٹی پر واقع ایک چھوٹے نشیب میں دونوں جانب ہوتے ہیں۔

منافع

ان اعضاء سے بقاء و تولید انسانی ہوتی ہے

ضعف باہ

ANAPHRODISIA

اس مرض میں جنسی فعل کی ادائیگی میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، ذکر میں تھوڑی دیر کے لیے انتشار ہوتا ہے اور دخول سے پہلے یا میں دخول کے بعد انتشار سرور ہو جاتا ہے۔

اقسام

ضعف باہ

ضعف باہ غیر حقیقی (شرکی)

ضعف باہ حقیقی

استرخاء آلہ

ضعف شہوت

اسباب

لے براہ راست آلہ تناسل کی خرابی سے پیدا ہو۔
لے اعضاء تناسل صحیح سالم ہوں، لیکن دوسرے اعضاء کے امراض کی وجہ سے طبی و نفسی کی انجام دہی میں فتور آگیا ہو۔

۱۔ امراض اعضاء تناسل :-

۱. کثرت بہارت
۲. کثرت احتلام
۳. قلت منی
۴. کثرت منی
۵. فساد منی
۶. سکون و مجبوری منی
۷. جریان منی
۸. غلام بازی
۹. بلیق
۱۰. عدم تولید منی
۱۱. قنصب میں غلظت نقص
۱۲. خصیروں میں غلظت نقص
۱۳. درم خصیہ آشکی
۱۴. جماع منقطع
۱۵. ذکاوت حس
۱۶. استرخاء قنصب
۱۷. فساد غدہ مذی

۱۔ امراض راس :-

۱. ضعف دماغ و اعصاب
۲. فالج
۳. برودت اعصاب و دماغ

۱۔ امراض قلب :-

۱. ضعف قلب
۲. برودت قلب

امراض جگر :-

۱. نعت جگر

۲. برودت جگر

۳. امراض کلیه :-

۱. نعت کلیه

۲. برودت کلیه

۳. امراض معدہ و امعاء :-

۱. سوء ہضم

۲. ریقان اعلاء

۳. ورم اعلاء

۴. بواسیر

۵. امراض مثانہ :-

۱. التهاب مثانہ

۲. حصاة مثانہ

۳. غلبہ کیفیات اربعہ :-

۱. غلبہ حرارت

۲. غلبہ برودت

۳. غلبہ رطوبت

۴. غلبہ پیوست

۵. انفعالات نفسانی :-

۱. رنج و غم

۲. خوف و ہراس

۳. شدید خواہش و فرحت

۴. کثرت مطالعہ

۵. تجرد

(۱۰۱) شہوانی خیالات

(۱۰۲) نفرت و کراہت

متعدی امراض :-

(۱۰۳) سوزاک

(۱۰۴) آتشک

امراض غدا و غیر نا قلم :-

(۱۰۵) ذیابیطس

منشیات :-

(۱۰۶) چرس

(۱۰۷) امیون

(۱۰۸) بھنگ

(۱۰۹) شراب

(۱۱۰) تمباکو

نقص تغذیہ :-

(۱۱۱) قلت غذا

(۱۱۲) غذائی بے اعتدالی

علامات |

قلت منی :-

قلت منی اگر سو مزاج کی وجہ سے ہے اور ضعف باہ کا یہ سبب ہے تو منی خارج نہیں ہوتی ہے، لیکن رات میں ادویہ منی میں عارضی حرارت کی وجہ سے استادگی پیدا ہو جاتی ہے، یا اعتلام ہو جاتا ہے، — یبوست اور ضعف آلات منی کی صورت میں منی غلیظ — ہوتی ہے، مشکل سے خارج ہوتی ہے، برودت آلات منی کی صورت میں، منی غلیظ، مسخرد اور سرد ہوتی ہے، اور بمشکل خارج ہوتی ہے، ادویہ مسخرد، گرم آب و ہوا اور گرم ماحول سے فائدہ ہوتا ہے، حرارت آلات منی کی صورت

میں منی زردی مائل، رقیق یا غلیظ ہوتی ہے۔ سرعت انزال ہوتا ہے، قضیب کی عروق ابھری ہوئی اور خبیثے بڑے ہوتے ہیں، اور تبریدی تدابیر سے راحت ملتی ہے، رطوبات آلات منی کی صورت میں، منی رقیق ہوتی ہے، بول، سفید اور غلیظ ہوتا ہے، پالنے سے نقصان ہوتا ہے، مجفف تدابیر سے راحت ملتی ہے۔

فقصان حدت منی :-

منی زیادہ مقدار میں، غلیظ اور منجمد صورت میں خارج ہوتا ہے، مکمل استادگی بہت زیادہ حرکت جماعیہ کے بعد ہوتی ہے، انزال دشواری سے ہوتا ہے۔

آلات منی :-

استرخار و ضعف آلات منی کی صورت میں عضو کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے، مکمل استادگی نہیں ہوتی، بلکہ کچی اور استرخالی کیفیت پائی جاتی ہے، سرعت انزال ہوتا ہے، روز بروز ضعف میں اضافہ ہوتا ہے۔

مثرات مباشرت :-

عام ضعف ہوتا ہے، سستی اور ماندگی ہوتی ہے، خفقان ہوتا ہے، معمولی بھاگ دوڑ سے سانس پھولتا اور سارا بدن پسینے سے تر ہو جاتا ہے، سیان کا غلبہ ہوتا ہے، قوت ارادی ضعیف ہو جاتی ہے، اطراف سرد ہوتے ہیں، دماغی کام کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، نبض ضعیف، لین اور بطنی ہوتی ہے، سو رہنم ہوتا ہے۔

جلق :-

بعض اوقات آنکھ کے گرد مخصوص طرز کے سیاہ طعنے پڑ جاتے ہیں، ریش پڑ پڑا اور خلوت پسند ہو جاتا ہے، فیزیکی ذکاوت ص کی وجہ سے سرعت انزال، کثرت احتلام اور جریان کی شکایت ہوتی ہے، مرض کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی صورت میں صرع، تشنج، مایخولیا اور جنون بھی ہو سکتا ہے۔

ترک جماع :-

جسمانی قوت میں اعتدال ہونے کے باوجود استادگی میں کمی ہوتی ہے، شہوت اور منی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ضعف قلب :-

ضعف قلب کی صورت میں اختلاج قلب اور بعض اوقات خفیف وجع القلب ہوتا ہے، جماع کے بعد بہت زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے، مباشرت میں لذت میں کمی ہوتی ہے۔ نبض ضعیف اور غیر منظم ہوتی ہے، درد بانے پر آسانی دہ جاتی ہے، رخسار کی وریدیں خون سے بھر جاتی ہیں، چہرہ زرد اور ہونٹ نیلیگوں ہوتے ہیں۔ صداع اور گرانی سر کی شکایت ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ اور چہرے پر فکر و اضطراب ہوتا ہے

ضعف دماغ :-

حافظہ ضعیف ہوتا ہے، ہوش و حواس میں انتشار و کند رہتا ہے،

ضعف جگر :-

ضعف جگر کی صورت میں چہرہ اور پپٹوں میں تہیج ہوتا ہے، مقام جگر پر کم و بیش درد اور بوجھ ہوتا ہے، آنکھوں اور چہرے پر زردی یا سفیدی ہوتی ہے

ضعف کلیہ :-

ضعف کلیہ کی صورت میں کمر اور پشت میں درد ہوتا ہے، پیشاب کم ہوتا ہے اور اس میں رطوبت بے نیہ خارج ہوتی ہے، پپٹوں پر تہیج ہوتا ہے اور بغیر شہوت انزال ہوتا ہے۔

ضعف معدہ امعاء :-

سورہضم، قلت اشتہار، اور نفخ کی شکایت ہوتی ہے۔

منشیات و معدن رات :-

استعمال سرگزشت ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔

اصول علاج |

- ۔ عمل انہقام پر خصوصی توجہ دیں۔
- ۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- ۔ تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں۔

• عرصہ تک ترک جماع اگر مرض کا سبب ہو تو مریض کو جماع کی طرف مائل کریں۔

• انفعالات نفسانی کی صورت میں، خیالات میں اصلاح اور استحکام کی تدابیر اختیار کریں۔

• استرخاء کی صورت میں قہیب و خصیہ پر گرم پانی کا نطول کریں، اور اس کے بعد بیوٹر کا دودھ پلین اور زفت کا ضا د کریں۔
• غلبہ خلط بارد کی صورت میں منضج، مسهل کا اصول اختیار کریں۔

علاج

• ثعلب مصری، شقائق مصری، فج، مغز بادام، مغز پستہ، مغز اخروٹ، تخم خشناب سفید، مغز پیبہ دانہ، کنجد مقشر، ہر ایک ۲ گرام، زنجبیل، بہمن سفید، بہمن سرخ، خولجان، ہر ایک ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو کورٹ پھان کر شہد خالص، نبات سفید، ہر ایک ۸۰ گرام میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۳ گرام ہمراہ دودھ تازہ ۲۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

• اسپند، برباسہ، جوز بوا، دارچینی، قرنفل، ہر ایک ۵ گرام، کنجد سیاہ مقشر، گرام، شہد خالص تین گنا، حسب دستور معجون بنائیں، ۵ گرام کھلائیں۔

• ثعلب مصری ۵ گرام، مغز پیبہ دانہ ۵ دانہ، دار فلفل، تخم بیون، مغز چلغوزہ، کنجد مقشر، ہر ایک ۲ گرام، مایہ شتر اعالی، شقائق مصری، تخم گزر، سر کنجشک نر، ہر ایک ۸ گرام، تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے تین گنا شہد ملا کر معجون بنائیں۔ اور ۵ گرام کھلائیں۔
• استرخاء قہیب کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ

ریگ ماہی، دارچینی، زعفران، ماقر قرا، خولجان، کباب چینی، ہر ایک ۲ گرام
تمام دواؤں کو باریک پس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی

صبح کو استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۲۔

ثعلب مصری ۲ گرام، ریگ ماہی ۲ گرام، بیر بہوٹی ۸ گرام، میٹھا نمک سفید ۱ گرام، افیون ۵ گرام، جدوار خطائی ۶ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر عرق ادرک میں سخت کریں اور پچنے کے برابر گولیاں اور ۲ گولیاں ہمراہ شیر گاؤ کھلائیں۔
_____ قلع منی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔

آب پیاز سفید، شہد خالص، ہر ایک ۵۰۰ ملی لیٹر، _____ دونوں کا قوام تیار کریں، جب قوام تیار ہو جائے تو تودری شرح، تودری سفید، بہمن سرخ و سفید، زنجبیل، ثعلب مصری، تخم پیاز، تخم مولی، گندنا، تخم شلغم، تال کھانا، موصلی سفید و سیاہ ہر ایک ۱۱ گرام، کاسفوف اس میں ملائیں اور حسب دستور معجون بنائیں۔
۱۲ گرام ہمراہ آب تازہ / شیر گاؤ ۲۵۰ ملی لیٹر یا عرق گزر ۲۰۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
_____ ضعف اعضاء رتبہ و اعصاب کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ ۴۔

منز اشہب، ثعلب مصری، خونچان، ہر ایک ۸ گرام، مشک خالص، زعفران مصطفیٰ، ہر ایک ۴ گرام، پیریاہ شتر اعرابی ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر بٹل بیر کے برابر خوب بنائیں۔ اور ۲-۳ خوب گولیاں مارالحم / آب انگور / دودھ کے ساتھ کھلائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ ۵۔

منز بادام شیریں ۵ عدد، منز تخم کدو شیریں، منز تخم تربوز، ناشاستہ، منق حوی، تخم کاہو مقشر، ہر ایک ۲ گرام، نبات سفید ۳۶ گرام، تمام دواؤں کو گھانے کے دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر میں پیس کر حسب دستور حریرہ تیار کریں اور سہ دن کے کھلائیں۔

• —۔ ضعف قلب کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

زہر مبرہ، طباشیر، ہر ایک اگرام، دونوں دواؤں کو باریک پس کر کے
دو اسک معادل ۵ گرام / مفرج بارد ۵ گرام کے ہمراہ کھلائیں۔ اس کے بعد
آب انار شیریں، آب سیب شیریں ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، شربت سیب ۳۶ ملی لیٹر ملا کر تخم
فرنجشک ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

• —۔ ضعف کبد کی صورت میں درج ذیل نسخہ مفید و مجرب ہے۔

نسخہ ۱۔

گل سرخ، گرام، لک مغسول، زرشک، منقہ ہر ایک ۲۱ گرام، طباشیر، فوہ، بسا،
صمغ عربی، صندل سفید، ہر ایک ۳ گرام، ریوند چینی ۲۲ گرام، تخم حمام ۳۰ گرام، زعفران
۸۲۵ ملی گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام کھلائیں
اور آب انار ۶۰ ملی لیٹر میں نبات سفید ۳۰ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

• —۔ ضعف کلیہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

مغز پنبد دانہ، حب الصنوبر بریاں، مغز نارجیل، مغز پستہ، مغز اخروٹ،
حب فلفل، ہر ایک ۳۱ گرام، حب الزلم، زنجبیل، لسان العصافیر، شقائق معری، ہر ایک
۶ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد ۸۵ ملی لیٹر میں ملا کر حسب دستور
مجموع بنائیں اور ۵ گرام، صبح کو استعمال کرائیں۔

• —۔ کثرت رطوبات معدی کی صورت میں جو ہر سین ۳۲ ملی گرام، معجون
ہمالینوس موسوی ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد آب برگ تمبول، آب ہیل خورد،
ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، شربت سیب ۴۸ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

• —۔ کثرت جماعت کی صورت میں درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

کشتہ طلا، کلاں ۳۲ ملی گرام، بسوب کبیر ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد
عرق مار اللحم ۵۰ ملی لیٹر میں نبات سفید ۳۰ گرام حل کر کے صبح کو نوش کرائیں۔ بعد غذا

حب ذیل نسخہ حب احمر استعمال کرائیں۔
نسخہ حب احمر:-

سنگیہ، زرنجا، ہر ایک ۲ گرام، سنگرف ۵۰۰ گرام، آب یمن
کاغذی، آب ادرک ہر ایک ۱۲۰ ملی لیٹر — مذکورہ دواؤں کو دونوں مرقیات
میں خوب سحق کریں اور موچی کے دانے کے برابر گویاں بنائیں اور کھلائیں۔
— منہ چڑا امدد، مشک خالص، جندبیدستر ہر ایک ۱۲۵ ملی گرام،
زعفران ۲۵۰ ملی گرام، شہد خالص ۲ ملی لیٹر — تمام دواؤں کو کھل کر کے
ایک گولی بنائیں اور درق طلاء میں پیٹ کر کھلائیں۔
— منہ بادام شیریں، منہ اخروٹ ہر ایک ۲ گرام، آرد غلہ بریاں،
منہ پستہ، ہر ایک ۲ گرام، طباشیر کبود ۶ گرام، جیل خورد ۱ گرام — تمام
دواؤں کو پیس کر گائے کے دودھ ۵۰۰ ملی لیٹر میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے
تو قند سفید ملا کر استعمال کرائیں۔

— خارجی طور پر درج ذیل مذاہیر اختیار کریں۔
نسخہ برائے مالش:-

چربی بٹ، بکری کے گردہ کی چربی، زفت رومی، منہ ساق گاڑی، ہر ایک ۲
گرام، روغن گل ۲۲ ملی لیٹر، مصطکی ۶ گرام — مذکورہ دواؤں کو نیم گرم کر کے
دن میں ایک مرتبہ ۱۵ — ۲۰ منٹ تک مالش کریں۔
نسخہ ٹکڑ:-

آئینہ ہلدی ۹ گرام، منہ جمال گوٹ ۵ گرام، مالکنگنی، برادہ دندان فیل ہر ایک
۵۰۰ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ایک پوٹلی میں باندھ کر بھیڑ کے
دودھ میں جوش دے کر ٹکڑ کریں۔

نسخہ:-
اسطوخودوس، کندش، برگ شبت، مالکنگنی، ہر ایک ۳ گرام — تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر گائے کے دودھ میں جوش دے کر ٹکڑ کریں۔
نسخہ طلاء:-

پوست پنج کبر سفید ۲۴ گرام ، افیون ، جوز بوا ، ہر ایک ۱۲ گرام ۔۔۔۔۔۔ تمام
دواؤں کو پیس کر گوہ کی چربی میں ملائیں ، اس کے بعد شیرہ برگ دھتورہ میں سخن کر کے
گولیاں بنائیں ۔۔۔۔۔۔ اور بوقت ضرورت ایک گولی ، پانی میں گھس کر بطور
طلہ استعمال کرائیں ۔

نسخہ طلہ ۱۔

طلہ جدید / طلہ دار چینی استعمال کرائیں ۔

نسخہ طلہ ۲۔

بیر بہوٹی ۱۲ گرام ، روغن بیضہ مرغ ، قرنفل ، روغن عاقرقڑھا ، روغن نخود ،
روغن دھتورہ ، ہر ایک ۲ ملی لیٹر ۔۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باہم ملا کر مومیائی معدنی
اگرام ، مشک خالص ۱۰۰ ملی گرام میں حل کر کے قیض پر ایک منٹ تک ماسٹ کریں ۔
اس کے بعد برگ تمبول بنگلہ اوپر سے باندھ دیں ۔

سرعت انزال

PREMATURE EJACULATION

اس مرض میں دخول قیض کے بعد منی جلد خارج ہو جاتی ہے ، بعض اوقات
دخول سے قبل محض شبوئی تصور یا کپڑے کی رگڑ سے ہی منی خارج ہو جاتی ہے ۔

اسباب

۱۔ مراض اعضاء تناسل ۔

۲۔ جلق کے سبب ذکاوت حس

۳۔ جماع میں انزال منی کی مدت مختلف اشخاص میں مختلف ہوتی ہے ، یہ مدت نصف
تا دو منٹ ہے ، بعض اوقات تین یا پانچ منٹ بھی ہوتی ہے ، لیکن اپنی خواہش کے
مطابق اساک نہ ہونا ، سرعت انزال ، نہیں ہے ۔

- (II)، کثرت جماع
 (III)، ترک جماع
 (IV)، مجری قضیب کا اتساع
 (V)، غلفہ کا لمبا ہونا
 (VI)، حشفہ کا میل
 (VII)، نائره کی خراش
 (VIII)، کثرت منی

(IX)، حرارت وحدت منی

۱ امراض مثانہ :-

(I)، حصاة مثانہ

(II)، خراش مثانہ

۲ امراض معدة و ۲ معاء :-

(I)، بواسیر

(II)، ویدان امعاء

۳ اعضاء رئيسية :-

(I)، ضعف اعضاء رئيسية واعصاب

ضعف قوت ماسکم :-

متعدی امراض :-

(I)، سوزاک

علامات |

دخول سے پہلے، ملاعت کے مرحلے میں یا دخول کے بعد فوراً انزال ہو جاتا ہے،
 جلق :-

جلق کے سبب ذکاوت حس میں کپڑے کی معمولی رگڑ یا محض شہوانی

خیالات سے ہی انزال ہو جاتا ہے، منی رقیق اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔

ضعف ۲ اعصاب ۱۔

_____ ضعف اعصاب کی علامات ملتی ہیں۔

کثرت منی ۱۔

اس صورت میں منی کا قوام مندل ہوتا ہے۔ اور کثرت سے خارج

ہوتی ہے۔ مولدات منی کی سرگزشت ملتی ہے۔

حدت منی کی صورت میں منی کا قوام رقیق اور رنگ زردی مائل ہوتا ہے، منی سوزش

کے ساتھ خارج ہوتی ہے، _____ اتساع قصب کی صورت میں ایستادگی نامکمل ہوتی ہے، اور منی کے اخراج میں قوت نہیں ہوتی۔

ضعف اعضاء رسیہ کی صورت میں ان کی علامات اور سرگزشت ملتی ہیں۔

ضعف قوت ماسک کی صورت میں منی سفید، رقیق ہوتی ہے، اس میں نیچ اور

ر ت کے اثرات مفقود ہوتے ہیں۔

اصول علاج ۱

۔۔۔ خیالات میں پاکیزگی کی تدابیر کریں

۔۔۔ کثرت منی کی صورت میں اخراج منی کی طبعی و شرعی تدابیر کرائیں

۔۔۔ ضعف قوی کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں۔

۔۔۔ حدت و رقت منی کی صورت میں مبردات و مرطبات استعمال کرائیں۔

۔۔۔ ضعف اعصاب کی صورت میں مقویات اعصاب دیں۔

۔۔۔ اتساع قصب کی صورت میں اس کا مخصوص علاج کریں۔

علاج ۱

۔۔۔ سنگھاڑ خشک، صمغ عربی، ہر ایک ۶ گرام، تالکھانا، ثعلب مصری،

ہر ایک ۴ گرام، مارو، مصطکی، ہر ایک ۳ گرام، شکر ۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو

باریک پیس کر محفوظ کر لیں اور ۶ گرام، صبح، شام ہمراہ معجون خبث الحدید کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ کثرت منی کی صورت میں سکنجین آب انار میں استعمال کرائیں
 ۔۔۔۔۔ حرارت و حدت منی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

شیرہ تخم کا ہو، شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم خشاش، ہر ایک ۳ گرام، تمام
 دواؤں کو باریک پس کر مشربن خشاش کے ساتھ ۶ گرام کھلائیں۔
 ۔۔۔۔۔ ثعلب مصری، تخم خشاش، جفت بلوط، کندر، ہر ایک ۹ گرام، ٹکٹار،
 طباشیر، مصطکی رومی، ہر ایک ۶ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۶ گرام، صبح،
 شام کھلائیں۔
 ۔۔۔۔۔ سفوف مغز تمر بندی بریاں ۶ گرام، صبح، شام بہراہ تازہ دودھ
 کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ دارچینی قلمی، قرنفل، کباب جینی، زنجبیل، ہر ایک ۱ گرام، عود غرقہ ۳ گرام،
 جوزبوا ۱۲ گرام، نبات سفید دو گنا، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف کی طرح
 ایں اور ۵ گرام، روزانہ استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ زعفران، شک خالص، جوزبوا ۱۱۱ وزن، تمام دواؤں کو باریک
 پس کر شہید خالص میں گوندہ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور جمات سے ۲ گھنٹے قبل
 ایک گولی استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ عاقرقہ، قرنفل، بلباسہ، اجوائن خراسانی، ہر ایک ۳ گرام، افیون
 زعفران، ہر ایک ۱ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر شہید میں گوندہ کر چنے کے برابر
 گولیاں بنائیں اور جماع سے ۳ گھنٹے قبل کھلائیں۔

۔۔۔۔۔ جوزبوا، سنکرف، افیون، دارچینی، عاقرقہ، ہر ایک ۳ گرام،
 تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہید میں گوندہ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور جماع سے
 ۲ گھنٹے قبل بہراہ تازہ دودھ استعمال کرائیں۔

۔۔۔۔۔ حمد و ارخطائی، مایہ شتر اعرابی، بنج لفاح، بزرالنج سفید، بلباسہ،
 طباشیر، بہن سفید، مصطکی رومی، ہر ایک ۹ گرام، شقاق مصری ۲ گرام، زعفران، صمغ عربی،
 ہر ایک ۱۲ ملی گرام، افیون، نبات سفید ہر ایک ۱۲ گرام، ورق طلا ۱۵ عدد، ورق نقرہ،

۵ عدد — تمام دواؤں کو باریک پس کر شہد میں گوندھ کر چنے کے برابر چوب بنائیں اور ارجب استعمال کرائیں۔

• سیلاب ۶ گرام کو چند بار کپڑے سے نکال کر صاف کریں اور افیون خالص ۶ گرام — دونوں دواؤں کو عرق پانی میں کھول کر کے سایہ میں خشک کریں اسی طرح ۷ مرتبہ عرق پان (عرق برگ قنبول) میں تر کر کے کھول کریں پھر سایہ میں خشک کریں، اس کے بعد جوز بوا، عاقرقحہ، زبرالنج، قرفل، خونجان، ہر ایک ۲ گرام کو کوٹ چھان کر مذکورہ دواؤں میں ملائیں اور عرق پان میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور جماع سے ۳ گھنٹے قبل ارجب ہمراہ نان گندم کھلائیں۔

• مغز بادام شیریں، مغز فندق، مغز اخروٹ، مغز چلغوزہ، جوز بوا، بسباسہ، افیون، قنب، ہر ایک ۶ گرام، مغز تخم کدوئے شیریں ۵ ۶ گرام، مغز تخم کاہو، ۲ گرام، مشک ۵، ملی گرام، عنبر ۲۵۰ ملی گرام، شہد دو گنا، — تمام دواؤں کا حسب دستور معجون بنائیں اور ۱-۳ گرام کھلائیں۔

• مردارید، کبر بامے شمع، بسداحمر، یا قوت، بادرنجبویہ، تخم کاہو، سنبل الطیب، عاقرقحہ، خونجان، زنجبیل، بہمن سفید، بہمن سرخ، ساذج ہندی، آملہ منقر، صندل سفید، قرفل، ہر ایک ۵ ۶ گرام، طباشیر ۱۲ گرام، — تمام دواؤں کو عرق کلاب میں پس کر قفل سیاہ، زہر مہرہ، زعفران، عود بلسا، سعد کونی، قلفل دراز، ہر ایک ۲ گرام، دارچینی ۳ گرام، گل کا دزبان، گل ارمنی، کیترا، جج، ہر ایک ۲ ۲ گرام، جوز بوا ۵ ۶ گرام، اجوائن خراسانی ۹ گرام، افیون، گرام، چرس ۳ گرام، اجوائن دیسی، مغز نارجیل، مغز پستہ، مغز بادام، مغز اخروٹ، ہر ایک ۵ ۶ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد خالص تین گنا ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور اگر گرام کھلائیں۔

• مغز بادام شیریں، مغز فندق، مغز چلغوزہ، مغز پستہ، تخم کاہو منقر، تخم خشتی، ہر ایک ۱۲ گرام، زعفران، مشک خالص، جوز بوا، بسباسہ، ہر ایک ۹ گرام، عنبر اشہب ۵ گرام، چرس ۵ ۶ گرام، قند سفید ایک حصہ اور شہد خالص دو گنا۔ حسب دستور معجون بنائیں اور ۳ گرام استعمال کرائیں۔

• جوز بوا، بسباسہ، افیون، مازو، مصطلکی، زعفران، اجوائن خراسانی،

میں خورد، فوفل، طباشیر، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف بنائیں پھر گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور اگولی کھلائیں۔
 ————— خارجی طور پر درج ذیل تدبیر اختیار کریں۔

دوغن دلت ۱۔

روغن قضا اور روغن نرگس سے خصبہ اور عاذہ پر دلک کریں۔

التهاب غده مذی

اس مرض میں غده مذی (Prostate Gland) میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

التهاب غده مذی

اقسام

التهاب غده مذی مزمن

Chronic Prostatitis

التهاب غده مذی حاد

Acute Prostatitis

اسباب

۱. سوزاک
۲. التهاب غده قدامیہ
۳. حصاة
۴. قانٹا طیر کا بکثرت استعمال
۵. امراض مقعد

علامات

حاذی۔

مٹانہ، مقعد اور سیون میں ثقل، سوزش اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ پیشاب درد کے ساتھ اور بار بار آتا ہے، پاخانہ کرتے وقت شدید تکلیف اور درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض مقدر بھر، پاخانہ کرنے سے احتراز کرتا ہے، مقعد میں انگلی ڈال کر معائنہ کرنے پر غدہ قدامیہ بڑھا ہوا اور دردناک محسوس ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد پیشاب میں غیر طبعی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔

منزل۔

سیون میں ثقل محسوس ہوتا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات رک کر اور کبھی درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اس میں دھانگے کی مانند رسوب بھی ہوتے ہیں، غدہ متورم ہو کر رفتہ رفتہ زخم / دبیلہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- _____ سیون پر تعلیق کریں۔
- _____ مٹانہ اور مومے زیر ناف کے پاس تکبیر کریں۔ اور پلٹس باندھیں۔
- _____ رفع قبض کی تدابیر کریں۔
- _____ رفع درد کی تدابیر کریں۔

علاج

_____ التهاب غدہ ندی حاد میں درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔

نسخہ ضادہ۔

آب برگ عنب الثعلب، حوض، سفیدی بیضہ مرغ، کات ہندی، ہر ایک ۲ گرام،
 روغن قنب ۱۲ ملی لیٹر: _____ کات ہندی اور حوض کو باریک پس کر دیکر تمام دواؤں
 کے ساتھ ملا کر نجاب اسپینول اور کسی قدر ایفون، کا فور اور زعفران ملا کر ضاد کریں۔
 نسخہ ۲۔

عنب الثعلب خشک، تخم کنوچہ، تخم خطمی، تخم کتاں، ہر ایک ۶ گرام _____ تمام

دواؤں کو باریک پیس کر موم سفید ۱۲ گرام، روغن گل ۲۴ ملی لیٹر میں پگھلا کر ملائیں اور سفیدی بیضہ مرزہ ۱ عدد ملا کر پٹڑے کی بتی تر کر کے مقعد میں رکھیں۔
 * خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

عنب الثعلب، بہدانہ، کاؤ زبان، خطمی، ہر ایک ۵ گرام، غناب ۷ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت بزوری معتدل ۲۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 * التهاب غدہ مذی مزمن میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ضما۔

سنبل الطیب، تخم خطمی، تخم کتان، گل بابونہ، گل خطمی، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو آب مکوہ سبز مرقق میں پیس کر روغن گل ۱۲ ملی میٹر اضافہ کر کے نیم گرم لیپ کریں، دردی صورت میں اس نسخہ میں پوست خشناب کا اضافہ کریں۔

نسخہ پمکید۔

جوشانندہ پوست خشناب سے موسے زیر ناف کے مقام پر پمکید کریں۔
 تحبیل درم کے لیے مرہم داخلیون لگائیں۔
 * خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲۔

عنب الثعلب خشک، بیخ کاسنی، گل بنفشہ، تخم خطمی، تخم قرطم، بادیان، ہر ایک ۱۰ گرام، سویز منقل ۹ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بزوری ۸۴ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

جریان مذی

PROSTATORROEA

اس مرض میں غیر طبعی طور پر دقت بے دقت مذی نکلتی رہتی ہے، شدید عوارض میں انتشار ہوتے ہی زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے جس سے قیض میں استرخائی کیفیت

پیدا ہو کر انتشار ختم ہو جاتا ہے۔

اسباب |

۱۔ امراض اعضائے تناسل :-

- ۱۔ جلق
- ۲۔ کثرت مباشرت
- ۳۔ ذکاوت حس
- ۴۔ کثرت منی
- ۵۔ حدت منی
- ۶۔ ضعف ادویہ منی
- ۷۔ تشیج ادویہ منی
- ۸۔ التهاب غدہ منی
- ۹۔ ضعف غدہ منی
- ۱۰۔ نائزہ کی خراش

۲۔ امراض کلیہ :-

- ۱۔ ضعف کلیہ

۳۔ امراض مثانہ :-

- ۱۔ سوزش مثانہ
- ۲۔ حصاة مثانہ

۴۔ امراض معدن و امعاء :-

- ۱۔ قبض
 - ۲۔ دیدان امعاء
 - ۳۔ خراش مقعد
- ۵۔ فاسد خیالات :-

علامات |

فدہ قدامیہ ہے ایک چمکدار، زردی مائل سفید رطوبت وقت بے وقت یا انتشار کے وقت حرکت جماعیہ سے قبل غیر طبعی طور پر زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، مریض سست اور مضطرب رہتا ہے، دماغی افعال میں فتور آ جاتا ہے، سب سے زیادہ حافظہ متاثر ہوتا ہے اور جماعی محنت کے بعد جیسی تکوان محسوس ہوتی ہے۔

اصول علاج |

- ۱۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۲۔ خیالات میں پاکیزگی کی تدابیر کریں
- ۳۔ مل مضم کی بہتری کی تدابیر کریں۔

علاج |

۱۔ تخم چولائی، رال سفید، مصری، ہر ایک ۶۰ گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر ۶ گرام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کرائیں۔

۲۔ موچرس، چھالیہ، مغز تخم تر ہندی، تخم انگن، ہر ایک ۳۳ گرام، سنگ جراثیم، پکھان بید، ہر ایک ۲۲ گرام، کات سفید، بیج بند، اجوائن، ہر ایک، ۲۲ گرام، کشتہ بیسنہ مرغ، کشتہ مرجان، کشتہ قلعی، ہر ایک ۳۳ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام ہمراہ آب تازہ / شیر گاؤ / شیر بزر کھلائیں۔

۳۔ سنگھاڑا خشک، طباشیر، کات سفید، ہر ایک ۱۲ گرام — تمام دواؤں کو پیس کر شیر برگد میں خوب کھل کر کسے چنے برابر گولیاں بنائیں اور ۳ گولیاں بعد از غذا صبح، شام کھلائیں۔

۴۔ اصل السوس مقشر ۶ گرام، تخم کاہو ۹ گرام، گلنار فارسی ۲۲ گرام، تخم سنہالو، تخم سداب، گل سرخ ہر ایک ۱۲۲ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنائیں اور ۸ گرام، ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

- _____۔ صغف اعصاب کی صورت میں خمیرہ ابریشم ارشدی ۵ گرام ہرراہ ۶۔
کا و زبان ۱۲۵ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
_____ جریان منی میں مذکورہ نسخہ جات استعمال کرائیں۔

جریان منی

SPERMATORRHOEA

اس مرض میں پیشاب، اجابت یا شہوانی خیالات کے وقت غیر ارادی طور پر منی نکل آتی ہے۔



اسباب |

۲ امراض ۲ عضائے تناسل :-

۱. کثرت منی
۲. رقت منی
۳. حدت منی
۴. دغدغہ اوعیہ منی
۵. استرخا اوعیہ منی
۶. جلق
۷. کثرت جماع
۸. جماع منقطع
۹. نائزہ کی خراش

طوالت و فلاتن تلفہ (۱۱۰)

ذکات حس (۱۱۱)

امراض سراسر :-

صرع (۱۱۲)

تشنج (۱۱۳)

نخاع و دماغ کے بعض امراض (۱۱۴)

دماغ و نخاع میں خراش (۱۱۵)

۲ امراض معدلا و امعاء :-

قبض (۱۱۶)

بو اسیر (۱۱۷)

دیدان امعاء (۱۱۸)

سج الامعاء (۱۱۹)

شقاق مقعد (۱۲۰)

سورہضم (۱۲۱)

۱ امراض کلیہ :-

حرارت کلیہ (۱۲۲)

التهاب کلیہ (۱۲۳)

حصاة کلیہ (۱۲۴)

ضعف کلیہ (۱۲۵)

۱ امراض مثانہ :-

ضعف مثانہ (۱۲۶)

استرخار مثانہ (۱۲۷)

حصاة مثانہ (۱۲۸)

۱ ادویات و محرکات و منشیات :-

۱ بکثرت شراب نوشی (۱۲۹)

۱۸. بکثرت چائے نوشی
 ۱۹. بکثرت قہوہ نوشی
 ۲۰. آبلہ انگیز ادویات
 ۲۱. مقویات
 ۲۲. متعدی امراض
 ۲۳. سوزاک
 ۲۴. آتشک
 ۲۵. ضعف قوت ماسکے

۲۶. فاسد خیالات

علامات

کثرت منی کی صورت میں جماع کرنے پر منی زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اس کا رنگ اور قوام معتدل ہوتا ہے، منی کے اخراج کے بعد اسفہار اور تونوں میں کسی قسم کا ضعف محسوس نہیں ہوتا۔ اغذیہ مولد خون و منی کے استعمال کی سرگزشت ہوتی ہے۔ رقت منی کی صورت میں منی کا قوام غیر معتدل، اور پانی کی طرح تہلا ہوتا ہے، کپڑے پر لگ کر خشک ہونے پر کوئی نشان نہیں پڑتا۔ رنگت سفید ہوتی ہے۔ بعض مرطوب المزاج ہوگا

حدت منی کی صورت میں اخراج کے وقت سوزش محسوس ہوتی ہے، پیشاب میں بھی سوزش ہوتی ہے، منی کا رنگ زرد یا زردی مائل ہوتا ہے، انزال بہت جلد ہوتا ہے، گرم غذاؤں کے استعمال اور شدت حرکات کی روداد ہوتی ہے۔

ضعف ادغیہ منی کی صورت میں منی رقیق اور انتشار کے بغیر خارج ہوتی ہے۔ استرخاء کی صورت میں بعض اوقات صرف شہوانی تصور سے ہی منی خارج ہو جاتی ہے، قوام رقیق اور رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے،

تشخ کی صورت میں منی تیزی سے خارج ہوتی ہے اور دیگر تشبہی علامات بھی پائی

جاتی ہیں۔

جلیق اور کثرت جماع کی صورت میں ابتداء میں مریض کو سستی، کاپہلی اور اعضاء شکنی کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کرنے وقت سوزش اور گدگدی محسوس ہوتی ہے، پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں آتا ہے، سرد درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے، خمیہ لٹکے ہوتے ہیں۔ دماغ اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، حافظہ کمزور اور ذہن پراگندہ ہوتا ہے، چہرہ مغموم اور اطراف سرد ہوتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ریفین خلط ملت نہیں ہوتا بلکہ تخلیہ پسند ہو جاتا ہے، پشت پر جیونیٹاں ریگتی محسوس ہوتی ہیں، ضعف ہضم اور عدم اشتہاء کی شکایت ہوتی ہے۔ مباشرت ناقص اور بعض اوقات باطل ہوتی ہے اور مباشرت میں لذت نہیں ملتی۔ اور بسا اوقات بلا دخول انزال ہو جاتا ہے، ترقی یافتہ صورت میں ذراسی تحریک، کپڑے کی رگڑ اور صنف نازک کے تصور محض سے ہی بغیر استادگی کے انزال ہو جاتا ہے۔

نخاع اور دماغ کی خراش کی صورت میں عضو تناسل میں مضطربانہ حرکت ہر ن ہے، نخاع میں سوزش کے آثار ہوتے ہیں زیریں حصہ جسم بعض اوقات مفلوج ہوتا ہے اور بول و براز بغیر ارادہ خارج ہوتا ہے۔

امراض کلیہ کی صورت میں علامات مخصوص نمودار ہوتی ہیں، جسم لاغر اور ضعیف ہوتا ہے۔ منی سفید، غلیظ اور جماع کے بعد زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے، کپڑے پر لگ جائے تو لٹک سکتی ہے۔

اعضاء بول کے امراض کی صورت میں بول و براز کے وقت چند قطرے ٹپکتے ہیں، دیگر اسباب کی صورت میں، ان سے متعلق مخصوص علامات ملتی ہیں۔

اصول علاج |

- _____۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- _____۔ رفع قبض کی تدابیر کریں اور نظام ہضم کی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔
- _____۔ حسب ضرورت مسکنات اور مغلاط منی ادویہ استعمال کرائیں۔
- _____۔ حدت کی صورت میں بار دادویہ کھلائیں۔

•۔ ثعلب مصری، ہسلی خورد، ہر ایک ۲ گرام، طباشیر، ست گلو، گوند
چنیا: ہر ایک ۲۲ گرام، نبات سفید ۳۰ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کا باریک سفوف تیار
کر کے محفوظ کر لیں۔ اور صبح، شام ۲ گرام کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ نمکینہ، تخم تالمکھانا، مغز سپستان ہر ایک ۳۶ گرام، اندر جوشیریں،
ہیل خورد ہر ایک ۸ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو صاف کپ کے باون دستہ میں کوٹ کر
باریک کر لیں جب سفوف تیار ہو جائے تو اس کا نصف، قند سفید ملا کر محفوظ کر لیں اور
صبح، شام ۶ گرام ہمراہ تازہ دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

•۔۔۔۔۔ درج ذیل ادویہ پر مشتمل یہ نسخہ بھی مفید ہے،

نسبی :-

برایک ۵ گرام، سپستان ۲۴ گرام تمام دواؤں کا باریک سفوف بنائیں اور
۲ گرام، ہر اہ آب سرد کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ ثعلب مصری، تخم خشتاش، کندر، جفت بلوط، ہر ایک ۶ گرام، گلنار، طباشیر، مصطکی، ہر ایک ۶ گرام، نبات سفید ۲۴ گرام،۔۔۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، اور ۶ گرام ہر اہ تازہ دودھ کھلائیں۔

..... مغز تخم تر ہندی بریاں، شکر نیم وزن ملا کر سفوف بنائیں اور ۶ گرام
برآہ تازہ دودھ صبح، شام کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ ست سلا جیت، دانہ ہیل، ست گلوں بیکھان بید، تاملکھانا،
سمندر سوکھ، خار خسک، گوند بھول، تیج، ہم وزن، شکر دوشی، — تمام دواؤں کو
کوٹ چیان کر سفوف کی طرح کریں اور ہر گرام کھلائیں۔

•۔۔۔۔۔ بڑ کا دودھ جیند قطرے، بتاشہ میں ڈال کر کھلائیں۔

•۔۔۔ اگر جریان کا سبب ضعف او عیہ منی ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نفسیہ

کشتہ، نولاد، کشتہ، خیرت الحدید، کشتہ، قلعی ہر ایک ۳۲ ملی گرام، جوارش جالینوس، گرام میں ملا کر صبح کو کھلائیں، اور شام کو سفوف مولف ہر اہ تازہ دودھ کھلائیں۔
..... مدت منی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

نفسی

کشتہ رصاص ۳۲ ملی گرام، معجون ثعلب ۵ گرام، میں ملا کر صبح کے وقت ۔۔
تازہ دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔
شام کو کشتہ سیسہ ۳۲ ملی گرام، معجون
کلاں ۵ گرام میں ملا کر کھلائیں۔
درج ذیل حیرہ استعمال کرائیں۔

نسخہ:-

ثعلب مصری، آرد سنگھاڑا، مغز بنول، ہر ایک ۳ گرام، نبات سفیدہ ۴۲ گرام،
 نرم دواؤں کو یانی میں پیس کر گائے کا دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر، سبوس اسپنغول، گرام
 ۱۰۰، کرپکائیں، جب غلیظ ہو جائے تو سرد کر کے کھلائیں۔
 بریان کا سبب اگر رطوبت کی زیادتی ہو تو وہ نسخہ استعمال کرائیں

— 12 —

اصل السوس مقشر، گھنار فارسی، گل سرخ، تخم سنبلہالو، تخم سداب، ہر ایک ۱۲ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سنوف سائیں اور ۳۲ گرام، ہیرا ۵ شربت بزوری کھلائیں۔

۔ پوست ببول، پوست کچنال، مونسری خام، موصل سفید، موصلی سیاہ،
تودری زرد، تودری سرخ، گل سپاری، تانکھانا، مازوسنہ، ہر ایک ۱۰ گرام، مغز بادام،
مغز پستہ، خرما، ہر ایک ۲۵۰ گرام، مغز تخم ترہندی بریاں ۱۲۵ گرام، شکر سفید، گھی،
آرد مونگ، ہر ایک اگلہ گرام، آرد مونگ کو گھی میں بھون کر، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
شکر سفید کے ہمراہ ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۶۰۔۲۰ گرام ہمراہ آب تازہ
کھلائیں۔


کشتہ قلعی ۳۰ ملی گرام، معجون آرد خرما ۱۲ گرام، میں ملا کر صبح کو

کھلائیں، شام کو لبوب کبیر ۵ گرام، کشتہ مثلث، ۳۲ ملی گرام ملا کر کھلائیں، سوتے وقت
سبوس اسپنول، ۵ گرام، پھنکائیں اس کے بعد دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر، نبات سفید ۲۲ گرام
علی کر کے نوش کرائیں۔

کثرت احتلام

EXSESIVE EMISSION

اس مرض میں نیند کی حالت میں شہوت انگیز خواب دیکھنے سے بلا ارادہ اور بغیر خواہش
کے منی خارج ہو جاتا ہے



اسباب |

۱۔ امراض اعضاء تناسل :-

- | | |
|----|-----------|
| ۱۔ | جلق |
| ۲۔ | کثرت جماع |
| ۳۔ | ترک جماع |
| ۴۔ | اغلام |

۱۔ جوان اور تندرست انسان کو، — ۱۵/۱۰ — دن میں احتلام ہو سکتا ہے، مجرد
لوگوں میں اسے مرض تصور نہیں کرنا چاہیے۔
۲۔ مادہ منویہ کی کثرت اور ترک جماع سے یہ مرض رونما ہوتا ہے۔
۳۔ ذکات حص اور اعضاء تناسل کے ضعف سے یہ مرض رونما ہوتا ہے۔

- (۶۹) برودت اعضاء تناسل
 (۷۰) نائزہ کی خراش
 (۷۱) ضیق غلفہ
 (۷۲) غلفہ کی لیبائی
 (۷۳) احتباس منی
 (۷۴) حدت و زنت منی
 (۷۵) ضعف اعضاء تناسل
 خیالات فاسد :-

- انفعالات نفسانی :-
 (۱) رنج و غم
 امراض معدہ و اعضاء
 (۲) سورہ ہضم
 (۳) قبض
 (۴) دیدان امعاء
 (۵) نفخ شکم
 امراض مثانہ :-
 (۱) مثانہ کا پیشاب سے پُر ہونا
 متفرقات :-
 (۱) پر خوری
 (۲) نرم و گداز بستر پر سونا
 (۳) قوت دافعہ کا قوی ہو جانا

علامات |

رات کے پچھلے حصہ میں نیم خوابی کی حالت میں اختلام ہو جاتا ہے اور مرین کو اختلام

کوئی نہ کوئی رومانوی خواب دیکھ کر ہی ہوتا ہے، بیدار ہونے پر خواب یا احتلام کی کیفیت یاد نہیں رہتی، خفیف عوارض میں دو، تین رات کے وقفہ سے احتلام ہوتا ہے، لیکن شدید عوارض میں ایک ہی رات میں دو، تین بار ہوتا ہے، دن میں بھی سونے پر ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، کستی، کاہلی، عام ضعف ہوتا ہے، خضیوں میں درد ہوتا ہے، مکر میں بھی درد ہوتا ہے، ذکاوت حس کی صورت میں صرف کپڑے کی رگڑ سے انزال ہو جاتا ہے، مریض کو شدید احساس کمتری ہوتا ہے۔

اصول علاج |

- _____ ۱۔ اصلاح ہضم پر خصوصی توجہ دیں۔
- _____ ۲۔ فحش اور شہوانی خیالات سے اجتناب کی تدابیر کریں۔
- _____ ۳۔ قلت جماع کی صورت میں طبعی تقاضوں کی تکمیل کی ہدایت کریں۔
- _____ ۴۔ قوت دافعہ کی شدت کی صورت میں افندال کی تدابیر کریں۔
- _____ ۵۔ رقت منی کی صورت میں مغلظات استعمال کرائیں۔
- _____ ۶۔ حدت و حرارت کی صورت میں مبردات و مرطبات استعمال کرائیں۔

علاج |

- _____ ۱۔ کندر، بلوط، تخم قنب، ہر ایک ۱۲ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۱۲ گرام ہمراہ آب تازہ، بوقت خواب کھلائیں۔
- _____ ۲۔ مغز ترمندی بریاں، ثعلب مصری، بہمن سفید، بہمن سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام، صمغ عربی، سبوس اسپغول ہر ایک ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شکر حسب ضرورت ملا کر سفوف کی طرح بنائیں اور ۶ گرام، صبح، شام کھلائیں۔
- _____ ۳۔ قبض کی صورت میں ۳ دن قرص ملین ۳ عدد بوقت خواب ہمراہ تازہ دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
- _____ ۴۔ یا، سفوف پستہ ۳ گرام، دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر کے ہمراہ صبح کو استعمال کرائیں۔
- _____ ۵۔ ترنجبین ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر ۲ لیٹر

شیر گاؤں ملا کر پکائیں جب خیرے کا سا قوام بن جائے تو حسب دستور خمیرہ گھونٹ کر محفوظ کر لیں، اور ۱۲ گرام کھلا کر دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر، نبات سفید ۲۴ گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

_____ قرص رصاص، ۴ عدد، معجون کلاں، گرام میں ملا کر سہ پہر کو کھلائیں۔

_____ کشیز خشک، شکر سفید ہم وزن، _____ دونوں دواؤں کا سفوف بنا کر ۷ گرام کھلائیں۔

_____ تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم کاسنی، تخم کشیز، ہر ایک ۷ گرام کا شیرہ پانی میں نکال کر شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر سے شیریں کر کے شام کو نوش کرائیں۔
_____ جریان منی کے ذیل میں بیان کردہ نسخہ جات استعمال کرائیں۔

جلق

MASTURBATION

اس میں مریض بغیر مجامعت کسی اور طریقہ سے اپنی منی خارج کر دیتا ہے جس سے اعضاء رئیسہ اور دیگر اعضاء جسمانی میں خراب اثر مرتب ہوتا ہے۔

اسباب

- (۴) بری صحبت میں رہنا اور خیالات فاسدہ کا هجوم
- (۵) شادی میں غیر معمولی تاخیر
- (۶) تجرد کی زندگی بسر کرنا
- (۷) شہوت کی زیادتی

بچوں میں عہد طفولیت میں درج ذیل اسباب کی وجہ سے سرور کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو جوانی میں جلق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(۸) حصاة مثانہ

۱. دایہ کانچے کو سلانے کے لیے پیشاب کی جگہ کو سہلانا
 ۲. دیدان امعاء
 ۳. حشفہ میں میل جمننا
 ۴. علفہ کا طویل ہونا

علامات |

تنہائی میں مریض بغیر جماعت، کسی اور طریقہ سے منی خارج کر دیتا ہے، ۲۴ گھنٹے میں حسب موقع یہ عمل متعدد بار کرتا ہے، خام و ناپختہ منی کے قبل از وقت خارج ہونے کی وجہ سے تمام اعضاء اور قوی ضعیف ہو جاتے ہیں، پیشاب میں پانی کی سی رفت ہوتی ہے، ساتھ ہی بار بار اور سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، قضیب کی جڑ باریک ہو جاتی ہے اور وہ خمیدہ ہو جاتا ہے، اس کی طبعی لمبائی بھی متاثر ہوتی ہے، قضیب کی عروق میں فاسدر طوبتوں کے اجتماع کی وجہ سے متورم ہو جاتی ہیں، طبیعت پریشان اور مضطرب رہتی ہے، عضو تناسل کے ذکی الحس ہونے کی وجہ سے شہوت جلد غالب ہو جاتی ہے، اور اس سرعت کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے، بعد میں کثرت اختلام، جریان، ضعف باہ اور سرعت انزال وغیرہ عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، خام منی کے خارج ہوتے رہنے کی وجہ سے اعضاء ریبہ پر بہت قراب اثر پڑتا ہے، طبیعت میں تو حش اور سست ہمتی ہوتی ہے، عام جسمانی ضعف کی وجہ سے جلد کی رنگت، بالخصوص چہرہ کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے بلکہ چہرہ فق پڑ جاتا ہے، ہاتھ پیر سرد پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، بصارت پر بھی قراب اثر مرتب ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ فریب نظری کی شکایت ہو جاتی ہے، معوی و معدی علامات مثلاً سورمضم، ضعف اشتہاء اور قبض وغیرہ رونما ہوتی ہیں۔ قوت حافظہ خاص طور سے متاثر ہوتی ہے، سدر اور دوار ہوتا ہے، مریض عام لوگوں سے ملنے ملانے سے گریز کرتا ہے، اور وہ اپنی ذات سے شرمندہ رہتا ہے، ذہنی انتشار اور بے کیفی اس حد تک پہنچتی ہے کہ مریض خود کو ہلاک کرنے کی سوچتا ہے۔ — بصورت دیگر مریض، رعشہ اور جنون وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

توال علاج |

- بچوں میں اگر طول خلفہ سبب ہو تو اس کا علاج کریں۔
- حصاة مثانہ اور دیدان امعاء کی صورت میں ان کا مخصوص علاج کریں۔
- پاکیزگی خیالات کی تدابیر کریں۔
- مرین کی قوت ارادی کو قوی کریں اور اس مرض کے عواقب سے آگاہ کریں۔

- تخلیہ اور عزالت گزینی سے پرہیز کرائیں۔
- فعل مبہم پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج |

- ضعف باہ کثرت اختلام کے ذیل میں مذکور نسخہ جات استعمال کرائیں۔
- تقویت دماغ کے لیے حب جواہر اعدد، خمیرہ گاؤ زبان ۵ گرام، میں ملا کر کھلائیں۔
- تقویت قلب کے لیے خمیرہ مردارید ۵ گرام، میں حب جواہر اعدد ملا کر کھلائیں۔
- تقویت کلیہ و مثانہ کے لیے کشتہ پوست بیضہ مرغ ۶۵ ملی گرام، میں معجون فلاسفہ ۵ گرام ملا کر کھلائیں۔
- خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔
- نسخہ طلارہ:-

خراطین خشک ۹ گرام، بیر بہنوٹی ۵۹ گرام، عاقر قرحا ۴۴ گرام، قرفل، جوزبوا، ہر ایک ۳ گرام، چربی شیر ۲۱ گرام، ردغن چنبیلی ۱۸ ملی لیٹر، دواؤں کو باریک پیس کر چربی اور ردغن میں کھل کر کے قصبہ پر لگائیں، اس کے اوپر برگ تنبول بٹنگہ باندھیں۔

نسخہ طلارہ:-

ہر تال طبقی، گندھک آملہ سار، ہر ایک ۳ گرام، سہاگہ، سم الفار، ہر ایک ۱ گرام، زردی بیضہ مرغ ۸ عدد، — تمام دواؤں کو زردی بیضہ مرغ میں کھول کر کے خوب بنائیں اور حسب ضرورت روغن کبجہ میں حل کر کے طلا کر لیں۔ اس کے لگانے سے دانے پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر دانے زیادہ ہوں تو روغن چنبیلی ملیں۔
نسخہ طلا ۱۔

حافظ قرچا، مرج دکھنی، قسط تلخ، مالکنگنی، تخم دھتورہ سیاہ، پوسن بیج کبیر سفید، کندش، گھونچی سفید، قزقل، بسباسہ، بیش سیاہ، بیر بہوٹی، حلتیت، اذراقی، ہر ایک ۱۲ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن کبجہ ۶۰ ملی لیٹر سے چرب کر کے حسب دستور آتشی شیشی سے روغن کشید کریں، پھر اس روغن میں جتہ بیدستر حل کر کے رات میں قصب پر طلا کر لیں۔
نسخہ ضماد ۱۔


بسباسہ، مغز حب السلاطین، گھونچی سفید، ہر ایک ۳ گرام، — تمام دواؤں کو پس کر روغن گاؤ میں ملائیں اور اس میں سے ۱۶ ملی گرام لے کر ضماد کریں اور اس کے اوپر برگ تنبول باندھ دیں۔

ورم خصیہ

ORCHITIS

اس مرض میں دونوں خصیوں یا ایک خصیہ کے کیسے یا بیضہ میں ورم ہو جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، ورم کیسے خصیہ کی صورت میں بخار نہیں ہوتا اور ورم بیضہ خصیہ کی صورت میں لازمی طور پر بخار بھی ہوتا ہے۔

اقسام



اسباب |

امراض اعضا و تشان :-

1. کثرت جماع

2. جلق

3. ضربہ خصیہ

4. احتباس منی

امراض معدة و امعاء :-

1. سوء هضم

2. قبح

امراض کس دة و مثانه :-

1. حصاة الكلية

2. التهاب مثانه

3. حصاة مثانه

امراض مفاصل :-

1. وجع المفاصل

2. نقرس

غلبہ اخلاط :-

1. غلبہ صفراء

2. غلبہ خون

3. غلبہ بلغم

4. غلبہ سوداء

طیفلی و جرثومی تقدیہ :-

1. اسٹریپٹوکوکس

2. اسٹافیلوکوکس

- (III) گوہر کوکس
 (IV) نیمو کوکس
 (V) استیر کا کولائی
 (VI) ٹیو برکل بے سیس
 (VII) ورم اصل الاذن
 (VIII) دار الفیل
 متفرقات :-

- I. ورم خصبہ حار، بارد کا معقول علاج نہ ہونا
 II. ورم صلب کا باعث ہے
 III. مادہ سرطان
 IV. ریاح

علامات

عمومی :-

خصبہ متورم ہو کر موٹا اور سخت ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہر ٹھہر کر شدید درد ہوتا ہے، جس کی ٹیس شکم، کچھ ران اور کمر تک پہنچتی ہے، بخار ہوتا ہے بشرطیکہ ورم بیضہ خصبہ میں ہو۔ متلی اور نفی ہوتی ہے، حادثہ صورتوں میں مذکورہ علامات میں حدت اور مزمن صورتوں میں علامات میں خفت ہوتی ہے۔

خصوصی :-

ورم حاد :-

عوارض شدید ہوتے ہیں، خصبہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ورم بھی زیادہ ہوتا ہے، لمس حار اور شدید سوزش ہوتی ہے۔ پیاس لگتی ہے، پیشاب زرد آتا ہے۔

ورم بارد :-

عوارض میں خفت ہوتی ہے، خصبہ کا رنگ سفید، لمس سرد اور نرم ہوتا ہے،

درم صلب :-

- — درم میں صلابت ہوتی ہے، خصیہ کارنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔
- سوزاک کی وجہ سے درم خصیہ ہو تو اس وقت عضو تناسل سے پیپ آنا بند ہو جاتا ہے،
- درم اصل الاذن کی صورت میں، درم کے خصیوں میں منتقل ہونے کے کوائف ملتے ہیں۔

اصول علاج |

- — درم خصیہ حار میں متاثر جانب کی باسلیق کی فصد کھولیں، اس کے بعد صافن کی فصد کھولیں، قطن یرسنگیاں کھینچیں،
- — درم خصیہ بار د میں منضج دیں اور اخراج مادہ کی تدابیر کریں۔
- — محملات استعمال کرائیں۔
- — فعل ہضم کی بہتری کی تدابیر کریں۔
- — اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔

علاج |

- — درم خصیہ حار میں درج ذیل تدابیر اختیار کریں
- متاثر جانب کی باسلیق کی فصد کھولیں، اس کے بعد صافن کی فصد کھولیں قطن پر سنگیاں کھینچیں۔
- تبرید کے لیے درج ذیل نسخہ اختیار کریں۔
- نسخہ تبرید :-
- لعاب بہدانہ، شیرہ عتاب، شیرہ تخم کاہو مقشر، ہم وزن میں شربت نیلوفر ۲۴ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- بطور ضمد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔
- نسخہ ضمد :-
- ارد جو، گل ابرمنی، رسوت، صندل سفید، عنب الثعلب، ہم وزن کو آب کشیز

سبز مروق میں پیس کر خصیتین پر ضا د کریں۔۔۔۔۔ عرق گلاب اور لعاب اسپنول،
میں کپڑا تر کر کے متاثرہ حصہ پر رکھیں۔
نسخہ ضا د۔

صندل سفید، صندل سرخ، آرد باقلا ہم وزن کو آب کاسنی میں پیس کر ضا د کریں،
نسخہ ضا د۔

بزر ابلیخ، آرد جو، نریشہ کدو، آب کشیز، کائی (طلحہ)، صندل سرخ،
جملہ دواؤں کو آب کشیز سبز مروق میں پیس کر ضا د کریں۔
نسخہ ضا د۔

عس مقشر، گل سرخ، پوست انار،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو آب برگ بھنگ میں
جوش دیں اور روغن گل ملا کر ضا د کریں۔

۔۔۔۔۔ درم خصیہ مغزادی حار میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شیرہ تخم خیارین ۶ گرام، شبیرہ تخم خرفہ ۴ گرام، شربت آلو بخارا ۲۵ ملی لیٹر میں
نکال کر نوش کرائیں۔

تسکین درد کے لیے برگ قنب پیس کر ضا د کریں۔۔۔۔۔ درج ذیل نسخہ مفید ہے۔

نسخہ ۲۔

اسپنول ۳۶ گرام، کوکنار ۲۵ گرام۔۔۔۔۔ دونوں کو پانی میں پیس کر پکائیں۔
گاڑھا ہونے پر روغن گل ۱۲ ملی لیٹر ملا کر لیپ کریں، اور اوپر سے برگ ارند رکھ کر ٹکٹ
کسوائیں

۔۔۔۔۔ خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ مفید ہے۔

نسخہ ۳۔

تخم کاہو مقشر، لعاب بہدانہ، ہر ایک ۳ گرام، مکوہ خشک ۶ گرام، سپتاد
۲ دانہ، عناب ۵ عدد۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور ملی چھان کر شربت
نیلو فر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

۔۔۔۔۔ درم خصیہ بارد میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما دہ۔

گل خطی، بیج خطی، کنجد سیاہ، تخم کتان، حلبہ، اکلیل الملک، آرد باقلا، ہر ایک ۴ گرام، مرکی، گل بابونہ، زیرہ سیاہ، مقل زرد، اشق، میعہ سائلہ، ہر ایک ۳ گرام، موم، پیسہ گروہ ہز، ہر ایک ۲ گرام، روغن گل ۸ ملی لیٹر، صنبل الطیب ۲ گرام۔
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر حسب دستور مریم بنائیں اور ضما د کریں۔

نسخہ ضما دہ۔

تخم حلبہ، تخم کتان، گل بابونہ، گل خطی، عنب الثعلب، اکلیل الملک، ہر ایک ۴ گرام، زیرہ سیاہ ۲ گرام، تمام دواؤں کو آب مکور میں جوش دے کر مل چھان کر زردی بیضہ مرغ اعداد، روغن گل ۱۲ ملی لیٹر گھینپ کر ضما د کریں۔
درج ذیل نسخہ بھی مفید ہے اور غلبہ خلط بلغمی میں مجرب ہے۔

نسخہ ۱۔

بابونہ، اکلیل الملک، شبت، بنفشہ خطی، برگ غار، برگ کربجہ، برگ عنب الثعلب، برگ شلیم، برگ چقندر ہم وزن۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر اس کا بھپارہ کرائیں، پانی سے نطول کرائیں اور اس کے تغل کو ضما د کے طور پر استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما دہ۔

بیج بید انجیر کو سرکہ میں پیس کر نیم گرم ضما د کریں۔
• درم خصیہ بارد میں حسب ضرورت منضج منقہ ادویہ ضرور استعمال کرائیں۔
• درم خصیہ صلب میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما دہ۔

روغن بید انجیر، روغن گل، روغن بابونہ، روغن جوزا مثل ملا کر طلا کریں اور اوپر سے برگ تمباکو بھادیں۔

نسخہ ضما دہ۔

گیرو، زنجبیل، معز بنولہ، کنجد سیاہ، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو پیس کر نیم گرم ضما د کریں۔

نسخہ ضما د :- بابونہ، خطمی، منقل، تخم مر، حلبہ، آرد نخود، اکلیل الملک، زیرہ سیاہ، بوزن، کو
پس کر تخم کتان اور روغن کنجد میں گھینپ کر ضما د کریں۔
داخلی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ :- بادرنجبویہ، برگ گاؤزباں، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۴ گرام، تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد ۵۰ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

درد خصیہ

TESTICULAR PAIN

اس مرض میں کیسے خصیہ میں التهاب یا ثقل کے بغیر، نفوڑے نفوڑے وقفے
سے عصبی درد ہوتا ہے۔

اسباب

امراض اعصاب :-

۱. سور مزاج حار

۲. سور مزاج بارد

۳. لذع عصبی

۴. ضربہ وسقوطہ

جنسی بے اعتدالی :-

۱. کثرت مجامعت

۲. ترک مجامعت

۳. قلت مجامعت

۴. جلق

امراض کلیہ :-

۱. حصاة کلیہ

امراض معدہ :-

۱. سورہفم

امراض مفاصل :-

۱. وجع المفاصل

۲. نقرس

عضوی اشتعال

۱. درد شہ کی

امراض جسم خصیہ :-

۱. التهاب خصیہ حاد (سوزاک مجری بول کا التهاب عفنی، حصاة کے

اعتباس سے قروح، غدہ قدامیہ پر عمل جراحی کے بعد، بارلیٹوس، انفلوئنزا)

۲. سل خصیہ

۳. آتشک خصیہ

۴. سلعہ خبیثہ

امراض غلاف خصیہ :-

۱. قبیلہ مائیہ

۲. فتق

۳. قبیلہ رمویہ

۴. سلعہ

۵.

امراض جبل المنویہ :-

۱. دوالی الصفین

انقلاب خصیہ :-

۱. احتباس خصیہ :-

درد میں شدت ہوتی ہے، لمس حار ہوتا ہے، سوزش اولاً برنج میں شروع ہو کر آہستہ آہستہ جسم خصبہ تک پھیل جاتی ہے۔۔۔۔۔ التهاب حاد کی ابتداء میں خصبہ اور قناتہ اربی (Groin Region) میں درد محسوس ہوتا ہے اور ریلین کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خصبیوں کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، حجم بڑھ جانے سے درد اور ذکات حس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے لیکن دکھن سی باقی رہتی ہے، اگر درد اور دکھن برقرار رہے تو خراج پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔

درد میں خفت ہوتی ہے، ملمس یار د ہوتا ہے، کسی قدر بے حسی بھی ہوتی ہے، ریا ح، سوہم غم اور نفخ کی شکایت ہوتی ہے، درد میں امتدادی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور درد مستقل رہتا ہے۔
ضربہ دستقلہ :-

سل خصیہ :-

ابتدار میں ایک چھوٹا سا مقامی، گول اور سخت ابجار ہوتا ہے، جو عام طور سے برنج کے بالائی سرے پر نمودار ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد اس میں درد ہونے لگتا ہے اور نوٹے کی جلد میں ناسور بن جاتا ہے۔
آتشک خصیہ :-

درد میں خفت ہوتی ہے، عام طور سے ثقل اور کھنپاؤ محسوس ہوتا ہے، خوبہ کا حجم اُٹارنے لگتا ہے اور کچھ عرصہ بعد خشک ہو جاتا ہے۔
سلعہ خبیثہ :-

دردِ رض کے ترقی یافتہ ہو جانے پر ظہورِ پیدا ہوتا ہے، مخصہ بہت

تیزی سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور کچھ عرصہ بعد غلاف خصبہ پھٹ جاتا ہے۔

قیلہ مائیہ :-

خصبہ نیچے کھینچتا محسوس ہوتا ہے، ابھار گول اور اس کی سطح بالکل ہموار

ہوتی ہے۔

دوالی الصفن :-

شدید صورت میں کھڑے ہونے پر بوجھ اور دکھ محسوس ہوتا ہے۔

ارتفاع خصبہ :-

درد کی خفت اور شدت کا احساس خصبہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ بے محل خصبہ میں عام طور سے بلوغ کے وقت، جب خصبہ بڑھ رہے ہوں تو، درد ہوتا ہے، ارتفاع خصبہ کے ساتھ اگر التهاب بھی ہو تو درد شدید ہوتا ہے۔

عضوی اشتراک :-

بعض اوقات خصبوں کے طبعی حالت میں ہونے کے باوجود درد ہوتا ہے اس کی وجہ حوض کلیہ یا حالب کی پتھری، فقرات قطنی کے امراض اور درم زائندہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

لذع عصبی :-

درد نوبت کے ساتھ ہوتا ہے اور بوجھ کے بغیر تناؤ ہوتا ہے۔

رتج :-

درد تمدد اور ثقل کے بغیر ہوتا ہے، اور منتفل ہوتا رہتا ہے۔

علامات

_____ فعل بھنم پر خصوصی توجہ دیں

_____ تہرید کریں

_____ ضما د کریں

_____ حرارت مادی کی صورت میں فصد کھولیں، پیچھنے لگا میں

علاج |

_____ حرارت غیر مادی کی صورت میں درج ذیل ادویہ کا ضما د کریں۔

نسخہ ضما د :-

کشیز سبز، غلب الثعلب، آب کدوتر، آب کاسنی سبز، میں تھوڑا سا افیون ملا کر ضما د کریں، اور سوزش و شدید درد کی صورت میں اسی نسخہ میں شوکران / افیون / کافور کا اضافہ کریں۔

_____ حرارت مادی کی صورت میں درج ذیل غذا بیر اختیار کریں۔

صافن کی فصد کھولیں

تغن یا پنڈ لیوں پر پچھنے لگائیں۔

سرکہ، غن گلاب ہم وزن میں ایک کپڑا بھگو کر خصیتین پر رکھیں۔

_____ داخلی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱:-

شربت ترمندی، شربت آلو بخارا، سکجنین کوشربت نیلو فریا شربت دینار کے ساتھ نوش کرائیں۔

تلمیں طبیعت کے لیے شربت ورد مکرر، شیر نشت، ترنجبین یا شربت آلو بخارا بھی نوش کرائیں۔

_____ برودت کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ دلک ۱:-

پیہ بٹ، پیہ مرغ، روغن بابونہ، روغن بیدارنجیر اور تھوڑا سا فرنیون حل کر کے حب دستور مالش کریں۔

نسخہ دلک ۲:-

روغن فروع میں روغن بیدارنجیر حل کر کے دلک کریں۔

نسخہ نطول ۱:-

الکلیل الملک، مرزنجوش، بابونہ، قیصوم، شبت، _____ تمام دواؤں کو پانی میں

جوش دے کر مل چھان کر نطول کرائیں۔
داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

پرسیاوشاں، بادیان ہر ایک ۶ گرام، اصل السوس مقشر ۳ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلغند ۲۵ گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

نسخہ ۱۔

.. برو دت مادی کی صورت میں مہیلات قویٰ مثلاً غارلیقون اور تربد وغیرہ
اجزاء پر مشتمل ادویہ استعمال کرائیں۔

۱۔ فلیہ ریاح علیظہ میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں ۔

نسخہ تکمیل :-

سپیس گندم اور نمک سے تکید کریں۔

نسخہ ضامد :-

پودینہ، سداب، اکلیل الملک، بابونہ، ہم وزن، — تمام دواؤں کو عرق پودینہ میں پیس کر خما د کریں۔

نسخہ طلباء و دلک :-

جند بیدستر، سدا ب، ہم وزن کور و عن یا سمین میں ڈال کر نیم گرم طلا و ادہ
دک کر پی۔

داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

برگ فنجکشت، انبہ، گل بابونہ، عنب الثعلب، بادیان، ہر ایک ۳۶ گرام کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔ _____ اس کے بعد منقل ۲۴ گرام کو سرکہ اور آب برگ مکوہ میں حل کر کے سنبل الطیب، بابونہ ہر ایک ۹ گرام ملا کر نیم گرم ضاد کریں

نسخہ :-

ایسیون ۳ گرام، بادیان ۶ گرام، گلفند ۲۵ گرام میں حل کر کے کھلائیں۔

•۔ ضربہ و سقطہ کی صورت میں خارجی اور داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

باسلیق یا صافن کی فصد کھولیں۔
ساقین یا قطن پر پچھنے لگائیں۔
دفع الم کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما دہ۔

بنفشہ، نیلوفر، کدو، برگ خٹلی، عنب الثعلب، کرنب، افسون، — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر ضا د کریں۔

نسخہ ضما دہ۔

مرکی، رائیج، بزرکٹاں، — تمام دواؤں کو آب سرد میں پیس کر روغن گاؤ، علق البطم ہم وزن ملا کر ضما د کریں۔

نسخہ ضما دہ۔

زرد چوب کو باریک پیس کر زردی بیضہ مرع میں ملا کر نیم گرم ضما د کریں۔
— اگر ضربہ و سقطہ کی وجہ سے خصیتیں اپنی جگہ سے ٹل گئے ہوں اور درد نیز بخار ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما دہ۔

تخم کشف کو پیس کر روغن گل میں حل کر کے ضما د کریں۔
داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

شیرہ تخم قرطم، شیرہ خار خشک، شیرہ تخم خرپڑہ، — تمام دواؤں کا شیرہ نکال کر گلفندہ ۲ گرام ملا کر کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

حب کا کچ، تخم خشنماش، کشنیز، کا ہو، ہر ایک ۶ گرام کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

•۔ فتن، قیلہ مائیہ کی صورت میں، علاج ان امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

عظم خصبہ

TESTICULAR HYPERTROPHY

اس مرن میں خصبہ، کسی سوزش، درد اور ورم کے بغیر، فریبہ کے طور پر بڑے ہو جاتے ہیں۔

اسباب |

- I, عام فربہ
- II, خصبوں میں زیادہ مقدار میں خون آنا
- III, قوت جاذبہ اور قوت غاذبہ کا غیر معمولی طور سے قوی ہونا

علامات |

مرض بندرج نمود پذیر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بالعموم صحت اطمینان بخش ہوتی ہے، خصبوں کے غیر معمولی طور پر بڑے ہو جانے سے طبعی طور سے منی پیدا نہیں ہو پاتی، بہت زیادہ بڑے ہو جائیں تو عام جسمانی نقل و حرکت میں بھی دشواری ہوتی ہے۔

اصول علاج |

- 1. علاج میں کامیابی کی توقع بہت زیادہ نہیں ہوتی تاہم سرد اور مخدرداؤں سے علاج کریں تاکہ قوت غاذبہ اور قوت جاذبہ ضعیف ہو جائیں۔
- 2. عام فربہ کو کم کرنے کی تدابیر کریں۔

علاج |

- 1. ابتداً مرن میں سرد اور مخدرداویہ مثلاً بیج لفاح، سوکران، پوست خشمش، اجوائن خراسانی، سانہ میں کھل کر دہ، آب کشیزہ، سیسہ کی رگڑ، چکی کے تھکر

- رگڑ، ان دواؤں کو آب کشینز سبز میں حل کر کے طلا کر لیں۔
 ۱۔ مردار سنگ کو آب کشینز سبز میں پس کر طلا کر لیں۔
 ۲۔ گل ارمنی اور سفیدہ کا شغری کا ضما د کریں۔
 ۳۔ افیون کو آب کشینز سبز میں حل کر کے لگائیں۔
 ۴۔ جوز اہل، مازوسبز کا ضما د لگائیں۔
 ۵۔ سوکران کو سرکہ میں گوندھ کر پس لیں اور ضما د کریں۔
 ۶۔ صبر، جوز بوا، سرد کا ضما د کریں۔

صغر خصبہ

TESTICULAR ATROPHY

اس مرض میں دونوں یا ایک خصبہ کے اجزاء کے سکڑ جانے سے خصبہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔

اسباب

دوران خون میں رکاوٹ۔

۱. فتنق
 ۲. قیلہ مائیه
 ۳. قیلہ دمویہ
 ۴. دوالی الصفن
 ۵. دار الفیل
 ۶. دوالی، فتنق وغیرہ پر عمل جراحی
- التماب خصبہ و برنج۔
۱. سوزاک
 ۲. ضربہ و سقطہ

(۱۰) التهاب غدہ تکفیه
 (۱۱) حمی تیفودیہ
 (۱۲) نفرس
 (۱۳) انفلوئنزا
 ضعف اعصاب :-
 (۱۴) دماغ / نخاع کی چوٹ

انفصالات نفسانیہ :-
 (۱۵) خوف دہراس
 نامعلوم اسباب :-

علامات

عائد یا خصبوں میں درد ہوتا ہے، پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، صفر خصیہ، سوزاک میں کثیر الوقوع ہے، چنانچہ سب سے پہلے خصبوں میں التهاب ہوتا ہے۔ ذبول (شروع ہوتا ہے، اعصابی کمزوری یا دماغ / نخاع پر چوٹ کی صورت میں صفر، مہینوں بعد شروع ہوتا ہے، اس صورت میں پہلے عضلات میں تھد کی شکایت ہوتی ہے، مریض، محنت و مشقت کا کام نہیں کر پاتا، سردی کمزوری ہوتی ہے، داڑھی، مونچھ کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور چند مہینوں بعد خصیہ مڑ کے دانوں کے برابر ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات صفر خصیہ، خصیہ پر چوٹ لگنے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں صفر کافی عرصہ بعد نمایاں ہوتا ہے۔ بعض اوقات صفر خصیہ، کسی معلوم سبب کے بغیر بھی شروع ہو جاتا ہے، تاہم اس میں مریض کی سرگزشت پر کافی توجہ کی ضرورت ہے۔

اصول علاج |

- _____ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- _____ ارخام اور تسخین کی تدابیر اختیار کریں۔

علاج |

_____ ارخام اور تسخین کے لیے درج ذیل ادویہ کے جوشاندہ سے آہرن کرائیں
نسخہ آہرن :-

بابونہ، سوسن، اکیلل الملک، تخم کتاں، ہم وزن کو پانی میں جوش دے کر مرین کو
آہرن کرائیں۔

_____ روغن قسط، روغن سوسن، روغن بابونہ، ہم وزن، تمام روغنوں
کو ملا کر خصیہ پر مالش کریں۔

_____ حلیت، حلبہ، فرہیون کو باریک پس کر ضاد کے طور پر لگائیں۔

_____ حلبہ، مرزنجوش، بابونہ، بزرک کتاں، اکیلل الملک، سوسن گندم کو

مارالعل میں جوش دے کر طلاء کے طور پر استعمال کرائیں۔ _____ مذکورہ دواؤں کو
اگر حام میں طلاء کریں تو بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

_____ آہرن کے طور پر یہ نسخہ مفید و مجرب ہے

نسخہ آہرن :-

بابونہ، حاشا، نمام، زونا خشک، عنب الثعلب، برگ زیتون، اکیلل الملک،
مرزنجوش، تخم کتاں، _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر، اس جوشاندہ میں

روغن قسط، روغن نار دین شامل کر کے آہرن کرائیں۔

_____ ضاد کے طور پر یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ ضاد :-

برگ زیتون، برگ سرو، مقل ارزق، اشق، سویز منقی نیم کوفتہ، مارالعل،
میں جوش دیں اور روغن شبت، روغن قسط، روغن گاؤ شامل کر کے ضاد کریں۔

دوالی، صفن

SCROTAL VARICOSE

اس مرض میں کیسہ خصبہ اور اس کے ارد گرد کی عروق میں انتہائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں ریاح غلیظہ اور خون کا اجتماع ہوتا ہے، پھر کن، صلابت اور خشونت بھی ہوتی ہے۔

اسباب

۱۔ امراض اعضاء تناسل :-

- ۱۔ کثرت مجامعت
- ۲۔ عروق خصبہ میں انصباب مواد
- ۳۔ خصبہ و مجاری خصبہ میں کثرت عروق
- ۴۔ عروق کی دیواروں کا ضعف

۲۔ امراض معدلا و امعاء :-

- ۱۔ قبض
- ۲۔

متفرقات :-

- ۱۔ ضربہ و سقطہ
- ۲۔ بار برداری
- ۳۔ جوف عادہ کی رسولی
- ۴۔ آتشک
- ۵۔ خناریر

علامات

• _____ مفتی دوائیں استعمال کرائیں

• _____ محملات کا ضاد کرائیں

• _____ مسہل سودا را استعمال کرائیں

• _____ فصد کھولیں۔

•۔۔۔ درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

حلبہ، تخم کتاں، خطمی سفید، پیہہ بزر۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر روغن
سوسن ملا کر نیم گرم ضماد کریں۔

اشق کو سہرہ کہ میں حل کر کے ضما د کر س۔

مغز تخم بید انجیر، کوشیر گاؤں میں پکا کر ضما د کریں۔

نسخہ ضامدہ۔

برگ کرب ۲۴ گرام کو ترکاری کی طرح پکا کر اس میں آرد جو، آرد حلبہ، ہر ایک
۱۲ گرام، پیسہ بزرگ / شحم بظام ۲۴ گرام ملا کر نیم گرم حما د کریں۔
..... با سلیق کی فصہ کھولیں
..... ترب یا اصل السوس کے جو شانده سے قے کرائیں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض صفاق

Learn Unani By Abdul Karim Salman

التهاب باریطون

PERITONITIS

اس مرض میں باریطون میں زیادہ مقدار میں مائیت مزرع ہو کر جمع ہو جاتی ہے، جس کے سبب اس میں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ التهابی رطوبت کے تحمل کی صورت میں نئی لیفی ساختیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات مختلف اعضاء کی باریطونی سطیں باہم یا دیوار شکم کے ساتھ چسپاں ہو جاتی ہیں، باریطون دبیز اور غلیظ ہو جاتی ہے، باریطون کی اس رطوبت سے شدید مرضی عوارض رونما ہوتے ہیں۔

التهاب باریطون

اقسام

التهاب باریطون مزمن

Chronic Peritonitis

التهاب باریطون حاد

Acute Peritonitis

اسباب

امراض صدر:-

۱. التهاب غلاف القلب

۲. ذات الجنب

امراض کبد :-

۱. دبیۃ الکبد کا انفجار

۲. التهاب کبد

۳. تدرن کبد

۴. سرطان کبد

۵. قروح الکبد

امراض کلیہ :-

۱. التهاب کلیہ مزمن

۲. التهاب کلیہ حاد

۳. تدرن کلیہ

۴. سرطان کلیہ

۵. بول زلالی

۶. قروح الکلیہ

امراض مثانہ :-

۱. انشقاق مثانہ

امراض موارلا :-

۱. التهاب مرارہ

امراض معدہ و امعاء :-

۱. تشقبہ معدہ و امعاء

۲. ضرب معدہ و امعاء

۳. التهاب زائدہ اعور

۴. قروح المعدہ و امعاء

۵. السداد امعاء

حیاتیات حادہ :-

۱۲. حمی معمولیہ

۱۳. جدری

۱۴. حصہ

۱۵. سرخبادہ

۱۶. حمی ہذیانہ

۱۷. حمی نفاسیہ

۱۸. امراض مفاصل ۱۔

۱۹. وجع المفاصل

۲۰. نقرس

۲۱. متفرقات ۱۔

۲۲. برودت و رطوبت

۲۳. خصبۃ الرحم کے امراض

۲۴. آئریشن کے بعد

۲۵. اسقاط حمل

۲۶. آنول کے ٹکڑے کا رحم میں رہ کر سڑ جانا

۲۷. اسسقا رزقی میں بار بار شکم سے بذریعہ سرنج پانی نکالنا

۲۸. آتشک

۲۹. نفخ لدم

۳۰. نقص تغذیہ

۳۱. محنت و مشقت کی زیادتی

۳۲. خنازیر

علامات ۱

حادثہ ۱۔

علامات مرض کا آغاز درد سے ہوتا ہے، جو پٹریو یا ناف کے نفا سے

شروع ہو کر سارے شکم میں پھیل جاتا ہے۔ درد کی کیفیت نشتری، انحرافی یا سوزشی ہو سکتی ہے۔ سانس لینے، کھانسنے، رینگنے، اور رکھی قراقر سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، دونوں ٹانگیں شکم کی طرف کھینچی ہوتی ہیں، التهاب باریطون مقامی میں متاثرہ جانب کی ٹانگیں شکم کی طرف کھینچی ہوتی ہیں کیونکہ اس عمل سے عضلات شکم مسترخ ہو جاتے ہیں اور درد میں 'فاقد' ہوتا ہے۔ نبض سریع ہوتی ہے۔ مرق سخت اور بے حرکت ہوتا ہے، تنفس کے وقت شکم میں حرکت نہیں ہوتی۔ چند گھنٹوں میں نبض اور بھی سریع اور دقیق ہو جاتی ہے، تنگی نفس کی شکایت ہوتی ہے، تپ ہوتی ہے، ابتدائیں بخارِ رزہ کے ساتھ معمولی ہوتا ہے لیکن صید کی صورت میں نہایت شدید ہو جاتا ہے۔ نفع اور قبض ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے، بطلانِ اشتہار ہوتا ہے، زبان خشک، سرخ اور اس پر کسی قدر میل جما ہوتا ہے۔ اطرافِ سرد اور کسی قدر نم ہوتے ہیں، پیشاب سُرخ اور قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ لاغری، ضعف، کرب، اضطراب اور تشنج ہوتا ہے، بعض اوقات بیداری اور ہڈیاں بھی ہوتا ہے، مریض کوتاہی اور خاموشی پسند آتی ہے۔ شکم ٹھوکنے سے ڈھول جیسی آواز آتی ہے، مریض شکم پر کسی طرح کا بھی لمس پسند نہیں کرتا۔

موت کے وقت عوارض میں تخفیف ہو جاتی ہے، مریض بظاہر راحت محسوس کرتا ہے، ڈھول کی سی آواز بھی زائل ہو جاتی ہے، قلبی حرکات سست ہو جاتی ہیں۔ نبض دقیق اور غیر منظم ہوتی ہے، اطرافِ سرد اور تمام جسم پسینے سے تر ہوتا ہے، خون میں سمیت شامل ہو جاتی ہے۔ فواق اور تپ کے بعد مریض فوت ہو جاتا ہے۔

مزمن ۱۔

مرض کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ چنانچہ حادثات میں جن علامات میں شدت ہوتی ہے، قریباً وہی علامات خفت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، درد بہت معمولی ہوتا ہے، بلکہ درد کے بجائے سارے شکم میں بوجھ سا معلوم ہوتا ہے، جوف باریطون میں پانی جمع ہو جانے سے استقارِ زتی ہوتا ہے، اور اس میں حرکتِ جوف محسوس کی جاسکتی ہے۔ باریطون کی تہوں کے دبیز ہو جانے سے ابھار پیدا

ہو جاتے ہیں، ناف باہر کی طرف ابھرتی ہے، اور بعض اوقات سرخ بھی ہو جاتی ہے،
 تھما ہوا بالٹس سے دبازت کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ چہرہ بے رونق اور پٹر مردہ ہوتا ہے۔
تفریقی علامات

التهاب معدہ حاد

- ۱۔ مرض کی ابتداء تھوے سے ہوتی ہے
- ۲۔ تھوے ہمیشہ ہوتی ہے اور اس میں
 صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے۔

- ۳۔ درد قسم معدی تک محدود ہوتا ہے
- ۴۔ چہرہ زرد اور بیست مخصوص ہوتی ہے
- ۵۔ امعاء کا فعل طبعی یا غیر منتظم ہوتا ہے
- ۶۔ نفخ معمولی یا غیر موجود ہوتا ہے

استسقاء

- ۱۔ کلیہ، کبد اور قلب کے مرض
 کی روئیداد ملتی ہے
- ۲۔ درد بطنی نہیں ہوتا
- ۳۔ دبائے سے درد نہیں ہوتا
- ۴۔ حرارت طبعی ہوتی ہے
- ۵۔ اوزیمیا عام ہوتا ہے
- ۶۔ اوردہ بطنیہ منبسط ہوتی ہیں

التهاب باریطون حاد

- ۱۔ مرض کی ابتداء درد سے ہوتی ہے
- ۲۔ تنافوی علامت کے طور پر تھوے
 ہوتی بھی ہے، تو اس میں سبزی مائل مادہ
 خارج ہوتا ہے۔

- ۳۔ درد پھیلا ہوا ہوتا ہے
- ۴۔ ہیئت باریطونی ہوتی ہے
- ۵۔ قبض ہوتا ہے
- ۶۔ نفخ شدید ہوتا ہے

التهاب باریطون مزمن

- ۱۔ شدید حملہ کی روئیداد، تاہم
 مرض کی رفتار بعد میں سست ہوتی ہے
- ۲۔ درد بطنی
- ۳۔ دبائے سے درد میں اضافہ
 ہوتا ہے

- ۴۔ حرارت غیر طبعی ہوتی ہے
- ۵۔ اوزیمیا عام نہیں ہوتا
- ۶۔ اوردہ بطنیہ طبعی حالت میں،
 غیر منبسط ہوتی ہیں

اصول علاج

۔۔۔۔۔ تاکید کریں

- ۔۔۔۔۔ حسب ضرورت حقنہ دیں۔
- ۔۔۔۔۔ اصل سبب مرض کا ازالہ کریں۔
- ۔۔۔۔۔ پیاس کی صورت میں برف کی ڈلی چسائیں۔

علاج :



- ۔۔۔۔۔ پوست خنخاش ۱۲ گرام کو عرق گلاب ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دے کر مکوہ کریں، درد میں مفید ہے۔
- ۔۔۔۔۔ بر شعثا، حسب دستور استعمال کرائیں، یہ بھی درد میں مفید ہے۔
- ۔۔۔۔۔ مرہم داخلیمون، آب برگ کاسنی، آب غلب الثعلب سبز میں ملا کر ضماد کریں۔
- ۔۔۔۔۔ آب مکوہ سبز مروق، آب کشینز سبز مروق، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر میں مغز فلوس نیار شبنز ۲۵ گرام جل کر کے مل چھان کر شربت بنفشہ ۳۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ جوارش کوئی ۶ گرام کھلا کر آب برگ شبت سبز مروق ۶۰ ملی لیٹر، آب برگ مکوہ سبز مروق، شربت دینار ہر ایک ۶۵ ملی لیٹر ملا کر صبح شام نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ ماش کی روٹی ایک طرف پکا کر شکم پر باندھیں۔
- ۔۔۔۔۔ شدت درد کی صورت میں افیمون ۷۵ - ۱۲۵ ملی گرام، پانی میں ملا کر ہر تیسرے چوتھے گھنٹے استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ پوست خنخاش، مکوہ، ہر ایک ۶ گرام، دونوں دواؤں کو پانی ۲ لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر اس میں فلالمین کا محلول بھگو کر شکم پر رکھیں۔
- ۔۔۔۔۔ جب کبد نوشادری ۲ عدد بعد غذا کھلائیں۔

فتق

HERNIA

اس مرض میں کوئی اندرونی عضو مکمل یا مکمل طور پر اپنی اصلی جگہ سے کسی طبیسی یا غیر طبیسی سوراخ یا شکاف سے باہر نکل آتا ہے۔۔۔۔۔ یہ مرض نسبتاً مردوں

بالخصوص ضربہ اندام لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔



فتنق تام :-

اس میں آنت کا کوئی حصہ مکمل طور سے سوراخ سے باہر نکل آتا ہے۔

فتنق ناقص :-

آنت کا حصہ صرف نالی کے اندر ہے ، باہر نہ نکل سکے۔

فتنق راجح :-

فتنق حصہ دبائے سے اپنے اصل مقام پر لوٹ جائے۔

فتنق غیر راجح :-

فتنق حصہ دبائے سے اصل مقام پر نہ لوٹے۔

۱۔ فتنق موقوف :-

آنت کسی نالی میں جا کر اوردب کر اس طرح ہو جائے کہ اس

عضو کا دوران خون بند ہو جائے اور اس کے مردہ ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے۔

(۱۱) فتق دس می :-

آنت کے متاثر حصہ میں درمی کیفیت پیدا ہو جائے۔

(۱۲) فتق سدی :-

غیر منہضم اشیاء، برازیل دیدان اسوار وغیرہ کے آنت میں جمع ہوجانے سے انسدادی کیفیت پیدا ہو جائے۔

مقام اور عضوی اشتراک کے نتیجہ میں اس عضویا مقام میں مرضی علامات ضرور ہوتی ہیں اور اسی مناسبت سے فتق کو ان مقامات یا اعضاء سے منسوب کر کے نام رکھا گیا ہے، مثلاً فتق معدی و مقام معدہ پر کسی غیر طبعی سوراخ کے ہو جانے سے معدہ کا کچھ حصہ دیوار شکم میں ابھر آتا۔ فتق سری :- ناف کے مقام پر مرضی عوارض رونما ہونا۔ فتق بطنی، فتق معوی، فتق کیسی، فتق فمدی اور فتق اربی وغیرہ کی وجہ تسمیہ میں بھی انھیں عوال کا دخل ہے۔

اسباب

مندرجہ ذیل دو کیفیتیں ہر نیائی (فتقی) حالت پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔

۱. مقامی کمزوری

۲. بڑھاؤ اور دباؤ

مقامی کمزوری :-

۱. دیوار شکم کے کسی حصہ کا پیدائشی طور سے کمزور ہو جانا

۲. آپریشن کے بعد

۳. پردہ صفاق میں تفرق اتصال

۴. کسی زائد سوراخ کا پیدا ہو جانا

۵. کسی قدرتی منفذ کا کشادہ ہو جانا

بڑھاؤ اور دباؤ :-

۱. بھاری بوجھ اٹھانا

۲. استسقاء

۱۰۰، حمل
۱۰۱، دائمی قبض
۱۰۲، بلغمی رطوبتوں کا نافع کی طرف مستحکم ہوتا
۱۰۳، ریا ح

علامات

بطن کے زیرِ جِصہ میں درد اور نقل و حرکت کی صورت میں تکلیف ہو تو معالج کو مریض کا معائنہ کرتے وقت فتن کے امکانات کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔

فتق مخنوق کی صورت میں تے آتی ہے جس میں براز بھی خارج ہوتا ہے، شکم میں درد ہوتا ہے، بار بار پاخانہ کی ضرورت محسوس ہونے کے باوجود کچھ خارج نہیں ہوتا، تبص ہوتا ہے، مخنوق آنت میں غائغرائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مریض کے فوت ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

فتق درمی میں شدید درد ہوتا ہے، بخار اور تے ہوتی ہے، درم، مجاور اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔

فتق سدی کی صورت میں قولنج سے مشابہ علامات رونما ہوتی ہیں۔

فتق معدی کی صورت میں مریض کو چت ٹٹا کر فتن کو دبانے کے باوجود وہ بآسانی واپس نہیں لوٹتا، اور بالفرض لوٹتا بھی ہے تو اس میں کسی قدر قراقرز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات قولنجی علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔

فتق سری کی صورت میں ناف کے مقام پر باریطون پھٹتی ہے جس کے نتیجے میں ناف ابھرتا ہے۔ اس کی رنگت عام بدن کی رنگت کے مانند ہوتی ہے۔ چھوڑنے پر نرم معلوم ہوتی ہے، درد بالکل نہیں ہوتا، دبانے سے اندر چلی جاتی ہے۔ فتن سرخ پیدا ہونے کی صورت میں، بوڑھی اور بار بار حاملہ ہونے والی خواتین میں کثیر التووع ہے، فتن بطنی میں پردہ صفاق اور مراق کے درمیان بلندی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے جو حرکت کرنے اور سانس روکنے کی صورت میں اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لیٹنے نیز مراق پر دباؤ پڑنے کی صورت میں غائب ہو جاتی ہے۔

اصول علاج |

- _____۔ شدید جسمانی حرکات، جماع اور بکثرت پانی نوش کرنے سے احتراز کرائیں۔
- _____۔ ریاح انگیز اور نفاخ دوائیں ہرگز استعمال نہ کرائیں۔
- _____۔ فراخ شدہ مقام کو اصلی حالت پر لانے کے لیے ندا بیر کریں۔
- _____۔ دافع الم ادویہ استعمال کرائیں۔
- _____۔ حسب ضرورت حقنہ دیں۔

علاج |

- _____۔ فتنق معوی / معالیٰ میں درج ذیل ندا بیر اختیار کریں۔
- آنت یا پردہ اتر آئے تو کمال آہستگی سے اوپر چڑھائیں، اگر چڑھنے میں دشواری ہو تو اس مقام پر گرم پانی دھاریں یا گرم آبزن کرائیں اور اس مقام کے نرم پڑ جانے پر ہاتھ سے اوپر چڑھادیں اور اس پر قابض دوائیں لگائیں۔
- داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ :-

مصطکی، بادیان، انیسون، ہر ایک انگرام کو باریک پس کر کلقتند ۲۵ گرام، میں ملا کر کھلائیں۔ اور اس کے بعد عرق بادیان، عرق مکوہ، ہر ایک ۳۶ ملی لیٹر نوش کرائیں۔ فتنق معوی کے درد میں بھی مفید ہے۔

نسخہ ۱:-

کندر، بڑنگ، کابلی، خشت کہنہ، ہم وزن _____ تمام دواؤں کو پس کر ۶ گرام سفوف روغن گاؤ ۱۲ ملی لیٹر میں ملا کر کھلائیں، کھلانے کے بعد تے ہو جائے تو فوراً آنت کو اوپر چڑھادیں۔

نسخہ ۲:-

تخم مورد ۱۸ گرام، پانی ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیں۔ جب ۱۰۰ ملی لیٹر رہ جائے تو روغن گاؤ ۳۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کر لیں، نیم گرم کر کے کھڑے ہو کر نوش کرانا

زیادہ سودمند ہے۔

نسخہ ۱۔

کونسل درخت ہی ۳ عدد، پانی ۵۰، ٹی لیٹریس جوش دیں، جب ۲۵۰ ٹی لیٹر رہ جائے تو تھوڑا سا نمک ملا کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۲۔

سہاگہ بریاں ۵، ٹی گرام، باریک پس کر تھوڑے سے گڑ میں ملا کر تین گولیاں بنائیں اور ایک گولی روزانہ صبح کو کھلائیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا روغن گاو نوش کرائیں۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضما د۱۔

مصطلی، گندر، جوزالسد، برگ سرو، اقا قبا، گلنار، دم الاخوین، مرکی، انزروت، صبر زرد، امہل، رسوت، شب یمانی، ہم وزن — تمام دواؤں کو باریک پس کر محفوظ کر لیں اور سریشم ماہی کو آب مکوہ سبز مروق میں پس کر تمام دواؤں کو اس میں ملا دیں، اور کسی کپڑے میں چھان کر مقام فتنق پر ضماد کریں اور کسی پٹی سے اچھی طرح کس کر باندھیں، اور ۳ دن بعد کھولیں۔

نسخہ ضما د۲۔

عنب الثعلب، گل حطی، جوزالسد، سریشم ہر ایک ۴ گرام، — تمام دواؤں کو پس کر شیر گاؤں میں پکائیں اور تھوڑا سا روغن بیداجخیر ملا کر کپڑے پر لگا کر فتنق پر باندھیں۔

نسخہ ضما د۳۔

پوست انار نریش، مازو، جفت بلوط، جوزالسد، شب یمانی، کندر، قشائ، سریشم ماہی، برگ ببول، برگ مورد، طراشیث، صمغ عربی، ہم وزن — تمام دواؤں کا لپ تیا کر کے لگائیں۔

نسخہ ضما د۴۔

حصفن کی، عصارہ لیجۃ التیس، ربوند چینی، ہر ایک ۲ گرام، مازو سبز، گلنار فارسی، جوزالسد، کندر، راتینج، ہر ایک ۴ گرام، گل قیویا، گل قبرسی، خرنوب نیبطی، پوست انار

حب الہس، برگ حب الہس ہر ایک ۵، اگرام، صبر زرد، مر، اتاقیا، سریش، سریشیم ماہی ہر ایک ۱۰
اگرام، تمام دواؤں کو حسب دستور حل کر کے شراب قابض میں ملا کر ضما د کریں۔
نسخہ ضما د:-

دم الاخویں، کیترا، صغ عربی ————— تمام دواؤں کو پانی میں باریک پس کر ضما د کریں
نسخہ ضما د:-

بہر وزہ خشک، باریک پس کر افیون کے پانی میں ملا کر کپڑے پر لگائیں اور
اس کو متاثر مقام پر باندھیں۔

• فتنی ریکی میں درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
نسخہ ضما د:-

جوزالسد، صبر زرد، برگ سداب، بابونہ، مارو، ہم وزن ————— تمام
دواؤں کو باریک پس کر روغن قسط میں ملا کر ضما د کریں۔
نسخہ ضما د:-

زنبون، جند بیدستر، ہم وزن ————— دونوں کو روغن کنجد میں حل کر کے لگائیں
اور تھوڑا سا اخیل میں ٹپکائیں۔
نسخہ ضما د:-

نخم سداب، نخم سنبھالو، پودینہ، مرزنجوش، قیصوم، ترس، دج ترکی ————— تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں بھگو دیں اور ضما د کریں۔
نسخہ قسطور:-

روغن ربنق ۱۲ ملی لیٹر، جند بیدستر، مشک، ہر ایک اگرام ————— آخرالذکر
دونوں دواؤں کو روغن زنبون میں حل کر کے اخیل میں ٹپکائیں۔
نسخہ نطول:-

گل بابونہ، تخم شبت، اخیل الملک، برنجاسف، مرزنجوش ہم وزن —————
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نطول کریں۔
نسخہ مالش:-

روغن بابونہ، روغن قسط، روغن شبت، روغن سداب، ————— تمام روغنات

یہ جبہ بیدستر حل کر کے مالش کریں۔

• ————— فقن مائی میں درج ذیل تدابیر/نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱:-

بادیان، جفت بلوط، ہرایک ۹ گرام، سنبل الطیب، سعد کوفی ہرایک ۳ گرام،
تخم گز، تخم شلجم، ہرایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر ۳ گرام ہمراہ پانی
نیم گرم، استعمال کرائیں۔

نسخہ ۲:-

سفون چوب زرد حسب ضرورت، باریک پیس کر کھلائیں اور پر سے پانی نوش
کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ضماد ۱:-

چوب انگور خاکستر، چوب بلوط خاکستر، ہم وزن کور وغن زیتون میں خوب
پکائیں۔ اور ضماد کریں۔

نسخہ طللا ۱:-

قرمانا، تخم کتاں، تخم حلبہ ہم وزن، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر
روغن دارچینی میں ملا کر طللا کریں۔

نسخہ طللا ۲:-

جبہ بیدستر، بورہ ارمنی، مرکی ————— تمام دواؤں کور وغن زیتون میں
حل کر کے طللا کریں۔

نسخہ طللا ۳:-

آرد جو، سعد کوفی، زیرہ کرمانی، برگ مورد، گل ارمنی، پشک گوسفند،
ہم وزن ————— تمام دواؤں کو سرکہ میں باریک پیس کر لیپ کریں۔


• ————— فقن کی دوسری اقسام کا علاج بھی ان ہی خطوط پر

کریں۔

قیلہ مائئہ

HYDROCELE

اس مرض میں خصیہ کی افشہ میں سے کسی ایک میں رطوبات جمع ہو جاتی ہیں جس سے معمولات پر اثر پڑتا ہے، اور مرضی کوائف رونما ہوتے ہیں۔



اسباب

۱. درم خصیہ
۲. قوت جاذبہ کے نقص کی وجہ سے رطوبت لغاویہ کا خصیہ میں جمع ہونا۔
۱۰. مجاری رطوبت لغاویہ کا انسداد
۱۷. آتشک
۱۸. خلقی

علامات

فوطے بند رتج بڑھتے ہیں، ابتداء میں فوطے پھٹنے ہو جاتے ہیں، پانی کی مقدار کے

لہ پانی، خصیہ کے صفاتی طبقہ (لغافہ غدیہ) کے جون میں جمع ہوتا ہے۔
 لہ پانی، مجرائے اریہ کے جون میں جمع ہوتا ہے اور دبائے سے سارا پانی شکم کے اندر
 چلا جاتا ہے، دباؤ مٹنے پر واپس آ جاتا ہے۔
 لہ پانی، ایک طحیدہ تھیلی میں جمع ہو جاتا ہے۔

اخبار سے ان میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، اعضاء شکنی اور بنجار بھی ہو سکتا ہے، شائع حصہ میں درد ہوتا ہے، رطوبت شفاف ہوتی ہے — بعد میں قبیلہ دبیز ہو جاتا ہے، اس میں صلابت بھی آجاتی ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، کھانسنے سے اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ عموماً فوطہ بیضوی یا گول ہوتا ہے۔ دبانے سے حرکت موجی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات پیشاب کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، جبل المنی دم کے اوپر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ پانی کا ثقل اضافی ۱۰۲۰ — ۱۰۲۴ ہوتا ہے اور مقدار ۶۰۰ ملی لیٹر تک ہوتی ہے۔ خصیوں کے ایک طرف روشنی کرنے سے دوسری طرف بھی اس کی روشنی معلوم ہوتی ہے۔

اصول علاج |

- — پانی کو جذب کرنے کی نذر ابیر کریں۔
- — عملیہ اس کا بہتر اور شافی علاج ہے۔

علاج |

- — ابتدا میں درج ذیل نسخہ نمادا استعمال کریں۔

نسخہ نمادا:-

پیشک گو سفند ۵ گرام، بورہ ارمی، ترس، گل ارمی، صبر زرد، آرد جو، ہر ایک ۳ گرام — تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر ضما د کریں۔

نسخہ نمادا:-

مقل ازرق، مرکی، گل بابونہ، سنبل الطیب، اکیل الملک، زیرہ سیاہ، میعہ سائلہ، ہر ایک ۳ گرام، گل خطمی، حلبہ، آرد باقلا، ہر ایک ۴ گرام، موم سفید ۴ گرام، شحم کلیہ نر ۲۵ گرام، روغن گل ۲۵۰ ملی گرام — پہلے موم سفید اور شحم کو روغن گل میں پگھلائیں پھر مذکورہ دواؤں کو پیس کر ملائیں۔ اور ضما د کے طور پر استعمال کریں۔

نسخہ نمادا:-

مصطکی، مامیثا، دم الاخویں، سرلیں ماہی، کندہ، ہرایک ۶ گرام، سرلیں ماہی کو
علیحدہ اور تمام دواؤں کو آب مکوہ سبز میں پیس کر اور باہم ملا کر لیپ کریں۔ اور کس کر
تین دن تک لنگوٹ باندھنے کی ہدایت کریں۔

نسخہ ضما د:-

سعد کونی، بورہ، زیرہ کرمانی، ترمس سوختہ، صبر سفوطری، قشاد الحمار، شحم
حفظل ہرایک، گرام، پشک گوسفند، گل ارمنی، آرد جو، سرگین کا دُ خشک، ہرایک
۳۶ گرام ————— تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر ضما د کریں۔

درج ذیل نسخہ مرہم بھی مفید ہے۔

نسخہ مرہم :-

موم زرد ۸ گرام، زفت، اشق، ہرایک ۲ گرام، شب یمانی ۳۲ گرام،
پیلہ اشق کو آب گرم میں حل کریں پھر روغن زیتون ۳۶ ملی لیٹر میں موم اور زفت گھلاتیں
اور شب یمانی کو باریک پیس کر تمام دواؤں کو ملائیں۔ اور خوب سحن کر کے مرہم کی
طرح بنا کر استعمال کرائیں۔

روغن شریفی بھی مفید و مجرب ہے۔

سورہ روغن شریفی :-

حفظل ۳ عدد، بڑے سائز کا لیکر ٹکڑے ٹکڑے کریں اور روغن کنجد ۵۰۰ ملی لیٹر
کنویں کا پانی ۱ ملی لیٹر بھر کر ملا کر جوش دیں، جب پانی اڑ جائے تو اتار کر روغن چھان کر
محفوظ کر لیں اور اس کا طلا د کریں۔

نسخہ ضما د:-

گل ارمنی، سفیدہ کا شغری باہم ملا کر ضما د کریں۔

نسخہ ضما د:-

جوزمانٹل، اہبل، مارو سبز ہم وزن کو سرکہ میں پیس کر ضما د کریں۔
درج ذیل ادویہ کا نطول کریں۔

نسخہ :-

گلی میو، پوست خشتاش، ہرایک ۶۰ گرام، ہزر البنج ۲۴ گرام ————— تمام

دواؤں کو ۳ لیٹر پانی میں جوش دے کر گرم گرم نطول کریں اور اس کا ثفلہ باندھیں۔
 • داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱۔

جوارش کمونی، گرام صبح کے وقت کھلائیں اور بوقت درد اطریفیل کبیر، گرام

کھلائیں۔

نسخہ ۲۔

جوارش کمونی، جوارش مصطلکی، معجون فلاسفہ، معجون کندریا اطریفیل صغیر استعمال

کرائیں۔

• علیہ کریں۔

Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

امراض نقص تغذیہ

Learn Unani By Abdul Waris Salman


سمن مفرط

OBESITY

اس مرض میں زیر جلد اور اندرونی انسجہ میں غیر معمولی طور پر شحم (جم) ہو کر ایک دبیز تہہ بنا دیتی ہے، جس کے سبب جسم غیر معمولی طور پر فربہ اور بھاری ہو جاتا ہے، نقل و حرکت میں دشواری ہوتی ہے، بسا اوقات یہ فربہ دوسرے امراض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ عام طور سے یہ مرض ادھیڑ عمر کے بعد عارض ہوتا ہے اور عورتوں میں سن ایاس کے بعد کثیر الوقوع ہے۔

سمن مفرط

اقسام



سمن خارجی غذا میں شحمی اجزاء مناسب مقدار میں ہوتے ہیں۔ لیکن جسم میں ان کا جذب دہضم ناقص ہونے کی وجہ سے وہ زیر جلد اور اندرونی انسجہ میں جمع ہونے لگتے ہیں، سمن خارجی غذا میں شحمی اجزاء زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور جسم میں ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔

اسباب ا

ا، ذاتی :-

۱. تغذیہ کی زیادتی، مثلاً مرض، شیریں اور نشاستہ دار غذاؤں کا بکثرت استعمال۔

۲. عیش و عشرت کی زندگی
۳. قوت مدبرہ بدن اور نظام ہضم میں فرق آنا

۴. وراثت

۵. ورزش کی کمی

۶. کثرت سے نوشی

۷. سن ایاس۔

ب، شرکی (عضوی اشتراک) :-

۱. ذیابیطس شروع ہونے سے قبل

۲. التهاب کلیہ مزمن لمبی
Chronic Parenchymatus Nephritis

۳. انقطاع یا ضمور خصبہ
Testiculus Atrophy

۴. خصیتہ الرحم کی رطوبت مخصوصہ کا کم ہونا
Ovarian Insufficiency

۵. غدہ نخاعیہ کی رطوبت مخصوصہ کی کمی

۶. عدم دمانع کا سلعہ یا جراحہ

۷. ورم کبظری (نوساخت)
Hyper Nephroma

۸. منتشر اور ام شمی یا مرض ذرکم
Adiposis Dolorosa

۹. استسقاء لحمی اور غدہ درقیہ کی رطوبت مخصوصہ کا کم ہونا
Hypothyroidism

۱۰. التهاب دماغ
Encephalitis

۱۱. التهاب دماغ غشائی
Meningo-Encephalitis

علامات |

زیر جلد اور اندرونی انسجہ میں شحم جمع ہو جانے کی وجہ سے جسم بھاری اور بے ڈول ہو جاتا ہے، مریض کو نقل و حرکت میں دشواری ہوتی ہے، معمولی ریاضت اور دوڑ بھاگ سے سانس پھولنے لگتا ہے، ہاضمہ کمزور، چہرہ بھرا یا ے اور سارا جسم پھولا ہوا ہوتا ہے۔

مریض کو دوسرے امراض کی قبولیت استعداد بڑھ جاتی ہے، قلب اور پھیپھڑے کے ارد گرد کی ساخت میں سنجی تغیرات سے ان کے افعال بھی متاثر ہو سکتے ہیں، نفرس اور عصبی امراض کی قبولیت کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے، مثور و قروح اور نار فاری کی عام شکایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ناگہانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

- ۔۔۔۔۔ نفسیاتی تدابیر اختیار کریں۔
- ۔۔۔۔۔ غذا میں کمیت، کیفیت، ہر دو اعتبار سے تخفیف کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ شیریں، مرغن غذاؤں اور شحمیات سے اجتناب کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ قلیل انتغذیہ غذائیں دیں
- ۔۔۔۔۔ عضوی اشتراک کی صورت میں اصل سبب کا ازالہ کریں۔
- ۔۔۔۔۔ دواؤں کا استعمال ناگزیر ہو تو مدرات استعمال کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ تھوک کم کرنے دلی روں سے پرہیز کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ غذا کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم کر کے پروٹین (لحمیہ) کی مقدار بڑھا دیں۔
- ۔۔۔۔۔ چہل قدمی اور معمولی ورزش کی ہدایت کریں۔

علاج |

- ۔۔۔۔۔ فولاد کا ٹکڑا گرم کر کے پانی میں بھجھا کر، اس کا پانی نوش کرائیں۔
- ۔۔۔۔۔ سندرؤس، اگرام، سنگنیس ساد ۱۲۰۵ ملی لیٹر ملا کر چند روز چٹائیں۔

• نان خواہ، بادیان، سداب، زیرہ کرمانی، ہرایک ۱۰ گرام، لک مغسول ۲۴ گرام، مرزنجوش، بورہ ارمنی، ہرایک ۳ گرام، جملہ دواؤں کو کوٹ چھان کر ۲ گرام، عرق زیرہ کرمانی کے ہمراہ نوش کرائیں۔

• کنڈرا اگر ۱۰ گرام، دن میں دوبار کھلائیں۔

• جو اکھار اگر ۱۰ گرام، دن میں دوبار کھلائیں۔

• شہد کہنہ، ۲۴ ملی لیٹر، پانی میں ملا کر نہار منہ نوش کرائیں۔

پلاگرا

PELLGRA

یہ ایک نقصی، فقدانی مرض ہے جو عام طور سے غذائیں (Nicotinic Acid) کی کمی یا فقدان کے نتیجے میں عارض ہوتا ہے نیز عاداتاً یا ضرورتاً محض مخصوص غذائیں مثلاً صرف مکی کھانے والوں میں اس مرض کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس مرض میں جلد میں خشونت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب

۱، نقص تغذیہ۔

۲، غذائیں حیاتیات ب ("Vitamin B") کی کمی یا جملہ

انواع کی کمی یا فقدان۔

۳، غذائیں لحمیہ (Protein) کی کمی یا فقدان

علامات

ابتداء میں مریض چند تعارفی علامات جیسے بھوک کی کمی، لاغری، وزن میں بندرتج کی، بدبغی، شراسیف کے آس پاس سوزش اور جلن، اختلاج، پست فشار دموی، بے کیفی، نیان، بے خوابی، درد سر اور اعصابی الجھن وغیرہ کے لیے معالج سے رجوع کرتا ہے،

اور پے تعارفی علامات عام طور سے موسم سرما میں رونما ہوتی ہیں۔
جب مرض شدت اختیار کر لیتا ہے تو التهاب جلدی اور اسہال کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔
— ارتقائی علامات کو بحیثیت عمومی تین درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱. مجری غذائی کے اختلالات

۲. جلدی اضرار

۳. اعصابی کوائف

۴. مجری غذائی کے اختلالات:-

مجری غذائی کے اختلالات کی علامات عام طور سے موسم بہار میں رونما ہوتی ہیں۔

۔۔۔ زبان:-

التهاب لسان حاد کی شکایت ہوتی ہے، لعاب کمزرت خارج ہوتا ہے،
زبان خشک اور پٹی دکھائی دیتی ہے، نوک اور کناروں پر سرخی اور دانوں کے نشانات نمایاں
ہوتے ہیں، غشاء مخاطی کے متاثر ہونے کے بعد چکنی، خشک، شیرہ سے خالی، کچے گوشت کی
مانند ہو جاتی ہے۔ التهاب فم اور قلاع تقرجی ہوتا ہے جو منہ، مسوڑھوں اور ہونٹوں
تک پھیل جاتا ہے، ہونٹ اور باجھیں سرخ اور پٹی ہوتی ہیں۔

۔۔۔ معدہ:-

متلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، شکم میں درد ہوتا ہے، غذا لینے کے
بعد نفع عارض ہوتا ہے، ابتداء میں قبض ہوتا ہے لیکن بعد میں معمولی سے ۱۰—۱۵
غیر شخی اسہال آنے لگتے ہیں، براز بدبودار اور تپلا ہوتا ہے، ذرب جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی
ہیں، مقعد و مہبل میں خارش ہوتی ہے۔

۵. جلدی التهاب (اضرار):-

جلدی التهاب کی علامات عام طور سے ابتداء موسم گرما میں رونما ہوتی ہیں۔

اور یہ التهاب و خراش اگرچہ سارے جسم میں ہوتا ہے تاہم جسم کے کھلے ہوئے حصوں اور
بعض مخصوص مقامات، جیسے ہاتھوں کی پشت، پہنچے، کہنیوں، چہرہ، گردن، گھٹنے، پیر کا
بیرونی حصہ، عجان اور زیر پشانی جلد پر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔

ابتداء میں ایک سرخ دھبہ نمودار ہوتا ہے جیسے جلد جل گئی ہو، اس میں

حرقۃ بول، قلت بول اور عورتوں میں قلت طمث کی شکایت ہوتی ہے
فشارخون تحت الطبی ہوتا ہے، انقباض قلب اور انقباض قلب ہوتا ہے،
Macrocytic / Microcytic فقر الدم ہوتا ہے،

- ۔۔۔۔۔ غذائیں تغذیہ کے عناصر کا خیال رکھیں
- ۔۔۔۔۔ ہضم کو بہتر بنائیں

- _____ مسکنات و مرطبات استعمال کرائیں
- _____ جیاتین ب کے کسی ایک یا جملہ انواع کی کمی یا فقدان کو پورا کریں۔
- _____ مقویات اعصاب استعمال کرائیں۔

علاج

- _____ درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

نسخہ ۱۔

زرشک ۸ گرام، طباشیر سفید، صندل سفید، صندل سرخ، کشنیز خشک، گل گاؤزبان، آملہ، تخم خرفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، گل سرخ، ابریشم مقرض، بہمن سفید، بہمن سرخ، دارچینی، درونج عقری، ہر ایک ۵ گرام، عود ہندی، بادرنجبویہ، ہر ایک ۵ گرام، مصطکی رومی، اشمنہ، ہیل خورد، ہر ایک ۴ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ کر دو گنا نبات سفید اور شہد خالص کے قوام ہمراہ آب سیب میں ملائیں اور اس کے بعد زعفران ۵ گرام، شگ عنبر، ہر ایک ۲ گرام کھل کر کے قوام میں شامل کریں اور ۵ گرام ہمراہ عرق گاؤزبان ۶۰ ملی لیٹر، نبات سفید ۵ گرام استعمال کرائیں۔ اس نسخہ کے ساتھ مار اللحم بھی نوش کرانا سودمند ہے۔

نسخہ ۲۔

مذکورہ بالا نسخہ کے ساتھ چرائنتہ تلخ، برادہ صندل سرخ، ہر ایک ۳ گرام کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

نسخہ ۳۔

شاہترہ ۲۵۰ گرام، پوست ہلبہ زرد ۱۲۰ گرام، پوست ہلبہ کابلہ ۸۵ گرام، پوست ہلبہ آملہ، ہر ایک ۶۰ گرام، برگ سنائے کمی ۳۰ گرام، گل سرخ ۱۸ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ کر کشمش دو گنا میں پیس کر ۱۲ گرام ہمراہ مار اللحم استعمال کرائیں۔

• _____ جیاتین ب کے مرکبات استعمال کرائیں۔

• _____ قرص فولاد پلے عدد ہمراہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا ۳ گرام استعمال کریں۔

• _____ کوکنار مسلم، تخم خشاش، مغز بادام شیریں ہر ایک ۵ گرام، زعفران

۱ گرام، نبات سفید ۵۰ گرام — کوکنار کو رات میں پانی الیڑ میں بھگوئیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان کر مغز بادام، تخم فطاش باریک پس کر ملائیں اور اسی میں نبات سفید کا قوام بنا کر آخر میں زعفران ملائیں۔ اور ۶ گرام، صبح شام کھلائیں۔

شب کوری

NIGHT BLINDNESS

یہ ایک نقصی، غذائی مرض (Deficiency Disease) ہے جو عام طور سے غذائیں حیاتیں "آ" کی کمی یا فقدان کے نتیجے میں عارض ہوتا ہے، یہ حیاتیں (Vitamin) خلیات، خاص طور سے جلد اور غشاء مخاطی کے تغذیہ میں حصہ لیتے ہیں، اس کی کمی سے جلد خشک ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جلد اور غشاء مخاطی کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، آنکھ کے بیرونی طبقات بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں قرص ہو کر سرایت کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ مادہ بصارت ناقص ہو جاتا ہے اور شب میں دیکھنے کی صلاحیت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔

اسباب

(۱) نقص تغذیہ۔

غذائیں حیاتیں "آ" ("Vitamin A") کی کمی یا فقدان،

(۲) امراض چشم۔

رطوبات چشم کی زیادتی
رطوبات چشم میں فلالط
حدوث کا چھوٹا ہونا
اعوجاج چشم

لہٰذا سے عشا اور راتوندھی بھی کہتے ہیں۔

التهاب طبقہ
آنکھوں پر تیز شعاع یا دھوپ کا پڑنا
(۱۱) معدہ و دماغ کی مشارکت
(۱۲) متعدی امراض۔
(۱۳) آتشک
(۱۴) وراثت
(۱۵) عام جسمانی کمزوری
(۱۶) بلیریاوی سمیت

علامات |

رات میں مریض کو ابتداء میں دھندلا دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد ہفتہ دو ہفتہ میں بینائی غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہے اور ۶ ماہ میں نہایت ضعیف یا ختم ہو جاتی ہے۔ ————— ملحوظ رہے کہ اس مرض میں مریض دن میں تمام چیزوں کو بآسانی دیکھتا ہے، زوالِ آفتاب کے بعد رفتہ رفتہ بینائی دھندلی ہوتی جاتی ہے اور آفتاب کے غروب ہو جانے پر بینائی کم و بیش ناکافی ہو جاتی ہے۔

اصول علاج |

۱۔ ————— غذائیں "جیاتین" "ا" ("Vitamin A") کا اہتمام کریں،
————— ملحوظ رہے کہ "جیاتین ا" کا ابتدائی ماخذ کیروٹین ہے، جو دراصل ایک زرد سرخی مائل ہائڈروکاربن ہے، یہ سبزر پودوں کی ساخت اور بحری کائی (جہاں سے یہ پھلیوں میں پمپختی ہے۔) میں پائی جاتی ہے، بعض جڑوں اور پھلوں، جیسے گاجر اور کھجور دفیہ میں بھی پائی جاتی ہے، جانوروں کی ساخت میں یہ کیروٹین ٹوٹ پھوٹ کر جیاتین "ا" بن جاتی ہے۔

علاج |

۱۔ ————— برگ سرس ۶ گرام، دہی میں ملا کر کھلائیں۔

..... کشتہ فولاد، خمیرہ گاؤ زبان منبری کھلائیں
 اطرینل صغیر / اطرینل کبیر استعمال کرائیں۔
 اطرینل زمانی، گرام ۳۰ دن کے وقفہ سے بوقت خواب ہمراہ آب نیلگرم
 استعمال کرائیں،

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱- زنجبیل کو عرق بادیاں میں گھس کر سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

نسخہ ۱- نوشادر، شب بيمانی بریاں، باریک سرمہ کی طرح پس کر آنکھوں میں لگائیں۔

نسخہ ۱- فلفل دراز، فلفل سیاہ، نمک سنگ ہم وزن _____ تمام دواؤں کو بکری کی بھٹی
 سے پانی میں کھول کر کے خشک کریں اور سرمہ کے طور پر استعمال کرائیں۔

نسخہ ۱- سنگ بھری ۲ گرام، شب بيمانی بریاں، ۱۲ گرام، نبات سفید ۲۵ گرام، عرق
 لیموں کاغذی ۵۰ ملی لیٹر میں ۸ گھنٹہ کھول کریں اور شیان بنا کر محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت
 پانی میں گھس کر آنکھوں میں لگائیں۔

نسخہ ۱- فلفل سیاہ ۲ گرام بکری کے پتے میں تین دن بھگونے کے بعد خشک کریں، زرد
 چوب ۲ گرام، آب لیموں میں بھگو کر خشک کریں، سنگ بھری ۲ مرتبہ آگ پر سرخ کر کے
 آب لیموں میں سرد کریں اور منہ زخم کوئی، غنیہ چنبیلی ہر ایک ۵۰۰ گرام _____ تمام
 دواؤں کو آب بادیاں میں خوب کھول کر کے آنکھوں میں لگائیں۔

اسکریوٹ

SCURVY

عموماً غذا میں حیاتی "ج" "Vitamin C" کی کمی یا فقدان کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے، اس میں وہ مخصوص مادہ جو ایف، دانت، فشارین اور ہڈیوں میں ان کے اجزاء کو چپکانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس مخصوص حیاتی کی کمی یا فقدان کی وجہ سے اپنی توبہی صلاحیت (افراز) کھودیتا ہے، جس کے نتیجے میں زخموں کے اندام، ہڈیوں کے اتصال اور نشوونما میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے، اور ہڈیوں کے مقام اتصال پر ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ دانت بد وضع ہو جاتے ہیں، اور عروق دمو یہ میں الصاقی مادہ کی کمی کی وجہ سے اس کی Permeability میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جریبان الدم ہونے لگتا ہے۔ یہ مرض ہر جنس اور ہر عمر میں ہو سکتا ہے تاہم، ماہ تا ۲ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام |

اسکریوٹ

اسکریوٹ غیر رضیعی

اسکریوٹ رضیعی

اسباب |

۱. نقص تغذیہ :-

غذائی حیاتی "ج" "Vitamin C" کی کمی یا فقدان اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً غذا میں تازہ اور مہری ترکاری، گوشت کی کمی یا فقدان، یہ صورت بحری سفر میں کثیر الوقوع ہے، مصنوعی دھک استعمال،

۲. سورہمغم

۳. متعدی امراض

علامات |

۱. اسکریوٹ رضیعی Infantile Scurvy

یہ مرض غیر محسوس طور پر بڑھتا ہے اس لیے اس کی علامات بھی غیر محسوس طور پر نمودار ہوتی ہیں، حصار فی علامات کے طور پر ابتدا میں کچھ بے پروا، سست اور خاموش رہتا ہے اس کے بعد فالج کا ذب کی سی کیفیت پیدا ہو جانے کی وجہ سے، کپڑا تبدیل کرنے اور نہلانے کے لیے جب ہاتھ پیر اٹھانے کی نوبت آتی ہے تو پتھر رونے اور چلانے لگتا ہے، کمزوری کا احساس اکثر نہیں ہوتا لیکن عضلات غیر معمولی طور پر لاغر ہو جاتے ہیں، جسم کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ فقر الدم نمایاں طور سے ہوتا ہے، کچھ چڑچڑے پن اور وحشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سرعت تنفس ہوتا ہے، غضروف سے متصل پسلیوں کا سراسر قریب چوڑا ہو جاتا ہے،

شدید نوز ہوتا ہے جو اوپر سے دکھائی بھی دیتا ہے، جلد یا مدقہ (Orbit) میں بھی نوز ہوتا ہے، اگر دانت نکل آئے ہوں تو مسوڑھوں سے بھی نوز ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت

۱۰۲ ف تک ہوتا ہے، قلت الدم کی وجہ سے مخ العظام (Bone Marrow)

پر مضر اثرات کی وجہ سے فقر الدم ثانوی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

عظام طوال کے کسرے میں Osteoprosis کی کیفیت پائی جاتی ہے، ہڈی کے کنارے پر تکلس Calcification کے سبب ایک مخصوص قسم کی

گہری، محول لائن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ Porefication کی ایک باریک

Sub-Ephiphyseal لائن ہوتی ہے جو بنیٹا کم گہری ہوتی ہے اور ہڈی کے تسلسل

کو ختم اور ہڈی کے کنارے کو علیحدہ کرتی ہے، تکلس Calcification

کی گہری لائن بعض اوقات ہڈی کے جسم کے کناروں سے بھی بنیاد زکرجاتی ہے اور کانٹے

Spur کی شکل بناتی ہے، جب اندمال شروع ہوتا ہے تو Sub-Periosteal

نوز میں بھی تکلس Calcification ہوتا ہے جس سے ایک عجیب شکل بنتی ہے

جو ہڈی کے جسم کی پوری لمبائی میں پھیلی ہوتی ہے، لیکن آخر میں اس Calcified

ہونے والے مادے میں عمل انجذاب شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد کوئی فراہمی

Deformity باقی نہیں رہ جاتی۔

۱۰، اسکر لوبو غیر رضیعی :-

تعارفی علامات کے ظاہر ہونے کے لیے ۴-۸ ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے اور یہ علامات، اسکر بوط رضیعی سے مشابہ ہوتی ہیں، مریض کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، جوارح اور پسلیوں میں درد ہوتا ہے، ہفتہ عشرہ بعد زیریں جوارح اور جسم کے دوسرے حصوں کی جلد پر نمش Mother's Mark نمودار ہوتے ہیں اور عام طور سے ہرنزف بال کے قاعدے کے گرد واقع ہوتا ہے، اور بعض نمش تشدد سے پیدا ہونے والی گزند سے مشابہ ہوتے ہیں، بڑے، ابھرے ہوئے ددڑے یا تحت الجلد خطی کمات بھی موجود ہو سکتے ہیں، یہ مختلف نزفات سارے جسم پر ہوتے ہیں۔

اسکر بوط کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ سوڑھے متورم، لحمی یا اسفنجی ہو کر دانتوں سے جلیں ہو جاتے ہیں، اور نیلے، سرخ، ڈھیلے تودوں کی شکل میں دانتوں سے آٹھے ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ تودے دردناک ہوتے ہیں اور ذرا سا چھو جانے سے ان سے خون نکلنے لگتا ہے، دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مریض کوئی چیز چبا نہیں سکتا، تنفس میں بہ بو ہوتی ہے، بعض اوقات سوڑھے متورم ہو کر لبوں سے باہر ابھرنے لگتے ہیں اور ان میں تفسر بھی ہوتا ہے، منہ کا باقی حصہ اس قدر متاثر نہیں ہوتا، زبان بڑی ہو جاتی ہے اور اس پر دندانے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات سوڑھے، اسفنجی نہیں ہوتے بلکہ ان کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے،

ان تمام تغیرات کے ظاہر ہو جانے پر مریض کا چہرہ پھیکا اور متورم ہو جاتا ہے، شدید محنت و مشقت سے سرعت تنفس عارض ہوتا ہے تاہم پھیپھڑوں میں کوئی غیر معمولی علامت نہیں پائی جاتی، نوبتی طور پر متلی ہوتی ہے، دماغی محنت دشوار ہو جاتی ہے، پیروں میں اوزیمائی کیفیت ہوتی ہے، عام طور سے پیشاب میں رطوبت بیضہ خارج نہیں ہوتی بلکہ کریات حمر ملتے ہیں۔

ثون کی نوعیت فقر الدم ثانوی جیسی ہوتی ہے، اس میں خفیف بوقلمو خلویت، متعدد الوان پسندی اور منقط اساس پسند خلویت ہوتی ہے، خفیف ایض خلویت کا موجود ہونا بھی ممکن ہے۔ کریات حمر کم ہو جاتے ہیں۔

اسکر بوط اور فرورہ کی علامتوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے ذیل میں ان کی تفریق

علامات درج کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

فرفرہ	اسکر یوط
۱۔ جریان الدم آزاد سطح تک محدود ہوتا ہے۔	۱۔ جریان الدم محض آزاد سطح تک محدود نہیں ہوتا۔
۲۔ مرض کی مدت مختصر ہوتی ہے۔	۲۔ مرض کی مدت طویل ہوتی ہے،
۳۔ نقص تغذیہ کی سرگزشت نہیں ہوتی۔	۳۔ نقص تغذیہ کی سرگزشت طئی ہے،
۴۔ اذیما نہیں ہوتا۔	۴۔ اذیما بہت نمایاں ہوتا ہے،
۵۔ عضلات متورم نہیں ہوتے۔	۵۔ عضلات بہت متورم ہوتے ہیں،
۶۔ اضمحلال اور افسردگی نہیں ہوتی۔	۶۔ اضمحلال اور افسردگی بہت نمایاں ہوتی ہے،
۷۔ مسوڑھے طبی ہوتے ہیں،	۷۔ مسوڑھے اسفنجی ہوتے ہیں۔
۸۔ ایک ہی فرد مبتلا ہوتا ہے۔	۸۔ ایک ہی کنبہ کے متعدد افراد مبتلا ہو سکتے ہیں۔
۹۔ غذائی علاج سے شفا یابی نہیں ہوتی۔	۹۔ غذائی علاج سے بھی شفا یابی ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

- ۱۔ جیاتین ج کا خاص طور پر مقدار جسم میں پہنچائیں۔
- ۲۔ مسوڑھوں میں مرض کی صورت میں قابض سنونات استعمال کرائیں۔
- ۳۔ تبدیلی مزاج کریں
- ۴۔ اعضاء رئیہ، خصوصاً کبد کی تقویت کی تدابیر کریں۔

علاج

- ۱۔ بہدان، خاکسی، فتاب کو جوش دے کر نوش کرائیں۔
- ۲۔ یہ نسخہ جات بھی مفید ہیں۔

نسخہ ۱۔ آملہ ۱۰۰ گرام، شکر سفید اکلو گرام، ————— آملہ کو دودھ میں ۲۴ گھنٹے تک بھگوئیں اس کے بعد آملہ کو پانی سے دھو کر دوسرے پانی میں جوش دیں، لی چھان کر اسی پانی میں شکر کا توام بنا کر، ————— ۹ گرام ہمراہ عرق کا دزیاں صبح، شام کھلائیں۔

نسخہ ۲۔ کشتہ فولاد ۳۵ ————— ۱۲۵ ملی گرام ہمراہ جوارش جالبینوس، گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۳۔ کشتہ جٹ الہدیہ ۱۲۵ ————— ۳۵۰ ملی گرام ہمراہ دوار المسک گرام استعمال کرائیں۔

نسخہ ۴۔ انوشدارو سادہ، گرام، کشتہ نقرہ ۳۵ ملی گرام، ہمراہ عرق بادیان ۵، ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

قابضات کے طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔
آس، عدس، طباشیر، سماق، اتاقیا، مازو وغیرہ۔

لین العظام

OSTEOMALACIA

یہ ایک نقصی، فقدانی مرض
حیاتین "د" کی کمی یا فقدان کے نتیجہ میں عارض ہوتا ہے۔ ————— یہ مرض بالغوں
بالخصوص عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب |

۱۔ نقص تغذیہ ۱۔

فذا میں کیلشیم اور حیاتین "د" ("Vitamin D") کی کمی
یا فقدان ————— روٹی/ترکاری، آٹے اور شکر کی قلیل مقدار پر گزار بسر

۱۱. رہائشی نقص :-

ایسے مکان میں رہائش، جہاں براہ راست سورج کی شعاعوں

اور روشنی کا گزرنہ ہو،

۱۲. تاخیر پذیر کساحت (Late Reckets) :-

تاخیر پذیر کساحت (جو عام طور سے ۱۲ — ۱۴ سال کی عمر میں ہوتی ہے)

کا لینت عظام میں منتقل ہو جانا۔

۱۳. حمل :-

دوران حمل بعض حیاتیات کی قلت یا فقدان

۱۴. سیلان دہنی اسہال دسمی Steatorrhea

۱۵. کبدی صفراوی Hepatobiliary

۱۶. مزمن انحطاط کلیہ

Dystrophic Disease

علامات |

نظنی، عجزی خطے کوٹھے اور نیچے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے

جو عمود الفقار اور اضلاع میں پھیل جاتا ہے، بعض اوقات بالائی حوارج بھی متاثر ہو جاتے

ہیں، ہڈیاں دردناک ہو جاتی ہیں، حرکت کرنے پر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، چال اکثری

ہوتی اور سطح کی مانند ہوتی ہے، مریض ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، ماندگی ہوتی

ہے، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، عمود الفقرات کے گول ہو جانے یا حوارج کے جھک جانے

کی وجہ سے قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد کسی ظاہری سبب کے بغیر یا معمولی زور پڑنے

سے ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، عام طور سے یہ کسر محض ناقص طور پر مندمل ہوتا ہے۔ بالآخر

دوسری ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، لمبی ہڈیاں غیر معمولی طور پر نرم پذیر سی ظاہر کرتی ہیں، چنانچہ

وہ نہایت عجیب و غریب وضعوں میں خمیدہ ہو سکتی ہیں، ان ہڈیوں کے بالائی سروں میں

انگلی گڑائی جاسکتی ہے، پسلیوں کی نرمی کی وجہ سے سینہ گولی ہو سکتا ہے جس کے سبب

بہر ہو سکتا ہے، نساذ حالات میں کھوپڑی کی ہڈیاں نرم ہو سکتی ہیں، کزاز بھی واقع ہو سکتا

مرض کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ اور مرض عموماً ۵۔۱۰ سال پر محیط ہوتا ہے۔

لیں العظام کے باعث تنفس میں دشواری ہو کر خستگی پیدا ہو جاتی ہے، شعبی ذات الریہ کے باعث موت واقع ہو سکتی ہے، بعض اوقات وضع حمل کے دوران ٹیڑھے، (منقادار) حوض میں جنین کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
• جسم میں جراثیم دمی رسد کا نظم کریں
• رہائش کی بہتری کی تدابیر کریں۔
• جگر کی اصلاح کریں۔

علاج |

- ۱۔ جیاتین دکی رسد کا نظم کریں مثلاً دھوپ میں بٹھائیں۔
۲۔ چوزہ مرغ، کسوتر کے بچے کی ہڈیوں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
۳۔ کیلشیم کھلائیں۔
۴۔ ترہندی منق، مویز منق، انار شیریں، ہرایک ۲۵۰ گرام، ترہندی اور مویز منق کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر بالکل مرہم جیسا بنائیں اور انار دانوں کو دبیز کپڑے میں دبا کر نچوڑ لیں، اور اسی میں قند سفید ۲۵۰ گرام، ملا کر قوام بنائیں، اور ترہندی و مویز منق کو اس میں ملائیں نیز آب لیموں کا غدی، آب انار ترش اس قوام کی تیاری کے دوران چھڑکیں جب قوام تیار ہونے کو آئے تو برگ رسیاں ۶ گرام، برگ پودینہ ۱۲ گرام، فلفل سیاہ، زنجبیل، تیج، قزفل، جوز بوا، عود خام، مہل خور دو کلاں، ہرایک ۵ گرام کو باریک پس کر قوام میں شامل کریں اس کے بعد مشک ۱ گرام، عرق کلاب میں حل کر کے ملائیں اور ۵—۹ گرام سمراہ عرق کا دوز بان استعمال کرائیں۔

• سنبل الطیب، پیل خورد، جج، دارچینی، خولنجان، قرفل، سعد کوفی، زنجبیل، فلفل سیاہ، فلفل دراز، قسط، غودلساں، اسارون، تخم مورد، قصب الزریرہ، زعفران، ہر ایک ۲۵ گرام، مصطکی رومی ۶۰ گرام، نبات سفید ہم وزن جملہ ادویہ، شہد خالص دو گنا۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھانک کر نبات سفید اور شہد خالص کے قوام میں ملا کر جوارش تیار کریں اور، ۱۲ گرام پچھلے غذا صبح، شام ہمراہ برق بادیاں یا عرق کاؤزبان استعمال کریں۔

بیری بیری


BERI-BERI

یہ ایک نقصی، فقدانی مرض ہے جو عام طور سے غذا میں جیاتین ب۱ ("Vitamin B1") کی کمی یا فقدان کی وجہ سے عارض ہوتا ہے، یہ جیاتین اعصاب کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، چنانچہ اس کی کمی یا فقدان کے نتیجہ میں محیطی اعصاب (Peripheral Nerves) اور عصب تامہ میں التهاب ہوتا ہے نیز عضلات کی اعصابی پرورش کے نظام میں فتور واقع ہونے کے سبب ان میں بھی تخی فساد واقع ہوتا ہے۔

انقسام

بیری بیری

Beri-Beri



اسباب |

نقص تغذیہ :-

غذائیں حیاتی ب ("Vitamin B1") کی کمی یا فقدان ،

(۱) عمل انجذاب میں فتور :-

تے ، دست وغیرہ

(۲) حاجت غذا کا بڑھ جانا

(۳) ورم امعاء

(۴) طبعی افعال کی زیادتی (جسمانی محنت و مشقت کی زیادتی)

(۵) حمل و رضاعت کے اثرات

(۶) حمیات

(۷) زیا بیطس

(۸) الکوحلی تسم (Alcoholism)

علامات |

۱. عمومی :-

حیاتی ب کی کمی یا فقدان کے نتیجے میں ۸۔ ۹ دن میں مرضی علامات

رو نما ہوتی ہیں ، علامات کا آغاز بطلان اشتہار (Anorexia Nervosa)

غفلت ، (Listlessness) ، چڑچڑاپن (Irritability) ، نفی

اور قبض سے ہوتا ہے ، اور بعد میں یہ علامات کثیر عصبی التهاب (Multiple

Neuritis) کی صورت اختیار کر لیتی ہیں ، عضلات میں درد ' Paraesthesia

اور Peripheral Neuritis ، بھی ہوتا ہے ،

(۲) بیری بیری خفیف :-

۱. رطب :-

علامات کا آغاز عام طور سے غیر محسوس طور پر ہوتا ہے ، دفعتاً بھی ہو سکتا

ہے، اطراف و جوارح میں بھاری پن، ضعف اور معمولی خدر کے ساتھ پٹھریوں میں درد ہوتا ہے اور کسکندگی کی عام حالت پائی جاتی ہے، عروق دموئیہ قلب، خاص طور سے دایاں اذنی حصہ متاثر ہوتا ہے، جگر، گردے اور امعاء پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اعصابی تحلیل کی وجہ سے پیروں میں کمزوری، رباطی رد عمل میں کمی اور المنا کی پائی جاتی ہے، تہیج کے ساتھ عضلاتی تحلیل نمایاں ہوتا ہے، عسر تنفس، اختلاج اور اتساع قلب ہوتا ہے، عظم قلب بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑے اور جگر میں اجتماع رطوبات ہوتا ہے، نبض لین، سریع اور صغیر ہوتی ہے، لمس حار اور چمکدار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان علامات کے بعد عام طور سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

دب، یا بس۔

عوارض میں شدت کے ساتھ ساتھ ضعف قوت اور عضلاتی ذبول نمایاں ہوتا ہے، یہ پیروں کے سامنے عضلات باسطہ میں شروع ہو کر دوسرے عضلات نیز ران کے عضلات کو مآؤف کر دیتا ہے، بعد میں ہاتھ کے عضلات باسطہ، عضلات ذوالراسین اور بعض عضلات شکم، دیا فرغا اور عضلات بین الاضلاع بھی مآؤف ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ گھٹنوں کی حرکت انعکاسی بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد عوارض میں کمی آکر رد عمل ختم ہو جاتا ہے اور گھٹنوں کے نیچے کا احساس تقریباً ازل ہو جاتا ہے، مریض پورے طور پر کھڑا نہیں ہو پاتا، ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے بالآخر مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے اور اعصاب باصرہ کے متاثر ہونے کے سبب بینائی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔

(iii) بیری بیری ر ضعیعی :-

بچوں میں اس مرض کا حملہ نہایت تیزی سے ہوتا ہے، عسر تنفس، تھکے، قبض اور بے چینی ہوتی ہے، تہیج بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ قلب کی رقتاری منٹ ۲۰۰ تک ہو جاتی ہے، دماغ پر تہیج کی وجہ سے جسم میں کھنکھناتی، تشنجی اور کزاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات ذات الریہ ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

نقص تغذیہ، خاص طور سے پالش کیا ہوا چاول کھانے والوں پر اور مشرقی لوگوں میں یہ علامات رونما ہوں تو بیری بیری کا شبہ کیا جاسکتا ہے، سرگزشت

میں گزشتہ تین ماہ سے غذائیں جیاتین ب کی کمی یا فقدان کا ذکر ہوگا۔

اصول علاج |

- غذائی نقص کو دور کریں
- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں
- جیاتین ب کی کمی کو دور کریں
- حقنہ دیں۔

علاج |

- بیضہ مرغ نیمبرست اعدہ ہمراہ دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر، صبح، دوپہر، شام کھلائیں،
 - جیاتین ب کے مرکبات استعمال کرائیں۔
 - درج ذیل نسخہ جات بھی مجرب ہیں،
- نسخہ ۱۔

گاؤزبان ۳۶ گرام، گل گاؤزبان، کشیز خشک، ابریشم خام مقرض، بہمن سرخ، بہمن سفید، صندل سفید، تخم بالنگو، تخم فرنجشک، بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو پانی ۲ لیٹر، میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر لچھان کر اسی میں نبات سفید اگلو گرام اور شہد خالص ۲۵ گرام کا قوام بنائیں، اور صبح کو ۱۲ گرام ہمراہ عرق گاؤزبان ۳۵ ملی لیٹر استعمال کریں۔

نسخہ ۲۔ برگ بادرنجبویہ ۲۵ گرام، بہمن سرخ، بہمن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، تخم بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۲ گرام، تخم خرفہ، گل گاؤزبان ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق بید مشک، ہر ایک الیٹر میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر لچھان کر اس میں قند سفید ۲ گلو گرام کا قوام بنائیں اور آخر میں زہر مہرہ ۲۵ گرام، مروارید، زعفران، عنبر، مشک ہر ایک ۱۲ گرام، کہ کھڑے اسی قوام میں ملائیں اور ۳ گرام ہمراہ عرق بادبان استعمال کرائیں۔

مصادر

Learn Unani By Abdul Waris Salman

مصادر

- _____ ابن زہر، عبد الملک / غوری شبیر احمد، ندوی حکیم عطار الرحمن، نفع اللہ،
حکیم محمد قاسمی، حکیم حمید الاسلام، کتاب التیسیر فی المداوۃ والتدبیر،
مرکزی کونسل برائے تحقیقات طب یونانی
پنج شیل ٹناینگ سنٹر
نئی دہلی ۱۹۸۶ء
- _____ ابن سینا، ابوعلی بن الحسین، القانون فی الطب (الجزء الثانی)،
مطبع عامرہ مصر،
- _____ ابن ماسویہ، ابو زکریا یوحنا، کتاب المشجر (مخطوطہ)
خدا بخش لائبریری، پٹنہ،
- _____ الرازی، ابو بکر محمد بن زکریا، الحاوی الکبیر فی الطب (الجزء الخامس)،
مجلس دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن (ہندوستان)، ۱۹۷۹ء
الحاوی الکبیر فی الطب (الجزء السادس)
- _____ مجلس مطبع دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن (ہندوستان)، ۱۹۷۹ء
الحاوی الکبیر فی الطب (الجزء السابع)
- _____ مجلس مطبع دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن، ۱۹۵۸ء
الحاوی الکبیر فی الطب (الجزء الثامن)
- _____ مجلس مطبع دائرة المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۹۵۹ء

- الحادی الكبير فی الطب (المجزر العاشر)
مجلس مطبع دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد دکن ۱۹۶۱ء
- الحادی الكبير فی الطب (المجزر الحادی عشر)
مجلس دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد دکن ۱۹۶۲ء
- _____ الجرجانی، سید اسماعیل / عابد حسین، حکیم سید، ذخیرہ خوارزم شاہی
(جلد ششم) مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ،
- _____ ارزانی، محمد اکبر / کبیر الدین حکیم محمد، میزان الطب
دفتر المص، قزول بانہ، دہلی ۱۹۳۷ء
- _____ طب اکبر،
مطبع منشی گلاب سنگھ، لکھنؤ ۱۸۹۷ء
- _____ المجوسی، ابوالحسن علی بن العباس / کنٹوری، غلام حسین، کمال الضاعہ
المجلد الاول والثانی،
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ،
- _____ القفزی، ابو منصور الحسن بن نوح، فنی منی۔
- _____ اعظم خان، حکیم محمد، اکسیر اعظم (حصہ دوم)
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ، ۱۹۰۶ء
- _____ اکسیر اعظم (حصہ سوم)
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ۔
- _____ اردہوی، حکیم سید احمد سعید، التشخیص الکمال (المقالات الثلاثہ عشر)
مطبع سفیر دکن / معلم شفیق، حیدرآباد۔
- _____ اجل خان، میر ملک حکیم حافظ محمد، حاذق
یونین پرنٹنگ پریس، دہلی ۱۹۷۱ء
- _____ عبدالحکیم، حکیم محمد، خزینتہ العلاج (جلد اول)
مطبع مجتہائی، لکھنؤ ۱۹۰۹ء

خزینۃ العلاج (جلد دوم)

مطبع مجتبیٰ، لکھنؤ، ۱۹۰۹ء

۱. ————— جامعی، حکیم محمد شریف، ماہیت الامراض (حصہ اول)

مجلس ترقی ادب، لاہور، پاکستان ۱۹۶۳ء

۲. ————— جیلانی، حکیم غلام، مخزن حکمت،

ایم، جے پبلیکیشنز، نئی دہلی، ۱۹۵۷ء

۳. ————— سعید، حکیم محمد، تجربات طبیب،

ہمدرد اکیڈمی، کراچی، پاکستان۔ ۱۹۸۳ء

معمولات مطب

ہمدرد فاؤنڈیشن پریس کراچی/ ماس پرنٹرس، کراچی ۱۹۸۵ء

۴. ————— شریف، حکیم محمد، مفتاح الحکمت موسوم بہ کتاب العلاج (جلد اول)

دفتر الحکیم و رفیق اطباء لاہور، ۱۹۳۱ء

۵. ————— شریف خان، حکیم محمد، علاج الامراض

مطبع مجتبیٰ، دہلی ۱۹۰۳ء

۶. ————— صادق حسین، ڈاکٹر، کامل التشخیص

قومی طبی کونسل پاکستان لاہور پاکستان ۱۹۸۱ء

۷. ————— کبیر الدین، حکیم محمد، بیاض کبیر (حصہ اول)

ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منزل، بل روڈ، پاکستان

بیاض کبیر (حصہ دوم)

۸. دفتر المسیح، بازار نور الامراء، حیدرآباد دکن، ۱۹۵۴ء

ترجمہ کبیر (حصہ دوم)

۹. دفتر المسیح، بازار نور الامراء، حیدرآباد دکن ۱۹۴۹ء

ترجمہ کبیر (حصہ سوم)

۱۰. اسلامی پریس/ دفتر المسیح، بازار نور الامراء، حیدرآباد دکن ۱۹۵۰ء

جید پریس، بلی ماران دہلی ۱۹۲۴ء

.....۔ نذیر الدین احمد، حکیم، فروق الامراض

محبوب المطابع برقی پریس، دہلی ۱۹۳۸ء

_____ ہمدانی۔ حکیم سید کمال الدین حسین، تشریح الاحشاء (جلد دوم)،

ترقی اور دیسور، نئی دہلی ۱۹۸۷ء

_____، نگرامی، حکیم سید محمد حسان، سریریات

سبلع نظامی، لکھنؤ۔

Golwalla, A.F. Medicine for Students

India Printing Works, 9 Nagindas Master Road Extension 1, Fort
Bombay-1975.

John Macleod, Davidson's Principles and Practice of Medicine.

— — — — — Batra, Neelam, Clinical Pathology for Students
— — — — — as Publishing House, Ghaziabad.

• ————— Weather All D.T. Ledingham J.G.G.,

Warrell D A., *Textbook of Medicine*

IBS Oxford University Press-1985.

ہماری مطبوعات

۱۳/=	۳۷۶	خواجہ غلام الیہ دین	آندھی میں چراغ
۲۱/=	۳۳۶	پروفیسر رشید الدین خاں	ابوالکلام آزاد شخصیت: سیاست
			پیغام۔
۵۸/=	۶۸۸	مرتب پروفیسر رشید الدین خاں	ابوالکلام آزاد۔ ایک ہمہ گیر شخصیت
۲۲ =	۲۵۴	ڈاکٹر محمد یعقوب عامر	اردو کے ابتدائی ادبی معرکے
			ابتداء سے عہد مرزا و میر تک
			اردو کے ادبی معرکے میر سے انشا
۳۰/=	۴۴۸	ڈاکٹر محمد یعقوب عامر	مکرم فاضل کے ساتھ (دوسرا ایڈیشن)
		احسان حسین	اردو کی کہانی
۳۰/=	۲۴۰	ڈاکٹر مسعود ہاشمی	اردو لغت نگاری کا تنقیدی جائزہ
۱۱/=	۱۷۲	ڈاکٹر سلامت اللہ خاں	ازبیکسٹ، ہیمنگوائے حیات و فن کا
			تنقیدی مطالعہ (دوسرا ایڈیشن)
۹/۵۰	۱۹۲	ڈاکٹر سلامت اللہ خاں	امریکی ادب کا مختصر جائزہ
۱۵/۷	۲۵۵	مرتب ڈاکٹر حامد کاشمیری	انتخاب غزلیات میر
۹/=	۹۱	مرتب ڈاکٹر فضل امام	انتخاب کلام حسرت
۲۸/= ۳۵۰		محمد طہر علی / امین الدین	اورنگ زیب کے عہد میں مغل امراء
۱۳/= ۱۹۹		میکاولی / ڈاکٹر محمود حسین	بادشاہ
۳۶/= ۲۰۸		محمد محمود فیض آبادی	برطانیہ کا دستور اور نظام حکومت
۱۰/= ۱۸۹		مرزا ابوطالب / ڈاکٹر ثروت علی	تاریخ آصفی
۱۰/۵۰ ۱۳۰		عائشہ بیگم	تاریخ اور ساجیات

Learn Unani By Abdul Waris Salman

معالجات

جلد سوم

(حمیات، حمیات خلطیہ و امراض متعدی)

وسیم احمد اعظمی



فوق نشانی در فروع ایریز بنانی

Learn Unani By Abdul Waris Salman



معالجات

جلد سوم

(حمیات، حمیات خلطیہ و امراض متعدی)

Learn Urdu By Abdul Waris Salman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

معالجات

جلد سوم

(حمیات، حمیات ظلطیہ و امراض متعدی)

وسیم احمد اعظمی



وزارت صحت و ترقی انسانى وسائل، حکومت ہند

وزارت ترقی انسانى وسائل، حکومت ہند

فروغ اردو بھون، FC-33/9، انسٹی ٹیوٹل ایریا، جسرہ، نئی دہلی۔ 110025

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

پہلی اشاعت : 1992

تیسری طباعت : 2015

تعداد : 1100

قیمت : -/613 روپے (سیٹ)

سلسلہ مطبوعات : 714

Moalijat Vol. III

By

Wasim Ahmad Azmi

ISBN : 978-81-7587-754-3

978-81-7587-756-6 (Set)

ناشر: ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، فروغ اردو بھون، FC-33/9، انسٹی ٹیوشنل ایریا،

جسولہ، نئی دہلی 110025، فون نمبر: 49539000، فیکس: 49539099

شعبہ فروخت: ویسٹ بلاک 8 آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی 110066

فون نمبر: 26109746، فیکس: 26108159

ای۔ میل: urducouncil@gmail.com، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in

طابع: جے۔ کے۔ آفسیٹ پرنٹرز، گلگڑھیا، بازار میاں محل، جامع مسجد دہلی 110 006

اس کتاب کی چھپائی میں (Top) Maplitho, TNPL 70GSM کاغذ استعمال کیا گیا ہے۔

پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دو خدا داد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے اُن اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے دہنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مخفی عوامل سے آگہی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبروں کے علاوہ، خدا رسیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشکیل و تعمیر سے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر وسیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کا فن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر چھپائی کا فن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقہ اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی زبان ہے، بلکہ اس کے سمجھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور

غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یہ امر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپنی تشکیل کے بعد قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قارئین نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے اب ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا پروگرام شروع کیا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔


اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گی کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خالی رہ گئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین

ڈائریکٹر

تہدیہ

خسر محترم جناب حکیم مولوی عبدالحفیظ اعظمی مرحوم کی نذر!
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے — آمین!
وسیم احمد اعظمی



فہرست

xiv

ابتدائیہ

1

حمیات

4

عقونٹ، مستوقد عقونٹ

7

حمی کی اساسی اقسام

18

حمی کی تقسیم درجہ حرارت کے اعتبار سے

20

حمی کے درجات

23

بحران، اقسام بحران — انجام مرض

30

حمی کے لازمی عوارض اور ان کا تدارک

43

حمی یوم کا دوسرے حمی میں منتقل ہونا

47

حمی کے ساتھ دوسرے امراض کی شرکت

49	حمی میں موت
51	انتقاص حرارت
53	حمی کا عام اصول علاج
60	حمیات حادثہ کا اصول علاج
63	تشخیص مزاج
65	تشخیص نہ ہونے کی صورت میں علاج
67	ادویہ حمی کی نوعیت عمل اور فلسفہ علاج
71	حمی عفونیہ میں سرد پانی
73	احکام غذا
77	مریض کا مسکن اور تیمارداری
79	حمیات یوم
82	حمی یوم غمیہ
85	حمی یوم فریہ
87	حمی یوم سہریہ
90	حمی یوم فکریہ
92	حمی یوم فزعیہ
94	حمی یوم غضبیہ
96	حمی یوم ہمیہ
99	حمی یوم تخمیہ
102	حمی یوم قشعیہ
104	حمی یوم جوعیہ
106	حمی یوم عطشیہ

108	حمی یوم سردید
111	حمی یوم درمیہ
115	حمی یوم نومیہ
117	حمی یوم استغفرانیہ
120	حمی یوم وجعیہ
122	حمی یوم غشیہ
125	حمی یوم تعبیہ
127	حمی یوم استحصانیہ
129	حمی یوم شرابیہ
132	حمی یوم غذائیہ / دوائیہ
134	حمی یوم حریہ
137	حمی یوم نزلیہ و زکامیہ

139 حمیات خلطیہ

140	حمیات دموئیہ
141	سوزخس
143	حمیات صفراویہ
145	حمی محرقة
150	حمیات بلغمیہ
152	حمی لثقہ

157	حمی مواظبہ
165	سادہ لرزہ
167	ایفیا لوس
169	حمیات سوداویہ
171	حمی ربع دائرہ
171	حمی ربع لازمہ
179	حمیات ثقلطہ و مرکبہ
180	غلب غیر خالص
185	حمی غشیہ
191	لیفوریہ
195	دق شیخونت
199	حمی دق
205	حمی درمیہ

212 امراض متعدی

213	تعدیہ — ایک جائزہ
218	سوفوس عفونی
223	حمی مطبقہ متزانندہ
230	حمی معویہ
244	غلب دائرہ

251	غلب لازمہ
259	شطر الغلب
266	حمی صدیدیہ
274	حمی نفاسیہ
279	حمی خندقیہ
283	حمی لذع الففار
287	حمی بول اسود
2۹۱	حمی سکتیہ
294	حمی متوجہ
301	حمی بے بس کولائی
304	حمی مصرانیہ
307	حمی قرادیہ
310	حمی دماغی نخاعی
320	حمی اجامیہ (ملیریا بخار)
330	حمی تکیہ (حمی راجعہ)
337	حمی قرمزیه
346	حمی اصفر
354	حمی غدویہ
357	حمی دنج
363	کزاز
370	مرض النوم
375	داء الکلب

380	انف العزہ
390	التهاب غده تليف
396	خناق وبائی
405	وجع الحلق
408	شہقیہ
415	زحیر
431	ہیضہ
446	دق
460	جدری
482	صب
491	حمیقہ
495	حمیراء
499	کالا آزار
506	طاعون
517	خنازیہ
522	توشہ
526	جرۃ
530	حمرہ (سرخبادہ)
540	آتکک
554	سوزاک
561	عارضہ نقصان مناعت (ایڈز)
565	جذام
572	مصادر

ابتدائیہ

ہمارے دور طالب علمی میں طب کی نصابی کتابوں کا حصول ایک دشوار گزار عمل تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اگر چند کتابیں حاصل بھی ہو جاتیں تو مباحث کے اختصار یا غیر ضروری طوالت کا شکوہ بہر حال رہتا۔ الحمد للہ حالیہ چند سالوں میں جہاں یونانی طب کے مختلف شعبوں میں تحقیق و جستجو کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے وہیں اطباء میں نصابی کتابوں کی تالیف و تدوین کا احساس بھی بیدار ہوا ہے۔ ریاستی اردو اکیڈمیوں اور ترقی اردو بیورو دہلی وغیرہ کے تعاون سے بیش قیمت کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ خدا کرے وہ دور جلد آئے جب یونانی طب کے طالب علموں کے لیے نصابی کتابوں کا حصول کوئی مسئلہ نہ رہے، بلکہ یہ لوگ بھی دوسرے ہم عصر طریقہ ہائے علاج کے طالب علموں کی طرح نصابی کتابوں میں ”انتخاب“ کی لذت سے آشنا ہوں۔ معالجات کی تالیف میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔

یہ کتاب چوں کہ انڈرگریجویٹ طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے ان کے ذہنی رویوں اور علمی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امکانی حد تک آسان اور عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے اور تفصیلی سہولتوں کے لیے ضروری جدول بھی دیے گئے ہیں۔ ماہیت مرض، اسباب، علامات اور اصول علاج کو عصری اسلوب میں تحریر کیا گیا ہے اور جدید طریقہ علاج

کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے تاہم علاج کے ذیل میں صرف یونانی طریقہ علاج تحریر کیا گیا ہے کہ یہ فطرت اور طبیعت سے زیادہ قریب ہے۔

مباحث کی ترتیب کے بعض مراحل میں اطباء قدیم کی روش سے انحراف کیا گیا ہے کہ مگر مباحث سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھا، تاہم بعض مقامات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اطباء قدیم کی روش اختیار کی گئی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔

لوازم کی فراہمی اور زبان و بیان میں اگرچہ احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ تاہم انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جلدی محسوس نہیں کر پاتا۔ اس لیے حاملین فن سے گزارش ہے کہ وہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعتوں میں ان کا ازالہ کیا جاسکے اور کتاب کو مزید کارآمد بنایا جاسکے۔

میں ان اطباء کا انتہائی ممنون ہوں، جن کی بیش بہا کتابوں سے اس کتاب کی تیاری میں مدد ملی گئی ہے۔ بالخصوص حکیم محمد کبیر الدین مرحوم، جو برصغیر میں یونانی طب کے مسیح اور مجدد رہے ہیں، کی کتابیں میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے مراتب کو اور بلند فرمائے۔ آمین!

میں ان تمام احباب کا ممنون ہوں جن کی حوصلہ افزائیاں اور مفید مشورے تکمیل کار میں معاون ثابت ہوئے۔ خصوصاً گرامی قدر حکیم خورشید احمد شفقت اعظمی، حکیم محمد یوسف بستوی، حکیم سید محمد حسان گرامی اور حکیم ملک وائس امین صاحب کا بے حد ممنون ہوں۔ شریک حیات، سلطانہ وسیم کا بھی انتہائی ممنون ہوں کہ مواد کی فراہمی سے تیویت و ترتیب تک کے بیشتر مراحل میں ان کا تعاون حاصل رہا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آمین! ربنا تقبل منا انک انت العليم الحکیم۔

وسیم احمد اعظمی

4 فروری 1990

وضاحت

583، شیخوپورہ کالونی

نرا لاگر، لکھنؤ۔ 226020

Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمیت

Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمی

FEVER

طبعی حالتوں میں جسم کا درجہ حرارت 98.4 فیصد ہوتا ہے۔ منہ کی نسبت بغل اور کچ راں میں ایک درجہ کم اور مقعد میں ایک درجہ زیادہ حرارت ہوا کرتی ہے۔ صحت کی حالت میں بھی اس مقررہ معیار میں نہایت معمولی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے جس کو مرض/ عرض مرض نہیں تصور کیا جاتا، گویا 1.5 درجہ تک یومیہ کمی و اضافہ، طبعی درجہ حرارت کے ذیل میں آتا ہے۔ جب کوئی غیر طبعی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو جسمانی درجہ حرارت میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کی وجہ کوئی مرض، اعصابی تحریک یا توازن حرارت کے نظام میں خلل وغیرہ ہوا کرتی ہے۔

ذیل میں ”حمی“ کے بارے میں مختلف اطباء کے اقوال تحریر کیے جا رہے ہیں۔
حمی (بخار) اس حرارت غربیہ کا نام ہے جو پہلے قلب میں مشتعل ہوتی (بھڑکتی) ہے اور قلب سے روح، شریانوں اور عروق دمویہ کے ذریعہ تمام بدن میں پھیل کر اس طرح مشتعل ہوتی ہے کہ بدنی افعال میں خلل پیدا کرتی ہے۔ (ابن سینا)
حمی (بخار) وہ حرارت غربیہ ہے جو قلب سے منبعث ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتی

ہے اور پورے جسم کو ملجوب کر دیتی ہے۔ (ابن طبری)
 حمی (بخار) حرارت طبعی اور حرارت عفونیہ سے مل کر پیدا ہونے والی ایسی حرارت
 ہے جو قلب سے سارے بدن میں پھیل کر تمام افعال و انفعالات میں ضرر پیدا کرتی ہے۔
 (ابن رشد)

حمی (بخار) ایک ایسی حرارت ہے جو مجری طبعی سے خارج ہے اور قلب میں پیدا
 ہو کر عروق و موید و شرائین میں نفوذ کرتی ہوئی تمام اعضا بدن میں پہنچ جاتی ہے اور افعال
 اعضا بدنی کو ضرر پہنچاتی ہے۔ (علی بن العباس الجوسی)

حمی (بخار) ایک ایسی حرارت غریبہ ہے جو قلب میں فروختہ ہوتی ہے اور روح و
 خون کے ذریعہ رگوں میں گزرتی ہے اور تمام جسم میں پھیل کر اس کو گرم کر دیتی ہے جس کے
 نتیجہ میں لازمی طور پر افعال طبعیہ میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ (سید اسماعیل جرجانی)
 حمی (بخار) ایک مرض ہے جس میں حرارت غریبہ یا تو خود قلب میں مشتعل ہوتی
 ہے یا کسی دوسرے عضو میں پیدا ہو کر قلب میں آ جاتی ہے اور پھر یہاں سے شرائین کی راہ
 خون و روح کے واسطے سے تمام بدن میں سرایت کر کے افعال طبعی میں ضرر پیدا کرتی ہے۔
 (غلام جیلانی)

عفونت اور مستوقد عفونت

SEPSIS AND PLACE OF SEPSIS

عفونت Putrefaction/Sepsis

عفونت— رطوبات بدنہ اور اخلاط و مواد میں ایسے تخیری اور کیماوی عمل کا نام ہے جس سے ان رطوبات و اخلاط و مواد میں فاسد کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کے طور پر جسم کے طبعی افعال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں اعضا ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نکتہ ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ عمل عفونت کے لیے مناسب حرارت اور رطوبت ضروری ہے اور اس عمل سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ عفونی/تخیری عمل، انتہائی حرارت/ انتہائی برودت میں معطل ہو جاتا ہے اور حرارت و رطوبت جس قدر سازگار ہوتی جاتی ہے، یہ عمل تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ عفونت اور وبا کا کسی قدر دھندلا تصور بقراط (460 ق م) کے یہاں (کتاب ایذیسیا) میں ملتا ہے۔ بعد کے اطباء میں ابو بکر محمد بن زکریا الرازی (متوفی 313ھ/ 925ء) نے اپنی کتاب ”الجدری والحصہ“ میں، قسطن بن لوقا (متوفی قریباً

320ھ/932ء) نے ”کتاب فی الوبا واسبابہ“¹ میں کسی قدر واضح تصور پیش کیا۔ شیخ الرئیس ابن سینا (متوفی 438ھ/1037ء) نے ”القانون فی الطب“ میں اس پر خاصی بحث کی۔ یہ اطباء عفونت/وبا کا سبب ”اجسام ارضیہ خبیثہ“ کو قرار دیتے ہیں۔ تاہم ان اطباء کا یہ نظریہ، معمولی مشاہدات پر مبنی نہیں تھا بلکہ تجربہ اور قیاس اس کے دو عناصر تھے۔ خوردبین کی ایجاد کے بعد اس سمت میں مشاہداتی پیش رفت ہوئی اور علم الجراثیم کے نام سے ایک مستقل شعبہ وجود میں آیا۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ اطباء کے وہ عفونی/وبائی نظریات فی زمانہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مستوقد عفونت Place of Sepsis

عفونت کا عمل عموماً بدنی رطوبات، اخلاط اور مواد میں واقع ہوتا ہے لیکن بعض اعضا اپنی مزاجی خصوصیات اور مخصوص افعال کی بنا پر عفونت کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں قلب کو یہی حیثیت حاصل ہے۔ چونکہ عفونت کا اثر عام طور سے اعضا پر ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ اعضاء متاثرہ مرکز عفونت (مستوقد عفونت) قرار دیے جاتے ہیں۔ مستوقد عفونت کی درجہ ذیل دو قسمیں ہیں:

(1) مستوقد عفونت مقامی۔

(II) مستوقد عفونت عمومی۔

مستوقد عفونت مقامی Place of Sepsis Local

اس صورت میں عفونت ایک جگہ پر برقرار رہتی ہے اور اس کا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے مثلاً اگر زخم ہو گیا ہو تو زخم کا مقام/عضو، مستوقد عفونت قرار پائے گا۔ اس میں عفونت اگرچہ مقامی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر سارے جسم پر از دیاد حرارت وغیرہ کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔

1۔ اسی کا ایک نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں اور دوسرا شہید علی میں موجود ہے۔ نسخہ خدا بخش میرے مطالعہ میں رہا ہے (مؤلف)

مستوقد عفونت عمومی Place of Sepsis General

اس صورت میں عفونت سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ عفونت کا مرکز کوئی عضو نہیں ہوتا بلکہ اخلاط، بالخصوص دموی خلط ہوتی ہے۔ اس طرح گویا مرکز عفونت اور اثرات عفونت دونوں کو عمومی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمی کی اساسی اقسام

BASIC CLASSIFICATION OF FEVER

(الف) حمی کی حقیقت، وجود کے اعتبار سے

حمی

Fever

حمی مرضیہ

Idopathic Fever

حمی عرضیہ

Symptomatic Fever

حمی عرضیہ Symptomatic Fever


حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) کی یہ صورت کسی دوسرے مرض کی علامت اور عرض کے طور پر پیش آتی ہے، گویا ازدیاد حرارت کسی اور مرض کا نتیجہ ہے۔ اور ام، ویلات اور خراجات وغیرہ میں ازدیاد حرارت کو یہی عرضی/علامتی حیثیت حاصل ہے۔ جدید تحقیقات، حمی کی بیشتر انواع کو عرض اور علامت تصور کرتی ہیں، صرف محدودے چند انواع ایسی ہیں جن کو

مرضی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر مرکز مرض میں عفونت وغیرہ پیدا ہو جائے تو اطبا اس جی کو، جی مرضیہ میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً زخم کی وجہ سے ازدیاد حرارت کو ”عرض“ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسی زخم میں عفونت پیدا ہو جائے، اس کے بعد ازدیاد حرارت ہو تو اس کو ”مرض“ کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔

حمی مرضیہ Idopathic Fever

حمی (ازدیاد حرارت) کی یہ صورت سراسر ذاتی / اصلی ہوتی ہے، اس میں سبب اور ازدیاد حرارت (حمی) کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا۔ اس زمرے میں صرف چند جی، جی معدیہ، جی اجامیہ (ملیریل فیور) وغیرہ آتے ہیں۔

(ب) مادہ مرض کے اعتبار سے



حمی خلطیہ / عفونیہ

اس میں حرارت، جسمانی رطوبات / اخلاط کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ حرارت کا یہ قیام یا تثبت دو طرح سے ہوتا ہے۔


(I) حرارت غریبہ خلط / رطوبت کو متعفن کر دے اور تعفن سے قلب متاثر ہو جائے اور از دیاد حرارت لاحق ہو جائے۔

(II) حرارت غریبہ خلط میں تعفن پیدا نہ کرے بلکہ اس کو طبی مقدار سے زیادہ گرم کر دے جس کے نتیجے میں اس میں جوش اور غلیان آکر از دیاد حرارت پیش آئے۔

حمی غیر خلطیہ / ساذج / غیر عفونیہ

اس میں حرارت کا تعلق ابتدا میں صرف روح کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کی حرارت سے سارے جسم میں از دیاد حرارت ہو جاتا ہے۔ روح سے مراد یہاں روح حیوانی، روح نفسانی اور روح طبعی تینوں ہیں، گوپا حرارت کا استحکام اور تعلق ان میں سے کسی ایک پر لازمی طور پر ہوتا ہے، اور روح چونکہ ایک لطیف شے ہے اور بہت جلد تحلیل ہو جانے کا رجحان رکھتی ہے اس لیے از دیاد حرارت کی مدت 34 گھنٹے (جالیئوس کے ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ 144 گھنٹے) تک ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو ”حمی یوم“ (ایک دن کا بخار) کا عنوان دیا گیا ہے۔

Fever



اس صورت میں جی (از دیاد حرارت) اپنی پوری معیاد یعنی ابتدا سے انتہا تک مسلسل چڑھا رہتا ہے، کسی وقت نہیں اترتا۔ البتہ 24 گھنٹے میں کسی وقت نہایت خفیف کی (ایک درجہ تک) واقع ہو سکتی ہے۔

(I) مطبقہ:—

اس صورت میں خلط دسوی میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حرارت جسمانی یکساں طور پر بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت حرارت اعتدال پر نہیں آتی بلکہ کسی وقت 1-1/2-1 درجہ تک کم ہو جاتی ہے۔

(i) مطبقہ مترائدہ:—

ابتدا میں خفت ہوتی ہے پھر بتدریج شدت آتی جاتی ہے اور بالآخر نہایت شدت اختیار کرنے کے بعد یا تو صحت حاصل ہو جاتی ہے یا ہلاکت مقدر ہوتی ہے۔ بخار (حمی) عام طور سے 7 دن تک لازم رہتا ہے۔

(ii) مطبقہ متناقصہ:—

ابتدا میں شدت ہوتی ہے، پھر بتدریج شدت میں کمی آنے لگتی ہے اور آخر میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ از دیاد حرارت (حمی) عام طور سے 21 دن تک لازم رہتا ہے۔

(iii) مطبقہ متساویہ/مٹا بہہ:—

حرارت جسمانی میں ابتدا سے انتہا تک یکسانیت ہوتی ہے، اور کسی بھی مرحلے میں خفیف طور پر ہی سہی، حرارت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی حمی ختم ہوتا ہے۔

(II) مفترہ:—

حمی (از دیاد حرارت) پوری طور پر نہیں اترتا لیکن اس میں نمایاں طور پر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

(i) مفترہ ثقہ:—

اس صورت میں حمی میں 22 گھنٹے میں ایک مرتبہ نمایاں طور پر کمی واقع ہوتی ہے، تاہم حمی بالکل ختم نہیں ہوتا۔

(ii) مغترہ غب لازمہ:—

اس صورت میں حمی میں تیسرے دن کی واقعہ ہوتی ہے جس کو واضح طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔

(iii) مغترہ ربع لازمہ:—

اس صورت میں حمی میں چوتھے دن نمایاں طور پر کمی واقعہ ہوتی ہے۔ تاہم حمی بالکل نہیں اترتا۔

حمی نائیبہ / دائرہ

اس صورت میں حمی (ازدیاد حرارت) نوبت (ہاری) کے ساتھ آتا ہے، یعنی ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب حرارت جسمانی اعتدال پر آجاتی ہے۔

(i) مواظبہ:—

اس صورت میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ازدیاد حرارت ہوتا ہے اور اس کے بعد حرارت اعتدال پر آجاتی ہے، اسی طرح اس کی نوبت آتی رہتی ہے۔


(ii) غب (دائرہ):—

اس صورت میں ازدیاد حرارت تیسرے دن ہوتا ہے اس کے بعد حرارت اعتدال پر آجاتی ہے۔ پھر اس کے تیسرے دن دوبارہ ازدیاد حرارت ہوتا ہے اور سلسلہ بدستور رہتا ہے۔

(iii) ربع (دائرہ):—

اس صورت میں ازدیاد حرارت چوتھے دن واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرارت اعتدال پر آجاتی ہے۔ پھر اسی طرح منظم طور پر چوتھے دن پھر حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(ہ) جلدی علامات کے اعتبار سے




اس ازدیاد حرارت (حمی) میں بدن پر دانے/آبلے/پھنسیاں/دوڑے/دھبے/داغ وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ جدری، حصہ، موتی جڑہ وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس حمی کو جی فاجرہ (پھوٹ پڑنے والا بخار) بھی کہتے ہیں۔

حمی غیر طفحیہ: —

ازدیاد حرارت (حمی) کی اس صورت میں سطح جلد پر کوئی مخصوص مرضی علامت (داغ/دھبے/پھنسیاں/دانے/آبلے وغیرہ) نہیں نمودار ہوتی ہے۔ مثلاً حمی لٹھ

(و) حمی کے انجام کے اعتبار سے




حمی سلیمہ:—

اس صورت میں حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) خطرناک نہیں ہوتا، اور برے عوارض بھی پیش نہیں آتے تو یا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اس کی مثال حمی تعبیہ سے دی جاسکتی ہے۔

حمی خبیثہ:—

ازدیاد حرارت جسمانی خطرناک نتائج مرتب کرتا ہے اور برے عوارض بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور سے اعضا رنیرہ و شریفہ ماؤف ہوتے ہیں۔ حمی عفونیہ اسی زمرے میں آتا ہے۔

(ز) نوعیت آغاز کے اعتبار سے



حمی بارودہ:—

ازد حرارت (حمی) کہ میں سردی کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اطباء کا خیال میں ہر وقت (صرف ابتدا میں ہی نہیں) سردی کا احساس ہے، حمی بارودہ کہلاتا ہے۔ ”سی بلٹیہ“ اس کی عمدہ مثال ہے۔


حمی ناقضہ:—

ازدیاد حرارت جسمانی (حمی) کی وہ صورت جس میں لرزہ (کچکی) ہوتی ہے۔

”حمی نافذ“ کہلاتا ہے۔ اس زمرے میں حمی اجامیہ کو رکھا جاسکتا ہے۔

حمی حارہ:—

اس صورت میں غیر معمولی حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ سردی/الرزہ قطعی مفقود ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ”حمی حریہ“ ہے۔
(ج) شدت اور مدت مرض کے اعتبار سے



حمی حادہ:—

حمی کی اس صورت میں ازدیاد حرارت جسمانی بہت شدید ہوتا ہے۔ اس کے بالقابل مدت بہت کم ہوتی ہے۔

(I) حادہ جدا:—

اس صورت میں جسمانی درجہ حرارت بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے اور حمی زیادہ سے زیادہ 4 دن رہتا ہے۔ ذات الریہ کو اسی زمرے میں رکھا جاتا ہے۔

(II) حادثہ مطلقہ:—

اس صورت میں حمی حادثہ 7 دن سے زائد عرصہ پر محیط ہوتا ہے۔ حمی مفصلیہ کو اس زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔

(III) حادثہ:—

اس صورت میں از دیاد حرارت جسمانی 14 دن تک عام طور رہتی ہے۔ شلر الغب کو اس زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔


(IV) حادثہ المزمنہ:—

مدت مرض 19 دن سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اس زمرے میں حمی معویہ کو شمار کیا جاتا ہے۔

حمی مزمنہ:—

حمی کی اس صورت میں حرارت جسمانی میں شدت نہیں ہوتی اس کے بالتقابل مدت مرض طویل ہوتی ہے۔ حمی دقیرہ کو اس زمرہ میں رکھا گیا ہے۔

(ط) حمی کے مفرد/ مرکب ہونے کے اعتبار سے




حی مفردہ:—

اس صورت میں ایک وقت میں صرف ایک ہی بخار (حی) ہوتا ہے۔ اس کی مثال 'غلب خالص' سے دی جاسکتی ہے۔

حی مرکبہ:—

اس صورت میں ایک ہی وقت دو یا دو سے زائد ہی عارض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حی و قیہ اور حی اجامیہ ایک ساتھ عارض ہوں۔



Learn Unani By Abdul Waris Samadani

حمی کی تقسیم درجہ حرارت کے اعتبار سے

CLASSIFICATION OF FEVER ACCORDING TO GRADES/STAGES

درجہ اعتدال سے بڑھی ہوئی حرارت جسمانی (جس سے طبی افعال متاثر ہوں) ”حمی“ تصور کی جاتی ہے۔ حرارت کے اعتبار سے اطباء نے اس کی درجہ بندی کر دی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(I) حمی خفیفہ Slight Fever — اس کا اطلاق 99

— 101 ف پر ہوتا ہے۔

(II) حمی متوسطہ Moderate Fever — اس کا اطلاق

101.01-103 ف پر ہوتا ہے۔

(III) حمی شدیدہ High Fever — اس کا

اطلاق 103.01-110 ف پر ہوتا ہے۔

(IV) حمی محرقة Hyper Fever — اس کا اطلاق

106.01-110 ف پر ہوتا ہے۔

اس کو جدول کے انداز میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔

تقسیم حمی باعتبار درجہ حرارت

حمی محرقہ	حمی شدیدہ	حمی متوسطہ	حمی خفیفہ
(106.01-110ف)	(103.01-106ف)	(101.01-103ف)	(99-101ف)

Learn Unani By Abdul Wais Salman

حمی کے درجات

STAGES OF FEVER

مرض/حمی (بیمار) کی ابتدا سے اختتام تک (دورہ حمی Course of Fever) علامتی اور عوارضاتی طور پر کئی مرحلے پیش آتے ہیں، جس کو ذہن میں رکھنے سے معالجے میں کافی سہولت پیش آتی ہے۔ عام طور سے یہ درجات/مراحل تین ہوتے ہیں

(I) درجہ ابتدا Initial/Onset Stage

(II) درجہ انتہا Fastigium/Stage

(III) درجہ انحطاط

لیکن بعض حمی ایسے بھی ہیں جن میں یہ درجات تین کی بجائے پانچ ہو جاتے ہیں۔ یہ درجات/مراحل حمی طفیہ وغیرہ میں پیش آتے ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(I) درجہ انشاء/مدت حضانت Latency/Incubation Period

(II) درجہ ابتدا Onset Stage

(III) درجہ ازدیاد/انطفاخ Advance/Eruption Stage

(IV) درجہ انتہا/اشداد Fastigium/Acme Stage

(V) درجہ انحطاط/تحفیف Deferve scence/Resolution Stage

(I) درجہ اخفاء/ مدت حضانت:—

یہ مرحلہ جرثومی حمی میں پیش آتا ہے اور اس کا اطلاق جرثومی سرایت اور اس مرض کی علامات کے رونما ہونے کے درمیانی مدت پر ہوتا ہے، جو جرثومے کی سمیت کے اعتبار سے چند گھنٹے سے چند یوم پر محیط ہے۔ اس میں تقدمہ مرض کے طور پر سستی، کابلی، ضعف اشتہا اور اضمحلال و کم ہمتی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات درجہ اخفاء/ حضانت میں اس طرح کی علامات رونما نہیں ہوتیں بلکہ یک ایک ابتدائی درجے (استیلائی درجہ) کا آغاز ہوتا ہے۔

(II) درجہ ابتدا/ استیلاء:—

اس درجے میں حمی/ مرض کی ابتدائی علامات رونما ہوتی ہیں، چنانچہ معمولی سردی/ جھرجھری سے بخار چڑھتا ہے (جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے) بعض اوقات شدید جاڑے کے ساتھ جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی صرف شدید سردی محسوس ہوتی ہے لیکن اندرون جسم حرارت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ بچوں کو اس مرحلہ میں سردی لگنے کی بجائے تشنگ کی شکایت ہوتی ہے۔

(III) درجہ ازدیاد/ انطفاح:—

اس مرحلے میں مرض کی مخصوص علامتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ حمی طغیہ وغیرہ میں اسی مرحلے میں جسم پر دانے/ پھنسیاں وغیرہ نکلتی ہیں۔


(IV) درجہ انتہا/ اشتداد:—

اس مرحلے میں مرضی علامات اور جسمانی حرارت اپنی پوری شدت اور انتہا پر ہوتی

ہے، اس کو فیصلہ کن مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں طبیعت اور مرض کی مزاحمت اپنے انتہائی درجے پر ہوتی ہے۔ طبیعت کے غالب آجانے پر پانچواں درجہ (درجہ انحطاط) شروع ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

(V) درجہ انحطاط/تخفیف:—


اس مرحلے میں آکر طبیعت نے مرض کو شکست دے دی تو اس کا زور نوٹے لگتا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت بتدریج اعتدال پر آنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں تخفیف مرض بحران/تحلیل کی صورت میں پیش آتی ہے۔ بحران کی صورت میں جسم میں بہت بڑا تغیر رونما ہوتا ہے اور صرف 12-36 گھنٹے میں ہی اسہال/رعاف/بکثرت خارج ہو کر جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بحران میں کچھ کمی ہوتی ہے جس کو 'بحران ناقص' کہتے ہیں۔ تاہم اس صورت میں بھی 72-96 گھنٹے میں عوارض اور علامات میں کمی واقع ہو کر مرض جاتا رہتا ہے۔ تحلیل کی صورت میں جسم میں کوئی تغیر عظیم/شدید انقلاب رونما نہیں ہوتا بلکہ درجہ حرارت بتدریج کم ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر 72 گھنٹے میں اعتدال پر آ جاتا ہے۔ بعض اطباء نے ان پانچ درجات کے بعد ایک چھٹا درجہ، درجہ نقاہت (Convalescence Stage) قرار دیا ہے، جو درحقیقت جمی کا کوئی مرضی درجہ نہیں ہے بلکہ اس مرحلے میں بخار کی صرف نقاہت رہتی ہے جو بتدریج دور ہو جاتی ہے اور مریض بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بھی کم (96-97ف) ہوتا ہے۔



بحران، اقسام بحران - انجام مرض

CRISIS, TYPES AND PROGNOSIS

اقسام



بحران

طبی اصطلاح میں بحران اس عظیم تغیر کو کہتے ہیں جو کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے مریض کی حالت میں یک بیک سرعت و تیزی کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(I) بحران جید:—

اس صورت میں مریض کی حالت میں یک بیک، سریع اور عظیم تغیر واقع ہو کر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس کی دو انواع ہیں۔

(الف) جید تام:—

اس میں شفا یابی مکمل طور پر ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت مادہ کو مکمل طور پر دفع کر دیتی ہے اور یہ مادہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔

(ب) جید ناقص:—

اس میں شفا یابی اصل مرض سے تو کسی قدر مکمل طور پر ہوتی ہے لیکن ضعف کی وجہ سے طبیعت، مادہ مرض کو مکمل طور پر دفع کرنے سے قاصر ہوتی ہے چنانچہ اعضا رسیہ کو اس مادہ سے تو بچا لیتی ہے اور ضعف کی وجہ سے اس کو اطراف کی طرف دفع کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ عرصہ بعد مرض کے عود کر آنے کا اندیشہ بہر حال رہتا ہے۔ اس کو ”بحران انتقائی“ بھی کہتے ہیں۔

(II) بحران ردی:—

اس میں مریض کی حالت میں یک بیک نہایت تیز اور غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے، کیوں کہ طبیعت، مادہ مرض سے مکمل یا جزوی طور پر شکست کھا جاتی ہے۔ اس کی دو انواع ہیں۔

(الف) ردی تام:—

اس میں طبیعت، مادہ مرض سے مکمل طور پر شکست کھا جاتی ہے اور مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

(ب) اس میں طبیعت مادہ مرض سے جزوی طور پر شکست کھا جاتی ہے۔

غیر بحرانی

اس صورت کو ہم بحران کا 'عرض' بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی دو انواع ہیں۔

(الف) تحلل:۔

اس میں مریض کی حالت میں دفعتاً / فوراً تغیر یا انقلاب واقع نہیں ہوتا بلکہ مرضی علامات بتدریج، خفی طور پر زائل ہوتی ہیں اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

(ب) ذبولی:۔

اس میں مریض کے حالات میں یک یک، غیر معمولی طور پر تغیر واقع ہو کر یک یک موت واقع نہیں ہوتی بلکہ قوتوں میں بتدریج ذبول طاری ہوتا ہے اور ضعف واقع ہو کر مریض رفتہ رفتہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

علامات

اس ذیل میں ان علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بحران کا مقدمہ تصور کی جاتی ہیں اور ان کے ظہور کے بعد بحران واقع ہوتا ہے۔

مرض میں پہچان اور غلبہ ہوتا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کرب و اضطراب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے خیالی تصویریں آنے لگتی ہیں، کان میں مختلف انواع کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، عقل میں بھی اختلال پیدا ہو جاتا ہے، اچانک چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یا زرد پڑ جاتا ہے، کان کی لو بھی سرخ یا زرد پڑ جاتی ہے، سیاہ بھی پڑ سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے۔

بحران اگر پسینہ کے ذریعہ ہوتا ہے تو مریض کو سخت لرزہ آتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اور بہت زیادہ پسینہ آکر شفا مل جاتی ہے۔

نکسیر کے ذریعہ ہونے کی صورت میں پیر میں درد اور ٹیس محسوس ہوتی ہے۔

آنکھوں کے سامنے سرخ رنگ کے دھبے اور ڈورے دکھائی دیتے ہیں، ناک میں کھلا ہٹ ہوتی ہے۔

پیشاب کے ذریعہ واقع ہونے کی صورت میں مثانہ میں درد اور اٹھیل میں سوزش محسوس ہوتی ہے، براز کا اخراج بند ہو جاتا ہے اور پسینہ بھی کم آتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ پیشاب خارج ہوتا ہے۔

تفے کے ذریعہ واقع ہونے کی صورت میں فم معدہ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور نیچے والے لب میں اختلاجی نوعیت کی حرکت ہوتی ہے۔ اسہال کے ذریعہ واقع ہونے کی صورت میں شراسیف میں بوجھ، شکم میں درد ہوتا ہے۔ قراقر اور نفخ بھی ہوتا ہے۔

حیض کے ذریعہ واقع ہونے کی صورت میں کمر میں درد ہوتا ہے۔ رحم میں گرانی اور اختلاج کی شکایت ہوتی ہے۔

ملاحظہ رہے کہ ابتداء مرض میں بحران واقع ہونا خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرض کے بڑھنے کے زمانے میں واقع ہونا ”جید“ نہیں ہوتا۔ زمانہ انحطاط مرض میں بحران کا وقوع نہیں ہوتا۔ مرض کے زمانہ انتہا میں عام طور سے بحران تام جید واقع ہوتا ہے۔ بحران ہو جانے کے بعد بخار سائن نہ ہونا، قوت میں ضعف واقع ہو جانا، بطلان اشتہا، پیاس میں شدت، چہرے پر تھج، پیشاب کا رنگین ہونا اور متلی و تفے وغیرہ علامات بیماری کے لوٹ آنے کی غمازی کرتی ہیں۔

چند مخصوص علامات

درن دین سطور میں جید اور ردی علامتیں تحریر کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی حاد مرض میں آنکھیں اندر کی طرف دھنس جائیں، ناک پتلی ہو جائے، کینیاں بھی دھنس جائیں اور ان میں سکڑن پیدا ہو جائے، کان سرد پڑ جائیں، لومر جھا جائیں، چہرہ کی جلد تن جائے اور رنگت سیاہ، ہنر یا نیلگوں ہو جائے، چہرے پر غبار اڑتا نظر

آئے تو یہ ردی اور موت کے قریب ہونے کی علامات ہیں۔ اس طرح رنگت کا ایک بیک زرد پڑ جانا یا سیاہ، نیلگوں ہو جانا اور پیشانی و ناک پر جھریاں پڑ جانا ردی علامات ہیں۔ آنکھوں کا اندر کی طرف دھنس کر سکڑ جانا، بیاض چشم پر سرخ، بنفشی، آسمانی یا نیلا رنگ آ جانا، کسی ایک آنکھ کا چھوٹا ہو جانا یا پھر جانا ردی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح امراض حادہ میں ایک آنکھ سے پانی جاری رہنا، روشنی سے نفرت اور تاریکی سے راحت و سکون محسوس ہونا، کبچ جمع رہنا، کسی ایک طرف ٹکلی باندھے دیکھنا، آنکھوں کے سامنے مٹری کے جالے سے مشابہ کسی چیز کا نظر آنا وغیرہ موت کے قریب ہونے کی علامتیں ہیں۔

ناک بیٹھ جانے، چپٹا ہونا یا مڑ جانا، کسی سبب کے بغیر گھی، مٹی، مشک وغیرہ کی خوشبو محسوس کرنا، ناک سے زرد پانی ٹپکنا، چھینک لانے والی دواؤں کے استعمال کے باوجود چھینک نہ آنا یا مریض کا بار بار انگلیوں کے ذریعہ ناک سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنا وغیرہ ردی علامات تصور کی جاتی ہیں۔

کان کی لو کا خشک ہو جانا، سکڑ جانا یا سیاہی مائل ہو جانا خراب علامت ہے۔

امراض حادہ بالخصوص حیات حادہ میں زبان پر سیاہی آ جانا، بدبو آنا، ہونٹوں کا سکڑ جانا یا مڑ جانا، منہ کا کھلا رہنا، زبان کا خشک اور کھردرا ہو جانا خراب علامتیں ہیں۔

ایام بحر ان

بحران کے دن کے تعیین کے سلسلے میں اطباء میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجدد طب علامہ حکیم محمد کبیر الدین مرحوم نے بھی اس موضوع کو نہایت اختلافی قرار دیا ہے۔ تاہم ذیل میں حکیم صاحب مرحوم کی تصانیف اور دوسری کتابوں کی مدد سے یہ ایام تحریر کر رہے ہیں۔

(1) چوتھا دن (بعض اطباء کے بقول تیسرا دن) (2) ساتواں دن (3) گیارھواں دن (4) چودھواں دن (5) سترھواں دن (بعض اطباء کے بقول اٹھارھواں دن) (6) اکیسواں دن (بعض اطباء کے بقول بیسواں دن) (7) چوبیسواں دن (8) اٹھائیسواں دن (بعض اطباء کے بقول ستائیسواں دن) (9) تیسواں دن (10) چونتیسواں دن (بعض اطباء

کے بقول پینتیسواں دن (11) سینتیسواں دن (بعض اطبا کے بقول اڑتیسواں دن (12) چالیسواں دن (بعض اطبا کے بقول پچاسواں دن)۔

ایام بحر ان جید

(1) تیرا دن (2) پانچواں دن (3) ساتواں دن (4) نواں دن
(5) گیارہواں دن (6) چودھواں دن (7) سترہواں دن (8) اکیسواں دن (9)
چوبیسواں دن (10) تینتیسواں دن (11) چونتیسواں دن — ان ایام میں پسینہ وغیرہ آ جانا
اچھی علامت ہے۔

ایام بحر ان ردی

(1) چھٹا دن (2) آٹھواں دن (3) دسواں دن (4) بارہواں دن
(5) سولہواں دن (6) اٹھارہواں دن (7) انیسواں دن (8) بائیسواں دن -

غیر بحرانی ایام


اطبا کرام نے درج ذیل ایام کو غیر بحرانی ایام قرار دیا ہے۔ تاہم جب ہم غور
کرتے ہیں تو بیشتر ایام، بحرانی ایام کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔
(1) بائیسواں دن (2) تیسواں دن (3) پچیسواں دن (4) چھبیسواں دن
(5) اٹھائیسواں دن (6) انیسواں دن (7) تیسواں دن (8) تیسواں دن (9) تیسواں
دن (10) پینتیسواں دن (11) چھتیسواں دن (12) اڑتیسواں دن - (13) انتالیسواں دن -

ایام واقع فی الوسط

اس عنوان کے تحت ان ایام کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں بعض اوقات بحر ان
انحراف کے طور پر واقع ہوتا ہے۔ ایام درج ذیل ہیں:

(1) تیسرا دن (2) پانچواں دن (3) گیارہواں دن (4) تیرہواں دن
(5) سترہواں دن۔

بہر حال یہ ملحوظ رہے کہ ایام بحران کے تعین سے متعلق کوئی قطعی بات نہیں کہی
جاسکتی بلکہ اطباء کی یہ روش قیاس اور عقلی دلائل سے بھی خالی ہے۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمی کے لازمی عوارض اور ان کا تدارک

COMPLICATIONS OF FEVER AND ITS MANAGEMENT

(الف) عوارض Complication

جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ کی صورت میں لازمی طور پر بعض امراض بھی رونما ہوتے ہیں جو یا تو خود حمی / ازدیاد حرارت کی وجہ سے جسم کی طبعی کارکردگی میں خلل اور فتور کی صورت میں پیش آتے ہیں یا حمی کے نتیجہ میں سخی اور فاسد مواد کے اختلاط میں اثر انداز ہونے کے بعد جسمانی افعال میں خلل و فتور کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔

حمی / ازدیاد حرارت کو بظاہر جلد سب سے پہلے آشکارا کراتی ہے، اس کے بعد نظام دوران خون، نظام ہضم، نظام اعصاب، نظام بتول اور نظام تنفس وغیرہ متاثر ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

(I) جلد: Skin

جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ (حمی) کی صورت میں چھونے پر جلد گرم محسوس ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی (کمی / زیادتی) سے ملمس بھی گرم / زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس

طرح بعض اوقات جلد خشک معلوم ہوتی ہے اور کبھی پسینہ کی وجہ سے بھیگی اور تر معلوم ہوتی ہے۔ بخار (حمی) کی حالت میں بھی عام طور سے جلد کی رنگت طبعی طور پر رہتی ہے۔ تاہم عام طور سے چہرے پر سرخی ہوتی ہے اور کبھی زردی اور بے آبی آجاتی ہے۔ کسی مواد کی سرایت کی صورت میں اکثر اوقات سطح جلد پر پھور، طفحات، دوزے اور داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔

(II) نظام ہضم : Digestive System

اس ذیل میں مرض کی علامات سے پہلے زبان پر نمودار ہوتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں زبان پر سفید فرجی ہوتی ہے اور تری کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد زبان خشک ہو جاتی ہے، اس کے کناروں اور نوک سے فراتر نئے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی زبان سرخ نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف جہاں فرسودہ ہوتی ہے وہ حصہ خشک، درشت (کھردرا) اور بھورے/نیالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کی سطح میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دانتوں کی خلاؤں میں بھی زردی مائل کسی قدر خشک مواد جمع ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم میں دوسرے خلل اور فتور کے طور پر ضعف، بطلان اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، ضعف ہضم ہوتا ہے جو کم و بیش حمی کی تمام اقسام میں پیش آتا ہے، متلی بھی ہوتی ہے حمی کی مزمن بعض مخصوص صورتوں میں طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ (دیے بھی حمی میں طحال بڑھ جاتی ہے) جگر بھی بڑھ سکتا ہے، بلکہ حمی کی بعض اقسام میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قبض اسہال کی شکایت کثیر الوقوع ہے۔

(III) نظام دوران خون : Circulatory System

جسمانی درجہ حرارت میں زیادتی میں قلب کی حرکات بھی غیر طبعی طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ ابتدائی مرحلے میں قلب کی حرکت میں قوت اور شدت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ضعف طاری ہو جانے کے سبب (حرکت میں) ضعف آ جاتا ہے۔ قلب میں جس قدر معف آتا جاتا ہے اسی قدر اس کی پہلی آواز دھیمی ہوئی چلی جاتی ہے اور ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ قلب کی حرکت سنائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات سرپستان کے بیرونی جانب قلب کی گریں/حرکات محسوس ہوتی ہیں، جو دراصل اتساع قلب (دل کا پھیل جانا) کا نتیجہ ہوتی

ہیں۔ قلب کی رفتار میں بے اعتدال کی وجہ سے نبض کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے اور جسمانی درجہ حرارت میں اختلاف کے تناسب سے 80-132 تک پہنچ جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ مستحکم، صلب اور قوی چلتی ہے اس کے بعد تین اور ذوالقرعین (اس میں قلب کی ایک ٹھوکر سے نبض میں ٹھوکریں (ضربات) محسوس ہوتی ہیں) چلتی ہے، حیاتِ حادہ میں ذوالقرعین بہت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ جب قلب میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے تو اس تناسب سے نبض متواتر اور ضعیف چلنے لگتی ہے۔

(IV) نظام اعصاب: Nervous System

ازدیا د حرارت کے عوارض لازمہ میں نظام اعصاب کا خلل و فتور بھی ہے۔ چنانچہ حمی کی ابتدا میں درد سر ایک عام عارضہ کے طور پر رونما ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ سر میں گرانی اور حواس میں ٹکدر بھی ہوتا ہے۔ مریض کو اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی خواہش نہیں ہوتی اور کچھ عرصہ بعد تو وہ اس موقف میں بھی نہیں رہتا۔ غنودگی سی طاری رہتی ہے، خواب میں بڑبڑاتا ہے۔ پھر ہڈیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بڑھ کر جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد بے حواسی اور مدہوشی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس مرحلے کی ابتدا میں مریض اپنی انگلیوں سے بستر کی چادر اور کپڑوں کو نوچتا ہے اور فضا میں کچھ موبوم چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کے بعد بتدریج قوما میں چلا جاتا ہے۔ ازدیا د حرارت کی وجہ سے جب عمومی ضعف عارض ہو جاتا ہے تو جسم کے عضلات کی طبعی کارکردگی بھی غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہے اور اعضا کو حرکت دینے کے وقت کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ کبھی تشنجی صورت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قابض اور حساس عضلات میں فتور آجائے تو پیشاب و پاخانہ خطا ہونے لگتا ہے۔ گفتگو کرتے وقت زبان لڑکھڑاتی ہے۔ لرزہ، اعضا غلٹی، بے خوابی، کرب و اضطراب وغیرہ عوارض رونما ہوتے ہیں۔

(V) نظام بتول: Urinary System

ازدیا د حرارت میں نظام بتول (Urinary System) بھی بہت جلد متاثر ہوتا

ہے اور کلچین (کروہے) کی کارکردگی پر خاص طور پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ازدیاد حرارت کی وجہ سے مائی بخارات پسینہ اور تنفسی اعضا کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ خارج ہوتے ہیں۔ شراین میں دھوئی دباؤ میں کمی آجاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر گردوں میں پیشاب کم بنتا اور چھٹتا ہے۔ اس طرح پیشاب میں مائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں اور لازمی طور پر پیشاب گہرے رنگ کا ہو جاتا ہے، جلد اجزاء کی زیادتی کی وجہ سے اس کا توام بھی غیر طبعی، غلیظ ہو جاتا ہے اور فی فی نوعیت و سمیت کے لحاظ سے پیشاب میں رطوبت، بیضیہ، اجزاء ارضیہ وغیرہ خارج ہوتے ہیں۔

(VI) نظام تنفس : Respiratory System

ازدیاد حرارت میں عارضہ کے طور پر تنفسی نظام میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ طبعی حالت میں تنفس کی جو رفتار ہوتی ہے ازدیاد حرارت میں قلب کی رفتار میں سرعت آ جانے سے یہ بھی سریع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 18 مرتبہ فی منٹ کے بجائے 30-40 فی منٹ ہو جاتی ہے۔ حمی کے عہدہ تک رہنے کی صورت میں قاعدہ الریہ (Base of the Lung) میں خون جمع ہو جاتا ہے اور سینہ کے اوپری حصے کی تنفسی حرکات سامنے کی طرف زیادہ نمایاں اور واضح ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات کھانسی اور زلہ بھی ہو جاتا ہے۔

(ب) عوارض کا تدارک Compensation of Complication

(I) جلد: — Skin

جسمانی درجہ حرارت جب 103 ف تک پہنچ جائے تو اس کو کم کرنے کی تدابیر بروئے کار لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ماحول / فضا کو سرد کرنا زیادہ سودمند ہے۔ سرد پانی سے اسٹنج کرنا، برف کی تھیلی سر اور سینہ پر رکھنا، گیلی چادر وغیرہ اڑھانا اور 70 فیصد درجہ کے پانی سے غسل کرنا فائدہ مند ہے۔ صندل، کافور، کشیز سبز، کاسنی سبز وغیرہ نہیں کر مقام قلب پر لپ کے طور پر لگانے سے بھی بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

بکثرت پسینہ خارج ہو رہا ہو اور اس سے رطوبتِ اصلیہ اس قدر خارج ہو جائے کہ ضعف اور بیہوشی کا غلبہ ہو جائے تو اس کے روک تھام کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تحت ماحول/فضا کو سرد کرنا، پسینہ کو نہ پوچھنا اور سرد پانی کا خارجی استعمال فائدہ مند ہے۔ ان سے جلد کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور پسینہ کا اخراج رک جاتا ہے، گلنار، صندل، کبریا، کافور، حب الّاس وغیرہ کو باریک پیس کر جسم پر چھڑکنے سے بھی یہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔

جسم پر اگر داغ، دھبے، شور اور طفحیات نکل آئے ہوں تو ان کی رعایت سے درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں:

شاہترہ، گل نیلوفر، مکوہ خشک، ہر ایک 5 گرام، بہدانہ 3 گرام، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے اوپر سے خاکسی 7 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

گل سرخ، شاہترہ، گل نیلوفر، چراتیہ، منڈی، بیج کاسنی ہر ایک 5 گرام، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں پھر مل چھان کر شربت عناب 50 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

خارجی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں:

صندل سفید، صندل سرخ، فوئل، گل ارنی، گل سرخ، مکوہ خشک، ہم وزن۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے آب مکوہ ہبز، آب کشیز ہبز میں گھول کر لیپ تیار کریں اور جسم پر لگائیں۔ صندل، کشیز ہبز، برگ خرقہ، برگ بارنگ، اسہنول کا جب دستور مقام مرض پر ضما د کریں۔

روغن بیدانجیر 250 ملی لیٹر، موم 90 گرام، مردار سنگ 60 گرام، زنگار 40 گرام۔ موم کو روغن بیدانجیر میں پکھلائیں اور آخری دونوں دواؤں کو سرکہ میں باریک پیس کر مزید سرکہ ملا کر پکھلی ہوئی دوا میں ملا کر ضما د کے طور پر استعمال کرائیں۔ مزید تفصیلات متعلقہ جی کے علاج میں ملاحظہ کریں۔

اگرچی کی وجہ سے قشر میرہ، نافض اور برد اطراف وغیرہ کی شکایت ہو تو فوری طور پر تشخیص کے لیے خارجی تدابیر بروئے کار لائیں۔ اس مقصد کے تحت ماحول کو گرم کریں، گرم کپڑے اڑھائیں، ہاتھ پیر کی آہستہ آہستہ مالش کریں۔ حسب ضرورت چند بیدستر، برگ سداب، فلفل سیاہ، پودینہ خشک، عاقر قرحا، اصل السوس، دانہ ہیل خورد، پورہ ارشی وغیرہ دواؤں کو باریک پیس کر روغن بابونہ میں ملا کر جسم پر ملیں، اگر خردل کا اضافہ کر لیں تو مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

خوردنی طور پر — قسط، غاریقون ہر ایک 4 گرام باریک کر کے نیم گرم (گنگنے) پانی کے ہمراہ کھلائیں۔

(II) نظام ہضم: Digestive System

اگر از دیاد حرارت کی وجہ سے اسہال کی شکایت ہو تو جب تک سقوط قوت کا اندیشہ نہ ہو، اسہال کو بند نہ کریں، کیوں کہ اکثر اوقات مادہ مرض بذریعہ اسہال خارج ہو جاتا ہے اور اس کو قبل از وقت روک دینے سے مزید پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ تاہم اگر اسہال کا روکنا ضروری ہو تو حمی کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر دلعابات سے اسہال کرائیں۔ اگر ان سے ضرورت کی تکمیل نہ ہو رہی ہو تو قابضات/ حابس اسہال دوائیں ان لعابات میں شامل کریں۔ بعض اوقات غذا دوائی سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مہر دلعابات میں لعاب بہدانہ، شیرہ تخم کاہو، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، شیرہ تخم خرفہ شیرہ بارتنگ، شیرہ حب الاس وغیرہ استعمال کرائیں۔ انھیں اودیہ میں حسب ضرورت طباشیر، زہر مہرہ وغیرہ کا اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ شیرہ تخم خشخاش اور شربت خشخاش بھی مستعمل ہیں، غذا دوائی کے طور پر آتش جو بریاں، مونگ/ مسور کی دال (بریاں کردہ) کشیز خشک کے ساتھ پانی میں پکا کر دال کے گل جانے پر پانی پھینک کر اس دال میں آب انار وغیرہ ڈال کر کھلایا جاتا ہے۔

قبض کی صورت میں خفیف ملینات/ ہننے/ مسہلات کا رواج ہے لیکن ان میں خفیف ملین دوائیں اور بعض صورتوں میں حقنہ زیادہ موزوں ہے۔ اس مقصد کے لیے

آلو بخارا، انجیر، موین مفتی، شیر خشک، ترنجبین، تمر ہندی، ہلیلہ، روغن بادام، روغن زیتون اور خیار شیر وغیرہ مستعمل ہیں۔

درد اور نسخ شکم وغیرہ کی صورت میں مرض کے سبب کی رعایت کرتے ہوئے دافع درد اور کا سر ریاچ دوائیں استعمال کرائیں۔ اس مقصد کے لیے شربت انار قرش و شیریں، سککھین نعتی، شربت سیب وغیرہ مستعمل ہیں۔ مزید تفصیل ان امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں:

متلی اور تے کی شکایت ہو تو ان کو روکنے کی تدابیر کریں۔ خیال رہے کہ متلی/تے اگر بحرانی طور پر، دفع مادہ کے لیے ہو رہی ہو تو اس کو اس وقت تک نہ روکیں جب تک کہ سقوط قوت/شدید بے آبی کا اندیشہ نہ ہو جائے بلکہ تے کے لیے طبیعت کو سہارا دینے کی غرض سے سککھین سادہ اور گرم پانی وغیرہ نوش کرائیں۔ اگر خلط غلیظ ہو تو حب ایارج اور صبر وغیرہ استعمال کرائیں اس کے بعد زرشک اور شربت انارین وغیرہ مسکن دوائیں دیں۔ متلی اور تے کو روکنے کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں:

غلبہ صفراء کی صورت میں یہ نسخے دیں۔

انار دانہ ترش، موین، (دانہ کے ساتھ) ہر ایک 17.0 گرام، زیرہ سیاہ 3 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر سفوف تیار کریں اور 4.5 گرام ہمراہ شربت انار استعمال کرائیں۔
گل سرخ، طباشیر ہر ایک 7 گرام، ریوند چینی، کہر یا شمی، پوست بیرون پستہ، ہر ایک 5 گرام، فلفل سیاہ، زرشک، انار دانہ، ہر ایک 17.0 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف تیار کریں اور 10.5 گرام ہمراہ شربت سیب چنائیں۔

تمر ہندی کہنہ 6 گرام، آلو بخارا 5 عدد، تخم خرفہ، زرشک، گل نیلوفر، ہر ایک 6 گرام، مغز کنول گھٹھ 10 عدد۔ تمام دواؤں کو 2 لیٹر ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں اور پھر مل چھان کر شربت نیلوفر، شربت ترنجبین ہر ایک 25 ملی لیٹر حل کر کے پانی کے بجائے نوش کرائیں۔
غلبہ خلط بلغمی میں یہ نسخے بروئے کار لائیں۔

قرنفل، عود، مصطکی، پودینہ خشک، ہموزن۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر 3.5 گرام ہمراہ گل قند 50 گرام استعمال کرائیں۔

انہون، نوشادر، کافور، ہموزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ دیں۔

کشیڑ سبز، زرشک، انار دانہ ترش، پوست لیموں ہر ایک 6 گرام، فلفل سیاہ 5.5 گرام، نیل خوردہ 3 گرام، زیرہ سفید، نمک طعام، ہر ایک 1.5 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر اہوق (چینی) بنائیں اور چٹائیں۔ بلغمی اور صفراوی دونوں خلطوں میں مفید ہے۔ سوداوی خلط کے غلبہ پر یہ نسخے بروئے کار لائیں۔

زرشک 13.5 گرام، گل سرخ 18 گرام، پوست بیدون پستہ، مصطکی رومی، عود، قرف، سنبل الطیب، زیرہ کرمانی مدبر، فربجشک، پودینہ، ہر ایک 35 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف تیار کریں۔ 9 گرام ہمراہ گلقد سفر جلی استعمال کرائیں۔

پوست بیدون پستہ، گل سرخ — ہر ایک 130 گرام عود، مصطکی، ہر ایک 10.5 گرام، سک 17.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر شربت سیب میں ملا کر 4.5 گرام کھلائیں۔

بعض اوقات حمی کی وجہ سے بھوک کم لگنے لگتی ہے/ زائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا سبب معدہ میں فاسدہ اخلاط کا اجتماع ہو تو مقیات (قے آور دوائیں) کے ذریعہ معدہ کا تنقیہ کریں۔ ضعف قوت سبب بطلان ہو تو خوشبو سے تحریک پہنچائیں، معدہ کی صلاحیت میں کمی واقع ہو گئی ہو تو اس کی قوت احساس کو بیدار کرنے والی دوائیں بروئے کار لائیں۔ ذیل میں چند نسخے تحریر ہیں، حسب ضرورت ان کا استعمال کرا سکتے ہیں۔

فلفل سیاہ، پوست آملہ، اجوائن، زنجبیل، تچ، فلفل دراز، ہیل زرد، زیرہ، قرففل ہموزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر بنات سفید دو گنا ملائیں اور 15 گرام کھلائیں۔

بلبلہ، بلبلہ، سناہلی، نمک لوچر، زیرہ، بادیان، ہر ایک 42 گرام، فلفل سیاہ 40 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے حسب ضرورت 6 گرام استعمال کرائیں۔

جوارش آملہ، جوارش عود ترش، جوارش انارین، جوارش زرشک وغیرہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات متعلقہ مرض کے ذیل میں ملاحظہ کریں:

شہوت کلبہ وغیرہ میں یہ نسخے استعمال کرائیں۔

بادام مقشر، کثیر اہموزن کو باریک پیس لیں اور لعاب اسبغول کے ساتھ 3 گرام کے بقدر گولیاں بنائیں۔ حسب ضرورت 12 گرام کھلائیں۔

آب بہہ ترش، سرکہ خالص ہر ایک 500 ملی لیٹر، دونوں کو باہم ملائیں۔ اور سنبل الطیب 1.5 گرام، مصطکی رومی 3 گرام، عود جینی 2 گرام، انیسون، بادیان، ختم کرفس ہر ایک 7 گرام، پوست بخ کبر 10 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر پوٹی میں باندھ لیں اور مذکورہ بالا سیال میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور اس کے دو حصے کر لیں۔ ایک حصہ میں شیر خالص (حسب ضرورت) اور دوسرے حصے میں نبات سفید (حسب ضرورت) ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھلائیں۔

شدید پیاس کی شکایت ہو تو حتیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے مشروبات بارہ (زالال تمر ہندی، عرق کیوڑہ، عرق بید مشک، شربت لیمون وغیرہ) استعمال کرائیں لعاب بہدانہ، زلال، آلو بخارا، شیرہ مغز تخم خیارین وغیرہ بھی سودمند ہیں۔ سر پر سرد پانی دھارنے سے بھی پیاس کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آئندہ مطلقہ میں نسخے تحریر کیے جا رہے ہیں۔

مغز تخم خیار، مغز تخم باؤ بڑنگ، تخم خرف، کثیرا، ہر ایک 17.5 گرام، رب السوس 1.5 گرام، تخم کاہو، زرشک ہر ایک 7 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر لعاب اسبغول میں گولیاں بنائیں اور منہ میں رکھنے کی ہدایت کریں۔

صندل سرخ، صندل سفید، مغز تخم خیارین، مغز تخم کدو، مغز خرف، ہر ایک 10.5 گرام، نشاستہ، کثیرا، صمغ عربی ہر ایک 1.5 گرام، طباشیر 7 گرام۔ تمام دواؤں کو پیس کر لعاب اسبغول میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں اور 12 گرام ہمراہ سلجھین استعمال کرائیں۔

خرپڑہ ہندی، کدوئے تازہ، مغز خیار، مغز باؤ بڑنگ، ہموزن۔ تمام کو بھگو کر عرق کشید کریں پھر اس کے ہموزن عرق گلاب اور تھوڑی مقدار میں کافور حل کریں۔ اس کے بعد اسی عرق میں آب غورہ/ آب ترنج/ زلال تمر ہندی ہموزن ملائیں اور طباشیر تھوڑا سا باریک پیس کر شامل کر کے پانی کی بجائے تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔

(III) نظام دوران خون: Circulatory System

ضعف قلب کی صورت میں مقوی قلب دوائیں استعمال کرائیں۔ ذیل میں چند نسخے تحریر ہیں:

تھوڑی مقدار میں شراب نوش کرائیں۔

طباشیر کبود، دانہ بیل خورد، زہر مہرہ، یشب بسداہر، کبر با شمی، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق بید مشک، عرق کیوڑہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں اس قدر کھل کر کریں کہ خشک ہو جائے۔ 1 گرام ہمراہ فیروزہ گاؤ زبان 8 گرام کھلائیں۔

ابریشم مصفی، گاؤ زبان ہر ایک 50 گرام، گل گاؤ زبان، بہن سفید، تخم فرنج مشک، تخم ریحان، صندل سفید، کشیز، ہر ایک 12 گرام، عنبر اہلب، 2 گرام، ورق نقرہ 60 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے نبات سفید 50 گرام کے قوام میں ملا کر مہجون بنائیں اور 12 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان، عرق بید مشک، شربت گڑھل استعمال کرائیں۔

جدوار، ورق طلا، ہر ایک 6 گرام، مشک، عنبر اہلب، زعفران، ورق نقرہ، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق کیوڑہ، عرق بید مشک میں کھل کر کے فلفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-3 گولیاں کھلائیں۔

مروارید ناسفت، بخ مرجان، کبر با شمی ہر ایک 9 گرام، گل گاؤ زبان، عود خام، تخم کشیز خشک، طباشیر ہر ایک 12 گرام، صندل سفید، صندل سرخ، تخم کاسنی ہر ایک 18 گرام، تخم فسخاش سفید 11 گرام، گل سرخ، افیمون، ساؤج ہندی، درونج عقرلی، فرنجشک بادیان، زرنباد ہر ایک 6 گرام، گل ارمنی، گل مخوم، گل بنفشہ ہر ایک 5.5 گرام، ابریشم مقرض 11.5 گرام، مغز تخم کدوئے شیریں 27 گرام، ترنجبین اصلی 60 گرام، عنبر اہلب، زعفران ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے شربت سیب، شربت بھی شیریں۔ ہر ایک 60 ملی لیٹر، عرق گلاب، عرق بید مشک ہر ایک 85 ملی لیٹر، نبات سفید 475 گرام، شہد 250 گرام میں مہجون بنائیں اور 3 گرام ہمراہ آب تازہ صبح کے وقت کھلائیں۔

مذکورہ بالا نسخے میں گرم مزاج کی حامل دوائیں شامل ہیں اس لیے مہر دات کے ذریعہ تعدیل حرارت کی کوشش کریں۔ ورنہ حمی میں اور بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔

(IV) نظام اعصاب: Nervous System

غشی/ضعف اعصاب کی صورت میں محرکات اور مفرحات استعمال کرائیں۔
ہیجان، کرب و اضطراب اور ہذیان کی صورت میں مسکنات، مہر دات اور حسب رعایت مادہ مفرحات استعمال کرائیں۔ ذیل میں اس زمرے کے چند نسخے تحریر ہیں:
ضعف اعصاب میں یہ نسخے استعمال کرائیں۔

خمیرہ مروارید/خمیرہ ابریشم/ارشدی/خمیرہ گاؤ زبان عنبریں جواہر والا/لیوب کبیر
5 گرام ہمراہ ماء الفواکہ استعمال کرائیں۔

یا توتی مفرح/مجنون اذراقی/دواء المسک معتدل باردا/ماء اللہم غیری معتدل 3 ملی لیٹر/گرام استعمال کرائیں۔

غفلت/غش کی صورت میں یہ نخلخہ سوگھانا سودمند ہے۔

گل نیلوفر، گل ارمنی، صندل سفید ہر ایک 12 گرام، آب کدوئے دراز، آب خیاربز، آب کشنیزبز ہر ایک 35 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو چوڑے منہ کی شیشی میں رکھ کر نخلخہ مریض کو سگھائیں۔

عرق نیلوفر، عرق گلاب ہر ایک 50 ملی لیٹر، برگ کشنیزبز، صندل سفید، ہر ایک 12 گرام، عطر خس 1 گرام۔ تمام دواؤں کو جوڑے منہ کی ایک شیشی میں رکھ کر نخلخہ کے طور پر سگھائیں۔

ہذیان کی صورت میں روغن گل، عرق گلاب، سرکہ تینوں کو باہم ملا کر برف سے سرد کر کے اس میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں اور برف کی تھیلی پھیرنا بھی سودمند ہے۔ دوسری مرہمہ ابیر بھی بروئے کار لائیں۔

کرب و اضطراب کی صورت میں مسکنات استعمال کرائیں۔ صداع/گرافنی سرکہ

صورت میں سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے دافع درد دوائیں دیں۔ یہ نسخے استعمال کرا سکتے ہیں۔
مہر دات کے طور پر یہ نسخے دیں۔

شیرہ تخم کا ہو قشر، لعاب بہدانہ ہر ایک 3 گرام، شیرہ تخم کدوئے شیریں، شیرہ مغز تخم
تریزہ، ہر ایک 6 گرام پانی میں نکال کر شربت نیلوفر حسب ضرورت حل کر کے نوش کرائیں۔
لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد عرق گاؤ زبان 125 ملی لیٹر میں نکال کر
شربت بنشت 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

کافور، ست اجوائن، ست پودینہ، ہموزن کو ایک شیشی میں رکھ دیں۔ تھوڑی دیر
بعد جب یہ باہم مل کر سیال ہو جائیں تو پیشانی پر طلا کریں۔

لعاب اسفول 14 گرام، روغن کدوئے شیریں، شیرزن ہر ایک 7 ملی لیٹر، عرق
گلاب 12 ملی لیٹر، آب کشیز سبز 11 ملی لیٹر، کافور تھوڑا سا۔ تمام دواؤں کو باہم ملا کر طلا کریں۔
صندل سرخ، صندل سفید (گلاب میں بسا ہوا) گل نیلوفر، گل بنفشہ آرجو، کشیز سبز،
ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کریں، تراشہ کدو، 5 گرام روغن گل 25 ملی
لیٹر، ملا کر آب کا ہو، آب خرفہ، آب خیار، آب مکو، سبز میں دوبارہ پیس کر ضا کر دیں۔
بکری کے دودھ میں کپڑا تر کر کے پیشانی پر رکھیں۔ قبض وغیرہ ہو تو ملیعات
کے ذریعہ علاج کریں۔


(V) نظام بول: Urinary System

احتباس بول کی شکایت ہو تو یہ نسخے بروئے کار لائیں۔
خار خشک، تخم خیارین، تخم خرفہ، تخم خرپوزہ، زیرہ سفید، تخم کاسنی، بادیان شورہ قلمی،
ججر الیہود، ہر ایک 12 گرام۔ تخم قرطم، تخم کرفس، تخم گاجر، ریوند جینی، دانہ ہیل خورد، صمغ
عربی ہر ایک 6 گرام۔ صمغ عربی کو پانی میں حل کریں اور باقی دواؤں کو باریک پیس کر
صمغ عربی کے محلول میں گوندھ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں اور 3 گرام ہمراہ آب تازہ
استعمال کرائیں۔

جوا کھار، ریوند چینی، شورہ قلمی، بادیان، نمک ترب، ہر ایک 12 گرام، نبات سفید 50 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر 7 گرام صبح و شام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔
 روغن بیدانجیر 35 ملی لیٹر ہمراہ آب نیم گرم نوش کرائیں۔
 حب الغار، شب میانی، حماما، اکلیل الملک، آرد چنا سیاہ، بابونہ - ہر ایک 35 گرام، دو قو، تخم کرفس بستانی، تخم کرفس کوہی، تخم ترب، ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب کرب، روغن بلسان، روغن سون میں ملا کر مناد کریں۔

(VI) نظام تنفس: Respiratory System

نزہ، کھانسی وغیرہ کی صورت میں حسب ضرورت لعقوق خشخاش، حب سعال، لعقوق سپتاں استعمال کرائیں۔
 روغن موم اور قیروطی کی سینہ پر مالش کریں۔
 ضیق انفس ہو تو مرض کے حقیقی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نسخے استعمال کرائیں۔
 زراوند حرج 2 گرام، سنبل الطیب 3 گرام، دونوں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور شہد 12 گرام ملا کر صبح و شام نوش کرائیں۔
 گل بنفشہ، گل گاؤ زبان، برگ گاؤ زبان، گل نیلوفر، گل خیرہ، پرسیاوشاں، زوفا خشک، اصل السوس، انجیر کالی، بادیان، مویز متقی ہر ایک 60 گرام، عتاب 50 عدد، سپتاں 8 عدد — تمام دواؤں کو 5 لیٹر پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 1 کلو گرام میں قوام تیار کر کے 12 گرام کھلائیں۔
 مزید تفصیلات ان امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔
 مذکورہ بالا عوارض کے علاوہ بھی دوسری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کے ازالہ کے لیے متعلقہ امراض کا بیان ملاحظہ کریں۔



حمی یوم کا دوسرے حمی میں منتقل ہونا

انجام کے اعتبار سے حمیات یومیہ عام طور سے بے خطر ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات صحیح تشخیص نہ ہونے، بے پرواہی یا علاج وغیرہ میں غلطی کی وجہ سے حمیات خلطیہ/عقونیہ/دق میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ذیل میں ان کے اسباب و علامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اسباب

(۱) طبعی استعداد:—

بعض اشخاص کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ حمی یوم میں تغذیہ وغیرہ کی ذرا بھی غلطی کریں تو وہ حمی خلطی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کا جسم کچی ہے اور حمی یوم میں اس کی غذا بند کر دی جائے تو اس کے حمی خلطی میں منتقل ہو جانے کے امکان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔

(۲) اخلاط/مزاج:—

حمی یوم کے حمی دق/حمی عقونی/حمی خلطی میں منتقل ہو جانے کا ایک بڑا سبب اخلاط

اور مزاج ہیں۔ مثلاً اگر کسی صغریٰ مزاج کے حامل شخص کو حی یوم پیش آیا اور اس کی غذا بند کر دی گئی تو یہ حی، حی دق میں منتقل ہو جائے گا۔

(III) کیفیت اخلاط:۔

حی یوم کے دیگر خلطی / دق حی میں منتقل ہو جانے کا ایک سبب اخلاط کی کیفیات بھی ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو حی یوم ورمیہ عارض ہوا اور تحلیل ورم کی تدابیر بروئے کار نہیں لائی گئیں تو وہ ورم، قرحہ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح حی یوم حی عفونی میں منتقل ہو جائے گا یا اگر خلط میں لزوجت کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے جلد کے مسامات بند ہو گئے ہوں اور مسامات کو کھولنے کی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں، تو اس سے حرارت مشتعل ہو جائے گی نتیجہ کے طور پر اخلاط میں خونیت پیدا ہو کر حی یوم، حی خلطی میں منتقل ہو جائے گا۔

(IV) تسخین:۔

جسم میں پیدا کرنے والے خارجی / داخلی اسباب سے بھی حی یوم، حی خلطی / دق میں منتقل ہو جاتا ہے۔

(V) معالج / مریض کا اقدام:۔

حی یوم کے دیگر حمیات میں منتقل ہو جانے میں معالج کا فیصلہ بھی موثر کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر تشخیص مرض میں ذرا بھی غلطی ہوئی کہ حی کے دوسرے حی میں منتقل ہونے کے امکانات بڑھے۔ مثلاً حی یوم میں اگر بے وقت غذا دے دی جائے تو اس کے حی معوی میں منتقل ہو جانے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر غذا کی ضرورت اور تقاضے کے باوجود غذا بند کر دی جائے تو بھی حی یوم، حی دق وغیرہ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض، معالج کی ہدایات کو نظر انداز کر دے تو بھی حی دوسرے حمایت میں منتقل ہو سکتا ہے۔

علامات

انتقال حمی کی علامتوں کو ہم دو زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) انتقال حمی کی عمومی علامات۔

(II) انتقال حمی کی خصوصی علامات۔


(I) انتقال حمی کی عمومی علامات:—

اس ذیل میں ان علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو حمی یوم کی مخصوص علامتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً حمی کے ختم ہو جانے کے باوجود طبیعت کا اصل/حقیقی حالت پر نہ آتا بلکہ غیر طبعی حالت اور کیفیت کا پایا جاتا حمی کا خلاف عادت اور مدت، زیادہ دیر میں زائل ہونا، حمی کے نتیجے میں درد سر کی شکایت رہی ہو، لیکن حمی اتر جانے کے بعد بھی شکایت قائم ہو۔ پسینہ نمی کے بغیر انحطاط، پسینہ خارج ہونے کے باوجود تحقیق نہ ہونا، حمی ختم ہو جانے کے بعد بھی طبعی حالت پر نہ آنا، زمانہ انحطاط کا طویل ہونا وغیرہ۔

(II) انتقال حمی کی خصوصی علامات:—

اس ذیل میں انتقال حمی کی ان خصوصی علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کسی خلط/عقون/دق سے وابستگی کی غماز ہوتی ہیں۔ چنانچہ حمی یوم اگر کسی خلط کی طرف منتقل ہو گیا ہو تو اس خلط کی مخصوص علامتیں رونما ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح اگر خلط حار یا بس ہے تو علامات مرض نہایت شدید ہوتی ہیں۔ حار رطب ہو تو اس کی کسی قدر کم اور بارد رطب ہو تو اور بھی کم، اور اسی طرح بارد یا بس ہو تو اس کی علامتیں رونما ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ خلط کے ملوث ہونے اور علامتوں کے رونما ہونے کی کیفیت میں خلط کی مقدار کو بڑا دخل ہے۔ اگر خلط کم ہوگی تو علامتوں میں زیادہ شدت نہیں ہوگی اور اگر خلط زیادہ مقدار میں ہوگی تو علامتوں میں اسی تناسب سے زیادتی ہوگی۔ حمی یوم اگر حمی عقونی میں منتقل ہو گیا ہو تو از دو یا د حرارت تکلیف وہ حد تک ہوتا ہے۔ عوارض میں شدت ہوتی ہے۔ بیہوش وغیرہ کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ جگر،

طحال، گردے وغیرہ کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق آجاتا ہے۔ قشعر یہ اور نبض میں تضابط وغیرہ ہوتا ہے۔ حمی یوم اگر حمی دق کی طرف منتقل ہو گیا ہو تو دق کی مخصوص علامتیں رونما ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً غذا لینے کے بعد ایک مخصوص وقت میں از دیاد حرارت جسمانی وزن میں کمی، ضعف اشتہا اور نبض میں صفرو صلابت وغیرہ۔ حاصل کلام یہ کہ حمی یوم میں مریض کو معالج سے تعاون اور اس کی ہدایات پر اچھی طرح عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح معالج کو نہ صرف تشخیص مرض سے لے کر غذائی اور دوائی تدابیر تک بلکہ ممکنہ عوارضات پر بھی خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔



حمی کے ساتھ دوسرے امراض کی شرکت

بعض اوقات حمی کے ساتھ دوسرے امراض بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں معالج کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے کس مرض کا علاج کرے۔ یہاں یہ نکتہ ذہن میں رہے کہ جو مرض زیادہ شدید ہو یا دوسرے مرض میں بھی شریک غالب کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا علاج پہلے کریں تاہم کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ ذیل میں حمی کے ساتھ کچھ دیگر امراض کے جمع ہو جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

(۱) حمی اور صداع:—

حمی کے ساتھ صداع (درد سر) کی شکایت کثیر الوقوع حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں حمی کے ازالے کی طرف توجہ دینی چاہیے کیوں کہ مشاہدہ یہی ہے کہ حمی کے زائل ہونے کے بعد عام طور سے صداع از خود زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مرحلے ایسے بھی آتے ہیں جب صداع کی غیر معمولی شدت معالج کو علاج پر مجبور کرتی ہے۔ اس صورت میں ایسی مسکن اور معرق دوائیں منتخب کرنی چاہیے جو حمی کے لیے مضر نہ ہوں بلکہ اس کے ازالہ میں بھی معاون ثابت ہوں۔

(II) حمی اور فالج:—

بعض اوقات حمی اور فالج ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے حمی کے ازالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فالج کے علاج پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔
اطباء نے سکجین ہمراہ گلقد کھلانے کو مفید بتایا ہے اور اگر حرارت جسمانی بہت زیادہ نہ ہو تو آب نخود ہمراہ روغن زیتون کا استعمال بھی سودمند نتائج مرتب کرتا ہے۔

(III) حمی اور درم:—

بعض اوقات حمی کے ساتھ التهاب معدہ، التهاب کبد، التهاب طحال وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جب تک حمی کی شدت میں کمی نہ واقع ہو جائے، تحلیل درم کے لیے زیادہ گرم دوائیں نہ استعمال کرائیں۔ جب حرارت میں کمی واقع ہو جائے تو التهاب کے ازالے کی طرف متوجہ ہوں اور اگر التهاب کی تحلیل کے لیے گرم دوائیں بھی درکار ہوں تو ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آب برگ کاسنی سبز، آب برگ منب الثعلب سبز، سکجین وغیرہ کچھ ایسی دوائیں ہیں جو بارد اور مسکن حرارت ہونے کے باوجود تحلیل درم بھی ہیں۔ لہذا حمی کی حالت میں ان کا استعمال زیادہ موزوں ہے۔

(IV) حمی اور قولنج:—

بعض اوقات حمی اور قولنج ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں حقنہ وغیرہ کے ذریعہ پہلے قولنج کا علاج کرنا چاہیے۔ امعاء کے تنقیہ اور درد میں سکون آ جانے کے بعد حمی کے ازالے پر متوجہ ہوں، بعض اوقات تو حقنہ سے نہ صرف قولنج ختم ہو جاتا ہے بلکہ حمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

حمی میں موت

DEATH IN FEVER


جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ، عام طور سے موت کا باعث نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امر بھی بار بار کے مشاہد سے میں ہے کہ بخاروں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہی موت کا باعث ہے۔ یا اس کے ساتھ دوسری پیچیدگیاں بھی موت کی ذمہ دار ہیں۔ ہم اس جملے کو پھر دہرا رہے ہیں کہ 'صرف جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ عام طور سے موت کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ عوارض بھی موت کے اسباب میں داخل ہیں۔

(I) متعدی امراض میں کسی مواد کا نظام اعصاب کو مسموم کر دینا، جس سے جسمانی کارکردگی پر خراب اثر پڑے۔ اس صورت میں موت بہت جلد واقع ہوتی ہے۔

(II) کسی مواد کا جسم میں عرصہ دراز تک رہنا۔ اس صورت میں اگر نظام اعصاب متاثر نہ ہو تو موت دیر میں واقع ہوتی ہے۔

(III) جسمانی درجہ حرارت میں عرصہ تک غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے قلب کی کارکردگی متاثر ہو جائے اور ضعیف ہو کر ناکارہ ہو جائے۔

(IV) جسمانی درجہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے پیچھڑوں کی کارکردگی پر خراب اثر پڑے اور احتباس تنفس ہو کر موت واقع ہو جائے۔
 واضح رہے کہ جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ کے باعث ہونے والی اموات میں تشریح بعد الموت میں خون رقیق ہوتا ہے۔ اس میں لونیت بھی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ شریان اعظم اور بڑی عروق کو تیزی کے ساتھ رنگین کر دیتا ہے۔ کریات حرا (R.B.C.) میں کمی اور کریات بیضاء (W.B.C.) میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غشاء الصدر اور غلاف قلب کے مائی طبقے کے نیچے زف الدم (جریان خون) کے نشانات چھوٹے چھوٹے دھبے پائے جاتے ہیں۔ جگر طحال اور گردے وغیرہ میں تعظم اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔



انتقاص حرارت

اعتدال سے کم حرارت جسمانی کو طبی اصطلاح میں ”انتقاص حرارت“ کہتے ہیں۔ اطباء نے اس کے درج ذیل اسباب بیان کیے ہیں۔

(I) شعاع حرارت (Radiation) کی افراط۔

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گرم ماحول سے یک بیک سرد ماحول فضا میں جانا، بہت سرد پانی سے غسل کرنا۔ ان تدابیر سے حرارت بدنی بہت زیادہ خارج ہوتی ہے اور نتیجہ کے طور پر جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بھی کم ہو جاتا ہے۔

(II) فساد مزاج / فساد تغذیہ۔ بعض امراض مثلاً سوء التقدیہ کی بعض انواع، دماغ کے مہمن امراض، ذیابیطس شدید اور آلات غذا کے سرطان وغیرہ میں بھی جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے کم ہو جاتا ہے۔

(III) نزف الدم شدید / استفراغ شدید۔ ان صورتوں میں بھی درجہ حرارت اعتدال سے کم ہو جاتا ہے۔

(IV) دوران خون اور تنفس کے شدید عوارض۔ مثلاً ضعف قلب اور بیماری تنفس میں تنگی بھی انتقاص حرارت کا باعث ہے۔

(V) مرکزی نظام اعصاب کے بعض امراض۔

(VI) بعض وسیع جلدی امراض — مثلاً تار فارسی (Eczema) کا جلد کے

وسیع رقبہ پر پھیلا ہونا/جلد کے ایک بڑے رقبے کا جل جانا۔

(VII) حسی اعصاب کے بعض بیچانات و تاثرات — مثلاً آپریشن کے بعد درد

گردہ، درد جگر وغیرہ میں۔


(VIII) حمی کے بعد۔

(IX) بعض سمیات — مثلاً افیون اور اس کے مرکبات، بروج، لفاج، تسمم

شراب، تسمم بول اور قومائے ذیابیطسی وغیرہ۔

یہ اور اسی طرح کی بعض صورتوں میں جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بھی کم

ہو جاتا ہے۔



حمی کا عام اصول علاج

GENERAL PRINCIPLES OF TREATMENT OF FEVER

حمی خلطی میں عام طور سے دو طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔

(I) مہر دات کے ذریعہ تسکین حرارت:۔

یہ علاج حقیقی علاج نہیں ہوتا بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ حرارت کی شدت اور حدت میں براہ راست تسکین لائی جائے اور جب تسکین حاصل ہو جائے تو معالج اصل علاج کی طرف رجوع کرے۔ یہ صورت عام طور سے حمیات حادہ میں پیش آتی ہے۔ معالجاتی نقطہ نظر سے یہ وقتی تسکین از حد ضروری ہے کیوں کہ ازدیاد حرارت سے وقتی طور پر ایسے عوارض رونما ہو سکتے ہیں جو اصل مرض اور اس کی پیچیدگیوں سے زیادہ پر خطر ثابت ہوں۔ تفصیل ”حمیات حادہ کا اصول علاج“ میں ملاحظہ کریں۔

(II) انضاج و اخراج مادہ:۔

یہ طریقہ علاج ہی حقیقی طریقہ علاج ہے۔ تاہم اطباء میں اس قدر اختلاف رائے ضرور ہے کہ آیا حمیات خلطیہ / غنونیہ کے کے ہر مرحلے میں علاج کا آغاز / مضحجات سے کیا

جانا ضروری ہے۔ اطباء کے نظریاتی اختلاف میں پڑے بغیر اس قدر ذہن نشین کر لیں کہ بعض حیات خلطیہ/عقونیہ کچھ اس نوعیت سے پیش آتے ہیں کہ وہ منہج کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس صورت میں منہج کو نظر انداز کرتے ہوئے ملینات کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حیات خلطیہ کی وہ حاد صورتیں، جن میں منہج کے استعمال کا موقع ہو تو مرض کو بالکل ختم کرنے کے لیے منہجات کا استعمال ضروری ہے۔ حیات حنونہ/خلطیہ مزمنہ میں اطباء کرام منہجات کے ذریعہ علاج کے آغاز کی سفارش کرتے ہیں۔

ذیل میں تلین، تعریق، ادرار اور تے وغیرہ کو کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔

تلین Laxation

حیات خلطیہ/عقونیہ کے ابتدائی مرحلے میں (اگر اسہال نہ ہو رہا ہو تو) خفیف ملین کا استعمال ضروری ہوتا ہے، جس کے ساتھ قبض کی شکایت بھی ہو تو تلین کی ضرورت اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تلین کے لیے منہج کا انتظار ضروری نہیں ہے، بلکہ استفراغ کلی/تام کے وقت نفع مادہ ضروری ہوتا ہے اور اس نفع کے بغیر قوی مسہلات کا استعمال بعض اوقات خطرناک صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے تحت گلقد، سکنجبین، ترنجبین اور شیر خشک وغیرہ مستعمل ہیں۔ بعض اطباء ملینات کے خوردنی استعمال کی بجائے حقنہ کو مفید تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تلین اور تنقیہ امعاء کے لیے ہلکے مسہلات سے بہتر خفیف حقنہ ہیں۔ اس مقصد کے تحت حقنہ کا یہ نسخہ مفید ہے۔

روغن بنفشہ 12 ملی لیٹر، آب برگ چقدر 475 ملی لیٹر، زردی بیضہ مرغ 1 عدد، شکر سرخ 50 گرام، بورق 11.5 گرام۔ تمام دواؤں کو ملا کر حسب دستور حقنہ کریں۔

تعریق Diaphoresis

اس اصول کو ملینات کے استعمال کے بعد معمولی از دیاد حرارت کے وقت بروئے کار

لاتے ہیں۔ بہت زیادہ حرارت کے وقت اس طرح کی دواؤں سے احتراز برتنا جاتا ہے۔ ذیل میں اس زمرے کی چند دوائیں تحریر ہیں:

بادیان، کباب چینی، پودینہ ہنری خشک، برنجاسف، افیون، تخم سداب، برگ سداب، زعفران، فلفل سیاہ، سنبل الطیب، شوکران، افیون، کافور، تمباکو، نوشادر، کاکچ، شورہ قلمی وغیرہ۔ یہ دوائیں داخلی طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان میں سے کچھ دوائیں اعصاب کو تحریک دے کر پسینہ لاتی ہیں اور بعض جلدی عروق کو پھیلا کر پسینہ لاتی ہیں۔

خارجی طور پر تفریق کے لیے بخور، آبنور اور انکباب وغیرہ طریقے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ ذیل میں اس زمرے کے چند نسخے تحریر ہیں:

بابونہ، ناخونہ، سیوس گندم، خطمی ہموزن، پانی میں جوش دے کر حسب دستور بخور کریں۔
تخم کتان، تخم تیرہ تیزک، تخم گذر، تخم شلجم، بلباب، سداب، برگ کرفس، گندنا، بادیان، ہر ایک 17 گرام، کرم کلہ 30 گرام، پیاز 335 گرام، روغن زیتون 400 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو 30 لیٹر پانی میں جوش دیں، جب میں لیٹر رہ جائے تو چھان کر اسی نیم گرم پانی میں آبنور کرائیں۔ ایک گھنٹے بعد پانی سے نکال کر جسم کے کپڑے سے خشک کر کے گرم کپڑے اڑھا دیں تاکہ پسینہ بہ آسانی خارج ہو جائے۔
انکباب (بھپارہ) کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں۔
قیصوم، بابونہ، اکلیل الملک ہر ایک 35 گرام، مرزنجوش، پوست بادیان، پوست بچ کرفس، گل سرخ ہر ایک 18 گرام۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں جب تہائی رہ جائے تو حسب دستور بھپارہ کریں۔

تے Vomiting

حمی کے ابتدائی مرحلے میں مقیات (تے لانے والی دوائیں) کا استعمال اطباء مفید تصور کرتے ہیں۔ نوبت/متلی اور ابکائی کی صورت میں یہ اصول علاج ازالہ مرض میں بے حد مفید ہے۔ ان اوقات میں سببیں اور گرم پانی پلانے سے ہی تے ہو جاتی ہے۔ بہر حال

قوی مقیات سے احتراز لازمی ہے۔ ذیل میں چند تے آور لئے تحریر کیے جا رہے ہیں:

صفراوی خلط کی صورت میں — آتش جو/ آب پالک/ آب خبازی 150 ملی لیٹر میں سکینجین قندی 9 گرام ملا کر نیم گرم نوش کرائیں اور کچھ عرصہ بعد بدستور تے کرائیں۔

بلغی خلط کے غلبہ کی صورت میں — تخم ترب 7 گرام، تخم شبت 3 گرام، نمک طعام 2 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر شبد میں ملا کر استعمال کرائیں اس کے کھانے سے اگر از خود تے آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ گرم پانی نوش کرائیں۔

بلغی اور صفراوی دونوں خلطوں کی صورت میں — اصل السوس مقشر نیمکوب تخم شبت ہر ایک 15 گرام، آتش جو 12 ملی لیٹر، تخم خبازی 12 گرام — تمام دواؤں کو 145 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے تو مل چھان کر شربت افیون 18 ملی لیٹر حل کر کے سرکہ انگوری سے ترش کر کے نوش کرائیں۔ تھوڑی دیر بعد حسب دستور تے کرائیں۔

سوداوی خلط کے غلبہ کی صورت میں — ایک مولی کو چیر کر اس کے اندر خربق سیاہ بھر دیں اور سکینجین میں ڈال کر رات بھر بھگوئے رکھیں، صبح کو مولی کھلا کر سکینجین عسلی، اویا سرخ کے پانی میں ملا کر نوش کرائیں اور حسب دستور تے کرائیں۔

ادرار To Promote the Discharge

یہ اصول عام طور سے راولبی امراض (حمی) میں مستعمل ہے۔ اس میں نفع کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ مضحجات کے بغیر ادرار کرانا خلاف اصول معالجہ ہے۔ تاہم شدید ضرورت کے تحت (جب مادہ مرض نفع کا موقع نہ دے) ادرار کر سکتے ہیں۔ ذیل میں چند لئے تحریر ہیں۔ مزاج اور خلط کی رعایت سے ان میں سے کوئی نسخہ منتخب کر سکتے ہیں۔

نشاہت، مغز تخم کدو، کتیرا، رب السوس، خشخاش، مغز تخم خیارین، تخم خرفہ، ہر ایک 10.5 گرام، اجوائن خراسانی 7 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھا کر ہموزن نبات سفید ملا کر بنوف تیار کریں اور 8 گرام ہمراہ شربت خشخاش استعمال کرائیں۔ مدر بول ہے۔

بادیان، افیون ہر ایک (نیمکوب) 7 گرام، 125 ملی لیٹر پانی میں اس قدر

جوش دیں کہ نصف رہ جائے پھر اس میں تخم خیارین، تخم خربوزہ، ہر ایک 10.5 گرام، چیں چھان کر ملائیں اور نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔ مدر بول ہے۔

نضج

حمیات خلطیہ / غفونیہ میں اگر موقع ہو تو نضج کا اصول اختیار کریں۔ یہ طریقہ علاج مرض کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ تاہم اس میں کچھ دیر ہوتی ہے۔ خلط کی رعایت اس میں بھی از حد ضروری ہے۔ ذیل میں چند نئے تحریر کیے جا رہے ہیں مادہ مرض کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک نئے کو منتخب کر سکتے ہیں۔

صفراوی خلط کے نضج کے لیے یہ نئے استعمال کرائیں۔

گل بنفشہ، گل سرخ، تخم قطعی، تخم کاسنی، شاہترہ، عنب الثعلب، ہر ایک 7 گرام، گل نیلوفر 5 گرام، عناب، آلو بخارا، ہر ایک 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کول صاف کر کے ضمیرہ بنفشہ / گلقدہ آفتابی 25 گرام ملا کر دوبارہ چھان کر 3-5 دن استعمال کرائیں۔

گل بنفشہ، گل نیلوفر، شاہترہ، تخم کاسنی، بیخ کاسنی، گل سرخ، ہر ایک 7 گرام، مناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کول چھان کر شربت نیلوفر / سبکچمین 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
بلغی خلط کے نضج کے لیے یہ نئے استعمال کرائیں۔

بیخ بادیان، بیخ کرفس، بیخ کاسنی، بیخ اذخر، اسطوخودوس، ہر ایک 7 گرام، انجیر زرد 2 عدد، مویز منقی 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں دے کر مل چھان لیں۔ شہد 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

بادیان، اصل السوس مقشر، ہر ایک 5 گرام، پر سیا دشاں 7 گرام، انجیر زرد 21 عدد، مویز منقی 9 عدد۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقدہ عسلی 50 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

سوداوی غلط کے نفع کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔

شابتہ، بادرنجبویہ، بادیان ہر ایک 7 گرام، اصل السوس مقشر 5 گرام، سپٹاں 9 عدد، عتاب 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر گلقد عسلی 15 گرام / تربجین ہموزن ملا کر نوش کرائیں۔

سوداوی غلط کے نفع میں غلط محترق کی رعایت سے نسخہ تجویز کرنا زیادہ سودمند ہے۔

اسبال

جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو تحقیق و اسبال کی غرض سے یہ نسخے (حسب رعایت) غلط استعمال کرائیں۔

صغراوی غلط کے اسبال کے لیے — شابتہ، سنا، مکی، ہر ایک 9 گرام، تخم کاسنی 7 گرام، تخم کشوت 5 گرام، (صرہ بست) پوست بلبلہ زرد 12 گرام، آلو بخارا 15 عدد، سپٹاں 20 عدد، عتاب 9 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شیر خشک 25 گرام، مغز فلوں خیارشیر، تربجین ہر ایک 50 گرام ملا کر اوپر سے روغن بادام ملی لیٹر ڈال کر نوش کرائیں۔

پوست بلبلہ زرد، پوست بلبلہ کابل، بلبلہ سیاہ، سنا، مکی، زرد شک، گل بنفشہ، ہر ایک 18 گرام، کتیرا 9 گرام، حقونیا مشوی 4.5، مغز فلوں خیارشیر 85 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام شیریں 20 ملی لیٹر میں چرب کریں اور شہد میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں اور ورق نقرہ میں لپیٹ کر 9-7 گرام کھلائیں۔

باقی غلط کے اسبال کے لیے — تربد سفید، حب النیل ہر ایک 2.7 گرام، ایارج فیرا 3 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب بادیان میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں 9-12 گرام ہمراہ آب نیم گرم صبح کو کھلائیں۔

گل بنفشہ، زوفا خشک، پرسیاوشاں، بادیان نیم کوفتہ، اصل السوس مقشر ہر ایک 9 گرام، مویز منقی، عتاب سپٹاں، ہر ایک 15 عدد، انجیر خشک 7 عدد — تمام دواؤں کو 1


لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے تو مغز فلوں، خیارشیر، ترنجبین گلقد ہر ایک 35 گرام حل کر کے مل چھان لیں اور روغن بادام 3 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

سوداوی خلط کے اسہال کے لیے — غاریقون، ماش سفید، گوگل، تربد مدبر، پوست بلبلہ زرد، کتیرا سفید، لاجورد مغسول ہر ایک 4 گرام، ایارج فیقر 31 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام شیریں سے چرب کر کے پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 7-9 گرام میں ورق فقرہ 3 عدد لپیٹ کر نصف شب میں گرم پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔

بلبلہ سیاہ 30 گرام، بستانج میمونہ 15 گرام، اقیقون دلائی 27 گرام، برگ سنا، مکی، اسطوخودوس 21 گرام، گل سرخ 12 گرام، برگ گاؤ زبان، برگ بادرنجبویہ، ہر ایک 9 گرام، انیسون، بادیان ہر ایک 6 گرام، تربد مصوف 3 گرام، زنجبیل 1.5 گرام، خربق سیاہ 1 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور حجر ارمی، لاجورد مغسول، نمک سیاہ، غاریقون ہر ایک 1 گرام پیس کر ملائیں اور نوش کرائیں۔ حسب ضرورت صبر ستوطوی اور تخم حنظل ہر ایک 1 گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا تمام اخلاط کے مسہلات کے بعد مبردات کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ صغریٰ خلط کے اسہال کے بعد تبرید کی غرض سے اسبنول مسلم 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ بلغمی خلط کے اسہال کے بعد گلقد آفتابی 25 گرام، عرق بادیان 150 ملی لیٹر میں مل چھان کر تخم ریحان 4 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

سوداوی خلط کے اسہال کے بعد آملہ مربی گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد لعاب گاؤ زبان 5 گرام پانی میں نکال کر شربت انار 25 ملی لیٹر حل کر کے تخم ریحان 7 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ بہر حال حیات عفنہ/خلطیہ میں قابض امعاء و عروق مبردات مثلاً قرص کافور، قرص طباشیر استعمال نہ کرائیں بلکہ مبردات غیر قابضہ مثلاً آب برگ خرد، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شیرہ تخم کاہو، لعاب بہدانہ، آب انار ترش، آب انار شیریں، زلال تمر ہندی، آلو بخارا عرق نیلوفر، عرق گلاب وغیرہ بروئے کار لائیں۔



حمیات حادہ کا اصول علاج

LINE OF TREATMENT FOR ACUTE FEVER

اس میں ”حمی کا عام اصول علاج“ کے ذیل میں بیان کردہ اصولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وقتی تقاضوں اور ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مہردات اور مقلات حرارت، استعمال کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصولی علاج (حمی کا عام اصول علاج میں بیان کردہ ہے) بروئے کار لایا جاتا ہے، تبرید اور تنقیل حرارت کا مقصد صرف اس قدر ہوتا ہے کہ غیر معمولی ازدیاد حرارت سے بعض غیر معمولی عوارض نہ پیدا ہو جائیں۔ اس اصول کو بروئے کار لانے سے بعض اوقات تشخیص مرض میں معالج کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شدید سبجوری کے تحت ہی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

”تنقیل حرارت“ خارجی اور داخلی دونوں طور پر کی جاتی ہے اور تاثیر کے اعتبار سے ان کی درج ذیل دو قسمیں ہیں۔

(I) مہردات خفیفہ

(II) مہردات قویہ

(I) مہردات خفیفہ:—

اس زمرے کی دوائیں تقلیل حرارت میں یک بیک نمایاں کردار نہیں ادا کرتیں بلکہ یہ طبیعت کے لیے تسکین اور راحت کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔ لعاب اسبغول، لعاب بہدانہ، سکنجبین، سرکہ، آب لیموں، زلال تمر ہندی، زلال آلو بخارا، آب انار، آب خرفہ، آب کدو، آب خیاریں، آب کاسنی، آب تربوز وغیرہ دوائیں اسی قبیل کی ہیں۔

(II) مہردات ثویہ:—

اس زمرے کی دوائیں تقلیل حرارت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں ان کے استعمال سے جسمانی درجہ حرارت بہت جلد اعتدال پر آجاتا ہے یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوائیں طبیعت کی قوت سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اس لیے ان کے بد اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، تاہم ضرورت شدید ہوتی ہے۔ اس لیے بد اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے یا ان میں مصلح دوائیں شامل کر کے بروئے کار لائی جاتی ہیں۔ یہ دوائیں جس سرعت کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال پر لاتی ہیں ان کا اثر زائل ہونے کے بعد اسی شدت پر درجہ حرارت دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ اس قبیل کی دوائیں عام طور سے جدید طریقہ علاج میں مستعمل ہیں۔

تقلیل حرارت کے لیے خارجی طور پر درج ذیل تدابیر بروئے کار لائیں۔
مریض کے ماحول کو کسی طریقے سے سرد کرنے کی کوشش کریں۔
ہاتھ، پیر میں ایک ساتھ، خشک کپڑے/سوزھے کی تازہ پتیوں سے ٹکڑے سے انگلیوں کی طرف مالش کریں۔ جب پتیاں سیاہ ہو جائیں تو دوسری سبز پتیاں استعمال کریں۔

سرد پانی سے اسفنج کریں۔
برف کی تھیلی سر اور سینہ پر رکھیں۔
مقام جگر پر سرد پانی دھاریں۔

مریض کو 70 درجہ حرارت ف. کے پانی سے غسل کرائیں۔
 صندل، کافور، کشیز بزر، کاسنی سبز وغیرہ کا لپ مقام قلب پر رکھیں۔
 آب تربوز، آب خیارین، آب خرقہ میں روغن گل اور تھوڑا سا کافور ملا کر حقنہ کرائیں۔
 واضح رہے کہ مذکورہ بالا تدابیر مرض کا علاج نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنانے سے
 بڑھی ہوئی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ مریض کو بھی کسی قدر راحت حاصل ہوتی ہے اور معالج
 کے لیے مزید پیچیدگیوں پر توجہ دیے بغیر اصل علاج بروئے کار لانا آسان ہو جاتا ہے۔



تشخیص مزاج

DIAGNOSIS OF TEMPRAMENT

مرض کی تشخیص میں خلطی مزاج کی خصوصی علامتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ذیل میں ان پر سرسری گفتگو کی جارہی ہے۔

(I) دموی مزاج:—

یہ گرم و تر ہوتا ہے۔ علاماتی طور پر جلد گرم اور ملائم ہوتی ہے۔ جسم کی رنگت سرخ و سفید، گوشت زیادہ اور بدن ٹھوس ہوتا ہے۔ چربی زیادہ نہیں ہوتی، نیند اعتدال سے آتی ہے۔ اعضا کی نشو و نما اعتدال سے ہوتی ہے۔ آنکھیں پیازی رنگ کی، روشن ہوتی ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے خوش خلق ہوتا ہے، حسن ظن کی صفات سے آراستہ ہوتا ہے، بہادری کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ جسمانی صفات کے ضمن میں اس قدر وضاحت ضروری ہے کہ موسم اور جغرافیائی حالات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(II) صفراوی مزاج:

یہ گرم خشک ہے۔ علاماتی طور پر جلد گرم اور کسی قدر کھردری ہوتی ہے۔ اعضا کی


نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے۔ بدن نہ زیادہ فریہ نہ زیادہ دبلا بلکہ متوسط درجہ کا ہوتا ہے۔ بال بکثرت زیادہ موٹے اور بہت جلد مگتے ہیں۔ جسم کی رنگت سفیدی مائل زرد ہوتی ہے۔ آنکھیں بھی زردی مائل ہوتی ہیں۔ اگر حرارت کا غلبہ ہو تو سینہ کشادہ، ہاتھ پیر بڑے اور رگیں فراخ ہوتی ہیں، نبض عظیم چلتی ہے۔ مفاصل کے قریب کے عضلات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ پیوست کا غلبہ ہو تو بال گھونگر یا لے آگتے ہیں۔ بہر حال غصہ زیادہ اور دیر تک رہتا ہے۔

(III) بلغمی مزاج:۔

یہ سرد و تر ہے۔ علاماتی اعتبار سے جسم ملائم، خمی اور سرد ہوتا ہے۔ جسمانی رنگت سفید نیلگوں ہوتی ہے، بالوں میں سیاہی زیادہ نہیں ہوتی اور یہ جلد سفید ہو جاتے ہیں، آنکھیں سفید ہوتی ہیں، جسم ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، بھوک کے وقت قوی مضطرب ہوتے محسوس ہوتے ہیں، جسم میں خون کی بھی کمی ہوتی ہے۔ سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے، نیند بہت زیادہ سلتی ہے۔ اعضا ضعیف ہوتے ہیں، طبیعت میں کسل اور سستی ہوتی ہے، مزاج میں تلون بہت زیادہ ہوتا ہے۔

(IV) سوداوی مزاج:۔

یہ سرد و خشک ہے۔ علاماتی طور پر جسم سرد اور کھردرا ہوتا ہے۔ جسم سیاہی مائل اور بہت زیادہ لاغر ہوتا ہے، آنکھیں سفید، نیلگوں ہوتی ہیں، جوڑ (مفاصل) اور حجرہ کی غفروں نمایاں ہوتی ہے، بال موٹے اور کھردرے ہوتے ہیں، ناک پتلی اور اونچی ہوتی ہے، ہمیشہ فکر میں غلطاں و پیچاں رہتے ہیں، بہت زیادہ خاموش رہتے ہیں۔



تشخیص نہ ہونے کی صورت میں علاج


TREATMENT OF UNDIAGNOSED CENES

بعض دوسرے امراض کی تشخیص کی طرح جی کی تشخیص میں بھی بعض اوقات معالج ناکام ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے تو بھی معالج کو کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ اس مرحلے میں کم قوت اور مشترک نفع کی حامل دوائیں استعمال کرانی چاہیے۔ اسی طرح ملطف تدابیر بروئے کار لانی چاہیے، حذاقت کا تقاضہ بھی یہی ہے، مثلاً اگر معالج کو عنونی بخار کی نوعیت معلوم نہ ہو۔ اسی طرح اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کبد، معدہ، امعاء اور طحال میں سے کس میں خلل ہے۔ گویا معالج تشخیص مرض میں مضطرب ہے۔ ایسی صورت میں اطباء نسخے کو کچھ اس انداز میں مرتب کرتے ہیں کہ جو مریض کے عمومی کوائف اور علامات پر حاوی ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا کیفیات میں خلل شکم کا یہ نسخہ مجرب ہے۔

گل بنفشہ، بادیان، بیج کاسنی ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، مویر متقی 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر ضمیرہ بنفشہ 50 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ زلہ، زکام کھانسی اور تنفسی شکایات میں بھی یہ نسخہ مفید ہے۔ خواہ اصل مرض کی تشخیص ابھی نہ ہو سکتی ہو۔ ہاں اپنی حذاقت سے اس میں ختم غلطی،

اصل السوس، تجم خبازی وغیرہ نزلہ میں مفید دوائیں شامل کر سکتا ہے۔
 حمی کی تشخیص میں غیر یقینی صورت پیش آنے پر خفیف ملینات بھی استعمال کرانا
 سود مند ہے۔ بشرطیکہ مریض کو آنتوں کا کوئی ایسا مرض نہ ہو جس میں ملینات/مسهلات کے
 استعمال کی ممانعت ہو۔

حمی یوم کے علاوہ، حمی عنونیہ وغیرہ میں تشخیص نہ ہونے پر بھی ان عمومی تدابیر اور
 اصول علاج (تلمین، تعریق، اورار اور تے وغیرہ) کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ اور ان
 کے استعمال سے کسی قدر فوائد ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ حمی کی بعض صورتوں میں مہر دات کے
 خارجی استعمال پر احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر حرارت غیر معمولی طور پر شدید ہو تو
 مرض کی نوعیت کی تشخیص و تعیین کے بغیر سرد تدابیر بروئے کار لانا چاہیے کیوں کہ اس وقت حمی
 کی حدت اور حرارت کی شدت کو ختم کر کے بعض دوسری اہم پیچیدگیوں کا حفظ یا تقدم مقصود
 ہوتا ہے۔



ادویہ حمی کی نوعیت عمل اور فلسفہ علاج

FEVER DRUGS, MODE OF ACTION AND
PHYLOSOPHY OF TREATMENT

ازدیاد حرارت (حرارت جسمانی کی زیادتی) میں کمی پیدا کرنے یا اعتدال پر لانے کے لیے داخلی اور خارجی طور پر جن دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو درج ذیل عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

(I) منفضیات

(II) ملینیات/مسهلات Laxative/Purgative

(III) متقیات Vomitives/Emetics

(IV) مدرات

(V) معرقات

(VI) مبردات/مطفیات

(VII) مانعات/دافعات حرارت/حمی

(VIII) مخصوص ادویہ (بالخصوص اثر کرنے والی دوائیں)

مذکورہ بالا زمرے میں تقسیم شدہ دواؤں کے فوائد اور نوعیت کار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوائیں صرف تخفیل حرارت کا کام کرتی نظر آتی ہیں ان کو ”مقلات حرارت“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا اثر عارضی ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے حمی کی شدت وحدت کو وقتی طور پر کم کر کے دیگر عوارض سے بچانا اور خود معالج کو اس درمیان غور و فکر کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ دوسرے زمرے کی دواؤں کا کام مادہ مرض کا تحقیقہ اور اعتدال میں لانا ہے۔ ان کو ہم ”مستقیات اور معدلات“ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ابدی اور مستقل ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان ادویہ کے فوائد اور خواص تحریر کیے جا رہے ہیں۔

(۱) منضجات :-

ادویہ منضجہ (خج پیدا کرنے والی دوائیں) دراصل قوی الاثر مسہلات کے استعمال کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مزمن حمی میں منضج دواؤں کا استعمال شفا یابی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے اسی لیے اطباء اس مرحلے میں منضجات کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ حمی حادہ میں بھی اس اصول کا اختیار کرنا سودمند ہے لیکن اگر خج کے انتظار تک مادہ مرض میں ہیجان ہو کر اعضا رئیسہ کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو نضج کا انتظار کیے بغیر تحقیقہ مواد کی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نضج سے غرض دراصل مواد کو پختہ کر کے، خارج ہونے کے قابل بنانا ہے۔ اس لیے بعض اوقات غلیظ خلط کو رقیق اور رقیق خلط کو غلیظ کر کے قابل اخراج بنایا جاتا ہے مثلاً خلط صفرادی کو غلیظ اور خلط سوداوی کو رقیق کر کے ہی قابل اخراج بنایا جاسکتا ہے۔ حمی حادہ کے ذیل میں یہ نکتہ ذہن میں ہے کہ حمی حادہ کی مدت سات دن ہو۔ اس میں منضج کا انتظار خداقت کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ حمیات حادہ جن کی مدت سات دن سے زائد ہو ان میں منضجات کا استعمال اصول علاج کے عین مطابق ہے اور حمیات مزمنہ میں منضجات کا استعمال نہ کرنا اصول علاج کے خلاف ہے۔

(II) ملینات/مسهلات:—

ان کے استعمال کی غرض مادہ مرض کا جسم سے استفرغ ہے۔ چنانچہ اس کے استعمال سے جسم میں حرارت پیدا کرنے والے مواد اور ان کے ساتھ دوسرے معاون معوی فضلات/خارج ہو جاتے ہیں اور لازمی طور پر طبیعت میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی ”قوت مدبرہ“ مرض کے ازالہ کے لیے نئی توانائیوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہو جاتی ہے۔

(III) مقیات:—

ان کے فوائد بھی ملینات اور مسهلات جیسے ہی ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ اول الذکر (ملینات/مسهلات) کے ذریعہ حقیقہ مواد، امعاء (آنتوں) سے ہوتا ہے اور اس میں معدی فضلات و مواد کا حقیقہ ہوتا ہے۔

(IV) مدرات بول:—

ان کے استعمال سے بھی حقیقہ فضلات جسمانی مقصود ہوتا ہے۔ ان کی نوعیت عمل یہ ہوتی ہے کہ گردوں کا عمل تیز کر کے خون کے فضلات کو پیشاب کے راستے خارج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جہاں خون سے کمی ہو ادا کم ہو جاتے ہیں وہیں طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور ”قوت مدبرہ بدن“ ایک نئی امنگ کے ساتھ مقابلہ و ازالہ مرض پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ مدرات بول کا استعمال رطوبی حمیات حادہ میں ہی زیادہ سودمند ہے، دیگر حمیات حادہ میں اس کے استعمال سے احتراز ضروری ہے۔

(V) معرقات:—

ان کے ذریعہ تقلیل حرارت اور حقیقہ بدن دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم اس میں حرارت بہت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کافی احتیاط درکار ہوتی ہے۔ ان دواؤں کی نوعیت عمل یہ ہے کہ ان کے استعمال سے اعصاب مفرزہ کے ذریعہ غدِ عرقہ میں تحریک پیدا ہوتی اور پسینہ کا اخراج عمل میں آتا ہے۔


(VI) مبردات/مطفیات:—

اس ذیل میں (فی الحال) وہ دوائیں بیان کی جاتی ہیں جو بالفعل بارد ہیں۔ مثال کے طور پر سرد پانی/سرد ہوا کی خارجی تدابیر یا سرد مشروبات کا داخل استعمال۔ ان دواؤں کی نوعیت عمل یہ ہے کہ اپنے بالفعل بارد ہونے کی وجہ سے یہ براہ راست حرارت کو جذب کر کے حمی کی حدت و تیزی میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور جسمانی درجہ حرارت اعتدال کی طرف آنے لگتا ہے۔

(VII) مانعات/دافعات حرارت/حمی:—

اس ذیل میں وہ دوائیں آتی ہیں جو بالفعل بارد نہ ہونے کے باوجود اپنے عمل اور اثر سے جسمانی حرارت کی زیادتی کو کم کر دیتی ہیں۔
(VIII) مخصوص ادویہ:—

اس ذیل میں وہ دوائیں آتی ہیں جو بالخاصہ بعض مخصوص مواد اور سمیات میں توڑ پھوڑ پیدا کر کے ان کے ضرر اور نقصانات کو زائل کر دیتی ہیں اور اس طرح وہ کسی مواد بے اثر ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آنے لگتا ہے۔



حمی عفونیہ اور سرد پانی COLD WATER IN SEPTIC FEVERS

حمی عفونیہ میں سرد پانی کے استعمال کی کچھ شرائط ہیں، جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(I) سرد پانی کے موانع:—

درج ذیل صورتوں میں سرد پانی کا استعمال نقصان دہ ہے۔

(I) مادہ مرض کے خام اور غلیظ ہونے کی صورت، میں — مثلاً حمی لثقہ اور حمی مواظہ بلغمیہ میں، جب کہ درجہ حرارت میں کمی واقع ہو۔

(II) ضعف معدہ / ضعف کبد / برودت معدہ / برودت کبد ہو۔

(III) معدہ / امعاء / کبد / طحال میں درم کی صورت میں۔

(IV) حمی کے ساتھ نزلہ / کھانسی / زکام / درد حلق / درد سینہ وغیرہ ہو۔

(V) اعضا میں درد ہو۔

(VI) حرارت غریزیہ میں کمی / عام جسمانی ضعف / لاغری / قلت خون وغیرہ کی

صورت میں۔

(VII) سرد پانی کے استعمال کی عادت نہ ہونے کی صورت میں۔

(II) سرد پانی کے استعمال کی ضرورت :-

درج ذیل صورتوں میں سرد پانی کا استعمال سودمند ہے۔

(I) غلبہ صفراء

(II) غلیظ مادہ میں نفع آگیا ہو۔


(III) حرارت غریزہ کافی مقدار میں ہو/ جسم فریہ ہو

(IV) احشاء میں درم نہ ہو۔

(V) نزلہ/ زکام/ کھانسی/ ریوی تکالیف نہ ہوں

(VI) سرد پانی کے استعمال کا عادی ہو۔

واضح رہے کہ بعض حالات میں سرد پانی کا استعمال مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی عضو میں درم ہو اور ساتھ میں شدید حمی اور پیاس کا غلبہ ہو، نیز یہ اندیشہ ہو کہ سرد پانی کے استعمال نہ کرنے سے اعضا میں تحلیل واقع ہو کر لاغری پیدا ہو جائے گی یا غیر معمولی حرارت اور ہیوست سے دماغ اور اعصاب ماؤف ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں سرد پانی کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ اس کے استعمال سے اگرچہ درم کے تحلیل ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے گی لیکن اس کے نہ استعمال کرنے سے جن پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ بعض اوقات سرد پانی کی بجائے سکنجبین استعمال کرائی جاتی ہے جو مسکن پیاس ہونے کے ساتھ ساتھ ملطف مواد بھی ہے۔ اس طرح یہ پانی سے زیادہ سودمند ہے بلکہ موانع کی صورتوں میں اس کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔



احکام غذا

DIET PRINCIPLES

حمی (بخار) میں غذا کی مقدار اور استعمال کی نوعیت کو بہت اہمیت حاصل ہے کیوں کہ جہاں غذا جسمانی قوت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہیں یہ ازدیاد مرض (بیماری کو بڑھانا) میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جب طبیعت کو ہضم غذا کے کاموں سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ جسمانی مواد میں تغیر و استحالہ کر کے اپنے کام کو زیادہ آزادی اور شدت کے ساتھ انجام دینے لگتی ہے اور یہ کیفیت دراصل ازالہ مرض کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ اس کے برخلاف جب وہ ہضم غذا کے کاموں میں بھی مشغول رہتی ہے تو وہ اپنی توجہ کو مرض کے ازالہ کے لیے خاطر خواہ طور پر مرکوز نہیں کر پاتی۔ تاہم اگر مریض کی غذا بالکل بند کر دی جائے تو جسمانی قوتی میں مزید ضعف اور انحطاط پیدا ہو جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور اس وقت مرض کو اور بھی تیزی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے معالج کو ان تمام امور پر توجہ دیتے اور کیفیت اور مدت مرض وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تلطیف / تقلیل / عدم غذا وغیرہ اصولوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ کیونکہ کیفیت مرض اور مدت مرض میں اختلاف کے ساتھ ساتھ غذائی احکامات میں بھی تغیر و

تبدل ضروری ہو جاتا ہے۔

حمیات حادثہ میں اگر غیر معمولی شدت ہو، ساتھ ہی مدت مرض 4-7 دن ہو اور اس عرصہ میں قوی جسانی میں انحطاط کا اندیشہ نہ ہو تو قوت مدبرہ کو مادہ مرض پر کلی طور پر مسلط کرنے کے خیال سے مریض کو فاقہ کراتا چاہیے اور اگر اس فاقہ سے زوال قوت کا تھوڑا بھی اندیشہ ہو تو صرف ملطف غذائیں مثلاً آب انار، ماء الحسل اور جلاب وغیرہ استعمال کرائیں۔

اگر حمی حادثہ 15 دن تک رہنے والا ہو تو ایام بحران کے علاوہ دنوں میں غیر معمولی ملطف غذاؤں کی بجائے معمولی ملطف، بلکہ غذائے متوسط مثلاً دودھ، آش جو اور ساگودانہ وغیرہ کھلائیں۔

حمیات مزمنہ، جن کی مدت 21-40 دن یا اس سے بھی زیادہ ہو، ان میں ملطف غذاؤں کی بجائے اوسط درجہ کی غذائیں کھانا سودمند ہے۔
بالفرض مرض کے حاد یا مزمن ہونے کی تشخیص نہ ہو سکے تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ملطف غذائیں استعمال کرائیں جائیں اور اس مرحلے میں مریض کے قوائے جسانی کو بھی مد نظر رکھیں۔

ذیل میں حمی کے مریض کی غذائیں تحریر کی جا رہی ہیں۔

- 1- ماء الشعیر، کشک الشعیر، ساگودانہ، اراروٹ، موگ کی دال کا پانی، چنے کی دال کا پانی، چاول کی پیچ، دھان کی کھیلوں کا پانی، موگ کی ملائم اور گلی ہوئی کھجڑی۔
- 2- دودھ، دودھ کا پانی، بکرے کے گوشت کی بخنی، پرندوں کی بخنی۔
- 3- بھوا، پالک، چولائی، خرفہ کا ساگ، شلجم، ٹڈے، پرول، کھیرے، گلڑی کی ترکاری، کدو۔


4- آب انار، آب نارنج، سکنجبین، ماء الحسل، آب تربوز، جلاب۔

5- چوزے، مرغ، پرندے (کبک تیز، بیڑ وغیرہ) بیضہ نیم برشت، چھوٹی

مچھلیاں۔

لطافت اور غلظت کے اعتبار سے غذا کے مدارج:—
مریض حمی کے اعتبار سے غذا کے درج ذیل تین مدارج ہیں۔

مدارج غذا



(الف) غیر معمولی لطیف:—

اس زمرے میں درج غذائیں آتی ہیں۔
شربت گل، سکنجبین کا رقیق مخلول، آب نارنج، آب تربوز، آب انار، ماء الشعیر
رقیق، چاول کی پتلی پیچ، پتلا سا گودانہ، اراروٹ، دودھ کا پھاڑا ہوا پانی، دھان کی کھلیں پانی
میں پکی اور چھانی ہوئی کا پانی، پنے کی دال کا پتلا پانی، مونگ کی دال کا پتلا پانی۔

(ب) معمولی لطیف:—

ماء الشعیر گاڑھا، چاول کی معمولی گاڑھی پیچ، معمولی گاڑھا اراروٹ، مونگ کا
معمولی گاڑھا پانی، پنے کی دال کا معمولی گاڑھا پانی، دودھ، بکری کے گوشت کی بخنی اور
شورب، پرندوں کی بخنی اور شوربے۔

(II) غذائے متوسط:—

آش جو گاڑھا، زردی بیضہ مرغ نیم برشت رقیق، روٹی کے چھلکے کا چورا،

ساگودانہ، چاول کی گاڑھی، روٹی کا گاڑھا محلول، سوئگ کی بہت ہی رقیق اور ملائم کچھڑی۔

(III) غذائے غلیظ:

ملائم کچھڑی، گلی ہوئی دالیں، پرانا چاول، پھلکا، حلوان کا گوشت، پرندوں کا گوشت وغیرہ۔

غذاؤں اور مناسب مشروبات کے استعمال کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کو مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھلانا، پلانا چاہیے تاکہ طبیعت پر گراں نہ پڑے، اسی طرح بعض اوقات ایک غذا کے ساتھ کوئی دوسری غذا کھلانے سے کسی قدر خراب اثر مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً ماء الشعیر اور سبجین کو ایک ساتھ استعمال کرانے سے کرب و بے قراری طاری ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سبجین ایک رد عمل کے ذریعہ ماء الشعیر کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے طبیب اس طرح کی غذاؤں کے بارے میں مریض کو پہلے سے آگاہ کر دے۔



مریض کا مسکن اور تیمارداری

RESIDENCE OF THE PATIENT AND NURSING

حمیات حادثہ میں مریض کی تیمارداری اور اس کے جائے قیام کی حالت پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے عوارض شدید ہوتے ہیں۔ اس لیے اطباء کا خیال ہے کہ مریض کے جائے قیام پر ایسی تصاویر اور پیمانہ انگیز اشیاء ہوں جو اس کے اختلاط ذہن و عقل میں مزید اضافے کا باعث ہوں، بلکہ اس کا کمرہ کشادہ ہو اور تازہ ہوا کا گزر بھی آسانی سے ہو رہا ہو۔ حسب ضرورت سرد خوشبوئیات وغیرہ کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے بستر پر بید، ہی اور ریچمان وغیرہ کی ہری پتیاں ڈالیں، مریض کے سکون اور راحت کی جملہ تدابیر بروئے کار لائیں۔

مریض کی جسمانی صفائی اور طہارت پر بھی خصوصی توجہ دیں، جمی دباہیہ میں تو بے حد احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے اور طہارت جسمانی کے ساتھ طہارت مکانی بھی درکار ہوتی ہے۔ ان حمیات میں دانت اور منہ کی صفائی پر بے حد توجہ دینی چاہیے۔

شدید ازدیاد حرارت میں مریض کے جسم سے غیر ضروری کپڑے کم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ پیر کو حسب ضرورت کھلا رکھیں یا ڈھانپ کر گرم رکھیں اور کبھی خارجی تدابیر کے طور پر پاشویہ کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی برف کی قحطی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اگر کسی کی سمیت اور روانیت کی وجہ سے اعضا کی حس متاثر ہو جائے تو اس بابت بھی معالج کو توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً کے حسی اعصاب اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مریض کو پیچہ بھی نہیں چلتا اور بول (پیشاب) بے اختیار خطا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ طبیب جب بیمار داروں سے اس بابت دریافت کرتا ہے تو وہ لوگ احتباس بول یا تقطیر بول کی شکایت نہیں کرتے اور یہی بتاتے ہیں کہ مریض کا پیشاب خاصی مقدار میں ہو رہا ہے۔ لہذا معالج کے فرائض میں سے ہے کہ وہ مریض کے نظری معائنہ کے وقت مثلاً کو اچھی طرح دیکھیں۔ مثلاً میں پیشاب کے رکے رہنے، بھرے رہنے کی صورت میں بیڑ (عاندہ) پر تازہ اور سو جن محسوس ہوتی ہے۔ ٹھونکنے پر بھاری آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات تقطیر البول کی شکایت ہوتی ہے۔ غرض معالج کو صرف بیمار داروں کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اگر اخراج بول، اور ار بول کی ضرورت محسوس ہو تو قاطعاً طیر کے ذریعہ پیشاب خارج کریں۔ داخلی طور پر درج ذیل ادویہ میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔

مدارت حارہ

پرسیا و شال، بادیان، خبازی، زوفا خشک، انیسون، برنجاسف، قسط شیریں، حب بلسان، کرنبوہ، پودینہ، اجوائن دلی۔

مدارت بارودہ

خار خشک، تخم خیارین، تخم خرفہ، تخم کاسنی، شورہ قلمی، آب خیار، کدو، آب تربوز، آتش جو، بنجین۔

مدارت معتدلہ

مدارت بارودہ اور حادہ میں سے منتخب کریں۔

حمیات تانیہ میں، از دیاد حرارت کے ابتدائی مرحلے میں مریض کو سونے سے منع کر دیں۔ لرزہ، قشعر یہ اور سردی وغیرہ عوارض کے وقت یہ پابندی از حد ضروری ہے کیونکہ سونے سے لرزہ اور قشعر یہ کی مدت طویل ہو جاتی ہے۔ بخار اترنے اور اس کے انتہائی مرحلے میں نیند مفید ہے۔

حمیات یوم

EPHEMERAL FEVERS


حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) کی ان اقسام میں حرارت کا ابتدائی تعلق روح (روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبعی) کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر روح کی حرارت سے جسم کی تمام رطوبات اور اعضا میں بھی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے سبب جسم کے افعال طبعیہ میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ حرارت کا تعلق چوں کہ صرف روح کے ساتھ ہوتا ہے اور روح خود ایک لطیف شے ہے اس لیے یہ بہت جلد تحلیل ہو جاتی ہے بلکہ عام طور سے 24 گھنٹے سے زائد قائم نہیں رہتی اسی مناسبت سے ”حمائے یوم“ کہا جاتا ہے۔

بعض اوقات حمی یوم ایک دن سے زائد (3 دن) تک رہتا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ دنوں تک رہے تو اس بات کی علامت ہے کہ حمی یوم، کسی دوسرے حمی میں منتقل ہو گیا ہے اور حرارت کا تعلق روح کی بجائے رطوبات جسمانی کے ساتھ قائم ہو گیا ہے۔ جالینوس کے ایک قول کے مطابق حمی یوم 6 دن تک قائم رہ سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے غلطی / دق حمی کی طرف منتقل ہوئے بغیر اتر جاتا ہے۔

اقسام

حمی یوم کی بنیادی اقسام

حمیات یوم



اس صورت میں داخلی/ خارجی اشتعالات نفسانی کی وجہ 24 گھنٹے کے لیے ازدیاد حرارت جسمانی پیش آتی ہے اور جسم کے طبعی افعال متاثر ہوتے ہیں۔

حمی یوم بدنیہ

اس میں حرارت کا تعلق جسمانی افعال و احوال سے قائم ہوتا ہے اور بعض داخلی/ خارجی اسباب کے نتیجہ میں عارضی ازدیاد حرارت جسمانی پیش آتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جسم کے افعال کی طبعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔


حمی یوم بادیہ

اس میں ازدیاد حرارت جسمانی (حمی) کا باعث خارجی اسباب ہوتے ہیں۔


حمی یوم کی ذیلی اقسام

(الف)


حمی یوم نفسانیہ



(ب)



(ج)



✦ ✦ ✦

حمی یوم غمیہ

G. EPHEMERAL FEVERS

اس مرض میں رنج و غم کی زیادتی کی وجہ سے روح نفسانی میں ایک غیر معمولی حرکت واقع ہوتی ہے اور وہ اندر ہی گھٹ کر حرارت میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے اور بخار لاحق ہو جاتا ہے۔

اسباب

(۱) رنج و غم کی زیادتی

علامات

مریض بچھا بچھا، افسردہ اور مضطرب دکھائی دیتا ہے۔ روئیداد معلوم کرنے پر رنج و غم کا سبب بتاتا ہے، روح اور خون کا میلان اندرونی جسم کی طرف ہو جانے سے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے، قویٰ میں ضعف پیدا ہو جانے کی وجہ سے آنکھیں کسی قدر دھنس جاتی ہیں اور ان کی طبعی حرکت میں بھی سستی آ جاتی ہے، پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، نبض صغیر اور ضعیف چلتی ہے، بعض اوقات نبض میں تھوڑی سی صلابت بھی ہوتی ہے، سوء ہضم کی شکایت

ہوتی ہے، جلد پر خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 مریض کے غم کے ازالہ کی تدابیر کریں۔
- 0 مفرحات استعمال کرائیں۔
- 0 آبن کرائیں۔
- 0 مبردات استعمال کرائیں۔
- 0 تبدیلی آب و ہوا کی ہدایت کریں۔
- 0 تقویت قلب کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں:
- عرق بید مشک، عرق گلاب، عرق کیوڑہ، عرق نیلوفر، عرق گاؤ زبان ہر ایک 20 ملی لیٹر میں شربت انار، شربت سیب، شربت نیلوفر ہر ایک 10 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- اگر شدید برودت درکار ہو تو شیرہ تخم خرف، تخم خیارین، مغز تخم کدوئے شیریں ہر ایک 4 گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔
- خیرہ مروارید 12 گرام میں طباشیر، لاجورد مغسول ہر ایک 1 گرام ملا کر ورق نقرہ لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خرف، تخم خیارین، شیرہ مغز تخم کدو، ہر ایک 9 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، آب کشیز سبز مرق اور عرق گلاب میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کریں اور تخم بانگلو 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- یہ نسخہ بھی مفرح کے طور پر مستعمل ہے۔
- ابریشم مقرض، مروارید ہر ایک 6 گرام، کھربا، شعی 3 گرام، گل گاؤ زبان، بار رنجو، کشیز سبز ہر ایک 12 گرام، مغز تخم کدوئے شیریں، تخم خرف، مغز تخم تربوز، ہر ایک 25

گرام، صندل سفید، طباشیر، دانہ ہیل خورد ہر ایک 12.5 گرام، بہمن سفید، بہمن سرخ ہر ایک 11 گرام، لاجورد مغسول، یا قوت رمانی ہر ایک 8 گرام، زعفران 5.7 گرام، عنبر اشہب، 4 گرام، مشک خالص، ورق طلا ہر ایک 2 گرام، ورق نقرہ 6 گرام، شربت فواکہ 125 ملی لیٹر، شربت سیب 240 ملی لیٹر، عرق گلاب، عرق بید مشک، عرق شاتبرہ ہر ایک 245 ملی لیٹر، نبات سفید 120 گرام — عنبر، مشک، زعفران اور ورق نقرہ و طلا کو علاحدہ کھل کر میں اور باقی تمام دواؤں کو باریک سفوف کی طرح کر کے محفوظ کر لیں اور نبات سفید، عرقیات اور شربتوں کو ملا کر قوام تیار کریں اس کے بعد تمام دواؤں کو ملا کر دوا تیار کریں اور 3-5 گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

o — خارجی طور پر یہ تدابیر اختیار کریں۔

صندل سفید، آب کاسنی، آب کشیز سبز مروق میں گھس کر کافور اور عرق گلاب حل کر کے سینہ پر لپک کریں۔ روغن بنفشہ، روغن نیلوفر کی مالش کریں، سرد خوشبو سونگھائیں۔



Learn Unani By Prof. Dr. A. H. Khan

حمی یوم فرجیہ JOY EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں خوشی اور مسرت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ روح، بیرون جسم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
سبب

غیر معمولی خوشی اور مسرت۔

علامات

چہرے پر غیر معمولی شادابی اور سرخی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرور کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی حرکات اور رکھ رکھاؤ سے بھی مسرت کا اظہار ہوتا ہے، پیشاب سرخ اور تیز ہوتا ہے، نبض ممتلی اور بلند ہوتی ہے۔

اصول علاج

- نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔
- سرد تیلوں سے جسم کی مالش کریں۔

- — سرد و تر غذا نہیں استعمال کرائیں۔
- — مریض کی توجہ کو دوسرے کاموں کی طرف مبذول کرائیں۔

علاج

- — قیصوم، نمام، اکلیل الملک — تینوں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اسی جوشاندہ سے غسل کرائیں۔
- — اصل السوس مقشر 3 گرام، خوب باریک کر کے شکر ہموزن کے ساتھ نوش کرائیں۔
- — مریض کو ایسے واقعات اور قصے سنائیں جن میں حزن و الم اور جد و جہد کے پہلو ہوں، فلسفیانہ مباحث میں الجھانے کی تدابیر کرائیں۔

Learn Unani By Abdul Karim Salmaan

حمی یوم سہریہ

INSOMNIOUS EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں عرصہ تک، دن رات جاگتے رہنے سے جسمانی درجہ حرارت میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

سبب

مستطسل بیداری کی وجہ سے روح میں تخمین پیدا ہو جانا۔

علامات

مریض کے حالات معلوم کرنے پر کثرت بیداری کی روئیداد ملتی ہے، فتور ہضم کی شکایت ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں بکثرت بخارات پیدا ہو کر پپٹوں میں بھر بھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات پونے اس قدر بھاری ہو جاتے ہیں کہ ان کا کھولنا دشوار ہو جاتا ہے، سوء ہضم کی وجہ سے پیشاب میں بھی تکدر ہو جاتا ہے، چہرہ بھی تھوڑا سا پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے، زردی بھی پائی جاتی ہے۔ طبیعت ست اور کسل مند ہوتی ہے، نبض ضعیف چلتی ہے۔

اصول علاج

- مکمل آرام کی ہدایت کریں۔
- مسکنات استعمال کرائیں۔
- سرد و تر اشیا کا سر پر نپول کریں۔
- مرطب حمام کرائیں۔
- صالح خون پیدا کرنے والی غذائیں کھلائیں۔
- ملحوظ رہے کہ نیند آ جانے کے بعد ان ادویہ/تدابیر کو ترک کرادیں۔

علاج

- خوردنی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔
- عرق گلاب، عرق بید مشک، ہم وزن کو نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
- شربت بنفشہ/شربت خشخاش 25 ملی لیٹر میں عرق گلاب 100 ملی لیٹر حل کر کے برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔
- شربت نیلوفر اور عرق بید مشک نوش کرائیں۔
- حسب ضرورت کسی قدر شراب نوش کرائیں تاہم احتیاط رکھیں کہ دوسری حالت میں شراب نقصان دہ ہے۔
- شربت سیب، عرق گلاب، ہر ایک 25 ملی لیٹر کو برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔

- خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
- روغن بنفشہ، روغن کدوناک میں پکائیں اور ان کی تلوؤں پر مالش کریں۔
- بنفشہ، تخم خشخاش، نیلوفر — تینوں دواؤں کو پانی میں جوش دے کر سر پر نپول کریں۔ مرطب حمام کرائیں۔ چنانچہ نیم گرم شیریں پانی سے غسل کرائیں اس کے بعد روغن

سارے جسم پر ملیں۔

روغن بنفشہ، روغن کدو، روغن نیلوفر میں سے کسی ایک کو سر میں رکھیں۔

تخم جوز مائل 500 ملی گرام، تخم کاہو مقشر، خشکاش سفید، ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر پیشانی پر مناد کریں۔

کافور، زعفران، ہر ایک 500 ملی گرام، نیلوفر، صندل، تخم کاہو، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق گلاب میں پیس کر سر پر مناد کریں۔

صندل سفید، تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم نیلوفر ہر ایک 3 گرام، زعفران 500 گرام، کافور ایک گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب کشیز بزمردی 25 ملی لیٹر، مرکب خالص، روغن گل ہر ایک 4 ملی لیٹر میں حل کر کے پیشانی پر لیپ کریں۔



Learn Unani By Abdul Wahid Saman

حمی یوم فکریہ

ANXIETY EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں غیر معمولی افکار کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

سبب

افکار کی زیادتی۔

علامات

چہرے پر افکار و خیالات کا ہجوم ہوتا ہے اور مریض غور و فکر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بیشتر مرحلوں میں خاموش رہتا ہے۔ پیشاب میں سوزش اور جلن ہوتی ہے۔ آنکھیں اندر اور بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتیں، چہرہ زردی مائل ہوتا ہے، نبض اور آنکھوں کی حرکت معتدل ہوتا ہے۔

اصول علاج

- کتری کے افکار اور خیالات سے چھٹکارا دلانے کی تدابیر کریں۔
- مریض کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے کام اور مقصد میں ضرور کامیاب

ہوگا۔ وغیرہ۔

- — تربیب دماغ کا اہتمام کریں۔
- — تبدیل آب و ہوا ضروری ہے۔
- — مذہبی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیں۔

علاج

- — تربیب دماغ کے لیے تھوڑی سی شراب میں عرق بید مشک حل کر کے نوش کرائیں۔
- — درج ذیل نسخے مفید ہیں۔
- خمیرہ مردارید 12 گرام، لاجورد مغسول، طباشیر ہر ایک 1 گرام ملا کر ورق نقرہ 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خرف، شیرہ تخم خیارین، شیرہ مغز تخم کدو ہر ایک 9 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، کشیز بنز مرق اور عرق گلاب میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کریں اور تخم بالنگو 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، عرق گلاب، عرق گاؤ زبان، عرق نیلوفر وغیرہ میں شربت انار، شربت سیب، شربت نیلوفر ملا کر نوش کرائیں۔
- شدید تیرید کی ضرورت محسوس ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
- شیرہ تخم خرف، شیرہ تخم خیارین، مغز تخم کدو ہر ایک 9 گرام عرق بید مشک / عرق کیوڑہ میں نکال کر شربت انار کے ساتھ نوش کرائیں۔
- خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
- نیم گرم پانی میں آبزین کرائیں — اس کے بعد سارے جسم پر روغن کدو، روغن بنفشہ کی مالش کریں۔
- صندل سفید، آب کاسنی، آب کشیز بنز، کافور، عرق گلاب، باہم ملا کر سینہ پر لگائیں۔
- بہدانہ، اسپنول کا لعاب آب کشیز میں نکال کر لگائیں۔
- عطر خس، عطر صندل، عطر کیوڑہ وغیرہ سرد خوشبوؤں کا نخلخہ سنگھائیں۔

حمی یوم فزعیہ FEAR EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں خوف کی شدت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور دوسری مرضی علاماتیں رونما ہوتی ہیں۔

سبب

خون کی زیادتی۔

علامات

چہرے سے خوف و ہراس کا پتہ چلتا ہے اور اس کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے۔ مریض کی سرگزشت سے خوف کے عناصر کا پتہ چلتا ہے، پیشاب ناری ہوتا ہے اور سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، نبض میں سخت اختلاف ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہیمت اور دہشت نمایاں ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس میں رحم (رحم چاہنے) کی سی کیفیت ہوتی ہے۔

اصول علاج

۵۔ خوف و ہراس کو دور کرنے کی تدابیر کریں۔

o — مفرحات استعمال کرائیں۔

o — دلجوئی کریں۔

علاج

o — شربت سیب، شربت صندل، عرق بید مشک ملا کر نوش کرائیں۔

o — شربت حماض 35 ملی لیٹر، مفرح یا قوتی بارد 4.5 گرام استعمال کرائیں۔ مفرح یا قوتی بارد کا نسخہ درج ذیل ہے۔

مفرح تخم کدوئے شیریں، تخم تربوز، مفرح تخم خیارین، تخم کاہو ہر ایک 10 گرام، تخم خرفہ مقشر 18 گرام، صندل سفید، طباشیر، سنبل الطیب، چھالیہ، صندل سرخ، بسد، کبریا، مردارید ناسفہ، سرطان سوختہ ہر ایک 8 گرام، زمرد سبز، یاقوت ہر ایک 2 گرام ابریشم مقرض، بہمن سرخ، بہمن سفید، گل گاؤ زبان، غنچہ گل سرخ، شقائق مصری، دانہ ہیل، دارچینی ہر ایک 10 گرام، زعفران، عنبر اشب، ورق طلا، مشک خالص ہر ایک 1-7.2 گرام، ورق نفرہ 8.5 گرام، نبات سفید 2.5 گرام، آب سیب شیریں، آب امروہ، آب ہی شیریں، شربت فواکہ شیریں، عرق گلاب، شہد خالص، عرق صندل ہر ایک 85 ملی لیٹر — حجریات اور جواہرات کا عرق گلاب/ عرق بید مشک میں صلا یہ کریں اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں، عرقیات، شربت، نبات سفید اور شہد کو باہم ملا کر قوام تیار کریں اور زعفران، مشک، عنبر کو کھل کر کے ملائیں اور اس کے بعد تمام دواؤں کو قوام میں ڈال کر خوب ملائیں۔

o — صندل سرخ، صندل سفید کو عرق نیلوفر، عرق گلاب میں گھس کر گل ارمنی ملا کر سینے پر ضاد کریں۔

خوف و ہراس سے نجات دلانے کا اہتمام کریں۔



حسی یوم غضبیہ

اس مرض میں غصہ کی شدت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور غیر طبعی حرکات سرزد ہو سکتی ہیں۔

سبب

غصہ کی شدت کی وجہ سے روح کا بیرون جسم کی طرف حرکت کرنا۔

علامات

چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اگر کسی قدر خوف بھی ہو تو زردی مائل ہوتا ہے، آنکھیں سرخ اور ابھری ہوئی ہوتی ہیں، چہرے پر کسی قدر انتفاخ بھی ہوتا ہے کیونکہ خون کا دوران چہرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات غصہ کی شدت کی وجہ سے مریض کا ہنسنے لگتا ہے، جو اس کی طبیعت میں ضعف اور کسی غلطی کی زیادتی کا بھی پتہ دیتا ہے، پیشاب سرخ، کسی قدر چمکدار ہوتا ہے اور سوزش کے ساتھ خارج ہوتا ہے، نبض موجی، بمتلی، بلند اور متواتر چلتی ہے۔

اصول علاج


۰ — دُخو کرنے کی ہدایت کریں (منہ ہاتھ اور پیر دھونے کی ہدایت کریں)

- — مرطبات و مہر دات استعمال کرائیں۔
- — غصہ کے ماحول سے نجات دلانے کی تدابیر کریں۔
- — مفرحات استعمال کرائیں۔

علاج

- — داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات بروئے کار لائیں۔
- شربت سیب، شربت انارین، شربت ترنج، شربت صندل ہمراہ عرق گلاب، عرق بید مشک، عرق گاؤ زبان نوش کرائیں۔
- سرکہ، روغن بادام اور دہی وغیرہ اجزاء پر مشتمل غذائیں کھلائیں۔
- سرد پانی نوش کرائیں اور انار ترش پر عرق گلاب چھڑک کر کھلائیں۔
- زالال تر ہندی 100 ملی لیٹر کو شکر سے شیریں کریں اور برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔

- — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
- عرق گلاب میں تھوڑا سا سادہ پانی ملا کر سرد کر دیں اور سرد سینہ پر ڈالیں۔
- صندل، کافور۔ دونوں کو عرق گلاب میں گھس کر سینہ پر ضا د کریں۔
- بنفشہ، صندل سفید، تخم کاہو ہر ایک 7 گرام، عرق گلاب، عرق بید مشک، ہر ایک 35 ملی لیٹر، کافور 1 گرام — اول الذکر تینوں دواؤں کو باریک پیس کر عرقیات اور کافور میں ملائیں اور ایک شیشی میں ڈال کر نخلخہ کے طور پر بروئے کار لائیں۔
- نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔
- رقص و سرود کی محفلوں میں بھی جانے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔



حمی یوم ہمیہ ANXIETY EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں مریض اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں غیر معمولی جدوجہد اور اہتمام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے روح، اندرون جسم گھٹ کر رہ جاتی ہیں۔

اسباب

(۱) کسی کام کے سلسلے میں بہت زیادہ جدوجہد۔

(۲) اہتمام اور توجہ کی زیادتی۔

علامات

چہرے پر پریشانی، کسی قدر اضطراب اور اضمحلال ہوتا ہے، جو جدوجہد اور غیر معمولی اہتمام کا پتہ دیتا ہے، سوء ہضم کی شکایت ہوتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، آنکھوں کی حرکت کسی قدر سست، ابھار کے ساتھ ہوتی ہے، نبض ضعیف اور کسی قدر بلند ہوتی ہے۔

اصول علاج

- دماغ کی تقویت کی تدابیر کریں۔
- خوشبو سگھائیں۔
- آب و ہوا کی تبدیلی کی ہدایت دیں۔
- توجہ کو دوسری طرف مبذول کرانے کی تدابیر کریں۔

علاج

- تقویت دماغ کے لیے یہ نسخے مفید ہیں۔

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کالی، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ، آملہ مقشر، ہر ایک 100 گرام، روغن گاؤ/ روغن بادام 100 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر مذکورہ روغن میں چرب کریں اور شکر 500 گرام/ شہد 500 ملی لیٹر کے قوام میں ملا کر حسب دستور اطریفل تیار کریں اور 6-10 گرام بوقت خواب ہمراہ عرق گاؤ زبان پانی استعمال کرائیں۔

ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ کالی، پوست ہلیلہ، لقلقل سیاہ، آملہ، دار لقلقل ہر ایک 150 گرام، زنجبیل، جاوتری، یوزیدان، شقائق مصری، تودری سرخ، تودری زرد، اندر جو شیریں، بہمن سفید، بہمن سرخ، کنجد مقشر، خشخاش سفید، مغز حب اقلقل ہر ایک 7.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام 20 ملی لیٹر میں چرب کر کے شہد/ شکر 750 گرام کا قوام تیار کر کے ملائیں اور 6-10 گرام آبلہ سادہ استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کالی، پوست ہلیلہ سیاہ، آملہ منقی ہر ایک 20 گرام۔ تمام دواؤں کو علاحدہ علاحدہ کھل کریں اور چھان کر محفوظ کر لیں۔ کشمش، موہن منقی ہر ایک 20 گرام کو علاحدہ سے کوٹ کر رکھیں پھر تمام دواؤں کو باہم ملا کر شہد/ شکر ایک کلو گرام کے قوام میں ملائیں اور حسب دستور اطریفل تیار کر کے 6-20 گرام ہمراہ عرق بادیان صبح کو

اور بوقت خواب استعمال کرائیں۔
 خارجی طور پر یہ تدابیر اختیار کریں۔
 سردوشبونیات سوگھائیں۔
 روغن گل سر میں رکھیں۔
 روغن بنفشہ / روغن نیلوفر کی سارے جسم پر مالش کرائیں۔
 حسب ضرورت رقص و سرود کی محفلوں میں جانے کی تاکید کریں۔
 مریض کو اس بات پر آمادہ کریں کہ معمولات زندگی / موجودہ کام میں اس قدر
 (غیر معمولی) اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کسی قدر توجہ سے بھی کام بحسن و خوبی
 انجام پذیر ہو سکتا ہے۔ وغیرہ۔



حمی یوم تخمیه / امتلائیہ

DYSPEPTIC/REPLETIVE EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں تخمیه کی وجہ سے رومی بخارات پیدا ہوتے ہیں جن سے حرارت مشتعل ہو کر روح میں شدید گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ کے طور پر جسمانی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسباب

- (I) مسامات کا ٹنگ ہونا۔
- (II) صفراوی مزاج ہونا۔
- (III) بدہضمی کی حالت میں تیز دھوپ وغیرہ میں چلنا/ شدید جسمانی حرکات سرزد ہونا۔

علامات

مریض قبض کی شکایت کرتا ہے اور کبھی اسہال آتے ہیں، ذخانی/ ترش ذکاریں آتی ہیں، کثرت بیداری کی صورت میں بخار کے ساتھ چہرے پر بھر بھراہٹ بھی ہوتی ہے،

پوٹوں میں گرانی ہوتی ہے، پیشاب، خون کی طرح سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں نفع کی علامات بھی نہیں پائی جاتیں، بخار 5-7 بار یوں میں از خود اتر جاتا ہے، نبض سریع اور عظیم چلتی ہے۔

اصول علاج

- قبض کی صورت میں ملینیات استعمال کرائیں۔
- مریض کے مزاج اور رجحان کو دیکھتے ہوئے استفراغ کرائیں۔
- اسہال، مرض کا سبب ہو تو یک بیک حابسات / قابضات ہرگز نہ استعمال کرائیں بلکہ فاسد مادہ کے اخراج کے بعد یہ دوائیں استعمال کرائیں۔
- تحقیر کے بعد مبردات، مرطبات اور مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- مریض کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے استفراغ کرائیں۔ چنانچہ اگر فاسد، غیر ہضم غذا معدہ میں جمع ہو تو تے کے ذریعہ استفراغ کرائیں۔ نسخے یہ ہیں:

پانی 750 ملی لیٹر میں سکجین 50 ملی لیٹر، نمک طعام 6 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

رائی کا سفوف 6 گرام، 500 ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں۔
 تخم ترب 6 گرام، تخم شبت، تخم گندنا ہر ایک 3 گرام، نمک طعام 2 گرام۔
 تمام دواؤں کو پیس کر 500 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو چھان کر شہد 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

آب سویا، آب ترب ہر ایک 60 ملی لیٹر، سکجین عسلی 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

اگر استفراغ، احتقان کے ذریعہ ہو تو یہ صورت اختیار کریں۔

صابن 3 گرام، روغن بید انجیر 25 ملی لیٹر، پانی نیم گرم، پانی میں صابن کو حل کر کے روغن بید انجیر ملا کر حقنہ کریں۔

صابن 2 گرام، عرق گلاب 250 ملی لیٹر، نیم گرم پانی 500 ملی لیٹر حسب دستور ملا کر حقنہ کریں۔

استفراغ کا رجحان اگر اسہال کی طرف ہو تو یہ نسخے سودمند ہیں:

عرق گلاب 250 ملی لیٹر میں گلفندہ 35 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

شیر خشک، ترنجبین ہر ایک 35 گرام استعمال کرائیں۔

معدہ میں ریاحی درد وغیرہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

جوارش فلائی 7 گرام، جوارش کمونی 7.5 گرام — دونوں کو عرق گلاب میں حل

کر کے نوش کرائیں۔

o — خارجی طور پر یہ تدابیر اختیار کریں۔

روغن نار دین / روغن زیتون میں کپڑا بھگو کر نچوڑ لیں اور مقام معدہ پر رکھیں، تخم

پالک، تخم خرفہ سیاہ ہر ایک 12 گرام، پانی میں پیس کر معدہ پر مناد کریں۔



حمی یوم قشفیہ

ICHTHYOTIC/PENURIAL EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں جلد پر میل وغیرہ کے جم جانے سے سطح جلد پر ایک طرح کی پیوست اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسامات بدن بند ہو جاتے ہیں اور جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسباب

- (I) میلا کچلا رہنا/ غسل نہ کرنا۔
- (II) صفراوی مزاج ہونا۔
- (III) حمام کی عادت کا چھوڑ دینا۔
- (IV) بعض خراب غذائیں۔

علامات

پسینہ خارج نہیں ہوتا یا بالکل قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت بڑھا ہوا اور 24 گھنٹے رہتا ہے، جسم میں تھوڑی سوزش بھی محسوس ہوتی ہے، پیشاب سرخی مائل


سیاہ آتا ہے، مریض کی سرگزشت سے میلے کپلے رہنے کا پتہ چلتا ہے۔

اصول علاج

- — جسمانی صفائی اور طہارت کی ہدایت کریں۔
- — مرطبات استعمال کرائیں۔
- — مناسب روغنوں کی ماسح کریں۔
- — مناسب مشروبات نوش کرائیں۔

علاج

- — خوردنی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں۔
- شراب میں پانی ملا کر نوش کرائیں۔
- تلیپین کی غرض سے نبات سفید، ترنجبین ہر ایک 25 گرام، عرق گلاب 150 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- لمحوظ رہے کہ اس میں جسمانی صفائی زیادہ سودمند ہے۔
- — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
- غسل کرنے کی ہدایت کریں۔
- سیوس گندم، آرد باقلا کو ابٹن کے طور پر سارے جسم پر ملیں۔
- روغن بنفشہ، روغن کدو سارے جسم پر ملیں۔
- آرد باقلا، بادام تلخ، بورہ ارمنی کا ابٹن بنا کر استعمال کرائیں۔



حمی یوم جو عیہ HUNGER EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں بھوک کی شدت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور
مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

سبب

بھوک کی شدت۔

علامات

مریض کی روئیداد میں بھوک کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی قدر کمزوری بھی ہوتی ہے،
نبض صغیر، ضعیف اور بعض اوقات صلب ہوتی ہے۔

اصول علاج

- ۰ بخار کی حالت میں سرد و تر غذائیں استعمال کرائیں۔
- ۰ نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔

- o — سرد و تر تیلوں سے جسم کی مالش کریں۔
- o — بخار ختم ہو جانے کے بعد زود بخم اور جید الکیموس غذا میں کھلائیں۔

علاج

- o — بخار کی حالت میں یہ نسخہ جات استعمال کرائیں۔
شربت نیوفز 48 ملی لیٹر، عرق کاسنی، عرق مکوہ، عرق بید مشک ہر ایک 75 ملی لیٹر
باہم ملا کر نوش کرائیں۔
آش جو نوش کرائیں۔
- شربت سیب 35 ملی لیٹر، عرق گلاب 85 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔
غذائی طور پر کدو، پالک وغیرہ سرد غذاؤں کو روغن بادام میں بھون کر کھلائیں۔ بعد
میں مقوی غذا میں استعمال کرائیں۔
- o — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔
نیم گرم پانی سے غسل کرائیں / سر پر نیم گرم پانی دھاریں۔
روغن گل / روغن بنفشہ / روغن بادام / روغن کدوئے شیریں / روغن خشخاش وغیرہ سے
جسم پر مالش کریں۔



حمی یوم عطشیہ

THIRST/INANTION EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں پیاس کی زیادتی کی وجہ سے بخار آجاتا ہے اور مریض مضطرب نظر

آتا ہے۔

سبب

پیاس کی زیادتی۔

علامات

جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، پیاس بھی محسوس ہوتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے،
نہایت شدید صورتوں میں جلد پر بھی پوست غالب آجاتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — مریض کے ہاتھ پاؤں پر سرد پانی ڈالیں / آئرن کرائیں۔
- 0 — وقفہ کے ساتھ تھوڑی مقدار میں سرد پانی / برف کے ٹکڑے دیں، کیوں کہ

یک بیک زیادہ مقدار میں سرد پانی نوش کرادینا، مزید پیچیدگیوں کا باعث ہوتا ہے۔

○ — مفرحات اور مبردات استعمال کرائیں۔

○ — سرد مقامات پر قیام کی ہدایت کریں۔

علاج

○ — خوردنی طور پر یہ نئے بروئے کار لائیں۔

سرد پانی سے کلیاں کرانے کے بعد انار/سنترے کا رس نوش کرائیں۔

برف کے ذلے چوسنے کی ہدایت کریں۔

شیرہ تخم خیارین 6 گرام، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں 6.5 گرام آب تازہ میں نکال کر برف سے سرد کریں اور شربت انار 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

زالال تمر ہندی، زلال آلو بخارا، آب انارین، آب خیار، آب امروہ، آب زرد آلو — تمام دواؤں کو برف سے سرد کر کے نوش کرائیں، ملحوظ رہے کہ یک بیک زیادہ مقدار میں سرد مشروبات کا استعمال نقصان دہ ہے۔

○ — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں۔


ہاتھ پیر پر سرد پانی دھاریں۔

روغن گل اور سرکہ میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں۔

تخم کشیز خشک، تخم کاسنی، گل سرخ، صندل سفید ہر ایک 9 گرام، آب برگ کشیز سبز میں پیس کر جگر اور معدہ کے مقام پر ضاد کریں — ملحوظ رہے کہ شدید برودت کا پہچانا نقصان دہ ہے۔

حسب ضرورت سرد پانی میں آیزن کرائیں/حمام کرائیں۔

سرد مقام پر رکھنے کی ہدایت کریں۔



حمی یوم سدییہ EMBOLIC EPHEMERAL FEVER

اس میں سدوی کی وجہ سے جلد کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسباب

- (I) یوست جلد۔
- (II) جلد کی کثافت۔
- (III) ورم/لحم زائد۔
- (IV) سرد اور قابض اشیا کا بکثرت استعمال۔

علامات

جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے جو عام طور سے 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، پیاس میں شدت ہوتی ہے، جسم میں سوزش بھی ہوتی ہے، پیشاب سرخ سیاہی مائل خارج ہوتا ہے، پینہ کا اخراج بالکل نہیں ہو پاتا یا بہت کم ہوتا ہے، سدوں کے کم ہونے کی

صورت میں بخار جلد ہی اتر جاتا ہے لیکن اگر خلط بھی طوٹ ہو اور زیادہ مقدار میں ہو نیز معالجہ میں غلطی ہو رہی ہو تو بخار کی مدت ایک یوم سے زائد بھی ہو سکتی ہے، امتلا خون اگر مرض کا سبب ہو تو عروق محتلی ہوتی ہیں، چہرے پر سرخی ہوتی ہے۔

اصول علاج

- — امتلا کی صورت میں فصد کھولیں۔
- — مفتوح عروق ادویہ استعمال کرائیں۔
- — روغنی مادہ کی کثرت پیدائش کی صورت میں ان کا ازالہ / تدارک کریں۔
- — حسب ضرورت نفع و تحقیق کریں۔
- — حمام معتدل کرائیں۔
- — مناسب تیلوں کی مالش کریں۔
- — جید الکیموس اور زود ہضم غذا کھلائیں۔

علاج

- — امتلا کی صورت میں باسلین کی فصد کھولیں لیکن اگر کسی بھی طور غلظت اور لزوجت کا احساس ہو تو فصد ہرگز نہ کھولیں۔ فصد کے بعد یہ ادویہ استعمال کرائیں:
- شاہترہ، بنفشہ، گل سرخ، تر ہندی، آلو بخارا — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شیر خشت حل کر کے نوش کرائیں۔ اس کے بعد سکنجبین بزوری بارہ استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

- عرق بادیان، عرق گلاب ہر ایک 85 ملی لیٹر، سکنجبین بزوری 25 ملی لیٹر، آب برگ کاسنی سبز مردوق 60 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو باہم ملا کر نوش کرائیں۔
- شربت افسنین، شربت بزوری ہر ایک 18 ملی لیٹر ہمراہ جوشاندہ بادیان، بخ بادیان، بخ کرفس ہر ایک 5 گرام نوش کرائیں۔

اگر نفع و تحقیق در کار ہو تو یہ نسخے بروئے کار لائیں۔

غلبہ بلغم کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بنج بادیان، بنج کرفس، بنج اذخر، بنج کاسنی، اسطوخودوس ہر ایک 7 گرام
پرسیاوشاں 5 گرام، مویز منقی 9 عدد، انجیر زرد 2 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم
پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان کر شہد 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

مویز منقی 9 عدد، انجیر زرد 2 عدد، بادیان، اصل السوس مقشر ہر ایک 9 گرام،
پرسیاوشاں 7 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان کر گلقد عسلی 50 گرام
حل کر کے نوش کرائیں۔

سوداوی خلط اگر مرض کا سبب ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

شاہترہ، بادرنجبویہ، بادیان ہر ایک 7 گرام، اصل السوس مقشر، گاؤ زبان ہر ایک
5 گرام، عتاب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل
چھان کر گلقد 25 گرام ملا کر دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔ گلقد کی بجائے ترنجبین بھی
استعمال کرا سکتے ہیں۔

0۔ حسب ضرورت یہ نسخے بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

بادیان، بنج بادیان، بنج کرفس، ہر ایک 7 گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان
لیں، شربت بزوری 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

عرق بادیان، عرق گلاب ہر ایک 85 ملی لیٹر، سکنجبین بزوری 25 ملی لیٹر،
آب برگ کاسنی سبز مردق 60 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

0۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کرائیں:

جسم پر روغن بنفشہ کی مالش کریں۔

آرد جو، آرد باقلا، آرد بنج سوس، ہموزن کو باریک کر کے پانی میں لیپ بنا کر جسم
پر مالش کریں۔ معتدل حمام کرائیں۔

حمی یوم ورمیہ

INFLAMMATORY EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں غدوی اجسام اور نرم گوشتوں میں ورم میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔

اسباب

- (I) غدو میں ورم پیدا ہو جانا۔
- (II) خراج / دل / قرحہ / جرب۔
- (III) کنج ران کا ورم۔
- (IV) بغل کا ورم۔
- (V) ضربہ و سقط کی وجہ سے ورم۔

علامات

مریض کی سرگزشت میں ورم کے مقدمہ کا تذکرہ ملتا ہے، چہرے پر نسبتاً زیادہ سرخی ہوتی ہے، بھر بھراہٹ بھی ہوتی ہے، سوزش یکسر مفقود ہوتی ہے۔ تاہم حرارت زیادہ

ہوتی ہے، جسم سے پسینہ بکثرت نکلتا ہے، پیشاب، پانی کی مانند سفید ہوتا ہے، نبض عظیم، سرخ اور متواتر چلتی ہے۔ علامتوں میں معمولی تغیر و تبدل، سبب کے تابع ہوتا ہے۔

اصول علاج

- — درم کے ازالہ کا اہتمام کریں۔
- — حسب ضرورت محلات استعمال کرائیں/ مبردات بھی استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن احتیاط لازمی ہے۔
- — منضجات استعمال کرائیں۔
- — مسکنات استعمال کرائیں۔

علاج

- — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- گل بنفشہ، گل نیلوفر ہر ایک 6 گرام، آلو بخارا، عناب ولایتی، ہر ایک 6 عدد، موہن منقہ 10 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت عرق گلاب 175 ملی لیٹر میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ بخار کی شدت اور تیزی کو زائل کرنے میں مفید ہے۔
- بہدانہ 3 گرام، عناب ولایتی 5 عدد، عرق مکو، عرق شاہترہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 4 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- عناب، عدد، تمر ہندی 35 گرام — دونوں کو عرق شاہترہ حسب ضرورت میں بھگو دیں اور مل چھان کر شربت نیلوفر میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- اگر بخار بلانی خلط سے عارض ہوا ہو تو یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- گل غافث پانی میں جوش دے کر مل چھان کر سکجبین (حسب ضرورت) ملا کر نوش کرائیں۔

سفوف غاریقون 6 گرام شہد میں ملا کر چٹائیں۔
 زنجبیل سفید (بے ریشہ) 12 گرام، بنات سفید 75 گرام باہم باریک پیس کر
 4 گرام کھلائیں۔

۰ — نفع و تحقیق کی غرض سے یہ نسخے بروئے کار لائیں:

صفاوی خلط کے غلبہ کی صورت میں منصفج کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 گل بنفشہ، گل نیلوفر، شاہترہ، تخم کاسنی (نیم کوفتہ) بخ کاسنی، گل سرخ ہر ایک
 7 گرام، عنب 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کول
 چھان کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
 منصفج کے طور پر یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر، تخم عطی، شاہترہ، تخم کاسنی، عنب الثعلب ہر ایک 7
 گرام، عنب، آلو بخارا ہر ایک 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو
 دیں اور صبح کول چھان کر گلقد آفتابی/ترنجبین/خیرہ بنفشہ 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔
 جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

پوست ہلیلہ زرد 16 گرام، شاہترہ، سناکی، ہر ایک 9 گرام، تخم کاسنی 7 گرام،
 تخم کشوت (پوٹلی میں بندھا ہوا) 5 گرام، آلو بخارا 15 عدد، سپستان 20 عدد، عنب
 9 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر حل چھان کر شیرخشت 25 ملی لیٹر، مغز فلوں،
 ترنجبین ہر ایک 50 گرام، روغن بادام 7 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

— بلغمی خلط مرض کا سبب ہو تو یہ نفع کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بخ بادیان، بخ کرفس، بخ کاسنی، بخ اذخر، اسطوخودوس ہر ایک 7 گرام، انجیر زرد
 2 عدد، مونیر منقی 9 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر حل چھان کر شہد 25 ملی لیٹر ملا
 کر نوش کرائیں۔


جب نفع کے آثار نمایاں ہوں تو مسہل بلغم کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

ایارح فیقرا، تربد سفید، حب الفیل ہر ایک 3 گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق

بادیان میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 9 گرام ہمراہ آب نیم گرم کھلائیں۔
 سوداوی خلط اگر مرض کا سبب ہو تو منصفج کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
 شاہترہ، بادرنجبویہ ہر ایک 7 گرام، اصل السوس مقشر، گاؤ زبان ہر ایک 5 گرام،
 عناب 5 عدد، سپتاں 9 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح
 کو مل چھان کر گلقد 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

جب نفعج کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 پوست ہلیہ زرد، سناہ کی ہر ایک 3.5 گرام، غاریقون، ریوند چینی ہر ایک 1.5
 گرام، مسفاج، اسطوخودوس، اقیقون، غنچہ گل، کتیرا، ہر ایک 1 گرام، زنجبیل 500 ملی گرام،
 نبات سفید 7 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر روغن بادام میں جب کریں اور
 7-9 گرام ہمراہ آب نیم گرم استعمال کرائیں۔

۵ — خارجی طور پر درج ذیل ادویہ/تدبیر بروئے کار لائیں:
 صندل کو پانی میں گھس کر برف سے سرد کر کے درم پر ضما کے طور پر لگائیں، تاہم
 ملحوظ رہے کہ باردا سبب کی صورت میں/ابتدا مرض میں سرد تدابیر نقصان دہ ہیں۔



حی یوم نومیہ وراچیہ

SLEEPING, REPOSE EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں بہت زیادہ سونے یا آرام کرنے کی عادت کے برعکس آرام کی سہولت فراہم ہونے سے مریض کے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سبب

خلاف عادت نیند/آرام کی زیادتی، جس کے نتیجے میں بخارات کی تحلیل کا عمل رک جاتا ہے اور روح غیر معمولی طور پر گرم ہو جاتی ہے۔

علامات

مریض کی روئیداد سے تشخیص اور تعین سبب میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، ایک خاص بات جو سرگذشت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا۔ یعنی مریض عام طور پر زیادہ آرام اور راحت کی زندگی یا بہت زیادہ سونے کا عادی نہیں ہوتا، بغض میں بھی بخاری نوعیت کا اعتلا پایا جاتا ہے۔

اصول علاج

- حمام کے ہوائی حصہ میں پسینہ لینے کی ہدایت کریں۔
- آب نیم گرم سے اعتدال کے ساتھ غسل کرائیں۔
- جسم کو باتھوں سے ملیں۔
- اعتدال کے ساتھ ریاضت کی ہدایت کریں۔

علاج

- خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- اصل السوس 3 گرام، شکر 3 گرام دونوں کو خوب باریک کر کے کھلائیں۔
- خارجی طور پر یہ تدابیر مفید ہیں:
- روغن خیرى، روغن باونہ تمام جسم پر ملیں۔ اس کے بعد سیوس گندم، پوست تمر، تربوزہ، گل باونہ ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اس سے غسل کرائیں۔
- تمام میں ایسے حصہ میں رکھیں کہ پسینہ آجائے اس کے بعد نیم گرم پانی سے اعتدال کے ساتھ غسل کرائیں۔
- قیصوم، ثمام، اثلیل الملک، شبت — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اسی سے غسل کرائیں۔

حمی یوم استفرغیہ

EVACUATIVE EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں استفرغ (جسم سے مادہ کا اخراج) کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور طبی کارکردگی پر خراب اثر پڑتا ہے۔

اسباب

- (I) قے / قے آور دواؤں / غذاؤں کا استعمال۔
- (II) اسہال، مسبل دواؤں کا استعمال۔
- (III) کثرت جماع / قصد۔
- (IV) استفرغ کے بعد کی ٹکان۔
- (V) غیر معمولی حرارت کی وجہ سے پسینہ کا اخراج۔

علامات

علامتوں کے رونما ہونے کا دار و مدار استفرغ کی کمی اور زیادتی پر ہے، چنانچہ شدید صورتوں میں بیوٹ تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ بہر حال جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے،

مریض کی سرگذشت سے سبب مرض کی تعیین ہو جاتی ہے، بخار کے ساتھ ساتھ جسمانی ضعف بھی ہوتا ہے، نبض لین اور سر پچ چلتی ہے۔

اصول علاج

- — استفراغ کو روکنے کی تدابیر کریں۔
- — سرد اور مقوی اضمہ استعمال کرائیں۔
- — قابضات استعمال کرائیں۔
- — فصد کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- — خوردنی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں:
- شربت سیب، شربت نیلوفر، ماء اللہم ہر ایک 25 ملی لیٹر، باہم ملا کر نوش کرائیں، حسب ضرورت ماء اللہم کی مقدار 80 ملی لیٹر تک کر سکتے ہیں، مزید قوی الاثر بنانے کے لیے کسی قدر شراب کا اضافہ بھی مفید ہے۔
- خمیرہ مروارید/خمیرہ زمرہ/خمیرہ گاؤ زبان غبری 7 گرام ہمراہ عرق عنبر 12 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔ استفراغ کی وجہ سے ضعف میں مفید ہے۔
- حابس اور قابض کے طور پر یہ نسخہ سودمند ہے:
- خم ریحان، خم باریک، اسبنول، صمغ عربی ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو روغن بادام میں بریاں کر کے کھلائیں۔
- طباشیر، گل سرخ، خم کاہو، خم کاسنی، خم خرفہ، سماق ہر ایک 6 گرام، گلتار، صندل سفید، خم حمض ہر ایک 3 گرام، زیتون 1.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 3 گرام ہمارہ آب سادہ/عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں۔

۵۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:
تخم پالک، تخم خرفہ سیاہ، خشکاش سفید، ہموزن کو پانی میں پیس کر مقام معدہ پر لپ
کریں۔

صندل کو عرق گلاب / عرق بید مشک میں گھس کر مقام قلب و جگر پر لپ کریں۔
طوطا رہے کہ ان اعضا پر شدید برودت پہنچانا نقصان دہ ہے۔
روغن یاسمین، عطر خس میں کپڑا بھگو کر نچوڑ لیں اور مقام معدہ پر رکھیں، روغن
مصطکی / روغن سنبل میں اسفنج بھگو کر نچوڑ لیں اور مقام معدہ پر رکھیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Chaudhary

حمی یوم و جعیہ EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں درد کی شدت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور طبی افعال میں فوری واقع ہوتا ہے۔

سبب

درد کی شدت

علامات

مریض، جسم کے کسی نہ کسی حصہ میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درد کے مقام اور نوعیت پر علامتوں کا انحصار ہے۔

اصول علاج

- تسکین درد کی تدابیر کریں۔
- خواب آور دوائیں استعمال کریں۔

o — اصل سبب درد کا ازالہ کریں۔

علاج

- o — داخلی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:
- تخم خیاریں 6 گرام، مغز تخم تربوز 5 گرام، مغز تخم کدوے شیریں، خشخاش سفید ہر ایک 4.5 گرام — تمام دواؤں کا پانی میں شیرہ نکالیں اور نوش کرائیں۔
- o — شربت عتاب 30 ملی لیٹر بکری کے دودھ کے ہمراہ نوش کرائیں۔ ملحوظ رہے کہ عضو متاثر کے درد کے اعتبار سے نسخہ تجویز کرنا لازمی ہے۔
- o — خارجی طور پر یہ نسخے مفید/تدابیر سودمند ہیں:
- جسم/سر کو ہلکے ہاتھوں دباتے رہنے کی ہدایت کریں، منوم کے طور پر یہ نسخے کار آمد ہیں، بیخ لقاح 3 گرام، خشخاش 5 گرام، تخم کاہو متشر 4.5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر سر/پیشانی پر مناد کریں۔
- صندل سفید، تخم کاہو، تخم نیلوفر، تخم خرفہ ہر ایک 3 گرام، کافور 1 گرام، افقیون 500 ملی گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب کشیز بنز 25 ملی لیٹر، سرکہ خالص، روغن گل ہر ایک 3 ملی لیٹر، میں ملا کر لپ تیار کریں اور آہستہ آہستہ پیشانی پر ملیں۔
- روغن گل/روغن خشخاش/دونوں روغنوں کو ملا کر سر پر مالش کریں۔
- روغن لبوب سبب کی مالش کریں/روغن گل بغشہ کی سر پر مالش کریں۔
- گرم پانی میں نمک ملا کر غسل کرائیں۔
- حی تعبیہ کا علاج اختیار کریں۔



حمی یوم غشیہ

COMATOSE EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں غشی کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ غشی کی وجہ سے مریض کی روح میں انتہائی حرکات رونما ہوتی ہیں اور اس میں غیر معمولی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، نیز حرارت کا قیام روح کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

سب

غشی۔

علامات

غشی طاری رہتی ہے اور ساتھ ہی جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہوتا ہے، تو میں ساتھ ہو جاتی ہیں، بزدلت کے غلبہ کے وقت نبض ساقط اور باطل ہو جاتی ہے اور حرارت کے غلبہ کی صورت میں سریع چلتی ہے، عام طور سے نبض اس مریض کی نبض جیسی ہو جاتی ہے جن کی رطوبتیں فنا ہوئی ہوں اور بدن میں شدید بوسمت کا غلبہ ہو، عام طور سے غشی کے ختم ہوتے ہی بخار بھی جاتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات غشی کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک رہتا ہے۔

اصول علاج

- — منہ پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں۔
- — برودت کا غلبہ ہو تو گرم دوائیں استعمال کرائیں۔
- — تقویت قلب کا اہتمام کریں۔
- — مفرحات استعمال کرائیں۔
- — حسب ضرورت مرطبات اور مہرقات استعمال کرائیں۔

علاج

- — داخلی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں:
- دواء المسک / خیرہ گاؤ زبان عبری جواہر والا، عرق گلاب میں حل کر کے حلق میں پکائیں۔

حسب ضرورت شراب میں ماء اللحم ملا کر حلق میں پکائیں۔
 غشی دور ہو جانے اور بخار کے باقی رہنے کی صورت میں آتش جو، بکری کا دودھ
 ہمراہ قرص کا فور استعمال کرائیں۔ قرص کا فور کا نسخہ درج ذیل ہے:
 تخم کاہو 60 گرام، تخم خرفہ 45 گرام، طباشیر، رب السوس ہر ایک 30 گرام،
 کشنیز خشک، گل سرخ ہر ایک 15 گرام، صندل سفید، گل ارمنی، گلنار فارسی، افاقیا ہر ایک
 6 گرام، کا فور 750 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر عرق گلاب میں قرص بنائیں اور
 60 گرام استعمال کرائیں۔

مفرح یا قوتی 3.5 گرام کھلا کر شربت حماض، عرق گلاب، عرق گاؤ زبان ہر
 ایک 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

تخم ریمیاں 12 گرام، رات کے وقت عرق گلاب 120 ملی لیٹر میں بھگو کر شبنم
 میں رکھ دیں، صبح کو نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
 گاجر کو باریک باریک کاٹ کر عرق بید خشک میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح

کونبات سفید (حسب ضرورت) سے شیریں کر کے کھلائیں۔
 ملحوظ رہے کہ سبب مرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے نسخہ تجویز کرنا سودمند ہے۔ مزید
 تفصیلات کے لیے ”غشی“ کا بیان ملاحظہ کریں۔

o — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:
 غشی کی حالت میں سرد پانی / سرد عریقات سے منہ پر چھیننے ماریں، ہاتھ پیروں کو
 زور سے کھینچیں اور بالوں کو تیزی کے ساتھ کھینچیں اور اطراف کی ماش کریں۔
 عرق گلاب، عرق کیوڑہ ہر ایک 25 ملی لیٹر، عرق بید شک 35 ملی لیٹر میں کافور
 3 گرام ملا کر شیشی میں ڈال کر خوشبو سوگھنائیں — تیز سرکہ سوگھانا بھی مفید ہے۔
 صندل کو عرق گلاب میں گھس کر سینہ پر ضماد کریں۔
 مفرحات و تقویات قلب استعمال کراتے رہیں۔



حمی یوم تعبیه

FATIGUE EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں ٹکان کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور طبعی افعال میں کسی قدر فتور پیدا ہو جاتا ہے۔

سبب

ٹکان کی زیادتی۔

علامات


مرض کا آغاز عام طور سے ٹکان کے بعد ہوتا ہے، سارے جسم اور خاص طور سے مفاصل میں گرمی اور خشکی ہوتی ہے اور تھوڑا سا درد بھی ہوتا ہے، مرض کے آخر میں تھوڑی سی نمی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ صورت ٹکان کی کمی میں ہی پیش آتی ہے، لیکن غیر معمولی ٹکان کی صورت میں پسینہ اور نمی کا فقدان یا کمی ہوتی ہے، پیشاب زرد اور رقیق ہوتا ہے، نبض صغیر اور ضعیف چلتی ہیں، شدید ٹکان کی صورت میں بعض اوقات صلب چلتی ہے، درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

اصول علاج

- — آرام کی ہدایت کریں۔
- — نیم گرم پانی سے آہن کرائیں / مفاصل پر مناسب روغن کی مالش کریں۔
- — حمام کرائیں۔
- — مرطبات استعمال کرائیں۔
- — عضلاتی تناؤ کو کم کرنے کی تدابیر کریں۔

علاج

- — خوردنی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں:
سکجین، عرق گلاب ملا کر نوش کرائیں۔
انار میٹھوش کھلائیں۔
شربت سیب، شربت انار / شربت شہد (جلاب) نوش کرائیں۔
انار، سیب، ناشپاتی، سنترہ وغیرہ کھلائیں۔
ماء الشعیر، کدو، کاہو، کاسنی اور خرفہ وغیرہ استعمال کرائیں۔
شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ہوزن عرق گلاب میں حل کر کے نوش کرائیں۔
- — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:
نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر غسل کرائیں۔ اس کے بعد مفاصل پر روغن بنفشہ / روغن نیلوفر / روغن کدو کی مالش کریں۔
روغن تلخ تمام جسم پر ملنے کی ہدایت کریں۔
ملاحظہ رہے کہ اس میں تمام جسم کی خاص طور سے سر، گردن، فقرات، پشت اور مفاصل کی ترمیم سودمند ہے۔



حمی یوم استحصافہ

ICHTHYOTIC EPHEMERAL FEVER



اس مرض میں برودت کی زیادتی یا قابض پانیوں کے استعمال کی وجہ سے جلد کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔

اسباب

- (I) سرد پانی سے غسل کرنا/ سردی کے موسم میں باہر نکلنا۔
- (II) پھٹکری/ کیس وغیرہ ملے ہوئے پانی سے غسل کرنا۔

علامات

جسم پر ہاتھ رکھنے سے ابتدا میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ حرارت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، برودت مرض کا سبب ہو تو پیشاب سفید اور کبھی رنگین خارج ہوتا ہے، سردی کا موسم نہ ہو تو نبض سریع چلتی ہے، بعض اوقات صلابت کی طرف بھی مائل ہوتی ہے اور کبھی مریض کی آنکھیں پھولی ہوئی، تھجی ہوتی ہیں۔ قابض پانی سے نہانے وغیرہ کی صورت میں بھی ابتدا میں ہاتھ رکھنے پر کم حرارت محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد حرارت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پیشاب، بکری کے پیشاب کی طرح ہوتا ہے، نبض بہت زیادہ

ضعیف، صغیر اور سرریج چلتی ہے۔

اصول علاج

- — نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔
- — مسامات کو کھولنے والی دوائیں استعمال کرائیں اور جسم پر ہلکی ماسح کریں۔
- — مفرحات استعمال کرائیں۔

علاج

- — جب بخار میں تخفیف ہو جائے تو نیم گرم پانی سے غسل کرائیں۔
- جلد کے مسامات کو کھولنے کے لیے یہ تدابیر کارآمد ہیں:
- بابونہ، اکلیل الملک، قیسوم ہر ایک 35 گرام، مرز بخوش، اذخر، پوست بادیان، بخ کرفس، گل سرخ ہر ایک 18 گرام۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں، جب 7 لیٹر بچ رہے تو بھپارہ کرائیں۔
- روغن سون کی ماسح کریں، اس سے جلد کے مسامات کھل جاتے ہیں، سروس کا تیل (روغن تلخ) بھی اس کام میں لایا جاتا ہے۔
- مرز بخوش، شبت نمام (پودینہ کوہی) ہموزن کو پانی میں جوش دے کر صاف کر کے نطول کریں۔ اس کے بعد روغن شبت، روغن خیری، روغن بابونہ وغیرہ کی ماسح کریں۔
- بعض اوقات مریض کو گرم کپڑے اڑھانے سے بھی پسینہ آکر بخار ختم ہو جاتا ہے۔
- — داخلی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں:
- ہلکی شراب کو پانی میں ملا کر نوش کرائیں۔
- بادیان، کباب چینی، پودینہ، نہری خشک ہر ایک 2 گرام، دانہ ہیل خورد، کلونجی، برنجاسف، انیسون، تخم سداب ہر ایک 1 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف تیار کریں اور 2-3 گرام کھلائیں۔
- ملحوظ رہے کہ داخلی طور پر ادویہ کے استعمال کی بجائے خارجی تدابیر اختیار کرانا زیادہ سودمند ہے۔

حمی یوم شرابیہ

INTOXICATING EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں شراب کے استعمال سے روح میں ایک طرح کا پہچان پیدا ہو کر
جسائی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

سبب

شراب کا بکثرت استعمال۔

علامات

شراب نوشی کی روئیدار ملتی ہے، اور غماز کی دوسری مخصوص علامتوں کے ساتھ
جسائی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے۔

اصول علاج

○ — مقیات استعمال کرائیں۔

○ — فصد کھولیں۔



- o — ترش اشیا استعمال کرائیں۔
- o — تسکین درد کی تدابیر کرائیں۔
- o — بخار اتر جانے کے بعد غسل کرائیں۔

علاج

o — خوردنی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں:
آب انار، شربت غورہ/شربت لیون برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔ مبرد اور مسکن ہے۔

شربت حب الاس نوش کرائیں۔
شیرہ تخم خرفہ 3 گرام، شیرہ مغز تخم خیارین 5 گرام۔ پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور سیکچین سادہ 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
خیرہ صندل 9 گرام، شربت انارین 50 ملی لیٹر، عرق بید مشک، عرق گلاب، عرق زرد شک، عرق کیوڑہ ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔
آب آلو بخارا، زلال تمر ہندی، شیر خشک، عرق گلاب، عرق بید شک باہم ملا کر نوش کرائیں۔

سے آور کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
تخم شبت 3 گرام کو پانی میں جوش دیں اور نمک طعام ملا کر نوش کرائیں۔
خودل 6 گرام 500 ملی لیٹر میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
تخم ترب، تخم شبت، تخم گندنا، ہر ایک 3 گرام، نمک طعام 2 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر 250 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھان کر شہد 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

آب شبت، آب ترب ہر ایک 60 ملی لیٹر، سیکچین عسلی 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

۵۔ قابضی طو، پڑیہ تا لیسر بر دے کاری کیسی۔

حسب ضرورت باسلیق / قیفال کی فصد کھولیں۔

تسکین درد کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:

افیون 250 ملی گرام، کافور 500 ملی گرام کو پانی / شیر زن میں کھول کر تاک میں
پکائیں، افیون، مرکبی، کافور، بزرالیح، بنج، لفاح، زعفران، تخم کاہو، کشنیز ہر ایک 6 گرام، صمغ
عربی 3 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفیدی بیضہ مرغ میں گوندھ کر اقراص بنائیں
اور حسب ضرورت ایک قرص، جوشاندہ کو کنار / پانی میں پیس کر پیشانی اور کپٹی پر لیپ کریں۔
افیون، کافور، صندل ہر ایک 500 ملی گرام کو عرق گلاب میں گھس کر سر اور کپٹی پر
لیپ کریں۔

ہاتھ پیروں پر روغن بنفشہ، روغن گل، روغن نیلوفر کی مالش کریں۔

سر پر نیم گرم پانی دھاریں۔

بخار میں کمی واقع ہو جانے پر حمام کرائیں اور روغن بنفشہ تاک میں پکائیں۔



حمی یوم غذائیہ / دوائیہ

DIETIC/MEDICINAL, EPHEMERAL, FEVER

اس مرض میں بعض غذاؤں اور دواؤں کے استعمال سے یبجان پیدا ہو کر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سبب کی شدت اور نفث کے اعتبار سے دوسری مرضی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔

اسباب

(I) گرم غذاؤں کا استعمال

(II) گرم دواؤں کا استعمال

علامات

گرم غذاؤں / دواؤں کے استعمال کی روئداد ملتی ہے اور بخار آ جاتا ہے۔

اصول علاج

— سرد تدابیر اختیار کریں۔

— تعدیل مزاج کریں۔

o — ملیناں استعمال کرائیں۔

o — جگر کی اصلاح کریں۔

علاج

o — سرد و اداں سے تعدیل کریں۔ اس غرض سے یہ نسخہ مفید ہے:

لعاب اسپنول، شیرہ تخم خرفہ، تخم خیارین، تخم خربوزہ ہر ایک 6 گرام، عرق گلاب، عرق کیوڑہ، عرق بید مشک ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر سبکچین سادہ 35 ملی لیٹر حل کر کے برف سے سرد کریں اور نوش کرائیں۔

ملین کے طور پر یہ نسخہ مفید ہے:

شربت ورد مکرر 35 ملی لیٹر/ شربت آلو بخارا 50 ملی لیٹر میں ترنجبین، شیر خشک ہر ایک 35 ملی لیٹر، عرق گلاب 250 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

جگر کی اصلاح کے لیے یہ نسخہ کار آمد ہے:

شیرہ تخم کافور 6 گرام، آب کاہو، آب خرفہ ہر ایک 5 گرام پانی میں نکال کر سبکچین 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔


آتش جو، روغن بادام اور نبات سفید ملا کر نوش کرائیں۔

جوارش کمونی 6 گرام ہر عرق بادیان 60 ملی لیٹر، صبح و شام بعد غذا/ نوش کرائیں۔

o — خارجی طور پر یہ نسخہ مفید ہے:

صندل، کافور، عرق گلاب، عصارہ گل سرخ، عصارہ کاہو میں گھس کر مقام جگر پر

ضماد کریں۔



حمی یوم حریہ THERMIC EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں بوجہ جسم میں غیر معمولی حرارت اثر انداز ہو کر اس کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے۔

اسباب

(I) دھوپ میں چلنا

(II) گرم ہوا

(III) گرم حمام

علامات

تقدّمہ کے طور پر ان اسباب کی روداد ملتی ہے، ثقل راس بھی ہو سکتا ہے، جسم کے بیرونی حصہ پر حرارت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، پیشاب میں حدت ہوتی ہے اور قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے، بعض اوقات پیشاب کا اخراج بار بار ہوتا ہے، شدید صورتوں میں درجہ حرارت 106-108 ف تک پہنچ جاتا ہے، شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، پیاس کی

شدت ہوتی ہے، مریض پر ہڈیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے، اٹکیاں آتی ہیں، قلب کی حرکات نہایت خفیف ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، نبض ضعیف اور دقت چلتی ہے۔

اصول علاج

- گرم موسم میں گرم تدابیر اختیار کرنے سے احتراز کی تاکید کریں۔
- سرد ہوا دار کمرے میں رہنے کی ہدایت کریں۔
- حسب ضرورت تبریدات، مرطبات اور مفرحات استعمال کرائیں۔
- تسکین اور تقویت قلب کی تدابیر کریں۔
- ضرورت ہو تو رفع قبض بھی کریں۔

علاج

- خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- آب قالد میں عرق گلاب ملا کر نیابت سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
- تمر ہندی 25 گرام کو 120 ملی لیٹر پانی میں بھگو کر زلال حاصل کریں اور نبات سفید 12 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
- ستو پانی میں گھول کر عرف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔
- آم کی کیری کو بھون کر نمکین پتہ بنا کر نوش کرائیں۔
- کشینز خشک 3 گرام، تخم کاہو 3.5 گرام — دونوں کو پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور چھان کر عرق گلاب 50 ملی لیٹر، شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- زر شک، بہدانہ ہموزن کو پانی میں پیس کر شربت آلو بخارا سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
- تمر ہندی 35 گرام، عرق کاسنی 60 ملی لیٹر، عرق گلاب 50 ملی لیٹر میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر سکنجبین 35 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

۵۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:

ہاتھ، پاؤں سرد پانی سے دھوئیں/سرد پانی میں آئرن کرائیں، روغن گل، آب بید،
آب کدو سر میں ملیں، آب سرد، عرق گلاب ملا کر سر پر دھاریں۔
سرکہ، عرق گلاب کو برف سے سرد کر کے کیڑے کا ایک کلو اس میں ترکیں اور
بار بار سر پر رکھنے کی ہدایت کریں۔

آم کو بھون کر اس کا گودا سارے جسم پر ملیں۔

عرق گلاب دو آتشہ، روغن گل، عرق بید مشک، سرکہ انگوری ہر ایک 4 ملی لیٹر، تازہ
گلاب کا پانی 80 ملی لیٹر، صندل سفید 4 گرام، کافور 1 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور
ملا کر نخلخہ کے طور پر کام میں لائیں۔ اسی دوا میں کیڑا بھگو کر سر، پیشانی اور سینہ پر رکھیں۔
اگر جس تنفس ہونے لگے تو کسی تاخیر کے بغیر باسلیق کی فصد کھولیں، قبض ہو تو رفع
قبض کریں۔



حمی یوم زکامیہ ونزلیہ CATARRHAL EPHEMERAL FEVER

اس مرض میں نزلہ و زکام کی وجہ سے انحرافات پیدا ہو کر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسباب

(I) نزلہ

(II) زکام

علامات


مریض نزلہ و زکام کی شکایت کرتا ہے، چنانچہ ابتدائی علامات کے طور پر تمام جسم میں درد ہوتا ہے، پیشانی پر جکڑن، درد سر، آنکھوں میں درد، چمک، اور کینٹی میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، ناک میں خشکی محسوس ہوتی ہے اور چھینکیں آتی ہیں، نھنوں کے کنارے سرخ اور دردناک ہوتے ہیں، اور رطوبت کی حدت کی وجہ سے آنسو کی نالی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، قوت سامعہ، ذائقہ اور شامہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ان تمام علامتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- 0— حسب ضرورت فصد کھولیں / اسہال لائیں / سٹکھیاں کھینچیں۔
- 0— نزلہ و زکام کے باب میں بیان کردہ اصول علاج اختیار کریں۔
- 0— درد اور بخار کے ازلہ کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0— خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:
- خمیرہ بنفشہ / شربت بنفشہ 35 ملی لیٹر، عرق کمو 85 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- بہدانہ 3 گرام، عتاب 5 عدد، سپٹاں 9 عدد— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ اگر حمی کے ساتھ درد بھی ہو تو اس نسخہ میں شیرہ تخم کا ہو مقشر 3 گرام کا اضافہ کریں۔
- یہ نسخہ بھی مفید ہے:
- گل بنفشہ 6 گرام، عتاب 5 عدد، سپٹاں 9 عدد، گاؤ زبان 5 گرام، تخم خیارین، تخم عطلی ہر ایک 5.5 گرام— تمام دواؤں کو رات کے وقت نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- حمی کے ساتھ اگر تر کھانسی بھی ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- اصل السوس مقشر 6 گرام، گل بنفشہ 12 گرام سپٹاں 7 عدد، عتاب 5 عدد، تخم خیارین، تخم عطلی ہر ایک 4 گرام پانی میں خفیف جوش دے کر نوش کرائیں۔
- 0— خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:
- استلا کی صورت میں فصد کھولیں / گردن کی پچھلی طرف سینکھیاں کھینچیں، سرکہ میں بھیکے ہوئے چوکر کی دھونی دیں، روغن بنفشہ، روغن کدو، روغن نیلوفر، ناک میں ٹپکائیں، بخار میں تخفیف ہونے پر حمام کرائیں۔



حمیات خلطیہ


Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمیات دمویہ

SANGUINEOUS FEVERS

حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) کی یہ انواع، دموی خلط میں جوش و غلیان/ عفونت کے سبب وجود میں آتی ہیں، مشترک علامت کے طور پر غلبہ خون کی بیشتر علامات پائی جاتی ہیں۔

اقسام



۱۔ بعض صورتوں میں سونو ش بھی عفونی می میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

سونو خس

SYNOCHUS

اس مرض میں دموی خلط میں جوش و غلیان ہونے کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اسباب

اندرونی / بیرونی حرارت سے خون میں جوش و غلیان پیدا ہو جانا۔

علامات


ابتدا میں حمی یوم سے مشابہ علامات ملتی ہیں۔ تاہم حرارت میں لذع اور اذیت کم ہوتی ہے، بخار دائمی ہوتا ہے، وقفہ نہیں ہوتا، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پیشاب گرم خارج ہوتا ہے اس میں عفونت نہیں ہوتی، قلب میں سوزش محسوس ہوتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، مرضی علامات زیادہ تر قلب کے آس پاس رونما ہوتی ہیں، عام طور سے 7 دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

اصول علاج

- o — فصد کھولیں۔
- o — نکسیر (رعاف) پھوڑنے کی تدابیر کریں۔
- o — مبردات کے ذریعہ اطفاء حرارت کریں۔
- o — رفع قبض کریں۔

علاج

- o — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- گل سرخ 10.5 گرام، عصارۂ زرشک 7 گرام، مغز تخم باد بونگ، مغز تخم خیار، مغز تخم خرف، طباشیر، مغز تخم خربزہ ہر ایک 3.5 گرام، صمغ عربی کثیر، نشاستہ ہر ایک 1.5 گرام، زعفران، ریوند چینی، کافور ہر ایک 500 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو کوٹ کر چھان کر حسب دستور اقراص بنائیں اور 7 گرام کھلائیں۔
- زرشک 12 گرام، تر ہندی 25 گرام، عرق شاہترہ 120 ملی لیٹر میں بھگو کر شربت عتاب، شربت انار ترش ہر ایک 12 ملی لیٹر ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں۔
- (فصد کھولنے کے بعد) — لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عتاب 5 عدد، عرق مکو، عرق شاہترہ ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر شامل کر کے خاکی 4 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔
- o — خارجی طور پر یہ تدابیر کریں۔
- فصد کھولیں۔
- نکسیر پیدا کرنے کی تدابیر کریں۔



حمیات صفراویہ



BILIOUS FEVERS

حمی کی یہ انواع، صفراوی خلط کے داخل عروق/خارج عروق متعفن ہونے سے رونما ہوتی ہیں اور کم بیش ہر نوع میں شدید علامات مرض رونما ہوتی ہیں۔ مشترک علامتوں کے طور پر کرب و اضطراب، متلی، تے، ہڈیاں، درد سر، بے خوابی، شدید پیاس، بظلمت اشتہا وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، ذائقہ تلخ اور منہ خشک ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے، پیشاب رقیق اور ناری رنگ کا آتا ہے، اور بعض اوقات نکیر (رغاف) وغیرہ بھی پھوٹی ہے۔

اقسام

حمیات صفراویہ

Bilious Fevers



حمی محرقة

اس میں صفراوی/ بلغم شور والی خلط کے داخلی عروق، اعضا ربیہ اور فم معدہ کے پاس متعفن ہونے کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور صفرا/ بلغم شور کی شدید علامات رونما ہوتی ہیں اور بخار کی نوعیت دائمی/ لازمی ہوتی ہے۔ یہ مرض بچوں اور نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

حمی محرقة

Burning Fever

حمی محرقة بلغم شور

حمی محرقة صفراوی

اسباب

(۱) خالص صفرا/ بلغم شور (نیز صفرا کے ساتھ مائیت بلغم کامل جانا) کا اعضا ربیہ اور فم معدہ وغیرہ کے پاس داخل عروق متعفن ہو جانا۔

علامات

جسمانی درجہ حرارت، حمی غیب کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مادہ مرض کی عفونت اعضا ریشہ اور فم معدہ وغیرہ کے پاس ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، زبان کھر دری، ابتدا میں زرد، اس کے بعد سیاہ ہو جاتی ہے، حرارت ہمیشہ رہتی ہے اور کبھی کم بھی ہوتی ہے تو مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا، گویا 24 گھنٹے کے درجہ حرارت میں کوئی واضح فرق نہیں ہوتا۔ درد سر، ہڈیان، اضطراب اور بطلان اشیا وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، بعض اوقات اندرون جسم کی حرارت زیادہ اور ظاہر جسم اس تناسب سے کم محسوس ہوتی ہے، بے خوابی، کپٹی کے پاس درد، اور نمیں ہوتی ہے، آنکھیں دھنس جاتی ہیں، نکسیر پھوٹی ہے، جگر اور طحال پر بھی خراب اثر مرتب ہوتا ہے، بعض اوقات سبز، زرد یا سیاہ رنگ کی تے اور دست آتے ہیں، یرقانی علامات بھی رونما ہونے لگتی ہیں، یہ مرض اگر بچوں کو عارض ہو تو ان میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے صفراوی علامات میں وہ شدت نہیں ہوتی جو جوانوں میں مشاہدے میں آتی ہے۔ بہر حال بچہ دودھ نہیں پیتا اور اگر پی بھی لے تو وہ معدہ میں فاسد ہو جاتا ہے، اس مرض کی مدت غیب لازمہ کی نسبت کم ہوتی ہے، بحران عام طور سے چھٹے/ساتویں دن ہوتا ہے اور پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے، بحران کے علاوہ پسینہ خارج نہیں ہوتا۔ عام طور سے 3-4 دن میں ہی رومی علامات رونما ہو سکتی ہیں لیکن اگر 5 دن تک رومی علامات رونما نہ ہوں تو شفا یابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

تفریقی علامات

حمی مطبقہ دموی	حمی محرقة
1- بخار تیسرے دن زیادہ نہیں ہوتا۔	1- بخار تیسرے دن زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔
2- بدن خاص طور سے چہرے پر غیر معمولی سرخی ہوتی ہے۔	2- جسم میں بہت زیادہ سرخی نہیں ہوتی۔
3- جسم کے اندر تباؤ محسوس ہوتا ہے۔	3- مطبقہ کی طرح جسم کے اندر تباؤ نہیں ہوتا۔

- 4- نیتق النفس جیسی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔
4- دمہ اور ضیق النفس کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔
5- مغز اونی: بغم شور کی علامات پائی جاتی ہیں۔
5- عروق محتلی ہوتی ہیں۔

اصول علاج

- — تسکین حرارت کریں۔
○ — غلط کا غلاب کا تنقیہ کریں / ستھیاں کھینچیں / فصد کھولیں۔
○ — پاشویہ کا اصول اختیار کریں۔

علاج

- — خوردنی طور پر یہ وہائیں استعمال کرائیں:
تسکین حرارت کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں۔
شیرہ تخم کاہو، لعاب اسپغول، ہر ایک 9 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، عرق بید سادہ، عرق کلو، عرق گلاب ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ بعض اطباء 6 گرام خاکسی اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔
شیرہ عتاب 5 عدد، شیرہ مغز تربوز، شیرہ تخم کاہو ہر ایک 6 گرام، عرق کاسنی، عرق شاہترہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
خس 12 گرام کو عرق بید سادہ، عرق نیلوفر، عرق گلاب ہر ایک 85 ملی لیٹر میں بھگو دیں 12 گھنٹے بعد مل چھان کر لعاب بہدانہ 3 گرام (پانی میں نکالا ہوا) بکھینیں، شربت نیلوفر ہر ایک 12 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
نسخ مادہ کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:
شیرہ تخم کاہو، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز تخم کاسنی، شیرہ تخم خیارین ہر ایک 5 گرام، شیرہ آلو بخارا 5 عدد، عرق شاہترہ، عرق کلو ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر، 25

ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

ساتویں دن جب کرب و اضطراب زیادہ ہو جائے اور پیاس کا غلبہ ہو تو مغز تخم کا ہو، تخم تربوز کی مقدار 12 گرام کر دیں اور خرفہ سیاہ 12 گرام کا اضافہ کر کے تخم خیارین کو نسخہ سے حذف کر دیں۔

آٹھویں دن مسہل کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

شاہترہ 5 گرام، مکو، گل سرخ ہر ایک 7 گرام، گل نیلوفر 6 گرام، تخم کاسنی، تخم خیارین، ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر مغز فلوں خیار شہرہ 8 گرام، تمر ہندی 50 گرام، ترنجبین 25 گرام، گلقد 25.5 گرام ملا کر دوبارہ مل چھان کر نوش کرائیں۔ بعض اطباء روغن بادام 5 ملی لیٹر، لعاب اسپنول 12 گرام کا اضافہ مفید تصور کرتے ہیں۔

دوسرے دن تمہید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

طباشیر 1 گرام، خوب باریک پیس کر خمیرہ صندل سادہ 12 گرام میں ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ مغز تخم خیارین، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز تخم تربوز، ہر ایک 9 گرام، لعاب بہدانہ 9.5 گرام۔ عراق نیلوفر، عرق گلاب، عرق بید سادہ ہر ایک 50 گرام میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

تمہید کے دوسرے دن مسہل والا نسخہ بروئے کار لائیں لیکن اس میں اب سنائی 7 گرام کا اضافہ کر دیں۔ اس کے دوسرے دن تمہید والا نسخہ استعمال کرائیں۔ اس کے بعد سفوف ہندی قرص طباشیر کا فوری اطباء کے معمولات میں سے ہے۔

سفوف ہندی کا نسخہ درج ذیل ہے:

طباشیر، ست گلو، زہر مہرہ، صندل سفید، کات سفید، مروارید ناسفہ ہر ایک 4.5 گرام، زعفران، کافور ہر ایک 2 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کوٹ چھان کر 2-3 گرام ہمراہ شربت نیلوفر 12 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

قرص طباشیر کا فوری کا نسخہ یہ ہے:

صندل سفید، کثیر، صمغ عربی، رب السوس ہر ایک 7 گرام، تخم کاسنی، تخم خرفہ، تخم کاہو، گل اومنی ہر ایک 10 گرام، مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، گرد ساق ہر ایک 18 گرام، طباشیر، زرشک ہر ایک 25 گرام، ترنجبین 35 گرام، کافور 3 گرام، زعفران 1 گرام— حسب دستور تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 5 گرام ہمراہ آب کاسنی سبز مروق (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔

کبھی کبھی جمی کی وجہ سے اسہال آنے لگتے ہیں، اس صورت میں قابض کے طور پر یہ نسخہ از حد مفید ہے:

طباشیر، گل سرخ ہر ایک 9 گرام، تخم خرفہ، تخم کاسنی ہر ایک 10.5 گرام، رب السوس، نشاستہ ہر ایک 3.5 گرام، کافور 1.5 گرام، زعفران 750 ملی لیٹر— تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں گوندھ کر گولیاں بنائیں اور 7 گرام ہمراہ شربت حب الّاس 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

۵ — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:

حسب ضرورت باسلین کی فصد کھولیں۔

پیردوں پر سینکھیاں کھینچیں۔

پاشویہ کریں۔

صندل سفید، عرق گلاب میں گھس کر سینہ پر لیپ کریں۔

شدید ہڈیان کی صورت میں صندل کو عرق گلاب، سرکہ میں گھس کر سر پر

لگائیں— روغن گل اور سرکہ ملا کر سر میں ڈالنا بھی مفید ہے۔

درد سر کی صورت میں صندل سفید 6 گرام، تخم کاہو 6.5 گرام، پانی میں پیس کر

پیشانی پر ضماد کریں۔



حمیات بلغمیہ PHLEGMATIC FEVERS

حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) کی یہ اقسام، بلغمی خلط کے داخل عروق/خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے حمی بلغمیہ کی متعدد ذیلی قسمیں بنتی ہیں:

مشترک علامت کے طور پر ازدیاد حرارت کی شدید صورت رونما نہیں ہوتی گویا حمایات صفراویہ کی شدت نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں کم دیش 6 گھنٹے کا وقفہ بھی ہوتا ہے، پیشاب غلیظ اور گدلا خارج ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے، دوسرے عوارض میں شدت نہیں ہوتی، عام طور سے پسینہ بکثرت آکر بخار اتر جاتا ہے، حمیات بلغمیہ کی تمام اقسام میں اس طرح کا بخار اسلم تصور کیا جاتا ہے جو پسینہ دے کر اتر جائے اور اس کے بعد گرمی باقی نہ رہے۔ واضح رہے کہ حمیات بلغمیہ عام طور سے 18 دن میں اتر جاتا ہے اور بعض اوقات مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے، اس مرحلے میں مدت مرض 64 دن ہو سکتی ہے۔

اقسام

بنیادی اعتبار سے

حمیات بلغمیہ

Phlegmatic Fevers

حمی مواظبہ / ناسبہ

Quotidian Fever

حمی ثقہ / دائمہ

Adhering/Asthenic Fever

ان کے علاوہ نافع ساذج (سادہ لرزہ)، انفیالوس وغیرہ بھی حمیات بلغمیہ میں شمار کیے جاتے ہیں، نافع ساذج میں اگرچہ ازدیاد حرارت جسمانی نہیں ہوتا، لیکن مریض اسی واہمہ میں مبتلا رہتا ہے کہ اب ازدیاد حرارت ہوا ہی چاہتا ہے۔ ان تمام انواع کا تفصیلی بیان آئندہ سطور میں کیا جا رہا ہے۔

+++

حمی ثقہ

ASTHENIC FEVER

اس مرض میں عروق میں بلغم کے متعفن ہو جانے کی وجہ سے خفیف لازمی بخار ہوتا ہے اور بہت سی دوسری علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرطوب، نزلاوی مزاج لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

- (I) غلط بلغم کا داخل عروق متعفن ہونا۔
- (II) معدہ میں دماغی نزلات کا تراوش پاکر متعفن ہو جانا۔
- (III) سرد میوہ جات / ترش اشیا کا سرد کر کے کھانا / مضغف معدہ اشیا کا بکثرت استعمال۔

علامات

جسمانی درجہ حرارت خفیف طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی نوعیت لازمی ہوتی ہے، چنانچہ یہ کلی طور پر کبھی نہیں اترتا، خفیف کی اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، نوبت ہر روز آتی ہے۔ چنانچہ باری کے شروع میں سردی محسوس ہوتی ہے اور قشعر یہ ہوتا ہے، تاہم لرزہ طاری

نہیں ہوتا، دورہ 8-8 گھنٹے تک رہتا ہے، نبض سریع اور لین چلتی ہے، بخار کی حالت میں جسم سے پسینے کا اخراج بالکل نہیں ہوتا، چودھویں دن اور بعض اوقات بیسویں/تیسویں دن بحران ہو کر بخار اتر جاتا ہے، اس صورت میں اسہال اور پسینہ آتا ہے، کبھی کبھی 40-60 دن تک خفیف طور پر بخار موجود ہوتا ہے اور معالج کوئی دق کا دھوکہ ہونے لگتا ہے، ضعف معدہ کی شکایت ہوتی ہے، چہرے پر کسی قدر سوجن ہوتی ہے، پیشاب غلیظ، رنگین اور مکدر ہوتا ہے، عام طور سے کھانسی اور نزلہ کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ مزمن صورت اختیار کر لینے پر جگر کی کارکردگی پر بھی خراب اثر پڑتا ہے اور چہرے کے علاوہ ہاتھ پیر بھی سوج جاتے ہیں، لیٹرغش (سرسام ہارڈ) کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔

تفریقی علامات

حمی دق Hectic Fever	حمی ثقہ Adhering Fever
1- غذا کھانے کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔	1- غذا لینے کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا۔
2- امتلا نہیں ہوتا بلکہ لاغری ہوتی ہے۔	2- جسم میں امتلا ہوتا ہے۔
3- نبض صلب مہمد، دقیق، متواتر اور ضعیف چلتی ہے اور ایک ہی حالت پر قائم رہتی ہے۔	3- نبض صغیر نہیں چلتی ہے۔
4- رات کے وقت درجہ حرارت میں نہایت اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے۔	4- رات کے وقت بخار میں زیادتی کوئی ضروری نہیں۔ نہ ہی پسینہ خارج ہوتا ہے۔
5- غذا لینے کے بعد نبض عظیم اور قوی ہوتی ہے۔	5- غذا لینے کے بعد نبض کی صغر اور سرعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

- 6- بخار سے قبل بلغم میں اضافے کے اسباب ملتے ہیں۔
 6- بخار سے قبل غم و فکر اور انفعالات نفسانی کی بے اعتدال کی روئیداد ملتی ہے۔
 7- کثرت جماع، احتلام، جریان منی وغیرہ ایسا نہیں ہوتا۔
 7- کے ذریعہ منی/رطوبات اعلیٰ خارج ہوتی ہیں اور مرض لاحق ہوتا ہے۔

اصول علاج

- — منہج بلغم ادویہ استعمال کرائیں۔
- — مسہلات اور ملینات بروئے کار لائیں۔
- — تھے آور دوائیں دیں۔ بشرطیکہ دوسرے موجود نہ ہو۔
- — حمی کے ازالہ کی تدابیر کریں۔

علاج

- — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:
- منہج بلغم کے لیے یہ نسخہ دیں:
- بادیان، گل بنفشہ، اصل السوس مقشر ہر ایک 4 گرام، عناب 7 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنفشہ 50 ملی لیٹر/گلقتند 50 گرام حل کر کے چھان لیں اور خاکسی 5 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔
- آٹھویں دن مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- گل بنفشہ، عنب الثعلب، بادیان، اصل السوس ہر ایک 9 گرام، پر سیا و شاں 6 گرام، عناب 10 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر اور ترنجبین، مغز فلوں خیار خنبر، ہر ایک 50 گرام ملا کر مل چھان لیں اور گلقتند 50 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں — سوٹھویں دن مسہل کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

اصل السوس، عنب الثعلب، گاؤ زبان، بادیان، گل بنفشہ ہر ایک 9 گرام، عنب
10 عدد، پوست تنخ کاسنی 6 گرام، سناکی 12 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے
کر ترنجبین، مغز فلوں، خیار شہیر، ہر ایک 50 گرام ملا کر مل لیں اور گلقد 25 گرام حل
کر کے چھان کر روغن بادام 5 عدد پیس کر ملائیں اور نوش کرائیں۔
سہ چوبیس دن بلینڈ مرہی عرق گلاب سے دھو کر کھلائیں۔

انھارہویں دن قرص گل صغیر 5 گرام ہمراہ سیکنجبین بڑوری معتدل 25 ملی لیٹر
استعمال کرانے کے بعد پوست تنخ کاسنی، عنب الثعلب، شکائی ہر ایک 4 گرام، پانی میں
جوش دے کر مل چھان کر گلقد 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ قرص گل صغیر کا نسخہ درج
ذیل ہے:

گل سرخ 35 گرام، عصاہ غافث، افسنتین، اصل السوس ہر ایک 15 گرام،
سنبل الطیب، مصطکی رومی، اگر، اذخر ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق
گلاب میں گوندھ کر اقراص بنائیں۔

اس بخار کی مزمن صورت میں یہ نسخہ مفید تصور کیا گیا ہے:
پرسیاوشاں، بادیان، اصل السوس ہر ایک 4 گرام، اجوائن 2 گرام، قرنفل 4 عدد،
مویز حنقی 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور نبات سفیدہ
25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ اس کے بعد مسہلات استعمال کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے:

دار فلغل 1 عدد، قرنفل 2 عدد کو عرق کاسنی، عرق کلو ہر ایک 18 ملی لیٹر میں بھگو
دیں، صبح کو چھان کر قند 12 گرام ملا کر نوش کرائیں، روزانہ دواؤں کا وزن بڑھاتے رہیں،
چودہ دن بعد بدستور گھٹا کر ابتدائی خوراک پر لائیں۔

اس مرض میں یہ نسخے بھی از حد مفید ہیں:
گل سرخ 21 گرام، شاترہ، سنبل الطیب ہر ایک 14 گرام، مصطکی رومی، کبریا
ہر ایک 10.5 گرام، انیسون 7 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص بنائیں اور

5 گرام، استعمال کرائیں۔

افستین، اسارون، تخم کرفس، مغز بادام تلخ، شکائی، باد آورد، سنبل الطیب مصطفیٰ
رومی، انیسون ہر ایک 7 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے قرص بنائیں اور 5 گرام
کھلائیں۔

صخر فاری، گل سرخ، زنجبیل ہر ایک 10 گرام، کشنر خشک 14 گرام، پودینہ
نہری، 18 گرام، مویر متقی 25 گرام — تمام دواؤں کو 50 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔
جب 25 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر تھوڑا تھوڑا نیم گرم نوش کرائیں۔
عافیت 9 گرام، طباشیر 25 گرام، سنبل الطیب 250 گرام، گل سرخ 240
گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر قرص بنائیں اور 5 گرام کھلائیں۔



حمی مواظبہ

QUOTIDIAN FEVER

اس مرض میں بلغم، عروق کے باہر متعفن ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کی باری 24 گھنٹے میں ایک دو بار ضرور آتی ہے۔ مرطوب مزاج لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

- (I) بلغم کا عروق کے باہر متعفن ہو جانا۔
- (II) دودھ/پھلّی وغیرہ کا بکثرت استعمال۔
- (III) سرد پانی سے غسل کرنا/سرد پتھروں پر بیٹھنا۔
- (IV) سرد غذا کھانے کے بعد مباشرت کرنا۔
- (V) جدید تحقیقات کے مطابق یہ لیریائی بخار ہے اور خون میں لیریا کی طفلی پائے جاتے ہیں۔

علامات

ایک ہی دن میں 2-1 مرتبہ مرض کا دورہ پڑتا ہے۔ بخار سے پہلے سردی محسوس ہوتی ہے اور جسم کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لرزہ بھی ہوتا ہے، جوش، کرب و اضطراب، پیاس اور سانس چڑھنے کی شکایت نہیں ہوتی، مریض کا رنگ سفید، زردی مائل، قلعی کے رنگ کے مشابہ ہو جاتا ہے، سستی اور غفلت طاری رہتی ہے، عام طور سے باری 18 گھنٹے اور وقفہ کی مدت 6 گھنٹے ہوتی ہے، وقفہ کی حالت میں بھی اندرون جسم بخار ہوتا ہے، باری باقاعدہ اور بے قاعدہ، دونوں طرح ہو سکتی ہے، فم معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور بھوک زائل ہو جاتی ہے، عام طور سے ملمس نرم ہوتا ہے، نبض ضعیف اور صغیر چلتی ہے اور آخر میں شدید طور پر مختلف ہوتی ہے، درد سر کی شکایت ہوتی ہے، طحال بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کا انحصار نوبت کے اوپر ہے چنانچہ اگر روزانہ نوبت آتی رہے تو طحال بہت بڑھ جاتی اور سوء التقدیہ کی علامات رونما ہوتی ہیں، چہرے پر جھائیاں پڑ جاتی ہیں، عام طور سے قے اور اسہال کی شکایت ہوتی ہے جس میں بلفی مادہ خارج ہوتا ہے، ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، بدن ڈھیلا اور چہرہ بھر بھرایا ہوتا ہے، فتنہ میں رطوبت بہت زیادہ آتی ہے، پیشاب ابتدا میں رقیق خارج ہوتا ہے اور اس کی رنگت پانی جیسی ہوتی ہے مگر جب بخار کی کئی باریاں گزر چکتی ہیں اور عفونت بڑھتی جاتی ہے تو سرخ گرم اور تیز ہو جاتا ہے، ٹکدر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کی رنگت بدلتی رہتی ہے، چنانچہ مادہ غلیظ کے جسم سے نکلنے/ مادہ کے تحلیل ہونے کے درمیان میں سدہ حائل ہو جانے کی صورت میں پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے۔

اس مرض کی علامتوں کو ہم درج ذیل تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) سردی کا درجہ

(II) حرارت کا درجہ

(III) تعریق (پسینے) کا درجہ

سردی کا درجہ

ابتدا میں سستی، کابلی اور اعضاء غلٹی کی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سردی کا احساس ہوتا ہے، عام طور سے سردی کا احساس پشت سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ سارے جسم میں ہونے لگتا ہے، پھر سردی اس قدر شدت اختیار کر لیتی ہے کہ دانت بجتے لگتے ہیں، انگلیوں کے پورے نیلگوں ہو جاتے ہیں، ناخن اور ہونٹوں پر بھی نیلا پن آ جاتا ہے، گرم کپڑے ازھانے سے بھی سردی ختم نہیں ہوتی، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اس حالت میں بھی جسمانی درجہ حرارت 104-105 ف تک رہتا ہے، چنانچہ منہ خشک رہتا ہے اور شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، اندرونی اعضاء میں اجتماع خون ہونے کی وجہ سے گرانی سر، درد سر، بے ہوشی، ہڈیان، مٹلی اور تے وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، سردی کا یہ درجہ عام طور سے 60-90 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اندرونی اعضاء میں اجتماع خون ہو گیا ہو تو پھر 5-6 گھنٹے تک سردی کا درجہ رہتا ہے، اور باریوں کے لگاتار آتے رہنے سے یہ مدت بہت مختصر ہو جاتی ہے بلکہ خفیف جھرجھری سی محسوس ہو کر رہ جاتی ہے۔

حرارت کا درجہ

سردی کے درجہ کے ختم ہونے پر مریض کچھ راحت محسوس کرتا ہے لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی رفتہ رفتہ مریض کا جسم گرم محسوس ہونے لگتا ہے، اور حرارت کی شدت کی وجہ سے مریض کپڑے اتار پھینکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، منہ بھی اس مرحلے میں خشک ہو جاتا ہے، زبان پر سفید تہہ جی ہوتی ہے، مٹلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، اس مرحلے میں پیشاب قلیل مقدار میں سرخ رنگ کا آتا ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے، یہ درجہ 3-4 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ حرارت کے کم ہونے پر جسم سے پسینہ آنے لگتا ہے۔

تعریق کا درجہ

حرارت کے کم ہونے پر ابتدا میں چہرے اور پیشانی پر پسینہ آنے لگتا ہے پھر

سارے جسم سے اس قدر پسینہ خارج ہوتا ہے کہ ترتر ہو جاتا ہے، قوت جسمانی میں ضعف طاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو نیند آنے لگتی ہے۔

اصول علاج

۰ — زمانہ ابتدا میں تلپین شکم کریں / معرقات اور قے آور دوائیں استعمال کرائیں۔

۰ — زمانہ ابتدا کے بعد منضجات بلغم اور مسہلات استعمال کرائیں۔

۰ — تحقیر مواد کے بعد دافع حمی دوائیں استعمال کرائیں۔

۰ — بخار رفع ہو جانے پر مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

۰ — خوردنی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں:

تلپین کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گلقد 50 گرام کو عرق کاسنی، عرق بادیان، عرق کرفس ہر ایک 35 ملی لیٹر میں گھول کر نوش کرائیں۔

سکچین عسلی / شکاری 25 ملی لیٹر ہمراہ عرق کاسنی، عرق بادیان، عرق کرفس ہر ایک 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

حسب ضرورت (قوی ملین کے طور پر) گلقد 50 گرام، مغز فلوں خیاض 60 گرام، شکر سفید 50 گرام کے ضیائدہ میں ملا کر نوش کرائیں۔

قے کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

آب ترب (سولی کا پانی) 120-175 ملی لیٹر، سکچین 50 ملی لیٹر، دونوں کو ملا کر نیم گرم نوش کرائیں۔

ترب کو سکچین بزدوری میں بھگو کر کھلائیں۔ یہاں ایک بات ملحوظ رکھیں کہ اگر دواء ملین (گلقد وغیرہ) صبح کے وقت کھلائیں تو قے آور دوا سہ پہر کو استعمال کرائیں اور اگر

تے آور دواؤں سے درد سر لاحق ہو تو خارجی تدابیر مثلاً ہاتھ پیروں پر گرم پانی دھاریں،
بایونہ کا فطول کریں اور پنڈلیاں کس کر باندھ دیں۔

تلسین کے لیے خفیف ہٹنے بھی از حد مفید ہیں۔ چنانچہ شہد 50 ملی لیٹر، نمک 25
گرام، آب چقدر، روغن کنجد ہر ایک 48 ملی لیٹر سے حسب دستور حقنہ کریں۔ یہاں یہ امر
ملاحظہ رکھیں کہ ہٹنے والے دن کوئی ملین دوا نہ استعمال کرائیں۔
نفع مادہ کے لیے آٹھویں دن یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

بادیان، برگ کرفس ہر ایک 7 گرام، بخ اذخر، پریادشاں ہر ایک 5 گرام —
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور سکنجبین بزدوری 50 ملی لیٹر مل کر کے
نوش کرائیں، اس درمیان گلقد کا استعمال بدستور رکھیں۔

تیرہ، چودہ دن بعد مذکورہ بالا نسخہ کے ساتھ آب برگ بادیان، آب برگ کرفس ہر
ایک 60 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔ تخم کرفس، انیسون، ہر ایک 50 گرام پانی میں جوش دے
کر سکنجبین بزدوری (زوفا اور حاشا ملی ہوئی) 35 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔ ان اعلیٰ درجہ کی
منضجات کے بعد تحقیق کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں:

پریادشاں 5 گرام، تربد سفید 6 گرام، مویز متقی 25 گرام، انجیر زرد 3 عدد، برگ
سناکی 12 گرام۔ منضج مذکورہ بالا میں حسب دستور جوش دیں اور مغز فلوں خیارشمر 75 گرام،
گلقد 50 گرام اس میں مل چھان کر روغن بادام 4 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

یہ دوائیں بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ ان میں جی کی رعایت بھی کی گئی ہے۔

ایارج 25 گرام، تربد سفید 35 گرام، ہلیلہ سیاہ، گل عافث ہر ایک 18 گرام،
انیسون، نمک ہندی ہر ایک 12 گرام، باد آورد، شکائی ہر ایک 14 گرام — تمام دواؤں کو
آب برگ کرفس بزر/ عرق کرفس 450 ملی لیٹر میں جوش دیں اور 140-90 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
بخ بادیان، بخ کاسنی، اصل السوس مقشر ہر ایک 35 گرام، ایارج 28 گرام،
عصارہ عافث 18 گرام، بادیان، تخم کرفس ہر ایک 4 گرام، نعناع، سنبل الطیب، گل سرخ،
ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر قرص بنائیں اور

3-7 گرام کھلائیں۔

ایارج، افسختین روی، باد آورد، شکائی، عصارہ غافٹ ہر ایک 18 گرام، انیسون، تخم کرفس بادیان ہر ایک 11 گرام، نمک نفطی 14 گرام، بلیلہ کابلی، تخم کشت/ ہر ایک 35 گرام غاریقون 50 گرام، قرص درد 75 گرام، تربد 108 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے قرص بنائیں اور 3-6 گرام کھلائیں۔

ایارج، بلیلہ کابلی، نمک طعام ہر ایک 14 گرام، افسختین روی 18 گرام، قرص درد 11 گرام، شکائی، باد آورد ہر ایک 7 گرام، تخم کرفس، بادیان/ ہر ایک 4 گرام، انیسون 5 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر خوب بنائیں اور 3-6 گرام استعمال کرائیں۔
ریوند چینی، صبر، بلیلہ زرد، عصارہ غافٹ، افسختین روی، مصطکی ہر ایک 5 گرام، زعفران 2.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے قرص بنائیں اور 3-6 گرام استعمال کرائیں۔

اس مرض میں درج ذیل نسخے از حد مفید ہیں:

شاہترہ، شکائی، باد آورد، غافٹ، افسختین ہر ایک 10.5 گرام، مویز منقی 35 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل کو صاف کر کے نوش کرائیں۔
برنجاسف 3-6 گرام رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو تھار کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔
شکائی، باد آورد ہر ایک 3 گرام — دونوں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو اس کا زلال حاصل کریں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
گل غافٹ 9 گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور سکنجبین 35 ملی لیٹر کر کے نوش کرائیں۔

شب یمانی بریاں، سہاگہ بریاں، اجوائن خراسانی، نمک لاہوری ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر آب برگ دھتورہ میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور سردی کے درجہ کے آغاز سے 2 گھنٹے پہلے 1-2 گولیاں کھلائیں۔

برگ ریحاں 6 گرام، دار قفل 1 عدد، قفل سیاہ 4 عدد، نبات سفید 12 گرام—
تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر چھان لیں اور نوش کرائیں۔
افستخین رومی، انیسون، تخم کرفس، مغز بادام تلخ، ہوزن— تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر اقراص بنائیں اور سائے میں خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ حسب ضرورت پانی کے
ساتھ استعمال کرائیں۔

افستخین رومی، انیسون، مغز بادام تلخ، صبر، سنبل الطیب ہر ایک 14 گرام، عصارہ
عاقث، سازج ہندی، اسارون، ہر ایک 10.5 گرام، تخم کرفس، مصطلی رومی ہر ایک
3.5 گرام— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں اور
3-4 گرام ہمراہ جوشاندہ افستخین (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔

پیچیل، مغز کرنجہ ہر ایک 12 گرام، برگ بول، زیرہ سفید ہر ایک 6 گرام—
تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور
1-2 گولیاں کھلائیں۔

گل سرخ 35 گرام، اصل السوس، عصارہ عاقث، افستخین رومی ہر ایک 15
گرام، اگر مصطلی، سنبل الطیب، اذخر ہر ایک 4 گرام— تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق
گلاب میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 5 گرام استعمال کرائیں۔
کات سفید، گل سرخ ہر ایک 4 گرام، سم القار 250 گرام— تینوں دواؤں کو
باریک کر کے قفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور باری آنے سے 3-4 گھنٹے قبل ایک گولی
کھلائیں۔

بخ بادیان، بخ کاسنی، اصل السوس، باد آورده، شکائی، گل عاقث، شاہترہ ہر ایک
13.5 گرام، تخم کاسنی، تخم کشوٹ، تخم خیارین، تخم خربزہ، بادیان، ہر ایک 9 گرام نبات سفید
30 گرام— حسب دستور شربت بنائیں اور 25 ملی لیٹر، صبح و شام نوش کرائیں۔

انیسون، بادیان، تخم کشوٹ، تخم کاسنی، سازج ہندی، اسارون، بخ سوسن، سلجہ،
بھانج، صحر قاری، سنبل الطیب، گل عاقث، زوقائے خشک، شکائی، باد آورده، تخم کرفس، ہر

ایک 3.5 گرام، بچ کاسنی، بچ بادیان، ریوند خطائی، لک مغسول، شکر تیتال، پر سیاوشاں، عنب الثعلب، گاؤ زبان، گل سرخ، تخم خربزہ، تخم خیارین، اصل السوس، ہر ایک 10.5 گرام، مویز منقہ 14 گرام، انجیر زرد 7 عدد، نبات سفید 500 گرام — حسب دستور شربت تیار کریں اور 25-35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

تخم کشوٹ 5 گرام پیس کر سلجھیں 12 ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں اور اس کے بعد عنب الثعلب 85 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

برگ مدار (زرد شدہ، جو پیلا پڑ گیا ہو) کو انگاروں کی آگ پر خاکستر کریں، 250 ملی گرام شہد (حسب ضرورت) میں ملا کر چٹائیں۔

بعض اوقات معدہ اور امعاء میں بلغم لزج چپک جاتا ہے اور پاخانہ کے ساتھ تھوڑا بہت بلغم آتا ہے، ایسی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گل بنفشہ 6.5 گرام، بادیان، بچ کاسنی ہر ایک 7 گرام، تخم کشوٹ، پر سیاوشاں، گاؤ زبان، ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کول چھان کر خیرہ بنفشہ 50 گرام ملا کر نیم گرم نوش کرائیں۔

شام کے وقت یہ نسخہ دیں:

شیرہ بادیان 5 گرام، مویز منقہ 9 عدد، عرق مکو، عرق بادیان ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر خیرہ بنفشہ 50 گرام حل کر کے چھان لیں اور نوش کرائیں۔

اگر اس جی کے ساتھ احشاء میں درم، نزہ، حلق میں درد، کھانسی، طحال میں درم، آنتوں میں خراش، زحیر، تے وغیرہ کی شکایت بھی ہو تو مذکورہ بالانسخہ میں ان عوارض کے ازالہ سے متعلق دواؤں کا اضافہ کریں۔ مثلاً احشاء میں درم کی صورت میں آب برگ کاسنی، سبز مرقق/ آب برگ مکو سبز مرقق 50 ملی لیٹر، نزہ کی صورت میں تخم عطمی، تخم خیار ہر ایک 7 گرام، حلق میں درد کی صورت میں برگ قوت 12 گرام، کھانسی کی صورت میں اصل السوس مقشر، گل گاؤ زبان ہر ایک 5 گرام، درم طحال کی صورت میں انجیر زرد 2 عدد، امعاء میں خراش اور زخیر کی صورت میں لعاب ریشہ عطمی 7 گرام کا اضافہ کریں۔

سادہ لرزہ*

SIMPLE CHILL

اس مرض میں بخار کے بغیر لرزہ اور سردی کا بار بار احساس ہوتا ہے اور مریض سوچتا ہے کہ لرزہ و سردی کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں ضرور اضافہ ہو جائے گا لیکن اضافہ نہیں ہوتا یہ صورت نوعتی طور پر رونما ہوتی ہے۔

اسباب

- (I) ہلکی زجاجی — غیر متعفن زجاجی بلغم کا سارے جسم میں پھیل کر برودت پیدا کر دینا یہی برودت کا اضافہ لرزہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
- (II) عام جسمانی لاغری/ضعف

علامات

جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ کے بغیر باری کے ساتھ بار بار لرزہ محسوس ہوتا ہے۔ کرب و اضطراب اور غلبہ پیاس وغیرہ کی علامتیں یکسر مفقود ہوتی ہیں۔


* نافض بلاحی — ملحوظ رہے کہ اس کا تعلق حیات سے براہ راست نہیں تاہم مریض کے احساسات حسی جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے حیات کے ذیل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

اصول علاج

- o — مخرج بلغم تدابیر/ ادویہ استعمال کرائیں۔
- o — مفتحات اور معرقات استعمال کرائیں۔
- o — طبی مواظبہ کا اصول علاج (حسب ضرورت) بروئے کار لائیں۔
- o — عام جسمانی ضعف / لاغری کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- o — داخلی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
- جند بیدستر 4 گرام، قفل گرد 2 گرام کو باریک کر کے دواء المسک تلخ 4 گرام میں ملا کر کھلائیں اور اس کے بعد عرق شاہترہ 60 ملی لیٹر، عرق افسخین 35 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- قسط شیریں 6 گرام، غاریقون 3 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ 3 گرام استعمال کرائیں۔
- o — خارجی طور پر درج ذیل طریقے اختیار کرائیں:
- چم کٹاں، چم تیرہ تیزک، چم گذر، چم شلجم، سداب، بلابل، بادیان، برگ کرفس، گندنا ہر ایک 18 گرام، کرنب 2 کلو گرام، پیاز 300 گرام، روغن زیتون 120 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو 30 لیٹر پانی میں جوش دیں، جب 10 لیٹر رہ جائے تو چھان کر نیم گرم پانی میں آہرن کرائیں۔
- اکلیل الملک، بابونہ، قیسوم ہر ایک 35 گرام، مرزنجوش، اذخر، پوست بادیان، پوست بخ کرفس، گل سرخ، ہر ایک 18 گرام تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں۔
- جب 3 لیٹر رہ جائے تو بھپارہ کرائیں۔
- روغن قسط کی مالش کریں۔
- ریاضت وغیرہ کرائیں تاکہ بلغم تحلیل ہو جائے۔



ایفیا لوس *

EPHIYALUS

اس مرض میں جسم کے اندر سردی اور ظاہری جسم پر حرارت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بخار بلغمی بخاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سرد مزاج لوگوں اور بوزھوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

(I) بلغم زجاجی کا اندرون جسم میں مجتمع ہونا اور اس کے کسی حصہ کا متعفن ہو جانا۔ چنانچہ بلغم زجاجی کی وجہ سے اندرون جسم برودت اور کسی قدر متعفن بلغم کی وجہ سے ظاہر جسم میں حرارت ہوتی ہے۔

علامات

جسمانی درجہ حرارت طبعی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اندرونی اعضاء سرد ہوتے ہیں، سستی اور کسل مندی طاری رہتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، نبض بلی اور متفاوت چلتی ہے، پیشاب سرد اور خام، خارج ہوتا ہے، مرض کا دورہ روزانہ پڑتا ہے، چنانچہ 24 گھنٹے میں *

اس کو انفیا لوس / انفیا یوس اور انفیا یوس بھی کہتے ہیں۔

ایک مرتبہ بخار اترتا ضرور ہے، بعض اوقات غلظت کی وجہ سے یہ گرمی ریلخ / غب کی طرف بھی
مستحیل ہو جاتا ہے۔ معالج سے بے پرواہی اور عرصہ تک بخار رہنے سے استقاء الحمی کے
امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔

اصول علاج

- o — غلط غالب کے لیے مضغبات و مسہلات استعمال کرائیں۔
- o — مدرات بول استعمال کرائیں۔
- o — معدہ کی تقویت کا خیال رکھیں۔

علاج

o — خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
منفج اور ملطف بلغم کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
گلقد 25 گرام، عرق بادیان، عرق کاسنی، عرق عنب القلب ہر ایک 50 ملی لیٹر
میں ملا کر چھان لیں اور سیکچمین بزدوری 25 ملی لیٹر حل کر خاکی 5 گرام چھڑک کر نوش
کرائیں۔ جب نفج کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
برگ سناکی 12 گرام، عاریقون 3 گرام، حجم کرفس، بادیان ہر ایک 10 گرام،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر خیار ضمیر 75 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے مل
چھان کر نوش کرائیں۔

دوسرے دن یہ نسخہ استعمال کرائیں:


قرص گل 5 گرام، ہمراہ گلقد 25 گرام استعمال کرائیں۔ ضعف معدہ کی شکایت
میں ہو تو مصطکی رومی، انیسون، عود، ہر ایک 1 گرم باریک پیس کر شامل کریں۔
مریض کے قویٰ کو بحال رکھنے کے لیے — دواء المسک 5 گرام ہمراہ ماء الاصول
60 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

حمیات سوداویہ MELANOTIC FEVERS

اس نوعیت کے بخار سوداوی خلط کے متعفن ہونے سے رونما ہوتے ہیں اور باریوں کا انحصار سوداوی خلط کے داخل عروق اور خارج عروق متعفن ہونے پر ہے، علامات بھی انہیں کے تابع ہوتی ہیں، چونکہ اس کی باریاں عام طور سے چوتھے دن آتی ہیں اس لیے حمی ”ربیع“ بھی کہتے ہیں۔


اقسام

(الف)



(ب) احتراق خلط کے اعتبار سے

حمیات سوداویہ



اسباب

(I) سوداوی خلط کا داخل عروق/خارج عروق متعفن ہونا۔

(II) خون/صفراء/بلغم/سودا طبعی کا احتراق۔

(III) آتشک۔

(IV) جذام۔

(V) حرارت مفرط کا مدت تک بدن میں رہنا۔

(VI) سوء ہضم۔

(VII) بلغمی امراض کا تقدم۔

(VIII) سوداوی امراض مثلاً صرع/ماجنو لیا/فساد خون۔

(IV) کثرت مباشرت۔

(X) کثرت مطالعہ/فکر و تردد کی زیادتی۔

ملاحظہ رہے کہ سوداوی خلط کے داخل عروق متعفن ہونے کی صورت میں حمی ربع

لازمہ اور عروق سے باہر متعفن ہونے کی صورت میں حمی ربع دائرہ عارض ہوتا ہے۔

علامات

ابتدا میں تھوڑی سردی محسوس ہوتی ہے جو بتدریج بڑھتی ہے۔ باری ختم ہونے کے

وقت کسی قدر کم ہو جاتی ہے، قشر پر ہوتا ہے، جسم میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، سردی کے احساس کے ساتھ ساتھ اعضا شکنی کی بھی شکایت ہوتی ہے، لرزہ کی وجہ سے دانت بچتے ہیں، بصارت ضعیف ہو جاتی ہے لیکن مادہ مرض کے نفع پاجانے پر پینائی اصل حالت میں آ جاتی ہے، نبض صغیر متفاوت اور بطنی چلتی ہے۔

(الف)

(۱) حمی ریلج دائرہ

اس میں بخار کی باری چوتھے دن آتی ہے، عوارض میں حمی ریلج لازمہ کی نسبت تخفیف ہوتی ہے۔

(۱۱) حمی ریلج لازمہ

اس میں بخار لازمی نوعیت کا ہوتا ہے، تین دن تک کم و بیش ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ چوتھے دن حرارت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، پھر تین دن بخار رہتا ضرور ہے لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی۔ البتہ چوتھے دن پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ یہ نوع ہر چوتھے دن شدید صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ حمی ریلج لازمہ زیادہ عام نہیں ہے۔ بعض اوقات مریض میں حمی ریلج دائرہ اور حمی ریلج لازمہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اس کو طبی اصطلاح میں حمی ریلج مرکب کہتے ہیں، اس میں باری دو دن کی ہوتی ہے چنانچہ یہ دو دن چڑھتا اور ایک دن کا وقفہ دیتا ہے، بخار کی اس رفتار کو ”ریلج معکوس“ کہتے ہیں۔

(ب)

(۱) حمی ریلج دسوی

اس میں غلبہ خون کی علامات رونما ہوتی ہیں، ذائقہ شیریں ہوتا ہے، عروق میں احتلاء ہوتا ہے، پیشاب سرخ رنگ کا آتا ہے، عام طور سے غنودگی طاری رہتی ہے، اور یہ عہد

شباب نیز موسم ربیع میں کثیر الوقوع ہے۔

(II) حمی ربیع صغریٰ

اس بخار کی مدت دوسری انواع کی نسبت مختصر اور عوارض و علامات میں شدت ہوتی ہے، شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، بخار میں سوزش اور تپش زیادہ ہوتی ہے، نبض سریع اور متواتر چلتی ہے، ابتدا میں لرزہ اور سردی محسوس ہوتی ہے، جسم کا گوشت کٹنا ہوا محسوس ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ آجاتا ہے، پسینہ خارج ہوتا ہے، نبض سریع اور متواتر چلتی ہے، پیوست کی وجہ سے کسی قدر صلابت بھی ہوتی ہے، غلظت مواد کی وجہ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو فترت کے مرحلے میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے، پیشاب سفید بھری مائل خام ہوتا ہے جو نفخ کے بعد رنگین اور زمانہ انحطاط میں سیاہ ہو جاتا ہے۔

(III) حمی ربیع بلغمی

اس بخار کی مدت نسبتاً زیادہ طویل ہوتی ہے، جسمانی حرارت بہت زیادہ نہیں ہوتی، سستی اور کسل مندی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پیاس نہیں لگتی، پیشاب سفید اور غلیظ خارج ہوتا ہے، نبض میں صلابت کم ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بلغمی خلط کی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں۔

(IV) حمی ربیع سوداوی

بخار کی مدت 24 گھنٹے پر محیط ہوتی ہے، پریشان خیالی اور فکر و وسوسہ کا غلبہ ہوتا ہے، جسم لاغر اور دبلا، سیاہی مائل ہوتا ہے، چہرے کی رنگت سرخ سیاہی مائل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ سوداوی خلط کے غلبہ کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

اصول علاج

خلط کے احتراق کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ذیل اصول ذہن میں رکھیں:

- 0 — احتراق غلط کو مد نظر رکھتے ہوئے منضجیات اور مسہلات استعمال کرائیں۔
- 0 — حسب ضرورت مبردات استعمال کرائیں۔
- 0 — فصد کھولیں۔
- 0 — معدہ کی تقویت اور اصلاح پر توجہ دیں۔

علاج

- ذیل میں ہر نوع کا علاحدہ علاحدہ علاج تحریر کیا جا رہا ہے۔
- 0 — حمی ریلج دائرہ میں درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:
- ابتدائی تین دن صبح کے وقت یہ ادویہ استعمال کرائیں:
- گلقتد 25 گرام کلائیں اس کے بعد عرق شاہترہ، عرق بید سادہ، عرق گاؤ زبان، عرق بکو، عرق کاسنی، ہر ایک 50 ملی لیٹر، گنجین 25 ملی لیٹر، باہم ملا کر نوش کرائیں۔
- اس کے بعد منضج کے طور پر کم و بیش 9 دن تک یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
- شاہترہ، اسطوخودوس، گاؤ زبان، بیخ کاسنی، اصل السوس مقشر، افیتون (پوٹلی میں باندھ کر) ہر ایک 7 گرام، مسفاج 4 گرام، مویز منقی 11 عدد، انجیر زرد 4 عدد، سپتاں 17 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دے کر گلقتد 25 گرام حل کر کے مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔
- منضج کے طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہے:
- تخم کشوٹ، گاؤ زبان ہر ایک 5 گرام، بادیان، بیخ کاسنی ہر ایک 7 گرام، گل بنفشہ 6 گرام، مویز منقی 9 عدد، انجیر زرد 2 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 50 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
- آٹھ دس دن استعمال کے بعد جب نفج کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- ساء کی 12 گرام، تربد سفید 6 گرام، مغز فلوکس خیابہ شمر 60 گرام — تمام

دواؤں کو عرق بادیان، عرق مکو ہر ایک 120 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقتہ 25 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔

دوسرے دن تہرید کے طور پر یہ نسخہ دیں:

عرق کاسنی، عرق شاہترہ، عرق گاؤ زبان ہر ایک 85 ملی لیٹر شربت انجبار 25 ملی لیٹر باہم ختم ریحاں 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

ایک دن بعد پھر سہل دیں اور پھر تہرید استعمال کرائیں۔

ریح دائرہ میں یہ مفرد نسخے بھی آزمودہ ہیں۔

قط شیریں 3 گرام ہر ایک کر کے سبکچین 35 ملی لیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔

شاہترہ 7 گرام کو ہر ایک پیس کر کھلائیں۔

افیتون 9 گرام کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔

o — حمی ریح (احراق) غلط دوی میں یہ نسخے / تدابیر اختیار کریں:

باسلقی کی ضد کھولیں۔ اس کے بعد گلقتہ 35 گرام، سبکچین 35 ملی لیٹر کے

ساتھ استعمال کرائیں اور عرق گلاب 85 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

منفع کے طور پر یہ نسخہ دیں:

مویز متقی، انجیر زرد ہر ایک 25 گرام، عتاب، سپستان، آلو بخارا، تمر ہندی ہر

ایک 12 گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کالی، ہلیلہ سیاہ ہر ایک 6 گرام — تمام

دواؤں کو پانی میں بھگو دیں مل چھان کر اور صبح، شام نوش کرائیں۔

منفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو سہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بادرنجبویہ، گاؤ زبان، نیلوفر، اسطوخودوس، بادیان، یسفاک، ختم کاسنی ہر ایک 10.5

گرام، سناہ کی 18 گرام، بنفشہ 17 گرام، گل سرخ 14 گرام، ہلیلہ زرد، ہلیلہ کالی افیتون

ہر ایک 25 گرام، ختم شاہترہ 20 گرام، آلو سیاہ، سپستان، عتاب ہر ایک 20 عدد، تہرید سفید

7 گرام، ہلیلہ آملہ، ہر ایک 10 گرام — دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور

نوش کرائیں۔

تحقیق کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 قرص افسہین 5 گرام، ہمراہ گنجین 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔ قرص افسہین کا
 نسخہ درج ذیل ہے:
 افسہین 7.5 گرام، تخم کرفس، اسارون، انیسون، بادام تلخ، شکائی، باد آورد،
 عصارہ عافیت، مصطکی، سنبل الطیب ہر ایک 7 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص
 بنائیں۔

○ — حمی ربع (احتراق خلط) صفراوی میں یہ نسخہ / تدابیر اختیار کریں:

منفع کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 تخم کاسنی، اصل السوس ہر ایک 10.5 گرام، آلو بخارا 10 عدد — تمام دواؤں کو
 رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور چھان کر نبات سفید، ترنجبین ہر ایک 35 گرام مل
 کر کے نوش کرائیں۔

منفع کے طور پر ہی یہ نسخہ استعمال کرا سکتے ہیں:
 گل بنفشہ، گل سرخ، عنب الثعلب، تخم خطی، تخم کاسنی، عنب ہر ایک 7 گرام،
 آلو بخارا 5 عدد، عنب 6 عدد، شاہترہ، گل نیلوفر، ہر ایک 6.5 گرام — تمام دواؤں کو پانی
 میں بھگو دیں اور مل چھان کر گلقد آفتابی 50 گرام مل چھان کر نوش کرائیں۔
 جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:

سناہلی 25 گرام، بنفشہ، نیلوفر، تخم کاسنی ہر ایک 12 گرام، پوست ہلیہ زرد،
 گل سرخ ہر ایک 18 گرام، مویز سرخ 35 گرام — تمام دواؤں کو 1500 ملی لیٹر پانی
 میں جوش دیں۔ جب 750 ملی لیٹر رہ جائے تو اس میں ترنجبین، مغز فلوں خیاضنہ، ہر ایک
 35 گرام ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

تحقیق کے بعد یہ نسخہ دیں:
 قرص عافیت 3.5 گرام ہمراہ گنجین 35 ملی لیٹر، عرق کاسنی، عرق بادیاں ہر ایک

60 ملیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔ قرص غافٹ کا یہ نسخہ ہے:

گل سرخ، زرنک، طباشیر ہر ایک 10 گرام، ختم کاسنی، ختم کشوٹ ہر ایک 7 گرام صمغ عربی، نشاستہ، رب السوس ہر ایک 3.5 گرام، عصارہ غافٹ، ریوند چینی، لک مغسول ہر ایک 1.7 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے قرص بنائیں۔

o — حمی رلیق (احتراق غلط) بلغمی کی صورت میں یہ نسخہ / تدابیر اختیار کریں:

منفع بلغم کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

ختم کاسنی، اصل السوس مقشر ہر ایک 10.5 گرام، گلقد عسلی 35 گرام — تمام دواؤں کو جوش دے کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:

سناہ کی، پوست ہلیہ کابی، ایتھون (پوٹی میں باندھ کر) ہر ایک 25 گرام، تربد سفید خراشیدہ 7 گرام، ختم کشوٹ، ختم کاسنی، افسنین رومی، اسطوخودوس، بادیان، بسفانج، ہر ایک 10.5 گرام گاؤ زبان، بادرنجبویہ ہر ایک 14 گرام، مونیر منق 25 گرام — تمام دواؤں کو 2 لٹر پانی میں جوش دیں جب 500 ملی لیٹر رہ جائے تو اس میں ترنجبین، مغز فلوں خیار خضر، ہر ایک 55 گرام ملا کر مل چھان لیں اور غاریقون 1.5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

مسہل کے بعد قرص غافٹ 4.5 گرام ہمراہ سیکنجین بزدوری 35 ملی لیٹر استعمال

کرائیں۔

سیکنجین بزدوری کا نسخہ یہ ہے:

پوست بخ کرفس، پوست بخ بادیان ہر ایک 35 گرام، بادیان، پوست بخ کبر، ختم کرفس، ہر ایک 10.5 گرام — تمام دواؤں کو 1500 ملی لیٹر سرکہ میں رات کے وقت بھگو دیں، پھر مل چھان کر تمام دواؤں کے نصف وزن، نبات سفید ملا کر قوام تیار کریں۔

قے لانے کے لیے یہ نسخہ دیں:

ختم شبث، ختم ترب، اصل السوس ہر ایک 5 گرام، نمک 3 گرام، شہد 12 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

o — حمی رلیع (احتراق / لغض غلط) سوداوی میں یہ نسخے / تدابیر بروئے کار لائیں:
منفعج سوداء کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گاؤ زبان، شاہترہ، تیخ کاسنی، اصل السوس مقشر، افتیون (پوٹلی میں باندھ کر) ہر ایک 7 گرام، مویز منقی، سپتاں ہر ایک 30 عدد، بسفاج 3.5 گرام، انجیر زرد 4 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے گھلند 25 گرام حل کر کے مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔ جب نفج کے آثار نمایاں ہو جائیں (اور یہ کم دیش 35-40 دن بعد رونما ہوتے ہیں) تو مذکورہ بالاسنخہ منفعج میں ان دواؤں کا اضافہ کریں:

ثناء کی 12 گرام مذکورہ نسخہ میں جوش دے کر مغز فلوس خیار شیر 75 گرام، ترنجبین، شیر خشت ہر ایک 50 گرام حل کر کے مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔
تحقیق کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں:

پوست ہلیلہ زرد، عصارہ غافث ہر ایک 7 گرام، صرف 3.5 گرام، حلتیت 4.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر پانی میں گوندھ کر حبوب بنائیں اور 4.5 گرام ہمراہ آب گرم استعمال کرائیں۔

جند بیدستر، حلتیت، دار چینی، قرفل، شونیز، مر، میہ سالکہ ہر ایک 10.5 گرام، سداب، فلفل سیاہ، انیون ہر ایک 3.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر تمام دواؤں کے ہموزن شہد کے قوام میں ملا کر عجون تیار کریں اور 500 ملی گرام — 2 گرام استعمال کرائیں۔
گل بنفشہ، گاؤ زبان ہر ایک 22.5 گرام، پانی 250 ملی لیٹر میں جوش دیں، جب 125 ملی لیٹر رہ جائے تو چھان کر نبات سفید 200 گرام کے قوام میں ملائیں اور 25 گرام ہمراہ تخم ریحان 9 گرام استعمال کرائیں۔


گل سرخ، ترنجبین ہر ایک 15 گرام، عصارہ زرشک، مغز تخم خیاریں، مغز تخم خربزہ، ہر ایک 10.5 گرام، رب السوس، تخم کشوث، طباشیر، تخم کاسنی، مصطکی روی، سنبل الطیب، عصارہ غافث، لک مغسول، ریوند چینی، فوہ ہر ایک 7 گرام، زعفران 120 ملی گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ترنجبین کے پانی میں قرص تیار کریں اور 3.5 گرام ہمراہ

شریت پوست پنج کاسنی 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

پنج اذخرکی، 14 گرام، قطوریون باریک، شاہترہ ہر ایک 17 گرام، بادآورد، شکامی، گل غافق ہر ایک 17 گرام، پوست ہلیہ کابی 35 گرام، اقیون ولایتی 25 گرام، مویز منقی 28 گرام—تمام دواؤں کو 2.5 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب 750 ملی لیٹرہ جائے تو صاف کر کے سکجین 30 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ بلخی اور سوداوی خلط میں مفید ہے۔

اقتیون ولایتی، سناہکی ہر ایک 14 گرام، تخم ترب، تخم شبت، تخم خربزہ، ہر ایک 18 گرام، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابی ہر ایک 25 گرام—تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور باری آنے سے قبل 200 ملی لیٹر، مہراہ سکجین 125 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ صفاوی خلط میں کارآمد ہے۔

پوست ہلیہ کابی، سعد کونی ہر ایک 35 گرام، زیرہ کرمانی 18 گرام، بیلامول 10 گرام—تمام دواؤں کو باریک کر کے 2.5 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب 50 ملی لیٹرہ جائے تو صاف کر کے 125 ملی لیٹر میں سکجین بزوری 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔



حمیات مختلفہ و مرکبہ

IRREGULAR, COMPOSITE FEVER

حمی (ازدیاد حرارت جسمانی) کی ان انواع میں ایک ہی وقت دو اخلاط کے باہمی اشتراک سے ازدیاد حرارت ہوتا ہے یا ایک خلط پہلے اثر کر کے اپنی مرضی علامات رونما کرتی ہے اس کے بعد دوسری خلط کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ اس طرح مرض کی علامات ایک نظام کے تحت پیش آتی ہیں۔ ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ علامات اور نوبت میں اختلاط رونما ہونے لگے، یعنی مرضی علامتوں میں کمی و اضافہ کا کوئی وقت متعین نہ ہو۔ دونوں ابتدائی صورتوں کو ”حمیات مرکبہ“ اور آخری صورت کو ”حمیات مختلفہ“ کی وجہ، سبب قرار دیا جاتا ہے۔ ان توضیحات کی روشنی میں حمیات مرکبہ اور مختلفہ کی بے شمار قسمیں اور صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ مثلاً ایک ہی نوع کے دو حمی کا مرکب ہو جانا، دو مختلف انواع کے حمی کا مرکب ہونا (وغیرہ) اس ذیل میں اطبا غلب غیر خالص، شطر الغلب، حمی غشیہ اور لیفوریا کا خصوصی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔

آئندہ صفحات میں ان انواع کا تفصیلی بیان ملاحظہ کریں۔

غلب غیر خالص

IMPURE TERTIAN FEVER

اس از دیاد حرارت جسمانی (جمی) میں بخار لازم رہتا ہے اور ہر دوسرے دن باری آتی ہے۔ مرن صورتوں میں یہ مرض 6 ماہ کی مدت تک رہ سکتا ہے۔

اسباب

بلغم اور صفرا کا باہم مل کر، یک ذات ہو کر متعفن ہونا۔

علامات

سر میں گرانی اور تھام محسوس ہوتا ہے، نوبت طویل اور عام طور سے 12-30 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے، ایک باری کے ختم ہونے اور دوسری باری کے شروع ہونے کا درمیانی وقفہ 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، بعض اوقات باری 24-30 گھنٹے تک رہتی ہے اور سکون کا وقفہ 48 گھنٹے کا ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت غلب خالص کی نسبت قلیل ہوتا ہے۔ باری کی مدت کی زیادتی بلغمی خلط کے غلبہ کی غمازی کرتی ہے، عوارض میں بھی شدت نہیں ہوتی۔ پسینہ بہت کم خارج ہوتا ہے، حرارت جسمانی کے بڑھنے اور گھٹنے کا عمل کسی واضح نظام کے تابع ہوتا۔ بعض

اوقات یہ بخار شدید لرزہ آئے بغیر ہی شروع ہو کر پسینہ خارج کیے بغیر ہی اتر جاتا ہے اور کبھی اخراج پسینہ کے باوجود حرارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نفع کے آثار بھی دیر سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عوارض کے طور پر عظم کبد، عظم طحال اور استسقاء وغیرہ پیش آسکتے ہیں۔

تفریقی علامات

غلبہ خالص	غلبہ غیر خالص
Pure Tertian Fever	Impure Tertian Fever
1- حمی کی ابتدا انتہائی شدید قشعریرہ اور نافض سے ہوتی ہے۔	1- مرض کی ابتدا میں قشعریرہ اور نافض وغیرہ کیفیات نہیں پائی جاتیں۔ بالفرض ہوں بھی تو ان میں شدت نہیں ہوتی۔
2- حرارت تیزی کے ساتھ یکساں طور پر پھیلتی ہے۔	2- ازدیاد حرارت (حمی) دیر میں پھیلتا ہے تاہم یکسانیت اور شدت نہیں ہوتی۔
3- نوبت 4-12 گھنٹے رہتی ہے۔	3- مرض کی باری 21-24 گھنٹے تک رہتی ہے۔
4- خوب پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے۔	4- پسینہ آنے پر حمی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بخار بالکل نہیں اترتا۔
5- کمزوری اور ضعف کا غلبہ بہت سرعت کے ساتھ ہوتا ہے۔	5- کمزوری اور ضعف بتدریج ہوتا ہے۔
6- باریاں منظم ہوتی ہیں۔	6- باریاں غیر منظم ہوتی ہیں۔
7- جسم میں سردی کے ساتھ سوئی کی سی چھن محسوس ہوتی ہے۔	7- جسم پر تیز سرد ہوا کی سی چھن محسوس ہوتی ہے۔
8- گرانی اور تناؤ نہیں ہوتا۔	8- سر میں گرانی اور تناؤ ہوتا ہے۔

- 9- ذائقہ بد مزہ/ پھیکا ہوتا ہے۔
 9- ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔
 10- سوزش، پیاس کی شدت اور
 10- مذکورہ کیفیات میں شدت ہوتی ہے اور
 اضطراب وغیرہ کیفیات عام طور
 سے نہیں ہوتیں اور اگر ہوتی بھی
 ہیں تو ان میں شدت نہیں ہوتی اور
 یہ بخار اترنے کے بعد بھی برقرار
 رہتی ہیں۔
 11- مریض کو نیم گرم پانی پلانے سے
 11- نیم گرم پانی نوش کرانے سے پسینہ آتا
 بخار کی کیفیات میں کوئی تغیر رونما
 ہے اور مریض کو کچھ راحت ملتی ہے۔
 نہیں ہوتا۔

اصول علاج

- 0- منہج و مسہل کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے تحقیق خلط کریں۔
 0- معدہ کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں۔
 0- عوارض کی روک تھام/ ازالہ کریں۔

علاج

- 0- داخلی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 ابتدا میں یہ نسخہ مفید ہے۔
 ختم کاسنی، اصل السوس مقشر ہر ایک، 7 گرام، دونوں کو باریک کر کے سکینجین سادہ
 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

صفرادی خلط شریک غالب ہو تو یہ نسخہ دیں:

- اصل السوس مقشر، ختم کاسنی ہر ایک 10.5 گرام، نیلوفر 14 گرام، آلو بخارا 10
 عدد— تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اس کے بعد جوش دے کر چھان لیں اور ترنجبین،

شکر سفید، ہر ایک 35 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:

نیلوفر، تخم کاسنی، بادیان، اصل السوس مقشر، بنفشہ ہر ایک 10.5 گرام، بھانج کوفتہ، اسطوخودوس ہر ایک 14 گرام، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کالبی، سناہکی ہر ایک 18 گرام، سیاہ عناب، سہتاں ہر ایک 20 عدد — تمام دواؤں کو 1.5 لیٹر پانی میں جوش دیں، جب 750 ملی لیٹر رہ جائے تو اس میں ترنجبین 70 گرام، مغز فلوں خیاء شمر 50 گرم ملا کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

تحقیق کے بعد بھی اگر حرارت کا احساس ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

طباشیر، گل سرخ ہر ایک 18 گرام، تخم کاہو مقشر، مغز تخم خیاء، مغز تخم باریک، مغز تخم کدوئے شیریں ہر ایک 10.5 گرام، رب السوس 7 گرام، ترنجبین خراسانی 35 گرام۔ حسب دستور کوٹ چھان کر قرص بنائیں اور 4 گرام کھلائیں۔

صفراوی غلط کے غلبہ میں یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

گل سرخ 35 گرام، سنبل الطیب 10.5 گرام، تخم کاسنی، مغز تخم خیاء ہر ایک 14 گرام، اصل السوس مقشر 18 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں گوندھ کر قرص بنائیں اور 4 گرام استعمال کرائیں۔

بلغنی غلط اگر زیادہ ہو تو یہ نسخہ دیں:

افستین رومی 18 گرام، تربد سفید خراشیدہ نیم کوفتہ 7 گرام، سنبل الطیب 3.5 گرام، گل سرخ 50 گرام — تمام دواؤں کو 3 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب 1.5 لیٹر رہ جائے تو 140 ملی لیٹر 35 گرم شکر ملا کر نوش کرائیں۔

مزمین صورتوں میں یہ نسخے بروئے کار لائیں:

گل بابونہ، افستین رومی ہر ایک 1 گرام کو باریک کر کے شربت قطور یون 12 ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد شربت کشوٹ علوی خان 50 ملی لیٹر، عرق ککو، عرق شاہترہ، عرق کیوڑہ ہر ایک 45 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

مرض کے اگر 6 ماہ گزر گئے ہوں اور جگر و طحال میں صلابت کے آثار نمودار ہونے لگے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:


قرص کبر 3 گرام، جوارش مصطفیٰ، خیرہ گاؤ زبان ہر ایک 7 گرام ملا کر چنائیں۔
اس کے بعد تخم کشوث، بیج کبر، ہر ایک 5 گرام، شاہترہ، بادرنجبویہ، تخم خرپڑہ، مکو
ہر ایک 7 گرام اصل السوس مقشر، گاؤ زبان ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو عرق کیوڑہ
375 ملی لیٹر میں جوش دیں پھر مل چھان کر شربت انسٹین 25 ملی لیٹر، خاکسی، تخم ریحان ہر
ایک 5 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

اگر مرض کے آٹھ ماہ گزر گئے ہوں (یہ صورت بہت شاذ ہے) تو یہ نسخے بروئے
کار لائیں۔

قرص زرشک 4 گرام چند بیدستر، جدوار خطائی، ہر ایک چنے کے برابر، شربت
کشوث 25 ملی لیٹر میں ملا کر چنائیں۔ اوپر سے بادیان 9 گرام، تخم کشوث، انیسون ہر ایک
4.5 گرام، آملہ، عود صلیب ہر ایک 500 ملی گرام، مکو 7 گرام — تمام دواؤں کو عرق مکو،
عرق شاہترہ، عرق بادرنجبویہ ہر ایک 85 ملی لیٹر میں جوش دیں مل چھان لیں اور سلکچین
بزدوری 50 ملی لیٹر مل کر کے خاکسی 4 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

o — خارجی طور پر یہ نسخہ مفید ہے۔

برگ نے، برگ نیم، برگ انبہ، گل بابوند، اشہ ہر ایک 35 گرام، انیسون 18
گرام — تمام دواؤں کو 5 لیٹر پانی میں جوش دے کر نوبت آنے سے پہلے بھپارہ کریں۔



حمی غشیہ

COMATOSE FEVER

اس مرض میں جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ کے وقت مریض پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور نقاہت و ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہر بے ہوشی/غشی کے بعد تاحاتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نتیجہ کار ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔

اسباب

- (I) غلبہ بلغم — اس میں فم معدہ اور معدہ میں ضعف ہوتا ہے۔
- (II) غلبہ صفراء — صفراء کا جو ہرکی، ردی ہو جاتا ہے، نیز اس میں تعفن و فساد واقع ہو جاتا ہے۔
- (III) لیبریائی طفیلی — یہ دماغ کی شرائمین کے اندر جمع ہو کر دوران خون کو مسدود کر دیتے ہیں۔

علامات

(ا) عمومی علامات:-

ابتدا میں سردی کے مرحلے میں سر میں درد ہوتا ہے، حواس میں ٹکدر ہوتا ہے، دوران سر کی شکایت ہوتی ہے اور مریض بے ہوشی کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرارت و حمی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور مکمل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تنفس میں خرائے کی آواز آتی ہے، آنکھ کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اطراف (ہاتھ، پیر) ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ بے ہوشی کا یہ عرصہ 10-12 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، اس کے بعد پسینہ کا مرحلہ آتا ہے۔ چنانچہ پسینہ خارج ہو کر بے ہوشی ختم ہو جاتی ہے اور حواس بحال ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو پسینہ آنے کے بعد شدید ہبوط قوت ہوتا ہے، سارا جسم سرد اور چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، تنفس میں ضعف آ جاتا ہے اور آواز بھی بہت دھیمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تے اور اسہال کی بھی شکایت ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت گھٹ کر 86-88 ف تک رہ جاتا ہے۔

بعض اوقات ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مریض چیخا چلاتا ہے، ہوش و حواس پر بہت خراب اثر پڑتا ہے، واسے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سہائی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے اور کبھی غیند طاری ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی مریض مشاہدے میں آئے ہیں جن کے قلب اور نبض کی حرکت غیر محسوس تھی اور تنفس بھی ناپید تھا، بعض اوقات شدید تشنجی دورہ پڑتا ہے۔

(ب) خصوصی علامات:-

غلہ، بلغم کی صورت میں حمی (بخار) سے قبل اختلاج قلب ہوتا ہے، اور حمی کے وقت متلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، چہرہ اور زبان کا رنگ سفید ہوتا ہے اور قلب کی طرف کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوتا ہے، نبض صغیر، بطی اور متفاوت ہلتی ہے۔ قوی جسمانی میں بتدریج ضعف طاری ہوتا ہے، مواد کے اخراج اور

مقویات کے استعمال کے وقت جی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

غلبہ صفراء کی صورت میں دورہ عام طور سے تیسرے دن آتا ہے، مریض کے معائنہ سے مزاج میں حرارت و بیوست کے غلبہ کا پتہ چلتا ہے، لاغری میں زیادتی اور عجلت ہوتی ہے، چنانچہ دو تین دورے سے ہی مریض نڈھال ہو جاتا ہے، جی کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہ بے ہوشی متواتر بڑھتی جاتی ہے اور 12-14 گھنٹے میں ذرا سا ہوش آ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات 24 گھنٹے میں ہی مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

لمیریائی طفیلی کی صورت میں، خون میں ان کی موجودگی تشخیص کو آسان اور یقینی بنا دیتی ہے، مرضی علامات، صفراوی غلطی کے غلبہ کی علامتوں کی سی ہوتی ہے۔

اصول علاج

- غشی کی حالت میں ہوش میں لانے کی تدابیر کریں۔
- غلط موثر کا ستقیہ کریں۔
- مفرحات، مبردات (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔
- مقویات بھی برعایت استعمال کرائیں۔
- عوارض کا تدارک / ازالہ کرائیں۔
- دلک کریں۔

علاج

غشی کی حالت میں — عرق گلاب، عرق بید مشک کو برف سے سرد کر کے چہرے اور سینے پر چھنیں ماریں اور اسی میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھیں۔
یہ نخلیہ سونگھانا بھی سودمند ہے۔

صندل سفید، گل ارنی، تخم کاہو ہر ایک 3 گرام، کافور 1 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق گلاب، عرق بید مشک، آب ہی، آب خیار، آب سیب، آب کشیز سبز، ہر

ایک 12 ملی لیٹر میں ملا کر ایک شیشی میں رکھ لیں اور مریض کو سگھائیں۔
خردل/ عاقر قرحا کو باریک پیس کر نسوار کے طور پر استعمال کرائیں۔
چونہ، نوشادر، ہوزن کو تر کر کے اس کی ہواناک میں پیچائیں۔
تیز سرکہ سگھائیں۔

o — تنقیہ کی غرض سے خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں۔
بلغمی خلط کی صورت میں منہج کے طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:
ختم کرفس 4.5 گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور سنگجین عصلی 25 ملی لیٹر ملا کر چٹائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

بادیان، گاؤ زبان، ختم کاسنی ہر ایک 6 گرام، ختم کرفس 4.5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور سنگجین عصلی 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
بعض اطباء منہج کے طور پر یہ نسخہ استعمال کراتے ہیں:

منہج بادیان، منہج کرفس، منہج اوزر، منہج کاسنی، اسطوخودوس ہر ایک 7 گرام مونیر منقی 9 عدد، انجیر زرد 2 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شہد 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:

سناہ کی، شاہترہ، گل سرخ، مونیر منقی، منہج کاسنی، منہج بادیان، تربد سفید ہر ایک 12 گرام، گل غافث، گاؤ زبان، بنفشہ، برفانج ہر ایک 7 گرام، ختم کشوٹ 4.5 گرام، آلو بخارا 15 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نہایت سفید 375 گرام سے شیریں کر کے چھان لیں اور 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

صفرا کے تنقیہ کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں:

درج ذیل نسخہ منہج کے طور پر بروئے کار لائیں:

گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل سرخ، ختم کاسنی، ختم عطی، شاہترہ ہر ایک 7 گرام،

عنب الثعلب 7.5 گرام، آلو بخارا، عنب ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقتہ آفتابی 50 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو سہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کالمی، ہلیلہ سیاہ، سناہ کی، زرشک، گل بنفشہ ہر ایک 18 گرام، کتیرا 9 گرام، مقوینا مشوی 4.5 گرام، مغز فلوں خیارشمر 85 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام 10 ملی لیٹر میں چرب کر کے شہد میں گوندھ کر گولیاں بنائیں اور ورق نقرہ میں پیٹ کر 7-9 گرام رات کے آخری حصہ میں ننگے کی ہدایت کریں۔ بعد میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شیرہ زرشک، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز، تخم خیاریں، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک 9 ملی لیٹر، عرق زرشک، عرق کاسنی، عرق بید خشک، عرق نیلوفر، ہر ایک 70 ملی لیٹر میں نکال کر شربت لیموں، شربت صندل ترش کو ہر ایک 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ آب افشردہ انارہ انارین ہر ایک 60 ملی لیٹر، نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

بخار کو آنے سے روکنے کے لیے ایک گھنٹہ پہلے یہ دوا استعمال کرائیں۔

گل ارمنی 5 گرام کو 250 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر برف سے سرد کریں اور عرق زرشک 35 لیٹر، شربت سیب ترش، شربت لیموں ہر ایک 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔


دوسری باری کے دن یہ نسخہ دیں:

قرص طباشیر علوی خان 3 گرام کو شربت صندل ترش 25 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

ہوش آنے پر تقویت قلب کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

مفرح اعظم 5 گرام، ہمراہ عرق بید خشک، عرق گلاب ہر ایک 75 ملی لیٹر، شربت انار 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

جواہر مہرہ 500 ملی گرام، شہد 12 ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں۔
 طباشیر، زہر مہرہ خطائی، کہر یا شعی، یشب سبز، مصطکی رومی ہر ایک 1 گرام۔
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر خمیرہ گاؤ زبان عبری 5 گرام ملا کر کھلائیں۔ اس
 کے بعد گاؤ زبان، اصل السوس مقشر ہر ایک 3 گرام، بادیان 5 گرام، مویر منقی 7 عدد۔
 تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق بید شنگ، عرق گاؤ زبان ہر ایک 60 ملی لیٹر میں
 جوش دے کر صاف کر لیں اور شربت سیب 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
 ۵۔ ہوش میں لانے کی جملہ خارجی تدابیر اور خوردنی طور پر ادویہ کے استعمال
 کے ساتھ حسب ضرورت ان تدابیر کو بروئے کار لاتے ہیں۔ چنانچہ نغلبہ بلغم کی صورت میں
 کھردرے کپڑے سے تمام جسم کی مالش کریں اور مالش کا آغاز پنڈلیوں سے کریں۔ اس کا
 رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ اس کے بعد علی الترتیب ران، ہاتھ، شانے، پشت اور سینے کی
 مالش کریں۔ یہ عمل اس قدر دہرائیں کہ مریض پر ضعف سا طاری ہو جائے۔
 مریض کو سونے کی ہدایت کریں، اور خود اس کا نظم کریں۔
 صفراوی صورت میں صندل کو عرق گلاب میں گھس کر سینہ پر منہاد کرائیں۔



لیفوریا

LIPHORIA

اس مرض میں جسم اندر سے گرم اور باہر سے سرد محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری غیر طبعی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔

اقسام

لیفوریا

Liphoria

لیفوریا خفیف
Sub-acute Liphoria

لیفوریا شدید
Acute Liphoria

اسباب

(I) غلبہ بلغم۔

(II) غلبہ صفراء غلیظہ۔

اس کی صورت یہ ہوتی ہے غلیظ صفراء اندرون بدن متعفن ہو کر حرارت اور بلغم بیرون جسم برودت پیدا کرتا ہے، اس لیے مریض اپنے اندر حرارت اور ظاہر جسم پر برودت محسوس کرتا ہے۔

علامات

لیفور یا شدید

اندرون جسم حرارت کی زیادتی کی وجہ سے مریض بے چین ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، زبان سیاہ ہو جاتی ہے اکثر اوقات اس پر میل جمی ہوتی ہے، بعض اوقات متلی اور تے کی بھی شکایت ہوتی ہے، ہوش بجا نہیں رہتے، بخار کی زیادتی کی وجہ سے مریض ٹھہال پڑا رہتا ہے، طبیعت مدبرہ بدن اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اندرون میں مادہ مرض سے نمٹنے کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام جسم سرد پڑ جاتا ہے۔ ہفتہ عشرہ تک مرض رہ جائے تو انجام خراب ہوتا ہے۔

لیفور یا خفیف

اندرون جسم کی حرارت شدید نہیں ہوتی، دوسری ظاہری علامتیں بھی خفیف ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ان کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ معمولی سا معالج اور تھوڑی توجہ سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ یہ مرض عام طور سے باری کے ساتھ آتا ہے لیکن بعض اوقات دائمہ لازمہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس میں تیسرے دن شدت ہوا کرتی ہے۔

اصول علاج

- پیاس اور حرارت کو کم کرنے کی تدابیر کریں۔
- بلغم اور صفراء غلیظ کا نفع دہشہ کریں۔
- ادویہ کے انتخاب میں صفراوی اور بلغمی غلط کی رعایت ضرور کریں۔
- مقیات استعمال کرائیں۔

علاج

خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

حرارت کو کم کرنے اور پیاس کو بجھانے کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:

تخم کاسنی 10 گرام، ترنجبین، شکر سفید ہر ایک 25 گرام، پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔ بلغمی خلط کی رعایت کرتے ہوئے نیلوفر، اصل السوس ہر ایک 60 گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

منفج بلغم کے طور پر یہ نسخہ مفید ہے:

تخم کرفس، بادیان، ہر ایک 10 گرام—دونوں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور سلیجھین بزوری 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

جب نفع کی علامات رونما ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ بردے کار لائیں: بادیان، اصل السوس، شاہترہ ہر ایک 7 گرام، اسطوخودوس، برگ سناہ کی ہر ایک 12 گرام—تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مغز فلوس خیار شمیر 60 گرام، گلقد 5 گرام مل چھان کر روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

تحقیق کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں:

قرص فستقین 5 گرام ہمراہ شربت بزوری 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

قرص فستقین کا نسخہ درج ذیل ہے:

فستقین 7 گرام، بادام تلخ، شکائی، باد آرد، عصا رے غائف، انیسون، تخم کرفس، سنبل الطیب، مصطلی رومی ہر ایک 6.5 گرام—تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر اقراص بنائیں۔

یہ نسخہ بھی اس مرض میں مفید ہیں:

تخم کاسنی، بادیان ہر ایک 20 گرام، تیج کاسنی، اصل السوس مقشر، تخم کشوث (پوٹلی میں باندھ کر) مغز تخم خیارین، بادرنجبویہ، ہر ایک 30 گرام، گل کشوث، رب السوس، تیج بادیان، تخم خربزہ، ہر ایک 31 گرام—تمام دواؤں کو رات کے وقت حسب ضرورت پانی

میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 500 گرام، شیر خشک 120 ملی لیٹر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 35 ملی لیٹر ہمراہ عرق کاؤ زبان استعمال کرائیں۔

بادیان، گل سرخ، گل بنفش، تخم کاسنی، تخم کشوٹ (پوٹلی میں باندھ کر) بچ کاسنی، عنب الثعلب خشک، باد آورد ہر ایک 10 گرام، مویز منقہ 7 عدد — تمام دواؤں کو 500 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں صبح کو اس قدر جوش دیں کہ 150 ملی لیٹر پانی رہ جائے تو مل چھان کر گھٹند 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔


قرص گل 5 گرام کھلا کر پوست بچ کبر، بچ کرفس، تخم کرفس، تخم کشوٹ، اجوائن دیسی، شکامی، باد آورد، بادیان، انیسون ہر ایک 18 گرام، 1 لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب 500 ملی لیٹر رہ جائے تو 100 ملی لیٹر میں سکنجبین بزدوری 30 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ قرص گل کا نسخہ درج ذیل ہے:

گل سرخ 85 گرام، رب السوس 60 گرام، فلاح اذخر، سلیجہ، مصطکی رومی، سنبل الطیب، زعفران، مرکبی ہر ایک 25 گرام — زعفران اور مرکبی کو سرکہ انگوری میں حل کریں اور باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اس میں ملا کر اقراص بنائیں۔

قے آور کے طور پر آب لبویا، آب ترب، آب شبت نوش کرا کر قے کرائیں۔

۵ — خارجی طور پر یہ تدبیر بروئے کار لائیں:

تخم شبت، بابونہ، اکلیل الملک، قیسوم ہر ایک 12 گرام پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور 5 لیٹر گرم پانی ملا کر جسم پر دھاریں۔ اس کے بعد جسم کو خشک کر کے روغن شبت، روغن بابونہ کی مالش کریں۔



دق شیخوخت

SENILE HECTCUS

اس مرض میں جسمانی رطوبتوں کے تحلیل ہو جانے اور غلبہ پوست کی وجہ سے ضعف اور لاغری پیدا ہو جاتی ہے اور مریض وقت سے بہت پہلے پوڑھا/ دق کا مریض دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ دق کے جراثیم اس کے جسم میں نہیں پائے جاتے۔ نہ ہی جسمانی درجہ حرارت غیر طبعی ہوتا ہے۔ اویز عمر کے لوگوں میں یہ مرض کثیر الوقوع اور بچوں میں شاذ و نادر ہوتا ہے۔

اسباب

(I) غلبہ برودت مزاج۔

(II) حرارت مزاج۔

(III) استفرغات۔

(I) تے کی زیادتی۔

(II) اسہال۔

1۔ اس کو دق الہرم بھی کہتے ہیں، دق سے نظری مشابہت کی وجہ سے دق شیخوخت یا دق الہرم نام رکھا گیا ہے۔ درحقیقت میں دق سے اس کا دور دور کا واسطہ نہیں۔

(III) کثرت مباشرت۔

(IV) کثرت ریاضت۔

(IV) مبردات کا بکثرت استعمال۔

(I) حمیات حادثہ میں سرد دواؤں کا بکثرت استعمال۔

(II) سرد غذاؤں کا بکثرت استعمال۔

(III) مقام قلب پر سرد دواؤں کا طلا۔

علامات

مزاج میں بیوست پیدا ہو جاتی ہے جس میں بعض اوقات گرمی اور سردی درجہ اعتدال پر اور کبھی سردی کسی قدر غالب ہوتی ہے، جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، حرارت غریزی فنا ہو جاتی ہے اور جسم خشک اور چہرہ بے رونق، سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر ہنری کی جھلک ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، سوء ہضم اور ضعف کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب سفید، رقیق ہوتا ہے۔

اعضاء میں تحلیل اور گھلاوٹ ہونے لگتی ہے اور تمام بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں آواز پست ہوتی ہے، طاقتیں سلب ہوئے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ان تمام علامتوں اور کیفیتوں کے باوجود جسمانی درجہ حرارت بڑھا ہوا نہیں ہوتا۔

اصول علاج

— تقویت معدہ کا اہتمام کریں

— ترطیب او تشمین کی طرف خصوصی توجہ دیں/حرارت غریزی بڑھانے والی

دوائیں دیں۔

— مفرح اور مقوی قلب دوائیں استعمال کرائیں

— حسب موقع حمام کرائیں/آبزن کا اہتمام کریں

— غذا لینے کے بعد مزلیض کو سونے کی تاکید کریں

o — شدید ریاضت اور جماع سے احتراز کی تاکید کریں
 طحطا رہے کہ اس مرض میں یک بیک گرم دواؤں/ غذاؤں کا استعمال ہلاکت کا
 باعث ہو سکتا ہے کہ اس لیے مٹن دواؤں/ غذاؤں کا استعمال بتدریج کرنا سودمند ہے۔

علاج

o — خوردنی طور پر یہ نئے استعمال کرائیں:

معدہ، اعضاء ریسیہ کی تقویت اور رفع خفقان کی غرض سے یہ نئے استعمال کرائیں:
 منبر 2 گرام، زعفران 8 گرام، مروارید ناشفتہ، بسد، یشب، سعد کونی، اذخر، ہر
 ایک 10 گرام، سازج ہندی، سنبل الطیب، گل ارمنی، طباشیر، ابریشم مقرض ہر ایک 12
 گرام، عود خام 16 گرام، شیر آملہ 96 ملی لیٹر — تمام خشک دواؤں کا ہر ایک سفوف تیار
 کریں اور ان کی تین گنا شہد/ شکر کے قوام میں مذکورہ سفوف اور شیر آملہ ملا کر نوشدار و لولوی
 تیار کریں اور 5-7 گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

گل سرخ 21 گرام، سعد کونی 18 گرام، مصطکی رومی، قرقفل، اسارون سنبل
 الطیب ہر ایک 10 گرام، ہیل خورد، ہیل کلاں، تالیپتر، جاوتری، جوز بوا، تچ، زعفران، ہر
 ایک 7 گرام، آملہ مقشر 50 گرام — آملہ مقشر کو دودھ میں بھگو دیں اور صبح کو پانی سے دھو کر
 پانی میں ہی جوش دیں، اس کے بعد چھلنی سے چھان کر جوشاندہ مذکورہ میں شہد 360 ملی لیٹر
 شکر 350 گرام ملائیں اور قوام تیار کریں۔ باقی تمام خشک دواؤں کو کوٹ چھان کر اس قوام
 میں ملا کر 5-7 گرام استعمال کرائیں۔ ہضم اور تقویت معدہ کے لیے بے حد مفید ہے۔


جواہر مہرہ 250 ملی گرام، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا 5 گرام میں ملا کر کھلائیں۔
 اس کے بعد عرق گذر عبیری، عرق شیر ہر ایک 75 ملی لیٹر، شربت سیب شیریں
 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح کو نوش کرائیں۔ شام کے وقت جوارش مصطکی مرکب 9 گرام ہمراہ
 عرق بادیان 75 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

طباشیر، صندل سرخ، صندل سفید، کشیز خشک مقشر، آملہ منق، گل گاؤ زبان بسد احمر، تخم خرفہ سیاہ مقشر، ورق نقرہ ہر ایک 10.5 گرام، زرشک منق 17 گرام، مروارید ناشفتہ، کبریا شعی، ابدیشم مقرض، گل سرخ، دارچینی بہن سرخ، بہن سفید، درونج عقربی، زعفران ہر ایک 7 گرام، بادرنجبویہ، اگر ہر ایک 5 گرام، دانہ ہیل خورد، مصطکی رومی، اشنہ ہر ایک 3.5 گرام، مشک بتقی، عنبر اہلب ہر ایک 250 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب سیب شیریں، قد سفید، شہد تمام دواؤں کی تین گنا۔ حسب دستور معجون، بنائیں اور 4 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان عبری 75 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

غذا کے طور پر چوزہ مرغ، کبوتر وغیرہ کا شوربہ روٹی کے ساتھ کھلائیں۔

o — گل بابوت، مرزنجوش، تخم گاؤ زبان، تخم عطی، گل نیلوفر ہر ایک 60 گرام۔ تمام دواؤں کو 3 لیٹر پانی میں جوش دیں جب 1500 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر 15 لیٹر نیم گرم پانی میں ملا کر آہرن کرائیں۔ 30 منٹ بعد پانی سے نکال کر جسم کو کپڑے سے خشک کر کے روغن بادام/ روغن بنفشہ/ روغن زکس/ روغن سوسن کی جسم پر مالش کریں۔ حسب یافت تمام روغنوں کو ایک ساتھ ملا کر بھی مالش کر سکتے ہیں۔



حمی دق* HECTIC FEVER

اس مرض میں لازمی/ بے قاعدہ نوبتی طور پر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ مادہ سلیہ بھی لازمی طور پر ہوتا ہے، حرارت، اعضاء اصلیہ پر حملہ آور ہو کر رطوبت جسم کو فنا کرنے لگتی ہے نتیجہ کے طور پر جسم خشک اور لاغر ہونے لگتا ہے۔
ملاحظہ رہے کہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ دق کی ایک اہم علامت اور عرض ہے۔

اسباب

(I) اسباب معدہ:

حمیات

(I) حمائے یومیہ۔

(II) حمی درمیہ۔

(III) حمی محرکہ۔

* حمی دق دراصل ایک علامت اور عرض ہے۔ یہاں صرف اطباء قدیم کی پیروی کرتے ہوئے علاحدہ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

(IV) خالص/غلب غیر خالص۔

(V) شطرنجب۔

متفرقات

(I) اورم—ورم گردہ، ورم جگر، ورم مثانہ، ورم امعاء، ورم رحم وغیرہ۔

(II) حرارت—حرارت گردہ، حرارت جگر، حرارت معدہ، حرارت ریه۔

(III) سدہ—سدہ مار ساریقا۔

(IV) غم و فکر، غصہ و رنج۔

(V) سوء مزاج یا بس/موسم گرما/خارجی حرارت۔

(VI) عرصہ تک بھوکا رہنا۔

(VII) بے خوابی۔

(VIII) اسہال مزمن۔

(X) کثرت سے نوشی۔

(II) اسباب حقیقی۔

مائیکو بیکٹیریم ٹیوبرکولوس (Mycobacterium Tuberculosis) کی

سرایت:—

علامات

ابتدا مرض میں جسمانی درجہ حرارت میں اضافے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نبض کی رفتار معمولی سرعہ ہوتی ہے اور جسم میں بھی بہت معمولی لاغری ہونے لگتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد روزانہ تیسرے پہر طبیعت میں سستی آنے لگتی ہے، اور پھر صبح کو یہ کسل مندی اور سستی از خود ختم ہو جاتی ہے، کچھ مدت بعد کسی قدر تیز بخار ہونے لگتا ہے، اس مرحلے میں مریض کو جسمانی درجہ حرارت میں اضافے کا احساس ہوتا ہے، اور وہ معالج کی طرف رجوع کرتا ہے،

اس کے بعد خفیف جازے کے ساتھ بخار آ جاتا ہے، اور اس عرصہ میں نبض سریع چلتی ہے اور اس کی رفتار 130 فی منٹ تک پہنچ جاتی ہے، کچھ دیر بعد پسینہ آ کر بخار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے میں کم و بیش دو مرتبہ بخار میں شدت ہوتی ہے، چنانچہ پہلی مرتبہ یہ شدت دوپہر کو ہوتی ہے جو کم و بیش 4-5 گھنٹے تک رہتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے لیے بخار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر دوسری بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے 2 بجے تک شدت برقرار رہتی ہے، اس کے بعد بکثرت پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے، پیشاب قلیل مقدار میں، سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، رخساروں پر سرخ رنگ کا ایک مخصوص حلقہ سائبان جاتا ہے جس کو ”حرۃ اللہ“ کہتے ہیں، ہاتھ پیروں کے ٹکڑے میں جلن محسوس ہوتی ہے، آئے دن لاغری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ حمی (بخار) کی مدت بڑھتی جاتی ہے اور تخفیف کا عرصہ مختصر ہوتا جاتا ہے، بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، اسہال کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، بطلان اشتہاء ہوتا ہے، پیروں پر درم آ جاتا ہے اور مریض غیر معمولی لاغری اور ضعف کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تفصیلی معلومات ’دق‘ کے ذیل میں ’متعدی امراض‘ کے باب میں ملاحظہ کریں:

تفریقی علامات

دیگر حمیات خلطی Other Humoral Fever	حمی دق Hectic Fever
1- بخار میں شدت ہوتی ہے، جسم گرم محسوس ہوتا ہے، مریض حرارت اور بخار سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔	1- ابتدا میں بخار کی حرارت خفیف، نرم اور ہمیشہ ایک ہی حال پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ مریض اس بڑھی ہوئی جسمانی حرارت سے عرصہ تک آگاہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس بڑھی ہوئی جسمانی حرارت سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔

- 2- جسم پر ہاتھ رکھنے سے پہلے تو گرمی کم ہوتی محسوس ہوتی ہے لیکن دیر تک ہاتھ رکھنے سے حرارت بڑھتی رہتی ہے۔
- 3- رات میں اکثر پسینہ آتا ہے اور اس کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے۔
- 4- شام کے وقت عام طور سے درد سر، یا گرانی سر کی شکایت ہوتی ہے۔
- 5- غذا لینے کے بعد بخار میں اضافہ ہو جاتا ہے، قشریہ اور اعضاء شکنی نہیں ہوتی۔
- 6- بخار کی شدت تھوڑی دیر کے بعد کم ہو جاتی ہے، لیکن بخار عام طور سے لازمی نوعیت کا ہوتا ہے۔
- 7- ہاتھ پیر کے ٹکڑے میں جلن محسوس ہوتی ہے اور یہ کبھی سرد نہیں پڑتے۔
- 8- غذا لینے کے بعد نبض قوی، عظیم اور کسی قدر متواتر چلتی ہے۔
- 9- پیشاب مائی اور کم رنگین ہوتا ہے، اور اس میں بدبو بھی کم ہوتی ہے۔
- 2- جسم پر ہاتھ رکھنے پر پہلے تو گرمی بہت معلوم ہوتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد کمی کا احساس ہوتا ہے۔
- 3- رات کو پسینہ نہیں آتا، کسی بھی طرح پسینہ آجائے تو فرحت اور طاقت محسوس ہوتی ہے۔
- 4- حرارت میں زیادتی کے وقت سر میں درد اور گرانی کا احساس ہوتا ہے۔
- 5- غذا لینے کے بعد سردی محسوس ہوتی ہے، گرانی اور اعضاء شکنی بھی ہوتی ہے۔ حرارت صرف باری کے وقت بڑھتی ہے۔
- 6- بخار دیر تک رہتا ہے، لیکن یہ غلط کی نوعیت پر منحصر ہے۔
- 7- ہاتھ پیر سرد ہوتے ہیں، باری کے وقت تو برودت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔
- 8- غذا لینے کے بعد نبض مختلف چلتی ہے۔
- 9- پیشاب نسبتاً زیادہ رنگین (غلط موثر کے غلبہ کے اعتبار سے) اور زیادہ بدبو دار ہوتا ہے۔

- | | |
|--|--|
| 10- پیشاب میں چکنائی ہوتی ہے۔ | 10- چکنائی / دہیت نہیں ہوتی۔ |
| 11- رسوب ہوتا ہے، اس کی نوعیت غماہی ہوتی ہے یا غماہی مادہ درمیان میں ہوتا ہے۔ | 11- عام طور سے رسوب یا غماہی مادہ نہیں ہوتا۔ |
| 12- براز میں چکنائی ہوتی ہے۔ | 12- براز میں چکنائی نہیں ہوتی۔ |
| 13- براز کبھی تو زیادہ مقدار میں خشک آتا ہے اور کبھی اسہال کی شکایت ہوتی ہے۔ | 13- عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ |
| 14- وزن بتدریج کم ہو کر مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ | 14- کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ |
| 15- ابتدائی دنوں میں جماع کی شدید خواہش ہوتی ہے یا کثرت احتلام کی شکایت ہوتی ہے۔ | 15- عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ |
| 16- خورد بینی معائنہ میں دق کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ | 16- جراثیم نہیں پائے جاتے۔ |

اصول علاج

- 0- — تربیب بدن کی طرف خصوصی توجہ دیں۔
- 0- — بخار کے کم کرنے کی تدابیر کریں۔
- 0- — مفرحات استعمال کرائیں۔
- 0- — نزف الدم کی صورت میں حابسات استعمال کرائیں / تلخین طبع کریں۔
- 0- — مبردات استعمال کرائیں۔
- 0- — قوی جسمانی کے تحفظ اور بقاء پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0- — مرض کے اصل سبب کا ازالہ کریں۔

علاج

o — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

بخار میں کمی لانے کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

مغز تخم کدو، مغز تخم خربزہ، مغز تخم خیارین ہر ایک 18 گرام، طباشیر کبود، گل سرخ، رب السوس ہر ایک 11 گرام، نشاستہ، کثیر، صندل سفید، صمغ عربی، ہر ایک 7 گرام، تخم خرنہ 12 گرام، کافور 2 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر لعاب اسپنول کی مدد سے اقراص بنائیں اور 3 گرام ہمراہ عرق شیر 85 ملی لیٹر، شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

طباشیر، گل سرخ ہر ایک 18 گرام، مغز تخم خیار، مغز تخم باد رنگ، مغز تخم کدو، تخم خرنہ، صندل سفید ہر ایک 12 گرام، تخم کاہو، تخم کاسنی ہر ایک 14 گرام، رب السوس، سرطان سوختہ، ہر ایک 445 گرام، کثیر، صمغ عربی ہر ایک 6 گرام، سنبل الطیب، کافور، عود خام، ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 5 گرام ہمراہ عرق شیر کافوری 85 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔ عرق شیر کافوری کا نسخہ درج ذیل ہے:

برگ کاسنی، برگ کاہو، کدوئے سبز ہر ایک 75 گرام، گل بید، گل نیلوفر، کیسرو تازہ (چھیلا ہوا) ہر ایک 125 گرام، عنب الثعلب، گل سرخ، صندل سفید، صندل سرخ گاؤ زبان، مغز تخم کدو، تخم کاہو، تخم خیارین، ہر ایک 25 گرام، کشنیز خشک 50 گرام، گل گاؤ زبان، تخم کاسنی، زہر مہرہ خطائی، طباشیر سفید ہر ایک 12 گرام، تخم خرنہ 25 گرام، گل کنول 62 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ کر عرق گلاب 2 لیٹر، عرق بید خشک، عرق عنب الثعلب، عرق شاہترہ ہر ایک 1 لیٹر، عرق بید سادہ 4 لیٹر، بکری کا دودھ 1 لیٹر، آب باراں 10.5 لیٹر میں بھگو دیں، مغزیات وغیرہ کو عرق گلاب میں پیس لیں اور شیرہ حاصل کریں، اسی طرح زہرہ مہرہ خطائی کو عرق گلاب میں گھسیں اور حسب دستور عرق کشید کریں۔
تفصیلی علاج — متعدی امراض کے باب میں دق کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

حمی ورمیہ

INFLAMMATORY FEVER

اس مرض میں جسم میں بڑے اور ام یا قلب کے قریب چھوٹے اور ام پیدا ہوجانے سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوجاتا ہے اور طبعی کارکردگی پر خراب اثر پڑتا ہے اور دوسری مرض علامات رونما ہوتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس میں اسباب عام طور سے داخلی نوعیت کے ہوتے ہیں اور نہ صرف ورم کی حرارت قلب تک پہنچتی ہے بلکہ بخونیت بھی قلب تک سرایت کرجاتی ہے اور مرضی علامات مقام ورم، مادہ ورم وغیرہ کے تابع ہوتی ہیں۔

اسباب

(I) التهاب دماغ/التهاب اعشیہ دماغ۔

(II) ورم صماخ اذن۔

(III) ورم حلق۔

(IV) التهاب حجاب حاجز۔

(V) التهاب جگر۔

- (VI) التهاب مثانہ۔
 (VII) التهاب رحم۔
 (VIII) التهاب امعاء۔
 (X) بعض دوسرے اورام۔
 (IX) قروح داخلی/خارجی۔

علامات

اشاء میں حمہ کی قسم کے اورام پیدا ہو جانے کی صورت میں عوارض میں شدت ہوتی ہے، چنانچہ شدید درد ہوتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، سوزش ہوتی ہے اور دوسری صفراوی علامتوں کے ساتھ ساتھ حمہ (سرخ بادہ) کی مخصوص علامات رونما ہوتی ہیں۔
 ورم کے لمبی اعضا میں ہونے کی صورت میں بھی علامت میں شدت ہوتی ہے اس طرح اگر ورم شرائین کے قریب ہو تو بھی جسمانی درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے برخلاف آوردہ کے قریب ہو تو عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔
 اطباء نے اندرونی اعضا کے اورام سے پیدا ہونے والے بخار کی علامتوں اور عوارض کو تین انواع میں تقسیم کیا ہے۔

- (I) مآؤف عضو پر دلالت کرنے والی علامات اور عوارض۔
 - (II) مادہ مرض پر دلالت کرنے والی علامات اور عوارض۔
 - (III) مریض کی کیفیات پر دلالت کرنے والی علامات اور عوارض۔
- اس طرح ان اورام سے پیدا ہونے والے بخار کے قوی یا ضعیف ہونے، دائمی یا مفرغ ہونے کا انحصار بھی درج ذیل تین اصولوں پر ہے۔

- (I) اورام کا بڑا یا چھوٹا ہونا۔
- (II) اورام کی عروق کا بڑا یا چھوٹا ہونا۔
- (III) متاثرہ اعضا کا قلب کے پاس یا دور ہونا۔

عضو یاؤف پر دلالت کرنے والی علامات:

متاثر عضو میں بوجھ اور شدید گرمی محسوس ہوتی ہے، جبکہ اور درد ہوتا ہے، اگر درم عصبی اعضاء مثلاً رحم وغیرہ میں ہو تو درد، گرانی اور چھین کے علاوہ تشنج کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ احشاء امراق اور صفاق میں ہو تو عوارض میں اور بھی شدت ہوتی ہے۔

مادہ مرض پر دلالت کرنے والی علامات:

اس میں اخلاط اربعہ میں سے کسی بھی غالب خلط کی اپنی مخصوص علامات ضرور پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ صفراوی درم میں عوارض میں شدت ہوتی ہے اور متاثرہ عضو کی کارکردگی پر خراب اثر پڑتا ہے، دموی درم کی علامات بھی صفراوی درم سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن بلغمی اور سوداوی درم، جن کو ”ادرام بارده“ بھی کہہ سکتے ہیں، میں ان اخلاط کی مخصوص علامتوں کے ساتھ نقل اور گرانی نمایاں طور پر ہوتی ہے، درد میں کسی حد تک کمی ہوتی ہے اور اکثر اوقات بخار بھی نہیں ہوتا۔ بلغم کی صورت میں درم میں نرمی اور سوداء کی صورت میں صلابت پائی جاتی ہے۔

مریض کے کیفیات پر دلالت کرنے والی علامات:

اس میں علامتوں کا تجزیہ کر کے مریض کی صحت کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جاتی ہے، اور آئندہ کے معالجہ کے بارے میں اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ باطنی اور ام میں، ابتدا میں نبض صغیر چلتی ہے اور زمانہ انتہا کے قریب سرع چلنے لگتی ہے، متاثرہ عضو اور مادہ کے اعتبار سے عظیم، سرع اور متواتر بھی چل سکتی ہے، اس طرح اگر متاثرہ عضو عصبی اور لحمی ہو تو نبض موجی اور فشاری چلتی ہے، پیشاب عام طور سے سفیدی مائل ہوتا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ درم ہر عضو میں ہو سکتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کی بہت سی انواع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً درم جگر، درم قلب، درم زائدہ امور، درم صفاق، درم گردہ وغیرہ۔ اس لیے ان کی تفصیلی معلومات متعلقہ نظام کے تحت ملاحظہ کریں۔

اصول علاج

- o — تحقیق مواد کریں، اس مقصد کے تحت حسب ضرورت ابتداء میں منضجبات استعمال کرائیں۔
- o — تسکین و تبرید کا اصول کا اصول اختیار کریں، لیکن اس میں احتیاط لازمی ہے کیونکہ اورام بارہ میں مبردات کا استعمال صحیح نہیں ہے۔
- o — رفع درد کی تدابیر کریں۔
- o — حسب ضرورت منجرات استعمال کرائیں۔
- o — محلات اور مدلات استعمال کرائیں۔

علاج

اورام چونکہ عضو کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے اعضاء کے امراض کے تفصیلی بیان کی طرف رجوع کریں، تاہم ذیل میں چند بنیادی امور تحریر کیے جا رہے ہیں:

- o — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- منضج صفراء کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر، عنب الثعلب، تخم کاسنی، شاہترہ، تخم عطسی ہر ایک 7 گرام، آلو بخارا، عناب ہر ایک 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر ترنجبین / خیرہ بنفشہ / گلقد آفتابی 25 گرام حل کر کے چھان لیں اور نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

- عناب 5 عدد، گل بنفشہ، گل نیلوفر، شاہترہ، سر بھوکہ، تخم کاسنی (نیم کوفتہ) گل سرخ، بخ کاسنی، ہر ایک 7 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر / سلجھین 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو تحقیق کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

پوست ہلیدہ زرد 12 گرام، شاہترہ، سناہکی، ہر ایک 9 گرام، حجم کشوٹ 5 گرام،
(صرہ بست) حجم کاسنی 7 گرام، آلو بخارا 5 عدد، سپتاں 20 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر مل چھان لیں اور شیر خشک 25 ملی لیٹر، مغز فلوس خیار ضمیر، ترنجبین ہر ایک 50
گرام حل کر کے دوبارہ مل چھان کر روغن بادام 7 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
منضج بلغم کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بخ بادیان، بخ کرفس، بخ اذخر، بخ کاسنی، اسطوخودوس ہر ایک 7 گرام، انجیر زرد
2 عدد، مویز منقی 9 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش
دے کر مل چھان لیں اور شہد 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

پرسیاوشاں 7 گرام، اصل السوس مقشر، بادیان 5 گرام، مویز منقی 9 عدد، انجیر
3 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد عسلی 50 گرام حل
کر کے نوش کرائیں۔

جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
ایارج فقیرا، تربد سفید، حب اللیل، ہر ایک 3 گرام — تینوں کو کوٹ چھان کر
عرق بادیان میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 9-12 گرام ہمراہ آب نیم گرم
کھلائیں۔

گل بنفشہ، پرسیاوشاں، اصل السوس نیم کوفہ، زوفائے خشک ہر ایک 9 گرام،
مویز منقی، عناب، سیپتاں ہر ایک 15 عدد، انجیر زرد 7 عدد — تمام دواؤں کو ایک لیٹر پانی
میں جوش دیں۔ جب 500 ملی لیٹر رہ جائے تو مغز فلوس خیار ضمیر، ترنجبین، گلقد، ہر ایک
35 گرام حل کر کے چھان کر نوش کرائیں — حسب ضرورت روغن بادام 3 ملی لیٹر کا اضافہ
بھی کر سکتے ہیں۔

سوداوی خلط کے نفع کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

سپتاں 9 عدد، گاؤ زبان 5 گرام، بادرنبویہ، بادیان، شاہترہ ہر ایک 7 گرام،

اصل السوس مقشر 6 گرام، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر گلقتہ 25 گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔
جب نفخ کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:

ایارنج فقیر 31 گرام، لاجورد مفصول، غاریقون، ماش سفید، تربد سفید مدبر، پوست ہلیہ زرد، کثیر اسفید ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام شیریں سے چرب کر کے پنے کے برابر جوب بنائیں اور 7-9 گرام میں ورق نقرہ 3 عدد لپیٹ کر رات کے آخری حصے میں گرم پانی کے ساتھ نگلنے کی ہدایت کریں۔
صبح کو یہ نسخہ دیں:

شیر خشک، گلقتہ آفتابی ہر ایک 40 گرام، مغز فلوں خیاب شعیر 60 گرام، آب بادیان سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق ہر ایک 200 ملی لیٹر میں حل کر کے چھان لیں اور روغن بادام 4 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

غلہ خون کی صورت میں غلیان کو کم کرنے کے لیے یہ نسخہ دیں:

لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد، عرق شاہترہ عرق کاسنی، عرق عناب اشعلب ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

o — خارجی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:

حسب ضرورت روادعات استعمال کرائیں۔ ذیل میں چند نسخے تحریر ہیں:

گیرو، رسوت، افاقیا، ہلیہ سیاہ، پوست اتار، فوفل، صندل سرخ، مردار سنگ کات سفید، ہموزن — تمام دواؤں کو پیس کر پانی میں گوندھ کر اتر اصر بنائیں اور سرکہ آب برگ کو سبز میں گھس کر مقام ورم پر ضا د کریں۔

رسوت 3.5 گرام باریک کر لیں، موم سفید 7 گرام کو روغن بنفشہ، روغن گل ہر ایک 14 ملی لیٹر میں پگھلا کر رسوت ملائیں اور خوب ملا کر مرہم تیار کر کے ضا د کریں۔
ملاحظہ رہے کہ سنج دان اور بغل کے اورام میں روادعات ممنوع ہیں۔ محلل کے طور

پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شبث، اکلیل الملک، عطی، پریاوشاں، صبر، ہموزن کو لعاب تخم کتاب میں ملا کر ضیاد کریں۔
گل عطی، سیوس گندم، بالونہ — تمام دواؤں کو آب برگ کرنب میں پیس کر ضیاد کریں۔
صندل سرخ، زعفران، ہموزن کو آب کشنیزبز میں پیس کر ضیاد کریں۔

یہ منضجات بھی حسب ضرورت استعمال کرا سکتے ہیں:


اکلیل الملک، گل عطی، گل بنفشہ، گل بالونہ، تخم حلبہ، تخم کتاب، تخم شبث، ہموزن —
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں پکا کر ضیاد کریں اور اوپر سے برگ پان تازہ باندھ دیں۔
پیاز کو باریک کتر کر روغن زیتون / روغن خیری میں پکائیں، جب اچھی طرح گل
جائے تو ضیاد کریں۔

مغز کے طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

شیرہ بلاور، زفت رطب، ہموزن کو خوب ملائیں جب یکذات ہو جائے تو درم کے
سرے پر لگائیں۔

انزوت، تخم کنوچہ، کتیرا، مغز خستہ تمر ہندی، مغز بید انجیر، تخم حلبہ، برگ چقدر،
خمیرہ روٹی، ہموزن کو کوٹ کر گائے کے دودھ میں پکا کر زردی بیضہ سرخ، روغن بید انجیر،
گائے کا پتہ ملا کر ضیاد کریں۔

بتار کی رعایت کرتے ہوئے دافع حمی دوائیں استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض متعدی

تعدیہ

INFECTION


میزبان (Host) کی بافتوں (Tissues) میں بیماری پیدا کرنے والے زندہ خوردبینی اجسام (Living Micro-Organism) کی سرایت، اور اس کے نتیجے میں مہلکی تبدیلیوں (Phathological Changes) کے رونما ہونے کو طبی اصطلاح میں عدی/تعدیہ (Infection) کہتے ہیں۔

طبی اصطلاح میں 'سرایت' کا اطلاق — ایک انفرادیت سے کسی دوسری انفرادیت تک بیماری کی ترسیل پر ہوتا ہے۔ اس طرح ایسے تمام امراض جو مختلف وسیلوں کے توسط سے کسی انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ 'متعدی امراض' کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے امراض میں مبتلا جسم میں موجود مرضیاتی جراثیم کسی بھی ذریعے سے جب دوسرے میزبان میں منتقل ہوتے ہیں تو وہاں اپنی تعداد کو غیر معمولی طور پر بڑھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہی مرض نئے میزبان میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

مرض پیدا کرنے والے یہ خوردبینی اجسام (Micro-Organism) کو درج ذیل زمروں میں رکھا جاسکتا ہے۔

(الف) جراثیم (خورد بنی نباتات) جرر/ بکٹیریا (Bacteria or Germs)

شکل و شابت کے اعتبار سے اس کی درج ذیل قسمیں ہیں:



یہ گول، گرے کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کا قطر تقریباً ایک مائیکرومیٹر (iu) ہوتا ہے۔

(۱) کرودیہ عشقودیہ

اسٹیفیلو (Staphylo) یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 'خوشہ انگور' کے ہیں، خوردبین کے ذریعہ دیکھنے پر ان کے گردہ انگور کے خوشوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ معمول (لیپورینری) میں ان کی مصنوعی کاشت کی جائے تو یہ سہرے زرد رنگ (گہرے نارنجی رنگ) کے جھوم کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نوع جسم میں پیپ پیدا کرنے کا باعث تصور

کنا جاتی ہے۔

(II) کروبیہ عقدیہ

اسٹریپٹو (Strepto) یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 'زنجیر' کے ہیں۔
خوردبین کے ذریعہ دیکھنے پر یہ زنجیر کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔

(III) ذوبقیہ/زوجیہ

خوردبین کے ذریعہ دیکھنے پر یہ زوج (pairs) کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔

جراثیم عصویہ

یہ عضو نما یا بیلن جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی اوسط لمبائی 2-5 مائیکرو ملی لیٹر اور موٹائی (0.3) — 1 مائیکرو ملی لیٹر ہوتی ہے۔

جراثیم حلزونیہ

یہ نہایت باریک بلداز/ اسپرنگ نما، ریشوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی 10 مائیکرو ملی لیٹر اور موٹائی (0.2) ملی لیٹر کے قریب ہوتی ہے۔

(ب) فطریات/فنجائی/پھپھوند (Fungi/Moulds)

یہ مناسب حد تک نمی میں مردہ حیوانی اجزاء اور نباتی مادوں پر اُگتے ہیں۔ ان کے تخم ہوا کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور مناسب ماحول پانے پر بہت سرعت کے ساتھ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔

(ج) وائرس/مادرائے خردبین اجسام Virus/ Ultra Microscopic Organism

یہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ پورسلین فلٹر (چینی کے فلٹر) میں سے بھی بہ آسانی

گزر جاتے ہیں، چونکہ یہ عام خوردبین سے دکھائی نہیں پڑتے اسی مناسبت سے ماورائے خوردبین (Ultra Microscopic) کہلاتے ہیں۔ ان کی جسامت باہم بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔

(د) ریکیٹسیا (Rickettsiae)

ان خوردبینی اجسام کو دریافت کرنے والے سائنس دان کا نام ریکیٹس تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو ریکیٹسیا کہا جانے لگا، شکل و شبہت کے اعتبار سے یہ حلقہ اور عصا نما اور جسامت کے اعتبار سے جراثیم (Bacteria) اور وائرس (Virus) کے درمیان ہوتے ہیں۔

(ه) حیوانات دنیہ/خوردبینی حیوانات (Protozoa)

جسامت کے اعتبار سے اس گروہ میں بہت سے سرایتی اجسام آتے ہیں۔ مثلاً اینٹ امیبا ہسٹولائیٹیکا (Entamoeba Histolytica) پلازموڈیا ملیریائی (Plasmodia Malariae) لیشمن ڈونووان (Leishman-Donovan) ٹرائکی پانوسومز (Trypano Somes) وغیرہ۔

(و) ورد (Worm)

ان کے ذریعہ بھی تعدیہ ہوتا ہے۔ اس زمرے میں دید ان امعاء وغیرہ کی انواع آتی ہیں۔

بہر حال ان خوردبینی اجسام میں نمو اور چکار کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے اور سازگار ماحول میں صرف ایک جڑومہ 24 گھنٹے میں کروڑوں جراثیم پیدا کر دیتا ہے۔ ایک جائزہ کے مطابق ایک بالغ جڑومہ 24 گھنٹے میں تین سو کھرب نئے جراثیم پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک نوزائیدہ جڑومہ صرف 30 منٹ میں ہی بالغ ہو جاتا ہے۔

ذریعہ سرایت (Route of Infection)


جراثیمی سرایت کے درج ذیل وسیلے ہیں:

- (I) بلا واسطہ اتصال۔
- (II) ہوا کے ساتھ اڑنے والے گرد و غبار۔
- (III) غذائی اشیاء۔
- (IV) مکھی / چمچ / کیزے / کوزے / پالتو جانور۔

مدت حضانت (Incubation Period)

مرض پیدا کرنے والے خوردبینی اجسام کے جسم میں داخل ہونے اور مرض کی ابتدائی علامتوں کے آغاز کے درمیان کی مدت 'مدت حضانت' کہلاتی ہے۔ یہ مدت مرضی / خوردبینی جسم کی نوعیت اور کسی حد تک مریض کی قوت مدافعت پر منحصر ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

واضح رہے کہ تمام متعدی امراض میں علامتوں اور مائیکروبیاتی تبدیلیوں Pathological Changers کے رونما ہونے کا سبب جسم اور جسمانی ساختوں میں مرض پیدا کرنے والے خوردبینی اجسام کی موجودگی ان کے پیدا کیے ہوئے سخی مادوں کا اثر، اور ان کی وجہ سے خلیوں اور نسجوں میں پیدا ہونے والی خراش اور التهاب ہے۔ یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے کم و بیش تمام متعدی امراض میں از دیاد حرارت جسمانی (حمی) عام جسمانی ضعف اور جسمانی عدم فعالیت کا احساس وغیرہ علامات، مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔



سونو خس عفونی


PARATYPHOID FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص جراثیم کی سرایت کی وجہ سے خون میں غیر طبعی حرارت اور غلیان پیدا ہو جاتا ہے، جس کے سبب جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور حمی معویہ (Typhoid Fever) سے مشابہ دوسری علامات رونما ہوتی ہیں۔ تاہم یہ علامات نسبتاً خفیف طور پر رونما ہوتی ہیں اور مدت مرض بھی قلیل ہوتی ہے۔

اقسام

سونو خس عفونی

Para Typhoid Fever



اسباب

(I) سالمونیلہ پیرائٹیفائی، الف Salmonella Paratyphi, A

(II) سالمونیلہ پیرائٹیفائی، ب Salmonella Paratyphi, B

(III) سالمونیلہ پیرائٹیفائی، ج Salmonella Paratyphi, C

آخر الذکر نادر الوقوع ہے۔ ملاحظہ رہے کہ اس کے تعدیہ کے وہی ذرائع ہیں جو جمی معویہ (Typhoid Fever) میں مذکور ہیں۔

(IV) کسی داخلی/خارجی حرارت سے خون کا اس حد تک گرم ہو جانا جس سے حرارت، قلب اور دوسرے اعضاء کو متاثر کرے، لیکن خون میں کسی طرح کی عفونت پیدا نہ ہو۔

علامات

داغی بخار ہوتا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پیشاب گرم اور بغیر تعفن کا ہوتا ہے، 7 دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

پیرائٹیفائڈ (الف) کی مدت حضانت 6-144 گھنٹے ہے، اور بخار 9-20 دن تک رہ سکتا ہے۔ ابتدا میں جاڑا لگ کر بخار آتا ہے، شدید درد سر ہوتا ہے، گردن اور اطراف میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، بخار کی حالت میں تھوڑا پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، زبان پر سفیدی مائل خشک میل جمی ہوتی ہے، کبھی کبھی گلے میں خراش کی شکایت ہوتی ہے، کھانسی بھی ہو سکتی ہے، 65 فیصدی مریضوں میں جسم پر صہ کی مانند دانے نکل آتے ہیں۔ یہ عام طور سے پہلے شکم اور سینے پر نمودار ہوتے ہیں، اس کے بعد بازو اور ٹانگوں پر نمایاں ہوتے ہیں، بعض اوقات گردن اور چہرے پر بھی نکل آتے ہیں، یہ دانے جمی معویہ کے دانوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، دبائے پر اس کے دانوں کی طرح غائب نہیں ہوتے۔ حرارت کے تناسب سے نبض بھٹی چلتی ہے، شدید معوی علامات عام طور پر نہیں پائی جاتیں۔ تاہم بعض مریضوں میں امعاء میں التهاب، اسہال اور زحیر کی علامات رونما ہوتی ہیں، جسمانی درجہ حرارت عام طور سے 10-14 دن تک بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور چارٹ پر حرارت کے بڑھنے،

گھٹنے کا نقشہ، حمی معویہ کی طرح ہی مرتب ہوتا ہے، کريات بیضاء الدم (W.B.C.) میں اضافہ ہو جاتا ہے، طحال بھی کسی قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

پیرا ٹائیفائڈ (ب) کی علامت پیرا ٹائیفائڈ (الف) کی علامات سے خفیف ہوتی ہیں، مدت مرض بھی کم ہوتی ہے، اور مریض کی روئیداد قسم غذائی، موسیضوں/ بند ڈبوں کا گوشت وغیرہ کھانے کی نشاندہی کی جاتی ہے، چنانچہ متعدی غذا کھانے کے چند گھنٹے کے بعد شکم میں درد اور تے کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے بعد زحیر کی مانند اسہال آنے لگتے ہیں۔ پیرا ٹائیفائڈ (ج) نادر الوقوع۔

تفریقی علامات

حمی معویہ Typhoid Fever	سونو خس Paratyphoid Fever
1- خفیف، بتدریج ہوتا ہے۔	1- مرض کا حملہ نسبتاً سرنج ہوتا ہے۔
2- دانچھوٹے ہوتے ہیں۔	2- دانے (طفحات) بڑے، صہب کے دانوں کی مانند ہوتے ہیں۔
3- دھبے/ دانے دبانے سے زائل ہو جاتے ہیں اور دباؤ ہٹتے ہی عود کر آتے ہیں۔	3- دھبے/ دانے دباؤ سے زائل نہیں ہوتے۔
4- اس قدر بطنی نہیں چلتی۔	4- نبض بہت بطنی چلتی ہے۔
5- عام طور سے ہوتا ہے۔	5- جسمانی درجہ حرارت شاذ و نادر 104-105 ف تک ہوتا ہے۔
6- طحال بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔	6- طحال کسی قدر بڑھی ہوئی ہے۔
7- عام طور سے ہوتا ہے۔	7- تعفن الدم شاذ و نادر ہوتا ہے۔
8- مدت مرض زیادہ ہوتی ہے۔	8- مدت مرض کم ہوتی ہے۔

اصول علاج

0 — خون کے غلیان کو کم کرنے کی تدابیر کریں/ مدرات استعمال کرائیں۔

0 — حسب ضرورت فصد کھولیں / ملیتات استعمال کرائیں۔

0 — مبرہات اور مصفیات خون استعمال کرائیں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

گل سرخ 10.5 گرام، عصارہ زرشک 7 گرام، مغز تخم خیار، تخم خربزہ، تخم خرفہ، مغز تخم باؤ بزرگ، ہر ایک 3.5 گرام، نشاستہ، کثیر، صمغ عربی، ہر ایک 1.205 گرام، زعفران، ریوند چینی، کافور ہر ایک 750 ملی گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر قرص بنائیں 7 گرام استعمال کرائیں۔

آلو بخار شیریں 30 عدد، تمر بندی 250 گرام — دونوں کو 1500 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب 750 ملی گرام رہ جائے تو ل چھان کر آب اتار میخوش، ترشی تاج ہر ایک 500 ملی لیٹر ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب 875 ملی لیٹر رہ جائے تو نبات سفید 500 گرام، عرق گلاب 125 ملی لیٹر ملا کر شربت کا قوام بنائیں اور سفوف تخم خرفہ 7 گرام کھلائیں یہ شربت 50 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

مزاج میں حرارت کی صورت میں — زرشک 12 گرام، تمر بندی 25 گرام — دونوں کو عرق شاترہ 120 ملی لیٹر میں بھگو دیں۔ 12 گھنٹے بعد ل چھان کر شربت عتاب، شربت انار ترش ہر ایک 12 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عتاب 5 عدد، عرق شاترہ، عرق عنب الثعلب، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

شیرہ تخم کاسنی، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک 6 گرام، عرق گلاب 25 ملی لیٹر، عرق شاترہ 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

سکینین سادہ 25 ملی لیٹر، عرق شاترہ 75 ملی لیٹر، عرق عنب الثعلب 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ غنودگی، بھوک کی کمی اور کندی حواسی میں سودمند ہے۔

پیشاب کے ادرار کے لیے — تخم کاسنی، تخم کشوت ہر ایک 10.5 گرام،

پوست بچ کبر، پوست بچ کاسنی، ہر ایک 25 گرام، تخم خیار، تخم باؤ بڑگ، تخم خر بڑو، ہر ایک 18 گرام۔ تمام دواؤں کو 1 لیٹر پانی اور 25 ملی لیٹر تیز سرکہ میں 8 گھنٹے بھگوئیں اور بعد میں جوش دیں۔ جب $1/2$ حصہ رہ جائے تو مل چھان کر بات سفید 500 گرام قوام بنائیں اور 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

اس مرض میں مٹانہ میں درد اور صلابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مٹانہ میں درد کی صورت میں۔ عاب اسپول 12 گرام، شیر و تخم کاہو، شیر و تخم خیارین، ہر ایک 6 گرام، عرق شاترہ 110 ملی لیٹر، عرق گلاب 50 ملی لیٹر میں نکال کر شربت لیوں 50 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ دوسرے دن آب آلو بخارا 7 عدد اضافہ کریں۔

مٹانہ میں سوزش کی صورت میں۔ بہدان 3 گرام، عاب 5 عدد، تخم خیارین، خار خشک، ہر ایک 6 گرام کو پانی میں پیس کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ دوسرے دن اسی نسخہ میں بنفشہ، اصل السوس ہر ایک 4 گرام کا اضافہ کریں۔
(فصد کے بعد) درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:

سناہنی 18 گرام، بنفشہ، نیلوفر، تخم کاسنی، گل سرخ ہر ایک 10.5 گرام، تمر بندی 35 گرام، آلو بخارا، عاب ہر ایک 20 عدد، سیٹاں 40 عدد۔ تمام دواؤں کو 1 لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب وہ 250 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر شیر خشک، ترنجبین ہر ایک 50 گرام اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

حسب ضرورت فصد کھولیں۔

صلابت مٹانہ کی صورت میں۔ برگ عنب، العلب کو نیم کوب کر کے پکا کر روغن گل میں ملا کر نکلیاں بنائیں اور مٹانہ کے مقام پر باندھیں۔
ملین کے طور پر یہ حقنہ بروئے کار لائیں:

بنفشہ، نیلوفر، سیٹاں ہر ایک 10.5 گرام، جو کوئے، برگ چقندر ہر ایک 12

گرام۔ تمام دواؤں کو 1 لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب 250 ملی لیٹر رہ جائے تو شکر سرخ 35 گرام، روغن بنفشہ 35 ملی لیٹر ملا کر حقنہ کریں۔

حمی مطبقہ متزائدہ

TYPHUS FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص طفیلی کی سرایت کے نتیجہ میں جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے اور شدید دسوی اور اعصابی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ یہ بیماری شدید متعدی نوعیت کی حامل ہے اور کم و بیش 20-7 دن شدید بخاری کے ساتھ رہتی ہے، سرد ملکوں اور سرد موسم میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

حمی مطبقہ متزائدہ

Typhus Fever

حمی مطبقہ متزائدہ وبائی
Epidemic Typhus Fever

حمی مطبقہ متزائدہ مقامی
Endemic Typhus Fever

اسباب

(I) ریکٹسیائی (Rickettsiae) نامی خورد بینی اجسام — یہ اجسام، جراثیم (Bacteria) اور تکب (Virus) کے درمیان کے ہیں — سرایت زدہ جوہوں کے ذریعہ صحت مند انسانوں تک یہ طفیلی پہنچتا ہے — گنجان آبادی، ملاء ملت، کثافت اور عدم صفائی وغیرہ اس بیماری کے پھیلائے میں معاون ہیں۔

علامات

سرایت کے 14-5 دن بعد اور عام طور سے 13 دن میں مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں، ابتدا میں طبعیت سست اور کسی قدر بے چین ہوتی ہے، کمر میں درد محسوس ہوتا ہے، اعضا شقی ہوتی ہے، اس کے بعد بیک ایک جاڑا دک کر بخار چڑھتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت 101-103 ف تک پہنچ جاتا ہے، ہاتھ پیر اور سر میں شدید درد ہوتا ہے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھ اور بظاہر اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، متلی اور تھکے آتی ہے، نفس جلد جلد ہوتا ہے، زبان اور حلق خشک ہوتے ہیں، قشوک نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، ہونٹوں پر چوڑی جھمی ہوتی ہے، شدید ضعف کا احساس ہوتا ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، رات کے وقت کرب و اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے اور بذاتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نفس سرخ اور متلی ہوتی ہے، 24 گھنٹے بعد درجہ حرارت 104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے اور 24-48 گھنٹے میں اور بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن خفیف صورت میں 7 دن تک بخار ایک ہی حالت میں قائم رہتا ہے اور دوسرے ہفتہ میں بتدریج کم ہو کر بحران کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ درجہ حرارت استدال سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر دوسرے ہفتہ بھی بڑھی ہوئی حرارت برقرار رہے تو یہ اندرونی اعضا میں سوزش کی غماز ہے۔ 5-6 دن میں تمام جسم، بالخصوص سینے، شکم، ہاتھوں اور کانوں کی پچھلی طرف سیاہ شہتوت کی مانند، جلد سے کسی قدر ابھرے ہوئے دھبے / نقطے نمودار ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ان پر دباؤ اثر کرتا ہے اور یہ دھبے / نقطے زائل ہو جاتے ہیں، لیکن دباؤ ہٹنے ہی پھر لوٹ آتے ہیں، 24-48 گھنٹے میں ان کا رنگ پختہ اینٹ کی مانند ہو جاتا ہے

اور دماؤ ڈالنے پر بھی بدستور رہتے ہیں، جسم سے مخصوص قسم کی بو آتی ہے۔

شدید صورت میں علامات میں تخفیف نہیں ہوتی 12-20 دن کے اندر ہی ردی علامتیں رونما ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ بے خوابی اور غنودگی کی شکایت ہوتی ہے، شدید ضعف اور نفاہت ہوتی ہے، منہ اور ہاتھ کے عضلات میں پھڑکن ہوتی ہے اور تمام عضلات میں تحلیل (گھلاوٹ) کا عمل شروع ہو جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے، زبان اور حلق خشک ہوتے ہیں بلکہ زبان سیاہ ہو جاتی ہے اور منہ سے باہر نکالنے پر کانپتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، آنکھیں ادھ کھلی اور منہ کھلا ہوتا ہے، پیشاب کم مقدار میں، سرخ خارج ہوتا ہے، بعض اوقات احتباس بول کی بھی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے، پیشاب، پاخانہ بلا ارادہ خارج ہونے لگتا ہے اور غفلت اور تشنج ہو کر انجام کار موت ہو جاتی ہے۔

خفیف صورت میں 10-14 میں بحران ہو کر جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آنے لگتا ہے، نبض اعتدال پر آنے لگتی ہے، دھبے/نقطے ختم ہو جاتے ہیں، بے خوابی رفع ہو جاتی ہے، زبان کی میل صاف ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے اور قوی اعتدال کی طرف آنے لگتے ہیں، اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

طوطا رہے کہ جی مطبقہ متزائدہ مقامی میں عوارض نسبتاً خفیف اور دہائی میں نہایت شدید ہوتے ہیں اور ایک سے زائد لوگ مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

تفریقی علامات

سرسام Meningitis	جی مطبقہ متزائدہ (جی تیفوسید) Typhus Fever
1- قحطہ External Occipital Eminence میں درد ہوتا ہے۔	1- پیشانی میں شدید درد ہوتا ہے۔
2- پٹیاں ہونے پر درد سر رفع ہو جاتا ہے۔	

- | | |
|---|---|
| <p>3- حرارت جسمانی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور شاذ و نادر 104 ف سے زائد ہوتی ہے۔</p> <p>4- نبض بظلی چلتی ہے۔</p> <p>5- تشنج اور فالج کثیر الوقوع ہے۔</p> <p>6- تے کثرت سے ہوتی ہے۔</p> <p>7- عضلات میں صلابت ہوتی ہے۔</p> <p>8- چہرے سے اضطراب اور تردد ظاہر ہوتا ہے۔</p> <p>9- لب اور چہرے پر دانے/دھبے نمودار ہوتے ہیں کہیں یہ شاذ و نادر ہی نکلتے ہیں۔</p> <p>10- بھیگاپن ہو جاتا ہے۔</p> <p>11- بکران نہیں ہوتا۔</p> <p>12- نقاہت زیادہ نہیں ہوتی۔</p> | <p>3- جسمانی درجہ حرارت ابتدا سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔</p> <p>4- نبض سرلج چلتی ہے۔</p> <p>5- تشنج عام طور سے نہیں ہوتا۔ شدید صورت میں البتہ ممکن ہے فالج نہیں ہوتا۔</p> <p>6- حتمی اور تے کی شکایت ہو سکتی ہے۔</p> <p>7- عضلات میں صلابت نہیں ہوتی۔</p> <p>8- چہرے سے بے خبری کا اظہار ہوتا ہے۔</p> <p>9- لب اور چہرے کو چھوڑ کر دوسرے حصہ جسم پر توتی نوعیت کے دھبے/دانے نکلتے ہیں۔</p> <p>10- حول (بھیگاپن) نہیں ہوتا۔</p> <p>11- بکران ہوتا ہے۔</p> <p>12- نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے</p> |
|---|---|

تفریقی علامات

حصہ	حمی مطبقہ متزاہدہ/حمی تیفوسیہ
Measles	Typhus Fever
1- چوتھے دن دھبے/طفحات رونما ہوتے ہیں۔	1- عام طور سے 5 دن بعد جسم پر دھبے/دانے نمودار ہوتے ہیں۔

- | | |
|---|--|
| <p>2- چہرے پر طفحات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات ہلالی ہوتے ہیں۔</p> <p>4- طفحات سے پہلے شدید سردی محسوس ہوتی ہے۔</p> <p>5- نقاہت نسبتاً کم ہوتی ہے۔</p> <p>6- حلق سرخ اور چمکدار ہوتی ہے۔</p> <p>7- رنگت سرخ ہوتی ہے۔</p> <p>8- دبانے سے غائب ہو جاتے ہیں۔</p> | <p>2- سر کے آس پاس دھبے/دانے/طفحات بہت کم ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات ہلالی نہیں ہوتے۔</p> <p>4- طفحات نکلنے سے پہلے دماغی علامات شدید ہوتی ہیں۔</p> <p>5- نقاہت غیر معمولی ہوتی ہے۔</p> <p>6- حلق کی غشا مخاطی طبعی رنگ پر ہوتی ہے۔</p> <p>7- طفحات کی رنگت توتی (سرخ سیاہی مائل) ہوتی ہے</p> <p>8- کچھ عرصہ بعد دبانے سے غائب نہیں ہوتے۔</p> |
|---|--|

تفریقی علامات

- | | |
|--|---|
| <p>جدری
Small Pox</p> <p>1- طفحات تیسرے دن نمودار ہوتے ہیں اور بالوں کے پاس پہلے نکلتے ہیں اور مخصوص انداز کے ہوتے ہیں۔</p> <p>2- درد گلو ہوتا ہے۔</p> <p>3- عضلاتی نقاہت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔</p> | <p>حمی مطبقہ متزاہدہ
Typhus Fever</p> <p>1- طفحات 5 ویں دن اور پہلے جسم کے درمیانی حصہ پر نمودار ہوتے ہیں اور ان کی نوعیت مخصوص ہوتی ہے۔</p> <p>2- درد گلو کی شکایت نہیں ہوتی۔</p> <p>3- شدید عضلاتی نقاہت ہوتی ہے۔</p> |
|--|---|

اصول علاج

- 0 — مریض کو صاف سترے، ہوادار کمرے میں رکھیں۔
- 0 — عوارض کے تدارک/ازالہ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔

- 0 — غیر معمولی مہر دات سے احتراز کریں۔
 0 — رفع قبض کریں۔
 0 — قوی جسمانی کویرقہ اور کھنے کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:
- قرص کافور 3 گرام، شربت انارین 12 ملی لیٹر میں ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد آب برگ کاسنی سبز مرق، آب برگ کوبہر مرق، ہر ایک 85 ملی لیٹر، کلکچین سادہ 35 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- شیرہ تخم کاہو، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، شیرہ خرفہ، ہر ایک 5 گرام، لعاب بہدان 3 گرام، عرق کیوڑو، 35 ملی لیٹر، عرق 150 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- شدید پیاس کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے۔
- لعاب بہدان 3 گرام، شیرہ تخم خیاریں، شیرہ تخم خرفہ، ہر ایک 6 گرام، عرق کیوڑو، عرق بید مشک ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر مل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- رفع قبض کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
- گل بنفشہ، گل سرخ ہر ایک 6 گرام، تمر بندی 35 گرام، آلو بخارا 7 عدد، خطاب 9 عدد — تمام دواؤں کو عرق بید سادہ، عرق بید مشک، عرق گاؤ زبان، عرق کیوڑو ہر ایک 35 ملی لیٹر، عرق کاسنی، عرق شاترہ، عرق گلاب، عرق کوبہر ایک 60 ملی لیٹر میں بھسودیں، 12 گھنٹے بعد مل چیمان کر شربت درو کدر 45 ملی لیٹر، شیرہ بنفشہ 35 گرام، کلکچین سادہ 35 ملی لیٹر شامل کر کے نوش کرائیں۔
- یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

گاؤ زبان 4 گرام، گل بنفشہ، بادیان، بچ کاسنی، کوشنگ ہر ایک 6 گرام۔
تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقتد 35 گرام،
شربت بزدوری معتدل 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدابیر / نسخے بروئے کار لائیں:

درد سر کی صورت میں — برادہ صندل سفید، تخم کشیز، تخم کاہو، ہموزن کو عرق گلاب
میں پیس کر سر / پیشانی پر لیپ کریں۔ یا صرف صندل سفید عرق گلاب میں گھس کر پیشانی پر
لیپ کریں۔

بے خوابی کی صورت میں — روغن خشکاش، روغن کدو، روغن بادام عورت کے
دودھ میں ملا کر سر میں ڈالیں اور ناک میں پٹکائیں۔

شدید حرارت کی صورت میں — سرد پانی سے جسم پر اسفنج کریں۔

ہذیان کی صورت میں — پاشویہ کریں اور روغن گل، سرکہ میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھیں۔

احتباس بول کی صورت میں — گل ٹیسو 125 ملی لیٹر میں پانی میں جوش دے کر

چھان لیں اور نیم گرم حالت میں عانہ پر نطول کریں۔ یا شورہ قلمی، کافور، ہموزن کو عرق
گلاب میں پیس کر ناف پر طلاہ کریں۔



حمی معویہ TYPHOID FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص جرثومہ کی سرایت کی وجہ سے معا دقاق (Small Ileum/Intestines) کے غدود مجتمعہ میں التهاب اور تقرح پیدا ہو جاتا ہے اور جرثومی سمیت تمام جسم میں منتشر ہو کر دوسری شدید مرضی علامات رونما کرتی ہے۔ گرم ممالک میں موسم گرما و برسات میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

سالمونیلہ ٹائفی (Salmonella Typhi) نامی جرثومہ کی سرایت — یہ جرثومہ گندے پانی، دودھ اور غذا کے ساتھ جسم میں داخل ہوتا ہے اور چھوٹی آنت کی دیواروں پر حملہ آور ہوتا ہے۔

علامات

سرایت کے 10-14 گھنٹہ میں مرض علامات رونما ہوتی ہیں — چھوٹی آنتوں کے دیواروں پر حملہ آور ہو کر لیمف نمائش کے مجموعوں میں تکاثر اور افزائش کرنے کے مرحلے میں

کوئی خاص علامت رونما نہیں ہوتی، لیکن ہفتہ عشرہ بعد دوران خون میں شامل ہو جانے کے بعد علامات کا ظہور ہوتا ہے، ابتدا میں اعضا شکنی اور طبیعت میں کسل مندی ہوتی ہے، سر میں گرانی اور درد محسوس ہوتا ہے، بھوک مر جاتی ہے، بعض اوقات متلی بھی ہوتی ہے۔ معدی علامات یا تو از خود رونما ہوتی ہیں یا مذکورہ علامتیں علامتوں کو دور کرنے کے لیے ملینیات کے استعمال کے بعد رونما ہوتی ہیں۔ اسہال کی زیادتی کی وجہ سے ضعف لاحق ہوتا ہے اور مریض کے معمولات پر خراب اثر پڑتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس اسہال کو روکنے کی پیشتر تدابیر نا کام ثابت ہوتی ہیں۔

پہلے ہفتہ میں رات کے وقت جسمانی درجہ حرارت 101 ف ہوتا ہے، اور صبح کو ایک درجہ کم ہو جاتا ہے، اس ہفتہ کے آخری دن تک رات کے وقت درجہ حرارت 103-104 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیفیت اگر چارٹ میں لائی جائے تو زینہ کی میڑھیوں کی بلندی کی مانند دکھائی دے گی۔ یہ مدت عام طور سے 3-5 دن اور بعض حالات میں 7 دن تک رہتی ہے۔ اس کے بعد جسمانی درجہ حرارت اسی درجہ پر رک جاتا ہے اور 3-4 ہفتے تک 103-104 ڈگری ف بخار قائم رہتا ہے، پھر بخار کے کم ہونے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور گرم ملکوں میں یہ مدت کافی طویل ہوتی ہے، عام طور سے صبح کی حرارت اعتدال پر رہتی ہے، لیکن شام کو 2-3 ڈگری حرارت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ حرارت بالکل اعتدال پر آ جاتی ہے، عام طور سے یہ مدت 5-25 یوم پر محیط ہوتی ہے، دوران بخار 200-400 گرام عضلاتی پروٹین (لحمیہ) ہر دن ضائع ہوتی رہتی ہے۔

نبض تین اور بے قاعدہ چلتی ہے۔ عام طور سے نبض بطنی چلتی ہے جو 80 فی منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، گویا حرارت کے تناسب سے نبض میں سرعت نہیں آتی۔ معمولی کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، بلغم خارج ہوتا ہے۔ 7-10 دن کے اندر بخار کی علامتیں رونما ہوتی ہیں اور ان کی کیفیت مذکورہ بالا نچ پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات غنودگی بھی طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ اور پتلیاں پھیل جاتی ہیں، چہرے پر زردی اور رخسارے کا درمیانی حصہ سرخ، ہونٹ نیلگوں ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے اور اس پر سفید فرجی ہوتی ہے۔ تاہم نوک اور

سرخ ہوئے ہیں، سر میں شدید درد ہوتا ہے — حواس کند ہو جاتے ہیں، شنوائی میں فرق پڑتا ہے۔ تاہم بذیان کی سی کنڈی نہیں ہوتی۔ 7-12 دن کے اندر جسم پر دھبوں کی مانند ٹھاپی۔ تپ کے دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ کسی قدر مہذب، بغیر فوک کے 2-4 فی لیٹر حجم کے ہوتے ہیں، انکی گڑبے سے رنگت غائب ہو جاتی ہے، دباؤ ہینے کے قبویٰ دیر بعد سرخی لوٹ آتی ہے، سی قدر گرم ممالک (ہندوستان وغیرہ) میں ان دانوں کی رنگت سفید ہوتی ہے اور یہ ششائش سے بھی چھوئے ہوتے ہیں۔ 20 فیصد مرینسوں میں یہ دھبے دانے رونما نہیں ہوتے، دانوں کی تعداد 80 تک ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے شکم کے سامنے اور سینے پر ظاہر ہوتے ہیں، لاش اوقات اطراف و جوانب ران اور پیٹ پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور 3 ہفتے تک نکلتے رہتے ہیں، ہر دانہ صرف 4-5 دن تک رہتا ہے۔ اس کے بعد مرجھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔

دوسرے ہفتے میں آنٹوں کے اعراض رونما ہوتے ہیں، نفخ شکم کی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ شکم پر ہاتھ سے ٹھونکنے پر دھول کی سی گونج دار آواز پیدا ہوتی ہے، ملمس نرم ہوتا ہے، شکم میں درد محسوس ہوتا ہے، ناف کے نیچے دائیں طرف دبانے سے درد اور گڑبڑا ہٹ ہوتی ہے، چھوٹی آنٹ کے نچلے حصہ میں خند جاذبہ کے مقام پر زخم پیدا ہو جاتا ہے۔

اسہال، جمی معویہ کی ایک اہم علامت ہے۔ تاہم کبھی، اسہال کی شکایت قطعی نہیں ہوتی، اسہال آ رہے ہوں تو اس کی تعداد اور مقدار میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے۔ عام طور سے پہلے ہفتے میں دست کا شدید حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد آنٹوں میں انسداد پیدا ہوتا ہے، دست کا رنگ مخصوص ہوتا ہے چنانچہ رنگت زرد، ایک خاص قسم کی بدبو اور قوام میں رقت ہوتی ہے، بعض دستوں میں خون، بشرہ امعاء وغیرہ مہضم غذا کے اجزاء، صفراوی مادہ اور صفوی مواد خارج ہوتے ہیں — امعاء میں زخم پڑ جانے سے جریان خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے ثقاہت اور لاغری طاری ہو جاتی ہے، قرحہ کے مقام پر شکم میں درد محسوس ہوتا ہے، اور دیوار شکم میں صلابت ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس دوران بھی بعض اوقات دانے نکلتے رہتے ہیں، برد اطراف ہو کر 25-30 فیصد مرینس ہلاک ہو جاتے ہیں۔

تیسرے ہفتے میں عام طور سے عوارض میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے، جسمانی

حرارت صبح کے وقت کم اور رات میں 1-2 درجہ زیادہ ہوتی ہے، 2-3 دن بعد رات کا درجہ حرارت بھی اعتدال پر آنے لگتا ہے، لاغری اور کمزوری بہت ہو جاتی ہے۔ اس عرصہ میں بھی اگر نفع اور درد شکم ہو، اسہال کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ہڈیانی طاری ہو جائے تو یہ ردی علامات ہیں۔

چوتھے ہفتہ میں عوارض میں بہت زیادہ تخفیف ہو جاتی ہے، اسہال موقوف ہو جاتے ہیں اور زبان صاف ہوتی ہے، بھوک لگنے لگتی ہے اور مریض اٹھ کر بیٹھ سکنے لائق ہو جاتا ہے، جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے اور عام طور سے 40 دن بعد مرض سے بالکل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

اگر انجام خراب ہونے پر آتا ہے تو سابق میں مذکورہ جملہ علامات میں شدت ہوتی ہے جسمانی درجہ حرارت بہت بڑھا ہوتا ہے، نبض سریع اور ضعیف چلتی ہے، شنوائی پر خراب اثر پڑتا ہے، زبان خشک، پھٹی ہوئی اور اس پر سیاہ میل جمی ہوتی ہے، ہچکیاں آتی ہیں اور شدید ہڈیان ہوتا ہے، اسہال آتے رہتے ہیں اس کے بعد چہرے پر سیاہی/مردنی چھا جاتی ہے، ہاتھ پیر کی انگلیاں کپکپاتی ہیں، پیشاب، پاخانہ بغیر ارادہ خارج ہونے لگتا ہے، نبض دیتی، ضعیف اور سریع چلتی ہے اور حرکت قلب بند ہو جانے سے مریض فوت ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

التهاب مستطین القلب قرحی

Ulcerative Endocarditis

1- حرارت غیر منتظم ہوتی ہے۔

2- مرض کی رفتار نسبتاً سریع ہوتی ہے۔

3- قلبی خراہٹ موجود ہوتی ہے۔

4- وجع المفاصل کی سرگذشت ملتی ہے۔

حمی معویہ

Typhoid Fever

1- ہر ہفتہ حرارت جسمانی میں فرق محسوس

ہوتا ہے۔

2- مرض کی رفتار بطنی ہوتی ہے

3- قلبی خراہٹ غیر موجود ہوتی ہے۔

4- وجع المفاصل کی سرگذشت غیر موجود

ہوتی ہے۔

- | | |
|---|---|
| <p>5- اسہال: تسمیر کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔</p> <p>6- جسم پر نمکی نوعیت کے طشحات نکلتے ہیں۔</p> <p>7- عام طور سے مدہ کی علامات بھی موجود ہوتی ہیں۔</p> <p>8- اس طرح کے جراثیم غیر موجود ہوتے ہیں۔</p> | <p>5- مخصوص نوعیت سے اسہال آتے ہیں تسمیر کی بھی علامت ہوتی ہے۔</p> <p>6- جسم پر سفید، خشکاش کی مانند گلابی رنگ کے دانے نکلتے ہیں۔</p> <p>7- مدہ وغیرہ کی علامات عام طور سے نہیں پائی جاتیں۔</p> <p>8- خوردہ مٹی، مٹا، پانی وغیرہ کے مخصوص جراثیم پائے جاتے ہیں۔</p> |
|---|---|

تفریقی علامات

- | حمی تیفوسہ
Typhus Fever | حمی تیفوئید / معویہ
Typhoid Fever |
|--|---|
| 1- مرض دہائی ہوتا ہے۔ | 1- مرض عام طور سے مقامی ہوتا ہے۔ |
| 2- حملہ بیکار ہوتا ہے۔ | 2- مرض کا حملہ بدترجیح ہوتا ہے۔ |
| 3- بخار شدید قشعریرہ کے ساتھ آتا ہے۔ | 3- بخار خفیف لرزہ و قشعریرہ کے ساتھ آتا ہے۔ |
| 4- حرارت ابتدا مرض سے بچران تک زیادہ ہوتی ہے۔ | 4- ہر ہفتہ کی حرارت مخصوص انداز سے ہوتی ہے۔ |
| 5- ابتدا میں شانوں پر سیاہ رنگ کے تاجموار دانے نکلتے ہیں اور رفتہ رفتہ دانے تمام جسم پر نکل آتے ہیں۔ | 5- ابتدا میں شکم پر عددی / خشکاشی / گلابی / سفید رنگ کے دانے نکلتے ہیں۔ |
| 6- دہانے سے دھبے غائب نہیں ہوتے۔ | 6- دھبے / دانے دہانے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ |
| 7- دانے / دھبے 5 دن تک نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ | 7- دانے / دھبے بخارا ترنے تک 7-20 دن نکلتے رہتے ہیں۔ |

- | | |
|---|--|
| <p>8- قبض کی شکایت ہوتی ہے۔</p> <p>9- بطنی علامات مفقود ہوتی ہیں۔</p> <p>10- جریان خون شاذ و نادر طور پر ہوتا ہے۔</p> <p>11- طحال بہت زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔</p> <p>12- تھمناہٹ نہیں ہوتی۔</p> <p>13- پہلے ہفتے کے آخر میں عصبی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔</p> <p>14- بحران کم و بیش 14 ویں دن ہوتا ہے۔</p> <p>15- مرض کی مدت عام طور سے 2 ہفتے ہوتی ہے۔</p> | <p>8- اسہال کی شکایت ہوتی ہے۔</p> <p>9- دائیں حفرۂ حرقیہ (Right Ilac Fossa) میں گرگڑاہٹ اور ذکاوت ہوتی ہے۔</p> <p>10- نکسیر اور معوی جریان خون کی عام طور سے شکایت ہوتی ہے</p> <p>11- طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔</p> <p>12- چہرہ تھمایا ہوتا ہے۔</p> <p>13- دوسرے ہفتے میں عصبی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔</p> <p>14- ایام بحران نہیں ہوتے۔</p> <p>15- مرض کی مدت عام طور سے 5-6 ہفتے ہوتی ہے۔</p> |
|---|--|

تفریقی علامات

- | | |
|--|---|
| <p>دقی شدید
Acute Tuberculosis</p> <p>1- موروثی / ثانوی ہوتا ہے۔</p> <p>2- جسمانی درجہ حرارت پہلے ہفتے میں 106-107 ف تک ہوتا ہے۔</p> <p>3- شدید عسر تنفس ہوتا ہے۔</p> <p>4- تصلب ریہ، خزرخہ مخاطی ہوتا ہے۔</p> | <p>حمی معویہ
Typhoid Fever</p> <p>1- مرض مقامی نوعیت کا ہوتا ہے۔</p> <p>2- جسمانی درجہ حرارت دوسرے ہفتے کے آخر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔</p> <p>3- عسر تنفس کی عام طور سے شکایت نہیں ہوتی۔</p> <p>4- التهاب شعب ہوتا ہے۔</p> |
|--|---|

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 5- چہرہ نیلگوں ہوتا ہے۔ | 5- چہرہ تکتایا ہوا ہوتا ہے۔ |
| 6- طحال بڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ | 6- طحال بڑھی ہوئی ہے۔ |
| 7- دھبے/ دانے نہیں رونما ہوتے۔ | 7- جسم پر مخصوص نوعیت کے دانے/ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ |
| 8- تھوک میں عصا درنی موجود ہوتے ہیں۔ | 8- تھوک میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا۔ |
| 9- طبقہ مشیمہ میں تدرنی زخم ہوتے ہیں۔ | 9- طبقہ مشیمہ (Choroid) طبعی حالت میں ہوتا ہے۔ |

تفریقی علامات

- | | |
|--|--|
| <p>حُمی خنزیری
Trichionosis</p> <p>1- حرارت میں ہفتہ وار، تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔</p> <p>2- دانے/ دھبے نمودار نہیں ہوتے۔</p> <p>3- عضلات میں شدید درد ہوتا ہے۔ اور ذکات حس بھی ہوتی ہے۔</p> <p>4- مخصوص نوعیت کے دیدان/ جراثیمے پاسے جاتے ہیں۔</p> <p>5- پلکوں میں اوزیمیائی کیفیت پائی جاتی ہے۔</p> | <p>حُمی معویہ
Typhoid Fever</p> <p>1- ہر ہفتہ جسمانی درجہ حرارت میں مخصوص تبدیلی رونما ہوتی ہے۔</p> <p>2- جسم پر مخصوص نوعیت کے دانے/ دھبے نمودار ہوتے ہیں۔</p> <p>3- عضلات میں شدید درد نہیں ہوتا۔ نہ ہی ان میں ذکات حس ہوتی ہے۔</p> <p>4- عضلاتی امتحان میں کسی طرح کے جراثیمے نہیں ہوتے۔</p> <p>5- پلکوں پر سوجن نہیں ہوتی۔</p> |
|--|--|

تفریقی علامات

التهاب امعاء شدید Accute Interitis	حمی معویہ Typhoid Fever
1- معدی اور معوی علامات بخار سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔	1- جسمانی درجہ حرارت کی زیادتی کے کچھ عرصہ بعد معدی اور معوی علامات رونما ہوتی ہے۔
2- حرارت کی رفتار کسی مخصوص نوعیت کی نہیں ہوتی ہے۔	2- حرارت کی رفتار مخصوص نوعیت کی ہوتی ہے۔
3- نکسیر کی شکایت نہیں ہوتی۔	3- عام طور سے نکسیر کی شکایت ہوتی ہے۔
4- دانے/ دھبے نہیں نکلتے۔	4- جسم کے مختلف حصوں میں مخصوص نوعیت کے دانے نکل آتے ہیں۔
5- قسم سری (Umbilical Region) میں شدید درد ہوتا ہے۔	5- دائیں ہفرہ حرقیہ میں شدید درد ہوتا ہے۔
6- گڑ گڑاہٹ نہیں ہوتی۔	6- دائیں ہفرہ حرقیہ میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے۔
7- ہفتہ عشرہ 7-10 میں شفا حاصل ہوتی ہے۔	7- 4 ہفتہ سے زائد میں شفا حاصل ہوتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — مرض کے ہر مرحلے میں جسمانی قوت کے تحفظ اور کسی قدر تسکین حرارت کی تدابیر کرتے ہیں۔
- 0 — امعاء (آنتیں) کے جھدنے اور جریان خون سے محفوظ رکھنے کی تدابیر کریں۔
- 0 — تیمارداری پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — قوی مسہلات سے احتیاط لازمی ہے۔

0 — قوت مدبرہ بدن کو، اپنی کارکردگی کی انجام دہی کا پورا پورا موقع فراہم

کریں۔

0 — جسمانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے فصد کھولیں۔

0 — حسب ضرورت تعلیق اور سینکلیاں بھی عمل میں لائیں۔

0 — عوارض کی روک تھام / ازالہ کی تدابیر کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

مویز منقہ 9 عدد، عتاب 5 عدد، انجیر زرد 3 عدد، خاکسی 5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید (مصری) 25 گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔ موسم کی رعایت سے اس کو سردا گھٹا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ مریض کے قوی مضحل ہو رہے ہوں تو اس نسخہ کے ساتھ خیرہ مروارید 3-5 گرام بھی دے سکتے ہیں۔ قبض ہو تو نبات سفید کی بجائے خیرہ بنفشہ 50 گرام شامل کریں، مزید ملین بنانا ہو تو روغن بید انجیر 25 ملی لیٹر، نوش کرا سکتے ہیں۔

ابتدا میں رفع قبض کے لیے یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

ترنجبین 12 گرام، مغز ترمہ ہندی 9 گرام، گلقد 25 گرام — حسب دستور استعمال کرائیں۔

دواؤں، گل گاؤ زبان ہر ایک 3 گرام، تخم عطی، خاکسی ہر ایک 5 گرام، مویز منقہ 9 عدد، عتاب 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد — تمام دواؤں کو 120 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ کھانسی کی صورت میں اسی نسخہ میں اصل السوس مقشر 5 گرام کا اضافہ سودمند ہے۔

شدید کھانسی کی صورت میں لعوق سپتاں 12 گرام، عرق گاؤ زبان 150 ملی لیٹر، نیم گرم میں ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں — لعوق سپتاں کا نسخہ درج ذیل ہے۔

سپتیاں کلاں 50 عدد، عناب 20 عدد، پوست خشکاش 25 گرام، اصل السوس
مقشر 12 گرام، تخم خطمی سفید، تخم خیارین ہر ایک 4 گرام، بہدانہ 3 گرام — تمام دواؤں
کو 2 لیٹر پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر شکر سفید تمام دواؤں کی تین گنا ملا کر قوام تیار
کریں اور قوام کی تیاری کے آخری مرحلے میں جو مقشر، مغز بادام شیریں، تخم خشکاش سفید، ہر
ایک 12 گرام، کثیرا، صمغ عربی، رب السوس ہر ایک 3 گرام کا سفوف بنا کر ملائیں۔

شدید جراثیم کی صورت میں بھی عام طور سے اول الذکر دونوں نسخے ہی استعمال
کرائے جاتے ہیں۔ تاہم حسب ضرورت یہ نسخے بھی بروئے کار لاسکتے ہیں۔

قرص طباشیر کا فوری لولوی 3 گرام رب انار 12 گرام میں ملا کھلائیں۔ اس کے
بعد شیرہ تخم کاہر شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، شیرہ مغز تخم خیارین ہر ایک 3 گرام، شیرہ آلو
بخارا 5 عدد، عرق بید شک، عرق گلاب ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی
لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔ اس دوران خارجی تدابیر بھی بروئے کار لاتے رہیں، جن کا
تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

قرص طباشیر کا فوری کا نسخہ درج ذیل ہے:

طباشیر، مروارید ناسفتہ، سرطان سوختہ، تخم خشکاش سفید، تخم کاہر، تخم خرفہ مقشر، کثیرا ہر
ایک 12 گرام، کبریا شمشی، رب السوس، نچہ گل ہر ایک 8 گرام، مغز تخم خیارین 20 گرام،
صمغ عربی 4 گرام، کا فور قیصری 3 گرام، زعفران، آبریشم ہر ایک 750 ملی گرام — حسب
دستور دواؤں کو کوٹ چھان کر آب بارنگ میں میں گوندھ کر قرص بنائیں اور استعمال کرائیں۔
ابتدائی 3-4 دن میں (اگر قوی اجازت دیں تو) باسلیق کی فصد کھولنے کے بعد
یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

مغز تخم خیارین، تخم کاسنی، زرشک، ہر ایک 9 گرام، تخم کاہر 7 گرام، آلو بخارا
7 عدد — تمام دواؤں کا عرق گلاب، عرق کیوڑہ، عرق کاسنی ہر ایک 75 ملی لیٹر میں شیرہ
نکال کر شربت عناب، شربت صندل ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
بعض اوقات بخار کی شدت کی صورت میں قرص طباشیر کا فوری لولوی صبح کو

استعمال کراتے ہیں اور شام کو درج ذیل نسخہ تجویز کرتے ہیں۔

زہر مہرہ خطائی 1 گرام، عرق گلاب میں گھس کر طباشیر 1 گرام ہر ایک پیس کر شربت سیب 25 ملی لیٹر ملا کر چنائیں۔ اس کے بعد مغز حتم خیارین، مغز حتم کدوئے شیریں ہر ایک 9 گرام، بہدانہ 3 گرام، اسپغول 3.5 گرام کا عرق گلاب، عرق گاؤ زبان، عرق ہید منک ہر ایک 65 ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت سیب، شربت ہی 35 ملی لیٹر ملا کر حتم فرج منک 7 گرام شامل کر کے نوش کرائیں۔

اسہال کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

زہر مہرہ 1 گرام، مرداریدہ 75 ملی لیٹر، کبر باشمی 80 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو ہر ایک کر کے سفوف تیار کریں اور خمیرہ مرداریدہ 3 گرام ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ حب الّاس، شیرہ بخ انجبار ہر ایک 3 گرام، پانی میں نکال کر شربت حب الّاس 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

طباشیر سفید، حب الّاس، گلتار فاری، کتیرا، صمغ عربی، حتم خرفہ، سماق منقی، پوست بیروں پستہ، گل ارمنی، پوست بخ انجبار، صندل سفید بگلاب سودہ، کبر باشمی ہر ایک 6 گرام، طراشیٹ شیریں 6.5 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں، اور 3 گرام ہمراہ شربت انجبار/ شربت بہد 25 ملی لیٹر، صبح و شام استعمال کریں۔ بعض اطباء یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں:

گل قبری، گلتا۔ فاری، حتم خرفہ بردیان، حتم حاض ہر ایک 12 گرام، گل سرخ، طراشیٹ، نشاستہ، دم الاخوان، حب الّاس، شادوہ مغسول، ہر ایک 6 گرام، کندر 3 گرام، ایفون 50 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو ہر ایک کر کے سفوف تیار کریں اور 1 گرام ہمراہ رب ہی 25 گرام، صبح شام استعمال کرائیں۔

آنتوں میں سیان خون کی صورت میں یہ مفید ہے:

کبر باشمی، دم الجوین، صمغ عربی ہر ایک 1 گرام کا سفوف استعمال کرائیں۔

اور لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ باریک، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک 6 گرام، شیرہ حب الّاس، شیرہ ریشہ انجبار ہر ایک 5 گرام، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ 25 گرام ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں اور دوسری خارجی تدابیر بھی بروئے کار لائیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

0 — عوارض کی روک تھام / ازالہ کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:

شدید پیاس کی صورت میں یہ نسخہ دیں:

تھوڑی تھوڑی مقدار میں، بکثرت سرد پانی نوش کرائیں۔

آب بہدانہ، آب کدوئے مشوی میں تخمیناً ملا کر نوش کرائیں۔

آب برگ کاسنی ہمراہ سکنجبین نوش کرائیں۔

آب انار / آب لیموں ہمراہ شربت صندل / شربت سیب نوش کرائیں۔

عرق گاؤ زبان، عرق گلاب، عرق بادیان — وغیرہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

ملاحظہ رہے کہ نزلہ، کھانسی اور ذات الریہ وغیرہ عوارض کی صورت میں عرق لیموں، عرق گلاب اور دوسری ترش چیزیں استعمال کرانا نقصان دہ ہے۔

منہ اور زبان کی خشکی کی صورت میں آلو بخارا منہ میں رکھنے کی ہدایت کریں۔

بہدانہ کو پوٹلی میں باندھ کر پانی میں بھگو دیں اس کے بعد پوٹلی کو منہ میں پھرائیں

اور لعاب چوسنے کی تاکید کریں۔

بے خوابی کی صورت میں شربت خشتاش 35 ملی لیٹر، گرم پانی میں ملا کر نوش

کرائیں۔

امعاء میں ورم کی صورت میں یہ نسخہ سودمند ہے:

مغز فلوس خیار خنبر 6 گرام، تربجبین 20 گرام، عناب 10 عدد، آلو سیاہ 11

مدد۔ تمام دواؤں کو 1 لیٹر پانی میں جوش دیں جب 300 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر

وش کرائیں — شام کو آتش جو ہمراہ آب انار شیریں نوش کرائیں۔

ضعف قلب / غفلت کی صورت میں یہ نسخے مفید ہیں:

دواء المسک بارد عنبری 3 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان 60 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

خمیرہ مروارید 3 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان 60 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

اگر ہاتھ سرد ہو جائیں تو دوا، المسک حار/ تریاق فاروق ایک گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں۔ اس مقصد کے تحت معجون مژوہ و بطوس ایک گرام ہمراہ شراب انگوری استعمال کرا سکتے ہیں۔ جواہر مہرہ 125 ملی گرام ہمراہ شہد استعمال کرنا بھی سودمند ہے۔ جواہر مہرہ 125 ملی گرام مفرح اعظم 3 گرام کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اس کے بعد عرق گلاب، عرق بید مشک ہر ایک 60 ملی لیٹر شربت سیب سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

0 — خاری طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کرائیں:

اگر جسمانی درجہ حرارت 104-105 ف تک پہنچ گیا ہو تو سرکہ، عرق گلاب ہموزن کو برف سے سرد کر کے کپڑے کی گدی بنا کر بھگوئیں اور پیشانی نیز سر پر رکھیں۔ خالص برف کو تھیلی میں بھر کر رکھیں۔ تازہ برگ بید/ برگ کدو بستر پر بچھائیں اور 3-4 گھنٹے پر بدلتے رہیں، منہ کی خشکی کی صورت میں سرکہ، عرق گلاب پانی میں ملا کر کلیاں کرائیں، منہ میں آلو بخارا رکھنے کی ہدایت کریں۔

درد کی صورت میں یہ نئے کام میں لائیں:

صندل سفید، کاہو، کشیز، گل ارمنی ہر ایک 3 گرام، عرق گلاب میں پیس کر پیشانی اور سر پر طلا کریں۔

صندل سفید عرق گلاب میں گھس کر پیشانی پر لپ کریں، بے خوابی کی صورت میں روغن کاہو، روغن خشکاش، روغن کدو ہر ایک 12 ملی لیٹر باہم ملا کر سر پر مالش کریں۔ امعاء میں درد ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

گل ارمنی، صندل، فوفل، مازو، ہموزن — تمام دواؤں کو آب بارنگ اور عرق گلاب میں گھس کر مقام درد پر ضاد کریں۔

مقام درم پر یہ ضاد لگائیں:

صندل، فوفل، گل ارمنی ہموزن کو آب کاسنی، آب مکو، کشیز میں گھس کر ضاد کریں۔ بعد میں صبر، زعفران کا آب کشیز کے ساتھ لپ کریں۔

موسم سفید، روغن گل، آب کاسنی، آب کشیزبز، آب برگ خرف، سرکہ (تھوڑی مقدار میں) تمام دواؤں کو خوب ملا کر یکذات کریں کتان کے کپڑے پر لگا کر مقام درم پر رکھیں۔
 قلب میں حرارت محسوس ہو رہی ہو تو صندل، کافور کو عرق گلاب میں گھس کر اس میں باریک کپڑا تر کر کے سینہ پر رکھیں۔ اس کے برخلاف اگر برد اطراف ہو تو جسم کو خارجی حرارت پہنچائیں نیز خاکسی وغیرہ دواؤں والے نسخے بند کر دیں۔
 حسب ضرورت باسلیق / اکمل کی فصد کھولیں تاہم احتیاط لازمی ہے۔
 امعاء میں سوراخ ہو جانے کی صورت میں عملیہ کریں۔



غب دائرہ *


TERTIAN INTERMITTENT FEVER

اس مرض میں صفراوی خلط کے عروق کے باہر متعفن ہونے سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض دوسری صفراوی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں بخار کی باری ہوتی ہے۔ موجودہ تحقیقات کی روشنی میں یہ ملیریائی نوعی بخار تصور کیا جاتا ہے۔

اقسام

غب دائرہ

Tertian Intermittent Fever



• غب نابہ، غب مطلق، طریقہ اس وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

اسباب

- (I) صفراوی خلط کا خارج از عروق متعفن ہونا/ صفراء اور بلغم غلیظ کامل کر یک ذات ہو کر متعفن ہونا جدید تحقیقات کی روشنی میں اس کے اسباب درج ذیل ہیں:
- (II) پلازڈیم وائی ویکس (Plasmodium Vivax) تائی فلی۔
- (III) ٹرنین پیراسائٹ (Tertian Parasite)۔

علامات

ابتدا میں قشعریرہ اور سوئی کی سی جھین محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد سردی لگتی ہے اور شدید لرزہ شروع ہو جاتا ہے، جو دوسرے لرزوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم سردی بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتی، تھوڑے وقفہ کے بعد رنج ہو کر جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اس کی حرارت نسبتاً بے خطر ہوتی ہے اور جسم پر دیر تک ہاتھ رکھنے سے حرارت بڑھتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات گھٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لرزہ بھی آخری فوٹوں کی نسبت کم ہوتا ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے تاہم سر میں گرانی نہیں ہوتی، صفراوی علامات مثلاً پیاس کا غلبہ پڑ چڑا پن ہوتا ہے، صفراوی تے اور اسہال کی شکایت ہوتی ہے، باری عام طور سے مختصر ہوتی ہے اور پسینہ کے ساتھ بخار اتر جاتا ہے۔

(I) غب دائرہ خالصہ

یہ خالص صفراوی خلط کے خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہے، یہ لطیف اور خفیف نوعیت کا بخار ہے، جس کی باری 12-4 گھنٹے اور عام طور سے 7 گھنٹے تک رہتی ہے، ابتدا میں سردی کی وجہ سے ہاتھ، پیر سرد ہو جاتے ہیں اور جب حرارت تمام جسم میں پھیل جاتی ہے تو جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عام طور سے باریوں کے بعد مرض رنج ہو جاتا ہے، باریاں وغیرہ ایک خاص نظام کے تحت ہوتی ہیں، ابتداء دورہ میں لرزہ کے ساتھ جسم میں سوئی کی سی جھین کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت سے مریض بے چین ہوتا

ہے اور جب پانی پیتا ہے تو کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ گویا پسینہ خارج ہوا چاہتا ہے لیکن خارج نہیں ہوتا۔ ابتدا میں نبض میں پستی، صفر اور اختاف ہوتا ہے لیکن جب بخار جسم میں پھیل جاتا ہے تو نبض سریع اور زمانہ انتہا میں مختلف چلتی ہے اور کچھ دیر بعد قوی، سریع اور متواتر ہو جاتی ہے، پیشاب ناری، گندہ اور تیز بو والا ہوتا ہے اور اس میں نفع کے آثار، پہلے، تیسرے، چوتھے یا ساتویں دن رونما ہوتے ہیں۔

(II) غلبہ دائرہ غیر خالصہ

یہ بلغم آمیز ایسے صفراء سے پیدا ہوتا ہے جو مل کر یکذات ہو گئے ہوں (اس وجہ سے یہ شطر الغلبہ سے علاحدہ قسم تصور کی جاتی ہے، کیوں کہ شطر الغلبہ میں بلغمی اور صفراوی خلط کا باہم استخراج نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے خواص مختلف اوقات میں علاحدہ علاحدہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سر میں گرانی اور تناؤ ہوتا ہے، باری طویل اور عام طور سے 24-30 گھنٹے پر محیط ہوتی ہیں اور 48 گھنٹے کا باقی عرصہ فترت (سکون) کا ہوتا ہے، جسمانی حرارت، خالصہ کی نسبت کم ہوتی ہے، باری کی مدت کی زیادتی بلغمی خلط کے غلبہ کی غماز ہے، بعض اوقات یہ بخار سخت لرزہ کے بغیر شروع ہو کر پسینہ خارج ہوئے بغیر ہی اتر جاتا ہے، حرارت کے بڑھنے اور گھٹنے کا عمل کسی نظام کے تابع نہیں ہوتا، اس میں نفع کے آثار بھی دیر میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مرض کی مدت دراز ہو کر 6 ماہ تک پہنچ جاتی ہے، طحال بڑھ جاتی ہے اور جسم میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — حمی کی باری کے وقت مبردات اور مسکنات استعمال کرائیں۔
- 0 — منضجات و مسہلات صفراء استعمال کریں۔ اس میں بلغمی خلط میں معاون دوائیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔
- 0 — قاطع صفراء دوائیں استعمال کرائیں / مقیات استعمال کرائیں۔

0 — عوارض کے ازالہ/تخفیف کی تدابیر کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

شیرہ مغز، تخم کدوے شیریں 7 گرام، شیرہ تخم کاہو مقشر 3 گرام — عرق عنب الثعلب، عرق نیلوفر ہر ایک 50 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ بخار کے دوران یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے — یہ نسخہ بھی مفید ہیں: لعاب اسینفول، شیرہ مغز تخم کدوے شیریں، عنب الثعلب، عرق کاسنی، عرق شاترہ، ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر اوپر سے خاکسی 5 گرام چھڑک کر پلائیں۔

عنب الثعلب، گل نیلوفر ہر ایک 7 گرام، گل بنفشہ، شاترہ ہر ایک 6 گرام، تخم خیارین کوفتہ 9 گرام، خطمی، خبازی ہر ایک 5 گرام، اصل السوس مقشر 4 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر پلائیں۔

سکینجین لیونی 35 ملی لیٹر، عرق عنب الثعلب 85 ملی لیٹر، عرق گلاب 50 ملی لیٹر میں ملا کر خاکسی 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

بخ کاسنی، تخم کاسنی، تخم خرزہ، تخم خیارین، خار خشک ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو نیمکوب کر کے ایک لیٹر گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 500 گرام حل کر کے شربت بنائیں نیز 35 ملی لیٹر ہمراہ آب تازہ پلائیں۔ منفع صغراء کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

گل نیلوفر، گل بنفشہ، گل سرخ، تخم کاسنی نیمکوفتہ، ہر ایک 7 گرام، آلو بخارا 5 عدد، تمر ہندی 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اس کا زلال حاصل کر کے شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

منہج کے طور پر یہ نسخہ بھی کارآمد ہے۔

گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل حطی سفید، تخم خیارین ہیکوفتہ، ہر ایک 7 گرام، آلو بخارا 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر پلائیں۔ 6 دن تک یہی نسخہ استعمال کریں، اس درمیان نفخ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو ساتویں دن اس نسخہ میں درج ذیل مسہل دوائیں ملا کر استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل

مذکورہ بالا نسخہ منہج میں شیر خشک، ترنجبین، شکر سرخ ہر ایک 4 گرام، سناہ کی 7 گرام ملائیں اور نوش کرائیں۔ دوسرے دن تمہید کی غرض سے یہ دوائیں بروئے کار لائیں: خمیرہ گاؤ زبان 12 گرام کھلا کر شیرہ آلو بخارا 5 عدد، شیرہ زرخک، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک 5 گرام عرق بادیان، عرق کاسنی ہر ایک 120 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر مل کر کے تخم ریحان 5 گرام چھڑ کر نوش کرائیں۔ یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

زالال تھر ہندی 25 ملی لیٹر میں شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

نوبت کو روکنے کے لیے، نفخ و متعینہ خلط غالب کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں:

ست گلو، طباشیر، ہموزن کو ہر ایک پیس کر 1 گرام کی مقدار میں کھلائیں۔
تخم نیم، گل ببول، برگ ببول، اندر جو، ہر ایک 28 گرام — تمام دواؤں کو 250 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر نیم گرم نوش کرائیں۔

گلوہ سبز، کشنیز، شاہترہ، گل نیلوفر، خس، صندل سفید، صندل سرخ، برگ بانہ ہموزن — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

فلفل سیاہ 30 گرام، مغز تخم کرنجہ 60 گرام — دونوں کو آب برگ تلسی سبز

120 ملی لیٹر میں کوٹ کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور باری آنے سے پہلے کھلائیں۔
 اجوائن خراسانی، شب یمانی، بریان، سہاگہ بریاں، نمک لاہوری ہر ایک
 12 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب برگ دھتورہ سبز میں گوندھ کر چنے کے برابر
 اقراص بنائیں اور باری آنے سے 2 گھنٹے پہلے 1-2 قرص کھلائیں۔

درج ذیل عرق مرکب بھی اس مرض میں مفید ہے:

گل نیلوفر 120 گرام، بنفشہ گل گاؤ زبان ہر ایک 55 گرام، گل سرخ 75 گرام،
 گل سیوتی 50 گرام، تخم کاسنی، تخم کاہو، تخم خرف، تخم شاہترہ، تخم پالک، تخم چھانڈ، گل منڈی ہر
 ایک 60 گرام، شاہترہ، برگ تلخی، ہر ایک 45 گرام، برادہ صندل سفید 35 گرام، برگ
 حنا، برادہ صندل سرخ ہر ایک 25 گرام، کشیز 62 گرام، بادرنجبویہ 33 گرام، عتاب،
 آلو بخارا ہر ایک 100 عدد، تر ہندی 75 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق کاسنی، عرق نیلوفر،
 عرق بید سادہ، عرق عنب، العلب ہر ایک 3 لیٹر، عرق گلاب، عرق کیوڑہ ہر ایک 2 لیٹر میں
 بھگونیں اور 24 گھنٹے بعد 9 لیٹر عرق کشید کریں اور 75 ملی لیٹر ہمراہ شربت بزوری/
 شربت نیلوفر، صبح و شام نوش کرائیں۔

درج ذیل نسخہ قرص طباشیر بھی اطباء کے معمولات مطب میں سے ہے:

طباشیر کبود، تخم کاہو مقشر، مغز تخم بہدانہ، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم خیارین ہر
 ایک 12 گرام، زرشک مصفی 25 گرام، تخم خرف، تخم کاسنی، گل سرخ ہر ایک 6 گرام، کتیرا
 3 گرام، نشاستہ 2 گرام، صمغ عربی 2.5 گرام، کافور قیصوری 1 گرام، زعفران 500 ملی
 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ چھان کر لعاب اسپنول میں قرص بنائیں اور
 3 گرام ہمراہ شربت بزوری 35 ملی لیٹر، صبح و شام نوش کرائیں۔

درج ذیل عرق بھی مفید ہے:

منڈی، اجوائن دیسی، کاسنی، چھانڈ، بادیان، گلو سبز ہر ایک 500 گرام، عتاب،
 افستہین، برنجاسف، ہر ایک 35 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر 6 لیٹر عرق کشید
 کریں اور 75-60 ملی لیٹر صبح و شام نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل ادویہ/تدابیر اختیار کرائیں:

گل نیلوفر، گل ارمنی، صندل سفید ہر ایک 12 گرام، آب کدوئے دراز،
آب قضا، آب برگ کاسنی ہر ایک 35 ملی لیٹر میں بھگو کر ایک چوڑے منہ کی شیشی میں
ڈال کر مریض کو سونگھائیں۔

روغن گل، سرکہ، عرق گلاب باہم ملا کر برف سے سرد کر کے اس میں اسفنج بھگو کر
سر پر رکھیں۔

سکوء خشک، گل خطمی، گل بنفشہ، سیوس گندم، برگ کنار دتی، نمک طعام ہر ایک 60
گرام — تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دے کر نیم گرم پاشویہ کریں۔
صندل سفید کو عرق گلاب میں گھس کر اس میں کپڑا تر کر کے جگر اور قلب کے
مقام پر رکھیں۔



غیب لازمہ *

TERTIAN REMITTENT FEVER

اس مرض میں صفراء کے داخل عروق متعفن ہو جانے کی وجہ سے لازمی نوعیت کا بخار ہوتا ہے۔ نام طور سے یہ صفراوی تعفن، اعضا ریسہ کے پاس نہیں ہوتا۔ جدید تحقیقات اس کو ملیریا کی بخار قرار دیتی ہیں۔ یہ کسی بھی وقت بالکل نہیں اترتا۔ البتہ صبح یا شام کے وقت کسی قدر خفیف ہو جاتا ہے۔ علامات میں شدت ہوتی ہے۔

اسباب

- (I) صفراوی خلط کا عروق میں متعفن ہونا۔
- جدید تحقیقات کی روشنی میں درج ذیل طفیلی اس مرض کا باعث ہوتے ہیں:
- (II) پلازموڈیم ملیریا کی (Plasmodium Malariae)
- (III) پلازموڈیم واکس (Plasmodium Vivax)
- (IV) لیوی رینا ملیریا کی (Laverina Malariae)

* اس کوچی دائرہ بھی کہتے ہیں۔

علامات

ابتدا میں سستی، کسل مندی اور معمولی پست ہمتی ہوتی ہے، اعضا شکنی کی شکایت ہوتی ہے، جو درد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، فم معدہ پر گرانی اور کسی قدر درد محسوس ہوتا ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، مٹلی ہوتی ہے، اس کے کم و بیش 24 گھنٹے بعد جائزے کے بغیر یا خفیف جائزے کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے اور تھوڑی ہی مدت میں 107-109 ف تک پہنچ جاتا ہے، سر میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، کرب و اضطراب بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، مٹلی کے بعد صفراوی قے آتی ہے، چہرہ سرخ، شمتایا ہوا اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، منہ خشک، زبان پیلی ہوتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، پیشاب کم مقدار میں، بدبودار، سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے اور 120-140 فی منٹ ہو جاتی ہے، 10-12 گھنٹے بعد تھوڑا سا پسینہ آکر علامات میں تھوڑی تخفیف ہو جاتی ہے۔ طبی اصطلاح میں اس کو تخفیف کہا جاتا ہے، اس مرحلے میں بھی درجہ حرارت صرف 1-2 ف تک کم ہوتا ہے، یہ حالت صبح کو عام طور سے اور شاذ و نادر شام کو پیش آتی ہے اور 30 منٹ سے 8 گھنٹے پر محیط ہوتی ہے، دوپہر یا سہ پہر کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات صبح کو زیادہ اور رات کے آخری پہر تخفیف ہو جاتی ہے، کبھی کبھی شروع سے ہی درجہ حرارت 24-36 گھنٹے تک یکساں طور پر چڑھا رہتا ہے۔ درجہ حرارت اگر بہت شدید ہو تو تخفیف کا عرصہ دو مرتبہ پیش آتا ہے، عوارض کی شدت سے ضعف اور کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے، جلد کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے اور یرقان کی علامتیں رونما ہونے لگتی ہیں، جگر اور طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، مقام طحال دجگر پر دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے، سیلان خون، رعاف کسی اور کی صورت میں ہوتا ہے 5-14 دن شفا حاصل ہو جاتی ہے لیکن معاملے میں بے پرواہی برتی گئی ہو تو مدت طویل ہو کر 21 دن ہو جاتی ہے۔ صحت یابی کی صورت میں بحران کے ذریعہ بخار بیک اتر جاتا ہے یا پھر حمی نابہ/حی ثقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

حمی معویہ Typhoid Fever	غیب لازمہ Tertian Remittent Fever
1- پہلے ہفتہ میں حرارت بتدریج بڑھتی ہے چنانچہ پہلے دن حرارت زیادہ نہیں ہوتی۔	1- جسمانی درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھتا ہے چنانچہ پہلے دن سے ہی بہت تیز ہوتا ہے۔
2- درجہ حرارت عام طور سے شام کو زیادہ ہوتا ہے۔	2- درجہ حرارت عام طور سے دوپہر کو زیادہ ہو جاتا ہے۔
3- دردمر ابتدا سے ہی زیادہ اور ہمیشہ رہتا ہے۔	3- دردمر ابتدا میں کم ہوتا ہے۔
4- آنکھیں عام طور سے صاف اور چمکیلی ہوتی ہیں۔	4- آنکھیں نمیالی اور معمولی یرقانی ہوتی ہیں۔
5- زبان زیادہ خشک اور دانتوں پر میل ہوتی ہے۔	5- زبان نسبتاً کم خشک اور دانتوں پر میل نہیں ہوتی۔
6- غنودگی نمایاں اور متزاید ہوتی ہے۔	6- غنودگی بہت نمایاں طور پر نہیں ہوتی۔
7- ہڈیاں میں بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے اور بخار زائل ہو جانے کے بعد ہی ہڈیاں ختم ہوتا ہے۔	7- ہڈیاں پہلے دن نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد زائل ہو جاتا ہے اور پھر غیر منظم طور پر نمایاں ہوتا ہے۔
8- آخر میں ذات الریہ عارض ہو جاتا ہے۔	8- ابتدا میں ذات الریہ نزلی ہوتا ہے۔
9- بلادیت اور ضعف میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔	9- کرب و اضطراب ہوتا ہے۔

- | | |
|--|---|
| 10- نفخ کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ | 10- نفخ میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ |
| 11- پانخانہ گوشت کے دھوون کی مانند نہیں ہوتا ہے۔ | 11- پانخانہ گوشت کے دھوون کی مانند ہوتا ہے۔ |
| 12- اجتماع خون کبدی، خفیف یرقان اور عام طور سے صفراوی قے کی شکایت ہوتی ہے۔ | 12- یہ علامات شاذ و نادر طور پر ہوتی ہیں۔ |
| 13- عام طور سے جریان خون کی شکایت ہوتی ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ | 13- جریان خون ہمیشہ ہوتا ہے۔ |
| 14- مرض میعادی نہیں ہوتا۔ | 14- میعادی ہوتا ہے۔ |
| 15- وبائی نہیں ہوتا۔ | 15- وبائی ہوتا ہے۔ |
| 16- عام طور سے طبریائی علاقوں میں ہوتا ہے۔ | 16- شہروں اور قصبوں میں جہاں لمبہ رہتا ہو۔ |
| 17- براز میں بدبو ہوتی ہے۔ | 17- براز میں چوہے کی طرح بو آتی ہے۔ |
| 18- عام طور سے صفراوی دانے نکل آتے ہیں۔ | 18- صفراوی دانے بہت کم ہوتے ہیں۔ |
| 19- کونین کے مرکبات سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ | 19- کونین کے مرکبات سے مرض میں اضافہ نہیں ہوتا۔ |

اصول علاج

- 0 — منفع و مسهل صفراء استعمال کرائیں۔
- 0 — ابتدا میں میردات استعمال کرائیں۔ تاہم بہت سرد دوائیں ہرگز نہ دیں۔
- 0 — مسکنات استعمال کرائیں۔
- 0 — تعریق و ادراک تداہیر کریں۔
- 0 — دافع خمی دوائیں استعمال کرائیں۔

0 — عوارض کے تدارک / ازالہ کی تدابیر کریں۔

علاج

داخلی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

ابتداء میں ذیل کے مبردات استعمال کرائیں:

لعاب بہدانہ 3 گرام، لعاب اسپول 5 گرام، شیرہ تخم کاسنی 6 گرام، عرق
عنب الثعلب، عرق بید سادہ، عرق شاہترہ، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر سکنجبین بڑوری 25
ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

لعاب بہدانہ 3 گرام مغز تخم خیارین 7 گرام، عرق گاؤ زبان، عرق کاسنی، ہر
ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 35 ملی لیٹر حل کر کے اسپول سلم 7 گرام چھڑک
کر نوش کرائیں۔

شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم کاہو متشر ہر ایک 7 گرام،
عرق نیلوفر، عرق بید سادہ ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے
خاکسی 5-7 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

گل بنفشہ، تخم خیارین ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، آلو بخارا،
عنب دلائی، ہر ایک 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح
کے وقت مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 50 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ اگر ساتھ میں کھانسی بھی
آ رہی ہو تو آلو بخارا کی بجائے مویر منقہ 9 عدد، بخ کاسنی/ تخم عظمیٰ 7 گرام کا اضافہ کریں۔

نفع دہنقیہ کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں:

گل بنفشہ، گل نیلوفر، شاہترہ، تخم کاسنی نمکوفتہ، بخ کاسنی، گل سرخ ہر ایک
7 گرام، عنب 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل
چھان کر شربت نیلوفر/ سکنجبین 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

منفع صفراء کے طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہے:

گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر، عنب اشعلب، شاہترہ، تخم عطمی، تخم کاسنی ہر ایک 7 گرام، آلو بخارا، عنب ہر ایک 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر گلقدہ آفتابی/ترنجبین/خیرہ بنفشہ 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ مسبل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

پوست ہلیلہ زرد 12 گرام، شاہترہ، سناء کی ہر ایک 9 گرام، تخم کاسنی 7 گرام، تخم کشوث، (پوٹی میں باندھ کر) 5 گرام، آلو بخارا 15 عدد، سپستاں 20 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شیر خشک 25 ملی لیٹر، مغز فلوں خیار شنبہ، ترنجبین، ہر ایک 50 گرام ملا کر روغن بادام 7 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

تخم کاسنی، تخم بادیان، ہلیلہ زرد ہر ایک 7 گرام، موہن منقہ 9 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مغز ترہندی، ترنجبین، مغز فلوں خیار شنبہ، ہر ایک 50 گرام ملا کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

پوست ہلیلہ زرد 12 گرام کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کے وقت مل چھان کر ترنجبین، خیرہ بنفشہ، گلقدہ، مغز ترہندی ہر ایک 50 گرام، مغز فلوں، خیار شنبہ 75 گرام، شکر سرخ 55 گرام ملا کر مل چھان لیں اور روغن بادام شیریں 7 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

بعض اوقات صرف خفیف ملین سے ہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ نسخے مفید ثابت ہوتے ہیں:

ترہندی 60 گرام گرم پانی میں بھگوئیں، پھر اس کو مل چھان کر شکر سرخ 25 گرام سے شیریں کر کے رکھ لیں اور اسپنول 25 گرام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پلا میں اور 45 منٹ بعد مذکورہ زلال ترہندی نوش کرائیں۔

رب السوس، صندل سفید، کتیرا، صمغ عربی، ہر ایک 7 گرام، تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم کاسنی، گل ارمنی ہر ایک 10.5 گرام، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم خیارین، گرد ساق ہر ایک 17.5 گرام، طباشیر، زرد شک ہر ایک 24.5 گرام، ترنجبین 35 گرام، کافور 3.5

گرام، زعفران 1 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ چھان کر لعاب اسپنول میں قرص بنائیں اور 3 گرام استعمال کرائیں۔

مسبلا ت اور ملینا ت کے بعد عام طور سے یہ نسخہ مستعمل ہے، یہ مسکن حرارت اور دافع سعال بھی ہے۔

طباشیر، صمغ عربی، کثیرہ، صندل سفید ہر ایک 4.5 گرام، نشاستہ، مغز تخم خیارین، مغز بہدانہ، اصل السوس مقشر ہر ایک 9 گرام، مغز تخم کدوئے شیریں، خرفہ مقشر ہر ایک 12 گرام، اجوان خراسانی 2 گرام، کافور 3 گرام، زعفران 1.5 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ چھان کر لعاب بہدانہ میں گوندھ کر قرص بنائیں اور 3 گرام قرص کو پیش کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں۔

دفع بخار (حمی) کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں:

ست گلوہ، طباشیر، دانہ ہیل خورد ہر ایک 6 گرام، نبات سفید 18 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور 4-6 گرام کھلا کر اوپر سے عرق گاؤ زبان 15 ملی لیٹر، شربت نیلوفر 35 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

گلوئے سبز، کشنیز، گل نیلوفر، خس، صندل سفید، صندل سرخ، برگ بانہ ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

بھنگ 4 گرام، کافور ایک گرام دونوں کو باریک پیس کر قفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-4 گولیاں استعمال کرائیں۔ بعض اطبا کافور کی بجائے پوست خشکاش، بھنگ کے ہموزن ملا تے ہیں اس وقت مقدار خوراک 3 گرام ہوتی ہے۔

بعض اوقات حمی کے ساتھ چہرے پر بھر بھراہٹ اور جگر میں خلل ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم کاسی ہر ایک 5 گرام، عرق کو، عرق شاترہ ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بزدوری بارد 35 ملی لیٹر ملا کر خاکی 7 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

حمی کے ساتھ سعال اور اسہال کی بھی شکایت ہو تو یہ نسخہ مفید ہے:
 شیرہ تخم خرفہ بریاں، شیرہ اصل السوس ہر ایک 5 گرام، عرق بارنگ 150 ملی لیٹر میں نکال کر رب بہہ 25 گرام ملا کر تخم بارنگ 5 گرام چمڑک کر نوش کرائیں۔
 حرارت میں تسکین دہریدہ کی دوائیں بیشتر نسخوں میں مذکور ہو چکی ہیں۔ تاہم مزید حرارت ہو تو یہ نسخے استعمال کرا سکتے ہیں۔

تمر ہندی 25 گرام، آلو بخارا 7 عدد — دونوں کو 25 ملی لیٹر پانی میں بھگو کر زلال حاصل کریں اور عرق مکو، عرق بید سادہ، عرق شاہترہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں تخم کاسنی، تخم کدوئے شیریں ہر ایک 6 گرام کا شیرہ نکال کر لعاب بہدانہ 2 گرام، (پانی میں نکالا ہوا) شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

شیرہ مغز کدوئے شیریں، شیرہ مغز تخم تربوز ہر ایک 5 گرام پانی میں نکال کر شربت ملا کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل مذاہیر / ادویہ بروئے کار لائیں:
 مکو، گل عظمی، گل بنفشہ، سیوس گندم، برگ کنار، نمک طعام ہر ایک 60 گرام — تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں جب 3 لیٹر رہ جائے تو اتار کر نیم گرم پاشویہ کریں — بخارات کے دماغ کی طرف صعود کرنے کی صورت میں بطور خاص سودمند ہے۔
 گل نیلوفر، گل ارمنی، صندل ہر ایک 12 گرام کو آب کدو سبز 35 ملی لیٹر، آب خیار شیر 30 ملی لیٹر، آب کشیز 36 ملی لیٹر میں بھگو کر نلخہ بنائیں اور بروئے کار لائیں۔
 شدید صورتوں میں صندل سفید، عرق گلاب میں گھس کر مقام قلب و جگر پر لپ کریں یا اس میں کپڑا بھگو کر رکھیں اور خشک ہونے پر بدل دیں۔ عطر خس، صندل اور گلاب سوگھانا بھی مفید ہے۔



شطر الغب

SEMITERTIAN FEVER

اس مرض میں صفراوی اور بلغمی خلط کے متعفن ہو جانے کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں ہی اخلاط کی علامات ایک ساتھ یا علاحدہ علاحدہ نمایاں ہوتی ہیں اور اس اعتبار سے باری متعین ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات اس کو لیبریائی بخار قرار دیتی ہیں۔

اسباب

(۱) صفراوی اور بلغمی خلط کا جدا جدا متعفن ہونا — ملحوظ رہے کہ اس میں صفراء اور بلغم کی آمیزش اس طرح کی نہیں ہوتی کہ دونوں یکذات ہو جائیں بلکہ ان کے طبعی خواص اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں اور مرضی علامات اسی طریقے سے رونما ہوتی ہیں۔ جدید تحقیقات اس کو لیبریائی بخار تصور کرتی ہیں اور درج ذیل طفلیوں کو مرض کا سبب قرار دیتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی دو تین انواع کے طفلی خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا شاذ طور پر ہوتا ہے۔

(I) پلازموڈیم وائی ویکس (Plasmodium Vivax)

(II) پلازموڈیم اووے لی (Plasmodium Ovale)

(III) پلازموڈیم ملیریائی (Plasmodium Malariae)

(IV) پلازموڈیم فلیسپیریم (Plasmodium Falciparum)

دورہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ طفیلی (Parasite) کی ایک نسل جب خون میں تلف ہونے کے قریب ہوتی ہے کہ دوسری نسل کے طفیلی اس وقت بالکل جوان ہو کر دورہ کا باعث بنتے ہیں اور ان کے طبعی ہی خواص کی کمی و بیشی سے علامات میں شدت اور تخفیف ہوتی ہے، طبی اصطلاح میں اس کیفیت کو تسیم مرکب (Mixed Infection) کہا جاتا ہے۔

علامات

بخار باری کے ساتھ آتا ہے، جس میں ایک دن شدت ہوتی ہے تو دوسرے دن کسی قدر تخفیف، تیسرا دن پھر شدت کا ہوتا ہے اور چوتھا تخفیف کا، یعنی جس دن صفراوی خلط متعفن ہوتی ہے تو عوارض شدید ہوتے ہیں اور مدت قلیل ہوتی ہے۔ جب اس میں فترت ہوتی ہے اس وقت تک بلغمی خلط متعفن ہو جاتی ہے اور اس کی باری آتی ہے، تو عوارض میں کسی قدر کمی اور مدت طویل ہوتی ہے، بعض اوقات ابتدا نہایت شدید طور پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفراوی اور بلغمی دونوں اخلاط بیک وقت متعفن ہو جاتی ہیں چنانچہ پہلے دن نہایت شدید عوارض رونما ہوتے ہیں لیکن پھر صفراوی خلط سے پیدا شدہ عوارض کی مدت کے کم اور بلغمی کی مدت کے طویل ہونے سے ان کی باریاں علاحدہ علاحدہ دنوں میں آنے لگتی ہیں۔ بلغمی خلط کے غلبہ کی صورت میں بخار دیر تک اور جازا کم لگتا ہے، لرزہ بھی خفیف ہوتا ہے، نبض ضعیف چلتی ہے اور ہاتھ پیر سرد ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جسم میں حرارت اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ پیاس کم لگتی ہے، صفراوی تے بھی کم آتی ہے، پیشاب بہت اور خام (غیر نفع یافتہ) ہوتا ہے۔ اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، غلبہ بلغم کی دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ صفراوی خلط کے غلبہ کی صورت میں نوتوں کا عرصہ کم ہوتا ہے، اطراف جلد

گرم ہو جاتے ہیں، پھریری مائل یہ لرزہ ہوتی ہے، تشنگی محسوس ہوتی ہے، بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، پیشاب سرخ، کسی قدر زردی مائل ہوتا ہے۔ صفراوی اور بلغمی خلط کے مساوی ہونے کی صورت میں بغیر لرزہ کے پھریری کا احساس ہوتا ہے اور یہ پھریری لرزہ کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات شطر الغب لازمی اور نوبتی بخاروں سے مرکب ہوتا ہے۔ اس کی درج ذیل چار صورتیں ہیں:

(I) صفراوی اور بلغمی بخار، دونوں دائمی ہوں۔

(II) صفراوی اور بلغمی بخار، دونوں نوبتی ہوں۔

(III) صفراوی بخار نوبتی ہو اور بلغمی دائمی۔

(IV) صفراوی بخار لازمی ہو اور بلغمی بخار نوبتی۔

ان صورتوں میں علامات مختلف ہوتی ہیں — چنانچہ دونوں لازمی بخاروں کے مرکب ہونے کی صورت میں لرزہ بالکل نہیں ہوتا، اور جسمانی حرارت بھی اخلاط کے تابع ہوتی ہے۔ دونوں بخاروں کے نوبتی ہونے کی صورت میں لرزہ دوبارہ آتا ہے، کیوں کہ ایک خلط کا مادہ جلد اور دوسری خلط کا دیر میں متحرک ہوتا ہے، اسی طرح ایک دن لرزہ خفیف اور پھریری کے ساتھ آتا ہے اور اطراف سرد ہوتے ہیں، دوسرے دن لرزہ شدید اور کچکی کے ساتھ آتا ہے، حدت اور سوزش بھی ہوتی ہے۔ صفراوی بخار کے نوبتی اور بلغمی کے لازمی ہونے کی صورت میں لرزہ ضعیف ہوتا ہے، اطراف کے سرد ہونے کے باوجود احشاء میں حرارت نسبتاً زیادہ محسوس ہوتی ہے، نبض نہایت ضعیف اور متواتر چلتی ہے۔ صفراوی بخار کے لازمی اور بلغمی بخار کے نوبتی ہونے کی صورت میں لرزہ نہیں ہوتا، پھریری بھی زیادہ نہیں ہوتی، اضطراب شدید ہوتا ہے، نبض عظیم اور سریع چلتی ہے۔

اصول علاج

0 — استفراغ اور حقیقہ کے لیے ملینیات، مسہلات مقیات، معرقات اور مدرات استعمال کرائیں۔

0 — ضرورت محسوس کریں تو منضجیات خلط غالب استعمال کرائیں۔

0 — باری کو آنے سے روکنے کی تدابیر کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:

ابتداء میں خلط غالب کا نفعج کریں، اس مقصد کے تحت یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

بادیان، پرسیاوشاں ہر ایک 7 گرام، بہدانہ 3 گرام، مویر متقی 7 عدد — تمام دواؤں کو 375 ملی لیٹر میں جوش دیں، جب 200 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر شربت گاؤ زبان 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

منضج کے طور پر یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

ختم کاسنی، برنجاسف، بنفشہ ہر ایک 5.5 گرام، بادیان 4 گرام، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو عرق ککو، عرق شاہترہ، ہر ایک 120 ملی لیٹر میں جوش دیں اور مل چھان کر شربت اصل السوس 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

بادیان، ککو، خشک، زوقائے خشک، بنفشہ، گل نیلوفر ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو 500 ملی لیٹر میں جوش دیں، جب 150 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر شربت خشکاش 12 ملی لیٹر/شربت زوقا 25 ملی حل کر کے نوش کرائیں۔

مادہ کی زیادتی کی صورت میں منضج کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بادیان، بیج بادیان، بیج کاسنی ہر ایک 7 گرام، سپستاں 11 عدد، مویر متقی 9 عدد، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام/گلقتد 25 گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔

جب نفعج کی علامات رونما ہونے لگیں تو ان ہی منضجیات میں مسہل کے طور پر، گل سرخ، سناہ کی ہر ایک 12 گرام ملا کر مغز فلوں خیابہ ضمیر 60 گرام مل چھان کر روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

نفع و تحقیق کے بعد یہ نسخے استعمال کرائیں:

گل سر 10 گرام، زعفران، سنبل الطیب ہر ایک 2 گرام، تخم مقشر، رب السوس، ترنجبین ہر ایک 3 گرام، کثیر، صمغ عربی، ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی سے قرص بنائیں اور 5-7 گرام کھلائیں۔

گلوہ سبز مقشر 75 گرام، گل نیلوفر، گل سرخ ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو جوش دیں اور مل چھان کر شکر 500 گرام ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

عنب الثعلب خشک، گل نیلوفر، گل سرخ، تخم کاسنی، تخم کشوث (پوٹلی میں باندھ کر) بادیان نیکوفتہ ہر ایک 5 گرام، باد آورد، شکائی، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر شربت بزوری 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

بخ کاسنی، تخم کاسنی، بادیان، گاؤ زبان، تخم عظمی، اصل السوس مقشر ہر ایک 13.5 گرام، گل بنفشہ، باد آورد، شکائی، سنبل الطیب، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور شکر 500 گرام، ترنجبین 250 گرام ملا کر شربت کا قوام تیار کر کے 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

گلوہ نیم 125 گرام، چرائے شیریں 25 گرام، فلفل سیاہ 5 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر چھان کر مغز کرنبوہ 60 گرام پیس کر اس جو شانہ میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

عصارۂ غافٹ 21 گرام، طباشیر 35 گرام، سنبل الطیب 7 گرام، گل سرخ 18 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 3.5 گرام کھلائیں۔

مصطکی رومی، صحر فاری ہر ایک 1.7 گرام، اصل السوس، بخ کرفس بخ بادیان ہر ایک 7 گرام، غافٹ شکائی ہر ایک 3.5 گرام، گل سرخ، کشیز خشک ہر ایک 14 گرام،

ترنجبین 70 گرام — تمام دواؤں کو 1500 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب 750 ملی لیٹر رہ جائے تو چھان لیں اور 250 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

گل سرخ 18 گرام، صمغ عربی، تخم حمض ہر ایک 14 گرام، نشاستہ 10.5 گرام، طباشیر، تخم خرف، زرشک ہر ایک 7 گرام، سنبل الطیب، ریوند چینی، زعفران، کثیرا، ہر ایک 1 گرام، کافور 50 ملی گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 5-7 گرام استعمال کرائیں۔ شطرنجب کی سوزش اور شدید حرارت میں مجرب ہے۔

سنبل الطیب، انر، زرشک، زعفران ہر ایک 10.5 گرام، ریوند چینی 14 گرام، صمغ عربی، گل سرخ طباشیر، لاکھ کبریا، ہر ایک 17.5 گرام، تخم حمض بریاں 18 گرام، انسٹین رومی 25 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 5-7 گرام کھلائیں۔

پوست بلیہ زرد، ریوند چینی، ایلوا، مصطلی، عصارہ انسٹین، عصارہ عافیت، گل سرخ، ہر ایک 5 گرام، زعفران 2.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب کاسنی میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور 7 گرام سیکچین 25 ملی لیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔ غلبہ بلغم کی صورت میں تو یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

صبر، خاریقون ہر ایک 6 گرام، پوست بلیہ زرد، تربد سفید ہر ایک 3 گرام، مقوینا، گل سرخ، حلتیت، سیکچین ہر ایک 1.5 گرام، مصطلی رومی 750 ملی گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کوٹ چھان کر آب کرفس میں گوندھ کر حبوب بنائیں اور 5 گرام ہمراہ شراب اصول (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔

عوارض کے ازالہ کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں:

جگر اور طحال میں صلابت پیدا ہو جانے کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

قرص کبر 3 گرام کو سیکچین بزوری 25 ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں — اس کے بعد اسارون، انیسون، انسٹین، ہر ایک 3 گرام، تخم فنج مشک، تخم کرفس، تخم کبر، قحاح اذخر ریوند خطائی ہر ایک 5 گرام، پوست تخ کاسنی، پوست تخ بادیان، عنب الثعلب، ہر ایک

7 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلتقد 35 گرام، سکنجبین
عصلی 18 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

اختلاج قلب کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
ضمیرہ گاؤ زبان عنبری 9 گرام، عرق عنبر 85 ملی لیٹر کے ہمراہ دیں۔
انوشد ابدئے لولوی 7 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان عنبری (حسب ضرورت)
استعمال کرائیں۔

باتھ، پیروں میں تھنج / درم آجانے کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
عصارۂ عافیت، مصطلکی روی، فوہ، طباشیر، زعفران، ہر ایک 2 گرام، مغز تخم خربزہ،
مغز تخم خیاریں، رب السوس، تخم کاسنی، زرشک، گل سرخ، تخم کشوت، ہر ایک 3 گرم — تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر تہنجبین خراسانی 65 گرام ملا کر عرق کاسنی 25 ملی لیٹر حل کر کے
اقراص بنائیں اور 4.5 گرام ہمراہ آب مگوہنر مروق، آب کاسنی ہنر مروق، سکنجبین بزدوری ہر
ایک 50 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
باتھ پیروں میں درم کی صورت میں — انیسون، برگ عنب الثعلب کو پیس کر درم پر
ضماد کریں۔

صلابت جگر و طحال کی صورت میں — انجیر خام صحرائی 40 عدد، برگ گز 25
گرام کو نیم گرم پانی میں جوش دیں۔ سہاگہ، گندھک، مقل، اشق ہر ایک 4 گرام اشنہ،
برگ سداب، کنر مازج ہر ایک 6 گرام، گل گز برگ سرد، ہر ایک 2 گرام پیس کر ملائیں اور
مقام درم پر روغن گل لگا کر مذکورہ ضما د لگائیں۔

حمی صدیدیہ

PURULANT FEVER

اس مرض میں خون میں تعفن کے ساتھ ساتھ صدید (پیپ خون آمیز، زرد آب) شامل ہو کر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے اور دوسری جلدی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ تعفن میں تھخ ضروری/ لازمی نہیں ہے لیکن ہر تھخ میں تعفن لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔

اقسام

اسباب کے اعتبار سے

حمی صدیدیہ

Purulent Fever



اسباب

- (I) مائیکرو کاکس پائوجنس (Micro Coccus Pyogenos)۔
- (II) عمل جراحی کے گندے زخم۔
- (III) حلی معوی / زحیر کی وجہ سے قروح الامعاء ہونا۔
- (IV) جسم کی کسی ساخت کا مردار ہو جانا۔
- (V) کسی ورید میں دم ہو جانا / کسی اندرونی عضو میں دم / قلب کی اندرونی عشاء میں خبیث دم۔
- (VI) عظام (ہڈیوں) خاص طور سے صدغین (کینچی) کی ہڈی میں پیپ پڑ جانا۔
- (VII) متعفن نفش کی چیز پھاڑ (پوسٹ مارٹم) سے ہاتھوں میں کسی طرح رگڑ اور خراش پیدا ہو جانا۔
- (VIII) سرخبادہ۔
- (IX) ریہ / طحال / کبد / دماغ وغیرہ میں سدہ پڑ کر متعفن ہو جانا۔
- (X) التهاب کلیہ / ذات الریہ۔
- (XII) کثرت سے نوشی
- (XIII) عام جسمانی کمزوری۔
- (XIV) غیر صحت بخش رہائش۔

علامات

مرض نامعلوم طور پر ترقی کرتا ہے، بار بار جاڑے کے ساتھ شدید بخار چڑھتا ہے۔ اس طرح حرارت ابتدا میں ہی 104-105 ف یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں غیر منظم طور پر کمی و بیشی ہو سکتی ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، نبض اور تنفس میں سرعت ہوتی ہے، تنفس اور پسینے میں مخصوص قسم کی

ہو آتی ہے، جلد کی رنگت پھلکی زردی مائل ہو جاتی ہے، بعض اوقات یرقان بھی ہو جاتا ہے، عام طور سے جسم پر سرخ دھبے / گرمی دانے / پیپ دار دانے نمودار ہوتے ہیں، طبیعت میں ضعف اور جسم میں لاغری ہوتی ہے، مٹلی اور تھکے کی شکایت ہوتی ہے، بعض اوقات بدبودار اسہال آتے ہیں، پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے، اس کے بعد طحال، جگر، امعاء، گردے، مفصل، ریہ اور دماغ وغیرہ میں پیپ دار پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جلد / خانہ دار غشاء / آبدار غشاء میں التهاب ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے، اس کے بعد مرض کی ردی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چہرہ پھیکا اور بچھا ہوا ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتا ہے، زبان خشک اور بھوری ہوتی ہے، مسوڑھوں اور ہونٹوں پر سیاہ چوڑی جم جاتی ہے، قلب اور نبض کی حرکت غیر منظم اور وقفہ کے ساتھ ہوتی ہے، کمزوری غیر معمولی طور پر پیش آتی ہے، پیشاب پاخانہ غیر ارادی طور پر خارج ہوتے ہیں اور 6-12 دن میں بے ہوشی اور تشنج ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

(I) حمی صدیدیہ وریدی جراثیمی

اس صورت میں جراثیم دریدوں کے ذریعہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتے ہیں اور دہاں پھوڑے پیدا کرتے ہیں، اس صورت میں پیچھے دے، گردے، ہڈیاں، امعاء، جگر، مرارہ وغیرہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قلب و دماغ بھی متاثر ہوتا ہے اور اس میں پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(II) حمی صدیدیہ شریانی جراثیمی

یہ صورت التهاب غشاء، مستطین قلب میں کثیر الوقوع ہے اور قلب خاص کر بایاں اذن اس کا مرکز ہوتا ہے، علامت صمامات قلب کے امراض سے شروع ہوتی ہیں۔ طحال، دماغ گردے، بالائی اور زریں اطراف میں پھوڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔

(III) حمی صدیدیہ حادثاتی / خارجی

اس میں خارجی طور پر خربہ و سقطہ روئید املتی ہے، جس سے سبب کی تعیین اور علاج

میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

تفریقی علامات

حمی نوہتی Remittent Fever	حمی صدیدیہ Purulent Fever
1- طیریائی تسم کی سرگذشت۔	1- ضرب (چوٹ لگنے) / متعدی مرض کی روئیداد ہوتی ہے۔
2- بخار کے چڑھاؤ اتار میں ایک طرح کا نظم ہوتا ہے۔	2- جسمانی درجہ حرارت میں غیر منتظم طور پر چڑھاؤ اتار ہوتا ہے۔
3- حرارت زیادہ ہوتی ہے۔	3- حرارت نسبتاً کم ہوتی ہے۔
4- عام طور سے یرقان نہیں ہوتا۔	4- یرقان ہو سکتا ہے۔
5- خراج / دل نہیں ہوتے۔	5- بھیچڑے، جوڑ (مفاصل) اور اعضاء شریفہ میں خراج ہوتا ہے۔
6- طبعی بو ہوتی ہے۔	6- تنفس میں شیریں بو آتی ہے۔
7- تعدیہ کا مرکز نہیں ہوتا۔	7- ضرب / تعدیہ کا مرکز موجود ہوتا ہے۔
8- نقاہت شدید نہیں ہوتی۔	8- شدید نقاہت ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

تعفن الدم Septicaemia	حمی صدیدیہ Purulent Fever
1- ٹھنڈا / خفیف قشعریرہ سے ابتدا ہوتی ہے۔	1- جسمانی درجہ حرارت میں زیادتی کی ابتدا قشعریرہ سے ہوتی ہے۔
2- قشعریرہ اور پسینہ دورہ سے نہیں آتا۔	2- قشعریرہ، بخار اور پسینہ کے دورے پڑتے ہیں۔

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3- برقان خفیف ہوتا ہے۔ | 3- برقان بہت نمایاں ہوتا ہے۔ |
| 4- حرارت غیر منظم 101-105 ف | 4- حرارت غیر منظم 101-105 ف |
| 5- تنفس میں کوئی مخصوص بونہیں ہوتی۔ | 5- تنفس میں شیریں بو آتی ہے۔ |
| 6- اسہال پریشان کن ہوتا ہے۔ | 6- اسہال اگر ہو تو بہت معمولی ہوتا ہے۔ |
| 7- پھوڑے نہیں ہوتے۔ | 7- پیچھے، منہ، اطراف اور اطراف بدن میں پھوڑے ہوتے ہیں۔ |

اصول علاج

- 0 — تحقیق مواد کریں / سافن کی فصد کھولیں۔
- 0 — مصفی خون دوائیں استعمال کرائیں۔
- 0 — قوی کو بحال رکھنے کا اہتمام کریں۔
- 0 — حسب ضرورت مصل / مدل / دم دوائیں استعمال کرائیں۔
- 0 — مریض کی جسمانی راحت و سکون کا بطور خاص نظم کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں۔
- مصفی خون کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- شاہترہ، سر پھوڑ، چائے، مندول سفید، مندول سرخ، منڈی، بلبلہ سیاہ، ہر ایک 35 گرام، تخم نیم، پوست اندرون درخت نیم، پوست مولسری، جوانہ، برادہ شیشم سرخ، افیتون، پوست بلبلہ، پوست بکائن، پوست بچ کچنال ہر ایک 75 گرام — تمام دواؤں کو 15 لیٹر پانی میں 24 گھنٹے تک بھگوئے رکھیں اس کے بعد 6 لیٹر عرق کشید کریں اور 75 ملی لیٹر، صبح شام نوش کرائیں۔

شاہترہ، منڈی، پوست ہلیہ زرد، ہلیہ سیاہ، صندل سرخ، صندل سفید، گل بنفشہ، نیلوفر، عناب آکاش نیل، خبازی، کاسنی، برادہ شیشم، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو آٹھ گنا پانی میں جوش دیں۔ جب $1/3$ حصہ رہ جائے تو مل چھان کر تین گنا شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 25 ملی لیٹر ہمراہ عرق، مصفی خون استعمال کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے:

برگ شاہترہ، سرچوک، پوست ہلیہ زرد، گل سرخ، تخم کشیز نیمکوفتہ ہر ایک 3 گرام، برہم ڈنڈی، نیل کنٹھی، صندل سرخ، دھایا، ہر ایک 3.5 گرام، برگ حنا 2 گرام، گل کچنال، فلفل سیاہ، زیرہ سفید ہر ایک 1 گرام، برگ نیم، برگ بکائن ہر ایک 7 عدد — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر آب برگ حنا، آب تخم کشیز میں رات کو تر کریں اور صبح کو پینے کے برابر گولیاں بنائیں اور دو گولیاں ہمراہ عرق گاؤ زبان، عرق شاہترہ ہر ایک 85 ملی لیٹر، شربت عناب 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
بیشتر اطباء اس مرض میں یہ نسخہ استعمال کراتے ہیں:

قرص صندل 3 گرام، شربت سیب ترس 12 ملی لیٹر میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد مغز تخم خیارین، تخم کاسنی، مغز تخم کدوئے شیریں، زرشک ہر ایک 7 گرام، عناب 7 عدد، تخم کاہو 5 گرام کو عرق شاہترہ، عرق بید مشک، عرق کاسنی ہر ایک 85 ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح کے وقت نوش کرائیں۔ بعض اطباء قرص صندل کی بجائے قرص طباشیر کا فوری استعمال کراتے ہیں۔

شام کے وقت یہ نسخہ مجربات میں سے ہے۔

زہر مہرہ (عرق گلاب میں گھسا ہوا) جدوار خطائی، طباشیر، کنول گندہ ہر ایک 1 گرام، صندل سفید (عرق گلاب میں گھسا ہوا) 12 گرام، کافور 2 گرام، کات سفید 4 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر پینے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گرام کھلانے کے بعد گل گاؤ زبان 3 گرام، تخم کاسنی 5 گرام، عناب 5 عدد کو عرق شاہترہ، عرق بید مشک سادہ، ہر ایک 85 ملی لیٹر میں پیس کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

تحقیق کے لیے (فصد کھولنے کے بعد) یہ نسخہ استعمال کرائیں:

تخم خرپڑہ، شاہترہ، عنب الثعلب ہر ایک 6 گرام، فوہ ہر سیاوشاں ہر ایک 4 گرام، خار شک 6.5 گرام، پوست خیار شہر 50 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلتند 35 گرام حل کر کے نیم گرم نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی کار آمد ہے:

ابیل خار شک، تخم خرپڑہ، گاؤ زبان ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو عرق عنب الثعلب 175 ملی لیٹر میں جوش دیں پھر مل چھان کر گلتند آفتابی 25 گرام، شربت بڑہری حار 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ تحقیق مواد کے بعد خیرہ گاؤ زبان عبری 5 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان، عرق بید مشک ہر ایک 75 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
مکمل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

گل سرخ، بہدانہ، اسپنول، اذخر، مرکبی ہر ایک 12 گرام، تخم عطی 25 گرام، بیج کاسنی 50 گرام، مونیر منق 120 گرام، بیج کرفس 24 گرام، ریشہ عطی، سہاگہ خام ہر ایک 6 گرام، انجیر زرد 140 گرام — تمام دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں بھگونے کے بعد جوش دیں۔ جب 1/2 حصہ رہ جائے تو مل چھان کر محفوظ کر لیں اور آپ کاسنی سبز مردق، آب مکو سبز مردق، آب مولی، آب بھوا ہر ایک 120 ملی لیٹر اس میں ملائیں۔ 4 کیلو گرام شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 50 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
یہ نسخہ از حد مفید ہے:

سیماب مصفی 1 ملی لیٹر، گلتند 3 گرام میں خوب کھرل کریں، جب دونوں یکذات ہو جائیں (خوب اچھی طرح مل جائیں اور سیماب کی چمک دکھائی نہ دے) تو اصل السوس 500 گرام باریک پیس کر ملائیں اور خوب کھرل کر کے 125 ملی گرام تین گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں۔


حب زہر مہرہ، کاسنی 1 گرام کھلائیں — اور عناب 5 عدد، گل گاؤ زبان 3 گرام، تخم کاسنی 5 گرام کو عرق بید سادہ، عرق شاہترہ ہر ایک 85 ملی لیٹر میں پیس کر شربت بنشہ

25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدبیر اختیار کریں:

قوی جسمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے صافن کی فصد کھولیں۔

ورم نفع پا گیا ہو تو اس میں شگاف دے دیں اور تنقیہ مواد کریں، دافع عفون، دواؤں سے زہم کو دھونے کی ہدایت کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

حمی نفاسیہ

PUERPERAL FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص جراثیم کی وجہ سے زچہ کے خون میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔

اسباب

- (I) آلول مشیمہ (Placenta) کا پوری طور پر خارج نہ ہونا۔
- (II) نفاس کا بند ہو جانا۔
- (III) رحم/مہبل میں آنول کے کلاے/خون کے لوتھڑے کا قہس ہو کر متعفن ہو جانا۔
- (IV) جنین کا مردہ ہو کر رحم کے اندر متعفن ہو جانا۔
- (V) وضع حمل کے وقت رحم کی کسی ساخت میں خراش واقع ہونا۔
- (VI) کسی وجہ سے بعض مخصوص جراثیم کی سرایت مثلاً اسٹریپٹوکوکائی۔
- (I) اسٹریپٹوکوکائی فی کیلس (Strepto Cocci Faecalis)۔

(II) اسٹریپٹو کوکائی اری سپلے ٹوکس Strepto Cocci

-Erysipelatosis

(III) نیو کوکائی (Pneumo Cocci)-

(V) اسٹیفلی کوکائی (Staphy to Cocci)-

(VI) بیسی لس کوکائی (B.Colli)-

(VII) گونو کوکس (Gono Coccus)-

مذکورہ بالا جراثیم کسی بھی طرح سے رحم/خون میں سرایت کر جاتے ہیں اور مرض کا باعث ہوتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ صحت کی حالت میں حملہ انواع کے جراثیم سے رحم اور مہبل وغیرہ پاک رہتے ہیں کیونکہ طبعی طور پر مہبل سے لیکلک ایسڈ نام کی ایک رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے جس میں جراثیم کو مارنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وضع حمل کے وقت عام طور سے غیر معمولی حالات پیش آتے ہیں اور آلودہ آلات ولادت/نا تجربہ کار/سرایت زدہ دامیہ/نا پاک/گندے کپڑوں کے استعمال سے یہ جراثیم رحم میں پہنچ جاتے ہیں اور شدید عوارض رونما کرتے ہیں۔

علامات

وضع حمل کے 4-2 دن بعد زچہ کو لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، نفاسی رطوبات کا اخراج بند ہو جاتا ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس میں شدید بدبو ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت یک بیک بڑھ کر 103-105 ف تک پہنچ جاتا ہے، نفخ شکم کی شکایت ہوتی ہے، پستانوں میں دودھ پیدا نہیں ہوتا، بے چینی اور کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد نبض ضعیف چلنے لگتی ہے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں۔ چہرہ پھیکا، بچا ہوا اور فکر مند ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، گہری سانس نہ لے پانے کی وجہ سے رحم، علق الرحم اور مہبل میں، سوزش کی وجہ سے التهاب پیدا ہو جاتا ہے، ان کے مجاور خانہ دار ساختوں میں بھی سوزش ہوتی ہے، اگر مہبل میں خراش آگئی ہو تو اس پر زرد رنگ کا مواد چپکا ہوا دیکھا جاسکتا

ہے، جسم سے بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، اس کے باوجود حرارت جسمانی بدستور رہتی ہے۔ بعض صورتوں میں مریض کا جسم نہایت سرد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ لگانے پر بھی حرارت کا احساس نہیں ہوتا لیکن مقعد/منہ میں حرارت بیا (تھرمامیٹر) لگانے سے بڑھی ہوئی حرارت کا پتہ چلتا ہے، نفخ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ شکم ڈھول کی مانند ہو جاتا ہے اور اس کا کبھی طبق 'ریان' کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہڈیاں ہوتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو کر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

بعض اوقات لرزہ کے ساتھ جسمانی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور کچھ گھنٹے بعد کم ہو جاتا ہے اور یہ دورہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جسم کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور سرخ، سرخ دسے نمودار ہوتے ہیں، بڑے جوڑوں میں التهاب ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے، ریه اور غلاف ریه میں بھی پیپ پڑ سکتی ہے، آنکھ میں زخم پیدا ہو کر آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ عوارض کی صورت میں ذات الجنب، التهاب نصیۃ الرحم، التهاب کبد، التهاب کلیہ اور دوسرے عفونی بخار لاحق ہو سکتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — جسم اور استعمال کی اشیا کی طہارت اور صفائی پر خصوصی توجہ کی ہدایت کریں۔
- 0 — دافع قلعن ادویہ سے مہل کو دھوئیں۔
- 0 — خلط غالب کا متقیہ کریں۔
- 0 — نفاس بند ہو گیا ہو تو اس کو جاری کرنے کی تدبیر کریں۔
- 0 — بخار کو دفع کرنے کی تدبیر کریں۔
- 0 — عام جسمانی تقویت بالخصوص قلب کی تقویت والی دوائیں استعمال کرائیں۔
- 0 — دیگر عوارض کا تدارک/ازالہ کریں۔

علاج

0 — برگ نیم کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر اس سے مہل کی صفائی کریں۔

0 — نفاس کا خون جاری کرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:
گاؤ زبان، خار خشک، تخم خرپڑہ، اہبل ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو عرق مکوہ 175 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد آفتابی 25 گرام، شربت بزوری حار 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے:

گاؤ زبان، تخم عطلی، بادیان، عنب الثعلب، پوست بخ کپاس، اصل السوس، تخم خرپڑہ ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو 300 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر خیرہ بنفشہ 25 گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔

0 — بے ہوشی/پینہ کی زیادتی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
بیش مدبر (دودھ میں) سہاگہ، شنگرف، قرفنفل، قلفل سیاہ، دار قلفل، انیون، عاقر قرحا ہموزن — ابتدا میں قلفل اور بیش مدبر کو شیرہ برگ تنبول یا مصالحہ میں دوپہر کھل کریں۔ اس کے باقی دوسری دواؤں کو ملا کر کھل کریں اور سرسوں کے دانہ کے بقدر گولیاں بنا کر 1-2 گولیاں پانی میں رکھ کر کھلائیں۔

0 — حمی نفاسیہ میں یہ نسخے بھی مفید و مجرب ہیں

دار چینی، ابریشم مقرض، زعفران، جوزبوا، قرفنفل، بھاسہ، اندر جو، قلفل، خولجان، درونج، مصطلکی، ہموزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر مویر منقی کے ساتھ حسب دستور مخون بنائیں اور 7-9 گرام ہمراہ شربت گاؤ زبان نوش کرائیں۔

ہڑتال، شنگرف، بیش، سیسب (یاسم الفار) ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو خوب باریک کھل کریں، جب خوب باریک ہو کر یکذات ہو جائے تو آب اورک ڈال کر

دوبارہ کھل کر یں، اور موٹھ کے دانہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور 1 گولی استعمال کرائیں۔
 میٹھا سیلے 3.5 گرام، نیمکوفت کر کے روغن زرد میں چلائیں اور ایک عدد قنفل مع
 کلاہ (نو پ) 140 عدد، قنفل سیاہ، اس روغن میں ڈال کر دوبارہ پکائیں، جب یہ دوائیں
 جل جائیں تو نکال کر پیس لیں اور موٹھ کے دانہ کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی کھلائیں۔
 زرنباہ، ایرسا، گندہ ہر ایک 5 گرام، جدوار 4 گرام، حجر الیہود ایک گرام، مشک
 500 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو پیس کر حسب دستور شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور 1-2
 گرام کھلائیں۔

تخم دھتورہ سیاہ 3.5 گرام، قنفل سیاہ، زنجبیل ہر ایک 6 گرام، مشک 500
 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو پیس کر پانی کے ہمراہ 135 گرام کے بقدر گولیاں بنائیں اور
 1 گولی صبح شام کھلائیں۔

حلبہ، زنجبیل، قنفل سیاہ، دارچینی، نرگجور، سعد کونی، سیپاری، تیرج ہر ایک 28
 گرام، شکر سفید 300 گرام۔ شکر کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن گل 250
 ملی لیٹر میں بریاں کر کے، شکر کو شیر گاؤ 500 ملی لیٹر میں پکائیں اور مذکورہ بریاں کردہ دواؤں
 کا لندہ بنا کر 25 گرام کھلائیں۔

0 — اگر دانتی بیٹھ گئی ہو تو جوز بوا باریک پیس کر روغن کنجد میں ملا کر جیزوں
 اور کان کے پاس مالش کریں۔

زنجبیل، پیلا مول، کائے پھل پیس کر مالش کریں۔

0 — تقویٰ کے لیے خمیرہ گاؤ زبان عبری 12 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان
 استعمال کرائیں۔

ملفوظ رہے کہ بخار کی حالت میں مقوی دوائیں استعمال کرانا نقصان دہ ہے۔



حمی خندقہ TRENCH FEVER

اس مرض میں حمی رابعد (Relapsing Fever) کی کیفیات کا حامل بخار ہوتا ہے، درد سر، درد کمر، غنودگی اور آنکھوں میں ورم کی شکایت ہوتی ہے اور ان کے علاوہ بھی دوسری علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض فوجیوں کو خندق/بیرکوں میں، جہاں نہانے کا اچھا نظم نہ ہو، کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

(I) قفل بدن (جسم کی جوئیں)۔ مرض کی سرایت جوؤں کے فضلہ اور کچی جوؤں کے جسم کی رطوبت سے ہوتی ہے، یہ رطوبت، جوں کے کاٹنے کے نتیجہ میں کھلاتے وقت جلد اور جوؤں کے کچل کر باہم مل جانے سے عارض ہوتی ہے، جوں کے کاٹنے پر جو خراش ہوتی ہے اس میں بھی کچلی/کچی جوؤں کی رطوبت سرایت کر سکتی ہے، اور اس طرح جوؤں کی ہی رطوبت مرض رونما کرتی ہے۔

(II) جسم کی صفائی پر توجہ نہ دینا۔

علامات

سرايت کے 7-9 دن بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں علامات نہایت شدید ہوتی ہیں۔ چنانچہ جسم میں درد، قبض/اسہال، کرب و اضطراب اور بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور 103-104 ف تک پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات متلی اور تے کی بھی شکایت ہوتی ہے، لرزہ/قشعریرہ بھی ہو سکتا ہے، نبض سریع چلتی ہے اور اس کی رفتار 90-120 تک (جوانوں میں) ہو جاتی ہے۔ بعض مریضوں میں علامات کا ظہور خفیف طور پر ہوتا ہے، چنانچہ حرارت اعتدال سے کچھ زائد ہو جاتی ہے یا صرف درد کی شکایت ہوتی ہے اور جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر رہتا ہے۔

درد سر کی شکایت عام طور سے سر کی پچھلی جانب ہوتی ہے، ایسی صورت میں گردن کا پچھلا حصہ اٹھایا ہوا دکھائی دیتا ہے، پیشانی پر درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے، خانہ چشم میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، کمر کا درد رات میں زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تمام اعضا میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، تاہم ہڈیوں میں درد کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔

کرب و اضطراب کی شدت۔ مریض کو کسی پل چھین نہیں ملتا، آنکھیں سرخ اور متورم دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم ان سے پانی نہیں آتا، ابتدا میں زبان پر بالائی کی مانند سفید جہہ جمی ہوتی ہے جو بعد میں از خود صاف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جسم پر گلانی رنگ کے دھبے بھی نمودار ہوتے ہیں، سبز اور شکم پر زیادہ ہوتے ہیں جو دباؤ پڑنے پر زائل ہو جاتے ہیں اور دباؤ ہٹنے پر نمودار ہو جاتے ہیں، یہ دھبے 48-6 گھنٹے تک رہنے کے بعد از خود ختم ہو جاتے ہیں، پیشاب کی مقدار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں رطوبت بیضیہ بھی شامل ہو سکتی ہے، جسمانی حرارت کے کم ہو جانے پر پیشاب کی مقدار میں لازمی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ شدید حرارت کی صورت میں ہڈیاں ہو سکتا ہے، آواز بھی بند ہو سکتی ہے، جسم، خاص طور سے ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے صفراوی دانے (Herpes) نکل آتے ہیں، پٹلیوں کی جلد سرخ ہوتی ہے اور انگلیوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے۔

چند دنوں بعد بخار زائل ہو جاتا ہے اور خام دوسری علامتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ مگر کچھ عرصہ بعد جسمانی درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے اور معدوم علامات دوبارہ رونما ہوتی ہیں، پھر رفتہ رفتہ عوارض میں تخفیف اور بخار میں کمی واقع ہو کر مرض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قلبی اور اعصابی علامات اور عوارض بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مقام قلب پر درد، تنفس میں دشواری، وہم اور ضعف حافظہ ہوتا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ اس مرض کا انجام 90 فیصد بخیر ہوتا ہے، 10 فیصد میں دوسری پیچیدگیاں پیدا ہو کر مریض ہلاک ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال پر لانے کے لیے دافع حمی دوائیں استعمال کرائیں۔
- 0 — مسکن درد دوائیں خارجی/داخلی طور پر استعمال کرائیں۔
- 0 — بخار رفع ہونے کے بعد مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:

یہ نسخے دفع حمی میں کارآمد ہیں۔

گل نیم تازہ 95 گرام، گلو سبز 50 گرام، برگ شاہترہ، گل منڈی، سر پھوک، ہر ایک 45 گرام، گل نیلوفر، خس ہندی ہر ایک 25 گرام، تخم کاہو مقشر، تخم کاسنی ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح 3 لیٹر عرق کشید کر کے 120 ملی لیٹر ہمراہ شربت بزوری/شربت عتاب 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

طباشر 25 گرام، کونین 6 گرام، مست گلو 6.5 گرام، صمغ عربی 3 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ کر مٹر کے دانہ کے بقدر گولیاں بنائیں، 1 گولی ہمراہ آب تازہ، صبح شام کھلائیں۔

ست گلو، طباشیر، دانہ ہیل خورد ہر ایک 6 گرام، نبات سفید 18 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے 4 گرام کھلا کر عرق گاؤ زبان 150 ملی لیٹر میں شربت نیلوفر، 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

زہر مہرہ، طباشیر، دانہ ہیل خورد، کشنیز، ست گلو، ہموزن — تمام دواؤں کو باریک پس کر 3 گرام، ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

مقوی کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

خمیرہ مرداریہ 4-7 گرام استعمال کرائیں۔


تسکین درد کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:

ختم کرفس 60 گرام، سلیج، اذخر ہر ایک 45 گرام، قطر اسلیون، جند بیدستر، ہر ایک 65 گرام، فلفل سفید 55 گرام، انیسون، انجون ہر ایک 42 گرام، سنبل الطیب 35 گرام، دار چینی، قسط، میعہ سائلہ، اساروں ہر ایک 27 گرام، حملا، زعفران، دار فلفل، ہر ایک 18 گرام، سیسالیوس 4.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے تمام دواؤں کے تین گنا شہد کے توام میں حسب دستور معجون بنائیں اور 3-5 گرام، ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / نسخے بروئے کار لائیں:

حسب ضرورت مناسب ادویہ کا پاشویہ کریں:

روغن شفا / روغن گل، روغن کنجد وغیرہ سے مالش کریں۔



حمی لذع الفار

RAT-BITE FEVER

اس مرض میں سرایت زدہ چوہے کے کاٹنے سے مزمن نوعیت کا، بار بار لوٹ آنے والا بخار ہوتا ہے اور دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

اسباب

اسپائروکیٹاموس میورس (Spirochaetamosus Muris) نامی جرثومہ، یہ جرثومہ جب چوہے/نولے/چھوٹے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو ان کو بھی شدید تعدیہ کا واسطہ بنا دیتا ہے اور جب یہ سرایت زدہ جانور، صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو یہ جرثومے انسان کے خون میں شامل ہو کر مرض کا باعث ہوتے ہیں۔

علامات

چوہے کے کاٹنے کے بعد زخم حسب معمول مندمل ہو جاتا ہے، اس کے 2-6 ہفتہ بعد کاٹے ہوئے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے اور درم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے آس پاس آبلے پڑ جاتے ہیں، جو زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات زخم متحرک ہو کر وہ مقام

مردار ہو جاتا ہے، مریض سر میں درد کی شکایت کرتا ہے، متلی اور تے ہوتے ہیں، سردی بھی محسوس ہوتی ہے، حواس خمسہ مکدر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی حلق میں درد محسوس ہوتا ہے، آواز میں بھراہٹ ہوتی ہے جسمانی درجہ حرارت 103-104 ف تک پہنچ جاتا ہے، جسم پر سرخ رنگ کے ڈورے رونما ہوتے ہیں، شدید بخار کی صورت میں ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے، بخار 1-8 دن اور کبھی 12 دن تک تیز چڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اتر جاتا ہے اور 2-7 دن کے وقفہ سے دوبارہ چڑھتا ہے، اس طرح مہینوں بلکہ کئی سال تک چڑھتا اترتا رہتا ہے، غدد لفاویہ میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، عضلات اور مفاصل میں بھی درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات بخار بہت خفیف ہوتا ہے، لیکن مریض کی سرگزشت میں چوہے کے کاٹنے کا ذکر تفتیش میں معاون ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مقام گزیدہ پر پینکٹیاں کھینچیں اور عمل کئی کریں۔
- 0 — جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال پر لانے کے لیے داخلی اور خارجی تدابیر اختیار کریں۔
- 0 — زخم کی صفائی اور اندام پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — ازالہ درد کی تدابیر کریں۔
- 0 — رفع قبض کریں۔

علاج

- 0 — مقام گزیدہ پر پینکٹیاں کھینچنے کے بعد داغ دیں / زخم کو سرکہ سے دھو کر لہسن اور زیرہ کو پانی میں جوش دے کر نطول کریں / آرد کرسنہ، انجیر خام پیس کر ضاد کریں۔
- 0 — بخار کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- چم کاہو 120 گرام، تخم خرفہ 90 گرام، طباشیر، رب السوس ہر ایک 60 گرام، گل سرخ کشیز خشک ہر ایک 30 گرام، صندل سفید، گل ارمنی، گلنار، اقاتیا، ہر ایک

12 گرام، کافور 1.7 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں اور 3 گرام ہمراہ شربت انارین 12 ملی لیٹر استعمال کرائیں اس کے بعد آب کاسنی سبز مروق، آب مکو سبز مروق ہر ایک 85 ملی لیٹر، سببھین سادہ 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے:

مروارید ناسفتہ، طباشیر ہر ایک 8 گرام، صندل سفید، گل نیلوفر، کشیز خشک، صندل سرخ، تخم خرفہ مقشر، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم تربوز، گل سرخ ہر ایک 12 گرام، کتیرا، نشاستہ ہر ایک 8.5 گرام، کافور قیصوری 2 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب اسپغول میں قرص بنائیں اور 5 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں۔
جب بخار رفع ہو جائے تو پیش بندی کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ اس کے استعمال سے انشاء اللہ بخار دوبارہ نہیں آئے گا۔

سم الفار سفید 10 ملی گرام، گل سرخ 4 گرام، کات گلابی 50 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر فلفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح، شام بعد غذا کھلائیں۔
یہ نسخہ بھی کار آمد ہے:

ہزتاں 1.5 گرام، فلفل دراز 6 گرام — دونوں دواؤں کو آب اورک میں پیس کر 125 ملی گرام کے بعد بقدر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح شام کھلائیں۔
0 — رفع قبض کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

گل سرخ، گل بنفشہ ہر ایک 6 گرام، تمر ہندی 35 گرام، آلو بخارا 7 عدد، عناب 9 عدد — تمام دواؤں کو عرق بید سادہ، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، عرق گاؤ زبان ہر ایک 35 ملی لیٹر عرق شاہترہ، عرق کاسنی، عرق گلاب ہر ایک 60 ملی لیٹر میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت درد مکرر 50 ملی لیٹر، مغز فلوں خیار شمر، خمیرہ بنفشہ ہر ایک 35 گرام، سببھین سادہ 35 ملی لیٹر ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

0 — حلق میں درد اور آواز میں بھراہٹ کے لیے نسخہ استعمال کرائیں:
گل بنفشہ 6 گرام، بہدانہ 3 گرام، تخم عطلی، تخم خبازی، ہر ایک 6.5 گرام،

گاؤ زبان 5 گرام، عتاب 5 عدد، سپتیاں 9 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت قوت سیاہ 5 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

برگ عطشی، گل عطشی، تخم عطشی کو اس قدر پکائیں کہ خمیر کی طرح ہو جائے اور عرق گلاب ڈال کر دوبارہ پکار کر مقام درد پر لگائیں۔

0 — مفصل میں درد کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

ابوزیدان، مصطکی، سور بخان ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر گلتند 25 گرام ملا کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خیاریں، شیرہ خار خشک، شیرہ تخم خریزہ، شیرہ بادیان ہر ایک 6 گرام پانی میں نکال کر شربت بزوری 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

اکلیل الملک، تخم خبث، بابونہ، تخم عطشی، صبر، لعاب تخم کتاں، ہموزن کا ضماد کریں۔
زخم کی صورت میں یہ نسخے استعمال کرائیں:
زخم کو آب نمک سے دھو کر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

صابون لاہوری، پیاز منقشر ہر ایک 12 گرام — دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روغن کنجد 50 ملی لیٹر میں جلا کر سیاہ کر لیں۔ اس کے بعد برگ نیم 10 عدد ملا کر جلائیں اور خوب ملا کر کات سفید 12 گرام پیس کر حل کریں اور چھان کر زخم پر لگائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے:

رال، روغن کنج ہر ایک 50 ملی لیٹر، موم 3 گرام، سفیدہ کاشغری، کافور، نیلا توتیہ، مردار سنگ، ہر ایک 2 گرام، الاچھی خرد 7 عدد — پہلے الاچھی خرد کو مع پوست روغن میں جلائیں اس کے بعد مردار سنگ پیس کر ملائیں اس کے بعد نیلا توتیہ ڈال کر جلائیں پھر رال، سفیدہ کاشغری اور موم ڈالیں۔ پھر برتن کو آگ سے اتار کر کافور ڈال کر خوب حل کریں اور مقام زخم پر لگائیں۔



حمی بول اسود *

BLACK WATER FEVER

اس مرض میں جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یرقان ہوتا ہے، تے کی شکایت ہوتی ہے اور خون کی آمیزش سے پیشاب میں سیاہی غالب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس بخار اور ملیریا کی بخار میں کچھ نہ کچھ رشتہ/تعلق ضرور ہے۔ تاہم یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس مرض کے تعدیہ کا سبب مادہ انافلیر ہے، کیونکہ بعض ایسے علاقے جہاں حمی اجامیہ (ملیریا بخار) کثرت سے ہوتا ہے وہاں یہ بخار یا اس کی مخصوص علامات رونما نہیں ہوتیں۔

اسباب

- (I) ایک مخصوص جراثیم۔
- (II) داخلی/ خارجی طور پر شدید بروڈت پہنچنا۔
- (III) تقادمہ کے طور پر ملیریا ہونا۔

* اس کو حمی دم البول بھی کہتے ہیں۔

علامات

مرض کا آغاز شدت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتدا میں خفیف جائزے کے ساتھ بخار ہوتا ہے، بعض اوقات شدید جائزے کے ساتھ بخار ہوتا ہے جس کی کیفیت بے قاعدہ ہوتی ہے یا چند گھنٹوں کے بعد اتر جاتا ہے۔ مرض کی ابتدا میں یا دوران مرض کمر/پہلو میں درد ہوتا ہے، جگر اور طحال کے مقام پر بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی درد کا احساس نہیں ہوتا، سیاہ رنگ کا پیشاب آتا ہے، عام طور سے مقام معدہ پر درد ہوتا ہے، صفراوی علامات رونما ہوتی ہیں، صفراوی تے/اسہال آتے ہیں، پیشاب کی رنگت میں آئے دن سیاہی کا غلبہ ہوتا ہے، جلد کی رنگ زرد زعفرانی ہو جاتی ہیں اور یرقان کا دھوکہ ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت کی زیادتی کی حالت میں رنگ اور بھی زرد دکھائی پڑتا ہے 4-5 دن یہی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے بعد پیشاب طبعی رنگ پر آنے لگتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سیاہی میں سرخی کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ طبعی رنگ غالب آ جاتا ہے۔ پسینہ خارج ہو کر بخار اتر جاتا ہے، تے/اسہال وغیرہ علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ شدید صورتوں میں کريات حراء الدم (R.B.C.) زیادہ تعداد میں ضائع ہوتے ہیں تو خفیف جریان خون کی سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مریض طویل اور سرد سانس لیتا ہے۔ نبض دقتی اور ضعیف چلتی ہے اور جسمانی حرکت سے غشی طاری ہو جاتی ہے کبھی احتباس بول کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں پیشاب قلیل مقدار میں، جلد جلد خارج ہوتا ہے۔ توام میں گاز ہاپن ہوتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کا بڑا/خارج ہونا موقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ کلیتین (گردے Kidneys) کی تجاری بول میں حمہ الدم (Haemoglobin) کی وجہ سے انسداد/رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جسمانی درجہ حرارت 107-108 ف تک پہنچ سکتا ہے۔ بچی آتی ہے، صحت یابی کے مرحلے میں شدید ضعف اور نقاہت محسوس ہوتی ہے اور کافی عرصہ بعد مریض نقاہت پر قابو پاتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مکمل آرام کی ہدایت کریں۔
- 0 — رفع قبض کریں۔ بارود رات استعمال کرائیں۔
- 0 — قلت بول/احتباس بول/ درد گردہ کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔
- 0 — ضعف قلب کی صورت میں مقویات قلب استعمال کرائیں۔
- 0 — شدید حرارت کی صورت میں سرد تدابیر بروئے کار لائیں۔

علاج


- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں۔
ادار کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں:
- مغز تخم خیارین، تخم خرف، تخم کدوئے شیریں، تخم خشکاش، کتیرا ہر ایک 12 گرام،
بزرانج 3 گرام، شکر سفید 120 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور
25 گرام ہمراہ شیرہ تخم کاسنی استعمال کرائیں۔
- تخم کاسنی، تخم خرپزہ، بادیان ہر ایک 12 گرام، تخم بادیان، تخم کاسنی ہر ایک 18
گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر شکر 250 گرام ملا کر دوبارہ سفوف کر کے
25 گرام ہمراہ آب سرد استعمال کرائیں۔
- شدید حرارت، پیشاب میں سوزش کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- تخم خیارین، تخم خربوزہ ہر ایک 18 گرام، پوست کاسنی 25 گرام — تمام
دواؤں کو پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور 750 گرام شکر ملا کر شربت کا قوام تیار
کریں، قوام کے آخری مرحلے میں شیرہ مغز تربوز، شیرہ مغز پیٹھا ہر ایک 12 گرام پانی میں
نکال کر ملائیں اور شربت تیار ہو جانے پر 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
- کشینز، برگ گاؤ زبان، گل گاؤ زبان، صندل سرخ، صندل سفید، تخم کاہو، تخم خرف،
برگ بنفشہ، تخم کاسنی، گل سرخ، گل نیلوفر، ہر ایک 65 گرام، تراشہ کدوئے تازہ

750 گرام، تراشہ پیٹھا 350 گرام، کافور 50 گرام۔ حسب دستور عرق کشید کریں اور 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

خون کے اجزا اور کریات حرا کو نوٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے — کشتہ مرجان 125 ملی گرام ہمراہ شربت انجبار 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
شربت انجبار کا نسخہ درج ذیل ہے:

بج انجبار 25 گرام، حب الّاس، پوست انار شیریں ہر ایک 12 گرام، برادہ صندل سفید 9 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور آب برگ مغلی سبز، شکر سفید 500 گرام کے ساتھ شربت کا قوام تیار کریں۔
ملین کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شاء کی 175 گرام، افتیمون 120 گرام، بمفاج قسقی 50 گرام، تربد سفید 48 گرام، گل بنفشہ 52 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر 2-3 گرام استعمال کرائیں۔
0 — خارجی طور پر یہ تدابیر اختیار کریں۔
حسب ضرورت کمر اور گردہ کے مقام پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکیہ کریں۔



حمی سکتیہ

SANDFLY FEVER

اس مرض میں سرایت زدہ مکھی (ریت کی مکھی Sand Fly) کے کاٹ لینے سے اعضاء شکنی جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ، مفاصل میں درد وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ متعدی بیماری ہے اور گرم ممالک میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

ایک مخصوص قسم کا قابل تقطیر کب (Filterable Virus) — جو ایک خاص قسم کی مکھی کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مکھی جب کسی سرایت زدہ انسان کو کاٹتی ہے تو اس کے خون میں شامل یہ وائرس مکھی کے شکم میں چلے جاتے ہیں اور 7 دن میں مکمل نشوونما پا کر سرایت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان ایام میں اگر یہ مکھی کسی صحت مند انسان کو کاٹ لے تو 3-7 دن میں مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ ابتدا میں اس بخار کو لیریائی بخار تصور کیا گیا تھا، لیکن N.B.S. (نائٹ بلڈ ایمر) کے بار بار ٹسٹ کے باوجود مریض کے خون میں لیریائی طفیلی اجسام (Malarial Parasite) نظر نہیں آتے، پھر بعد کی تحقیقات نے اس کو ایک علاحدہ حمی قرار دیا۔

سرایت زدہ مکھی کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ خاکی رنگ کی، بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوڑے کرکٹ، گھر کی تالیوں، باروچی خانوں کے پاس رہتی ہے، یہیں اس کے انڈے بھی ہوتے ہیں۔ رات کے وقت یہ کان، آنکھ کے پاس کاٹ لیتی ہے تو ابتدا میں خفیف علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مکھی اگر ایک مرتبہ سرایت زدہ ہو جائے تو ہمیشہ سرایت زدہ رہتی ہے۔

علامات

سرایت زدہ مکھی کے کاٹنے کے 3-7 دن بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ یک بیک (خفیف لرزہ کے ساتھ) بخار ہوتا ہے، جو 104-105 ڈگری ف تک پہنچ جاتا ہے، نبض کی رفتار فی منٹ 100-116 تک پہنچ جاتی ہے، بخار کے ابتدائی مرحلے میں قبض کی شکایت ہوتی ہے لیکن بعد میں اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے، سر، سر اور دوسرے اعضا میں درد محسوس ہوتا ہے، شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، روشنی اور آواز ناگوار گزرتی ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، بعض اوقات غنودگی بھی طاری ہو سکتی ہے، زبان میلی، کناروں پر سرخ، منہ اور حلق اندر سے سرخ اور ان میں خراش ہوتی ہے، قوت ذائقہ زائل ہو جاتی ہے، بطلان اشتہا بھی ہوتا ہے، 1/3 مریضوں میں تے آتی ہے، رعاف کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے، بعض اوقات گاڑھا لیسیدار بلغم بھی خارج ہوتا ہے، لوزتین بڑھ جاتے ہیں، لہات میں درم بھی ہو سکتا ہے، دوران سر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جسم پر سرخ دھبے بھی پڑ جاتے ہیں، شدید بخار کی صورت میں ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے، بخار ابتدائی دو دن برابر چڑھتا ہے اور تیسرے دن سے پانچویں دن میں اتر جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کونین کے مرکبات اس میں چنداں فائدہ مند نہیں ہوتے، ملیریائی بخار کے برخلاف یہ مرض دوبارہ نہیں لوٹتا، خون میں ملیریائی طفیلی نہیں ملتے۔

اصول علاج

0 — رفع قبض کریں۔

- 0 — دافع درد دوائیں استعمال کرائیں۔
 0 — خارجی طور پر طلاء وغیرہ استعمال کرائیں۔
 0 — مبردات استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے مفید ہیں:
 تلپین شکم کے لیے یہ دوائیں استعمال کرائیں۔
 خمیرہ بھنٹہ 25 گرام، ہمراہ عرق گلاب 120 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔
 شربت درد نکر 50 ملی لیٹر پانی میں ملا کر نوش کرائیں۔
 گلقد 35 گرام رات کو سوتے وقت کھلائیں۔
 اطربفل کشیزی 25 گرام رات کو کھلائیں۔
 تلپین شکم کے بعد یہ نسخے استعمال کرائیں:
 تخم کاسنی، تخم کاہو ہر ایک 7 گرام، تخم کشیزی 12 گرام — تمام دواؤں کو عرق بید
 سادہ، عرق گلاب، عرق کاسنی، عرق کلو، ہر ایک 60 ملی لیٹر میں پیس کر چھان لیں اور شربت
 انارین/سکینجین سادہ/شربت لیموں 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
 مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، تخم کاسنی ہر ایک 9 گرام کو عرق نیلوفر، عرق کاسنی،
 عرق کیوڑہ، عرق بید مشک، ہر ایک 60 ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور
 شربت لیموں 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔
 نارنیل دریائی، زہر مہرہ خطائی ہر ایک 1 گرام کو عرق بید مشک، عرق گلاب میں
 گھس کر شربت انارین 250 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔
 0 — خارجی طور پر درج ذیل طریقے اختیار کریں:
 ریت کی مکھی کے کانے ہوئے مقام کو سرکہ سے دھوئیں۔ کافور کو سرکہ میں ملا کر
 مقام گزیدہ (کانے ہوئے مقام) پر طلاء کریں۔

حمی متموجہ *

UNDULANT FEVER

اس مرض میں جسم کا درجہ حرارت لہر (موج) کے انداز میں شام کو نسبتاً زیادہ اور صبح کو کم ہوتا ہے۔ کیفیت بڑی حد تک غیر منضبط ہوتی ہے۔ مرض کا دورہ بار بار ہوتا ہے اور 3 ماہ سے زائد عرصہ تک مریض مبتلا رہتا ہے۔ یہ مرض مالٹا (اس مناسبت سے حمی ملتیه کہتے ہیں، ایبین، اٹلی پر نکال اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں کثیر الوقوع ہے۔ متعدی مرض ہے بروسیلا (Brucella) نامی جرثومہ سے پھیلتا ہے۔

اقسام

حمی متموجہ

Undulant Fever

حمی متموجہ خفیف

Mild Undulant F.

حمی متموجہ نوبتی

Undulant Remittent F.

حمی متموجہ خبیث

Maligant Undulant F.

* اس کو حمی ملتیه (Malta Fever) بھی کہتے ہیں۔

اسباب

بروسیلا (Brucella) — اس کو مائیکرو کاکس میلی ٹین سس (Micro Coccus Melitensis) بھی کہا جاتا تھا۔ میلی ٹین سس دراصل مالٹا میں بکثرت وقوع ہونے سے کہا گیا تھا۔ یہ جرثومہ سرایت زدہ بکری، بھیڑ کا کچا دودھ نوش کرنے سے صحت مند لوگوں میں پہنچ جاتا ہے اور دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے نیز طحال، جگر، غدود لفاویہ، گردہ، مغز، پیشاب، براز، تنفس، بلغم، پسینہ اور جلد کی بھوسی وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

علامات

(۱) عمومی

سرایت کے 28-3 دن بعد علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں کسل مندی ہوتی ہے، سر اور عضلات میں درد محسوس ہوتا ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، سوء ہضم کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے بعد مرض کی خصوصی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، صبح کی نسبت شام کو حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فرق عام طور سے 2 ڈگری ہوتا ہے، نبض کی رفتار 80-90 فی منٹ ہوتی ہے، زبان پر سفید رنگ کی میل جمی ہوتی ہے۔ تاہم اس کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، بظان اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، طحال بڑھی ہوئی، دبانے پر دردناک محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی جگر بھی کسی قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے، فم معدہ میں گرانی اور دبانے پر درد محسوس ہوتا ہے، قبض بھی ہوتا ہے، بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، سینہ پشت اور شکم پر خشخاش/باجرے کے دانے کی مانند سفید دانے نکل آتے ہیں، یہ مدت 2 ہفتہ تک رہتی ہے اور اس دوران درجہ حرارت 103-105 ف رہتا ہے، تیسرے ہفتہ کے دوسرے دن عام طور سے درجہ حرارت اعتدال پر آنے لگتا ہے اور مریض کو صحت کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن 3-4 دن بعد بخار دوبارہ چڑھتا ہے اور سابق میں مذکور تمام علامتیں عود کر آتی ہیں اور 2-3 ماہ اس طرح مرض میں اضافہ ہوتا اور پھر عود کرتا رہتا ہے،

بالآخر شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس دوران معدہ اور امعاء میں خراش ہونے کے سبب ہاضمہ خراب ہوتا ہے، قبض/دست آتے ہیں، بخار کی زیادتی سے ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے، قوتِ حافظہ خاص طور سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ نسیان کا غلبہ ہوتا ہے، جلد کی رنگ زرد ہوتی ہے۔ اس میں چیچکا ہٹ اور نمی بھی ہوتی ہے۔ تقریباً 40 فیصدی مریضوں میں مفاصل کے اندر آبی رطوبات پیدا ہو کر جوڑ متورم ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے مفاصل کی علامات ایک بیک رونما ہوتی ہیں، معمولی حرکت سے بھی جوڑوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی جسمانی نقل و حرکت کے بغیر بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ ابتدا میں ایک ہی جوڑ متاثر ہوتا ہے۔ درم 2-3 دن میں ہی زائل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوسرا جوڑا متاثر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خفیف تخرج مفاصل بھی ہوتا ہے وجع المفاصل کے مریضوں میں یہ کیفیت اور بھی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے۔ ویسے تو تمام مفاصل متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم کوہے، کندھے اور ٹخنے کے جوڑ زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خصیتین (فوطے) میں متورم اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ غدد کلفیہ Parotid Gland میں بھی التهاب ہو سکتا ہے۔ پیشاب کثیر مقدار میں، ترش کیفیات کا حامل، خارج ہوتا ہے اور اس میں فاسفٹس اور پورٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں مخصوص جراثیم ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، جب جسم سے بکثرت پسینہ خارج ہونے لگتا ہے تو پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ منہ اور حلق اندر سے سرخ ہوتے ہیں، التهاب لہات، التهاب لوزتین وغیرہ علامات بھی رونما ہو سکتی ہیں، دوران سر کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ 20-40 فیصدی مریضوں کے خون میں کربات حرا (R.B.C.) کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کربات بیضا کثیر النوات میں کمی ہو جاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی کربات بیضا (W.B.C.) میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تاہم ضعف، نفاہت اور لاغری کا غلبہ ہوتا ہے۔

(ب) خصوصی

(۱) حمی متموجہ خبیث

جسمانی درجہ حرارت میں یک بیک اضافہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے

104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے، جسم میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، چہرے پر سرخی ہوتی ہے۔ معمولی علامات کے ذیل میں بیان کردہ علامتوں میں شدت ہوتی ہے، بدبودار/متعفن قسم کے اسہال آتے ہیں، ذات الریہ کی بھی شکایت ہوتی ہے، تنفس کھینچ کر آتا ہے، تے بھی آسکتی ہے، نبض انک انک کر چلتی ہے، بخار تیز ہو جاتا ہے اور عوارض شدید ہو کر 21-5 دن میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ قسم شاذ و نادر طور پر پائی جاتی ہے۔

(II) حمی متوجہ نوبتی

جسمانی درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ اعتدال سے صرف دو ڈگری زیادہ ہوتا ہے، بلکہ صبح کو اعتدال پر رہتا ہے اور شام کو 2 درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پسینہ آتا ہے، کسل مندی اور اضطراب کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ کیفیات کم و بیش 6 ماہ تک رہتی ہیں، شدید علامتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ نوع زیادہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی۔

(III) حمی متوجہ خفیف

اس میں مرضی علامات نہایت خفیف ہوتی ہیں کہ بسا اوقات مریض صرف کالی اور سستی محسوس کرتا ہے اور اس کے معمولات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ تاہم خون اور پیشاب کے خورد بینی معائنہ سے مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے، ان دونوں میں ہی مرض کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — سرایت زدہ بکری کا خام دودھ نوش کرنے پر پابندی عائد کریں۔
- 0 — رفع بخار کی تدابیر کریں۔
- 0 — مفاصل/جسم کے درد کو رفع کرنے کی تدابیر کریں۔
- 0 — اسہال کو بند کرنے کا اہتمام کریں۔

- 0 — مقویات قلب استعمال کرائیں۔
 0 — دیگر عوارض کا تدارک کریں۔
 0 — حسب ضرورت معرقات (پینہ لانے والی دوائیں) استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — خمیرہ مردارید 5 گرام کھلا کر، گل گاؤ زبان 3 گرام، تخم خیارین 6 گرام، گل گاؤ زبان 5.5 گرام، مونیر منقی 5 عدد، انجیر ایک عدد، عتاب دلائی 7 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
 یہ نسخہ بھی مفید ہے:

مردارید ناسفہ 20 عدد، مویر منقی 3 عدد، جادری 3 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ورق طلا، چڑھا کر ایک گولی 4 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ نوش کرائیں۔
 مویر منقی 5 عدد، سپتال 7 عدد، اصل السوس مقشر 6 گرام، گل گاؤ زبان، 3 گرام، عتاب 5 عدد، انجیر 1 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

بادیان، تخم خیارین ہر ایک 6 گرام، مکو خشک 4 گرام، تخم کشوت (پوٹی میں باندھا ہوا) اصل السوس مقشر، خاکسی ہر ایک 3 گرام، کوہیہ ابریشم 3.5 گرام، عتاب 7 عدد، مویر منقی 9 عدد — تمام دواؤں کو 300 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت شقائق 25 ملی لیٹر، نبات سفید 12 گرام، جل کر کے نوش کرائیں۔
 0 — قبض کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بنفشہ 9 گرام، برگ گاؤ زبان 6 گرام، سناہ کی 3 گرام، گل سرخ 5.5 گرام، مویر منقی 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور تربجین 35 گرام

حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — اسہال کی کثرت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

اتیں، موچس، اندر جو شیریں، لودھ، گل دھارا، بموزن — تمام دواؤں کو پیس کر شہد ملا کر چمائیں۔

0 — شدید درد سر کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

عاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ تخم خیارین 6 گرام، عرق عنب الثعلب، عرق شاہترہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 5 گرام چمڑک کر نوش کرائیں۔ اور عرق کلو میں روغن بنفشہ ملا کر ناک میں چکائیں۔

0 — مفاصل میں درد کی صورت میں یہ نسخے / تدابیر اختیار کریں:

تخم کاسنی، تخم خرف، مغز تخم خیارین، مغز تخم خربوزہ، مغز تخم بہدانہ ہر ایک 3 گرام، سورنجان شیریں 2 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور نوش کرائیں۔


0 — خارجی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

تخم ارنڈ، قسط تلخ، میدہ چوب، پھلکرمول، ماش سیاہ، تاج، دیودار، مغز بنہ دانہ، کلہسی، کعبہ سیاہ سردائی، جو مقشر، تخم سن، سورنجان تلخ، زعفران ہر ایک 2 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر پانی میں جوش دے کر ضا د کریں اور جڑوں پر روئی رکھ کر پکڑا لپیٹ دیں۔ روغن دار چینی، روغن قزفل، روغن انیسون ہر ایک 5 ملی لیٹر، روغن تارپین، روغن اذراقی ہر ایک 2 ملی لیٹر کو باہم ملا کر مفاصل پر مالش کریں۔

0 — اگر دانے رونمانہ ہوئے ہوں تو درج ذیل ادویہ کا بھپارہ کریں:

خاکسی 60 گرام کو 5 لیٹر پانی میں ڈال کر دیکھی کا منہ بند کر کے جوش دیں، جب خوب اچھی طرح جوش آجائے تو مریض کو بغیر بستر کی چارپائی (کھڑی کھاٹ) پر لٹا کر چارپائی کے نیچے دیکھی رکھ کر ڈھکن کھول دیں اس کے بعد مریض پر کبیل اڑھائیں۔ اس ترکیب سے خوب پسینہ خارج ہوتا ہے اور کمی مادہ دانوں کی شکل میں رونما ہو جاتا ہے۔

- 0 — بے خوابی کی صورت میں یہ تدابیر اختیار کریں:
 روغن خشخاش سر میں لگائیں، آب برگ کا ہو، آب کشیز سبز، شیرہ تخم خشخاش، روغن نیلوفر، شیشی میں ڈال کر تھلنے کریں۔
- 0 — تمام جسم میں درد محسوس ہوئی ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
 گل بنفشہ، عنب الثعلب، تخم کاسنی، تخم خطمی، گل سرخ ہر ایک 5 گرام، سورنجان 4 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نوش کرائیں۔
- 0 — قے کی شکایت ہو تو یہ نسخے مفید ہیں:
 برف کے ٹکڑے چوسنے کی ہدایت کریں۔
- زہر مہرہ 3 گرام، نارنگیل دریائی 3.5 گرام — دونوں دواؤں کو عرق گلاب اور عرق بید مشک میں پیس کر نوش کرائیں۔
- خردل کو پانی میں پیس کر ناف پر ضا د کریں۔
- 0 — بخار قسم ہو جائے تو مزید احتیاط کے پیش نظر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 ست گلو، مغز تخم کرنجہ ہر ایک 12 گرام، طباشیر کبود، کونین ہر ایک 6 گرام، دانہ ہیل خورد، ست لیموں ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر پچنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں صبح، شام کھلائیں۔



حمی بے سی لس کولائی

BACILLUS COLI FEVER

اس مرض میں خون میں بی کولائی کی سرایت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت سی دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

(I) بی کولائی (B. Coli)۔

علامات

سرایت کے بعد ابتدا میں کسٹندی اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد خفیف سردی محسوس ہو کر لرزہ کے بغیر بخار چڑھتا ہے اور بہت جلد درجہ حرارت 104-105 فہنچ جاتا ہے، اس کی نوعیت حمی معویہ جیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ نقشہ حرارت کا مشاہدہ کرنے پر حمی معویہ کا دھوکا ہوتا ہے۔ تاہم اس کی مدت زیادہ اور حرارت بے قاعدہ ہوتی ہے، بعض اوقات بخار بتدریج بڑھ کر چند دنوں میں 104-105 درجہ فہنچ پہنچتا ہے، لیوکوسائٹس کی تعداد

زیادہ ہو جاتی ہے، بخار کے باوجود لاغری نہیں ہوتی اور مریض معمولات میں مصروف رہتا ہے۔ پسینہ بھی بکثرت خارج ہو جاتا ہے، مرض کے دوران بعض اوقات قبض بھی ہوتا رہتا ہے اور کبھی اسہال آنے لگتے ہیں، جس میں صفراء کی آمیزش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قے بھی آتی ہے، طبیعت میں اکثر امتلا رہتا ہے، صفراوی اسہال کے بعد عام طور سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، مگر دو، ایک دن کے بعد درجہ حرارت پھر بڑھ جاتا ہے، درد سر کی شکایت ہوتی ہے، زکام اور کھانسی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ بلغم آتا ہے، پیشاب گاڑھا، رنگین اور مکدر، خارج ہوتا ہے اور مثانہ کے بتلائے مرض ہونے کی صورت میں غشا مخاطی پیپ، خون کے سفید دانے اور بلغمی چیچرے بھی خارج ہوتے ہیں، خون کے خورد بینی معائنہ پر جڑوے دکھائی دیتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — مدرات اور معرقات استعمال کرائیں / منضجات بردے کار لائیں۔
- 0 — تقویت معدہ کی تدابیر کریں۔
- 0 — درد سر نہ ہو تو قے آور دوائیں استعمال کرا سکتے ہیں۔

علاج


- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
منفع کے طور پر یہ نسخہ 7 دان تک استعمال کرائیں۔
- بادیان، اصل السوس، گل بنفشہ ہر ایک 4 گرام، عناب 7 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنفشہ / گلقد 50 گرام حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- آٹھویں دن مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں:
- گل بنفشہ، عناب الثعلب، بادیان، اصل السوس ہر ایک 9 گرام، پر سیاوشاں 7 گرام، عناب 10 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور ترنجبین، مغز خیار ضمیر، ہر ایک 75 گرام، گلقد 50 گرام ملا کر چھان لیں اور روغن بادام شیریں 6

ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ نویں دن پھر نسخہ منفعج اور اس کے دوسرے دن مسہل استعمال کرائیں تاکہ امعا کا تحقیر ہوتا رہے۔

یہ نسخے اس مرض میں خاص طور سے مفید ہیں:

شہترہ، گل سرخ، رب السوس، سنبل الطیب ہر ایک 14.5 گرام، کھریا، مصطکی رومی ہر ایک 10 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص بنائیں اور 5-6 گرام کھلائیں۔

کاسنی، تخم خربزہ، تخم خیارین، تخم عطی، بادیان ہر ایک 85 گرام، باد آرد، شکائی، برنجاسف، شہترہ، گل غافق، سنبل الطیب، پوست بیج کاسنی، پرسیاوشاں، گل بنفشہ، اصل السوس، گل گاؤ زبان، تخم کشوث ہر ایک 60 گرام، سفید گل، برگ بانسہ 125 گرام، زوفا خشک 35 گرام۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں بھگو دیں، صبح کو 5 لیٹر عرق کشید کریں اور 85 ملی لیٹر نوش کرائیں۔



حمی مصرانیہ

اس مرض میں بعض مخصوص جراثیم کی سرایت کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس کی بیشتر علامات، طریقہ تعدیہ وغیرہ، حمی معویہ سے ملتے جلتے ہیں۔

اسباب

- (I) دُموی تفسن (داخلی عروق)
- (II) اسٹریپٹوکوکائی Strepto Cocci جراثیم وغیرہ

علامات

عام طور سے مرض کا حملہ یک بیک ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت 102-103 فہنک پہنچ جاتا ہے اور یہ مدت 18-10 دن پر محیط ہوتی ہے بعض حالات میں 21 دن بھی ہو سکتی ہے، جسم پر کسی قدر گلابی/آبی دھبہ نمودار ہوتے ہیں، نبض اور حرارت میں طبعی تناسب نہیں ہوتا چنانچہ حرارت جسمانی کی زیادتی کے باوجود نبض بہت زیادہ بطی چلتی ہے اور بعض

اوقات اس کی رفتار 50 فی منٹ ہی رہتی ہے، شکم میں زائدہ امور کی مانند درد ہوتا ہے، لمحال بھی غیر معمولی طور پر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ پیچیدگی کے طور پر امعاء میں التهاب ہوتا ہے، جو بعض اوقات اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ اصل مرض کی طرف معالج کی توجہ ہی نہیں ہو پاتی، نقصان خون، وجع الفاسل، انف العزہ وغیرہ کے علاوہ گردے اور پیچھے پڑے میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

اصول علاج

- 0 — جسمانی قوت کے تحفظ کی تدابیر کریں۔
- 0 — تسکین حرارت کا اہتمام کریں۔
- 0 — تیز اثر مسبلات سے احتراز کریں۔
- 0 — امعاء میں سوراخ اور جریان خون نہ ہونے کی تدابیر کریں۔
- 0 — تیمارداری اور غذا وغیرہ پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:
- خاکسی 5 گرام، عناب 5 عدد، سویر منقی 9 عدد، انجیر 3 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر / نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔
- آلو بخارا 5 عدد، تر ہندی 50 گرام، تخم کاسنی، 4 گرام، گل نیلوفر 6 گرام، عناب 6 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھان کر شربت عناب / شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
- شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم خیارین ہر ایک 5 گرام، لعاب بہدانہ 35 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں حسب دستور پیس کر شربت عناب 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی چھڑک کر نوش کرائیں۔

قبض کی صورت میں ملین کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

خاکسی 5 گرام، عتاب 6 عدد، سویر متقی 9 عدد، انجیر زرد 3 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور خمیرہ بنفشہ 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ مزید قوی بنانے کے لیے روغن بید انجیر 25 ملی لیٹر کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

ضعف قلب وغیرہ کی صورت میں یہ نسخہ سود مند ہے:

خمیرہ مرورید 3 گرام / دواء المسک بارد 3.5 گرام کھلا کر عرق بادیان 60 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

0 — تخفیف / ازالہ مرض کے لیے خارجی طور پر وہ تمام تدابیر بروئے کار لائیں، جن کا تذکرہ جمیع معویہ کے ذیل میں مذکور ہے۔



حمی قرادیہ

TICK FEVER

اس مرض میں جسم میں ایک مخصوص طفیلی کے سرایت کر جانے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور دوسری غیر طبعی، مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض افریقہ کے بعض ملکوں میں بکثرت پیش آتا ہے۔

اسباب

سیارو دنیاؤ ٹونیائی نامی طفیلی — یہ طفیلی، آرئی تھوڈرس نام کی چمچری کے سرایت زدہ مریض کا خون چوسنے پر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ چمچری کسی صحت مند انسان کو کاٹتی ہے تو پھر یہ طفیلی اس شخص کے خون میں شامل ہو کر امراضیاتی علامات پیدا کرتا ہے۔

علامات

سرایت کے 7 دن بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ تاہم چمچرے کے کاٹنے/خون چوسنے کے مقام پر سوزشی علامات ابتدائی مرحلے سے ہی نمایاں ہوتی ہیں۔ کسلیندی اور

سستی کا غلبہ ہوتا ہے اور بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، اس کے بعد بتدریج جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، درد سر اور قشعر یہ ہوتا ہے، مقام طحال پر شدید درد محسوس ہوتا ہے، طحال بڑھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات اسہال کی شکایت ہوتی ہے اور اس میں خون کی دھاریاں پائی جاتی ہیں، خون کے خوردبینی معائنہ میں طفیلی کو دیکھا جاسکتا ہے۔ 3-4 دن بعد بخران ہوتا ہے اور پسینہ کے ساتھ بخار اتر جاتا ہے، نقاہت کا غلبہ ہوتا ہے، تاہم چند دنوں میں ہی جھوک بڑھ جاتی ہے اور بہت جلد مریض کے قوی بحال ہو جاتے ہیں اور مکمل طور پر شفا حاصل ہو جاتی ہے لیکن بعض صورتوں میں 5-7 دن کے وقفہ سے دوبارہ بخار چڑھتا ہے اور 3-4 دن تک رہ کر بخران کے ذریعہ اتر جاتا ہے، یہ دورہ 3-4 بار پڑتا ہے اس کے بعد مریض مکمل طور پر صحت پا جاتا ہے۔ تاہم نقاہت اور کمزوری عرصہ تک رہتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — مبردات استعمال کرائیں۔
- 0 — رفع درد کی تدابیر کریں۔
- 0 — قوی جسمانی کو برقرار رکھنے کا اہتمام کریں۔
- 0 — عوارض کے تدارک / ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

قرص طباشیر کافوری 3 گرام کورب انار ترش 12 ملی لیٹر میں ملا کر چٹائیں۔ اس کے بعد مغز تخم کدوئے شیریں، تخم کاسنی، مغز تخم خیارین، زرشک، ہر ایک 9 گرام، تخم کاہو 7 گرام، آلو بخارا 7 عدد۔ تمام دواؤں کو عرق نیلوفر، عرق بید سادہ، عرق بید شگ، عرق گلاب ہر ایک 75 عدد ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ نکالیں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر، شربت لیمون 20 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

زہر مہرہ، صندل سفید ہر ایک 1 گرام کو عرق گلاب میں گھس کر ایک گرام کی مقدار میں خیرہ صندل 5 گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد شربت حماض اترج 12 ملی لیٹر میں عرق نیلوفر، عرق کیوڑہ، عرق بید شک ہر ایک 75 ملی لیٹر، لعاب اسپنول، لعاب بہدانہ ہر ایک 3 گرام، شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک 6 گرام (پانی میں نکال کر) ملائیں اور نوش کرائیں۔

بے خوابی اور درد کی صورت میں — تخم کاہو، تخم خشکاش، مغز تخم کدوئے شیریں، ہر ایک 7 گرام پانی میں پیس کر نبات سفید 25 گرام شیریں کے نوش کرائیں۔
 0 — خارجی طور پر یہ تدابیر اختیار کریں:
 تخم خشکاش، تخم کاہو، مغز تخم کدوئے شیریں، اجوائن خراسانی ہر ایک 3 گرام کو روغن گل 35 ملی لیٹر میں پیس کر سر میں لگائیں — بے خوابی اور درد میں مفید ہے۔



حمی دماغی نخاعی *

CEREBRO-SPINAL FEVER


اس شدید دہائی متعدی مرض میں ایک مخصوص جراثیم کی وجہ سے دماغ اور نخاع کی اغشیہ (جھلیوں) میں درم/التهاب پیدا ہو جاتا ہے، گردن اکڑ جاتا ہے، جسم پر سرخ رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں شدید درد سر اور قے کی شکایتوں کے ساتھ سرسام کی دوسری علامتیں رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض 35-5 سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔ 1 سال سے کم اور 55 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس میں شاذ و نادر ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ عورتوں کی نسبت مرد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ موسم سرما اور موسم برسات میں یہ دہائی طور پر پھیلتا ہے۔

* اس کو جی جی نخاعی بھی کہتے ہیں۔ ہندستان میں گردن توڑ بخار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا تذکرہ معالجات (1) میں ہو چکا ہے، یہاں نصاب تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قدر تفصیل سے تحریر کیا جا رہا ہے۔

اقسام

حمی دماغی نخاعی

Cerebrospinal Fever



اسباب

نبتہ حناسیہ (Meningo Coccus) نامی جرثومہ — یہ جرثومہ عام طور سے کریات بیضاء کثیر النوات (پالی مارفونیوکلیر) میں بکثرت پایا جاتا ہے، جو مریض کی ناک اور حلق سے خارج ہونے والی رطوبتوں میں بکثرت موجود ہوتا ہے اور انہیں کے ذریعہ متعدی ہوتا ہے تو دماغ اور نخاع (دام مغز) کی تھلیوں میں پہنچ کر الجھالی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ غیر معمولی تکان، سرد موسم، جھگ اور تاریک مکانوں میں رہائش، غیر معمولی محنت و مشقت، فاقہ کشی، عام جسمانی ضعف، کشافیت جسمانی، رنج و غم، فکرو تردد، نزلہ و باسیہ، صہبہ، زکام وغیرہ اس کے اسباب سابقہ معده ہو سکتے ہیں۔

علامات

سرایت کے 1-5 دن بعد مرض کی ابتدائی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ علامات مندرہ (Premonitory Symptoms) کے طور پر کرب و اضطراب، تھلی، کسی قدر درد سر، خفیف نزلہ اور درد مفاصل وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سردی/ جاڑا آکر بخار چڑھتا ہے اور درجہ حرارت 102-104 ف پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کمی دیشی بھی ہوتی رہتی ہے، سر میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، گدی کے مقام پر درد اور بھی شدت کے ساتھ

ہوتا ہے، دوار (سرچکرائنا Vertigo) کی شکایت ہوتی ہے، تشنج بھی ہوتا ہے، اعضاء شکنی اور غیر معمولی مکان معلوم ہوتی ہے، گردن کے عضلات اکڑ کر سخت ہو جاتے ہیں، قبض/اسہال کی شکایت ہوتی ہے، چہرے اور آنکھ کے عضلات کے مفلوج ہو جانے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ بھیٹکا پن بھی ہوتا ہے، تنفس سریع اور بعض اوقات جھٹکے کے ساتھ ہوتا ہے، نبض بے قاعدہ اور بٹلی چلتی ہے، ابتدا میں اگرچہ متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے، جلد کے نیچے جریان خون ہونے کی وجہ سے جسم پر داغ/دھبے پڑ جاتے ہیں۔

اگر نخاع کی اعشیہ کے ساتھ دماغ کی اعشیہ میں بھی التهاب پیدا ہو جائے تو پھر علامات نہایت شدید ہوتی ہیں، شدید ہڈیان ہوتا ہے، بے ہوشی ہو سکتی ہے (اسی صورت کو جالینوس نے حمی عشیہ قرار دیا ہے) مریض بستر پر ایک ہی پہلو لیٹا رہتا ہے، اس کا سر پیچھے نیچے کی طرف کھینچا ہوا ہوتا ہے، پنڈلیاں رانوں کی طرف مڑی ہوتی اور شکم کے دائیں پہلو کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ بچوں میں یہ صورت بعض اوقات اس قدر شدید ہوتی ہے کہ کھوپڑی کا پچھلا حصہ، سرین سے لگ جاتا ہے۔

ذیل میں اس کی جملہ اقسام کی علامتوں کا علاحدہ علاحدہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

(I) حمی دماغی نخاعی خفیف

اس میں عوارض میں بہت زیادہ شدید نہیں ہوتی بلکہ یہ اس قدر خفیف ہوتے ہیں کہ بعض اوقات مریض کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صورت عام طور سے دہائی ایام کے انحطاطی مرحلے میں پائی جاتی ہے۔

(II) حمی دماغی نخاعی تحت الحاد

مرض کا آغاز لرزہ، تے، بخار اور درد سر سے ہوتا ہے اور یہ عوارض ایک بیک رونما ہوتے ہیں، آنکھ کے طبقہ ملتئمہ، کان، حلق وغیرہ میں نزلاوی کیفیات بھی پائی جاتی ہیں، گردن، خاص طور سے گدی کے عضلات میں بھی صلابت اور شدید درد کا احساس ہوتا ہے،

کرب و اضطراب اور ذکاوت حس ہوتی ہے، روشنی اور شور شرابے سے نفرت ہوتی ہے، عام طور سے جوانوں میں لرزہ اور بچوں میں تشنجی کیفیات پائی جاتی ہیں، بعض اوقات عضلات چشم میں استرخا پیدا ہو جاتا ہے، درد سر گدی کے مقام پر نسبتاً زیادہ اور مسلسل ہوتا ہے، نبض غیر منتظم اور تنفس میں بے قاعدگی ہوتی ہے۔ عام طور سے 4-2 دن میں سرسامی علامات رونما ہونے لگتی ہیں، چہرہ کی رنگت بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ کبھی تو سرخ ہو جاتی ہے اور کبھی زردی پھیل جاتی ہے، مریض ایک پہلو پر اس بیٹ میں لیٹا ہوا ہوتا ہے کہ سر نیچے کی طرف کھنچا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور روشنی کا اثر بہت دیر سے قبول کرتی ہیں، شکم چپٹا اور تناؤ ہوا ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت بڑھ کر 102-105 فہنک پہنچ جاتا ہے، 5-6 دن بعد زیر جلد جریان خون ہو کر دھڑ اور اطراف (ہاتھ پیروں) پر گلابی رنگ کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ دھبے، حصہ کے دانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ناک، ٹھوڑی اور کنارہ دہن پر آبلے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں، مریض کی دماغی کیفیات متغیر ہو جاتی ہیں اور وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، بلکہ ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہلانے ڈلانے پر بڑی مشکل سے ہوش میں آتا ہے۔ اگر اس کی کروش بدل دی جائے تو وہ کچھ دیر بعد از خود اپنی اصل وضع پر آ جاتا ہے، بے خوابی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں درد سر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ایک یا دو بار، خاص طور سے رات کے وقت دورہ سا پڑتا ہے، اس وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، گردن کی صلابت اور تناؤ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سر پیچھے کی طرف کچھ زیادہ مڑ جاتا ہے اور پشت میں بھی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جسمانی حرارت بدستور بڑھا ہوا ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیشاب بار بار، زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، لاغری کا غلبہ ہوتا ہے، مناسب علاج/شفایابی کی صورت میں 21-14 دن میں عوارض میں کمی آنے لگتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آنے لگتا ہے، اس کے بعد بے خوابی، کرب و اضطراب میں افادہ ہوتا ہے، اس کے بعد گردن اور پشت کی صلابت اور تناؤ میں کمی واقع ہو کر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

(III) حمی دماغی نغاعی حاد

یہ صورت دماغی طور پر کثیر الوقوع ہے، اس کی علامات یک بیک نہایت شدت کے ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ بے خوابی، درد سر اور ہڈیان میں غیر معمولی شدت ہوتی ہے، اور مرض جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے، جسمانی درجہ حرارت بڑھ کر 104-106 ف ہو جاتا ہے، بخار کی کیفیت نوبتی ہوتی ہے۔ زیر جلد زف الدم ہوتا ہے۔ چنانچہ جسم پر داغ / دھبے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ناک اور کان سے بھی جریان خون ہوتا ہے، زبان میں خشکی اور تھمر تھراہٹ ہوتی ہے۔ 3-4 دن میں ہی مریض پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جس میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن مقام کمر پر سوراخ کر کے سوئی کے ذریعہ مادہ نکالنے سے بے ہوشی کی شدت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ورنہ تنفس اور نبض کی رفتار میں تیزی واقع ہوتی جاتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بھی بڑھتا جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں بے حس ہو جاتی ہیں اور طبقہ قرنیہ کی انعکاسی حرکات زائل ہوتی جاتی ہیں، جسم میں مخصوص قسم کی چیچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور پچھلے دلوں میں شدید استخوان دموئی ہونے کی وجہ سے احتباس تنفس ہوتا ہے اور مریض فوت ہو جاتا ہے۔

(IV) حمی دماغی نغاعی خبیث

اس میں عوارض نہایت درجہ شدید ہوتے ہیں، دماغی عوارض میں یک بیک اس قدر شدت آ جاتی ہے کہ 12 گھنٹے میں ہی مرض فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات دماغی علامات میں زیادہ شدت نہیں ہوتی، اس مرض میں 7-18 سال کے بچے / لڑکے بکثرت مبتلا ہوتے ہیں۔

بہر حال ان تمام انواع میں نغاعی رطوبات کے امتحان میں مرض کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور تشخیص آسان ہو جاتی ہے۔

حمی تیفسیہ (Typhus Fever) اور حمی دماغی نغاعی کی تشخیص میں بظاہر اشتباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذیل میں ان کی علامات فارقہ تحریر کی جا رہی ہے۔

تفریقی علامات

حمی تیفوسیہ Typhus Fever	حمی دماغی نخاعی Cerebro-spinal Fever
1- پیشانی پر درد ہوتا ہے۔	1- درد سر ہوتا ہے، جو گدی (تحدہ) میں نسبتاً شدید درد ہوتا ہے۔
2- ہڈیاں ہونے پر درد سر ختم ہو جاتا ہے	2- ہڈیاں کے ساتھ بھی درد سر ہوتا ہے۔
3- عضلات میں صلابت نہیں ہوتی۔	3- عضلات میں صلابت پہلے نمودار ہوتی ہے۔
4- نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔	4- نقاہت نسبتاً کم ہوتی ہے۔
5- بھیگنا پن (حول) نہیں ہوتا۔	5- بھیگنا پن (حول) پیدا ہو جاتا ہے۔
6- تشنج / استرخاء / فالج نہیں ہوتا۔	6- تشنج / استرخاء / فالج عام طور سے ہوتا ہے۔
7- چہرے سے بے خبری اور انتہائی بے وقوفی نمایاں ہوتی ہے۔	7- چہرے سے کرب و اضطراب کا پتہ چلتا ہے۔
8- جسمانی حرارت ابتدا مرض سے ہی شدید ہوتی ہے۔	8- حرارت جسمانی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور بعض اوقات 106 ف تک پہنچ جاتی ہے۔
9- نبض سریع چلتی ہے۔	9- نبض عام طور سے بطبی چلتی ہے۔
10- تے / متلی کی شکایت نہیں ہوتی۔	10- تے / متلی کی شکایت ہوتی ہے۔
11- جلد پرتوت کی مانند دانے نکل سکتے ہیں لیکن ہونٹ اور باجھیں ان سے محفوظ رہتی ہیں۔	11- ہونٹ اور باجھوں پر آبلے نمودار ہو سکتے ہیں۔
12- بحران ہوتا ہے۔	12- بحران نہیں ہوتا۔

اصول علاج

- 0 — سر پر سرد و غنیاں رکھیں۔
- 0 — حسب ضرورت سر اور کی فصد کھولیں۔
- 0 — مریض کو روشن اور ہوا دار کمرے میں رہنے کی ہدایت کریں، لیکن یہ اس قدر کشادہ نہ ہو کہ ہوا کا براہ راست اثر مریض پر پڑے۔
- 0 — حسب ضرورت ران، پنڈلی، بازو اور کلائیوں پر اوپر سے نیچے کی طرف ماس کر کے۔
- 0 — مناسب لٹھے بروئے کار لائیں تاکہ مریض ہوش میں آجائے۔
- 0 — رفع تشنج کریں۔
- 0 — جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال پر لانے کی کوشش کریں۔
- 0 — عوارض میں تخفیف کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر بروئے کار لائیں۔ چنانچہ اگر مریض بے ہوش ہو تو یہ تدبیر اختیار کریں۔
- عرق گلاب، عرق بید مشک، آب سیب، آب بہی، آب خیار، آب کشنیز سبز ہر ایک 12 ملی لیٹر صندل سفید، تخم کاہو، گل ارمنی ہر ایک 3 گرام، کافور ایک گرام..... کافور اور صندل کو عرق بید مشک اور عرق گلاب میں گھس کر محفوظ کر لیں اور گل ارمنی، تخم کاہو کو آب کشنیز، آب خیار میں پیس لیں اس کے بعد تمام دواؤں کو باہم ملا کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور 30 منٹ کے وقفہ سے مریض کو سونگھائیں۔
- رفع تشنج کے لیے یہ نسخے مفید ہیں:
- جند بید ستر، حلتیت، فرنیون، عاقر قرح ہموزن — تمام دواؤں کو پیس کر روغن قسط میں ملا کر طلاء کریں۔

جدوار خطائی، زہر مہرہ، کشنیز خشک ہر ایک 2 گرام، زچکور 10 گرام، برگ کو خشک 30 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر گرم پانی میں لیپ تیار کریں اور لگائیں۔
روغن بنفشہ، روغن بادام ہر ایک 85 ملی لیٹر، موم سفید 35 گرام، تخم خطمی 12 گرام — تمام دواؤں سے حسب دستور قیر و طی تیار کریں اور بروئے کار لائیں۔

روغن بادام، برانڈی ہموزن ملا کر 2-3 بار مالش کریں۔
صابن 12 گرام، زرد چوب (خوب باریک پیس ہوئی) 8 گرام، روغن ارغ 4 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو کوئیں، جب باہم مل جائیں تو پانی میں ملا کر جوش دیں اور اسی کا لیپ کریں۔

صندل سفید، تخم کا ہو مقشر، کشنیز خشک، گل بنفشہ، رسوت، ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق کو 135 ملی لیٹر میں پیس کر ضاد کے طور پر استعمال کرائیں، دن میں دو تین مرتبہ ضاد بدلیں۔

گل نیسو 60 گرام، کوکنار 12 گرام — دونوں کو پانی میں جوش دے گردن پر نکور کریں / گرم حالت میں گردن پر باندھیں۔

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے از حد مفید ہیں:

زر خشک، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم خیاریں، تخم کاسنی ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق نیلوفر، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ ہر ایک 50 ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور چھان کر شربت نیوں، شربت صندل ترش ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر صبح کے وقت نوش کرائیں — شام کے وقت اسی نسخہ میں آب انار 60 ملی لیٹر، شرب نیلوفر 25 ملی لیٹر کا اضافہ کریں۔


ہڑتال (گنودنی) 12 گرام، اسطوخودوس 60 گرام کے نغہہ میں گل حکمت کریں اور 10 کلو ایلوں کی آگ دیں — جب کشتہ تیار ہو جائے تو 25 ملی گرام ہماراہ مجون جو گراج 3 گرام کھلائیں — اس کے بعد عرق برنجاسف، عرق بادیان ہر ایک 75 ملی لیٹر شہد خالص 25 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

حمی اجامیہ *

MALARIA

اس مرض میں خون میں ایک مخصوص طفیلی کی سمیت، اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کی جڑ سے لرزہ، بخار اور دوسری شدید مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ مرض گرم ممالک، مرطوب، نمناک، گندے مقامات وغیرہ میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام



* ابتدا میں اس مرض کا باعث گندی ہوا کو قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے لاطینی زبان میں اس کا نام "Mal" بمعنی گندی، "Aria" بمعنی ہوا، رکھا گیا تھا۔ گویا اہل اس کو گندی، زہریلی ہوا کا نتیجہ تصور کرتے تھے، جو گرم اور مرطوب مقامات میں باقی مادوں کے متعفن ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات نے ان اسباب کو اصل سبب قرار نہ دے کر اسباب محرک کے زمرے میں رکھا ہے، کہ یہ اسباب پھمکی تولید میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا لاطینی نام برقرار رہا۔

اسباب

یہ مرض ایک واحد الخلیہ طفیلی، پلازموڈیم (Plasmodium) کی درج ذیل چار اقسام سے پیدا ہوتا ہے۔

(I) پلازموڈیم وائیوگس Plasmodium Vivax

(II) پلازموڈیم اوویل Plasmodium Ovale

(III) پلازموڈیم ملیری Plasmodium Malarie

(IV) پلازموڈیم فلیسی پیرم Plasmodium Falciprum

یہ مرض مادہ، انافلیز نامی مچھر کے کاٹے سے رونما ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ملیریا کے اس طفیلی (Parasite) کی زندگی دوا دار پر مشتمل ہے۔

(I) انسان میں — غیر جنسی دور۔

(II) مچھر میں — جنسی دور۔

اس طفیلی پلازموڈیم (Plasmodium Parasite) کا غیر جنسی دور بھی دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔

(الف) پری اریٹھروسائٹک شائیزوگونی (Pre-Erythrocytic Schizogony)

(ب) اریٹھروسائٹک شائیزوگونی (Erythrocytic Schizogony)

پری اریٹھروسائٹک شائیزوگونی

یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مادہ انافلیز مچھر انسان کو کاٹتی ہے اور پلازموڈیم کے متعدد اسپوروزوائیٹ (Sporozoite) اس کے تھوک کے ساتھ انسان کے خون میں پہنچ جاتے ہیں اور صرف 30 منٹ بعد ہی یہ جگر، طحال میں پہنچ کر ایک غلیہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، تقد یہ کے بعد اس مرحلے میں اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور ان کا نام شائیزووزوائیٹ (Schizozoite) ہو جاتا ہے۔ ان کی نوات میں مائیٹوسس کا عمل ہو کر

ہڑتال ورقی (حسب ضرورت) کو پوست بندی کے درمیان کندش تازہ 250 گرام کے تھدہ میں گل حکمت کریں اور 10 کلوگرام ایلوں کی آگ پر کشتہ تیار کریں اور 75-125 ملی گرام، مونیر منقی میں کھلائیں۔ 120 ملی گرام ہمراہ جوارش جالینوس 7 گرام بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے بعد گاؤ زبان، مکوء ہر ایک 5 گرام، اسطوخودوس 3 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

افیون، زعفران، سم الفار ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق پیاز 250 ملی لیٹر میں کھل کر کے غلول بنائیں اور ایک بڑے پیاز کو اندر سے خالی کر کے اس میں بھر دیں اور گل حکمت کر کے بھوبھل میں قشویہ کریں۔ اس کے بعد نکال کر پیاز کے ساتھ کھل کر کے باجرہ کے دانہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں ہمراہ شہد استعمال کرائیں۔ بخار کے رفع کرنے کے لیے منہج و مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل سرخ، گاؤ زبان ہر ایک 6 گرام، بنج کاسنی، اصل السوس، عنب الثعلب، شاہترہ ہر ایک 5 گرام، عتاب 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت 350 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور گلقتہ 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ بخار میں تخفیف ہونے کے وقت اسی نسخہ میں درج ادویہ کا اضافہ کر کے اسہال لائیں۔

ثناء کی 12 گرام، مغز فلوس خیار ضمیر 60 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر، حسب دستور شامل کریں۔

اسہال آ رہے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

طباشیر، کشیز خشک بریاں، کثیرا، گل ارنی، اسپنول مسلم ہموزن، اسپنول کے علاوہ تمام دواؤں کو سفوف کی طرح کر کے اسپنول ملا کر 7 گرام کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خشکاش، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک 7 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، پانی میں نکال کر شربت خشکاش 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

قبض کی صورت میں خفیف ملینات/خمیرہ بنفشہ 12 گرام کھلائیں۔
 ضعف کی صورت میں یہ نسخے سودمند ہیں:
 دواء المسک معتدل جواہر دالی 5 گرام، عرق گاؤ زبان 85 ملی لیٹر کے ساتھ
 استعمال کرائیں۔
 خمیرہ آبریشم شیرہ عناب والا 5 گرام کھلائیں۔
 0 — فصد کھولیں، اس مقصد کے تحت سرارو کی فصد کھولنا سودمند ہے، لیکن اس
 بات کی احتیاط لازمی ہے کہ خون کا اخراج بہت زیادہ نہ ہو — بلکہ فصد کی بجائے پنڈلیوں پر
 سمجھ کرنا زیادہ موزوں ہے۔
 گردن کے دونوں جانب جو تکیں لگائیں۔



اصول علاج

- 0 — سر پر سرد و غنیاں رکھیں۔
- 0 — حسب ضرورت سر اور کی فصد کھولیں۔
- 0 — مریض کو روشن اور ہوا دار کمرے میں رہنے کی ہدایت کریں، لیکن یہ اس قدر ارشاد نہ ہو کہ ہوا کا براہ راست اثر مریض پر پڑے۔
- 0 — حسب ضرورت ران، پنڈلی، بازو اور کلائیوں پر اوپر سے نیچے کی طرف ماس کر رہیں۔
- 0 — مناسب لٹھے بروئے کار لائیں تاکہ مریض ہوش میں آجائے۔
- 0 — رفع تشنج کریں۔
- 0 — جسمانی درجہ حرارت کو اعتدال پر لانے کی کوشش کریں۔
- 0 — عوارض میں تخفیف کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر بروئے کار لائیں۔ چنانچہ اگر مریض بے ہوش ہو تو یہ تدبیر اختیار کریں۔
- عرق گلاب، عرق بید مشک، آب سیب، آب بہی، آب خیار، آب کشنیز سبز ہر ایک 12 ملی لیٹر صندل سفید، تخم کاہو، گل ارمنی ہر ایک 3 گرام، کافور ایک گرام..... کافور اور صندل کو عرق بید مشک اور عرق گلاب میں گھس کر محفوظ کر لیں اور گل ارمنی، تخم کاہو کو آب کشنیز، آب خیار میں پیس لیں اس کے بعد تمام دواؤں کو باہم ملا کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور 30 منٹ کے وقفہ سے مریض کو سونگھائیں۔
- رفع تشنج کے لیے یہ نسخے مفید ہیں:
- جند بیدستر، حلتیت، فرنیون، عاقر قرعہ، ہوزن — تمام دواؤں کو پیس کر روغن قسط میں ملا کر طلاء کریں۔

جدوار خطائی، زہر مہرہ، کشیز خشک ہر ایک 2 گرام، زنجبور 10 گرام، برگ مکو خشک 30 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر گرم پانی میں لیپ تیار کریں اور لگائیں۔
روغن بنفشہ، روغن بادام ہر ایک 85 ملی لیٹر، موم سفید 35 گرام، تخم خطمی 12 گرام — تمام دواؤں سے حسب دستور قیر و طی تیار کریں اور بروئے کار لائیں۔

روغن بادام، برانڈی، ہموزن ملا کر 2-3 بار مالش کریں۔
صابن 12 گرام، زرد چوب (خوب باریک پیس ہوئی) 8 گرام، روغن ارط 4 ملی لیٹر — تمام دواؤں کو کوئیں، جب باہم مل جائیں تو پانی میں ملا کر جوش دیں اور اسی کا لیپ کریں۔

صندل سفید، تخم کاہو، کشیز خشک، گل بنفشہ، رسوت، ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق کو 135 ملی لیٹر میں پیس کر ضاد کے طور پر استعمال کرائیں، دن میں دو تین مرتبہ ضاد بدلیں۔

گل نیسو 60 گرام، کوکنار 12 گرام — دونوں کو پانی میں جوش دے گردن پر کلور کریں / گرم حالت میں گردن پر باندھیں۔

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے از حد مفید ہیں:

زر خشک، مغز تخم کدو، شیریں، مغز تخم خیاریں، تخم کاسنی ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق نیلوفر، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ ہر ایک 50 ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور چھان کر شربت نیو، شربت صندل ترش ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر صبح کے وقت نوش کرائیں — شام کے وقت اسی نسخہ میں آب انار 60 ملی لیٹر، شرب نیلوفر 25 ملی لیٹر کا اضافہ کریں۔

ہڑتال (گنڈیتی) 12 گرام، اسطوخودوس 60 گرام کے نغہہ میں گل حکمت کریں اور 10 کلو ایلوں کی آگ دیں — جب کشتہ تیار ہو جائے تو 25 ملی گرام ہمراہ میون جو گراج 3 گرام کھلائیں — اس کے بعد عرق برنجاسف، عرق بادیان ہر ایک 75 ملی لیٹر شہد خالص 25 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

ہڑتال ورتی (حسب ضرورت) کو پوست بندی ہندی کے درمیان کندش تازہ
250 گرام کے نغہہ میں گل حکمت کریں اور 10 کلوگرام اپلوں کی آگ پر کشتہ تیار کریں
اور 75-125 ملی گرام، مونیر حنقی میں کھلائیں۔ 120 ملی گرام ہمراہ جوارش جالینوس
7 گرام بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے بعد گاؤ زبان، کلوہ ہر ایک 5 گرام، اسطوخودوس 3
گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام سے
شیریں کر کے نوش کرائیں۔

افیون، زعفران، سم الفار ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق پیاز 250
ملی لیٹر میں کھل کر کے غلولہ بنائیں اور ایک بڑے پیاز کو اندر سے خالی کر کے اس میں بھر
دیں اور گل حکمت کر کے بھوبھل میں تشویہ کریں۔ اس کے بعد نکال کر پیاز کے ساتھ کھل
کر کے باجرہ کے دانہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں ہمراہ شہد استعمال کرائیں۔
بخار کے رفع کرنے کے لیے منہج و مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل سرخ، گاؤ زبان ہر ایک 6 گرام، بیج کاسنی، اصل السوس،
عنب الثعلب، شاہترہ ہر ایک 5 گرام، عناب 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت
350 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور گلقتید 25 گرام حل
کر کے نوش کرائیں۔ بخار میں تخفیف ہونے کے وقت اسی نسخہ میں درج ادویہ کا اضافہ
کر کے اسہال لائیں۔
شاء کلی 12 گرام، مغز فلوس خیار خمیر 60 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر، حسب
دستور شامل کریں۔

اسہال آ رہے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:
طباشیر، کشیز خشک بریاں، کتیرا، گل ارمنی، اسپغول مسلم ہموزن، اسپغول کے
علاوہ تمام دواؤں کو سفوف کی طرح کر کے اسپغول ملا کر 7 گرام کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ
ختم خشخاش، شیرہ ختم خرفہ ہر ایک 7 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، پانی میں نکال کر شربت
خشخاش 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

قبض کی صورت میں خفیف ملینات/خیرہ بنفشہ 12 گرام کھلائیں۔
 ضعف کی صورت میں یہ نسخے سودمند ہیں:
 دواء المسک معتدل جواہر والی 5 گرام، عرق گاؤ زبان 85 ملی لیٹر کے ساتھ
 استعمال کرائیں۔
 خیرہ آبریشم شیرہ عتاب والا 5 گرام کھلائیں۔
 0 — فصد کھولیں، اس مقصد کے تحت سرارو کی فصد کھولنا سودمند ہے، لیکن اس
 بات کی احتیاط لازمی ہے کہ خون کا اخراج بہت زیادہ نہ ہو — بلکہ فصد کی بجائے پنڈلیوں پر
 ہچھنے کرنا زیادہ موزوں ہے۔
 گردن کے دونوں جانب جوئیں لگائیں۔



حمی اجامیہ *

MALARIA

اس مرض میں خون میں ایک مخصوص طفلی کی سمیت، اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کی جوش سے لرزہ، بخار اور دوسری شدید مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ مرض گرم ممالک، مرطوب، نمناک، گندے مقامات وغیرہ میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

حمی اجامیہ

Malarial Fever

حمی اجامیہ لازمہ	حمی اجامیہ دائرہ / تائبہ
Malarial Remittent Fever	Mintermitent Fever

* ابتدا میں اس مرض کا باعث گندی ہوا کو قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے لاطینی زبان میں اس کا نام "Mal" بمعنی گندی، "Aria" بمعنی ہوا، رکھا گیا تھا۔ گویا اطباء اس کو گندی، زہریلی ہوا کا نتیجہ تصور کرتے تھے، جو گرم اور مرطوب مقامات میں مہلتی مادوں کے متعفن ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات نے ان اسباب کو اہل سبب قرار نہ دے کر اسباب محرک کے زمرے میں رکھا ہے، کہ یہ اسباب پھمڑکی تولید میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا لاطینی نام برقرار رہا۔

اسباب

یہ مرض ایک واحد الخلیہ طفیلی، پلازموڈیم (Plasmodium) کی درج ذیل چار اقسام سے پیدا ہوتا ہے۔

(I) پلازموڈیم وائیوکس Plasmodium Vivax

(II) پلازموڈیم اوویل Plasmodium Ovale

(III) پلازموڈیم لمیری Plasmodium Malarie

(IV) پلازموڈیم فلیسی پیرم Plasmodium Falciprum

یہ مرض مادہ، انافلیر نامی مچھر کے کانٹے سے رونما ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ لمیریا کے اس طفیلی (Parasite) کی زندگی دوا دوار پر مشتمل ہے۔

(I) انسان میں — غیر جنسی دور۔

(II) مچھر میں — جنسی دور۔

اس طفیلی پلازموڈیم (Plasmodium Parasite) کا غیر جنسی دور بھی دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔

(الف) پری اریتھروسائیک شائیزوگونی (Pre-Erythrocytic Schizogony)

(ب) اریتھروسائیک شائیزوگونی (Erythrocytic Schizogony)

پری اریتھروسائیک شائیزوگونی

یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مادہ انافلیر مچھر انسان کو کاٹتی ہے اور پلازموڈیم کے متعدد اسپوروزوائیٹ (Sporozoite) اس کے تھوک کے ساتھ انسان کے خون میں پہنچ جاتے ہیں اور صرف 30 منٹ بعد ہی یہ جگر، طحال میں پہنچ کر ایک خلیہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، بعد اس مرحلے میں اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور ان کا نام شائیزوڈوائیٹ (Schizozoite) ہو جاتا ہے۔ ان کی نوات میں مائیٹوسس کا عمل ہو کر

32-16 نوات بن جاتے ہیں اور ان کے اطراف میں کسی قدر سائیکو پلازم جمع ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے میں اس طفلی کا نام شائیزوزوائیٹ (Schizont) ہو جاتا ہے اور اس تقسیم کو شائیزوگونی کہا جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد شائیزوزوائیٹ پھٹ جاتا ہے اور شائیزوزوائیٹ طحال اور جگر کے خلیات میں آزاد ہو جاتے ہیں اور اب ان کو کرپٹوزوائیٹ / میروزوائیٹ کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے کو پری اریٹھرو سائیک مرحلہ کہا جاتا ہے، طحال / جگر کے خلیات کے پھٹنے کے بعد ان میں موجود کرپٹوزوائیٹ / میروزوائیٹ ان کے صحت مند خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان میں داخل ہو کر شائیزوزوائیٹ بناتے ہیں، جو دوبارہ تقسیم ہو کر پٹوزوائیٹ (Matacryptozoite) بناتے ہیں۔ اس مرحلے کو ایکسو اریٹھرو سائیک مرحلہ (Exo-Ery Throcytic Phase) کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں طفیل انسان کے خون میں آ جاتے ہیں اور یہ تمام مراحل کم و بیش 8-10 دن میں پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں اور اس کے بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔

اریٹھرو سائیک شائیزوگونی

انسانی خون میں پہنچنے کے بعد مینا کرپٹوزوائیٹس، خون کے سرخ ذرات R.B.C. میں داخل ہو کر ان کے سائیکو پلازم کو کھانے لگتے ہیں اور ان کی جسامت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد طفلی میں ایک طرح کا خلا (Vacuole) رونما ہوتا ہے اور نوات ایک کنارے پر آ جاتا ہے اور طفلی کا انگوٹھی کی طرح ہو جاتا ہے جس کو سگنیٹ رینگ (Signet Ring) کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جسم مزید بڑھتا ہے اور خلا غائب ہو جاتا ہے نیز طفلی کی شکل امیبا (Amoeba) کی طرح بے ڈول ہو جاتی ہے۔ اس ہیئت میں اس کو ٹروفوزوائیٹ (trophozoite) کہتے ہیں۔ یہ خون کے سرخ خلیہ کو پوری طرح بھر کر گول شکل اختیار کر لیتا ہے اور شائیزوزوائیٹ (Schizont) کہلاتا ہے۔ پھر اس میں شائیزوگونی کے طور پر تقسیم ہو کر 32-16 پروزوائیٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے سرخ خلیہ کے پھٹنے پر یہ میروزوائیٹ پلازما میں آزاد ہو جاتے ہیں اور یہ عمل بار بار ہونے

سے کسی مادے خون میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے کچکی اور سردی کے ساتھ بخار آتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ پلازموڈیم کی ہر قسم میں اریٹروسائٹک شائیزوگوئی کا مرحلہ مکمل ہونے میں الگ الگ مدت درکار ہوتی ہے۔

لفیلی کے جنسی دور (گیم یوگوئی Gametogony) کے بھی کئی مرحلے ہیں۔ انسانی خون کے سرخ ذرات میں داخل ہونے والے میروزوائیٹ (Merozoite) یا کریپٹوزوائیٹ (Cryptozoite) کی شکل بدل جاتی ہے اور اب ان کا نام گیمی ٹوسائٹس (Gametocyte) ہو جاتا ہے اور شکل اور حجم کے اعتبار سے ان کی علی الترتیب میکروگیمی ٹوسائٹس (Macro Gametocyte) اور مائیکروگیمی ٹوسائٹس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ مادہ انافلیر پچھر جب لیبریا میں مبتلا شخص کا خون پیتا ہے تو خون کے سرخ ذرات میں موجود یہ گیمی ٹوسائٹ پچھر کے معدہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ معدہ میں خون کے سرخ خلیہ کے تحلیل ہو جانے سے گیمی ٹوسائٹ آزاد ہو جاتے ہیں۔ میکروگیمی ٹوسائٹ کا نواۃ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک تو باہر نکل آتا ہے اور دوسرا سائیکلو پلازم میں قیام پذیر رہتا ہے۔ مائیکروگیمی ٹوسائٹ بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور آٹھ نئے مائیکروگیمی ٹوسائٹ بناتا ہے۔ یہ ابتدا میں بچے ہوئے سائیکلو پلازم سے متصل رہتے ہیں بعد میں علاحدہ ہو کر معدہ میں تیرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں عمل اخضاب (Fertilization) ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں زائی گوٹ (Zygote) وجود میں آتے ہیں۔ ابتدا میں یہ گول ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصہ بعد یہ حیات (Ascaris) کی شکل کے لیے ہو جاتے ہیں اور اوکائیٹ (Ookinete) کہلاتے ہیں۔ یہ رینگ کر پچھر کے معدہ کی دیوار میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی بیرونی تہ کو اپنی آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ اب ان کی شکل تبدیل ہو کر گول ہو جاتی ہے اور نام بھی بدل کر اوسسٹ (Oocyst) ہو جاتا ہے۔ میکرو/مائیکروگیمی ٹوسائٹ کی تقسیم کے بعد سے لے کر اس مرحلے تک کو سن گومی (Syngomy) کہا جاتا ہے۔

تغذیہ کے بعد اوسسٹ کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے نواۃ میں بھی تقسیم کا عمل ہوتا ہے نیز سائیکلو پلازم میں خلا پیدا ہوتا ہے اور اس طرح یہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہر

نواۃ کے اطراف میں کسی قدر سائیکو پلازم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا نام اسپرو زوائیٹ (Sporozite) اور نکوین کا مکمل اسپرو گونی (Sporogony) کہلاتا ہے۔

اسپرو زوائیٹ کی نشو و نما مکمل ہو جانے کے بعد اوسٹ پھٹ جاتا ہے اور ہزاروں اسپرو زوائیٹ چھھر کے معدہ میں آزاد ہو جاتے ہیں، پھر یہ تیرتے ہوئے چھھر کے تھوک کے غدد (غدد یقیہ) میں پہنچ جاتے ہیں اور جب اس طرح کا سرایت زدہ چھھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو پھر یہ انسان کے خون میں پہنچ کر غیر جنسی دور شروع کرتے ہیں اور مرض کے پھیلنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

علامات

علامات کے جائزہ سے قبل یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چھھر کے کاٹنے کے بعد 8-10 تک (جب تک طفلی ٹھال/چکر میں رہتا ہے) کوئی مرضی علامت رونما نہیں ہوتی۔ اس مدت کو 'مدت حضانت' (Incubation Period) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب طفلی خون میں پہنچ جاتے ہیں تو شائیز و گونی کا مرحلہ مکمل ہونے پر جب خون کے سرخ ذرات پھٹتے ہیں تو خون میں زہریلے (کمی) مادے کے پہنچنے کی وجہ سے (ایک مقررہ مدت کے بعد جو شائیز و گونی کا دورہ مکمل کرتی ہے) لرزہ اور سردی کے ساتھ بخار آتا ہے جو ملیریائی سمیت شائیز و گونی کے بعد کے سرخ ذرات کے پھٹنے سے خون میں شامل ہوتی ہے وہ درج ذیل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔

(I) بخار پیدا کرنے والی Pyrogenetic سمیت۔

(II) خون کو تحلیل کرنے والی Haemolytic سمیت۔

(III) خلیات کو مردہ کرنے والی Historic سمیت۔

حی اجامیہ ناسبہ

ابتدا میں (مدت حضانت) سستی اور کابلی محسوس ہوتی ہے، اعضا شکنی کی شکایت ہوتی ہے، جنائیاں آتی ہیں، بعض اوقات بے خوابی، بطلان/ضعف اشتہا اور دوار (سر

پکڑانا) کی شکایت ہوتی ہے، کبھی کبھی ان ابتدائی علامتوں کے رونما ہونے بغیر اصل علامات مرض ظاہر ہونے لگتی ہیں — سہولت کے نقطہ نظر سے ہم ان علامتوں کو درج ذیل درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) سردی کا درجہ

سستی، کسل مندی اور اعضا شکنی کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سردی معلوم ہونے لگتی ہے، سردی کا احساس عام طور سے پشت کے جانب سے شروع ہو کر بتدریج سارے جسم پر ہونے لگتا ہے اور بعض اوقات یکبارگی سردی محسوس ہوتی ہے۔ شدید لرزہ محسوس ہوتا ہے اور سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اگرچہ سردی کا احساس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بخار ہوتا ہے اور حرارت جسمانی 104-105 ف تک پہنچ جاتی ہے۔ منہ خشک اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، یہ درجہ ابتدا میں عام طور سے 60-90 منٹ تک رہتا ہے لیکن جب شائیز و گونی کا بار بار مرحلہ مکمل ہونے پر سمیت کا اثر کم ہو جاتا ہے اور یہ درجہ چند منٹ تک آ جاتا ہے اور بعض اوقات تو صرف چند ثانیہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری علامتوں کے طور پر گرانی سر، درد سر، ہڈیاں، بے ہوشی، سرعت تنفس، متلی اور تے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

(II) گرمی کا درجہ

سردی کا درجہ ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی رفتہ رفتہ سارا جسم گرم ہو جاتا ہے، شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، کپٹی کی شریانوں میں شدید تڑپ ہوتی ہے، نبض سریع اور متلی چلتی ہے، صفراوی علامات رونما ہوتی ہیں، مثلاً شدت کی پیاس، زبان خشک اور اس پر سفید فرجی ہوتی ہے، متلی اور تے کی بھی شکایت ہوتی ہے، پیشاب قلیل مقدار میں سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت 101-107 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ درجہ 3-4 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔

- | | |
|--|---|
| <p>3- حرارت جسمانی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور شاذ و نادر 104 ف سے زائد ہوتی ہے۔</p> <p>4- نبض بطنی چلتی ہے۔</p> <p>5- تشنج اور فالج کثیر الوقوع ہے۔</p> <p>6- قے کثرت سے ہوتی ہے۔</p> <p>7- عضلات میں صلابت ہوتی ہے۔</p> <p>8- چہرے سے اضطراب اور تردد ظاہر ہوتا ہے۔</p> <p>9- لب اور چہرے پر دانے/ دھبے نمودار ہوتے ہیں کہیں یہ شاذ و نادر ہی نکلتے ہیں۔</p> <p>10- بھیگنا پن ہو جاتا ہے۔</p> <p>11- بخران نہیں ہوتا۔</p> <p>12- نقاہت زیادہ نہیں ہوتی۔</p> | <p>3- جسمانی درجہ حرارت ابتدا سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔</p> <p>4- نبض سرع چلتی ہے۔</p> <p>5- تشنج عام طور سے نہیں ہوتا۔ شدید صورت میں البتہ ممکن ہے فالج نہیں ہوتا۔</p> <p>6- متلی اور قے کی شکایت ہو سکتی ہے۔</p> <p>7- عضلات میں صلابت نہیں ہوتی۔</p> <p>8- چہرے سے بے خبری کا اظہار ہوتا ہے۔</p> <p>9- لب اور چہرے کو چھوڑ کر دوسرے حصہ جسم پر قوتی نوعیت کے دھبے/ دانے نکلتے ہیں۔</p> <p>10- خول (بھینگا پن) نہیں ہوتا۔</p> <p>11- بخران ہوتا ہے۔</p> <p>12- نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے</p> |
|--|---|

تفریقی علامات

- | | |
|--|---|
| <p>حصبہ
Measles</p> <p>1- چوتھے دن دھبے/ طفحات رونما ہوتے ہیں۔</p> | <p>حُمی مطبقہ متزاکنہ/ حُمی تیفوسیہ
Typhus Fever</p> <p>1- عام طور سے 5 دن بعد جسم پر دھبے/ دانے نمودار ہوتے ہیں۔</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>2- چہرے پر طفحات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات ہلائی ہوتے ہیں۔</p> <p>4- طفحات سے پہلے شدید سردی محسوس ہوتی ہے۔</p> <p>5- نقاہت نسبتاً کم ہوتی ہے۔</p> <p>6- حلق سرخ اور چمکدار ہوتی ہے۔</p> <p>7- رنگت سرخ ہوتی ہے۔</p> <p>8- دبائے سے غائب ہو جاتے ہیں۔</p> | <p>2- سر کے آس پاس دھبے/دانے/طفحات بہت کم ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات ہلائی نہیں ہوتے۔</p> <p>4- طفحات نکلنے سے پہلے دماغی علامات شدید ہوتی ہیں۔</p> <p>5- نقاہت غیر معمولی ہوتی ہے۔</p> <p>6- حلق کی عشاء غلطی طبعی رنگ پر ہوتی ہے۔</p> <p>7- طفحات کی رنگت توتی (سرخ سیاہی مائل) ہوتی ہے</p> <p>8- کچھ عرصہ بعد دبائے سے غائب نہیں ہوتے۔</p> |
|---|--|

تفریقی علامات

- | | |
|--|---|
| <p>جدری
Small Pox</p> <p>1- طفحات تیسرے دن نمودار ہوتے ہیں اور بالوں کے پاس پہلے نکلتے ہیں اور مخصوص انداز کے ہوتے ہیں۔</p> <p>2- درد گلو ہوتا ہے۔</p> <p>3- عضلاتی نقاہت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔</p> | <p>حمی مطبقہ متزاہدہ
Typhus Fever</p> <p>1- طفحات 5 ویں دن اور پہلے جسم کے درمیانی حصہ پر نمودار ہوتے ہیں اور ان کی نوعیت مخصوص ہوتی ہے۔</p> <p>2- درد گلو کی شکایت نہیں ہوتی۔</p> <p>3- شدید عضلاتی نقاہت ہوتی ہے۔</p> |
|--|---|

اصول علاج

- 0 — مریض کو صاف ستھرے، ہوادار کمرے میں رکھیں۔
- 0 — عوارض کے تدارک/ازالہ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔

5-6 دن کے بعد درج ذیل نسخہ بروئے کار لائیں:

گل بنفشہ، بیج کاسنی ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، مویر منقہ 5 عدد۔ تمام دواؤں کو 375 ملی لیٹر نیم گرم پانی میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر خمیرہ بنفشہ 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ چھٹے دن اس میں برگ سناہ کی 25 گرام، گلقد 50 گرام کا اضافہ کریں۔

حمی اجامیہ لازمہ میں اس ترکیب و ترتیب سے دوائیں استعمال کرائیں:

تمرید کی غرض سے 3-4 دن یہ نسخہ دیں:

تمر ہندی 35 گرام، آلو بخارا 7 عدد۔ دونوں کو 250 ملی لیٹر پانی میں بھگو کر دیں پھر مل چھان کر شیرہ ختم کاسنی، شیر ختم کدو ہر ایک 6 گرام لعاب بہدانہ 3 گرام، عرق مکوہ، عرق بید مشک، عرق شاہترہ ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر ملائیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر کا اضافہ کر کے نوش کرائیں۔

پانچویں دن نفع کی غرض سے یہ نسخہ دیں:

گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر، ختم کاسنی نیمکوفہ ہر ایک 6 گرام، تمر ہندی 25 گرام، آلو بخارا 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت 375 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے خوب کلاں 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ دوسرے دن اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کا اضافہ کریں۔


شیر خشت، گلقد ہر ایک 50 گرام، آلو بخارا 15 عدد حسب دستور شامل کریں۔

اس کے دوسرے دن یہ نسخہ دیں:

گل بنفشہ، بیج کاسنی ہر ایک 7.5 گرام، بادیان 7 گرام، گاؤ زبان، 5 گرام، مویر منقہ 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کے وقت مل چھان کر گلقد آفتابی 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ اگر پیاس کا غلبہ، مٹلی یا تھکے کی شکایت ہو تو اس نسخہ میں ختم کاسنی، گل نیلوفر ہر ایک 5 گرام، آلو بخارا 5 عدد کا اضافہ کر دیں۔

شام کے وقت یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شیرہ مغز، تخم کدوئے شیریں 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد، عرق گاؤ زبان 150
 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
 اس مرض میں کونین اور اس کے مرکبات مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام
 احتیاطی صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

حمی نلسیہ *

RELAPSING FEVER

اس مرض میں 7-8 دن تک جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اسی قدر وقفہ دے کر دوسری، تیسری مرتبہ بخار چڑھتا اترتا ہے۔ یہ ایک قسم کا متعدی، وبائی بخار ہے جو ایک مخصوص جراثیم کے ذریعہ قحط کے دنوں میں عارض ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسکو حمی سبب (سات دن والا بخار) حمی قحطیہ (قحط والا بخار) بھی کہتے ہیں۔

اسباب

اسپائروکیٹ (Spirochaete) نامی خوردبینی جراثیم۔ اس کو اسپائرونیما (Spirochaeta) بھی کہتے ہیں۔ یہ طفیلی مریض انسان سے کھٹل / جوں کے ذریعہ پھلتا انسان تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب کھٹل / جوں مریض انسان کو کائٹی / خون چوستی ہے تو یہ اس خون میں شامل ہو کر اس کے شکم میں پہنچ جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد جب یہ کھٹل / جوں صحت مند انسان کو کائٹی ہے تو یہ سہڈ کے ذریعہ صحت مند انسان کے دوران خون میں شامل

* حمی قحطیہ حمی رلپس (لوٹنے والا بخار) وغیرہ، اس کے دوسرے نام ہیں۔

ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد مرضی علامات رونما کرتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس طفیلی کی مختلف انواع، مرض کا باعث ہوتی ہیں۔ چنانچہ یورپ میں اسپائرونیما ریکرنٹس (Spironema Recurrentis) امریکہ میں اسپائرونیما نوویائی (Spironema Novyi) شمالی افریقہ میں اسپائرونیما بربرا (Spironema Berbera) وسطی افریقہ میں اسپائرونیما ڈوٹونی (Spironema Dottoni) اور ایشیا میں اسپائرونیما سارٹری (Spironema sarteni) اس مرض کا موجب ہوتا ہے۔

قحط قاذ کشی، غلاظت، کثافت اور غیر معمولی گھنی بستیاں، اسباب محرک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ جسمانی خراش وغیرہ کے ذریعہ بھی یہ جراثیم سرایت کر سکتا ہے۔

علامات

علامات سرایت 5-7 دن بعد رونما ہوتی ہیں، ایک بیک لرزہ اور جاڑے کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، کمر، ہاتھ، پیر اور پیشانی پر شدید درد ہوتا ہے اور اطراف (ہاتھ پاؤں وغیرہ) میں تشنج بھی ہوتا ہے، مریض کم عمر ہوتو قے کی شکایت لازمی طور پر ہوتی ہے۔ ویسے 75 فیصد مریضوں کو قے ہوتی ہے جس میں صفرا/خون کی دھاریاں ہوتی ہیں، بخار عام طور سے غروب آفتاب کے وقت شروع ہوتا ہے اور کبھی صبح کے وقت چڑھتا ہے۔ چند گھنٹوں میں حرارت 103-105 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ نبض فی منٹ 120-140 چلتی ہے، حرارت کے تناسب سے اس میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قبض کی شکایت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے، اسہال بھی آسکتے ہیں۔ آنکھوں میں چمک ہوتی ہے اور وہ دھنس جاتی ہیں، سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، زبان میل ہوتی ہے، کنارے سرخ ہوتے ہیں، فم معدہ پر درد محسوس ہوتا ہے، طحال اور جگر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں درد بھی محسوس ہوتا ہے، بخار کم ہونے پر زبان تر اور صاف ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات قلب کے بطن ایمن (دائنی طرف کے بطن) پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بکثرت پسینہ آتا ہے، پیر کی درید میں خون نمود ہو جاتا ہے اور کبھی غائریائی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بخار کے دوران پیشاب میں رطوبت، بیضہ، صفرا اور

کسی قدر خون کی آمیزش ہوتی ہے، اس کی مقدار کم اور رنگ گہری سرخ ہوتی ہے۔ شدید/ مہلک صورتوں میں یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جسم پر بے قاعدہ شکل کے محدود تعداد میں چھوٹے چھوٹے دانے سینے، شکم اور بازو پر نکلتے ہیں، یہ دانے تیسرے، چوتھے دن نکلتے ہیں، کبھی کبھی نرف دماغی بھی ہوتا ہے۔ 7-8 دن بعد یہ عوارض ختم ہو جاتے ہیں لیکن 7-8 دن کے بعد ہی مرض کا دوسرا حملہ ہوتا ہے، ضعف کا غلبہ ہوتا ہے اور مرض کی دوسری علامت لوٹ آتی ہیں، بخار 105-106 فہنک پہنچ جاتا ہے مگر اس کی مدت کم ہوتی ہے، جگر اور طحال کا بڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے تاہم یرقان اور شدید تھکے کی شکایت ایک تہائی مریضوں میں ہوتی ہے اس کے بعد وقفہ شروع ہو جاتا ہے۔ 10-12 دن بعد مرض کا پھر حملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مدت اور بھی کم 5-2 دن ہوتی ہے اور نوعیت (انٹرمیٹنٹ Intermittent) یا (ریکیٹنٹ Relapsing) ہوتی ہے۔ اس میں عام طور سے بحران واقع نہیں ہوتا۔ تیسرا دورہ بالعموم وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اگر واقع بھی ہو تو مدت نہایت کم 3-4 دن ہوتی ہے۔ عوارض میں بھی بہت زیادہ شدت نہیں ہوتی۔

امراضیاتی نقطہ نظر سے اس مرض کے طفیلی بہت زیادہ تعداد میں خون میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا مشاہدہ ابتدائی ایام میں ہی کیا جاسکتا ہے، بحران/ وقفہ کے ایام میں یہ خون سے غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے حملہ کے ابتدائی ایام میں بھی ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، خون کے سرخ ذرات میں کمی اور سفید کریات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

حمی متفرقہ اور تیفوسہ سے اس کا اشتباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

حمی تیفوسہ Typhus Fever	حمی نکسیہ Relapsing Fever
1- مرض کے آغاز میں ہی ہڈیانی کیفیت	1- مرض کا آغاز یک بیک لرزہ اور شدید

- | | |
|--------------------------------------|--|
| طاری ہو جاتی ہے۔ | بخار سے ہوتا ہے، ہڈیوں رات کے وقت، شدید صورتوں میں پیش آتا ہے۔ |
| 2- طمحات عام طور سے نکلتے ہیں۔ | 2- جسم پر دانے شاذ و نادر نکلتے ہیں۔ |
| 3- عضلات میں کمزوری ہوتی ہے۔ | 3- عضلات اور مفاصل میں شدید درد ہوتا ہے۔ |
| 4- طبعی حالت میں ہوتی ہے۔ | 4- طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ |
| 5- 14 ویں دن بحران ہوتا ہے۔ | 5- 7 ویں دن بحران ہوتا ہے۔ |
| 6- مرض کا دوبارہ حملہ نہیں ہوتا۔ | 6- 8-9 دن بعد مرض کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے۔ |
| 7- نبض ابتدا میں سریع نہیں چلتی۔ | 7- نبض متواتر 120-140 شاذ و نادر 150-170 فی منٹ چلتی ہے۔ |
| 8- اس طرح کی بطنی علامات نہیں ہوتیں۔ | 8- تے (صفراء/خون کی دھاریاں آمیز) اور لم معدہ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ |
| 9- اکثر غدد میں بڑھاؤ ہوتا ہے۔ | 9- عام طور سے غدد میں بڑھاؤ نہیں ہوتا۔ |

تفریقی علامات

- | | |
|---|--|
| حمی متفرقہ
Intermittent Fever | حمی نلکیہ
Relapsing Fever |
| 1- حرارت میں روزانہ تخفیف ہوتی رہتی ہے۔ | 1- وقفہ تک حرارت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ |
| 2- نبض بہت سریع نہیں چلتی۔ | 2- نبض بہت سریع چلتی ہے۔ |
| 3- عضلات/مفاصل میں شدید نوعیت کا درد نہیں ہوتا۔ | 3- مفاصل میں شدید درد ہوتا ہے۔ |
| 4- مرض عود نہیں کرتا۔ | 4- مرض کا دوبارہ، سہ بارہ حملہ ہوتا ہے۔ |

- | | |
|--|---|
| 5- پینہ آنے سے حرارت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ | 5- پینہ آنے سے حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ |
| 6- بحران واقع ہوتا ہے۔ | 6- بحران واقع نہیں ہوتا۔ |

اصول علاج

- 0 — مریض کو صاف ستھرے، ہوادار کمرے میں قیام کرنے کی ہدایت کریں۔
- 0 — سرلیج، لہضم اور مقوی غذاؤں کے ذریعہ طاقت کو برقرار رکھنے کا اہتمام کریں کیونکہ بار بار کے بحران سے فحاشت کا غلبہ ہو سکتا ہے۔
- 0 — مہروات اور مسکنات استعمال کرائیں۔
- 0 — عوارض کی روک تھام / ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کریں:
- حرارت کو زائل کرنے کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔
- زہر مہرہ، صندل سفید ہر ایک 1 گرام عرق گلاب میں گھس کر طباشیر (پسی ہوئی) 1 گرام ملا کر خیرہ صندل 5 گرام کے ساتھ کھلائیں۔ اس کے بعد شربت حاض، اترج 12 گرام میں عرق بید مشک، عرق نیلوفر، عرق کیوڑہ ہر ایک 75 ملی لیٹر ملا کر لعاب بہدانہ لعاب اسپنول ہر ایک 3 گرام، شیرہ تخم خرف، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک 6 گرام کو پانی میں نکال کر باہم ملا کر نوش کرائیں۔
- قبض کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:
- تمر ہندی 90 گرام، پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور سناہ کی 7 گرام باریک پیس کر ملائیں اور نوش کرائیں۔ شدید قبض ہو تو شربت ورد 50 ملی لیٹر کا اضافہ کریں۔ اس کے بعد یہ نسخے دیں:
- تخم خبازی، گل نیلوفر ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، عتاب، آلو بخارا ہر

ایک 5 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو فیروزہ بنشہ 50 گرام ملا کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں — حرارت شدید ہو تو تخم خیارین، تخم کاسنی ہر ایک 7 گرام کا اضافہ کرنا مزید سودمند ہے۔

شیرہ تخم خرفہ، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، لعاب بہدانہ ہر ایک 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد — پانی میں نکال کر شربت عناب 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

قرص طباشیر کافوری 3 گرم کو رب انار ترش 12 ملی لیٹر چٹائیں — اور مغز تخم خیارین، مغز تخم کدوئے شیریں، تخم کاسنی، زرشک ہر ایک 9 گرام، تخم کاہو 7 گرام، آلو بخارا 7 عدد — تمام دواؤں کا عرق بید مشک، عرق بید سادہ، عرق نیلوفر عرق گلاب ہر ایک 75 ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت نیلوفر، شربت لیون ہر ایک 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

0 — عوارض کے ازالہ کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں:

بے خوابی اور درد کی صورت میں خارجی تدابیر کے ساتھ ساتھ داخلی طور پر تخم خشکاش 7 گرام، تخم کاہو 4 گرام کا شیرہ نکال کر نبات سفید 25 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

صفراوی تے کی صورت میں یہ نسخہ دیں:

تمر ہندی 60 گرام، تخم خرفہ، زرشک، گل نیلوفر ہر ایک 6 گرام، آلو بخارا 9 عدد، مغز تخم کنول گھٹھ 10 عدد — تمام دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں بھگو دیں اور پھر مل چھان کر سبکجبین، شربت نیلوفر ہر ایک 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

زحیر / اسہال کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:

کتیرا بریاں، صمغ عربی بریاں، نشاستہ بریاں ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کا سفوف تیار کریں اور اس کو کھلا کر لعاب بہدانہ 2 گرام، لعاب ریشہ عطلی 4 گرام عرق گلاب 125 ملی لیٹر میں نکال کر خیار تخم 9 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

اسہاس بول / بول الدم کی صورت میں یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خر بڑہ، شیرہ خار خشک خورد ہر ایک 6 گرام کو پانی میں نکال کر شربت بزروی 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

جگر: بال بڑھ گئے ہوں تو اطباء یہ نسخہ استعمال کراتے ہیں:

قرص گل/قرص زرنشک کبیر 4 گرام کو پیس کر شربت 12 ملی لیٹر ملا کر کھائیں۔
اس کے بعد شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خرفہ، شیرہ تخم کاسنی ہر ایک 6 گرام پانی میں ملا کر سبببین
بزوری 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ قرص گل کا نسخہ یہ ہے:

گل سرخ 85 گرام، رب السوس 60 گرام، فتاح اذخر، سنبل الطیب، سلیخہ،
مرکی، زعفران، مصطکی ہر ایک 25 گرام۔ زعفران، مرکی کو سرکہ انگوری میں حل کریں اور
باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر قرص بنائیں۔

قرص زرنشک کا نسخہ یہ ہے:

زرنشک 90 گرام، تخم کاسنی، تخم خرفہ، مغز تخم خیارین ہر ایک 18 گرام، گل سرخ
30 گرام، سنبل الطیب، ریوند چینی ہر ایک 7 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب
اسچول میں گوندھ کر اقرص بنائیں۔

ضعف کی صورت میں یہ نسخے از حد مفید ہیں:

دواء المسک بارد 5 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان، عرق بید مشک ہر ایک 75 ملی لیٹر
استعمال کرائیں۔ ضعف کی حالت میں مفید ہے۔

بحران کے بعد کی کمزوری میں یہ نسخہ مفید ہے:

دواء المسک حار 5 گرام ہمراہ ماء اللہم عبیری 60 ملی لیٹر، استعمال کرائیں۔

حمی کے بعد کی کمزوری میں یہ نسخہ دیں۔

مرہی آملہ 1 عدد ورق، فقرہ 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد عرق بید
مشک، عرق گاؤ زبان، عرق کیوڑہ ہر ایک 60 ملی لیٹر، شربت سیب، شربت انار ہر ایک 25
ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدبیر نسخہ بروئے کار لائیں:


بے خوابی کی صورت میں — تخم خشخاش، مغز تخم کدوئے شیریں، اجوائن خراساں
ہر ایک 3 گرام کو پیس کر روغن گل 35 ملی لیٹر حل کر کے سر پر ضماد کریں۔

حمی قرمزیه *

SCARLET FEVER

اس مرض میں شدید بخار ہوتا ہے۔ گلا متورم اور اندر سے سرخ ہوتا ہے، جسم پر سرخ رنگ کے دھبے رونما ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے عوارض پیش آتے ہیں۔ یہ نہایت متعدی بیماری تصور کی جاتی ہے، مرد ملک اور 20-2 سال کی عمر میں بچیوں میں کثیر الوقوع ہے۔ عام طور سے زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔

اقسام



* سرخ بخار (Scarlatina) وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

اسباب

اسٹریپٹوکوکس (Strepto Coccus) نامی گرامی مثبت جراثیم کی سرایت، تنفس، لعاب دہن (تھوک) اور جلد سے بھوسی اترنے سے دوسروں کو ہوتی ہے گویا مادہ مرض ان اسباب سے صحت مند شخص کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جراثیم مریض کے بستر، لباس، فرش، استعمال کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور وہاں سے صحت مند شخص کو مبتلائے مرض کرتا ہے۔ عدم صفائی اور موسم خزاں میں یہ مرض نہایت شدت سے پھیلتا ہے۔

علامات

سرایت کے 3-5 دن کے بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ پھریری، جھرجھری کے ساتھ یک بیک شدید بخار عارض ہوتا ہے، اطراف، خاص طور سے سر میں نہایت شدت کا درد ہوتا ہے، رات کے وقت بخار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہڈیانی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت 103-105 ف ہو سکتا ہے، نبض سرخ (104-120 فی منٹ بچوں میں 160 فی منٹ) چلتی ہے، تے کی شکایت ہوتی ہے۔ تے کی شدت سے بعض اوقات زہر خورانی کا شبہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دست بھی آرہے ہوں تو معالج، زہر خورانی کے شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، بچوں میں تشنجی دوڑے پڑتے ہیں، آنکھوں میں سرخی اور مخصوص چمک ہوتی ہے، اعضاء شکنی/ درد ہوتا ہے، زبان پر موٹی تہہ جی ہوئی ہوتی ہے، جلد خشک اور گرم ہوتی ہے، شدید بخار کی صورت میں پیشاب سرخ، قلیل مقدار میں رطوبت بیضیہ آمیز خارج ہوتا ہے اور خون میں کریات بیضاء کی تعداد بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ شدید صورت میں حلق متورم ہو جاتی ہے، لوزتین بھی سرخ اور متورم ہوتے ہیں، بلغمی رطوبات خارج ہوتی ہیں۔ بعض اوقات حلق کے اوپر کھلنے والے ناک کے سوراخ بھی متورم ہوتے ہیں، کبھی لوزتین پر خناق وہائی کی مانند سفید جھلی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی یہ حصے مردار ہو کر گلے لگتے ہیں۔ بخار کے دوسرے دن جسم، بالخصوص گردن اور سینے پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں جو صرف چند گھنٹے میں شکم، پشت اور ہاتھ پیروں تک پھیل جاتے ہیں۔

دھبوں/ دانوں کا درمیانی مرکزی حصہ زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ دانے اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ ان کے کنارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یہ دور دور بھی ہوتے ہیں، چہرے، پیشانی اور رخسار پر دانے واضح طور پر نظر نہیں آتے بلکہ جلد سرخ دکھائی دیتی ہے۔ بعض اوقات دانے ابھر کر آلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہ دانے تیسرے چوتھے دن اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور چھپے ساتویں دن مرجھانے لگتے ہیں۔ بعض صورتوں میں 5-10 دن تک شدت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد دانے مرجھانے لگتے ہیں، مرجھانے کا آغاز عام طور سے گردن کے دانوں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ گردن کے دونوں طرف سفید، بھوسی کی مانند نظر آتے ہیں۔ یہ مدت 4-6 ہفتہ ہو سکتی ہے اور کبھی اس سے زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ دانوں کے مرجھانے کے ساتھ ساتھ بخار میں بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے اور پھر بخار ختم ہو جاتا ہے۔

(I) حمی قرمز یہ سازجہ:—

اس میں علامات بہت شدید نہیں ہوتیں، رات میں ہڈیاں، بچوں میں تشنج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم پر دھبے نمودار ہوتے ہیں، جن کی رگ دبانے سے غائب ہو جاتی ہے اور دباؤ ہٹنے پر لوٹ آتی ہے، جھر جھری کے ساتھ بخار، شدید درد سر، تنفس اور نگلنے میں تکلیف وغیرہ شکایات ہوتی ہیں۔ 5-7 دن میں دانے مرجھانے لگتے ہیں اور 9-10 دن میں ان سے بھوسی کی مانند بور جھڑنے لگتا ہے۔

(II) حمی قرمز یہ خائفہ:—

علامات شدید تر ہوتی ہیں۔ تے، بے خوابی، اضطراب اور ہڈیاں ہوتا ہے، حلق اور لوزتین پر سفید، جھلی پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینے اور نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، ناک سے پیپ آمیز رطوبت خارج ہوتی ہے، جو قسم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تے کے ساتھ بعض اوقات اسہال کی بھی شکایت ہوتی ہے، ضعف کا غلبہ ہوتا ہے، تنفس میں دشواری اور قلب کی کارکردگی میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے انجام، مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔

(III) حمی قرمزیه مقررہ:

اس میں بخار نہایت شدید ہوتا ہے۔ شدید تشنج، کرب اور ہڈیاں ہوتا ہے، جو بعد میں سبات میں تبدیل ہو جاتا ہے، دانے اچھی طرح نکل بھی نہیں پاتے اور اس طرح مادہ مرض اوپر، ظاہر جلد کی طرف دفع ہونے کی بجائے اندرون میں نفوذ کرتا ہے اور سخی علامات رونما کرتا ہے، حلق میں زخم پیدا ہوتا ہے اور انجام کار ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔

تینوں ہی اقسام میں عوارض کے طور پر التهاب کلیہ، ذات الجنب، ذات الریہ، التهاب بطن، قلب، درم نخجرہ، التهاب مانتس، داء الرقص، تشنج خون، یرقان، فلغمونی، وجع المفاصل، استسقاء، زرد، شدید درد اذن/التهاب اذن وغیرہ رونما ہو سکتے ہیں۔

تفریقی علامات

جدری Small Pox	حمی قرمزیه Scarlet Fever
1- مرض کا آغاز کمر اور سر میں شدید درد اور تشنج سے ہوتا ہے۔	1- مرض کا آغاز درد سر، تھکے، گلے میں درد اور پھیری/جھرجھری سے ہوتا ہے۔
2- تیسرے دن بالوں کے کناروں کے قریب طفحات نمودار ہوتے ہیں۔	2- دوسرے دن سینے اور گردن کے پاس دانے نمودار ہوتے ہیں۔
3- دانوں کی رنگت آئے دن بدلتی رہتی ہے اور یہ بقعی (Macular) حلیمی (Papular) حویلی (Vesicular) اور آخر میں ثمری (Pastular) ہو جاتے ہیں۔	3- دانوں کی رنگ گلابی ہوتی ہے اور بہت معمولی طور پر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
4- طفحات بتدریج پھیلتے ہیں۔	4- دانے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں۔

- | | |
|---|--|
| <p>5- طفحات کے نکلنے کے عرصہ میں بخار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔</p> <p>6- 7 دن بعد مرض لوٹ آتا ہے۔</p> <p>7- نقشہ جربی/نقشہ ہوتا ہے۔</p> | <p>5- دانوہی کے نکلنے کے وقت جسمانی درجہ حرارت بدستور بڑھا ہوا ہوتا ہے۔</p> <p>6- عام طور سے مرض عود نہیں کرتا۔</p> <p>7- نقشہ نمایاں ہوتا ہے۔</p> |
|---|--|

تفریقی علامات

- | حصہ
Measles | حمی قرمزیه
Scarlet Fever |
|---|--|
| 1- مرض کی علامات میں نزلہ ہوتا ہے۔ | 1- مرض کا آغاز تھکے، درد گلو، درد سر اور پھریری کے ساتھ بخار سے ہوتا ہے۔ |
| 2- طفحات چوتھے دن نمودار ہوتے ہیں۔ | 2- دانے دوسرے دن نمودار ہوتے ہیں۔ |
| 3- طفحات طبعی اور ہلالی مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ | 3- دانے تھوڑے ابھرے ہوئے، گہرے سرخ/گلابی ہوتے ہیں۔ |
| 4- زبان پر سفید تہہ جمی ہوتی ہے۔ | 4- زبان توتی ہوتی ہے۔ |
| 5- سعال کی شکایت ہوتی ہے۔ | 5- شدید درم گلو کی شکایت ہوتی ہے۔ |
| 6- پیشاب طبعی رنگ کا خارج ہوتا ہے۔ | 6- پیشاب زلالی آتا ہے۔ |
| 7- طفحات پہلے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ | 7- دانے پہلے گردن اور سینہ پر نمایاں ہوتے ہیں۔ |
| 8- طفحات بتدریج پھیلتے ہیں۔ | 8- دانے بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ |
| 9- ریوی عوارض رونما ہوتے ہیں۔ | 9- انتہاب کلیہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ |

تفریقی علامات

خناق و بانی Diphtheria	حمی قرمزیه Scarlet Fever
1- حلق کی گہری سرخی، مقامی نوعیت کی ہوتی ہے۔	1- حلق اور لوزتین کی چمکدار سرخی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
2- غشا مخاطی کا ذب ہوتی ہے۔	2- غشا، بلفی ہوتی ہے۔
3- غشا اچھی طرح چپکی ہوتی ہے اور آسانی سے جدا نہیں ہوتی۔	3- اس کو آسانی سے علاحدہ کیا جاسکتا ہے۔
4- زبان خشک اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔	4- زبان توتی ہوتی ہے۔
5- حرارت شاذ و نادر 104 ف ہوتا ہے۔	5- جسمانی حرارت 104-106 ف تک ہوتا ہے۔
6- دانے نہیں نکلتے، بالفرض نکلیں بھی تو ان سے بھوس نہیں جھڑتی۔	6- وردی نوعیت کے دانے نکلتے ہیں۔
7- اعصابی عوارض پیش آسکتے ہیں۔	7- کلوئی عوارض پیش آسکتے ہیں۔

تفریقی علامات

احمرار جلد Erythema	حمی قرمزیه Scarlet Fever
1- حرارت بہت خفیف ہوتی ہے۔	1- جسمانی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
2- نکلے میں درد نہیں ہوتا۔	2- گلے میں درد ہوتا ہے۔
3- غدد بڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔	3- غدد عنقیہ بڑھے ہوئے ہیں۔
4- طلحات غیر منظم طور پر منتشر ہوتے ہیں۔	4- تمام جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔

- | | |
|--|---------------------------|
| 5- دانوں کی رنگت سرخ اور کسی قدر
ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ | 5- طمحات یکساں ہوتے ہیں۔ |
| 6- دانے مرجھا جاتے ہیں تو ان سے
بھوسی نماشی گرتی ہے۔ | 6- ٹھنڈ نہیں ہوتا۔ |
| 7- زبان توتی ہوتی ہے۔ | 7- زبان طبعی ہوتی ہے۔ |
| 8- پیشاب زلالی آتا ہے۔ | 8- پیشاب زلالی نہیں ہوتا۔ |

اصول علاج

- 0 — مریض کے لیے علاحدہ صاف ہوا دار کمرے کا اہتمام کریں۔
- 0 — عوارض کے تدارک / ازالہ خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — حلق اور منہ کی صفائی پر توجہ دیں۔
- 0 — حسب ضرورت ملینات استعمال کرائیں۔ غلبہ خون کی صورت میں فصد کھولیں۔
- 0 — مسکنات استعمال کرائیں۔
- 0 — مقوی قلب دوائیں بروئے کار لائیں۔
- 0 — خارجی تدابیر کے ذریعہ مادہ مرض کا امالہ زیریں اعضا کی طرف کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- خون کے غلیان کو کم کرنے کے لیے یہ نسخہ مفید تصور کیا جاتا ہے۔
- شیرہ تخم کاسنی، شیرہ تخم خیاریں، شیرہ زرشک، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک 7 گرام، شیرہ تخم
کاہو، شیرہ عتاب کلاں 7 عدد، آلو بخارا 8 عدد، عرق گلاب، عرق بید سادہ عرق کاسنی ہر ایک
85 ملی لیٹر میں نکال کر سبچین 50 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
- آٹھویں دن اسی نسخہ میں ان دواؤں کا اضافہ کریں۔
- مغز فلوں خیارشیر 75 گرام، ترنجبین، گلقد ہر ایک 50 گرام، آلو بخارا 9 عدد،

روغن بادام 5 ملی لیٹر — اس سے اسہال آئیں گے۔ دوسرے دن تبرید کی غرض سے یہ نسخہ بروئے کار لائیں۔

شیرہ تخم کاسنی، شیرہ مغز تخم کدو، شیرہ مغز خیارین ہر ایک 7 گرام، لعاب اسپغول، لعاب بہدانہ ہر ایک 3 گرام — عرق کاسنی، عرق گلاب ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

یہ نسخے بھی اس مرض میں مفید تصور کیے جاتے ہیں۔

بلبلہ زرد، سناہ کی ہر ایک 6 گرام، گل سرخ، اصل السوس مقشر ہر ایک 4 گرام، تمر ہندی 5 گرام، تخم کشوت، تخم کاسنی، بنفشہ، شاہترہ ہر ایک 3 گرام، رازیانج، تخم کرفس ہر ایک 2 گرام، مویز مفتی 15 گرام، عناب 15 عدد، سیٹاں 30 عدد — تمام دواؤں کو 500 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور صبح شام نوش کرائیں۔

شاہترہ 6 گرام، منڈی 4 گرام، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر شربت تمر ہندی 5 ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

حلق میں درم ہو جانے کی صورت میں خارجی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

شیرہ مغز تخم کدو، شیریں 6 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عناب، عدد، عرق گاؤ زبان، عرق مکو ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت توت سیاہ 25 ملی لیٹر سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

تقویت قلب کے لیے یہ نسخہ کارآمد ہے:

زہر مہرہ خطائی 1 گرام، عرق گلاب میں گھس کر طباشیر 1 گرام باریک چیں کر دونوں کو ملائیں اور شربت سیب 25 ملی لیٹر ملا کر چنائیں۔ اس کے بعد مغز تخم خیارین، مغز تخم کدو، شیریں ہر ایک 9 گرام، کاشیرہ حاصل کریں اور لعاب بہدانہ، اسپغول ہر ایک 3 گرام، عرق گاؤ زبان، عرق بید مشک ہر ایک 75 ملی لیٹر، عرق بہار لیموں کاغذی 50 ملی لیٹر میں نکال کر شربت سیب 30 ملی لیٹر حل کر کے تخم فرنجیٹک 7 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر/ادویہ بروئے کار لائیں:

ورم گلو کی صورت میں یہ غرغره سودمند ہے:

عنب الثعلب، اصل السوس، حب الّاس، کشنیز خشک ہر ایک 12 گرام، برگ شہتوت 60 گرام، کوکنار 2 عدد — تمام دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شب یمانی، سہاگہ ہر ایک 3 گرام باریک پیس کر 4 پڑیہ بنائیں اور پڑیہ اس جوشاندہ میں ملا کر نیم گرم، غرغره کرائیں۔ اس کے بعد سہاگہ ایک حصہ، شہد مصفیٰ 4 حصہ میں ملا کر روئی کی پھریری کے ذریعہ روز طلق میں لگائیں۔

گردوں کی سوزش کی صورت مقام مرض پر تکمید کریں۔ گلاس سینکیاں بھی لگا سکتے ہیں اور ضہاد کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

گل بنفشہ، گل خطمی، مکو خشک، التحلیل الملک ہر ایک 6 گرام، آرو جو 12 گرام — تمام دواؤں کو آب مکو سبز مروق میں پیس کر نیم گرم ضہاد کریں۔

گردن کے متورم ہو جانے کی صورت میں مقامی طور پر سینک کر گرم روئی باندھیں — اور تخم سناں، تخم حلبہ ہر ایک 9 گرام، مویز متقی 10 عدد، انجیر زرد 4 عدد کو پانی میں جوش دے کر مغز فلوں خیارشمر 25 گرام حل کر کے نیم گرم غرغره کرائیں۔

پھنگری/مازو کو سرکہ میں ملا کر دانوں پر لگائیں۔

انار ترش کو چاک کر کے سرکہ میں اس قدر جوش دیں کہ گل جائے، پھر مل کر کپڑے پر لگائیں اور ضہاد کریں۔

حسب ضرورت فصد کھولیں:

بخار اتر جانے کے بعد جب جسم سے بھوی جھڑنے لگے تو روغن گل سے ماش کریں۔

حمی اصفر

YELLOW FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص خوردبینی جرثومہ کی سرایت سے صفرا میں جوش و غلیان پیدا ہو جاتا ہے۔ شدید بخار ہوتا ہے، سیاہ رنگ کی تے آتی ہے، برقان اور احتباس بول، پیشاب میں زلالی مادہ کا اخراج وغیرہ عوارض رونما ہوتے ہیں۔ یہ متعدی بیماری ہے۔ گرم ممالک میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

لپٹو اسپائرا (Leptospira) نامی طفیلی — یہ طفیلی اسٹیگومییا کیلوپس (Stegomyia Calopus) نامی مچھر کے ذریعہ مریض انسان سے صحت مند انسان تک پہنچتا ہے۔ صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض انسان کو جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو یہ خوردبینی، بلددار جرثومہ، خون کے ہمراہ مچھر کے شکم میں چلا جاتا ہے اور وہاں 10-12 دن تک رہتا ہے۔ اس عرصہ میں جب یہ مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو اس کی سوئٹ Sucker کے ذریعہ اس شخص کے خون میں منتقل ہو جاتا ہے اور صفرا میں غلیان و بھجان پیدا کر کے مرضی

علامات رونما کرتا ہے۔ مرطوب زمین اور گرم موسم اس کے لیے سازگار ہے۔ 60 دن تک یہ جراثیم فعال رہتا ہے۔

علامات

متعدی (سرایت زدہ) چمچر کے کانٹے کے 3-6 دن بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ یکا یک لرزہ اور پھریری کے ساتھ بخار چڑھتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت 101-106 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ چہرے پر تھج ہوتا ہے، پشت، کمر، مفاصل اور فم معدہ میں درد محسوس ہوتا ہے، مٹلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، جسم کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ نبض میں وہ سرعت باقی نہیں رہتی اور وہ ضعیف ہو جاتی ہے، تے میں پہلے زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ 3-4 دن بعد اس میں دومی مادہ شامل ہو جاتا ہے اور رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، کرب و اضطراب بہت زیادہ ہوتا ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، زبان کے کنارے اور نوک سرخ ہوتے ہیں لیکن اس کی درمیانی بالائی سطح غلیظ ہوتی ہے۔ پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے۔ یہ عام طور سے تیسرے دن اور بعض اوقات پہلے دن سے ہی آنے لگتی ہے، چونکہ دن ریکان کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ پانچویں، چھٹے دن عوارض میں تخفیف ہوتی ہے اور بخار اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد 2-3 دن وقفہ دے کر دوبارہ مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں عوارض نسبتاً شدید ہوتے ہیں، ریکان میں شدت ہوتی ہے، مٹلی کے ساتھ پانی خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیاہ رنگ کی خون آمیز تے آنے لگتی ہے، اسہال بھی آتا ہے، شدید استفراغ کی وجہ سے ہچکیاں آنے لگتی ہیں، احتیاس بول کی شکایت ہوتی ہے اور اس کا قوام کسی قدر غلیظ ہو جاتا ہے، رطوبت بیضیہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ناک، منہ اور مقعد سے خون آنے لگتا ہے، حمل ساقط بھی ہو سکتا ہے، نبض بہت ضعیف چلتی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر یہ عوارض کم ہو جائیں تو شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر انجام مہلک ہوا کرتا ہے اور مریض 3-9 دن تک بے ہوشی، تشنج میں مبتلا رہ کر فوت ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی تشخیص میں بعض اوقات اشتباہ

ہوسکتا ہے۔ خاص طور سے اگر لیبارٹری وغیرہ کی سہولیات حاصل نہ ہوں تو معالج کو کافی پیشانی / دشواری کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔

تفریقی علامات

ضمبورصفراوی حاد Acute Yellow Atrophy	حمی اصفر Yellow Fever
1- مرض کا آغاز خفیف یرقان سے ہوتا ہے۔	1- مرض کا آغاز لرزہ کے ساتھ بخار سے ہوتا ہے۔
2- رد عمل تیزابی ہوتا ہے۔	2- پیشاب کا رد عمل القی Re-action alkaline ہوتا ہے۔
3- پیشاب میں لیوسن (Leucin) اور ٹروسن (Tyrocin)۔	3- پیشاب میں یورین / رطوبت ہینے (Albumen) خارج ہوتی ہیں۔
4- طحال بڑھی ہوئی اور جگر طبعی حالت میں ہوتا ہے۔	4- جگر بڑھا ہوا ہوتا ہے اور طحال طبعی حالت میں ہوتی ہے۔
5- نبض 110 فی منٹ سے زائد ہوتی ہے۔	5- نبض شاذ و نادر 110 فی منٹ سے زائد ہوتی ہے۔
6- سوداوی تے دیر میں ہوتی ہے۔	6- سوداوی / سیاہ رنگ کی تے بہت جلد شروع ہو جاتی ہے۔

تفریقی علامات

حمی راجعہ Relapsing Fever	حمی اصفر Yellow Fever
1- حرارت عام طور سے 105-107 ف ہوتی ہے۔	1- جسمانی حرارت قریباً 101-105 ف شاذ و نادر 106-107 ف ہوتا ہے۔

- | | |
|---|---|
| 2- نبض سریع چلتی ہے۔ | 2- حرارت کے باوجود نبض میں بہت زیادہ سرعت نہیں ہوتی بلکہ رفتہ رفتہ بڑی اور ضعیف ہو جاتی ہے۔ |
| 3- عضلات اور مفاصل میں درد محسوس ہوتا ہے۔ | 3- درد فوق الجرجری (خانہ چشم کے اوپر) Upper of Orbit ہوتا ہے۔ |
| 4- ساتویں، آٹھویں دن وقفہ مرض ہوتا ہے۔ | 4- چوتھے، پانچویں عوارض میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ |
| 5- رطوبت بیضیہ خارج نہیں ہوتی۔ | 5- پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے۔ |
| 6- طحال بہت زیادہ بڑھی ہوتی ہے۔ | 6- طحال عام طور سے طبعی حالت میں ہوتی ہے۔ |
| 7- جریان خون عام طور سے نہیں ہوتا۔ | 7- عام طور سے جریان خون ہوتا ہے۔ |

اصول علاج

- 0 — ابتدا میں خفیف ملین استعمال کرائیں۔
- 0 — منہج و مسہل صفراء کے ذریعہ تحقیقہ مواد کریں۔
- 0 — تسکین حرارت کریں۔
- 0 — مسکنات درد استعمال کرائیں۔
- 0 — عوارض کی شدت کو کم کرنے کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے بردئے کار لائیں:
- خفیف ملین کے طور پر یہ ادویہ استعمال کرائیں:
- شربت درد کمر 50 ملی لیٹر، شربت دینار 35 ملی لیٹر، عرق مکو، عرق گاؤ زبان،

عرق کاسنی، ہر ایک 60 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ رفع قبض کے بعد یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
قرص زرشک 5 گرام کھلا کر آب کاسنی سبز مرق 60 ملی لیٹر، سیکچین بزدوری 25
ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ ان ادویہ کے استعمال کے بعد منہج و مسہل صفا کا اصول علاج
کرتے ہوئے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

منہج صفا کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:

گل بنفشہ، خم کاسنی، خم خیاریں، خم عطلی، خار شک خورد، گل نیلوفر، ہر ایک 6
گرام، گاؤ زبان 4 گرام، آلو بخارا 15 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں
بھگو دیں۔ صبح کو لچھان کر سیکچین بزدوری 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
جب نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں تو نسخہ منہج سے سیکچین کو حذف کرتے ہوئے
درج ذیل دواؤں کو اضافہ کر کے مسہل کے طور پر استعمال کرائیں۔

تمر ہندی کہنہ 60 گرام، مغز فوس خیارشیر 75 گرام، شیر خشک صمغی گلقد ہر
ایک 50 گرام، شیرہ مغز بادام 7 گرام۔

تہرید کی غرض سے دوسرے دن یہ نسخہ دیں:

شیرہ خم خیاریں، شیرہ خم کاسنی، پانی میں نکال کر شربت بزدوری بارد 25 ملی لیٹر حل
کر کے سیکچین بزدوری 12 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

شدید حرارت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

قرص طباشیر کافوری 3 گرام، شربت لیون 18 ملی لیٹر/ہموزن شربت انارین
میں ملا کر چلائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ دیں:

خم کاسنی، خم بہدانہ، زرشک، خم کاہو ہر ایک 6 گرام کو عرق بید مشک، عرق
کیوڑہ، عرق عنب الثعلب، عرق نیلوفر، عرق بید سادہ ہر ایک 60 ملی لیٹر پیس کر شیرہ حاصل
کریں اور سیکچین بزدوری 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

قرص طباشیر کافوری کا یہ نسخہ ہے:

طباشیر 12 گرام، زرشک 25 گرام، خم کاسنی، خم خرفہ، گل سرخ ہر ایک

6 گرام، نشاستہ، کتیرا ہر ایک 3 گرام، صمغ عربی 2 گرام، کافور ایک گرام، زعفران 250 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے لعاب اسپنول میں گوندھ کر قرص بنائیں۔

شام کے وقت یہ نسخہ دیں:

حب کافور ایک گرام کھلا کر خس 18 گرام، عرق بید مشک، عرق گلاب، عرق نیلوفر ہر ایک 60 ملی لیٹر میں 6 گھنٹے تک بھگوئیں اس کے بعد مل چھان کر شربت صندل شربت نیلوفر ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

حب کافور کا نسخہ درج ذیل ہے:

کافور، زعفران ہر ایک 25 گرام، صندل سفید، زہر مہرہ (عرق گلاب میں گھسے ہوئے) کات سفید، کتیرا، تخم خشکاش، تخم خرفہ، مقشر ہر ایک 4 گرام، مغز بہدانہ، مغز تخم کدو ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے لعاب بہدانہ میں حبوب بنائیں۔

یہ نسخہ بھی سود مند ہے:

طباشیر گلو، زہر مہرہ (عرق گلاب میں گھس کر) صندل سفید (گھسا ہوا) کات سفید، مروارید (کھل کیا ہوا) ہر ایک 4.5 گرام، زعفران، کافور ہر ایک 2.2 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پس کر سفوف تیار کریں اور 2 گرام ہمراہ شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

اس مرض میں عوارض کا ازالہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اصل نقطہ نظر سے چند نسخے

درج ذیل ہیں۔

درد سر رفع کرنے کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عتاب 5 عدد، شیرہ تخم کاہو 6 گرام، عرق گاؤ زبان 125 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں اور خارجی تدابیر بھی بروئے کار لائیں۔

متلی وغیرہ کی صورت میں یہ دوائیں دیں:

زرشک، گرد ساق ہر ایک 6 گرام۔ دونوں کو باریک کر کے سیکچین، شربت انار

ہر ایک 12 ملی لیٹر ملا کر تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔ لیموں کا غذی تراش لیں اور تھوڑا نمک اور فلفل سیاہ پیس کر چھڑکیں اور چٹائیں۔

تے کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

نارنگیل دریائی، زہر مہرہ خطائی، طباشیر ہر ایک 12 گرام کو عرق کیوڑہ میں پیس کر شربت لیموں 12 ملی لیٹر چٹائیں۔

احتباس بول کی صورت میں خارجی تدابیر اختیار کرنے کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
شیرہ تخم خربزہ، شیرہ تخم خیائین، شیرہ تخم قرطم ہر ایک 6 گرام کو پانی میں پیس کر نبات سفید 25 گرام، شورہ قلمی 3 گرام ملا کر کھلائیں۔

غیر دہوی اسہال کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

طباشیر بریاں 3.5 گرام، کافور 125 ملی گرام پیس کر کھلائیں اس کے بعد شربت انارین 25 ملی لیٹر، عرق سورہ 60 ملی لیٹر میں ملا کر سپغول 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
طباشیر، تخم کاہو، تخم کاسنی، تخم خرفہ، گل سرخ، ساق ہر ایک 6 گرام، گلنار، تخم حماض، صندل سفید ہر ایک 3 گرام، انجون 1.5 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں گوندھ کر اقرص بنائیں اور 3 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان / شربت حب الّاس استعمال کرائیں۔

دہوی اسہال کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:

گلنار، تخم حماض، طباشیر، گل ارمی، تخم خرفہ بریاں ہر ایک 4 گرام، شادند، حب الّاس، نشاستہ، گل سرخ، دم الاخوین ہر ایک 2 گرام، انجون، کندر ہر ایک 1 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے سفوف تیار کریں اور ایک گرام کھاکر یہ مشروب نوش کرائیں۔
لعاب بہدان، شیرہ خرفہ، بریاں ہر ایک 3 گرام، لعاب قطعی 4 گرام، شیرہ تخم خیائین 7 گرام، عرق گاؤ زبان، عرق مکوہ ہر ایک 60 ملی لیٹر، عرق کیوڑہ 35 ملی لیٹر میں کال کر شربت شیرین 25 ملی لیٹر حل کر کے تخم ریحان بریاں، ہارنگ بریاں ہر ایک 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

ضعف قلب اور عام ہسمانی کمزوری کی صورت میں یہ نسخہ بہتر تصور کیے جاتے ہیں۔

دواء المسک بارد ایک گرام، ہمراہ عرق بید مشک، عرق گاؤ زبان ہر ایک 60 ملی لیٹر صبح و شام استعمال کرائیں۔

مروارید، طباشیر، یشب سبز، کبریا صمغی، زہر مہرہ، شاخ مرجان، عقیق یعنی، درق نقرہ، ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو عرق کیوڑہ میں کھل کر کے سرمہ کی طرح بنائیں اور ایک گرام مرئی سیب میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد عرق گاؤ زبان 120 ملی لیٹر، عرق بید مشک 60 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

بے خوابی کی صورت میں — شربت خشاش 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدابیر / ادویہ بروئے کار لائیں:

درد سر کی صورت میں کشیز، تخم کاہو، گل بنفشہ، گل ارمنی، صندل سفید ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق خس / عرق گلاب میں پیس کر کپٹی / چندیا / پیشانی پر لپ کریں۔

احتباس بول کی صورت میں — گردوں کے مقام پر تلمید کریں اور خشک سینکلیاں کھینچیں۔ بعض اطباء چوہے کی میٹنی، شورہ قلمی ہر ایک 6 گرام پانی میں پیس کر پیڑو پر لپ کراتے ہیں۔

بے خوابی کی صورت میں — روغن کاہو، روغن کدو، روغن خشاش کی سر پر مالش کریں۔

حمی غدویہ GLANDULAR FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص تھب (Virus) کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور غدود، خاص طور سے گردن کے غدود بڑھ جاتے ہیں اور دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ بیماری وہابی طور پر، گھنٹی آبادی اسکول اور مسافر خانے میں پھیلی ہے۔ 5-12 سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

ای۔ بی۔ وائرس (Epstein-Barr Virus)

علامات

وائرس کی سرایت کے 10-15 دن بعد عام طور سے مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں بخار چڑھتا ہے اور کبھی اضطلال اور کسل مندی کے ساتھ گردن میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تھ آتی ہے، شکم میں بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ ویسے عام طور سے بخار آنے کے دوسرے دن گردن میں اکڑن اور صلابت پیدا ہوتی ہے۔ ابتدا

میں گردن کے دائیں جانب والے غدد کی لمبی قطار جو سرنوٹائڈ کے نیچے ہوتی ہے، متورم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف کے غدد بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ان غدد کی بالائی جلد پر درم محسوس نہیں ہوتا، غدد بڑھ کر بعض اوقات بیضہ سرخ کے برابر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ان غدد کے ساتھ ساتھ بغل اور کنج ران کے غدد بھی متورم ہو جاتے ہیں، سینہ کے لفافوی غدد اور امعاء کے ماساریقی غدد میں بھی درم ہو سکتا ہے، کبھی تو جوف صدر، استخوان اور پشت میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت 102 ف تک ہو سکتا ہے اور اس کی مدت 2-5 دن سے 2 ہفتہ تک ہو سکتی ہے۔ لیکن غدد کا درم 4-2 ہفتوں تک رہتا ہے۔ کبھی 1-2 ماہ تک غدد کا درم برقرار رہتا ہے، طحال اور جگر بھی بڑھ سکتا ہے، زبان پر تہہ جمی رہتی ہے اور قبض کی شکایت بھی عام طور سے رہتی ہے، تشنجی کھانسی، ضیق النفس کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔

عوارض کے طور پر التهاب کلیہ، التهاب غلاف قلب، التهاب عضلہ قلب، اجتماع ماء فی الراس، فقر الدم، سرسام وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ متورم غدد میں پیپ پڑ کر کمی کیفیت بھی رونما ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

0 — اس مرض میں علاماتی علاج زیادہ سودمند ہے۔ چنانچہ علامات کے ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔

0 — رفع قبض کریں۔

0 — مصفیات استعمال کرائیں۔

علاج

0 — خورونی طور پر یہ نسخے مفید ہیں:

شاہترہ، چرائیہ، منڈی، گل بنفشہ ہر ایک 3 گرام، عتاب 5 عدد — تمام دواؤں کو 250 ملی لیٹر پانی میں بھگو کر مل چھان لیں اور شرب عتاب 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح کو نوش

کرائیں۔ جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسی نسخہ میں یہ دوائیں شامل کریں اس سے اسہال آئیں گے۔


شیر خشک، ترنجبین، مغز فلوں خیاضنبر ہر ایک 25 گرام، شیرہ مغز بادام 3 عدد۔ اس کے بعد تیرید کی غرض سے یہ نسخہ دوسرے دن دیں۔

شیرہ تخم کاہو، شیرہ تخم خرفہ 7 گرام، زلال تیرہندی، عرق گاؤ زبان میں نکال کر اسپغول مسلم 12 گرام چمک کر نوش کرائیں۔ چند مرتبہ مسہل اور تیرید کا نسخہ استعمال کرانے کے بعد یہ اطرینفل استعمال کرائیں۔

اطرینفل شاہترہ 35 گرام/ اطرینفل غدی 5 گرام، ہمراہ عرق مصفی 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ اطرینفل شاہترہ کا نسخہ درج ذیل ہے۔

شاہترہ 125 گرام، پوست ہلیہ زرد 100 گرام، پوست ہلیہ کالی 105 گرام، پوست ہلیہ 50 گرام، برگ سناہ کی 25 گرام، گل سرخ 15 گرام، آملہ 55 گرام، موہن منقی ایک کلو گرام۔ تمام دواؤں سے حسب دستور اطرینفل تیار کریں۔ اطرینفل غدی کا نسخہ یہ ہے:

ہلیہ سیاہ، برفانج، اسطوخودوس، بھیڑا بکری کی گردن کی سب شدہ گھٹیاں، (غدر) ہر ایک 50 گرام، پوست ہلیہ، آملہ، تربہ ہر ایک 70 گرام، افیتیون 100 گرام، سناہ کی 40 گرام، غاریقون مغربل، شیطرج، زرنباں، نوشادر ہر ایک 30 گرام، انیسون، تاج قلمی، سنبل الطیب، قرنفل، ہیل خورد، جوز بوا، مصطکی رومی ہر ایک 20 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شکر/ شہد 2 کلو 750 گرام کے قوام میں ملا کر حسب دستور اطرینفل تیار کریں۔



حمی دنج*

DENGUE FEVER

اس مرض میں ایک مخصوص وائرس (Virus) کی وجہ سے جوڑوں (مفاصل) اور ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور غیر معمولی طور پر زوال قوت ہوتا ہے۔ یہ مرض دہائی طور پر پھیلتا ہے اور ہندوستان کا کوئی نہ کوئی علاقہ اس کی زد میں ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ مرض گرم ممالک میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

ایک مخصوص وائرس جو اسپائروکسی لوسیت کا ہوتا ہے۔ یہ وائرس کیوگس فیٹی جنس (Culex Fatigans) نامی مچھر کے ذریعہ صحت مند انسان تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس وائرس کی زندگی دوا دوار میں مکمل ہوتی ہے۔ ایک تو اس مخصوص مچھر میں، دوسرے انسان میں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مچھر، مریض انسان کا خون چوستا ہے تو خون کے

* اس کو ہڈی توڑ بخار (Break Bone Fever) یا حمی معالہ بھی کہتے ہیں۔ حمی دنج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دنج عربی میں کمزوری کو کہتے ہیں، جو اس مرض میں غیر معمولی طور پر پیش آتی ہے۔

ساتھ اس بخار کے مخصوص جراثیم پھر کے شکم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں اپنی ایک زندگی پوری کرتے ہیں اور جب یہ سرایت زدہ پھر صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو یہ جرثومے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مرضی علامات رونما کرتے ہیں۔

علامات

سرایت کے 5-9 دن بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں طبیعت مضطرب اور کسل مند ہوتی ہے۔ کام، کالج میں جی نہیں لگتا، بعض اوقات انگلیوں اور ہاتھ پیروں میں خفیف درد ہوتا ہے اور کبھی معمولی ٹکان محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بیک شدید بخار ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت 104-106 ف تک پہنچ جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ لرزہ بھی ہوتا ہے، مفاصل اور عضلات میں شدید درد ہوتا ہے، نبض سریع چلتی ہے، زبان میلی ہوتی ہے اس پر فرجی ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، متلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، سر، آنکھوں، گردن اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ سر کا درد عام طور سے پچھلی جانب محسوس ہوتا ہے، حدقہ چشم میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے، درد کی نوعیت حداری (Rheumatic Type) ہوتی ہے، کمر اور کولہوں کے درد کی وجہ سے بعض اوقات مریض کا لیٹنا دشوار ہو جاتا ہے، ہاتھ اور پیر اگر درد میں مبتلا ہو جائیں تو انگلیوں تک کی حرکت دشوار اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ چھوٹے بڑے تمام مفاصل دردناک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جوڑ متورم ہو کر سرخ ہو جاتے ہیں، بخار کی صورت میں رات کو ہڈیاں بھی ہوسکتا ہے۔ پیشاب غلیظ اور سرخ خارج ہوتا ہے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، جلد کی رنگت بھی کسی قدر سرخ ہو جاتی ہے اور اس پر خشخاش کے دانہ کی مانند باریک دانے نکل آتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آتا ہے، تنفس میں بھی سرعت ہوتی ہے، شدید صورتوں میں پردہ مخاطیہ سے جریان خون بھی ہوتا ہے، بعض اوقات تے کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ 3-4 دن بعد حرارت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور دانے مفقود ہونے لگتے ہیں پھر بخار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے، تیسرے دن بخار پھر چڑھتا ہے اور یہی علامات دوبارہ رونما ہوتی ہیں،

دانوں کا حجم کسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ان میں آبلے بھی پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ناک، منہ، حلق میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، غدد لمفاویہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بخار زائل ہو جاتا ہے، کبھی تیسری، چوتھی مرتبہ بھی حملہ آور ہوتا ہے لیکن عام طور سے دوسری مرتبہ کے بعد جسم میں قوت مناعت (Immunity Power) پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم اس عرصہ میں مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے، کرویات بیضاء دم (W.B.C.) میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ 10-15 دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے، مرض کی تشخیص میں عام طور سے کوئی دشواری پیش نہیں آتی، کیونکہ مریض کے خون کے خوردبینی معائنہ میں اس کے مخصوص طفیلی پائے جاتے ہیں۔ تاہم نظری معائنہ سے بعض اوقات تشخیص میں دشواری ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

حمی راجعہ Relapsing Fever	حمی دنج Dengue Fever
1- مرض کا آغاز تیز بخار اور قشعریہ سے ہوتا ہے۔	1- مرض کا آغاز عام طور سے حداری نوعیت کا ہوتا ہے۔
2- غدد لمفاویہ طبی سائز کے ہوتے ہیں۔	2- غدد لمفاویہ بڑھ جاتے ہیں اور ان میں ذکاوت حس بھی ہوتی ہے۔
3- چھٹے، ساتویں دن مکمل آرام ہو جاتا ہے۔	3- تیسرے، چوتھے دن علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے۔
4- دانے/آبلے نہیں نکلتے۔	4- تخفیف کے ساتھ سارے جسم/ہاتھ میں دانے/آبلے نکل آتے ہیں۔
5- قے لازمی طور پر ہوتی ہے۔	5- قے ہو سکتی ہے۔
6- پسینہ زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔	6- پسینہ زیادہ مقدار میں خارج نہیں ہوتا۔

اصول علاج

- 0 — نفع و تحقیق مادہ کریں۔
- 0 — مبردات استعمال کرائیں۔
- 0 — رفع درد کی تدابیر کریں۔
- 0 — شدید صورتوں میں منومات استعمال کرائیں۔
- 0 — ضعف کی صورت میں مقوی ادویہ استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:
تسکین حرارت کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔
تمر ہندی 35 گرام، آلو بخارا 7 عدد — دونوں کو 250 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں اور 24 گھنٹے بعد اس کا زلال حاصل کریں۔ اس کے بعد عرق مکو، عرق بید سادہ، عرق شاہترہ، ہر ایک 60 ملی لیٹر میں تخم کاسنی، مغز تخم کدو ہر ایک 6 گرام، بہدانہ 3 گرام کا شیرہ نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
نفع کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں:
گاؤ زبان، گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر ہر ایک 6 گرام، اصل السوس مقشر، تخم کاسنی، عنب الثعلب، شاہترہ، ہر ایک 5 گرام، عنب 9 عدد، تمر ہندی 25 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت 300 ملی لیٹر گرم پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان لیں اور گلقتد 25 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ جب یہ نفع کے آثار نمایاں ہو جائیں اور بخار اتر جائے تو اسی نسخہ میں یہ دوائیں شامل کریں۔
سناہکی 12 گرام، مغز فلوں، خیارشیر 60 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر، حسب دستور استعمال کرائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
سم الفار سفید، دانہ بیل خورد ہر ایک 6 گرام، کات سفید 50 گرام — تمام

دواؤں کو آب اورک میں کوٹ کر کے 680 گولیاں بنائیں اور کھانے کے بعد ایک گولی کھلائیں۔ تسکین اور خفیف تلخین کے لیے یہ نسخہ سودمند ہے۔

آلو بخارا 11 عدد کو عرق شاہترہ، عرق کاسنی ہر ایک 75 ملی لیٹر میں بھگو کر مل چھان لیں اور لعاب اسپنول 6 گرام، پانی میں نکال کر شربت نیلوفر ملا کر خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

بڈی، عضلات اور جڑوں میں درد کی صورت میں یہ نسخے استعمال کرائیں۔
پوست ہلکے، صبر زرد، مصطکی رومی، زنجبیل، ہر ایک 12 گرام، برگ سناہ کی 6 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن بادام سے چرب کر کے گولیاں بنائیں اور 7 گرام ہمراہ آب نیم گرم رات کو سوتے وقت کھلائیں۔

مغز تخم خیارین، مغز تخم خر بوزہ، مغز تخم ہند دانہ، تخم خشکاش، تخم کاسنی، تخم خرفہ، ہر ایک 25 گرام، سورنجان، بوزیدان ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور 6 گرام کھلانے کے بعد یہ شربت نوش کرائیں۔
شیرہ تخم کاسنی، شیرہ تخم کابو، شیرہ خار خشک ہر ایک 6 گرام، عرق کو، عرق شاہترہ ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر نوش کرائیں۔

منوم کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
شیرہ تخم خشکاش، شیرہ تخم کابو ہر ایک 6 گرام کو پانی میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

بخار میں کمی واقع ہونے پر یہ نسخہ بردے کار لائیں:
زہر مہرہ، طہاشیر، ست گلو، دانہ ہیل خورد ہر ایک 6 گرام، کونین 1.5 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر لعاب اسپنول میں پننے کے دانے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح، دوپہر شام کھلائیں۔

خیرہ گاؤ زبان غبری 6 گرام، ہمراہ عرق مقشر 120 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخے / تدابیر اختیار کریں:

درد کی صورت میں — انیسون، زعفران ہر ایک 1 گرام، سورنجان، بیخ نے ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو آب کوبیز میں گھس کر روغن گل ملا کر لیپ کریں۔
 غیند لانے کے لیے — تخم کاہو، تخم خربزہ، مغز بادام، خشکاش سفید، مغز تخم کدوئے شیریں، ہر ایک 25 گرام پیس کر قرص بنائیں اور تالو پر رکھوائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

کزاز TETANUS

اس مرض میں کزاز کے جراثیم کی سمیت خون میں شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جڑے، گردن اور جسم کے دوسرے ارادی عضلات میں تشنج (ایٹھن) ہو کر مریض آگے، پیچھے یا کسی ایک جانب کمان کی مانند ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اسباب

- (I) شکم میں فاسد مواد کا اجتماع۔
- (II) خراب آب و ہوا۔
- (III) بارد رطوبتوں کا اعصاب کے ریشوں میں نفوذ کر جانا۔
- (IV) کلوس ٹریڈیم ٹنائی (Clostridium Tetani) نامی جراثیم کی سرایت — جدید تحقیقات کے مطابق یہی جراثیم مرض کا اصل سبب ہے، یہ گرام مثبت، عام رنگوں سے رنگا جاسکتا ہے، لمبوتری شکل کا ڈھول بجانے والی چوب (Drum-Stick) سے مشابہ ہوتا ہے، اسی سرے سے نئے جراثیم کی تولید ہوتی ہے، آکسیجن کی غیر معمولی کمی میں

اس کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے، خشکی میں کئی سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ حد تو یہ کہ 200 درجہ حرارت پر بھی زندہ رہتا ہے۔ حالات / فضا سازگار ہوتے ہی ان میں خفیف حرکت ہونے لگتی ہے اور بہت جلد فعال ہو کر اکسوتاکسن (Exo-Toxin) نامی ذہر پیدا کرنے لگتا ہے جو خون میں شامل ہو کر مرکزی نظام اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔

یہ جرثومہ خفیف خراش، رگڑ یا زخم کے ذریعہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، صاف کئے ہوئے زخموں کی نسبت بھرے زخموں میں بہت جلد سرایت کرتا ہے۔ خاص طور سے اگر اس میں مٹی وغیرہ بھی آلودہ ہوگئی ہوں، ہیزی خور حیوانوں کے امعاء میں یہ جرثومہ نہایت خاموش اور بے ضرر طور پر پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد ان کی لید میں خارج ہو جاتا ہے (گھوڑوں کی لید میں زیادہ ہوتا ہے) ایسی صورت میں اگر یہ زخموں / خراش کے زیر اثر آجائے تو فوراً سرایت کر جاتا ہے اور چونکہ زخم کے مقام پر آکسیجن کی عام طور سے کمی ہوتی ہے۔ اس لیے نہایت سرعت سے نشو و نما پاتا ہے۔ گندے آلات جراثیم وغیرہ بھی اس کو پھیلانے میں معاون ہوتے ہیں۔

مدت حضانت 5-15 دن ہے۔

علامات

سابق میں مذکور ہوا کہ یہ جرثومہ مقام جراثیم پر قیام پذیر رہتا ہے اور اس کا خارجی ذہر (Exotoxin) اعصاب (Nerves) کے ریشوں کے ذریعہ جذب ہو کر دماغ اور نخاع میں سرایت کر جاتا ہے اور یہی مراکز پر اپنا موذی اثر ڈالتا ہے۔ بہر حال مرضی علامات عام طور سے سرایت کے 5-8 دن بعد رونما ہونے لگتی ہیں۔ اگر زہر کا اثر بہت زیادہ نہ ہو تو مقام جراثیم کے آس پاس کے عضلات ہی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن شدید صورتوں میں چھوٹے اعصاب پر مشتمل اعضا بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے بے خوابی اور پریشانی خیالی کی شکایت ہوتی ہے، سرچکر کرتا ہے، جمائیاں اور انگڑائیاں آتی ہیں، مقامی طور پر درد محسوس ہوتا ہے، عضلات میں کسی قدر تناؤ بھی ہوتا ہے، کچھ گھنٹے بعد



نگلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، ثم معدہ پر شدید درد ہوتا ہے، حلق کے عضلات میں صلابت پیدا ہوتی ہے، عسر اللع (نگلنے میں دشواری) کا احساس اسی وجہ سے ہوتا ہے، زبان میں لرزہ ہوتا ہے، کیکلپاہٹ کا احساس زبان نکالنے پر اور بھی ہوتا ہے، ایسی صورت میں منہ میں پانی آتا ہے، آنکھوں کے ڈھیلوں میں بھی لرزہ ہوتا ہے، آنکھوں میں بھیگاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے 1-2 دن بعد مرض کی اصل تشخیصی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ شروع میں جڑے کے چبانے والے عضلات میں صلابت اور اکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، منہ کھولنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے بعد عضلات میں تشنج ہو کر منہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ٹرسم (Trismus) کہا جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے بعد گردن کے عضلات میں بھی اکڑ اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور سر پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے، ابرو اوپر کی طرف تن جاتے ہیں، منہ کے دونوں زاویہ نما کونے باہر کھینچ جاتے ہیں جس سے مریض ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے، اطبا اس کیفیت کو تبسم تشنجی (Risus Sar Donicus) کا عنوان دیتے ہیں۔ اس کے بعد حلق کے عضلات میں اور بھی تشنج پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں پشت اور شکم کے عضلات میں بھی صلابت پیدا ہو کر رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور تشنج ظہری (Opisthotonos) واقع ہو جاتا ہے۔ پھر جسم کے تمام عضلات (ہاتھ، پیر وغیرہ) میں بھی تشنج واقع ہوتا ہے۔ چونکہ جسم کے ایک حصہ کے عضلات دوسرے کی نسبت زیادہ اینٹھتے ہیں اس لیے جسم اکڑ کر آگے، پیچھے یا ایک پہلو نیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی ہیئت کمان کی طرح ہو جاتی ہے اور مریض پیر اور سر کے سہارے پڑا رہتا ہے، نیز کی حالت میں تشنج کم ہو جاتا ہے، لیکن بیداری کی حالت میں مریض پر تشنجی دورے پڑتے ہیں اور اس کی حس اس قدر بیدار ہو جاتی ہے کہ تیز ہوا، زور کی آواز، روشنی وغیرہ سے بھی تشنج ہونے لگتا ہے۔ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، تشنج کی شدت سے عضلات پھٹ سکتے ہیں۔ ابتدا میں دورہ جلد آتا ہے اور جلد ہی رفع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں دیر سے آتا اور دیر تک رہتا ہے۔ تاہم ہوش و حواس آخر آخر تک بجا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مریض کے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ 105-106 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے، غغروف مکی Epiglottitis میں تشنج واقع ہونے سے تنفس میں بھی

دشواری ہوتی ہے، شدید نقاہت اور تسمم کی وجہ سے 14-4 دن میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔
 ملحوظ رہے کہ مرض کی شدت اور مدت کا انحصار کسی مواد کی مقدار، زخم / سرایت کے
 مقام، مدت حضانت اور تشنجی دورہ کے وقفہ پر ہے۔ چنانچہ کسی مواد کی زیادتی، چھوٹے
 عضلات و اعصاب مثلاً چہرہ وغیرہ کے مقام پر سرایت، مدت حضانت کا مختصر ہونا۔ دورہ کے
 وقفہ کی مدت میں کمی واقع ہونا خراب اور ردی تصور کیا جاتا ہے۔
 سمیت کزاز اور دوسرے زہروں اور امراض کی علامات بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں،
 اس لیے ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تسمم کچلہ	کزاز Tetanus
1- کچلہ / جوہر کچلہ کے استعمال کی سرگزشت ملتی ہے۔	1- چوٹ، رگڑ وغیرہ کی روئیداد ملتی ہے۔
2- کچلہ کی سمیت کی وجہ سے عارض ہونے والے کزاز میں دائمی اخیر میں پھنتی ہے۔	2- مرض کے ابتدائی مرحلے میں ہی دائمی بیٹھ جاتی ہے۔
3- تشنج بہت جلد شروع ہوتا ہے اور وقفہ میں عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔	3- تشنج بتدریج واقع ہوتا ہے اور اس کے بعد عضلات اٹھنے رہتے ہیں۔
4- مرض کی مدت مختصر ہوتی ہے۔ چنانچہ آدھ، پون گھنٹہ میں موت واقع ہو جاتی ہے۔	4- مرض کی مدت طویل ہوتی ہے۔ چنانچہ عام طور سے 5-6 دن میں موت ہو جاتی ہے۔
5- اطراف شروع میں ہی مآؤف ہو جاتے ہیں۔	5- اطراف آخر میں مآؤف ہوتے ہیں۔
6- جڑے بہت بعد میں تشنج ہوتے ہیں۔	6- تشنج پہلے جڑوں میں یا مقام سرایت پر محسوس ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

التهاب ماہجس نخاعی Spinal Meningitis	کزاز Tetanus
1- زخم وغیرہ کی روئیداد نہیں ملتی۔	1- زخم/خراش وغیرہ کی روئیداد ملتی ہے۔
2- چہرہ کی کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی۔	2- چہرہ ہنستا ہوا، دکھائی دیتا ہے۔
3- اس طرح کی علامات مفقود ہوتی ہیں۔	3- جڑے بیٹھ جاتے ہیں اور منہ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے۔
4- حرکت کے وقت درد میں شدت آجاتی ہے۔	4- ذکات حس شدید ہوتی ہے۔
5- حرکت سے تشنج واقع ہوتا ہے۔	5- بیرونی خراش/احساسات سے تشنج واقع ہوتا ہے۔
6- حرارت کا غلبہ ہوتا ہے۔	6- عام طور سے جسمانی حرارت طبعی، شاذ و نادر صورت میں 105-106 ف
7- تشنج کے بعد فالج ہو جاتا ہے۔	7- تشنج کے بعد فالج نہیں ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

داء الکلب Rabies	کزاز Tetanus
1- کتے، بلی کے کانٹے کی روئیداد ملتی ہے۔	1- چوٹ/خراش/جراحی آلات کے استعمال کی روئیداد ملتی ہے۔
2- حواس مخصوصہ ماؤف ہوتے ہیں۔	2- حواس مخصوصہ طبعی حالت میں ہوتے ہیں۔

- | | |
|---|---|
| 3- ہڈیاں نہیں ہوتا بلکہ ہوش و حواس درست ہوتے ہیں۔ | 3- ہڈیاں ہوتا ہے اور ہوش و حواس درست نہیں ہوتے۔ |
| 4- سیال اشیا سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ | 4- سیال اشیا سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ |
| 5- ذکاوت حس نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ | 5- ذکاوت حس بہت نمایاں ہوتی ہے۔ |
| 6- تشنج مستر اور شدید ہوتا ہے۔ | 6- تشنج متواتر، ارتجائی ہوتا ہے۔ |
| 7- منہ کی بیٹ مسکراہٹ کی سی ہوتی ہے۔ | 7- منہ میں بہت زیادہ جھاگ ہوتی ہے۔ |

اصول علاج

- 0 — مریض کو تارک کرے میں قیام کرنے کا اہتمام کرائیں۔
- 0 — عضلات کے تشنج کو کم کرنے کے لیے مناسب روغنوں کی مالش کریں۔
- 0 — رفع قبض کریں۔
- 0 — جس قدر جلد ممکن ہو قاذر ہر ماء الدموی (AntiToxin) استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — ابتدائی مرحلے میں جبکہ دانق نہ لگی ہو، خوردنی طور پر، درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
- حلتیت، عاقر قرحا، جاد شیر، قط شیریں ہر ایک 3 گرام، قنفل سیاہ، چند بیدستر ہر ایک 1.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد حسب ضرورت میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 3 گولیاں صبح، شام کھلائیں۔
- سم الفار سفید، معطلی روی ہر ایک 12 گرام، قنفل مع ٹوپ، کات سفید ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو 100 عدد آب لیموں میں خوب کھل کریں۔ اس کے بعد دانق موٹک کے برابر گولیاں بنائیں اور گائے کے دودھ سے ایک گولی استعمال کرائیں۔
- چند بیدستر 7 گرام، مشک خالص ایک گرام، عنبر احبب 750 ملی گرام، زعفران 3 گرام، جدوار خطائی 1.5 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور پارک کر کے شہد میں 50

عدد گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں صبح، شام استعمال کرائیں۔
 مغز بادام شیریں، مغز تخم کدوئے شیریں، تخم خشکاش، مغز تخم تربوز ہر ایک 6
 گرام، بہدانہ 3 گرام — تمام دواؤں کا شیرہ نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے
 نوش کرائیں۔

بھنگ، جائفل، بیل خورد، تاج، معطلگی ہر ایک 2 گرام، کھانڈ دیسی 12 گرام —
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر 2 گرام صبح شام کھلائیں۔
 حلتیت، گوگل، صبر زرد، مرکبی ہر ایک 6 گرام کو پیس کر آب اورک میں گوندھ لیں
 اور پنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح، شام کھلائیں۔

حلتیت، قلقل سیاہ، ہموزن کو دو گنا شہد میں ملا کر 4 گرام کھلائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل ادویہ / تدابیر بروئے کار لائیں:

بنفشہ، عطی، سداب کو پانی میں جوش دے کر آبن کرائیں۔

روغن سداب کو آب گرم میں ملا کر حقنہ کریں۔

روغن سداب، روغن بنفشہ سے عضلات اور پشت کے مہروں پر مالش کریں۔

چند بیدستر، فریون، میعہ سائلہ ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر موم
 سفید 2 گرام میں ملائیں۔ پھر اس میں روغن سوسن، روغن بید انجیر ہر ایک 4 ملی لیٹر ملا کر
 مالش کریں۔

زعفران ایک گرام، مشک 250 ملی گرام، روغن گل، روغن بابونہ ہر ایک 6 ملی لیٹر
 میں ملا کر مالش کریں۔

پوست بچ کبر، گھونگی سفید، برگ دھتورہ سیاہ، برگ دھتورہ سفید ہر ایک 28
 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے قرص بنائیں اور 250 ملی لیٹر روغن کچھ میں
 جلائیں۔ اس کے بعد ہاون دستہ سے خوب چلا کر محفوظ کر لیں، حسب ضرورت دھوپ میں
 بیٹھا کر مالش کرائیں۔



مرض النوم *

SLEEPING SICKNESS

اس مرض میں ٹرائیپے نوڈوس نامی طفیلی ایک مخصوص قسم کی مکھی کے ذریعہ انسانی جسم میں داخل ہو کر مرکزی نظام اعصاب کو متاثر کر دیتا ہے اور مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ مرض افریقہ کے بعض ممالک کے لیے مخصوص ہے، نوڈائیدہ کو موروثی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔

اسباب

ٹرائیپے نوڈوس (Trypanosomes) نامی طفیلی (Parasite) طحوظ رہے کہ یہ طفیلی شکار کے بعض جنگلی جانوروں مثلاً بارہ سنگھے اور ہرن وغیرہ کے خون میں بکثرت پائے جاتے ہیں لیکن ان میں کوئی مرضی علامت رونما نہیں کرتے۔ اس طرح گویا یہ جانور اس کے قدرتی میزبان ہیں۔ جب ٹی ٹی فلائی (T.T.Fly) کسی متاثر جانور کو کاٹتی ہے تو یہ طفیلی اس کی ڈنک میں چپک جاتے ہیں اور اب اگر یہی مکھی کسی صحت مند

* اس کا دوسرا نام نوام، نیند یا اور جدید طبی اصطلاحی نام Trypanosomiasis ہے۔

انسان کو کاٹ لے تو یہ فوراً اس کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ طفیلی ٹی ٹی فلائی کے جسم میں بھی سرایت کر جاتے ہیں اور وہاں اپنی پیچیدہ کارکردگی کے نتیجہ میں اس کے غدود لعابہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جب مکھی کسی صحت مند انسان کو کاٹتی ہے تو مقامی دُموی عروق کو پھیلائے کے لیے اپنی مخصوص رطوبت غدوی کو ڈالتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ طفیلی بھی عروق دُموی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹی ٹی فلائی کے علاوہ کیلوس اور بعض اقسام کے کھٹل بھی اس مرض کے طفیلی انسانوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرائی پے نوزوس تین انواع کے ہوتے ہیں۔

(I) ٹرائی پے نوزوس گم بن سی Try Panosomes Gambiense

(II) ٹرائی پے نوزوس بروئی Trypanosomes Bruecei

(III) ٹرائی پے نوزوس روڈی سنس Trypanosomes Rhodesiense

انسان میں ان کے صرف دو انواع ہی مرض کا باعث ہوتی ہیں۔

مدت حضانت

انسان میں اس کی مدت حضانت 14-21 دن یا اس سے کم اور جانوروں میں 5

دن ہے۔

علامات

ڈنک مارے جانے کی جگہ پر خارش محسوس ہوتی ہے اور کسی قدر دودھ مارے نما ابھار بھی ہو سکتا ہے، مقامی طور پر جلد کی رنگت خفیف سی متغیر ہو جاتی ہے۔ مرضی علامتوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) بخار کا درجہ:

علامات بتدریج رونما ہوتی ہیں۔ اس درجے میں بخار چڑھتا اترتا رہتا ہے، لرزہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات مستقل رہتا ہے اور طیریائی بخار میں استعمال کی جانے والی

دواؤں سے بھی کوئی افادہ نہیں۔ دانا، نبض سریلج چلتی ہے اور اس کی ضرب 100-120 تک پہنچ جاتی ہے، اسی تناسب سے تنفس بھی سریلج ہے۔ 20-30 فی منٹ ہو جاتا ہے۔ بلدیہ سرخی والے دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں کسی قدر ابھار بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیروں کے علاوہ حصے پر یہ دانے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، ناگوں اور چہرے پر اوزیمائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، طحال بڑھی ہوئی ہے جگر بھی بڑھ سکتا ہے، فقر الدم، اختلاج، اختلاج قلب اور عضلات میں ضعف کا احساس ہوتا ہے، طفلی خون اور رطوبت غدہ میں موجود ہونے کے باوجود دماغی، نخاعی رطوبات میں نہیں پائے جاتے۔

(II) دماغی نخاعی درجہ:

یہ مرحلہ عام طور سے 6 مہینے اور بعض اوقات سال دو سال بعد شروع ہوتا ہے۔ دماغی نخاعی رطوبات میں طفیلی سرایت کر جاتے ہیں لیکن عرصہ تک غیر فعال رہتے ہیں۔ شاذ و نادر صورتوں میں فوری طور پر شدید علامات رونما کرتے ہیں جس میں مانی Mani ایک کثیر الوقوع علامت ہے۔ دیسے عام طور سے ابتدا مرض سے بہت پہلے سینہ میں معمولی درد کی شکایت ہوتی ہے، طبیعت مضطرب اور بچھی بچھی ہوتی ہے، جسمانی وزن میں کمی آنے لگتی ہے، غدد میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ کسی قدر بڑھ بھی جاتے ہیں، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، اداسی اور تفکر میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزمرہ کے معمولات بھی دشوار ہو جاتے ہیں، چہرے کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے، چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، عضلات میں غیر اختیاری حرکات شروع ہو جاتی ہیں، بازو کے عضلات میں پھڑکن سی ہوتی ہے، آواز بتدریج دھیمی ہوتی جاتی ہے، غدد انتہائی درجہ تک متورم ہو جاتے ہیں، عضلات میں بیوست پیدا ہونے لگتی ہے اور لاغری غالب آ جاتی ہے۔ عام طور سے صرع کی مانند دورے پڑنے لگتے ہیں، بچوں میں یہ کیفیت زیادہ شدید ہوتی ہے، بستر پر پڑے رہنے سے قرحہ ظہری (بڈسور) پیدا ہو جاتے ہیں۔ غنودگی رفتہ رفتہ دماغی بے ہوشی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بھی کم ہو جاتا ہے اور شدید فقر الدم ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — علاماتی علاج کریں۔ چنانچہ عوارض میں تخفیف کی تدابیر اختیار کریں۔
 - 0 — دافع حمی دوائیں استعمال کرائیں۔
 - 0 — تصفیہ خون کی تدابیر کریں۔
 - 0 — مقویات استعمال کرائیں۔
- ملاحظہ رہے کہ قدیم طریقہ علاج میں اس مرض کی کوئی شافی دوا کم از کم میری معلومات کی حد تک دریافت نہیں ہو سکتی ہے۔

علاج


- 0 — حمی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- گل نیم نازہ 95 گرام، گلوئے سبز 60 گرام، برگ شاہترہ، گل منڈی، سر پھوک، ہر ایک 50 گرام، گل نیلوفر 25 گرام، خس ہندی 24.5 گرام، تخم کاسنی، تخم کاہو مقشر ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو 6 لیٹر عرق کشید کریں اور 125 ملی لیٹر ہمراہ شربت بزدوری / شربت عتاب 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
- مکوشک، گلوئے سبز ہر ایک 12 گرام، اصل السوس مقشر 7 گرام، تخم کشوت 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق کو، عرق شاہترہ ہر ایک 250 ملی لیٹر میں پیس کر شیرہ نکالیں اور چھان کر شربت بزدوری، شربت کشوت ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
- گل سرخ 21 گرام، رب السوس، شاہترہ، سنبل الطیب ہر ایک 14 گرام، مصطلک رومی، کہرباشمی ہر ایک 10.5 گرام، افیون 7 گرام — تمام دواؤں کو ہر ایک کوٹ چھان کر پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں اور 5 گرام کلائیں۔
- 0 — تصفیہ خون کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں:
- سر پھوک، برگ شاہترہ، تخم کشیز، گل سرخ، پوست ہلیہ زرد ہر ایک 3 گرام،

صندل سفید، دھایا، برہم ڈنڈی، نل کنکھی ہر ایک 3.5 گرام، برگ حنا 2 گرام، فلفل سیاہ، گل کچال، زیرہ سفید ہر ایک 1 گرام، برگ بکائن، برگ نیم ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پتے کے برابر گولیاں بنائیں اور 4 گولیاں صبح کو ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

0 — تقویت کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں:

مردارید، یاقوت ربانی، قاذز ہر معدنی، گل ارٹھی مغول، کھربا، درونج عقربی، حب بلسان، شقائق، بہمن سفید، بہمن سرخ، حب الغار، طباشیر سفید، دارچینی ہر ایک 4.5 گرام، زعفران 1.7 گرام، مشک خالص، عنبر اشہب، ورق طاہر ورق نقرہ ہر ایک 1 گرام — تمام جواہرات کو سنگ ساق سے پیس لیں اور ورق نقرہ اور ورق طلا کو صمغ سے مخلول کریں اور مشک، زعفران کو عرق گلاب میں گھس کر حل کریں، عنبر کو رو. بلسان میں حل کریں اور باقی تمام دواؤں کو باریک پیس چھان کر ملائیں اور 250 ملی گرام کی گولیاں بنائیں اور ایک گرام، ہمراہ عرق گلاب 50 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

آملہ مقشر، صندل سفید، عود ہندی، کشیز خشک، سنبل الطیب، گل سرخ، گل گاؤ زبان، کھربائے شمع، ابریشم خام مقرص ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر نبات سفید 250 گرام، عرق کیوڑہ، عرق گلاب میں ملا کر قوام تیار کریں اور حسب دستور دوائیں ملا کر زعفران 3 گرام، ورق نقرہ 3.5 گرام ملا کر خوب حل کریں اور 12 گرام نہار منہ کھلائیں۔



داء الکلب

RABIES

یہ مرض مادہ، متعدی مرض (Acute Infections Disease) ہے جس کا جراثیمہ سرایت زدہ کتے، بلی، بھیڑیے کے کاٹ لینے یا زخم کو چاٹ لینے سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے اور مرکزی نظام اعصاب پر اثر انداز ہو کر شدید مرضی علامات رونما کرتا ہے اور بعض اوقات ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ کتب (Fitrable Neurotropic Virus) مریض کے غدولعابیہ، رطوبات لفاویہ، دودھ، خون اور پیشاب میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مدت حضانت 9 دن — 4 ہفتہ اور زیادہ سے زیادہ ایک سال ہے۔

اسباب

ایک مخصوص نوع کا وائرس، جو فیئرہیل نیوروٹروپک ہوتا ہے۔ اور یہ ریچوڈ وائرس گروپ (Rhabdo Virus Group) سے تعلق رکھتا ہے۔

علامات

کائے ہوئے مقام پر خراش اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرض کی

مخصوص علامات کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے علامات اور مدت حضانت کا انحصار کانٹے ہوئے مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مقام گزند، عصبی نظام، دماغ اور نخاع سے جس قدر قریب ہوگا، مدت حضانت اس اعتبار سے کم ہوگی۔ مختصر مدت حضانت اور علامات درج ذیل کوائف پر منحصر ہیں:

- (I) مقام گزند۔
- (II) نوعیت گزند۔
- (III) دائرس کے زخم میں داخل ہونے کی مقدار۔
- (IV) کانٹے والے جانور کی قسم اور اس کا وحشی/ پالتو ہونا۔
- (V) ثانوی سرایت سے تحفظی تدابیر۔
- (VI) علاج۔

مرضی علامتوں کو سہولت کے لیے ہم درج ذیل تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) درجہ حملہ Primontory Stage

کانٹے/بھنچوڑے ہوئے مقام پر خارش اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد معمولی بخار آتا ہے، سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، بے خوابی لاحق ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ اور برہمی پیدا ہو جاتی ہے اور کسی قدر خوف و دہشت بھی طاری ہوتی ہے، تیز روشنی، بلند آواز اور شور و غل سے خوف اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ مریض کے حواس، کتے کے حواس کی طرح بیدار ہو جاتے ہیں، آواز میں گرجی ہوتی ہے، تنفس میں بھی دشواری ہوتی ہے، بھوکیں پکڑتی ہیں، فواق کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے، تمام اعضا بالخصوص چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔

(II) درجہ ہیجان Stage of Excitement

2-3 دن کے بعد کرب و اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے، دماغ خراش اور جلد کی حس میں غیر معمولی زیادتی ہوتی ہے، معمولی انفعالات نفسانی مثلاً غصہ، خوف وغیرہ سے گلے

اور حجرہ کے عضلات میں تشنج ہونے لگتا ہے، سرد پسینہ خارج ہوتا ہے، احتباس بول بھی ہو سکتا ہے، جسم میں تمددی کیفیت پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کرب و اضطراب کے بعد مریض کو جب کوئی سیال چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کو پینے کی کوشش میں گلے اور حجرہ کے عضلات میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں تیز ہوا، بلند آواز روشنی اور تیز چلنے کی آواز سے ہی تشنج ہونے لگتا ہے، پانی کا تذکرہ کرنے یا پانی گرنے کی مخصوص آواز سنتے ہی دورہ پڑنے لگتا ہے، دماغی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دیوانگی کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، مریض دوسرے صحت مند لوگوں کو کانٹنے کی کوشش کرتا ہے اور بالفرض کانٹ لے تو اس شخص میں وائرس سرایت کر جائے گا۔

(III) درجہ شلل Stage of Paralysis

اس مرحلے میں تشنجی دورے موقوف ہو جاتے ہیں۔ عضلات مسترخ ہو جاتے ہیں اور ان میں شلل اور فالج پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی قلمی نظام متاثر ہو کر ہلاکت ہو جاتی ہے۔ شاذ و نادر صورتوں میں رفتہ رفتہ افادہ ہونے لگتا ہے۔

تشریحی نقطہ نظر سے اعصاب اور عروق کے ارد گرد کربیات بیضا (W.B.C.) کا اجتماع ہوتا ہے، مرکزی اعصاب، دماغ اور نخاع میں چھوٹے چھوٹے بے قاعدہ طور پر پھیلنے ہوئے پروٹوزوا کی قسم کے اجسام موجود ہوتے ہیں۔ ان کو نیگری باڈی کہا جاتا ہے۔ اگر مریض کو پانی یا کسی سیال سے خوف اور وحشت محسوس نہ ہو، زخم سے خون جاری ہو یا پیشاب میں خون آنے لگے تو یہ اچھی علامات ہیں اور شنایابی کی توقع ہوتی ہے۔

اصول علاج

0 — زخم کے قریبی حصہ کو باندھ دیں۔ مثلاً زخم ہاتھ پر ہو تو اس کے پیلے بندش لگا دیں۔

0 — زخم کو مندرجہ ذیل نہ ہونے دیں بلکہ ہر اہر کھنے کی تدابیر کریں۔

0 — سوداوی غلط کا نفع و محقہ کریں / سینٹیاں کھینچیں۔

0 — تحقیق کے بعد اعضاء ریس کی تقویت کے نسخے استعمال کرائیں۔

0 — دیگر عوارض کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج

0 — زخموں کو ہر رکھنے کے لیے یہ نسخہ خارجی طور پر استعمال کرائیں۔

نمک، آب چغندر، چوب شاخ اگور سوختہ — تمام دواؤں کو سرکہ میں حل کر کے زخموں پر ملا کریں۔

0 — سودا کے نفج و تحقیق کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع سوداء

پرساوشاں 5 گرام، شاہترہ، بادیان، اسطوخودوس ہر ایک 7 گرام، بادرنجبویہ، گاؤ زبان، اصل السوس مقشر ہر ایک 4 گرام، عناب 5 عدد، سپتاں 11 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر گھٹہ آفتابی 25 گرام حل کر کے مل چھان کر نوش کرائیں۔ تحقیق کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

نسخہ مسہل سوداء

اسطوخودوس، برگ سائے کی ہر ایک 21 گرام، سفناج نمکوفت 15 گرام، ہلیہ سیاہ 30 گرام، افیمون ولایتی (پوٹلی میں باندھ کر) 27 گرام، گل سرخ 12 گرام، برگ بادرنجبویہ، برگ گاؤ زبان، ہر ایک 9 گرام، بادیان، افیون ہر ایک 6 گرام، تربد موسوف 3 گرام، زنجبیل 1.5 گرام، خربق سیاہ 1 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں دے کر مل چھان کر غاریقون، جہراڑنی، نمک سیاہ، لاجورد مغسول ہر ایک 1 گرام (مزید قوی الاثر بنانے کے لیے تخم حنظل، صبر ستوری ہر ایک 1 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

0 — تقویت اعصاب کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں:

گاؤ زبان 18 گرام، کشیز مقشر، ابریشم خام مقرض، بہن سفید، بہن سرخ، صندل

سفید، تخم فرنج مشک، تخم بانگو ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت 2 لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر دو تہائی پانی چلائیں پھر مل چھان کر شکر 1200 گرام ملا کر قوام تیار کریں اور ورق نقرہ، ورق طلا ہر ایک 6 گرام، زہر مہرہ، مردارید، یا قوت، زمرد ہر ایک 4.5 گرام، روح کیوڑہ میں سرمہ کی طرح باریک کریں اور قوام میں ملائیں اور صبح کے وقت 5 گرام ہمراہ شربت گاؤ زبان استعمال کرائیں۔

0 — قدیم اطباء اس مرض میں درج ذیل نسخے استعمال کراتے رہے ہیں۔


کچلے کے تخم کو دودھ میں خوب ابال کر سرد کریں اور چھلکا اتار کر دوبارہ دودھ میں جوش دے کر سرد کریں اور 250 ملی گرام کھلائیں۔
مشک 500 ملی گرام یومیہ کھلائیں۔

قسط تلخ 10.5 گرام کو 200 ملی لیٹر پانی میں ملا کر جوش دیں جب 50 ملی لیٹر پانی بچ رہے تو سرد کر کے نوش کرائیں۔

گل مختوم 8 گرام، پنیر مایہ خرگوش، پنیر مایہ ہرن ہر ایک 20 گرام، جلیانہ 5 گرام، مرکب 4 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ کر شہد ملا کر ایک گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

زرارح (تلفی بکھی) اطراف بریدہ، عدس مقشر ہموزن 4.5 گرام، سنبل الطیب، زعفران، قرنفل، فلفل سیاہ، دارچینی ہر ایک 40 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں اور 250 ملی گرام کھلائیں۔

0 — درجہ بیجانی اور درجہ شلل / استرخانی میں علاج ناکام ہو جاتا ہے۔



انف العزہ

INFLUENZA


اس مرض میں مخصوص جراثیم/حباب/مواد کی وجہ سے ناک کی اندرونی بلغمی غشا (Synovial Membrane) میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں ناک سے رقیق، لیسیدار وطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔

اقسام

غلط اور مرض کی شدت اور نفث کے اعتبار سے

انف العزہ

Influenza



انف العزہ Influenza



اسباب

- (I) اخلاط اربعہ میں سے کسی ایک کا فساد/ غلیظہ خلطی بخارات کا دماغ کے بطون مقدم کو متاثر کرنا اور پھر ان سے مرطوب مواد کا کھینچ کر نشتوں کی طرف آنا۔
- (II) ناک کی غشاء مخاطی کا التهاب۔
- (III) خراش آور ذرات/ بخارات کا ناک میں گھس جانا۔
- (IV) موسمی تغیرات/ سرد گرم ہونا۔
- (V) التهاب لوزتین۔
- (IV) دماغ کا سوء مزاج۔
- (VII) ضعف دماغ۔
- (VIII) ضعف اعصاب۔
- (IX) جسم میں قوت مدافعت کی کمی/ موروٹی استعداد۔
- (X) غذائی بے استقامی/ نقص تغذیہ۔
- (XI) غیر صحت بخش رہائش/ آرام طلبی۔
- (XII) جراثیمی/ وائرسی تعدیہ۔
- (I) فلٹر پاسنگ کوکائی (Filter Passing Cocci)۔
- (II) بے سی لس سے پٹس (ناک کی پشت میں)۔
- (III) مائیکروکوکس کیٹرس (نفی بلعوم میں)۔

- (IV) اسٹریچو کوکس و برٹنس (لوزٹین میں)۔
 (V) اسٹینی کوکس ایس (اگلے منخرن میں)۔
 (VI) مائیکو وائرس گروپ کے آر این اے (انفلو انزا وائرس مثلاً وائرس اے۔ وائرس اے 2، وائرس بی، وائرس سی وغیرہ)۔

علامات

(الف) عمومی علامات

ابتدا میں سستی اور ماندگی ہوتی ہے، اعضاء شکنی کی شکایت ہوتی ہے، پیشانی میں جکڑن اور کپٹیوں میں بوجھ آنکھوں میں بھاری پن، درد اور چمک محسوس ہوتی ہے، ناک خشک ہوتی ہے، چھینک آتی ہے۔ بعض اوقات حلق اور سر میں درد ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصہ بعد مرض کی اصل علامات رونما ہونے لگتی ہے۔ اس کی مدت عام طور سے 2-1 دن بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لرزہ کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت میں دفعتاً اضافہ ہوتا ہے، درد سر نہایت شدید ہوتی ہے، حلق اور گلے میں خشکی اور سرفی ہوتی ہے، خشک کھانسی آنے لگتی ہے۔ پھر ناک، سے پانی کی طرح تیلی رطوبت بہنے لگتی ہے جس کی حدت اور تیزی سے نشتوں کے کنارے سرخ اور دردناک ہو جاتے ہیں، رطوبات کی تیزی اور حدت کی وجہ سے آنسوؤں کی نالی (قناة الدمعہ) میں درم پیدا ہو جاتا ہے، نتیجہ کار آنکھیں بھر آتی ہیں۔ بعض اوقات حلق اور حجرہ میں بھی التهاب ہوتا ہے اور نکلنے نیز گفتگو کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ذائقہ، شامہ اور سامعہ وغیرہ قوتوں میں بھی فتور آ جاتا ہے، بعض اوقات جلد میں بھی سرفی پیدا ہو جاتی ہے۔

(ب) خصوصی علامات

(I) نزلاوی

اس کو دراصل حمی نزلاوی تصور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں جسمانی درجہ حرارت

واضح طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے، لازمی علامت کے طور پر درد سر اور درد پشت ہوتا ہے، اعضا شکن کی شکایت ہوتی ہے، کسی قدر شدید نزلہ اور زکام ہوتا ہے۔ مرض کا حملہ دفعتاً اور جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ایک بیک ہوتا ہے، اضطلال ہوتا ہے، زکام خشک سا ہوتا ہے، حد درجہ چشم میں درد ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، بخار عام طور سے 4-6 دن میں بحران کے ساتھ اتر جاتا ہے اور تنفسی علامات یکسر مفقود ہوتی ہیں۔

(II) تنفسی

اس میں اعضاء تنفس، حلق، لوز تین، حجرہ اور پیچھے دے سے متعلق شدید علامات رونما ہوتی ہیں اور انجام کا اشماع ان ہی علامتوں کی کمی و بیشی پر ہوتا ہے۔۔۔ مرض کے حملہ آور ہونے کے عام طور سے چھ دن ریوی/تنفسی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ حجرہ اور عروق نشہ میں شدید ورم پیدا ہو جاتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آواز گھکھکیا ہوتی ہے، کھانسی کی شکایت ہوتی ہے جو ابتدا میں خشک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، بعد میں تر کھانسی آنے لگتی ہے اور تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلغم مخصوص نوعیت کا خارج ہوتا ہے، اس کی مقدار بھی اکثر اوقات کم ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بلغم زیادہ مقدار میں صاف، چمکدار، گلابی جھاگدار آتا ہے، ذات الریہ اور ذات، الجنب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ 5-6 دن بعد درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے۔

(III) معوی، دموی

معدی صورت میں اچانک قے آنے لگتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، مقام معبدہ پر شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یرقان کی شکایت بھی ہوتی ہے۔۔۔ ملحوظ رہے کہ انف اللنزہ کی یہ نوع شاذ و نادر پائی جاتی ہے اور تشخیص میں معالج کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معوی صورت میں نفخ شکم اور بکثرت اسہال کی شکایت ہوتی ہے، بخار بھی ہوتا ہے۔

(IV) اعصابی

اس صورت میں اعصابی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا مرض میں اعضا میں شدید درد ہوتا ہے، قلب ضعیف اور اس کی حرکات بے قاعدہ ہوتی ہیں، شدید اضطراب، کرب اور بے خوابی ہوتی ہے، ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے، سر سام بلغمی بھی ہو سکتا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ اطباء نے مذکورہ بالا انواع کے علاوہ ایک اور قسم 'خبیث' کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ نوع نہایت شدید اور مہلک تصور کی جاتی ہے اور وہ بانی طور پر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس میں ابتدا ہی سے مریض کی حالت ابتر ہوتی ہے، چہرے کی رنگت نیلگوں ہو جاتی ہے، شدید ضعف قلب ہوتا ہے۔ 2-7 دن میں انجام کار موت ہو جاتی ہے۔

پیچیدگی کے طور پر التهاب تباہیہ انف (Sinusitis) ذات الجنب، ذات الریہ، ضیق النفس، کان کے اندرونی حصہ میں ورم، تدرن ریوی، اتساع عضلہ قلب، خفقان، پراگندہ خیالی ضعف حافظہ، جریان خون، التهاب کلیہ، التهاب منہ صلی وغیرہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — رفع درد کی تدابیر کریں / ازالہ جمی کا اہتمام کریں۔
- 0 — مقویات قلب استعمال کرائیں۔
- 0 — عوارض کا تدارک / ازالہ کریں۔
- 0 — نزاع و زکام میں مستعمل نسخہ جات معمولی حذف و اضافہ کے ساتھ پڑھئے کار لائیں۔
- 0 — قبض کی صورت میں خفیف ملینیات استعمال کرائیں۔
- 0 — مریض کو علاحدہ، کشادہ کمرے میں قیام کرائیں اور عام لوگوں سے خلط ملط نہ ہونے دیں۔
- 0 — حسب ضرورت بارود تدابیر اختیار کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

بہدانہ 3 گرام، عتاب 5 عدد، سپٹاں 9 عدد — تمام دواؤں کو 250 ملی لیٹر پانی میں خفیف جوش دے کر چھان لیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ تسکین حرارت میں مفید ہے۔ پسینہ لانے کی غرض سے اس نسخہ میں خاکسی 5 گرام کا اضافہ مفید ہے۔ خشکی اور پیاس کی زیادتی کی صورت میں شیرہ مغز کدوئے شیریں، شیرہ تخم کاہو ہر ایک 3 گرام کا اضافہ کریں۔

قرص کا فورلولوی 4 گرام، شربت انارین 12 ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد آب کاسنی سبز مروق، آب عنب الثعلب سبز مروق، ہر ایک 85 ملی لیٹر، سکنجبین سادہ 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

عتاب 20 عدد، سماق، اناردانہ ترش، کشنیز خشک، ہر ایک 18 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ کر عرق صندل، عرق کاسنی ہر ایک 250 ملی لیٹر رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو جوش دیں۔ جب نصف (125 ملی لیٹر) رہ جائے تو مل چھان کر آب انار شیریں، آب بھی شیریں، آب امروہ، آب ہندوانہ، آب بنٹکر، آب سیب شیریں ہر ایک 35 ملی لیٹر، عرق بید مشک، عرق گلاب ہر ایک 75 ملی لیٹر، نبات سفید تمام دواؤں کی دونا 7 شربت ترشی ترنج ہموزن۔ جملہ ادویہ ملا کر قوام تیار کریں اور 25-35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ آب آلو بخارا زلال تمر ہندی کا اضافہ مزید فائدہ مند ہے۔

بخار کے ساتھ دوسرے بھی ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ تخم کاہو 5 گرام، عتاب دلائی 5 عدد — تمام دواؤں کا عرق شاہترہ 150 ملی لیٹر میں پیس کر عرق نکالیں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ 3 یوم بعد اسی نسخہ میں تخم حطی، تخم خبازی ہر ایک 6 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، گل گاؤ زبان 3 گرام، گل بنفشہ 6.5 گرام، جوش دے کر استعمال کرائیں۔

بکثرت زلہ بننے کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:
 صمغ عربی، کثیر، رب السوس، شکر تیغال ہر ایک 1 گرام — دواؤں کو باریک پیس
 کر ضمیرہ خشک 12 گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد مذکورہ بالا جوشاندہ نوش کرائیں۔
 یکبارگی زلہ بند ہو جانے سے پیشانی اور آنکھوں میں درد محسوس ہو تو یہ نسخہ فائدہ
 مند ہے۔

گل پالونہ، اکلیل الملک، مرزنجوش ہر ایک 12 گرام کو پانی میں جوش دے کر
 بھپارہ لینے کی ہدایت کریں اور ساتھ ہی یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ سپتیاں 7 عدد، مویر منقی
 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد، اسطوخودوس 6 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل
 چھان لیں اور نوش کرائیں۔

ملین کی غرض سے یہ نسخے مفید ہیں:
 گل بنفشہ، ختم حطمی، ہر ایک 6 گرام، عتاب 5 عدد، سپتیاں 9 عدد، اصل السوس
 مقشر، 5 گرام، کو عرق مکوء، عرق گاؤ زبان ہر ایک 95 ملی لیٹر میں جوش دے کر ترنجبین 50
 گرام، ضمیرہ بنفشہ سادہ 25 گرام شامل کر کے مل چھان کر نوش کرائیں۔
 گل بنفشہ، ختم حطمی ہر ایک 6 گرام، گاؤ زبان، اصل السوس مقشر ہر ایک 5 گرام،
 عتاب 5 عدد، سپتیاں 9 عدد — تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان، عرق مکوء ہر ایک 100 ملی لیٹر
 میں جوش دے کر شیر خشک، ترنجبین، مغز فلوں خیار ضمیر ہر ایک 50 گرام، شیرہ مغز بادام 5
 عدد ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد نسخہ تہرید بروئے کار لائیں۔
 تہرید کے لیے یہ نسخہ سود مند ہے:

لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عتاب 5 عدد، شیرہ ختم کاہو مقشر 5 گرام کا
 عرق شادہ 150 ملی لیٹر میں شیرہ نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
 انف العنزہ تنفسی میں یہ نسخے استعمال کرائیں:
 ذات الریہ اور سعال بھی ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:
 ارچینی، اصل السوس مقشر، زوفا خشک ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو عرق گاؤ

زبان 200 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گھونٹ گھونٹ نوش کرنے کی ہدایت کریں۔
 بہدانہ 3 گرام، گاؤ زبان، اصل السوس مقشر، خبازی ہر ایک 5 گرام، عتاب 5
 عدد، سپستاں 9 عدد — تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان، عرق کھو ہر ایک 60 ملی لیٹر میں جوش
 دے کر مل چھان لیں اور شربت امجاز 25 ملی لیٹر ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔
 تخم خشخاش سفید، کثیر، صمغ عربی، نشاستہ، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز بادام
 شیریں ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر لیں اور نبات سفید 250 گرام، عرق
 بید مشک 250 ملی لیٹر — نبات سفید اور عرق کا قوام بنا کر دواؤں کا سفوف ملائیں اور 9
 گرام استعمال کرائیں۔ خشکی زیادہ ہو تو اسی نسخہ میں روغن بادام 25 ملی لیٹر کا اضافہ کریں۔
 اگر حلق میں الصباب نزلہ سے خراش ہو کر کھانسی آ رہی ہو تو شربت خشخاش تھوڑا
 تھوڑا نوش کرائیں۔

سینہ میں بلغم رک جانے کے سبب کھانسی آ رہی ہو تو مخرج بلغم کے طور پر لعوق سپستاں
 25 گرام، عرق گاؤ زبان 150 ملی لیٹر میں جوش دے کر بغیر چھانے ہوئے نوش کرائیں۔
 انف العنزہ معدی معوی میں یہ نسخہ مفید ہے:
 رفع تے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

دارچینی، اجوائن، جوز بوا ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان 225
 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں ایک گھنٹے کے وقفہ سے نیم گرم، گھونٹ گھونٹ نوش
 کرائیں۔

طباشیر، زہر مہرہ، نارچیل دریائی ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان
 میں گھس کر گھونٹ گھونٹ نوش کرائیں۔

اسہال آ رہے ہوں تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

طباشیر، زہر مہرہ ہر ایک 1 گرام — دونوں کو باریک پس کر ضمیرہ خشخاش 12
 گرام میں ملا کر چٹائیں۔

قرص طباشیر قابض 5 گرام ہمراہ شربت حب الاس 25 ملی لیٹر، عرق انجبار،

عرق گاؤ زبان ہر ایک 60 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ قرص طباشیر قابض کا نسخہ درج ذیل ہے۔
 طباشیر، گل سرخ، تخم کاہو، تخم کاسنی، تخم خرف، ساق، ہر ایک 6 گرام، تخم حماض،
 صندل سفید ہر ایک 3 گرام، انیون 1.5 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب
 میں گوندھ کر قرص بنائیں۔

انوشداروئے قابض 7 گرام کھلائیں۔ نسخہ درج ذیل ہے:
 گل سرخ 21 گرام، سعد کوئی 18 گرام، قرنفل، مصطکی، اسارون، سنبل الطیب
 ہر ایک 10 گرام، ہیل خردہیل کلاں، جادری، جوزیوا، تاج، زعفران، ہر ایک 7 گرام۔
 تمام دواؤں کو باریک کر کے محفوظ کر لیں اور آٹھ مقررہ 500 گرام کو دودھ میں بھگو دیں اور صبح
 کو پانی سے دھو کر پھر پانی میں جوش دیں، پھر چھلنی سے چھان کر محفوظ کر لیں، شہد، شکر، ہر ایک
 350 گرام کو اس میں ملا کر قوام تیار کریں اور پھر سفوف اس میں ڈال کر انوشدارو تیار کریں۔

انف الحترہ اعصابی/دماغی میں یہ نسخہ مفید ہیں:

دارچینی، بادرنجبویہ، اسطوخودوس، گاؤ زبان ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو
 عرق گاؤ زبان 300 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گھونٹ گھونٹ نوش کرائیں۔
 گاؤ زبان، گل گاؤ زبان، اصل السوس مقررہ، بادرنجبویہ ہر ایک 5 گرام، ایریشم
 مقررہ 3 گرام، عناب 5 عدد، سیتاں 9 عدد۔ تمام دواؤں کو 325 ملی لیٹر میں جوش دیں
 اور مل چھان کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

مسہل کی غرض سے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

ترنجبین، شیر خشک، مغز کلوں خیاشمر ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں میں
 حسب دستور روغن بادام 6 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ تہرید استعمال کرائیں
 جو درج ذیل ہے:

خمیرہ گاؤ زبان مخبری جواہر والا 7 گرام کھلا کر گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اصل السوس
 مقررہ ہر ایک 5 گرام کو عرق بادیاں 150 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بنفشہ
 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

یہ نسخہ انف العترہ کی جملہ انواع میں مفید ہے۔


خمیرہ گاؤ زبان 12 گرام، ورق نقرہ 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد
گاؤ زبان، گل گاؤ زبان ہر ایک 3 گرام، ابریشم مقرض 3.5 گرام — تمام دواؤں کو پانی
میں جوش دے کر نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے صبح کے وقت نوش کرائیں۔
لعوق معتدل، لعوق سپتاں ہر ایک 12 گرام، عرق گاؤ زبان 150 ملی لیٹر میں
جوش دے کر رات کے وقت پلائیں۔

کھانسی کے بعد کمزوری وغیرہ کو دور کرنے کے لیے جب جواہر 1 عدد پیس کر خمیرہ
ابریشم 5 گرام میں ملا کر صبح، شام کھلائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر/ادویہ بروئے کار لائیں:

پھیپھڑوں میں درم اور درد کی صورت میں سینہ اور پشت پر رائی کو پلٹس لگائیں۔
مکمل آرام کی ہدایت کریں۔

شدید بخار کی صورت میں گرم دودھ/سرد پانی سے 2-3 مرتبہ سارے جسم پر اسخ کریں۔
درد کی صورت میں گرم پانی سے پاشویہ کریں۔ اس کے بعد پیروں کو کپڑے سے
خٹک کر کے گرم چادر/کبل وغیرہ سے ڈھنک دیں۔




التهاب غده نكفیه *

PAROTITIS

اس مرض میں بعض مخصوص جڑوں/کھب اور مواد کی وجہ سے غدد نكفیه (Parotid Glands) اور دوسرے لعابی غدد میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے اور شدید مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ شدید متعدی مرض 5-15 سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے اور عام طور سے صرف ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے۔

اقسام

مادہ اور کیفیت کے اعتبار سے



* اس کو درم اصل الاذن، فوشلا، کن پھیڑ اور کرنول وغیرہ بھی کہتے ہیں۔

اسباب

- (I) غلبہ اخلاط / تھفن اخلاط۔
- (II) سوء مزاج / دانتوں / حلق / حمرہ کی گندگی۔
- (III) انصباب نزلہ و زکام / خراب غذائیں / میلا کھیلنا۔
- (IV) خنازیر / عملی جراحی۔
- (V) وجع الفاسل / شکم پر چوٹ لگنا۔
- (VI) حصہ (وغیرہ) کے بعد / متعدی بخار۔
- (VII) اسٹریپٹوکوکس / اسٹریپٹوکوکس کا تعدیہ Infection of Strepto Coccus
- (VIII) مائیکسو وائرس (Myxo Virus) گروپ R.N.A. کا تعدیہ۔

علامات

سرایت کے 12-25 دن اور بعض اوقات 30 دن بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں عام ضعف، بے خوابی، ٹکان، بد ہضمی، نچ اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 102 درجہ تک یکساں طور پر بخار ہوتا ہے۔ اس کے 1-2 دن بعد عام طور سے کنپٹی کے نیچے زیریں جڑے کے پچھلے کونے سے درد کے ساتھ درم پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دونوں طرف نمودار ہوتا ہے۔ ایک طرف نمودار ہونے کی صورت میں یہ درم بالائی جانب بڑھ کر 2-3 دن میں دوسری جانب کے غدہ کو بھی متورم کر دیتا ہے۔ گردن اور جڑے کے درمیانی حصہ کے متورم ہو جانے سے مریض کی شکل عجیب سی ہو جاتی ہے اور کان، سر کی جانب اونچا نظر آتا ہے۔ بعض اوقات غدہ تحت الفک، غدہ جاذب اور لوزٹمن میں بھی التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ درم ابتدا میں چپٹا ہوتا ہے اور دبانے سے دب جاتا ہے، کنارے کی نسبت درمیان میں تختی زیادہ ہوتی ہے، بعد میں چپٹا پن جاتا رہتا ہے اور ایک ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے، منہ کھولنے پر چبانے اور دانتوں نلے کسی چیز کے دبانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، گفتگو میں بھی دشواری ہوتی ہے۔

جسٹانی درجہ حرارت عام طور سے 102 ف سے زیادہ نہیں ہوتا اور 2-3 دن بعد ہی اتر جاتا ہے اور بعض اوقات درجہ حرارت اعتدال پر ہی رہتا ہے لیکن کبھی بخار بہت شدید 104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے اور درد سر، لرزہ، ہڈیان، درد گوش اور غنودگی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے۔ منہ میں خشکی ہوتی ہے اور بعض اوقات بکثرت رال بہتی ہے، جنس میں بر آتی ہے، شدید درد سر کی شکایت ہوتی ہے۔ 2-3 دن بعد عوارض میں کمی ہونے لگتی ہے، بخار سرعت سے کم ہوتا ہے اور درم دیرے دیرے قلیل ہوتا ہے۔ اس مقام سے خشک چھلکے اترتے ہیں، آٹھویں دن درد بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ماؤف مقام کی صلابت باقی رہ جاتی ہے اور کبھی درم نفع پا کر کان کے اندر یا باہر کی طرف پھوٹ جاتا ہے۔ پیچیدگی کے طور پر التهاب خصیہ 15-30 فیصد مریضوں میں پیش آتا ہے، چھوٹے بچوں میں یہ صورت نہیں عارض ہوتی۔ التهاب خصیہ کی صورت 7-14 دن بعد پیش آتی ہے۔ چنانچہ خصیہ میں پہلے درد محسوس ہوتا ہے اس کے بعد درم پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت شدید ہڈیان اور تنگی کی شکایت ہوتی ہے، جب خصیہ کا درم تحلیل ہونے لگتا ہے تو غده نکیہ دوبارہ متورم ہو جاتا ہے اور کئی مرتبہ یہ عمل ہو کر مکمل صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خصیہ چھوٹا/ بڑا بھی ہوتا ہے، عورتوں میں یہ مرض عام طور سے درم پستان/ درم خصیہ الرحم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ استہاب بانقراس، التهاب کلیہ وغیرہ کی صورت میں شدید درد شکم، تے، معدہ کے مقام پر ہاتھ رکھنے سے درد، قبض اور براز میں پکٹائی (مخاطی اجزا) کے اخراج، پیشاب میں شکر اور تے میں کسی قدر خون آنے کی شکایت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات التهاب غده ومعیہ کی شکایت ہوتی ہے اور اس کی علامات کے طور پر خانہ چشم میں درد ہوتا ہے، پلکیں سوج جاتی ہیں۔ ذات الریہ، سرسام، فالج، لقوہ، زوال بصارت، خراج دماغی وغیرہ بھی عارض ہو سکتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — محلات استعمال کرائیں۔
- 0 — درد میں تسکین کی تدابیر کریں۔
- 0 — بخار کو کم کرنے کے لیے پینہ لانے والی دوائیں استعمال کرائیں۔

0 — شدید عوارض سے بچنے کے لیے ابتدائی سات دنوں تک مکمل آرام کی ہدایت کریں۔ ورنہ مرض خفصوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں:

بہدانہ 2.5 گرام، سپستاں 4 عدد، عناب 3 عدد — تمام دواؤں کو عرق شاہترہ، عرق کھو ہر ایک 50 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت نیلوفر 35 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
شیرہ عناب 7 عدد، عرق شاہترہ 150 ملی لیٹر، شربت عناب 25 ملی لیٹر میں نکال کر نوش کرائیں۔

خیرہ گاؤ زبان 12 گرام، ورق نقرہ 1 عدد میں پیٹ کر کھلائیں — اس کے بعد شیرہ عناب 5 عدد، عرق گاؤ زبان 120 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر مل کر کے اوپر سے تخم ریحان 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
لعوق خیارشیر 6-12 گرام صبح و شام کھلائیں۔

گل منڈی 1 گرام، گل نیلوفر 1.5 گرام، عرق بادیان 25 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

گل بنفشہ، اسطوخودوس، اصل السوس مقشر خاکسی ہر ایک 3 گرام، برگ گاؤ زبان 5 گرام، عناب دلائی 5 عدد، مویز منقی 7 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت زوفا 25 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخے / تدابیر بروئے کار لائیں:

مغز فلوس خیارشیر کو پانی میں حل کر کے نیم گرم مناد کریں۔
عبت، بابونہ، تخم کتاں ہموزن — تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن گل میں ملا کر مناد کریں۔

اسپنول / تخم ریحان / تخم بانگو پانی میں تر کر کے کپڑے پر پھیلا کر مقام درم پر چسپاں انزروت، اشق، مقل ازرق، مرکی، تخم حطی، آنہ ہلدی، صبر زرد، ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو آب کوسبز میں پیس کر مناد کریں۔

زیری سیاہ، گیر و ہوزن کو عرق گلاب میں ملا کر مناد کریں۔

مقام درم پر سینک کر درج ذیل مناد کریں۔

گل حطی، عنب الثعلب، مغز خیاضمر ہوزن — تمام دواؤں کو آب کوسبز میں پیس کر نیم گرم لیپ کریں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

آرد باقلا، آرد جو ہر ایک 12 گرام، بابونہ، گل بنفشہ، ہر ایک 9 گرام، اکلیل الملک، حطی ہر ایک 7 گرام — تمام دواؤں کو گرم پانی میں پیس کر تھوڑی مقدار میں روغن بنفشہ ملا کر مناد کریں۔

روغن گل میں ہر ایک فنیہ تر کر کے کان میں رکھیں۔

کان میں شیر زن چکائیں۔

برگ کرنب، روغن گاؤزباں میں بھون کر پیس لیں اور درم پر مناد کریں۔

موم کو روغن گل میں پگھلا کر سرد کر لیں اور آب برگ کوسبز میں ملا کر مناد کریں — درم حار میں مفید ہے۔

گل خیری، عنب الثعلب، مغز فلوں خیاضمر ہر ایک 12 گرام کو آب برگ کوسبز میں پیس کر مناد کریں۔

گل بنفشہ، گل حطی، ہوزن کو لعاب حلیہ، ماء اہسل میں پیس کر مناد کریں۔

لہسن کی جڑ، پانی میں پیس کر درم پر لیپ کریں۔

خشکاش (حسب ضرورت) کو کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اسی میں آرد جو ملا کر مناد کریں۔

مکو، نیافر، برگ بیر جنگلی، گل خیرہ، ہوزن — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے

کر چھان لین اور باشو یہ کریں۔
 انجیر زرد کو پانی میں جوش دے کر آرد گندم ملائیں پھر روغن زیتون ملا کر نیم گرم
 ضہاد کریں۔ درم بلغتی میں سود مند ہے۔ یہ نئے بھی فائدہ مند ہیں۔
 آرد باقلا، آب برگ کرنب / آب سوسن میں ملا کر جوش دیں۔ جب گاڑھا
 ہو جائے تو تھوڑا سا روغن گل ملا کر ضہاد کریں۔
 انجیر زرد کو شراب میں پیس کر ضہاد کریں۔
 انجیر، ایرسا اور نظرون، پانی میں باریک پیس کر نیم گرم ضہاد کریں۔
 اسپنول کو کوٹ کر سرکہ میں تر کر کے تھوڑا روغن گل ملا کر لگائیں۔
 آرد باقلا، آرد حلیہ — دونوں کو پانی اور سرکہ میں پیس کر درم پر لپ کریں۔
 حسب ضرورت یہ نئے بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔
 پوست خشخاش، گل بابونہ ہر ایک 12 گرام کو 1 لیٹر پانی میں جوش دے کر اس
 میں کپڑا بھگو کر نیچوڑ لیں اور درم پر 15-20 منٹ تک تکمید کریں۔
 اگر درم خسیہ کی طرف منتقل ہو جائے تو کان کی جڑ کے درم پر خردل کا ضہاد لگائیں
 اور گل بابونہ اور پوست بابونہ کے جوشاندہ سے سینک کریں۔
 0 — حسب ضرورت درم پر جو تک لگائیں — پیپ پڑنے کی صورت میں
 آپریشن کریں۔

خناق وبائی

DIPHTHERIA

اس مرض میں ایک مخصوص جراثیم کی وجہ سے حلق، خجرو اور جوف انف کے ارد گرد ایک سفیدی مائل، ملائی کی شکل کی غشا کا ذب پیدا ہو جاتی ہے، جو متاثر حصہ جسم کے سطحی طبقات کے ساتھ پیوست ہوتی ہے۔ اور نہایت شدید مرضی علامات رونما کرتی ہے۔ یہ بیماری 2-10 سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

باعتبار جائے وقوع

خناق وبائی

Diphtheria



اسباب

اسباب معدہ:

- (I) التهاب حلق۔
- (II) نزلہ۔
- (III) موسم سرما/ضعف/تکان۔

اسباب واصلہ:

- (I) کورائن بیکٹیریم ڈیفٹھیریا (Coryne Bacterium Diphtheriae) نامی جراثیم۔ یہ جراثیم سریش کی ناک اور منہ کی رطوبت نیز حلق، چہرہ اور جوف انف کی غشا مخاطی میں پایا جاتا ہے اور دوسروں میں تعد یہ کا سبب بنتا ہے۔
- (II) اسٹریپٹوکوکس Strepto Coccus (بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے)
- (III) طبی نقطہ نظر سے اس کا سبب دسوی خلط ہوتی ہے۔ دوسری اخلاط بھی ہو سکتی ہیں۔

علامات

سریعت کے 24 گھنٹے کے بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں لیکن عام طور سے علامات 2-5 دن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ شاذ صورت میں 7 دن میں علامات رونما ہوتی ہیں۔

(الف) عمومی علامات

ابتدا میں بخار ہوتا ہے اور درجہ حرارت 101 ف تک پہنچ جاتا ہے، کسی قدر ضعف بھی ہوتا ہے، درد سر اور تھکائی کی شکایت ہوتی ہے، گردن کے عضلات و اعصاب میں اٹھن پیدا ہو جاتی ہے۔ زیریں جڑے کے قریبی غدود (گٹھیاں) متورم ہو جاتے ہیں، اسہال بھی ہو سکتا ہے، پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے، تالو متورم ہو کر سرخ ہو جاتا

ہے، طلق میں رطوبات کے اجتماع کے نتیجہ میں سفید، میلے رنگ کی جھلی بن جاتی ہے، یہ طلق کے جانب کی ناک کے دونوں سوراخ کے جانب پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ سارے طلق میں پھیل جاتی ہے اور خمرہ کی طرف بڑھنے کا رجحان رکھتی ہے، مگر عام طور سے لوزتین اور لہات پر ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات قصیدہ الریہ اور اس کی شاخوں تک پہنچ جاتی ہے۔ عام طور سے سفید غشا کا ذب کے نکلنے طلق میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں اس غشا کو بآسانی، علاحدہ کیا جاسکتا ہے لیکن چند دن بعد یہ زیریں سطح سے خوب اچھی طرح چپک جاتی ہے اور اگر زور سے اکھڑنے کی کوشش کی جائے تو زیریں ساخت سے خون نکلنے لگتا ہے، نبض سربلج اور نہایت ضعیف چلتی ہے، آواز میں بیماری پن پیدا ہو جاتا ہے کريات بیضاء الدم (W.B.C.) کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی درجہ حرارت 103 تک اور شاذ صورت میں اعتدال سے بھی کم ہو جاتا ہے۔

(ب) خصوصی علامات

(۱) خنای دہائی حالتی:

یہ صورت بچوں میں اکثر الوقوع ہے، مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور جب تک مکمل تعدیہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی جو معالج کو اس طرف متوجہ کر سکے۔ غالباً اسی وجہ سے یہ نوع مہلک تصور کی جاتی ہے۔ ابتدا میں طبیعت سست اور ماندہ ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، لوزتین پر سفید سرمئی رنگ کی جھلی (غشا) دکھائی دیتی ہے، جس کی حدود نمایاں ہوتی ہیں، اس کے آس پاس لوزتین میں التهاب ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ہوا یہ غشا کا ذریعہ، نچلی ساختوں سے سختی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اور علاحدہ کرنے پر جریان خون ہونے لگتا ہے اور وہ دوبارہ جتنا شروع ہو جاتی ہے۔ چند دنوں بعد اس غشاء کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس پر آکر Oancrum پیدا ہو جاتا ہے، منہ سے مخصوص قسم کی بو آتی ہے، گردن کے غدد بڑھ جاتے ہیں، چہرے پر کسی قدر سوجن ہوتی ہے اس صورت میں رنگت خاکستری ہو جاتی ہے، جلد خشک ہوتی ہے اور زیریں اطراف

سرد ہوتے ہیں، کرب و اضطراب بہت زیادہ ہوتا ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، خون میں سمیت کے مسلسل انجذاب کی وجہ سے لاغری پیدا ہو جاتی ہے۔ شفا یابی کی صورت میں 6-7 دن میں یہ کاذب غشا از خود علاحدہ ہونے لگتی ہے اور 9-10 دن میں بالکل صاف ہو جاتی ہے۔

(II) خناق وبائی انفی:

یہ صورت خناق وبائی حلقی سے بھی آہستہ نمونہ پذیر ہوتی ہے اور عام طور سے اس کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں غشا مخاطی کاذب ناک کے پچھلے سوراخوں تک پہنچ جاتی ہے، تنفس میں دشواری ہوتی ہے اگر حلق بھی ہٹلائے مرض ہو تو عوارض اور بھی شدید ہوتے ہیں اور نگلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، مریض گنگناہٹ کے ساتھ بولتا ہے، ناک سے زرد رنگ کی خون آمیز رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، ناک کے اندرونی حصہ کا معائنہ کرنے پر کاذب غشا مخاطی بخوبی دکھائی دیتی ہے۔

(III) خناق وبائی حجری:

یہ صورت 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں کثیر الوقوع ہے اور ابتدائی / ثانوی دونوں طور پر رونما ہو سکتی ہے۔ اس میں حجرہ میں ایک کاذب غشا مخاطی پیدا ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات بڑھ کر اس قدر دبیز ہو جاتی ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، جسم نیلا پڑ جاتا ہے، مریض کو ایک خاص قسم کی کھانسی آتی ہے جس کو اصطلاحی طور پر کروپ کہتے ہیں۔ غشا کاذب نام طور سے حجرہ تک ہی محدود رہتی ہے لیکن بعض اوقات نیچے کی طرف بڑھ کر قصبۃ الریہ کی شاخوں تک پھیل جاتی ہے اور شدید ریوی علامات کا باعث ہوتی ہے اور عام طور سے جس تنفس ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

اس مرض میں پیچیدگیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں چنانچہ قلبی عوارض کے طور پر حرکات قلب میں ضعف پیدا ہو جانا، خون کے دباؤ میں کمی، قلب کی حرکات کی آواز میں ضعف، التهاب بطن قلب وغیرہ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ التهاب کلیہ، انتشار

جراثیمی، انعقاد ورید (Thrombosis of the Vein) ذات الریه مختلف اعضا میں
ذبول اور استرخا لہات وغیرہ عوارض ہو سکتے ہیں۔

تفریقی علامات

خناق Croup	خناق وبائی Diphtheria
1- تقدمہ کے طور پر کھانسی اور خشونت صوت کی شکایت ہوتی ہے۔	1- تقدمہ کے طور پر التهاب بلعوم ہوتا ہے۔
2- بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔	2- ہر عمر میں ہو سکتا ہے لیکن 12 سال کی عمر تک کثیر الوقوع ہے۔
3- گلٹیاں کسی قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔	3- گردن کی گلٹیاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔
4- حلق میں رکاوٹ سے نقاہت پیدا ہو جاتی ہے۔	4- نقاہت کا غلبہ ابتدا ہی سے ہوتا ہے۔
5- ترشح/غشا سطحی نوعیت کی ہوتی ہے جس کو آسانی سے علاحدہ کیا جاسکتا ہے۔	5- غشا کاذب، زیریں سطح سے بالکل پیوست ہوتی ہے، اور آسانی سے علاحدہ نہیں ہوتی۔
6- ترشح/غشا علاحدہ کرنے پر جریان خون نہیں ہوتا۔	6- غشا کاذب کو سطح سے علاحدہ کرنے پر جریان خون ہونے لگتا ہے۔
7- ترشح کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس میں کوئی مخصوص جراثیم نہیں ہوتا۔	7- غشا کاذب کا رنگ بھورا اور اس میں کورائن ٹیکٹریم ڈیفٹیریا اور اسٹریپٹو کوکس کا جراثیم موجود ہوتا ہے
8- جسمانی درجہ حرارت عام طور سے 102-106 ف ہوتا ہے۔	8- جسمانی درجہ حرارت شاذ و نادر 102 ف سے زیادہ ہوتا ہے۔

- 9- موت کا سبب تسیم دم ہوتا ہے۔
 10- شفا یابی کے بعد فالج ہو سکتا ہے۔
- 9- موت کا سبب احتباس تنفس ہوتا ہے۔
 10- شفا یابی کے بعد فالج کا اندیشہ نہیں رہتا۔

اصول علاج

- 0 — امانہ کی غرض سے ہنسنے، ملینیات اور ہلکے مسہلات استعمال کرائیں۔
 0 — تسکین درد کے لیے مسکنات اور مبردات استعمال کرائیں۔
 0 — تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کی تدابیر کریں۔
 0 — مریض کے کمرے کو گرم اور مرطوب رکھنے کا اہتمام کریں۔
 0 — حسب ضرورت قابض اور رادع ادویہ استعمال کرائیں۔
 0 — شدید صورتوں میں عملیہ (آپریشن کریں)
 0 — تعلیق کریں/فصد کھولیں۔
 0 — حسب ضرورت مقویات قلب استعمال کراتے رہیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
 گل بنفشہ، بہدانہ، تخم حطی، تخم خبازی ہر ایک 6 گرام، گاؤ زبان 5 گرام،
 سپٹاں 9 عدد، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو گرم پانی میں بھگو کر چھان لیں اور شربت توت
 سیاہ 25 ملی لیٹر میں ملا کر نوش کرائیں۔
 لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ تخم کدو 6 گرام، شیرہ عناب 5 عدد۔ عرق کدو، عرق
 گاؤ زبان ہر ایک 60 ملی لیٹر میں نکال کر شربت توت سیاہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
 اگر قبض بھی ہو تو اسی نسخہ میں موہنہ منقہ 12 عدد، مغز فلوں خیاضہ 35 گرام، ترنجبین، شیر
 خشک ہر ایک 35 گرام کا اضافہ کریں۔
 بہدانہ شیریں، اصل السوس مقشر ہر ایک 3 گرام، تخم حطی 4 گرام، تخم خبازی

6 گرام، سپتاں 9 عدد، عناب 5 عدد۔۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شیرہ تخم خیارین (پانی میں نکالا ہوا) 4 گرام، شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر خاکی 4 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

بخار اور شدید درد سر ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

شیرہ تخم کاہو، شیرہ مغز کدو ہر ایک 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد، لعاب اسپنول 4 گرام، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ 50 ملی لیٹر ملا کر خاکی 6 گرام چھڑک کر صبح، شام نوش کرائیں۔

0۔ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر/ادویہ بروئے کار لائیں:

ابتدا میں جہدار خطائی کو آب کدو، سبز میں گھس کر باہر گلے پر لپ کریں اور لعاب اسپنول 12 گرام کو پانی میں نکال کر آب کشیز سبز 150 ملی لیٹر ملا کر غرارہ کرائیں۔

کونکار 2 عدد، گنار 4 عدد، کزمازق، عدس مسلم، کشیز خشک، مکوہ خشک ہر ایک 7 گرام۔ تمام دواؤں کو 750 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب 250 ملی لیٹر رہ جائے تو چھان کر غرارہ کرائیں۔ جب مرض میں استقرار آجائے تو اسی نسخہ میں مغز فلوں خیارہ نیم 25 گرام شامل کر کے غرارہ کرائیں۔ بعض اطباء مغز فلوں خیارہ نیم 50 گرام کو 375 ملی لیٹر گائے کے بالائی اتارے ہوئے دودھ میں جوش دے کر غرارہ کراتے ہیں۔

برگ بارنگ، تخم کرفس، اصل الوس مقشر، تخم خطی، نیم کوفتہ، عنب العلب، گل بنفشہ، برگ نیم، برگ خبازی، اکلیل الملک، ہموزن۔ تمام دواؤں کو بکری/گائے کے دودھ میں جوش دے کر چھان لیں اور تھوڑا سا نشاستہ گندم ملا کر غرارہ کرائیں۔

برگ حنا، رزد چوب ہر ایک 12 گرام، برگ کنار، برگ شہتوت ہر ایک 35 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور غرارہ کرائیں۔

کشیز خشک، پوست خشخاش، گنار فارسی، مکوہ ہر ایک 6 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور مغز فلوں خیارہ نیم 25 گرام مل کر کے دوبارہ چھان کر رست 3 گرام ملا کر غرارہ کرائیں۔

برگ شہتوت سبز، برگ اسود سبز ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو 500 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور غرغره کرائیں۔ صرف برگ شہتوت بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

فلفل سیاہ، فلفل زرد، زنجبیل، نمک سنگ، تخم ہالون، تخم ترب ہر ایک 4 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب اورک سبز 125 ملی لیٹر، سرکہ تند، 100 ملی لیٹر ملا کر غرغره کرائیں۔

مغز فلوں خیار شمبر، کباب پھینی، اسطوخودوس، مرزنجوش، انجیر ولایتی، برگ الماس سبز، گندم، مویز مٹقی، ہموزن۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نیم گرم غرغره کرائیں۔
مغز فلوں خیار شمبر 25 گرام، مکوہ خشک 9 گرام، آرد جو، گل بابونہ، اکلیل الملک، سنبل الطیب ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق مکوہ سبز مردق میں پیس کر ضاد کریں۔
ضاد کے طور پر یہ نسخہ بھی سودمند ہے:


مغز فلوں خیار شمبر 4 گرام، مکوہ خشک 6 گرام، آرد جو، گل بابونہ، سنبل الطیب، اکلیل الملک، صندل سرخ، رسوت، آرد جو ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو آب مکوہ سبز 25 ملی لیٹر میں پیس کر سرکہ 12 ملی لیٹر، روشن گل 13 ملی لیٹر ملا کر نیم گرم کر کے گلے پر ضاد کر کے کپڑا باندھ دیں۔

مغز فلوں خیار شمبر کو آب مکوہ سبز میں پیس کر نیم گرم کر کے گلے پر لپ کر دیں۔
0 — اگر مریض کے قویٰ اجازت دیں اور جسم میں خون کی کثرت ہو تو مرادوا زیر زبان کی فصد کھولیں۔ بصورت دیگر گردن پر جو نگین لگائیں۔ جذب مادہ کی غرض سے پنڈلیوں پر سینکڑیاں کھینچنا بھی سودمند ہے۔

ہڈیان کی صورت میں پاشویہ کریں۔
حقنہ کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
گل بنفشہ، خطمی، اکلیل الملک، جو مقشر، نمکوب، سیوس گندم، عناب، پستیاں ہر ایک 12 گرام، انجیر زرد 5 عدد۔ تمام دواؤں کو 1500 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب

750 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چمان کرشکر سرخ، کانچی ہر ایک 18 گرام، روغن بنفشہ، روغن بادام، روغن کچھ ہر ایک 35 ملی لیٹر ملا کر نیم گرم، دوسرے حقتہ کریں۔
یہ نسخہ بھی کارآمد ہے:

آش جو 60 ملی لیٹر، لعاب اسپنول 18 گرام، روغن بادام شیریں، روغن کدوئے شیریں ہر ایک 18 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو خوب ملائیں اور حسب دستور حقتہ کریں۔
اگر تنفس میں دشواری ہو رہی اور مریض کا دم گھٹ رہا ہو تو حجرہ / قصبہ الریہ کھول کر نلی لگائیں اور کسی بھی طرح تنفس کے نظام کو بحال کرانے کی تدابیر کریں۔




وجع الحلق

THROAT PAIN

اس مرض میں مادی/ غیر مادی اسباب کی وجہ سے حلق میں درد ہوتا ہے جس سے کھانے پینے اور دوسرے ضروری افعال میں خلل واقع ہوتا ہے اور نتیجہ کے طور پر دوسرے اعضا بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔

اقسام

اسباب کے اعتبار سے



اسباب

(I) سوء مزاج سازج / مادی۔

(II) تفرق اتصال۔

(III) درم / قرحہ / جور۔

علامات

حلق کے عضلات کے متاثر ہونے کی وجہ سے نکلنے اور چبانے میں دشواری ہوتی ہے۔ عام طور سے ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک حلق میں درد محسوس ہوتا ہے، گردن میں کھنچاؤ اور سرخی ہوتی ہے، آنکھیں ابھرتی ہیں، منہ سے رطوبت بہتی رہتی ہے۔ سوء مزاج سازج حار کی صورت میں گرم خواص کی حامل غذاؤں کے استعمال سے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور تقدّمہ کے طور پر گرم تدابیر / اغذیہ کے بروئے کار لانے کی سرگزشت ملتی ہے۔ سوء مزاج سازج بارد کی صورت میں سرد تدابیر کی روئیداد ملتی ہے، حلق میں خفیف درد ہوتا ہے، مسخن اشیاء کے استعمال سے راحت ملتی ہے اور سرد اشیاء سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوء مزاج مادی دُموی میں درد ٹیس کے ساتھ ہوتا ہے، ذائقہ شیریں، عروق مٹھی نیز چہرے اور آنکھوں میں سرخی پائی جاتی ہے۔ سوء مزاج مادی صفراوی میں درد چہن کے ساتھ ہوتا ہے، التهاب ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ اور منہ میں خشکی ہوتی ہے۔ سوء مزاج مادی بلغمی میں حلق میں گرانی کے ساتھ درد ہوتا ہے، ذائقہ بے مزہ / پیکا / نمکین ہوتا ہے، نکلنے میں دشواری ہوتی ہے، چہرے کی رنگت سفید نیز چھج ہوتا ہے۔ بکثرت لعاب دہن خارج ہوتا ہے۔ سوء مزاج مادی سوداوی میں منہ میں خشکی، تناؤ ہوتا ہے، رنگ سیاہی مائل اور ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ قروح و بھراور گرد و غبار کی صورت میں ان کی روئیداد ملتی ہے۔

اصول علاج

0 — اصل مرض کے سبب کا ازالہ کریں۔

0 — تعدیل مزاج کی کوشش کریں۔

0 — مناسب ادویہ کا غرارہ کرائیں۔

علاج

0 — غلبہ خون کی صورت میں حسب ذیل نسخہ استعمال کرائیں:

بہدانہ 3 گرام، عتاب 5 عدد — دونوں کو پانی میں جوش دے کر صبح، شام نوش کرائیں۔

غرارہ کے لیے یہ نسخہ مفید ہے:

مغزِ فلوں خیارِ شیر کو پانی میں جوش دے کر غرارہ کرائیں۔

یہ جوشاندہ بھی مفید ہے:

بہدانہ 3 گرام، ختم خبازی، مکوشنگ، ختم عظمیٰ، ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

0 — صفراوی خلط کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گل نیلوفر 4 گرام، عتاب 5 عدد — دونوں کو پانی میں جوش دے کر محفوظ کر لیں اور شیرہ ختم خیارین 4 گرام پانی میں نکال کر جوشاندہ میں ملائیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

0 — بلغمی خلط کے غلبہ کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:

اسطوخودوس، پر سیاوشاں، گلو نیلوفر، گل بنفشہ، ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — سوداوی خلط کی صورت میں یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

اصل السوس مقشر، گاؤ زبان، ہر ایک 4 گرام، عتاب 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نبات سفید سے شیریں کر کے صبح و شام نوش کرائیں۔

* شہیقہ *

WHOOPIING COUGH

اس شدید نوعی متعدی مرض میں پہلے زکام ہوتا ہے اس کے بعد توجہی طور پر شدید تنفسی قسم کی کھانسی آتی ہے، کھانسی کے ساتھ اندر کی طرف دم کھینچنے وقت ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے (اسی مناسبت سے ان کو ہنقد، سعال دہکی وغیرہ کہتے ہیں) یہ مرض 4-1 سال کی عمر میں موسم بہار میں کثیر الوقوع ہے اور وبائی طور پر پھیلتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض عمر میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ 35 سال کے بعد نادر الوقوع تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معتدل آب و ہوا والے ملکوں/علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اسباب

(۱) ہیموفیلس پرتوسس بے سی لس (Haemophilus Pertussis)
 Bacillus) نامی گرامی منفی (Gram Negative) جرثومہ — یہ جرثومہ انتہائی درجہ تعدیتی صلاحیت رکھتا ہے اور ابتدا سے ہی ملغم میں عروسی حالت میں موجود ہوتا ہے اور مریض کے تنفس، استعمال کے لباس اور چیزوں کے ذریعہ صحت مند بچوں/لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔

* کالی کھانسی، مگر کھانسی Pertussis وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

(II) نزلہ، بلغمی رطوبتوں کی زیادتی، غربت و افلاس، عام جسمانی ضعف اور غیر صحت بخش رہائش اس کے اسباب معدہ ہیں۔

علامات

امراضیاتی نقطہ نظر سے اس میں درج ذیل دموی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ خون کے سفید خلیات کی تعداد 20,000-30,000 فی مکعب ملی لیٹر ہوتی ہے، اس کے ساتھ لمفوسائٹ کا تناسب 60-70 فیصد ہوتا ہے۔

بہر حال سرایت کے 5-14 دن بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ بیان کرنے کی سہولت کی خاطر ہم ان کو درج ذیل تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) زکام / وقوع مرض کا درجہ Catarrhal/Onset Stage

اس مرحلے میں پہلے معمولی سردی کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد چھینکیں آتی ہیں، نزلہ، زکام، حلق میں خراش ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے، خفیف طور پر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو بعض اوقات 100-102 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ مذکورہ علامتوں کے ساتھ اس مرض کی ایک تشخیصی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہندرتج بظان اشتہا کی شکایت ہو جاتی ہے، کھانسی کے جھکے کے ساتھ کھائی چیز منہ سے باہر آ جاتی ہے، ناک بہتی ہے، چہرے پر بھر بھراہٹ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، پیشاب میں رطوبت بے بیہ (Albumen) خارج ہوتی ہے، رات کے وقت بے خوابی ہوتی ہے، کھانسی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ علامتیں 7-10 دن تک رہتی ہیں۔

(II) دوری درجہ Paroxysmal Stage

نزلہ/زکام کی علامتوں میں تخفیف آ جاتی ہے اور طویل نوعی کھانسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہونے سے پہلے حلق میں مخصوص سرسراہٹ اور خراش محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں لینا ہوا بچہ بیٹھ جاتا ہے، بچہ ذرا ہشیار ہو تو ان مخصوص علامتوں کا احساس

ہوتے ہی ماں/مرضعہ کی طرف دوڑ کر سہارا تلاش کرتا ہے۔ بہر حال کھانسنے کھانسنے پچے بے دم ہو جاتا ہے، منہ کھلا رہتا ہے، زبان پلٹ جاتی ہے، پیچھے پڑے سے ہوا خارج ہونے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ دورہ کی حالت میں چہرہ نیلگوں ہو جاتا ہے، آنکھیں ابھر آتی ہیں، دورہ کی شدید صورتوں میں چہرے اور گردن پر درم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بول و براز بھی خطا ہو جاتے ہیں، جسم عرق آلود ہو جاتا ہے۔ کھانسی کی باری کے وقت مریض اندر کی طرف تنفس (دم) نہیں لے پاتا۔ تاہم متعدد مرتبہ دم اندر کی طرف لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر تنفس کی ہوا اندر نہیں جا پاتی۔ مگر پھر یک بیک طویل سانس آ کر ہوا پیچھے پڑے میں داخل ہو جاتی ہے، گویا تھیم (Expiration) طویل اور زفیر (Inspiration) جھٹکے کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور غضروف مکئی (Epiglottis) کے دفعتاً بند ہو جانے سے ہوپ (Whoop) کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ (اسی مناسبت سے جدید طریقہ علاج میں اس کو Whooping Cough) کہتے ہیں) اور کھانسی کے ہر دورے کے آخر میں یہی آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب کھانسنے کھانسنے تھوڑا سا گاڑھا، لیسدار، بلغم خارج ہوتا ہے۔ اسی کھٹکس میں کھانسی ہوئی غذا بھی تے کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرا دورہ آنے کے وقت تک مریض بظاہر صحت مند نظر آتا ہے، شدید دورہ کے وقت بعض اوقات ناک اور زبان کی زیریں تھلیوں سے جریان خون ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی آنکھ کے پردہ میں اور کبھی دماغ میں بھی جریان خون ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں دورہ کی وجہ سے عضلات میں تشنج بھی ہوتا ہے اور احساس تنفس ہو کر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دوروں میں رات کے وقت شدت زیادہ ہوتی ہے۔

عام طور سے 24 گھنٹے میں 10-12 دورے پڑتے ہیں لیکن بعض اوقات 40-80 مرتبہ تک پڑ سکتے ہیں، دوروں کی زیادتی عام طور سے خطرناک نتائج مرتب کرتی ہے، مسماع الصدر کے ذریعہ بلغم کی حرکت کی آوازیں بخوبی سنی جاسکتی ہیں۔ یہ درجہ 3-4 ہفتے پر مشتمل ہوتا ہے۔

(III) انحطاطی درجہ Decline Stage

اس مرحلے میں کھانسی کے دوروں کی تعداد، مدت اور شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، رات کے وقت کھانسی کم آنے کی وجہ سے مریض کی نیند میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ غذا لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور جسمانی طاقت بھی زائل ہونے لگتی ہے۔ 'ہوپ' کی مخصوص آواز، تے اور بلغم کا اخراج رک جاتا ہے اور 8 ہفتے میں مریض اس کھانسی سے نجات پا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مرض 12-8 ہفتے اور کبھی 18-16 ہفتے تک پریشان کرتا ہے۔

چھیدگی کا انحصار عام طور سے دوسرے درجہ میں بہتری کی علامات نہ پیدا ہونے اور مناسب علاج نہ کرنے پر ہے۔ چنانچہ سقوط ربیہ، ذات الریہ، ابتدائی تدرن، التهاب عروق ششہ اور خروج مقعد وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔

واضح رہے کہ اس مرض میں 4-1 سال کی عمر کے بچوں میں ہلاکت کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس کے برخلاف 5 سال سے زیادہ عمر والوں میں کم ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مریض کو علاحدہ گرم ہوا دار کمرے میں رکھیں۔
- 0 — دورہ میں اگر تے ہو رہی ہو تو دورہ کے بعد مقوی، سیال غذائیں کھلائیں۔
- 0 — دورہ کے وقت سینہ اور گلے کی تمام بندشیں کھول دیں۔
- 0 — رفع قبض کے لیے ملینیات استعمال کرائیں۔
- 0 — عواض میں تخفیف / ازالہ کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- ابتدا میں رفع حرارت اور ازالہ زکام کے لیے یہ نسخہ دیں۔
- بہدانہ 3 گرام، ہنشدہ 3.5 گرام، گاؤ زبان 2 گرام، خبازی 2.5 گرام،

عذاب 3 عدد، سپتاں 5 عدد۔ تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان، عرق ککو، ہر ایک 35 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنشہ 12 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
سردی کا موسم ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

اصل السوس 1.5 گرام، زوفا خشک 2 گرام، گاؤ زبان 3 گرام، مویز منقہ 3 عدد، انجیر 1 عدد۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 6 گرام سے شیریں کر کے نیم گرم، چند بار نوش کرائیں۔ غلبہ ہیست کی صورت میں اسی نسخہ میں شیرہ مغز بادام 2 عدد کا اضافہ کریں۔

حلق میں خراش کی صورت میں یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

مغز بادام، مغز چلغوزہ، حجم کتان، ہر ایک 3 گرام، فلفل دراز ایک گرام، کاکڑا سنگی 1.2 گرام۔ تمام دواؤں کو چیں کر شہد خالص میں ملا کر چٹائیں۔

مغز نارچیل، حجم خشکاش، صمغ عربی، کتیرا، ہر ایک 2 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک چیں کر 35 گرام شہد ملا کر محفوظ کر لیں اور 2 گرام، صبح، شام کھلائیں۔

جوار کھار، جدوار، زعفران، فلفل سیاہ، سہاسہ، ہر ایک 7 گرام، انار دانہ ترش 18 گرام، صمغ آلو بالو 12 گرام، مرکبی 4 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر باریک کر لیں اس کے بعد خوبانی 7 عدد کو پانی میں بھگو کر زلال حاصل کریں اور اس میں باریک شدہ دوائیں ملا کر کھری کریں اور فلفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں، حسب ضرورت بچوں کو 1/4-1/2 گولی اور نوجوانوں کو 1 گولی 24 گھنٹے میں 3-4 بار کھلائیں۔

برگ کیلا خشک 12 گرام، رب السوس 6 گرام، نمک سیاہ 6.5 گرام، فلفل سیاہ، سہاگہ، شب میانی، کاکڑا سنگی، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے سٹی کے ایک کورے پیالے میں رکھ کر گل حکمت کریں اور اپلوں کی آگ پر خاستر کر کے پیس کر محفوظ کر لیں۔ بچوں کو 75-125 ملی گرام اور نوجوانوں کو ایک گرام، بکھن میں رکھ کر کھلائیں۔

پوست انار، اجوانن، ہر ایک 3 گرام، نمک سیاہ ایک گرام۔ تمام دواؤں کو 60 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب 25 ملی لیٹر رہ جائے تو چھان کر نوش کرائیں۔

کندر، لوبان، آرد باقلا، مغز۔ پیرانہ، ہر ایک 7 گرام، ترنجبین، رب السوس، گل
بخشہ، ہر ایک 5 گرام، افیون، بادیان، مغز بادام تلخ، مقشر، قند سفید، ہر ایک 2 گرام، مویر
منقی 4 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کوٹ چھان کر لعاب کر لعاب اسپغول میں گوندھ
کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی منہ میں رکھ کر چوسنے کی ہدایت کریں۔
چھوٹے بچے کو 1-2 گولیاں شہد میں حل کر کے دن میں 3-4 مرتبہ چٹائیں۔

بزدرالنج 2 گرام، زعفران ایک گرام، افیون 500 ملی گرام، اصل السوس مقشر،
کتیرا، صمغ عربی، مرکی، بہدانہ، تخم کاہو، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی
میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ضرورت کے وقت استعمال کرائیں۔
تخم باقلا، اصل السوس، ہر ایک 2 گرام، گاؤ زبان ایک گرام، پرسیا دشاں 4
گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صاف کر لیں اور شربت فریادرس 15 ملی لیٹر
حل کر کے نوش کرائیں۔

رب السوس، صمغ عربی، کتیرا، نشاستہ، شکر تینال، آرد باقلا، آرد عتاب، مغز بادام،
مغز کدوئے شیریں، مغز تخم خربزہ، تخم خشکاش سفید، ہر ایک 2 گرام، زعفران 500
ملی گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر لعاب گاؤ زبان میں گوندھ کر مونگ کے دانہ کے
برابر گولیاں بنائیں اور عمر کی رعایت سے 1-2 گولیاں استعمال کرائیں۔

گاؤ زبان 3 گرام، پنخ بادیان، بادیان، اصل السوس، ہر ایک 2 گرام، سپٹاں،
مویر منقی ہر ایک 3 عدد۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان لیں اور خمیرہ بخشہ
12 گرام ملا کر صبح کے وقت نوش کرائیں۔ شام کے وقت لعوق معتدل، لعوق سپٹاں ہر
ایک 6 گرام، عرق گاؤ زبان 75 ملی لیٹر میں جوش دے کر نیم گرم نوش کرائیں۔

نشاستہ گندم، افیون، صمغ عربی، رب السوس، ہوزن۔ تمام دواؤں کو خوب
باریک پیس کر پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں صبح، شام ہمراہ
آب تازہ کھلائیں۔

کاکڑاسنگی، اتیس، اصل السوس مقشر، صمغ عربی، ہر ایک 1 گرام۔ تمام دواؤں

کوکوٹ چھان کر شہد میں ملا کر بار بار چٹائیں۔
 دار قلع، کاکڑا سنگی نیم بریاں، زنجبیل نیم بریاں، ہر ایک 2 گرام — تمام
 دواؤں کو کوکوت چھان کر سفوف تیار کریں اور 65 ملی گرام ہمراہ شہد خالص چٹائیں۔
 روغن نارنگیل 3 ملی لیٹر دن میں تین بار نوش کرائیں۔
 0 — خارجی طور پر یہ تدبیر بروئے کار لائیں:
 قیر وٹی سرخ 5 گرام، روغن زیتون شمی 6 ملی لیٹر میں ملا کر سینہ پر مالش کریں۔




Learn Unani By Abdul Waris Salman

زحیر

DYSENTERY

اس مرض میں قولون (Colon) اور معاء مستقیم (Rectum) کی انشے مخاطیہ اور ان کے نیچے والی گلیوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ورم متفرج اور متعفن بھی ہو جاتا ہے۔ شکم میں مروڑ، درد کے باعث بار بار رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ براز میں آؤں اور خون کی آمیزش ہوتی ہے، شدید صورتوں میں جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرض گرم ممالک میں، موسم برسات میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام



اسباب

- (I) شیکا زبے سی لس¹ (Shiga's Bacillus)۔
- (II) فلیکس زبے سی لس (Flexner's Bacillus)۔
- (III) سونی (Sonne)۔
- مذکورہ تینوں جرثومے زحیر عسادی کے اسباب ہیں۔
- (IV) انٹ امیبا اسٹولائیلیکا (Ent Amoeba Histolytica) یہ زحیر امیبا کا سبب ہے۔
- (V) فیکل، نفاخ غذاؤں، گوشت، مچھلی کا بکثرت استعمال، کثیف اور گدلا پانی پینا اور کھلی و ناصاف غذاؤں کا کھانا اس کے اسباب معدہ ہیں۔
- (الف) جرثومیاتی (علم الجراثیم Bacteriology) اعتبار سے بنیادی طور پر یہ بے سی لس دو انواع کے ہوتے ہیں۔ پہلی نوع سے نیٹ (Manate) قسم کی شیرینی کو خیر نہیں کر پاتی۔ چنانچہ اس کو نمٹنے سے نیٹ فرمٹنگ گروپ² کہتے ہیں۔ اس میں ایسے مائیکرو آرگے نرم (Micro-Organism) شامل ہیں جو گلوکوز (شیرہ انگور Glucose) میں تیزابیت/ترشی پیدا کر دیتے ہیں مگر اس میں تخیر کا سبب نہیں ہوتے۔ اسی طرح لکٹوز میں بھی خیر پیدا نہیں کرتے۔ ذل سائیٹ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ گویا اس نوع کے جراثیم کا لکٹوز پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور تخیر کے بغیر گلوکوز میں ترشی/تزابیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس گروپ کا مشہور آرگے نرم شیکا زبے سی لس (Shiga's Bacillus) ہے۔ ان جراثیم کی جب کاشت کی جاتی ہے تو ان میں زندہ رہنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور بہت جلد ضائع ہو جاتے ہیں۔

دوسرے نوع سے نیٹ قسم کی شیرینی میں خیر پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کو نمٹ

1. اس جرثومے کو 1898 میں جاپان کے نامور ڈاکٹر شیکا Dr. Shiga نے دریافت کیا تھا، اسی مناسبت سے اس کو شیکا زبے سی لس کہا جانے لگا۔

فرنگک گروپ' کہتے ہیں۔ اس گروپ کا اہم جراثیم فلکسز ہے سی لس (Flexner's Bacillus) ہے۔

امراضیاتی نقطہ نظر سے برب یہ جراثیم غیر صحت بخش طریقوں کے اختیار کرنے سے فعال ہو جاتے ہیں تو ان کی سمیت وجہ سے بڑی آنتوں (اعور، قولون اور معاء مستقیم) کی اندرونی سطح میں سبزی مائل / خاکستری رنگ کی فاسد غذا (جھلی) پیدا ہو جاتی ہے، جو دراصل مقامی ورم کا نتیجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد اور انٹسٹائن ہوتی رہتی ہے۔ ورم کے متفرع ہو جانے سے براز میں آؤں اور خون وغیرہ کے اخراج کا سبب بھی یہی ہے۔

(ب) طفیلیاتی (Parastology) نقطہ نظر سے انٹ ایما سٹولائیڈ کا (Entamoeba Histolytica) نامی طفیلی، واحد اخلیہ طفیلی ہے اور پروٹوزوا (Protozoa) خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ساخت کے اعتبار سے انٹ ایما سٹولائیڈ کا تین انواع کا ہوتا ہے۔ بہر حال جب اس کی سسٹ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ انسان کے شکم میں پہنچ جاتی ہے تو معدہ سے بہت خاموشی سے گزر کر امعاء میں پہنچتے ہیں ٹریپسم (Trypsin) نامی رطوبت سے ایما کی سسٹ کی دیوار نرم ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں سے ایک انٹ ایما نکلتا ہے جس میں چار مرکزے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بائیزی فشن کے ذریعہ تقسیم ہو کر 8-8 پھولے طفیلی بن جاتے ہیں۔ یہ طفیلی کسل اور متحرک ہوتے ہیں اور معاء دقائق (چھوٹی / باریک آنتوں) سے گزر کر بڑی آنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔

امراضیاتی (Pathological) نقطہ نظر سے جب یہ طفیلی بڑی آنتوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں سسٹولائسن (Cystoclysin) نامی انزائم خارج کرتے ہیں جو امعاء کی غشا مخاطی (Mucous Membrane) اور زیر مخاطی تہہ (Sub Mucosa) کو تحلیل کرنے لگتے ہیں۔ ان انزائم سے متاثرہ نسیجیں مردہ ہو کر تحلیل ہونے لگتی ہیں اور متفرع ہو جاتی ہیں۔

علامات

(الف) زحیر عسبادی

(زحیر عسبادی تحت الحاد (Sub-Acute Bacillary Dysentery):

اس میں ابتدا میں شکم میں درد اور امعاء میں مروڑ ہوتا ہے اور پتلے، آنکوں طے ہوئے اسہال (دست) آتے ہیں، جسمانی درجہ حرارت بہت معمولی طور پر بڑھا ہوتا ہے، بطلان/ضعف اشتہا کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے بعد زحیر کی خاص علامتیں رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ بار بار رنج حاجت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاخانہ اچھی طرح نہیں خارج ہو سکا ہے۔ اس لیے کونھنا اور زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کوشش کے باوجود پاخانہ بہت مقدار میں آنکوں اور خون آمیز خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات کونھنے کی کوشش میں خروج المقتعد (کالچ نکلتا) بھی ہوتا ہے، شکم میں درد اور مروڑ کی بدستور شکایت رہتی ہے، شکم دبا ہوا/بعض اوقات منج (پھولا ہوا) ہوتا ہے۔ شفا کے وقت عوارض اور علامتوں میں کمی آنے لگتی ہے، جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اجابت میں براز طبیی خارج ہونے لگتا ہے اور کمزوری بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ زحیر عسبادی تحت الحاد (خفیف جراثیمی پیچش) ہی کثیر الوقوع ہے۔

(II) زحیر عسبادی حاد (Acute Bacillary Dysentery):

جراثیمی سرایت کے 1-11 دن کے بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا سے ہی شدت ہوتی ہے۔ چنانچہ شکم میں درد اور مروڑ ہوتی ہے اور بار بار رنج حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ 24 گھنٹے میں بعض اوقات 20-30 مرتبہ رنج حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، پاخانہ بہت قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ ابتدا میں تھوڑا سا پاخانہ/براز خارج ہوتا ہے لیکن اس کے بعد صرف آنکوں، خون اور تھچھڑے خارج ہوتے ہیں، درد اور مروڑ میں اور بھی شدت آ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنتیں اندر سے کٹ کر آ رہی ہیں، جب کھل کر رنج حاجت نہیں ہوتی تو مریض کونھ کر اور زور لگا کر فضا کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کوشش میں بعض اوقات کانچ بھی نکل آتی ہے۔ جسمانی درجہ حرارت 103-104 فہنک پہنچ جاتا ہے، متلی اور تے کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت سوزش اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس میں رطوبت بیضیہ بھی شامل ہوتی ہے، شکم پھول جاتا ہے اور شدید کرب اور بے خوابی ہوتی ہے، زبان مٹی پڑ جاتی ہے، نبض سریع چلتی ہے، ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔

نہایت شدید صورتوں میں سبز/زرد رنگ کے پیپ آئیز بدبودار اسہال آنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں بہت زیادہ مقدار میں خون خارج ہوتا ہے، متاثر آنت کے مردہ (کروسس) ہونے کی صورت میں اسہال میں خارج ہونے والا مادہ بہت قلیل مقدار میں سیاہی مائل لیسدار، شدید متعفن اور بدبودار ہوتا ہے، ان میں چھچھڑے بھی شامل ہوتے ہیں، نسخ شکم ہوتا ہے، سرد پسینہ آتا ہے، بے خوابی اور ہڈیاں ہوتا ہے، اس مرحلے میں ضعف اور لاغری غیر معمولی طور پر ہوتی ہے۔ 3-5 دن میں ہی بارہا طوں میں درم پیدا ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر 8-10 دن میں علامتوں میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور براز بھی طبی رنگ/مواد کا خارج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت بتدریج معمول پر آ جاتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے تاہم نقاہت کافی عرصہ میں جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ مریض صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(III) زخیر عصیادی مزمن (Chronic Bacillar Dysentery):

یہ صورت کبھی تو زخیر عصیادی حاد کے علاج سے شفا یابی کے بعد غذائی بے اعتدالی سے پیش آتی ہے اور کبھی زخیر عصیادی حاد از خود مزمن صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ آنتوں میں ہر وقت درد اور سروڑ ہوتا ہے اور 24 گھنٹے میں 5-6 مرتبہ رنج حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پاخانہ آنتوں اور خون آئیز خارج ہوتا ہے، چہرہ بے آب تکلیف زدہ اور بھیچا ہوا دکھائی دیتا ہے، بے آبی (Dehydration) کی وجہ سے جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے اور اس سے بھوس جھڑتی ہے، جسم سے ایک خاص قسم کی ناگوار بو آتی ہے، زبان سرخ، چمک دار اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اسہال ایک دو دن کے لیے موقوف ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت ہوتی ہے لیکن پھر زخیر کی شکایت لوٹ آتی ہے، بطلان اشتہا ہوتا

ہے، جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، رات کے وقت پسینہ آتا ہے، بعض اوقات خون آمیز متعفن مادہ اسہال میں خارج ہوتا ہے اور مریض بتدریج لاغر ہو جاتا ہے۔

(ب) زحیر امیبی:

(I) زحیر امیبی حاد (Actue Amoebic Dysentery):

عام طور سے ابتدا میں 2-3 دن زرد/بھورے رنگ کے پتلے اسہال آتے ہیں اور کبھی مرض کی علامات یک بیک رونما ہو کر شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ بہر حال فضلہ میں خون اور آنکوں آنے لگتا ہے اور 2-3 دن میں ہی شدید صورت اختیار کر لیتا ہے اور اسہال کی تعداد 24 گھنٹے میں 30 تک پہنچ جاتی ہے۔ مقام شکم میں درد اور مروڑ ہوتا ہے، رفق حاجت کے وقت بہت کونھنا اور زور لگانا پڑتا ہے۔ تاہم براز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات خفیف طور پر جسمانی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نبض سریع چلتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، مٹکی اور قے کی شکایت ہوتی ہے، فحش، شکم، شدید کرب و اضطراب اور بے خوابی ہوتی ہے، زبان پر سفید فرجی ہوتی ہے، سانس سے ناگوار بو آتی ہے، ہاتھ لگانے سے قولون اور امعاء مستقیم سخت محسوس ہوتا ہے۔ شفا یابی کی صورت میں ہفتہ عشرہ کے اندر اندر عوارض میں کمی آنے لگتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بے درد دیگر ہلاک ہو جاتا ہے یا مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔

(II) زحیر امیبی خبیث (Malignant Amoebic Dysentery):

اس صورت میں سسٹو لائیسین (Cystolysin) نامی رطوبت کی سمیت کا غیر معمولی انجذاب ہونے کی وجہ سے درد شکم اور مروڑ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، جسمانی درجہ حرارت اعتدال سے بھی کم ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، قے آنے لگتی ہے، سرد پسینہ آتا ہے، نبض ضعیف چلتی ہے، غیر معمولی ضعف ہوتا ہے اور مریض بتدریج ضعف دماغی کے باعث کوما میں چلا جاتا ہے۔

(III) زحیر امیبی غانغرائی (Gangrenus Amoebic Dysentery):

اس صورت میں آنکوں کی دیواریں مردہ ہونے لگتی ہیں (اور جب بالکل مردہ

ہو جاتی ہیں تو اس کو زحیر امیبی شفا قلو سی کہتے ہیں) شکم میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، براز میں آنٹوں کی مردہ غشا مخاطی کے بڑے بڑے ٹکڑے خارج ہو جاتے ہیں، ابتدا میں فضلہ کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے جو بعد میں سیاہی مائل ہو جاتا ہے، فضلہ سے مردار کی سی بو آتی ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور نبض سریع چلتی ہے، اسہال کی تعداد کم ہو جاتی ہے شدید ضعف ہو کر مریض ہلاک ہو سکتا ہے۔

(IV) زحیر امیبی مزمن (Chronic Amoebic Dysentery):

یہ صورت عام طور سے زحیر امیبی حاد کے بعد پیش آتی ہے اور بعض اوقات بتدریج از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر حال کبھی تو مریض کو قبض ہوتا ہے اور پھر 3-4 دن بعد اسہال آنے لگتے ہیں، جن میں مخاطی مادہ اور خون شامل ہوتا ہے، کبھی صرف اسہال آتے ہیں جن میں ساگو دانہ کے مانند چھوٹے چھوٹے دانے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شکم میں درد، بے چینی اور تکلیف سی ہوتی ہے، ریاح اور نفخ شکم کی شکایت ہوتی ہے، نظام ہضم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے عام کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ سال چھ ماہ یہی حالت رہے تو مریض دبلا ہو جاتا ہے، اعصاب بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور مریض کی قوت فیصلہ اور عام کارکردگی پر خراب اثر پڑتا ہے، شکم کو ہاتھ سے ٹٹولنے پر معاکبار (بڑی آنتیں) کے بعض حصے سخت محسوس ہوتے ہیں۔ براز کے کیاوی/خوردہنی معائنے سے تشخیص میں چنداں دشواری نہیں ہوتی۔

زحیر عسبادی اور زحیر امیبی کی تشخیص میں بعض اوقات دشواری پیش آسکتی ہے۔ اس لیے ذیل میں ان کی علامات فاروقہ تحریر کی جا رہی ہیں، بعض دوسرے امراض بھی تشخیص میں اشتباہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔

تفریقی علامات

زحیر امیبی Amoebic Dysentery	زحیر عسبادی Bacillary Dysentery
1- مدت حضانہ 7 دن سے زائد۔	1- اس کی مدت حضانہ 12 گھنٹے سے

- چار دن ہے، بعض حالات میں 11 بھی ہو سکتی ہے۔
- 2- مرض کا حملہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔
- 3- 24 گھنٹے میں اسہال کی تعداد عام طور سے 30-40 ہوتی ہے لیکن بعض حالات میں 100 تک پہنچ جاتی ہے۔ براز کی مقدار کم، بعد میں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور صرف آنکوں اور خون خارج ہوتا ہے۔
- 4- فضلہ برازی / اسہال میں بدبو نہیں ہوتی۔
- 5- جسمانی درجہ حرارت 104 ف تک پہنچ جاتا ہے اور اگر مرض رو بہ انحطاط ہو تو درجہ حرارت طبی سے بھی کم ہو جاتا ہے۔
- 6- مریض بہت جلد لاغر ہو جاتا ہے۔
- 7- بطن کے عضلات کی مزاحمت زیادہ نہیں ہوتی۔
- 8- امعاء کی غشا مخاطی میں التهاب ہوتا ہے۔
- 9- عوارض میں التهاب جگر / قروح جگر نہیں ہوتا بلکہ مفاصل میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔
- 10- براز کے خورد بینی امتحان میں خلیات
- بعض حالات میں 20 دن سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔
- 2- ابتدا آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔
- 3- اسہال کی تعداد 10-20 تک ہو سکتی ہے۔ نسبتاً براز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
- 4- فضلہ اسہالی میں بدبو ہوتی ہے۔
- 5- جسمانی درجہ حرارت شاذ و نادر 101 ف تک پہنچ جاتا ہے۔
- 6- مریض بتدریج لاغر ہوتا ہے۔
- 7- بطنی عضلات کی مزاحمت زیادہ ہو جاتی ہے اور امعاء بھی دبازت آ جاتی ہے۔
- 8- امعاء کی دیوار کے تمام حصوں میں قروح ہو جاتے ہیں۔
- 9- اکثر اوقات التهاب جگر / عظم جگر کی شکایت ہوتی ہے۔
- 10- خلیات امعاء (R.B.C.) کی تعداد

میں کی، آجاتی ہے اور براز میں امیبا اور ان کے کیسے دکھائی دیتے ہیں۔	احمر (R.B.C.) کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں اور عصبیادی جراثیم بھی دکھائی دیتے ہیں۔
11- مناسب علاج نہ ہونے کی صورت میں مرض کا اعادہ عام بات ہے۔	11- مرض کا اعادہ عام طور سے نہیں ہوتا۔

تفریقی علامات

التهاب مقعد حاد	زحیر Dysentery
1- معاء مستقیم میں غیر معمولی ہوتا احساس ہوتا ہے۔	1- مرض کی علامات شدت کے ساتھ رونما ہوتی ہیں۔
2- جسمانی علامات نہیں ہوتیں۔	2- جسمانی علامات بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔
3- معاء مستقیم میں درد ہوتا ہے۔	3- شکم میں شدید درد ہوتا ہے۔
4- نفخ شکم نہیں ہوتا۔	4- نفخ شکم ہوتا ہے۔
5- قبض ہوتا ہے۔	5- اسہال آتے ہیں۔
6- جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر رہتا ہے۔	6- جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

سرطان معاء مستقیم	زحیر مزمن Chronic Dysentery
1- سرطانی کیفیات کی سرگزشت ملتی ہے	1- شدید حملہ کی سرگزشت ملتی ہے۔
2- معاء مستقیم میں الم قاطع ہوتا ہے۔	2- معاء مستقیم میں مروڑ ہوتا ہے۔

- | | |
|--|---|
| 3- قبض ہوتا ہے۔ | 3- اسہال کی شکایت ہوتی ہے اور بعض اوقات صرف چند دنوں کے لیے قبض ہوتا ہے۔ |
| 4- اجابت فیتے کی طرح اور اس پر بلغم اور خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ | 4- اجابت گندھے ہوئے آٹے کی طرح اور اس میں خون اور بلغم کی آمیزش ہوتی ہے۔ |
| 5- معاء مستقیم کے معائنہ سے رسولی کا پتہ چلتا ہے۔ | 5- معاء مستقیم کے معائنہ سے غشا مخاطی میں درم محسوس ہوتا ہے۔ |
| 6- سرطانی مادہ ملتا ہے۔ | 6- براز کے خورد بینی معائنہ پر زحیر کے عصیادی/امبی طفیلی/جرثومے ملتے ہیں۔ |
| 7- نقص تغذیہ سرطانی ہوتا ہے۔ | 7- سوء التقیہ اور ضعف کی شکایت ہوتی ہے۔ |

اصول علاج

واضح رہے کہ زحیر عصیادی اور زحیر امبی کے اصول علاج اور علاج میں نمایاں فرق ہے۔ اس لیے دونوں کا اصول علاج تحریر کیا جا رہا ہے۔

زحیر عصیادی

- 0 — مریض کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دیں اور رفق حاجت کا انتظام بھی بستر پر ہی، بیڈ چین کے ذریعہ کریں۔
- 0 — ٹھوس اور سخت غذاؤں (روٹی، گوشت وغیرہ) کے استعمال پر قطعی پابندی لگا دیں، آتش جو، تھج وغیرہ دیں۔ زیادہ گرم اور زیادہ مقدار میں نہ دیں۔
- 0 — پیاس کی صورت میں ایک مرتبہ زیادہ مقدار میں پانی نہ دیں۔
- 0 — شکم میں شدید درد کی صورت میں گرم نکور کریں۔

- 0 — سردی سے احتیاط لازمی ہے۔
- 0 — ہاتھ پیر سرد ہو جائیں تو گرم پانی کی بوتلوں سے ٹکمد کریں۔
- 0 — اصل علاج سے قبل امعاء سے قاسد فضلہ کے اخراج کے لیے روغن بید
- 0 — نفوش کرائیں، درد شکم کے ازالہ کے لیے تھوڑی انیون بھی شامل کر سکتے ہیں۔
- 0 — اگر اسہال (رفع حاجت) کی بار بار ضرورت پڑتی ہو تو مریض کو دیر تک
- 0 — رفع حاجت کے لیے کونھنا اور زور لگانا، خلاف اصول ہے۔
- 0 — حقنہ، نطول، آیزن، شفاف، ضاد وغیرہ کا اصول اختیار کریں۔
- 0 — حسب ضرورت ملینیات اور حرز لقات استعمال کرائیں۔
- 0 — حقنہ دیں اور کمر کے نیچے سیٹگیاں کھینچیں۔

زحیرامی

- 0 — ابتدا میں لعاب دار اور سرد دوائیں استعمال کرائیں۔
- 0 — سرد مقویات کے بعد قابضات استعمال کرائیں۔
- 0 — شکم میں درد ہو تو گرم بوتل سے ٹکمد کر سکتے ہیں شدید صورتوں میں (جو
- 0 — عام طور سے پیش نہیں آتی) انیون کا داخلی استعمال کر سکتے ہیں۔
- 0 — شفا کے بعد مقویات استعمال کرائیں۔

علاج

- (I) زحیر عسیاوی:
- (I) زحیر عسیاوی تحت الحاد:
- آنتوں سے فضلہ کو خارج کرنے کے لیے خفیف مزریق اور ملین کے طور پر یہ نسخہ
- بروئے کار لائیں:
- اسپغول مسلم 18 گرام، روغن بادام سے چرب کر کے شربت بنفشہ 5 ملی لیٹر کے
- ہمراہ کھلائیں۔

ریشہ خطمی 5 گرام، بہدانہ 3 گرام۔ 50 لیٹر پانی میں دونوں کا لعاب نکال کر اسی میں شربت بنفشہ 25 لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔
روغن بیدانجیر دلائی 50 لیٹر، گائے کا دودھ 250 لیٹر میں ملا کر تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں۔

مغز فلوں خیار صفر 50 گرام، گائے کا دودھ 250 لیٹر میں بھگو کر مل چھان لیں اور نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

جب دو تین اسہال (کھل کر) آجائیں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:
خمیرہ گاؤ زبان 9 گرام، ورق فقرہ (چھوٹا) 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں اوپر سے لعاب ریشہ خطمی، لعاب بہدانہ، ہر ایک 3 گرام، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ 25 لیٹر ملا کر اسپغول مسلم 7 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

حسب ضرورت دوسرے دن یہ نسخہ دیں:

سفوف مقلیا شا 9 گرام، ہمراہ لعاب ریشہ خطمی، لعاب بہدانہ، ہر ایک 3 گرام (پانی میں نکالا ہوا)، شربت انجبار/ شربت حب الّاس 25 لیٹر، نوش کرائیں۔ سفوف مقلیا شا کا نسخہ درج ذیل ہے:

ختم خرفہ، ختم خشخاش، ہر ایک 10.5 گرام، نشاستہ 14 گرام، ختم کنوچہ، ختم ریحان، ختم حماض، حب الّاس، شاہ بلوط، طباشیر، گل ارمنی، ہر ایک 21 گرام، صمغ عربی 25 گرام، اسپغول 35 گرام۔ اسپغول کے علاوہ تمام دواؤں کو علاحدہ علاحدہ کوٹ لیں اور طباشیر، گل ارمنی، ختم خشخاش کے علاوہ باقی دواؤں کو بریاں کر لیں اور باہم ملا کر رکھ لیں۔

(II) زحیر عصیادی حاد:

امعاء سے فاسد فضلہ کو خارج کرنے اور تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
روغن بیدانجیر 50 لیٹر، نیم گرم گائے کا دودھ/ عرق گلاب 250 لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

بہدانہ 3 گرام، ریشہ خطمی 5 گرام کو عرق کو 145 ملی لیٹر میں بھگو کر لعاب حاصل کریں اور اس میں مغز فلوں خیارشیر 50 گرام، گلقد 55 گرام ملا کر چھان لیں اور روغن بادام 6 ملی لیٹر شامل کر کے نوش کرائیں۔ صرف مغز فلوں خیارشیر 50 گرام ہمراہ گائے کا دودھ نیم گرم 5 ملی لیٹر ملا کر چھان لیں اور نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرا سکتے ہیں۔

اس کے بعد مبرد کے طور پر یہ نسخہ دیں:

لعاب بہدانہ 3 گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر مل کریں اور اوپر سے اسپنول مسلم 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

امعاء کے حقیقہ کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گل ارمنی، کھریا، حب الّاس، جفت بلوط، کتیرا، تخم خشکاش سفید، ہر ایک 4 گرام، صمغ عربی، کرمازج، اتاقیا، دم الاخوین، ہر ایک 3 گرام گلنار فارسی، بخ انجبار، ہر ایک 6 گرام، انیون 75 ملی گرام، زعفران 1 گرام۔ تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ چھان کر 3 گرام کے اقراص بنائیں اور ایک قرص کھلا کر بادیاں 5 گرام، ریشہ خطمی، بخ انجبار ہر ایک 6 گرام پانی میں پیس کر شیرہ حاصل کر کے ضمیرہ بنفشہ 25 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

اس نوع میں خارجی تدابیر بھی از حد ضروری ہیں۔ چنانچہ حسب موقع و ضرورت یہ تدابیر اختیار کریں:

درم کو تحلیل کرنے کے لیے یہ نسخہ حقنہ بروئے کار لائیں:

تخم کتناں، بنفشہ، تخم خبازی، تخم خطمی، ککو، ہر ایک 35 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور 25 ملی لیٹر روغن ملا کر آہستگی سے حقنہ کریں۔

یہ آیزن بھی تحلیل درم میں معاون ہے:

گل سرخ، ککو، خطمی، برگ کرنب، ہر ایک 35 گرام۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں، پھر نیم گرم حالت میں مریض کو کمر تک آیزن کرائیں۔

درو کی شدت کے لیے یہ شیاف مفید ہے:

نحلی، بزرکتاں ہر ایک 3 گرام۔ دونوں کو باریک پیس کر محض 1 گرام،
افیون، زعفران، ہر ایک 135 ملی گرام، عرق گلاب میں گھس کر شیاف بنائیں اور روغن گل
سے چرب کر کے یہ شیاف حسب دستور استعمال کرائیں۔
کمر کے نیچے پینٹیاں کھینچیں۔

(III) زحیر عیادی مزمن:

ہالون بریاں، اسپغول بریاں، اہبل بریاں، زیرہ کرمانی تخم گندہ، ہر ایک 4
گرام، افیون 6 گرام۔ ہالون اور اسپغول ملا کر 250-500 ملی گرام استعمال کرائیں۔
رال، کات سفید، بیل گری، تخم کنوچ ہوزن۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر 5
گرام صبح، شام ہمراہ شربت حب الہاس استعمال کرائیں۔
بادیان، پوست خشکاش، ہلیہ سیاہ، ہر ایک 12 گرام۔ تینوں دواؤں کو روغن گاؤ
میں بریاں کر کے سفوف بنائیں اور 7 گرام یہ میہ استعمال کرائیں۔
ہلیہ سیاہ، زنجبیل بریاں ہوزن کو روغن گاؤ میں نیم بریاں کر کے کوٹ چھان لیں
اور ہوزن شکر ملا کر 7 گرام کھلائیں۔
اگر نفع اور درد شکم بھی ہو تو یہ نسخے استعمال کرائیں:

بادیان 5 گرام، زیرہ سفید، زنجبیل، آملہ خشک، ہلیہ سیاہ، ہر ایک 4 گرام، پوست
خشکاش 4.5 گرام۔ تمام دواؤں کو علاحدہ علاحدہ بریاں کریں اور نبات سفید 25 گرام
ملا کر سفوف تیار کریں۔ حسب ضرورت 4-5 گرام دن میں دو مرتبہ کھلائیں۔
فلفل سیاہ 25 گرام، زنجبیل 50 گرام، دارچینی 12 گرام۔ تمام دواؤں کو
بریاں کر کے سفوف کر لیں اور افیون 3 گرام پانی میں حل کر کے اس سے گوندھ کر پنے کے
برابر گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں کھلائیں۔

(ب) زحیر امیسی:

خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

زحیر شدید نہ ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

ریشہ عطی 4 گرام، بہدانہ 3 گرام، عرق گلاب، عرق کھو، ہر ایک 75 لیٹر میں
بھگو کر لعاب حاصل کریں اور شربت بنفشہ 25 لیٹر ملا کر چار تخم 9 گرام چھڑک کر صبح،
شام نوش کرائیں۔

شدید صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:-

لعاب بہدانہ 3 گرام، لعاب ریشہ عطی 4 گرام، شیرہ تخم کاسنی، شیرہ تخم خیاریں،
شیرہ زرشک، ہر ایک 7 گرام، عرق نیلوفر، عرق گلاب، ہر ایک 85 لیٹر میں نکال کر
شربت بنفشہ 25 لیٹر ملائیں اور سیوس اسپنول 7 گرام چھڑک کر صبح، شام نوش کرائیں۔
جب شدت میں کچھ کمی آجائے تو یہ سفوف استعمال کرائیں۔

تخم حماض بریاں، صمغ عربی بریاں، تخم خرفہ بریاں، ہر ایک 3 گرام، نشاستہ 3.5
گرام بریاں — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں۔ اس کے بعد تخم کنوچہ،
بارنگ، تخم ریحان، اسپنول مسلم، ہر ایک 3 گرام اس سفوف میں ملائیں اور حسب ضرورت
7-9 گرام روغن بادام/ روغن گاؤ میں چب کر کے کھلائیں۔

اگر براز میں خون بھی آ رہا ہو تو یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

تخم ریحان 5 گرام، بارنگ 4 گرام، دانہ بیل خورد 3 گرام — تمام دواؤں کو
پیس کر عرق گلاب 120 لیٹر میں جوش دیں اور لعاب بہدانہ 3 گرام، لعاب اسپنول،
لعاب ریشہ عطی ہر ایک 6 گرام رس جو شانہ، میں نکال کر شربت 25 لیٹر مل کر کے چار
تخم (روغن بادام میں چب کر وہ) 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

قابض کے طور پر یہ نسخہ بھی سودمند ہیں:

مائیں خورد، کات سفید، افیون ہر ایک 3 گرام — تینوں دواؤں کو پیس کر
فلفل سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں چاول کی پیچ کے ساتھ کھلائیں۔

خم حماض، نشاستہ، برنگ، دانہ بیل، بیل گری (ہر ایک بریاں کی ہوئی) ہر ایک
7 گرام طباشیر، دم الاخوین، کھریا، ہر ایک 3 گرام، پوست خشخاش (روغن بادام میں بریاں کیا
ہوا) 2 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر 3-7 گرام ہمراہ شیرہ خم کاسنی استعمال کرائیں۔
یہ سفوف سر خم بھی مجرب ہے:


خم کوچ، اسپنول، بارنگ، صمغ عربی، ہر ایک 12 گرام۔ پہلے تینوں دواؤں کو
بریاں کریں، اس کے بعد آخری دوا (صمغ عربی) کو باریک پیس کر باقی دواؤں کے ساتھ
دوبارہ سفوف کریں اور روغن بادام سے چب کر کے 9-12 گرام کلائیں۔

دم الاخوین، کھریا شعی، طباشیر، گل ارمنی، ہر ایک 1 گرام — تمام کا حسب دستور
سفوف تیار کریں اور 3-5 گرام کھلا کر اوپر سے شیرہ ریشہ انجبار 6 گرام، لعاب بہدانہ 3
گرام، لعاب ریشہ خطمی 4 گرام، شیرہ خم خرفہ 9 گرام، پانی میں نکال کر چہار خم 9 گرام
چھڑک کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں:

گل ارمنی، صندل سفید، زردون، افاقیا، ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو عرق
گلاب میں پیس کر شکم پر لپک کریں۔
یہ نسخہ بطور حقن استعمال کرائیں:

آش جو 120 ملی لیٹر، چاول (دھلا ہوا) خم کردہ بڑ، ہر ایک 120 گرام کو
پکائیں اور اس میں سفیدہ کاشغری، نشاستہ، افاقیا، گنار فارسی، ہر ایک 1.5 گرام، زعفران
1.5 گرام، روغن گل، 1.5 ملی لیٹر، زردی بیضہ مرغ 1 عدد، شیاف امیش 4 گرام — تمام
دواؤں کو ملا کر حقن کریں۔



ہیضہ

CHOLERA

اس حاد متعدی معدی معوی مرض (Acute Infective Gastrointestinal Disease) میں بکثرت اسہال اور تے آنے کی وجہ سے شدید بے آبی (Dehydration) پیدا ہو جاتی ہے اور اگر بروقت روک تھام (تدارک) نہ کی جائے تو شدید ضعف اور سقوط قوت ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہندوستان کے ساحلی علاقوں، بالخصوص گجرات اور برہم پتر میں غیر معمولی آلودگیوں کی وجہ سے موسم برسات میں کثیر الوقوع ہے۔

اقسام

ہیضہ

Cholera

ہیضہ شدید

Cholera
Gravis

ہیضہ یاسہ

Cholera
Sicca

ہیضہ

Cholera

ہیضہ اسہال

Choleraic
Diarrhoea

ہیضہ مشعلہ

Ambulatory
Cholera

اسباب

(I) وائبریو کالرائی (Vibrio Cholerae) نامی جرثومہ کا معدہ اور امعاء (Gsstero Intestine) میں سرایت کر جانا۔ واضح رہے کہ یہ جراثیم چھوٹے اور کسی قدر خم دار ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو "کاما بے سی لس" بھی کہتے ہیں۔ یہ جرثومے معدہ کی ترش، تیز آبدار رطوبت میں ہلاک ہو جاتے ہیں، خشکی میں بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہتے، خفیف جراثیم کس دواؤں سے فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں، گرم موسم میں پانی میں 1-3 دن اور سرد موسم میں 5-8 دن زندہ رہ سکتے ہیں۔

(II) آب و ہوا کا تغیر و فساد، ضعف ہضم، نقص تغذیہ، سوء ہضم، غیر صحت بخش رہائش، مکھیوں کی زیادتی، آبی کثافت و آلودگی، نازک مزاجی، مکان، رنج و غم، قوت مدبرہ بدن کا ضعف، ہیضہ کی وبا کے دوران تیز مسہل کا استعمال وغیرہ اس کے اسباب معدہ میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔

اس مرض کا قیدیہ غذا، پانی اور مریض کے براز سے دوسرے صحت مند انسان کو ہوتا ہے۔

امراضیاتی نقطہ نظر سے وائبریو کالرائی (Vibrio Cholerae) کی وجہ سے ابتدائی اذیت چھوٹی آنت (Small Intestine) کے زیریں حصہ میں حاد التهاب (Acute Inflammation) کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی آنت (Large Intestine) مرارہ (Gall Bladder) اور دوسرے حصوں میں بھی یہ جرثومہ نفوذ کر سکتا ہے۔ یہ جرثومہ ایک قوی درجہ کا سم خارجی (Exotoxin) جس کو سم معوی (Enterotoxin) کہتے ہیں، خارج کرتا ہے، جو غشا مخاطی کے Adeny Cyclase-Adenosine Monophosphate Pathway کو تحریک دیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر چھوٹی آنت سے طبعی الکی (Normal Alkaline) باہر نکلنے لگتی ہے، آنت میں سیال کے عمل انجذاب کے جلدی رہنے کے باوجود شدید بے آبی (Dehydration)

ہوتی ہے۔ تیزابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیبرکن غدد و غدود اور سطحی بشرہ کے اوپر منتشر شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بشرہ کے چھوٹے چھوٹے چھلکے سیال رقیق کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے براز (پاخانہ) چاؤل کی پیچ کی مانند ہو جاتا ہے، اس سیال کا رد عمل (جیسا کہ ذکر ہوا) کھاری ہوتا ہے، جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور شدید مرضی علامات رونما ہوتی ہے۔

علامات ۔

عام طور سے سرایت کے 20-72 گھنٹے کے بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں ہیضہ کی تمام اقسام کا اجمالی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی علامات ذکر کی جائیں گی۔

(I) ہیضہ منتقلہ:

اس نوع کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو ہیضہ کے جراثیم کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور مرض کو پھیلانے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں ہیضہ کے مرض کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ یہ صورت مرض ہیضہ سے شفا یاب اشخاص میں کثیر الوقوع ہے۔ غور کیا جائے تو یہ ہیضہ کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ یہ جرثومی تعدیہ کا ذریعہ ہے۔

(II) ہیضہ اسہالی:

اس میں براز، اسہال کی مانند آتا ہے۔ سیال کی رنگت زرد/پیچی ہوتی ہے اور ان میں ہیضہ کے جراثیم (V. Cholerae) موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تے بھی آتی ہے اور بے آبی (Dehydration) ہو کر تشنج بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کو ہم ہیضہ کا ابتدائی، صحت کے امکانات والا مرحلہ قرار دے سکتے ہیں۔ کیونکہ معالجہ کی بے پرواہی سے یہی قسم شدید ہیضہ کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور مناسب علاج ہو جانے پر شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

(III) ہیضین:

اس قسم میں اچانک شکم میں شدید درد محسوس ہوتا ہے اور اسہال آتے ہیں، جن میں براز شامل ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد چاول کی پیچ کی مانند اسہال آنے لگتے ہیں اور تھوڑی مدت بعد ہی راحت مل جاتی ہے۔

(IV) ہیضہ یابسہ / بند ہیضہ:

اس صورت میں اسہال اور سنے آئے بغیر یک بیک شدید ضعف، بخاری ہو کر جسم سرد پڑ جاتا ہے، گویا ان علامتوں کے ظاہر ہونے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تشریح بعد الموت سے مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے۔

بعض اطباء نے مذکورہ بالا چاروں اقسام کو ہیضہ غیر حقیقی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کا یہ نظریہ صرف علامتوں کے ظاہر ہونے کے اختلاف کی نوعیت پر ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان (ہیضہ مستقلہ، ہیضہ اسہالی، ہیضین اور ہیضہ یابسہ) میں بھی ہیضہ کے مخصوص جراثیم پائے جاتے ہیں۔

ہیضہ شدید:

اطباء اس کو ہیضہ حقیقی / اصلی بھی کہتے ہیں۔ اس میں علامتیں عام طور سے یک بیک اور شدت کے ساتھ رونما ہوتی ہیں — بعض اوقات علامات مندرجہ (Premonitory Symptoma) کے طور پر جسم میں گرانی (بھاری پن) کسل مندی، درد سر، بد ہضمی، پیاس کی شدت، کرب و اضطراب، کمزوری و پستی ضعف اور عدم اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، وبا کے آخری ایام میں ان علامات مندرجہ کو خاص طور سے دیکھا جاسکتا ہے، ورنہ شدید وبا کی ایام میں یہ علامات قطعی رونما نہیں ہوتیں۔

بیان کی سہولت کے لیے ہم ان کو درج ذیل درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) درجہ استفراغ / اسہال ابتدائی:

ابتدا میں شکم میں معمولی درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسہال آنے لگتے ہیں، اسہال کا آغاز عام طور سے صبح تڑکے سے ہوتا ہے، جس میں پہلے فضلہ خارج ہوتا ہے اس کے بعد چاول کی پیچ کی مانند اسہال آنے لگتے ہیں، ان میں امعاء کے خاکی ٹکڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد بعض اوقات تے آنے لگتی ہے، اس میں بھی غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفراوی مادہ خارج ہوتا ہے اور بالکل آخر میں چاول کی پیچ کی مانند رطوبت خارج ہوتی ہے یہ مدت 2-4 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔

(II) درجہ تڑاید / اشتداد:

عوارض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، تے اور اسہال کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جسم سے پانی 100 ملی لیٹر فی کیلو گرام، وزن جسمانی کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے اور اس شدید بے آبی (Dehydration) کی وجہ سے ٹانگوں اور پاؤں میں تشنگ ہونے لگتا ہے۔ یہ عام طور سے عضلات کے سروں سے شروع ہوتا ہے، شکم اور سر میں درد ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، کرب و اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مریض پانی پینے کے فوراً بعد تے کر دیتا ہے۔ عام طور سے یہ مدت 3-10 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

(III) درجہ انتہا / نقاہت:

جسم میں غیر معمولی بے آبی کی وجہ سے خون میں گاڑھا پن ہو جاتا ہے اور اس کا دوران ست پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے خارجی طور پر جسمانی حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ گھٹ کر 95 درجہ ف یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر جسم سرد پڑ جاتا ہے۔ لیکن اندرون جسم حرارت غیر طبعی طور پر بڑھی ہوتی ہے۔ چنانچہ مقدار / اندام نہانی میں

مقیاس الحرارة (Thermometer) سے دیکھنے پر درجہ حرارت 102-104 تک ہوتا ہے، سرد پینہ آکر جسم سرد پڑ جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آنکھیں پتھر جاتی ہیں اور اس کے گرد نیلگوں چلتے پڑ جاتے ہیں، ہونٹ بھی نیلے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر سردی چھا جاتی ہے اور وہ دب جاتا ہے، مریض بولنے سے قاصر ہوتا ہے اور بالفرض بولے بھی تو نہایت گہرائی سے آنے والی آواز، جیسی آواز سنائی دیتی ہے گویا وہ کسی کنویں سے بول رہا ہو، شدید ضعف ہوتا ہے، نبض نہایت ضعیف اور ایک ایک کر چلتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیشاب بالکل نہیں آتا، کرب اور بے چینی اپنی انتہا کو ہوتی ہے۔ عام طور سے اسہال اور تھکے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم سے سیال بالکل نچوڑ کر باہر آچکا ہوتا ہے، شکم کی جلد کو اٹھا کر چھوڑا جائے تو وہ بہت دھیمی رفتار سے اپنی اصل ہیئت اس مقام پر آتی ہے بعض اوقات تھکے کی شکایت بدستور رہتی ہے لیکن اس سے خارج ہونے والے سیال کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ درجہ عام طور سے 18-3 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، اسی مدت میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر شفا کی امید پیدا ہو جاتی ہے اور چوتھا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔

(IV) درجہ انحطاط / رد عمل:

اس کو مبارک درجہ تصور کرنا چاہیے، کیونکہ درجہ انتہا کا بغیر و خوبی گزر کر اس درجہ کے شروع ہو جانے سے شفا کی امید بہت زیادہ بندھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں علامتوں میں بتدریج کمی اور تخفیف ہونے لگتی ہے، پیاس کی شدت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ نبض میں باقاعدگی اور سرعت ہوتی ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا خارج ہونے لگتا ہے، جسمانی بیوست (خشکی) دور ہونے لگتی ہے اور چہرے پر ہلکتی اور بنیشت آنے لگتی ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات درجہ حرارت اعتدال سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، آنکھوں میں زندگی کی شادابی اور تڑاوت آ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ قوی جسمانی اصل حالت پر آ جاتے ہیں۔

بعض اوقات ان علامات مجموعہ (اچھی علامات) کے بعد مرض کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسہال آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے نقاہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں،

قلت بول/ احتباس کی شکایت ہو جاتی ہے، نبض سریع اور دقت چلنے لگتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے، عضلات میں کپکپاہٹ اور تشنج ہوتا ہے، غرض سابق میں مذکور تمام ردی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد مریض کو مایں چلا جاتا ہے اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ عوارض کے طور پر فواق (پھکی) ذات الریہ، ذات الحجب، التهاب کلیہ التهاب امعاء زحیر، التهاب غدہ تکیف، التهاب مرارہ— وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہیضہ اور بعض امراض (تخم، تسم غذائی اور تسم سکھیا وغیرہ) میں باہمی تفریق و تشخیص دشوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

تخم Dyspepsia	ہیضہ Cholera
1- اسہال اور تے میں صرف غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے۔	1- ابتدا میں اسہال میں براز اور تے میں غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد چاول کی پیچ کی مانند رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔
2- عوارض شدید نہیں ہوتے اور ضعف بھی بتدریج آتا ہے۔	2- عوارض نہایت شدید ہوتے ہیں، اور مریض بہت جلد نڈھال اور کمزور ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

تسم غذائی Food Poisoning	ہیضہ Cholera
1- خاندان کے ایک سے زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔	1- ایک ہی فرد یا محلہ/تھبے کے متعدد لوگ جتلائے مرض ہوتے ہیں۔

- | | |
|--|---|
| <p>2- غذا لینے کے چند گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔</p> <p>3- نبض میں بہت زیادہ ضعف نہیں ہوتا اور نہ ہی احتباس ہوتا ہے۔</p> <p>4- اسہال کے ساتھ درد شکم بھی ہوتا ہے۔</p> <p>5- کسی مواد پایا جاتا ہے جو فساد غذا سے وجود میں آتا ہے۔</p> | <p>2- اسہال عام طور سے صبح تڑکے سے شروع ہوتا ہے۔</p> <p>3- نبض ضعیف چلتی ہے اور احتباس ہوتا ہے۔</p> <p>4- اسہال کے ساتھ درد شکم نہیں ہوتا۔</p> <p>5- براز کے خورد بینی امتحان میں ہیضہ کے مخصوص جراثیم پائے جاتے ہیں۔</p> |
|--|---|

تفریقی علامات

- | تسمم سکھیا | ہیضہ
Cholera |
|---|--|
| <p>1- اسہال میں خارج ہونے والی رطوبت رنگین، بدبودار، خون آمیز ہوتی ہے۔</p> <p>2- اسہال کے ساتھ شدید مروڑ ہوتا ہے۔</p> <p>3- تے سے پہلے حلق میں درد ہوتا ہے۔</p> <p>4- طبقہ ملتحمہ میں درم ہوتا ہے۔</p> <p>5- وریڈوں میں خون کا اجتماع نہیں ہوتا۔</p> <p>6- تے کے کیمیائی امتحان میں سکھیا کا پتہ چلتا ہے۔</p> | <p>1- اسہال چاول کی پیچ کی مانند اور سفیدی مائل ہوتا ہے۔</p> <p>2- شکم میں (اسہال کے وقت) درد نہیں ہوتا۔</p> <p>3- حلق میں درد نہیں ہوتا۔</p> <p>4- طبقہ ملتحمہ میں درم نہیں ہوتا۔</p> <p>5- موت کے بعد وریڈوں میں خون کا اجتماع ہوتا ہے۔</p> <p>6- برازی فضلہ تے کے کیمیائی/خورد بینی امتحان میں <i>Vibrio Cholerae</i> موجود ہوتے ہیں۔</p> |

تفریقی علامات

اسہال وبائی Epidemic Diarrhoea	ہیضہ Cholera
1- اسہال میں غیر منہضم غذا، بلغم اور براز کے اجزا خارج ہوتے ہیں۔	1- اسہال میں عام طور سے ابتدا سے ہی چاول کی پیچ کی مانند رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔
2- اسہال میں براز/چوہے کی سی مخصوص بو ہوتی ہے۔	2- اسہال میں براز کی مخصوص بو نہیں ہوتی۔
3- اسہال میں صفرا کی آمیزش ہوتی ہے۔	3- عام طور سے صفراوی اسہال صرف چند مرتبہ آتا ہے۔ اس کے بعد چاول کی پیچ کی مانند رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔
4- اسہال اورتے کے ساتھ درد ہوتا ہے۔	4- اسہال اورتے میں درد نہیں ہوتا۔
5- پیشاب میں رطوبت بیضیہ کا اخراج نہیں ہوتا۔	5- پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے۔
6- احتباس بول نہیں ہوتا۔	6- احتباس بول ہوتا ہے۔
7- نقابہ کم اور عارضی ہوتی ہے۔	7- نقابہ زیادہ طویل ہوتی ہے۔
8- ہیضہ کا جراثیم نہیں ہوتا۔	8- اسہال میں ہیضہ کے مخصوص جراثیم پائے جاتے ہیں۔

تفریقی علامات

التهاب امعاء شدید اطفالی Infantile Acute Gastritis	ہیضہ اطفالی Cholera Infantum
1- اسہال میں غیر منہضم غذا خارج ہوتی ہے۔	1- اسہال میں مائیت کا اخراج زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔

- | | |
|--|--|
| 2- اسہال میں شراب انگوڑی کی طرح بو آتی ہے۔ | 2- اسہال میں براز کی مخصوص بدبو ہوتی ہے۔ |
| 3- تے اور اسہال کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ | 3- تے اور اسہال کے دورے پڑتے ہیں۔ |
| 4- پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ | 4- پیاس زیادہ نہیں لگتی۔ |
| 5- پیشاب میں رطوبت بیضیہ خارج ہوتی ہے۔ | 5- رطوبت بیضیہ شامل نہیں ہوتی۔ |
| 6- احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے۔ | 6- احتباس بول نہیں ہوتا۔ |
| 7- جسمانی درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ | 7- جسمانی درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ |
| 8- لاغری اور نقاہت جلد ہوتی ہے۔ | 8- لاغری اور نقاہت بہت جلد نہیں ہوتی۔ |
| 9- بطن خفیف ہوتا ہے۔ | 9- بطن متضخم ہوتا ہے۔ |
| 10- سہات (کوما) اور تشنج کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ | 10- سہات اور تشنج شاذ و نادر ہوتا ہے۔ |

اصول علاج

- 0 — مرض کے ابتدائی مرحلے میں اسہال اور تے کو بند کرنے کی تدابیر سے قطعی احتراز کریں۔ چنانچہ جب تک قوت متحمل ہو، ان کو جاری رہنے دیں۔ جب خوب اچھی طرح استفراغ ہو جائے تو تسکین کی تدابیر کریں۔ اگر ہیضہ کی تشخیص ہونے کے بعد بھی ردی فضلات کا اخراج نہیں ہو رہا ہو تو خفیف ملینیات استعمال کرائیں۔
- 0 — ضائع شدہ سیال اور برق پاشہ Electrolyte کا بدل جسم میں پہنچا کر دوران خون کو بحال اور سقوط کلیہ سے محفوظ رکھیں۔
- 0 — جسم سے جب تمام مایہ نکل جائے/ شدید ضعف طاری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تریاقی تاثیر کی حامل دواؤں سے علاج کریں۔
- 0 — عوارض کے تدارک/ ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔

- 0 — مریض کے بول و براز پر چونا ڈال دیا کریں اور اس کو علاحدہ کمرے میں رکھیں۔
- 0 — حسب ضرورت سینکنا کھینچیں اور پاشو یہ کریں۔
- 0 — جسمانی صفائی پر توجہ دیں۔

علاج

- 0 — داخلی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں۔
- قادز ہر/تریق کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
- تاریخیل دریائی، پیپتہ ولایتی، کافور، زہر مہرہ خطائی، جدوار بنفشی، قادز ہر حیوانی ہر ایک 125 ملی گرام — تمام دواؤں کو عرق گلاب/عرق کیوڑہ میں گھس کر سیکنجین لیونی 35 ملی لیٹر میں حل کر کے ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں تین مرتبہ کھلائیں۔
- حسب ضرورت دواؤں کے وزن میں کمی بیشی کر سکتے ہیں — یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس مرض میں عام طور سے دوا معدہ میں نہیں ٹھہرتی اس لیے اس کی مقدار خوراک کم کر کے ہر گھنٹے، نصف گھنٹے پر گھونٹ گھونٹ پلائیں اس طرح یہ معدہ پر بار نہیں بنتی اور خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
- معدہ کا حقیقی مقصود ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- شربت وردکرر، سیکنجین سادہ، عرق پودینہ، عرق بادیان، عرق گلاب، ہر ایک 35 ملی لیٹر، گھنٹہ 35 گرام — تمام دواؤں کو باہم ملا کر دن میں تین مرتبہ نوش کرائیں۔
- تحقیق کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- زہر مہرہ خطائی 375 ملی گرام، عرق گلاب، عرق بید مشک میں گھس کر شربت انار (پودینہ کے عرق میں تیار کردہ) / سیکنجین لیونی 25 ملی لیٹر ملا کر ایک ایک گھنٹے پر نوش کرائیں۔
- تریق افامی 1 گرام، عرق گلاب دو آستہ میں گھس کر 2-2 گھنٹے پر نوش کرائیں۔
- زہر مہرہ خطائی، طباشیر، ہر ایک 135 ملی گرام، شیرہ زرشک، شربت لیون، عرق

کیڑہ، عرق گلاب، عرق پودینہ ہر ایک 25 ملی لیٹر — زہر مہرہ خطائی کو عرق گلاب میں گھس کر اور طباشیر کو خوب باریک پیس کر تمام دوائیں ملا کر ہر گھنٹے نوش کرائیں۔

تھقیہ کے بعد اسہال اور تے روکنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

پوست بیرون پستہ، دانہ بیل خورد، ہر ایک 1.5 گرام — دونوں کو باریک پیس کر شربت انار، 35 ملی لیٹر میں ملا کر تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔

حلتیت، کافور، فلفل سیاہ، پوست بیرون پستہ، ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں استعمال کرائیں۔

ہینہ میں یہ نسخے بھی از حد مفید ہیں۔

زنجبیل خراشیدہ 100 گرام، فلفل سیاہ، فلفل دراز، قرفل، دانہ بیل خورد، ہر ایک 10 گرام، نمک سیاہ 1:0 گرام، نمک سیندھا 96 گرام، شربت معنی 9 گرام — تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے عرق لیموں میں 72 گھنٹے تک بھگوئیں بعد میں خشک کر کے باریک کر لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی ہر گھنٹے کھلائیں۔

زرد چوب (ہلدی) پوست بخ آک، چوٹا خوردنی، فلفل سیاہ، ہر ایک 10 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر عرق پودینہ میں 72 گھنٹے کھل کر پین اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ حسب ضرورت 1 گولی ہمراہ پودینہ دن میں 3-4 مرتبہ کھلائیں۔

ختم لیموں، ختم ترنج، نارنگیل دریائی، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک 12 گرام، جدوار خطائی 6 گرام، فلفل سیاہ 7 گرام، پوست بخ مدار 3 گرام، زعفران 24 گرام — حسب دستور تمام دواؤں کو باریک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہر اسہال اور تے کے بعد استعمال کرائیں۔

سہاگہ بریاں، قرفل، زنجبیل، دار فلفل، نمک سیاہ، گل ٹاٹھتہ آک، ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو آب اورک 120 ملی لیٹر میں باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-3 گولیاں کھلائیں۔

مغز کرنبوہ، حب الملوک مدبر، فلفل سیاہ، زنجبیل، ہموزن — تمام دواؤں کو

باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 2-1 گولیاں استعمال کرائیں۔ بند ہیضہ میں مفید ہے۔

نارنگیل دریائی 500 ملی گرام، پیپتہ 250 ملی گرام، دونوں کو باریک کر لیں اور سکجین 25 ملی لیٹر، نمک طعام 2 گرام، پانی 125 ملی لیٹر۔ تمام اشیا کو ملا کر نوش کرائیں۔ بند ہیضہ میں کارآمد ہے۔

پوست بخ نیم، بادیان، گل سرخ، زکچور، ہر ایک 12 گرام، قنفل، قنفل سیاہ ہر ایک 5 عدد، سہاگ، زنجبیل، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور سکجین 50 ملی لیٹر، گلتقد 50 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ بند ہیضہ (ہیضہ خستہ / ہیضہ یاسہ) میں مفید ہے۔

زرشک، برادہ صندل سفید، انار دانہ ترش، ہر ایک 250 گرام، آلو بخارا، بادیان، ہر ایک 500 گرام، پودینہ ایک کلو گرام، جیل خورد، دارچینی، ہر ایک 125 گرام، طباشیر، 85 گرام، کافور 50 گرام۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت 10 لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو 6 گرام کافور بچے کے منہ پر باندھ کر حسب دستور 4 لیٹر عرق کشید کریں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے نوش کرائیں۔

پوست بخ انار، پوست بخ نیم، برگ ارٹھ، قنفل سیاہ، ہر ایک 25 ملی گرام، زہر مہرہ خطائی 3 گرام، نارنگیل دریائی 6 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر دانہ موگ کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت 30-60 منٹ کے وقفے سے ہمراہ عرق ذیل استعمال کرائیں۔ ست اجوائن، کافور، ست پودینہ، ہموزن کو ایک شیشی میں بند کر دیں جب سیال ہو جائے تو روغن بادیان 3.5 ملی لیٹر عرق گلاب 500 ملی لیٹر ملائیں اور 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔ پیپتہ ولایتی، نارنگیل دریائی، جدوار، ہر ایک ایک گرام۔ تمام دواؤں کو عرق گلاب میں گھس کر چٹائیں۔

پوست ترنج، انار دانہ، طباشیر، سنگ شاہ مقصود، ہر ایک ایک گرام، زہر مہرہ خطائی 500 ملی گرام، نارنگیل دریائی، پودینہ خشک، قاقہ، پوست بیرون پستہ، ہر ایک 900

ملی گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر شربت انار ترش میں ملا کر چٹائیں۔
 تخم لیموں کاغذی، صبر زرد، فلفل سیاہ، ست پودینہ، زعفران، ہر ایک 35 گرام،
 انگوزہ، پیپتہ اصلی، نارنیل دریائی ہر ایک 25 گرام، مرکب 12 گرام، کافور 6 گرام — تمام
 دواؤں کو عرق ادرک میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ہر اسہال / قے کے بعد
 1-4 گولیاں ہمراہ عرق گلاب استعمال کرائیں۔

پوست بخ مدار، پوست بخ نیم، فلفل سیاہ ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو
 عرق گلاب میں باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی استعمال کرائیں۔
 عوارض کی تخفیف کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں:

شیرہ آلو بخارا (پانی میں نکالا ہوا) 5 عدد، عرق بادیان، عرق عب الشعب، عرق
 گلاب، عرق بید مشک، ہر ایک 50 ملی لیٹر شربت غورہ، انگور، سبچمین ہر ایک 25 ملی لیٹر باہم
 ملا کر نوش کرائیں۔ پیاس کی شدت میں مفید ہے۔ بعض اطباء اسی نسخہ میں زرد، حنا، انار
 دانہ ہر ایک ایک گرام کا حسب دستور اضافہ کرتے ہیں۔

عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، عرق گلاب میں برف ڈال کر تھوڑا تھوڑا پلائیں۔
 پیاس میں مفید ہے۔

آب لیموں / آب انار دانہ / زرشک / سبچمین لیونی تھوڑی مقدار میں نوش کرائیں /
 چٹائیں۔ پیاس میں مفید ہے۔

ماء اللہم مرکب 60 ملی لیٹر، شربت ریحانی ہموزن میں ملا کر نوش کرائیں۔ ضعف
 و قہاہت میں مفید ہے۔

دواء المہک 9 گرام، ماء اللہم کے ساتھ استعمال کرائیں — ضعف و قہاہت میں
 کار آمد ہے۔

تریاق فاروق 500 ملی گرام ہمراہ گلاب استعمال کرائیں۔ یہ بھی مفید ہے۔

فواق (چکی) کی صورت میں یہ نسخہ دیں:

عرق گلاب قرظی 25 ملی لیٹر ہموزن ماء اللہم کے ساتھ نوش کرائیں۔

کباب چینی، خارشک، ہر ایک 5 گرام کو 125 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو شورہ قلمی 500 ملی گرام ملا کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:

درد معدہ کی شدت میں یہ ضاد مفید ہے:

ساق، اقاقیا، کمونی، گل ارنی، پوست انار، آرد عدس، گھنار ہوزن — تمام دواؤں

کو پیش کر آب مورد میں گوندھ کر مقام معدہ پر ضاد کریں۔

پتلی کی صورت میں — نمک طعام، سیوس گندم کی فم معدہ پر تکمید کریں۔

رفع تشنج اور برد اطراف کی صورت میں — جوز ہوا، قرفل کو روغن کجھڑ میں چلا کر

چھان لیں اور نیم گرم حالت میں تمام جسم کی مائش کریں۔ گرم پانی کی بوتلیں کچھ ران، بغل

میں اور ہاتھ، پاؤں اور تنوں پر رکھیں۔

دفع شدت کے لیے — رانوں اور بازوؤں کو باندھ دیں/ بالائے ناف خالی

سیتلیاں کھینچیں۔

احتباس بول کی صورت میں — مقام کلیہ پر تکمید کریں، پلاس، برگ قصب پانی

میں پکا کر گرم گرم، مقام کلیہ (گردہ) اور مثانہ پر باندھیں۔

غشی کی حالت میں — سیتلیاں کھینچیں، پاشویہ کریں اور لٹخہ سگھائیں۔

بعض اطبا احتباس بول کی صورت میں — بڑے تربوز پر آٹے کا خمیر لگا کر تندور


میں رکھ کر، خمیر پک جانے پر تربوز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قابل برداشت گرمی کی حالت

میں مقام گردہ پر باندھتے ہیں۔

زنجبیل (ہسی ہونی) 12 گرام، روغن زیتون 60 ملی لیٹر — پہلے روغن کو آگ پر

گرم کریں اور اس کے بعد زنجبیل ملا کر نیم گرم حالت میں ہاتھ، پیروں میں ملیں، تشنج میں

مفید ہے۔



دق

TUBERCULOSIS

اس مرض میں ایک مخصوص جراثیم کی وجہ سے، اس کی جائے قیام (مقام مرض) پر چھوٹا چھوٹا دائرہ دار مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو درن (Tubercle) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کی ساخت متورم ہونے لگتی ہے اور دیرے دیرے یہی متورم ساخت جسمانی بنیر کی نوع کے مادہ میں تبدیل ہو کر پگھلنے لگتی ہے اور متورم ساخت/عضو یا تو زخم میں تبدیل ہو جاتا ہے یا خود بخود چوڑے کی قسم کے مادہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ واضح رہے کہ درن (ٹیوبرکل) میں عام طور سے درج ذیل انواع کی قدرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔

- (I) کیری ایشن (پیری/جنہ)۔
 - (II) کیلیسی فی کیشن (چوڑے کی طرح لڑا)۔
 - (III) فائبر ایڈ (لیفی)۔
 - (IV) سافٹنگ (ساخت کا مکمل کر مر دار ہونا)۔
 - (V) کرائک ایس (مزمن دماہل سلی کی طرح ہونا)۔
- حاصل کلام یہ کہ اس میں مذکورہ بالا جراثیمی مادہ کی وجہ سے جسم میں غیر طبعی

(غریبی) حرارت پیدا ہو جاتی ہے جو اعضاء اصلہ کو بتدریج گھلاتی اور جسم کی رطوبتوں کو فنا کرنے لگتی ہے اور بعد میں نہایت خراب نتائج مرتب کرتی ہے۔ یہ بیماری جسم کے کسی بھی عضو میں ہو سکتی ہے اور اسی عضو کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔

اسباب

اسباب سابقہ:

(I) حمیات محرکہ
(II) حمیات متطاوّلہ [قلب اور اعضاء اصلہ کی رطوبتوں کو فنا کر دینے والے اسباب۔

(III) التهاب / ورم حاد۔
(IV) قویٰ کو کمزور کرنے والے اسباب مثلاً۔ شہقہ، معدہ اور امعاء کے بعض امراض، ورم حلق، قلب کے بعض امراض۔
(V) وراثت۔

اسباب بادیہ:

- (I) رنج و غم / غور و فکر / غصہ۔
- (II) بیداری۔
- (III) نقص تغذیہ / فاقہ کشی۔
- (IV) کثرت جماع۔
- (V) غیر صحت بخش رہائش۔

جدید تحقیقات، اس مرض کا حقیقی سبب مائیکوبیکٹیریم ٹیوبرکولوس *Mycobacterium Tuberculosis* نامی جراثیم قرار دیتی ہیں۔ جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا، یہ جراثیم جسم انسانی کی مختلف ساختوں میں درن (ابھار) پیدا کرتے ہیں اور اس میں مختلف انواع کی

تجدیلیاں رونما کر کے مرض کی شدت اور سرایت میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ تدریجی مادہ (ٹیوبریکل) رنگ کے اعتبار سے دو قسم کا ہوتا ہے۔ خاکی رنگ کا (گرے/سیلی ری) مادہ، زردی مائل رنگ کا مادہ (یلو ٹیوبریکل) اس جراثیم کی اوسط لمبائی خون کے سرخ دانے کا نصف ہوتی ہے، یہ بہت ہی نازک اور باریک بالکل سیدھا/خمیدہ ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میں شحمی مادہ کی موجودگی کی وجہ سے دیر میں اور بدشواری رنگ قبول کرتا ہے، لیکن جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر الکلوکل اور تیزاب بھی اس کو ذائل نہیں کر پاتا، اس طرح گویا جس انداز اور شدت کے ساتھ جراثیم/روغن رنگ کو قبول کرنے میں دشواریاں پیدا کرتا ہے اس طرح رنگ قبول کر لینے کے بعد اس کا تحفظ بھی اسی شدت کے ساتھ کرتا ہے۔

یہ جراثیم مریض کے بلغم، پیشاب اور براز میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مزمن خنازیری غدہ، مفصل کلی (ٹیوبریکولر جوائنٹس) میں یہ جراثیم نسبتاً قلیل مقدار میں ریوی تعداد کی صورت میں بلغم میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا فاسد رطوبات کو بے احتیاطی سے ادھر ادھر ڈال دینے کے بعد جب یہ خشک ہو جاتی ہیں تو گرد و غبار میں اڑ کر (جس میں یہ مادہ مرض/جراثیم موجود ہوتا ہے) تنفس کے ذریعہ صحت مند افراد کے تنفسی اعضا میں داخل ہو جاتی ہیں اور مرض کی سرایت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔

علامات

ذیل میں دق کی چند مشہور صورتوں کا علاحدہ علاحدہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
(الف) دق عمومی (General Tuberculosis):
ابتدا میں اضمحلال، کسل مندی اور بطلان اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرض کا آغاز شدت سے ہوتا ہے۔ بہر حال نبض سریع اور ضعیف چلتی ہے، زبان خشک، رخسارے سرخ ہوتے ہیں، ہڈیاں بھی ہوتا ہے، ریوی علامات بہت کم ہوتی ہیں

چنانچہ کھانسی بہت کم ہوتی ہے، حرارت کی نسبت نبض میں واضح طور پر سرعت اور جسمانی درجہ حرارت کی بے قاعدگی اسکی اہم علامات ہیں۔ چنانچہ شام کے وقت درجہ حرارت 103-104 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے خلاف صبح کو 100 ڈگری ف تک رہتا ہے۔

(ب) دق ریوی (Pulmonary Tuberculosis):

اس صورت میں ریوی (بیمہ پھوے سے متعلق) علامات زیادہ تر رونما ہوتی ہیں، ابتدا میں کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، بلغم گاڑھا، معمولی زردی مائل رنگ کا خارج ہوتا ہے، جس میں دق کے مخصوص جرثومے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بلغم کے ساتھ خون بھی ملا ہوتا ہے، تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے، چہرے پر سرخی ہوتی ہے، ہونٹ اور ہاتھ کی انگلیوں کے انتہائی سرے (پوروے) نیلگوں ہوتے ہیں، جسمانی درجہ حرارت 102-103 تک پہنچ جاتا ہے، نبض سریع اور ضعیف چلتی ہے، شدید صورتوں میں طحال بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں شدید ہزال اور کمزوری ہوتی ہے۔

(ج) دق دماغی نخاعی (Meningo-Spinal Tuberculosis):

یہ صورت بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔ اس کو سرماسلمی (نیو رکیولرے نن جائیس) بھی کہتے ہیں۔ اس میں دماغ کے پردوں (مغشیہ دماغ) میں آبی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، سہولت بیان کی خاطر اس کی علامتوں کو درج ذیل تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(I) درجہ اول:

ابتدا میں سستی، کابلی اور کسل مندی کی شکایت ہوتی ہے، ضعف اشتہا بلکہ بعض اوقات بطلان اشتہا ہوتا ہے، کرب واضطراب اور مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرض کی اصل علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ شدید درد سر اور غشیان ہوتا ہے۔ بعض اوقات تشنج ہونے لگتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری شدت کی وجہ سے بچہ بار بار اپنے ہاتھوں کو سر کی طرف لے جاتا ہے، تے کی شکایت ہوتی ہے، غلو معدہ کی صورت میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے۔ بخار ابتدا میں اگرچہ معمولی

ہوتا ہے لیکن بتدریج 102-103 تک پہنچ جاتا ہے، اس طرح ابتدا میں نبض ضعیف اور کبھی سرخ چلتی ہے اس کے بعد بے قاعدہ اور ضعیف ہو جاتی ہے، مریض خواب میں بار بار چونک اٹھتا ہے، عضلات میں تشنجی کھنچاؤ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس درجہ کو دماغی خراش کا درجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

(II) درجہ دوم:

ابتدائی درجہ کی اکثر علامات (خراش دماغی والی) معدوم ہو جاتی ہیں، تے کی شکایت بھی جاتی رہتی ہے، شکم کی عضلاتی دیوار میں کھنچاؤ سا ہوتا ہے، درد سر ختم ہو جاتا ہے تاہم قبض کی شکایت بدستور باقی رہتی ہے، سستی کے ساتھ نیم بے ہوش ہوتی ہے، آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں یا ان میں بے قاعدہ طور پر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بھیگنا پن آ جاتا ہے، سارے جسم میں تشنج ہوتا ہے اور بعض اوقات صرف کسی ایک ہی عضو میں تشنج ہوتا ہے، جلد پر احمرار جلد کی نوعیت کے دانے نکل آتے ہیں، جسمانی درجہ حرارت 101-105 ف کے درمیان ہوتا ہے۔

(III) درجہ سوم:

بے ہوشی اور بھی گہری ہو جاتی ہے اور نوبت اس حد تک آ جاتی ہے کہ مریض کو بیدار کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تشنج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، پشت اور گردن کے عضلات خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف اطراف کے اعضا تشنج ہوتے ہیں، دماغ کے عصبی جوڑے، میں سوزش اور ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بصارت معدوم ہو جاتی ہے، خانہ چشم کے عضلات بھی مفلوج ہو سکتے ہیں، پلکیں کسی قدر نیچے گری رہتی ہیں اور ڈھیلے اوپر کی طرف چلے آتے ہیں۔ اسہال کی شکایت ہوتی ہے، نبض سرخ چلتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے، معمولی ہڈیاں بھی ہوتا ہے، پیشاب اور پاخانہ بے ارادہ خارج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت کبھی تو اعتدال سے بھی کم 93-95 ف اور کبھی 106 ف تک پہنچ جاتا ہے، شدید صورتوں میں صرف چند یوم میں ہی مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ جوانوں میں واقع ہونے والی یہ صورت عام طور سے شدید اور مہلک ہوتی ہے۔

(د) دق الامعاء (Intestinal Tuberculosis):

اس صورت میں آنتوں (امعاء) کے مختلف حصوں میں دق پیدا ہو جاتی ہے اور اسہال ایک اہم علامت کے طور پر رونما ہوتا ہے جس کے ساتھ اعضا میں گھلاوٹ بھی ہوتی جاتی ہے، اس لیے اس کو اسہال ذوبانی (گھلاوٹ والا اسہال) بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض اگرچہ امعاء کے کسی حصہ میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن معاء دقاق، زائدہ اعور اور قولون میں کثیر الوقوع ہے اور اس کا سب سے اہم سبب سل میں مبتلا گائے وغیرہ کا دودھ پینا ہے۔ بہر حال آنتوں کے غدود کیسہ اور خشتاشیہ میں مادہ مرض کے سرایت کر جانے سے ابتدا میں چھوٹی چھوٹی گرہیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بعض اوقات از خود خشک ہو جاتی ہیں اور عام طور سے امعاء میں ان لوگوں سے گول، بیضوی نوعیت کے دھم پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے کنارے کسی قدر ابھرے ہوئے اور بعض اوقات اس قدر گہرے ہوتے ہیں کہ امعاء کے کچی طبقے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر ان میں سوراخ ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

اس نوعیت کے دق کی علامات ہمیشہ یکساں نہیں رہتیں۔ چنانچہ بعض مریضوں میں تو کوئی بھی مرضی علامت رونما نہیں ہوتی، لیکن موت کے بعد امعاء کا مطالعہ کرنے پر قروح پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ میں ثقیل اور ناموافق غذا لینے سے شکم میں درد کی شکایت ہوتی ہے، سوء ہضم اور ضعف اشتہا ہوتا ہے، دودھ لینے سے نفخ شکم ہو جایا کرتا ہے، عمل انہضام میں فتور واقع ہونے کی وجہ سے لاغری اور ضعف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کبھی کبھی رات میں یا تیسرے پہر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ شدید صورتوں میں اسہال آنے لگتے ہیں، دائیں طرف عانہ کے قریب دہانے سے درد محسوس ہوتا ہے، براز میں شدید بدبو اور قفص ہوتا ہے، اور غیر منہضم غذا اور چربی کے اجزاء زیادہ خارج ہوتے ہیں اس میں کسی قدر خون کی بھی آمیزش ہوتی ہے، معاء دقاق میں تدرن واقع ہونے کی صورت میں اسہال کی تعداد کم ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات قبض ہوتا ہے، لیکن اگرچہ رودہ مستقیم میں تدرن ہو تو اسہال لازمی طور پر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ نفخ و قراقر، تنگی تنفس، متلی، تھکے وغیرہ کی بھی شکایات ہوتی ہیں۔

(۵)

ذیل میں بعض ایسی اہم علامتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کم و بیش دق کی ہر انواع میں مشترک ہوتی ہیں۔ سہولت بیان کے لیے اس کو بھی تین درجوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔

درجہ اول:

جسمانی درجہ حرارت میں خفیف طور پر اضافہ ہو جاتا ہے، نبض کسی قدر سریع چلتی ہے۔ طبیعت سست رہتی ہے جو شام کے قریب اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، صبح کے وقت طبیعت پھر چاق و چوبند ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد بے ترتیب اور کسی قدر نمایاں طور پر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، رات کے وقت اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور رات کے پچھلے پہر پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے۔ اس درجہ کی شناخت عام طور سے نہیں ہو پاتی، قدیم اطباء اس کو ”درجہ دق“ کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس میں حرارت، عروق کی رطوبت کو فنا کر چکتی ہے اور اب وہ اعضاء کے رخنوں کی رطوبتوں کو فنا کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس مثال کے ذریعہ مزید واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں جس طرح چراغ کی حرارت سے اس میں موجود تیل جذب ہوتا رہتا ہے اسی طرح اس درجہ میں حرارت کی وجہ سے جسمانی اعضا کی رطوبات فنا ہو جاتی ہیں، اس مرحلے میں مناسب علاج سے شفایابی یقینی ہو جاتی ہے۔

درجہ دوم:

جسمانی درجہ حرارت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد پسینہ آکر بخار بڑھے ہوئے (جسمانی درجہ حرارت) میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات 24 گھنٹے میں ہی بخار کی دو باریاں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ یہی باری دوپہر کے وقت ہوتی ہے اور 4-5 گھنٹے رہتی ہے اس کے بعد ایک مختصر مدت کے لیے حرارت میں تخفیف ہو کر دوسری باری شروع ہو جاتی ہے جو 2 بجے رات تک رہتی ہے۔ اس کے بعد زیادہ مقدار میں پسینہ آکر بخار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، پیشاب قلیل مقدار میں سرخ رنگ کا آتا ہے، رخساروں پر سرخ جلتے

پڑ جاتے ہیں، بطلان اشتہا، لاغری اور ضعف ہوتا ہے، تلوؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ آنکھیں دھنس جاتی ہیں، جسم کا گوشت گلنے لگتا ہے اور ہڈیوں کے سرے نکل آتے ہیں، پیشانی کی جلد میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کنپٹیاں دب جاتی ہیں، چہرہ بے آب ہو جاتا ہے اور گرد آلود ہونے جیسا لگتا ہے، آنکھیں خواب آلود ہوتی ہیں، بالکوں اور پپٹوں کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، سینے کی ہڈیاں ابھر آتی ہیں، آواز باریک ہو جاتی ہے، شانے کی ہڈیاں ابھر آتی ہیں، شکم، پشت سے لگ جاتا ہے، کان سکڑ جاتے ہیں اور ان کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، عروق ابھر آتی ہیں اور ان میں خون بہت کم مقدار میں ہوتا ہے۔ اطباء اس کو 'درجہ ڈیڑی' کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حرارت کی وجہ سے رطوبت طلیہ (وہ رطوبت جو اعضاء اصلیہ پر شبنم کی مانند بکھری ہوتی ہے اور جزو عضو ہوجانے کی قابلیت رکھتی ہے) فنا ہو جاتی ہے اور حرارت کا تعلق ان رطوبتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اعضاء کے ساتھ چسپاں ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو حرارت اس تیل کو جلانے لگتی ہے جو بتی میں موجود ہوتا ہے۔

درجہ سوم:

بخار شدت کا ہوتا ہے اور تخفیف کی مدت کم ہو جاتی ہے، پیوست کے نلبہ کی وجہ سے جسم کا گوشت تحلیل ہو جاتا ہے، ناخن بڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، جسم پر ہڈی چمڑے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا، بال گرنے لگتے ہیں، پیشاب میں کثیر مقدار میں روغنی اجزا خارج ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح اسہال کے ذریعہ ملائم ہڈیاں گل کر خارج ہو جاتی ہیں، پیر متورم ہو جاتے ہیں اور شدید ضعف و لاغری ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اطباء اس درجہ کو 'مقت' کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس مرحلے میں حرارت کا تعلق ان رطوبات اسطقیہ (رطوبت منویہ/عنصریہ) سے ہو جاتا ہے، جن کے سبب مفرد اعضاء کے اجزا باہم پیوستہ رہتے ہیں اور جن کے فنا ہوجانے سے یہ اجزا ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال بالکل اس چراغ کی ہے جس میں حرارت کی وجہ

سے بتی کا تیل بھی ختم ہو گیا ہو اور حرارت خود بتی کو جلارہی ہو۔ یہ مرحلہ علاج پذیر نہیں ہوتا۔

تفریقی علامات

حمی تیفوئید Typhoid Fever	دق شدید Acute Tuberculosis
1- مرض مقامی ہوتا ہے۔	1- مرض مروجی/ٹائوی طور پر رونما ہوتا ہے۔
2- جسمانی درجہ حرارت مرض کے دوسرے ہفتہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔	2- جسمانی درجہ حرارت پہلے ہفتہ میں 106-107 ف تک پہنچ جاتا ہے۔
3- چہرے پر متماسٹ ہوتی ہے۔	3- چہرہ نیگروں ہوتا ہے۔
4- طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔	4- طحال عام طور سے بڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔
5- عسر تنفس نہیں ہوتا۔	5- عسر تنفس شدید ہوتا ہے۔
6- التهاب شعبی ہوتا ہے۔	6- تصلب الریہ اور خرخرہ غاطی ہوتا ہے۔
7- جسم پر مخصوص طفحات ہوتے ہیں۔	7- جسم پر طفحات نہیں ہوتے۔
8- طبقہ مشیمیہ طبعی ہوتا ہے۔	8- طبقہ مشیمیہ میں زخم دتی ہو سکتے ہیں۔
9- اس قدر کی نہیں ہوتی۔	9- جسمانی وزن میں غیر معمولی کمی ہوتی ہے۔
10- تھوک میں تدریجی جراثیم نہیں ہوتے۔	10- تھوک میں تدریجی جراثیم موجود ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — مبررات اور مرطبات استعمال کرائیں۔ تاہم اس میں بھی رعایت ضروری ہے۔
- 0 — لاغری کو دور کرنے کی تدابیر کریں/مقویات استعمال کرائیں۔
- 0 — حسب ضرورت تنقیہ مواد کریں تاہم کسی بھی طرح کے شدید استفراغ سے احتراز لازمی ہے۔

- 0 — عام جسمانی صفائی پر خصوصی توجہ دیں۔
 0 — مفرحات استعمال کرائیں۔
 0 — مریض کو صاف ستھری اور مہلکی آب و ہوا میں قیام کی ہدایت کریں۔
 واضح رہے کہ دق، نیش اگر قرح ہو گیا ہو تو مشترک علاج ناگزیر ہو جاتا ہے۔
 چنانچہ قرح میں تخفیف پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بلغم اور پیپ کے اخراج کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اس طرح تہرید اور تربیب کے ساتھ ساتھ تسخین لطیف کا لحاظ بھی ضروری ہے تاکہ قرح کا تھقیہ آسان ہو جائے، یہ بھی نکتہ ذہن میں رہے کہ برووت پیدا کرنے والی دواؤں کے کثرت استعمال سے حرارت غریزی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور روح میں ضعف کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

علاج

- 0 — دق ریوی میں خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
 یہ نسخہ قرح ریہ کے اندمال اور بلغم کے بہ آسانی خارج کرنے میں معاون ہے۔
 بہدانہ 3 گرام، تخم خطمی، غلب الثعلب خشک، ہر ایک 7 گرام، عتاب 5 عدد، سہتاں 11 عدد — تمام دواؤں کو عرق گاؤ زبان، عرق ککو، ہر ایک 110 ملی لیٹر میں جوش دے کر ٹل چھان لیں اور شیرہ تخم کا ہو مقشر، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک 5 گرام، عرق گاؤ زبان 95 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر کا اضافہ کر کے تمام دواؤں کو باہم ملائیں اور نوش کرائیں۔ اگر مزید تسکین اور تربیب کی ضرورت ہو تو شیرہ مغز کدوئے شیریں، شیرہ مغز تربوز، بریان 5 گرام، حسب دستور نکال کر شامل کریں۔
 سرد موسم / غیر معمولی نقاہت کی وجہ سے اگر طبیعت اخراج بلغم سے قاصر ہو تو تربیب اور اخراج بلغم کے لیے یہ ادویہ بروئے کار لائیں:
 پرسیاوشاں، اصل السوس مقشر، بہدانہ، ہر ایک 5 گرام زوقائے خشک 3 گرام، حسب دستور مذکورہ بالا نسخہ میں شامل کریں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے:

رب السوس، شکر تیغال، کبریاے شمع، گوند کثیرا، ہر ایک ایک گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر خیرہ خشکاش 12 گرام کے ہمراہ کھلائیں۔ اس کے بعد گل نیلوفر، عنب اشعلب خشک، ہر ایک 6 گرام، بہدانہ 3 گرام، سپتاں 11 عدد، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو عرق عنب اشعلب، عرق گاؤ زبان، ہر ایک 90 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شیرہ انجبار، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شیرہ تخم کاہو، ہر ایک 5 گرام، عرق باریک 110 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر اضافہ کریں اوپر سے خاکسی 6 گرام چمک کر نوش کرائیں۔

یہ نسخہ تدرن ریوی کے پہلے مرحلے میں از حد مفید ہے:

رب السوس، گوند کثیرا، طباشیر، دانہ ہیل، ست گلو، کبریا شمع، ہر ایک 500 ملی گرام، سرطان محرق ایک گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شربت بنفشہ 12 ملی لیٹر ملا کر چٹائیں۔ اس کے بعد گلو سبز، نانے سبز، اصل السوس، ہر ایک 3 گرام، برگ اڑوسہ زرد (یعنی پختہ ہو گئے ہوں) 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں۔

درجہ اول میں یہ نسخہ بھی سودمند ہے۔

نمک، برگ اڑوسہ 3 گرام، سرطان محرق، گوند کثیرا، رب السوس، گل ارمنی، ہر ایک 6 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت تھوڑی مقدار میں لے کر شربت خشکاش میں ملا کر دن میں چند مرتبہ چٹائیں۔ یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

برگ اڑوسہ، برگ پیابانہ ہر ایک 7 عدد، فلفل سیاہ 5 عدد۔ تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر چھان لیں اور شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ تدرن ریوی کے دوسرے درجہ میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

قرص سرطان کا فوری 4 گرام، باریک پیس کر خیرہ خشکاش 12 گرام میں ملا کر

کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شیرہ مغز تخم کدو سٹے شیریں، ہر ایک 5 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، شیرہ عتاب 5 عدد، عرق سرطان خاص 96 ملی لیٹر، عرق گاؤ زبان 50 ملی لیٹر میں نکال کر شربت سرطان خاص 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

حسب ضرورت یہ نسخہ بھی استعمال کرایکتے ہیں:

مغز تخم خیاریں، رب السوس، گوند کثیرا، ہر ایک 2 گرام، طہاشیر، زہر مہرہ خطائی، تخم حطی، ہر ایک 500 گرام، کافور، زعفران، ہر ایک 250 ملی گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شربت خشخاش، 25 ملی لیٹر حل کر کے استعمال کرائیں۔ اس کے بعد شیرہ برگ گاؤ زبان، شیرہ اصل السوس مقشر، ہر ایک 5 گرام، شیرہ تخم کاہو مقشر، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، ہر ایک 3 گرام، عرق عنب الثعلب، عرق گاؤ زبان، ہر ایک 75 ملی لیٹر، میں نکال کر شربت بنشہ 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکی 7 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔ اسہال، ورم اطراف، حرارت کی زیادتی اور عام جسمانی کمزوری میں اس کا استعمال از حد سودمند ہے۔

تقویت کی غرض سے شام کے وقت یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

حب جواہر کافوری 4 گرام باریک پیس کر یا قوزہ علوی خانی 12 گرام، میں ملا کر کھلائیں اور اوپر سے شیرہ اصل السوس، شیرہ تخم کاہو مقشر، شیرہ انجبار، ہر ایک 5 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام، عرق کدو، عرق بارتنگ، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت سرطان خاص 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

تقویت، حذرہ، تقویت اعضاء ربیسہ، رفع ہیوست وغیرہ کے ساتھ ساتھ قدوں کے درجہ سوم میں یہ نسخہ از حد مفید ہے۔

حب جواہر کافوری علوی خانی 3 گرام باریک پیس کر خیرہ ابریشم شیرہ عتاب والا 9 گرام ملا کر کھلائیں۔ اوپر سے شیرہ بارتنگ 5 گرام، شیرہ دانہ بیل 2 گرام، عرق بیل 120 ملی لیٹر میں نکال کر جوش دیں اور اس میں شیرہ اصل السوس، شیرہ مغز ہندو دانہ بریاں، شیرہ عنب الثعلب، ہر ایک 5 گرام، عرق کدو 110 ملی لیٹر میں نکالا ہوا ملائیں اور شربت شیریں 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح عربی نیم بریاں 1 گرام، زودائے خشک 3 گرام باریک

پیش کر چھڑک کر نوش کرائیں۔

درج ذیل سفوف بھی سودمند ہیں:

گل ارنی، گل مختوم، نشاستہ، گل سرخ، ہر ایک 6 گرام، طباشیر سفید، شادنج، عدس
منسول، کتیرا، ہر ایک 5 گرام، سرطان محرق 1.5 گرام، رب السوس 3 گرام — تمام دواؤں
کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور 7 گرام، بکری کے دودھ کے ہمراہ استعمال کرائیں۔

طباشیر سفید، تخم گاؤ زبان، ست گلو، ہر ایک 2 گرام، صمغ عربی، سرطان نہری
محرق، ہر ایک 1 گرام، دانہ بیل 500 ملی گرام، کوکنار 250 ملی گرام — تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر سفوف تیار کریں اور 9-3 گرام، گدھی/بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔

طباشیر، غربی السرب، گل ارنی، داغستانی، صمغ عربی، دانہ بیل خورد، اقاقیا، ہر
ایک 3 گرام، معطلگی روی، ست گلو، ہر ایک 2 گرام، کافور قیصوری 1 گرام، سرطان محرق 4
گرام، تخم کاہو مقشر 7 گرام، زعفران، انیون، ہر ایک 1 گرام بنات سفید 3 گرام — تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور 2 گرام ہمراہ شربت خشخاش استعمال کرائیں۔

0 — تدرن معوی (دق الامعاء) میں یہ نسخے استعمال کرائیں:

طباشیر ایک گرام، کافور 500 ملی گرام دونوں کو باریک کر کے شیرہ بارتنگ 6
گرام، مناسب عرق میں نکال کر صبح، شام نوش کرائیں۔

بیلگری، جفت بلوط، اقاقیا، معطلگی روی، زیرہ سفید، دانہ بیل خورد، ہر ایک 6
گرام، طباشیر، ریش برگد، پوست سنگدانہ مرغ، حب الّاس، ہر ایک 3 گرام — تمام
دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور 2 گرام، ہمراہ عرق بارتنگ/بکری کا دودھ، دن
میں دو تین مرتبہ دیں۔

مائی بسنت 250 ملی گرام کو انوشدار، دلولی/میون سنگدانہ مرغ 6 گرام میں ملا
کر کھلائیں۔ اس کے بعد شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شیرہ تخم کاسنی، ہر ایک 3 گرام، پانی میں نکال کر
نوش کرائیں۔

قرص طباشیر کافوری ایک عدد، شربت انجبار/شربت حب الّاس 25 ملی لیٹر کے

ہمراہ صبح، شام استعمال کرائیں۔ قرص کا نسخہ درج ذیل ہے:

مردارید ناشفتہ، طباشیر سفید، سرطان محرق، تخم خشکاش سفید، تخم کاہو، تخم خرفہ مقشر، کثیر، ہر ایک 13.5 گرام، رب السوس، کرہ ہاشمی، غنچہ گل سرخ، ہر ایک 9 گرام، مغز تخم خیارین، صمغ عربی، بسد محرق، ہر ایک 4.5 گرام، کافور قیصری 3.5 گرام، ابریشم مقطر، زعفران، ہر ایک 1 گرام۔ حسب دستور دواؤں کو کوکت چھان کر آب بارنگ سبز میں 3 گرام کی اقراص بنائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:

غلہ بیوست اور حرارت کی صورت میں یہ آہن مفید ہے:

گل بنفشہ، گل نیلوفر، برگ کدو، برگ کاہو، تخم عطمی، تراشہ کدو، تراشہ خیار جو نیکوفتہ، ہر ایک 80 گرام۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں جوش دیں اور اسی میں آہن کرائیں کہ مریض کی گردن تک پانی پہنچے۔ اس کے بعد مرطب روغن مثلاً روغن بادام، روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن نیلوفر وغیرہ جسم پر ملیں۔



Learn Unani By Arbab Saifullah

جداری *



SMALL POX

اس مرض میں ابتداء لرزہ کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسری خطرناک جسمانی علامات رونما ہوتی ہیں۔ بخار کے تیسرے دن پیشانی، چہرہ، ہاتھ کی پشت اور بعض اوقات جسم کے بعض دوسرے حصوں پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں، یہ پھنسیاں بہت گہری ہوتی ہیں، ان میں آبی رطوبت بھری ہوتی ہے جو کچھ عرصہ بعد پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ بعد دانے (پھنسیاں و آبلے) خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر کھرٹ جم جاتی ہے جن کے اکھڑنے کے بعد جسم پر بے قاعدہ یا گول ہلالی شکل کے چھوٹے چھوٹے نشیب (گڑھے) رہ جاتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ یہ ایک قسم کا شدید نوعی، نہایت متحلی مرض ہے اور جہاں بھی وبائی طور پر پھیلتا ہے تو عمر کی کسی تفریق کے بغیر کسی بھی جنس کے فرد کو ہو سکتا ہے۔ اس کے عوارض بھی شدید ہوتے ہیں اور کثیر الوقوع عارضہ کے طور پر بینائی / سماعت سے محرومی ہے۔ اس مرض کو دریافت کرنے اور حصہ میں تفریق کا اعزاز مشہور طبیب ابو بکر محمد بن زکریا رازی کو حاصل ہے۔


• سیتلا، چچک اور Variola وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

اقسام


(الف) رنگ اور شکل کے اعتبار سے



(ج) بعض اطباء کے نزدیک اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:



جدید تحقیقات کے مطابق اس کی درج ذیل اقسام ہیں:



اسباب

سائٹورکٹیز ویری اولی (Sytoricytes Variolae) نامی مخصوص وائرس —
 ملحوظ رہے کہ یہ مرض تمام دوسرے حاد نوعی حمات (Acute Specific Fevers) میں
 سب سے زیادہ متعدی ہے، اور بالائی مجرای تنفس سے ڈراپلٹ انفکشن کے ذریعہ پھیلتا ہے
 اور جب تک کھرٹھ (Scab) رہتی ہیں، ان میں تعدیہ کی صلاحیت بھی رہتی ہے۔
 اس مرض کی مدت حضانت 12-14 دن ہے۔ اس درمیان صرف کسل مندی
 ہوتی ہے۔

علامات

اس مرض کی علامتوں کو تنہیم کی آسانی کے لیے درج ذیل درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
 درجہ اول

پھریری یا لرزہ کے ساتھ یکا یک جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 بچوں میں عام طور سے تشنج کے بعد درجہ حرارت بڑھتا ہے، سر، خاص طور سے کمر میں شدید
 درد ہوتا ہے، فم معدہ پر بھی درد کا احساس ہوتا ہے، متلی اور ابکائی کی شکایت ہوتی ہے، جسمانی
 درجہ حرارت بہت جلد 102-104 ف تک پہنچ جاتا ہے۔ مذکورہ بالا علامتوں کے رونما
 ہونے کے دوسرے دن بخار اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، کرب و اضطراب

اور ہڈیاں ہوتا ہے۔ یہ علامتیں رات میں اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہیں، چہرہ چمتایا ہوا، اور کنپٹیوں کی شریانیں تڑپتی ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ابتدا مرض سے ہی کرب و اضطراب ہڈیاں، غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات زکام اور گلے میں درد کی شکایت ہوتی ہے، فزع فی النوم (کابوس) اور سخت الصوت (آواز بیٹھ جانا) وغیرہ عوارض بھی ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں مریض عام طور سے چت لینے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ درجہ عام طور سے تیسرے دن ختم ہو جاتا ہے اس طرح جسمانی درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہی رہتا ہے اور بعض اوقات اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ دوم کی علامات رونما ہوتی ہیں۔

درجہ دوم:

جدری کے اصل دانوں کے نکلنے سے پہلے زیر جلد خون کے دھبے/نہایت باریک خشکاش کی مانند دانے نکلتے ہیں، یہ دانے عام طور سے اصل دانوں کے ظاہر ہونے سے 48 گھنٹے پہلے نمودار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دانے نکل بھی نہیں پاتے کہ جدری کے اصل دانے نمودار ہونے لگتے ہیں۔

نازک، باریک خشکاشی دانے:

یہ سرخ سرخ یا خفیف سیاہی مائل سرخ ہوتے ہیں، اور سارے جسم پر نکلتے ہیں، ان کی ہبہ سے مشابہت تشخص میں ابتدائی ایام میں دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔

زیر جلد خون کے دھبے:

ان کو نوزنی دھبے بھی کہتے ہیں۔ یہ دانے عام طور سے ران کی اندرونی سطح پر، شکم کے پیردنی عضلات اور بعض اوقات بغل اور گردن کی پشت کی جانب نمودار ہوتے ہیں۔ ان دانوں کا ظاہر ہونا مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف خشکاشی نوعیت کے دانے مرض کی خفیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصلی جدری دانے نمودار ہوتے ہیں، ان کے

نمودار ہوتے ہی عوارض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دانے ابتدا میں پیشانی، کنپٹی اور سر کے بالوں کی جڑوں کے قریب پیشانی کے بالائی حصہ پر نمودار ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد گردن اور کلائیوں پر نکلتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام جسم پر پھیل جاتے ہیں، یہ عرصہ عام طور سے 48 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، ران اور شکم پر نسبتاً کم اور سینے پر زیادہ ہوتے ہیں، پشت پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ جس حصہ جسم پر خراش/دباؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں زیادہ نکلتے ہیں، اسی لیے شانوں پر بکثرت نکلتے ہیں۔

پہلے دن یہ دانے چھوٹے چھوٹے، سرخ رنگ کے چمک دار ہوتے ہیں اور سطح جلد سے کسی قدر ابھرے ہوئے، نقطوں کی طرح ہوتے ہیں۔ 48 گھنٹے بعد محدود چھپے ابھار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں سختی بھی ہوتی ہے۔ اس کے تیسرے دن ان میں سفید و شفاف مائی رطوبت بھر جاتی ہے۔ پانچویں دن ان دانوں کے گرد سرخ حلقہ پیدا ہوتا ہے اور دانے کی نوک اندر کی جانب دھنس جاتی ہے اور اس کی مائی، شفاف رطوبت گدلی ہونے لگتی ہے، آٹھویں، نویں دن اس میں پیپ پڑنے لگتی ہے اور ان کی نوک اوپر کو ابھر آتی ہیں اور ان پر سیاہ نقطہ سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور 104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے، تعہض اور نکلنے میں دشواری ہوتی ہے، عام طور سے ہڈیاں ہوتا ہے، چہرہ اور آنکھیں متورم ہو جاتی ہیں۔

درجہ سوم:

اس مرحلے میں دانے مرجھانے لگتے ہیں۔ یہ صورت یقینی طور پر دسویں، گیارہویں دن سے شروع ہو جاتی ہے اور چودھویں دن تک ان پر سیاہی مائل بھورے/بھورے رنگ کے کھرٹ بن جاتے ہیں، انیسویں دن سے کھرٹ اترنے کا دور شروع ہو جاتا ہے جو کم و بیش 35-55 تک برقرار رہتا ہے۔ ان کھرٹوں کے اتر جانے کے بعد سطح جلد پر سرخ بھورے رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں اور غائری صورت میں داغ کی بجائے جلد میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ دانوں کے مرحلے میں جلد پر خارش محسوس ہوتی ہے جو بعض

اوقات اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مریض جلد کو نوچ کر زخمی کر دیتا ہے اور نوبت قحط اور کیڑے پڑنے تک آ جاتی ہے۔

ذیل میں اس مرض کی اچھی (محمود) اور بری (ردی) علامات تحریر کی جا رہی ہیں جس سے معالج کو معالجہ میں کوئی واضح لائحہ عمل مرتب کرنے میں دشواری نہ ہو۔

علامات محمودہ:

یہ علامات مرض سے شغلیابی اور عوارض میں کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان حالات میں جلدی کے دانے پختہ ہونے پر مروارید کے دانوں کی مانند سفید، الجھے ہوئے، چمکدار ہوتے ہیں، سینہ اور شکم پر قلیل تعداد میں نکلتے ہیں، تنفس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، عقل و شعور پر خراب اثر نہیں پڑتا، اسی طرح پالی اور غذا وغیرہ کی طبی خواہش وغیرہ۔ علامات محمودہ کی نماز ہیں۔

علامات ردیہ:

اس ذیل میں ان علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن کی موجودگی مہلک/خراب انجام کی نشاندہی کرتی ہے۔ چنانچہ شدید پیاس، کرب و اضطراب، جسم کا سرد ہونا خراب علامات ہیں، تنفس میں سرعت، دانوں کا سبز ہونا، دیر سے ٹکنا وغیرہ۔ ردی علامات ہیں، بول الدم اور اس کے بعد بول اسود کا اخراج مہلک تصور کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سقوط قوت، سبز، غسالی (گوشت کی دھون کی مانند) اسہال آ رہے ہوں تو ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، دانوں کا ملا ہونا اور کرب و اضطراب کی زیادتی کے ساتھ نفخ شکم ہونا ہلاکت کی علامت ہے۔ دانوں کا چھوٹا، سیال کا قلیل مقدار میں ہونا یا بالکل پیدا نہ ہونا اور اسی کے ساتھ بے ہوشی طاری ہونا بھی ہلاکت خیز ہے، اسی طرح دانوں کا تاخیر سے پکنا اور عوارض میں عرصہ تک کمی واقع نہ ہونا وغیرہ بھی تشویش ناک امر ہیں۔

خصوصی علامات:

(۱) لولوی قلیل العدد:

یہ دانے موتیوں کی مانند ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ابتدا میں دانے سفیدی مائل سرخ ہوتے ہیں۔ بعض دانے آبدار، چمکدار، مردارید کے دانوں کی مانند ہوتے ہیں، جسمانی درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا اور کرب و اضطراب کے بغیر عام طور سے 3 دن بعد بہت آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد عوارض میں مزید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دس دن میں دانے پک کر خشک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ تمام عوارض ختم ہو جاتے ہیں۔

لولوی کثیر العدد:

اس میں بھی دانے موتیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ دانے بہت زیادہ اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بخار وغیرہ نسبتاً تیز ہوتا ہے، نویں دن تک دانوں میں آبی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پک جاتے ہیں، ان کے نکلنے کے بعد عوارض میں تخفیف ہو جاتی ہے، بارہویں دن تک دانے خشک ہو جاتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ لولوی نوع کی جدری سے کسی عوارض کے پیش آئے بغیر شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو سلیم اور بے خطر قرار دیا جاتا ہے۔

ذیل کی اقسام ردی تصور کی جاتی ہیں۔

ری احمر:

اس میں ابتدا میں سرخ دانے نکلتے ہیں یا صرف بعض مقامات سے جلد میں حرمت (سرخ) آ جاتی ہے۔ یہ صورت مادہ مرض کے قلیل مقدار میں ہونے پر دلالت کرتی ہے ورنہ اگر مادہ زیادہ مقدار میں ہو تو اکثر اعضاء جسم سرخ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں

شدید الحمرة (لہایت سرخ) نوع بھی آتی ہے، اس میں جسم اس قدر سرخ ہو جاتا ہے کہ گویا خون کا چھڑکاؤ ہوا ہو، اسی کے ساتھ سطح جلد ہموار ہوتی ہے۔ یہ نوع ہلاکت خیز ہے اور عام طور سے نوے دن موت واقع ہو جاتی ہے اور اگر یہ مدت گزر جائے تو دانے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے متعفن خون جاری ہوتا ہے، اس صورت میں پندرہویں دن تک موت ہو جاتی ہے۔

جدری معصفر:

اس کے دانے چھوٹے، زرد رنگ کے سرخی و سفیدی مائل ہوتے ہیں، اگر دانے طے ہوئے ہوں سوزش اور حدت بھی زیادہ ہو تو نتائج عام طور سے خراب مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو جدری اصفر، جدری کسنبیہ بھی کہتے ہیں۔

جدری اسود:

اس کے دانے کالے (سیاہ) اور سطح جلد پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ جسم پر نکھرے ہوئے چھٹے، اور گرد سے سفید ہوتے ہیں اور درمیانی حصہ سیاہ ہوتا ہے اور کبھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے، کسی قدر ابھار لیے اور باریک نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ قسم سب سے زیادہ خطرناک تصور کی جاتی ہے۔

جدری رصاصی:

دانوں کی رنگت موم اور سیسہ (رصاص) کی مانند ہوتی ہے، یہ چہرے، سیدہ اور شکم پر بہت زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں اور اطراف میں نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ جدری اسود کے بعد یہ سب سے زیادہ خطرناک تصور کی جاتی ہے۔

جدری ہلالی:

یہ ہلال (چاند) کی مانند ہوتی ہے اور ردی و خراب بھی جاتی ہے۔

جدری مضاعف:

اس نوع میں نفاطات (آبلے) میں ایک اور آبلہ پیدا ہو جاتا ہے (ای لیے

مضاعف کہتے ہیں) دانے بڑے ہوتے ہیں۔

جدری بنفشی:

دانوں کی رنگت بنفشہ کی مانند نیلگوں ہوتی ہے۔ یہ دانے سطح جسم پر پھیلے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

جدری اخضر:

دانوں کی رنگت سبز ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے باہم ملے ہوئے جسم پر پھیلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سفید لکیریں ہوتی ہیں۔ ان کے بالائی سرے پر سرخ لکیریں ہوں تو یہ مزید خطرناک نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔

جدری ذوزوایا:

اس میں دانے گول ہونے کی بجائے چوکور یا ٹھکانے ہوتے ہیں۔

جدری عدسی:

دانے چھوٹے، سفید سخت اور دانہ مسور کی مانند ہوتے ہیں۔ اس میں کرب و اضطراب اور خارش وغیرہ میں شدت ہوتی ہے، دانے دشواری کے ساتھ نکلنے ہیں اور پکنے کے مرحلے میں شدید خارش اور کرب و اضطراب ہوتا ہے، پکنے کا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور عام طور سے ان میں موت واقع ہو جاتی ہے اور اگر ہلاکت نہ ہو، دانے پک جائیں تو کوئی نہ کوئی دوسرا مرض عارض ہو جاتا ہے۔

جدری جاوری:

اس میں دانے چھوٹے، سخت، باجرہ کے دانوں کی مانند اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ 4 دن گزر جانے کے بعد دانوں میں پانی پیدا ہو جائے اور اس سے سفیدی ظاہر نہ ہو تو یہ خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

جدری باطنی:

اس میں دانے نکلتے بھی ہیں اور کبھی اندر لوٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں مادہ مرض اندر اندر شدید فساد پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اگر دانوں کی رنگت بنفشی ہو تو نتائج عام طور سے خوفناک ہوتے ہیں۔

جدری منقوطی:

اس میں دانے نکلتے وقت میلے اور درمیان میں سیاہی مائل نقطہ والے ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے پر آبدار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ چھٹے اور باہم ملے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں ان کی رنگت خاکستری/سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ پیپ بھی اسی رنگ کی ہوتی ہے۔ درج ذیل انواع عام طور سے مہلک نہیں ہوتیں۔

جدری شوکیہ:

اس میں دانوں میں کانٹوں کی مانند چیز نوک نکلتی ہے اور دانوں پر ہاتھ پھیرنے سے جھین محسوس ہوتی ہے، کسی قدر خارش کا احساس بھی ہوتا ہے، ان میں مائی رطوبت نہیں پیدا ہوتی۔ اس وجہ سے کھر بڑ بھی نہیں بنتا، دانے عام طور سے جلد ہمرنگ ہوتے ہیں اور کچھ دنوں بعد از خود تحلیل ہو جاتے ہیں۔

جدری خشخاشی:

دانے تخم خشخاش کی مانند چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں، ان میں بھی رطوبت پیدا نہیں ہوتی اور کھر بڑ آئے بغیر از خود تحلیل ہو جاتے ہیں۔ دانے عام طور سے بخار کے 12 دن بعد نکلتے ہیں۔

جدری مرواریدی:

یہ مروارید کی شکل کے، علاحدہ علاحدہ نکلتے ہیں۔ یعنی باہم ملے ہوئے نہیں

ہوتے۔ یہ جلد اور تاخیر، دونوں ہی طرح نکلتے ہیں، ان میں کھرٹ نہیں بنتا۔
ذیل میں عوارض کے اعتبار سے جدری کی ممکنہ اقسام کی علامات تحریر کی جا رہی
ہیں۔ ان میں علامات محمودہ اور علامات ردیہ دونوں زیر بحث آ رہی ہیں۔

جدری متفرق منقصل:

جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس میں دانے علاحدہ اور دور دور ہوتے ہیں۔
جس سے لازمی طور پر ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ علامات میں بھی کوئی زیادہ شدت
نہیں ہوتی۔

جدری متصل:

اس میں دانے بہت زیادہ تعداد میں گنجان ہوتے ہیں۔ تمام جسم خاص طور سے
چہرہ متورم ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی سوج جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کی شکل بہت ڈراؤنی
ہو جاتی ہے، منہ سے رال بہتی ہے، شدید خارش ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتا ہے اور گیارہویں دن
تک موت واقع ہو جاتی ہے، بصورت دیگر عوارض میں کمی واقع ہو کر چودھویں دن مریض
شفایاب ہو جاتا ہے۔

جدری دموئی/نزفی:

دانوں میں پیپ کے ساتھ خون ہوتا ہے اور بعض اوقات پیپ کی بجائے صرف
خون ہوتا ہے، فاسد خون کی وجہ سے رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں ہی شدید ضعف طاری
ہو جاتی ہے، بے قراری، ہڈیاں اور غشی ہوتی ہے، دانے غیر منظم طور پر دور دور نکلتے ہیں اور
کبھی کبھی تو نکل کر پھر اندر چلے جاتے ہیں، زیر جلد زف الدم ہوتا ہے، کبھی کبھی پیشاب/
تے کے ساتھ مثانہ، گردہ اور معدے سے اخراج خون ہوتا ہے۔ یہ نوع نہایت مہلک تصور
کی جاتی ہے۔

جدری خفیف:

اس میں دانے تیسرے دن نکل کر دو، ایک دن بعد ہی خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، عوارض میں بالکل ہی شدت نہیں ہوتی۔ اطبا کا خیال ہے کہ یہ صورت چچک (جدری) کا صحیح طور پر نیک نہ نکلنے پر ایک مرتبہ جدری میں مبتلا ہو جانے کے بعد رونما ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

صہب Measles	جدری Small Pox
1- مرض کا آغاز عام طور سے زکام سے ہوتا ہے، تے کی نسبت ابکائی زیادہ آتی ہے اور درد کمر عام طور سے نہیں ہوتا۔ بالفرض ہو بھی تو اس قدر شدت نہیں ہوتی۔	1- ابتدا میں کمر میں درد اور تے کی شکایت ہوتی ہے۔
2- طفحات بخار کے چوتھے دن، چہرے پر سے نکلتا شروع ہوتے ہیں۔	2- طفحات، بخار کے تیسرے دن سر کے بالوں کے قریب سے نکلتا شروع ہوتے ہیں۔
3- طفحات جلیبی ہوتے ہیں۔	3- طفحات پہلے جلیبی Macular جلیبی (Papular) حویصلی (Vesicular) بعد میں بثری (Pustular) ہو جاتے ہیں۔
4- دانے نکلنے سے پہلے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے کسی طرح کا دانہ/ ابھار کا احساس نہیں ہو۔	4- دانے نکلنے سے قبل جسم پر ہاتھ پھیرنے سے بارود کے چھروں کی مانند خنکی محسوس ہوتی ہے۔

- | | |
|--|---|
| <p>5- دانے نکلنے کے بعد جسمانی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسری علامتوں میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔</p> <p>6- حمی ثانوی نہیں ہوتا۔</p> <p>7- قشر (Desquamation) ہوتا ہے۔</p> | <p>5- طفحات نکلنے کے بعد جسمانی درجہ حرارت اور دوسری علامتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔</p> <p>6- پیپ پڑنے کے بعد مرطے میں حمی ثانوی لاحق ہوتا ہے۔</p> <p>7- بعد میں تقری (Pitting) اور جربلی (Scabbing) صورت پیش آتی ہے۔</p> |
|--|---|

تفریقی علامات

- | | |
|---|---|
| <p>حمی قرمزیه
Scarlet Fever</p> <p>1- مرض کا آغاز درد سر، تے، درد گلو اور خلق سے ہوتا ہے۔</p> <p>2- سینہ اور گردن کے قریب دوسرے دن طفحات رونما ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات وردی، خفیف ابھرے ہوئے اور سرخ ہوتے ہیں۔</p> <p>4- طفحات سرعت کے ساتھ پھیلتے ہیں۔</p> <p>5- علامات میں تخفیف نہیں ہوتی۔</p> | <p>جدری
Small Pox</p> <p>1- مرض کا آغاز شدید درد کمر، درد سر اور قشریہ سے ہوتا ہے۔</p> <p>2- بالوں کے کناروں کے قریب تیسرے دن طفحات رونما ہوتے ہیں۔</p> <p>3- طفحات بتدریج متغیر، بقعی (Macular) حلیمی، حویصلی اور آخر میں بثری ہو جاتے ہیں۔</p> <p>4- طفحات دیرے دیرے پھیلتے ہیں۔</p> <p>5- طفحات نکلنے پر جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے یا معمولی طور پر ہی بڑھا ہوتا ہے۔</p> |
|---|---|

- 6- طغحات کے خشک ہونے پر وجرہی | 6- نمایاں قشر ہوتا ہے۔
صورت پیش آتی ہے۔

تفریقی علامات

حمی تیفوسہ Typhus Fever	جدری Small Pox
1- دانے پانچویں دن نکلتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل خاص ہیئت کی ہوتی ہے۔	1- دانے تیسرے دن نکلتے ہیں اور بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کی شکل مخصوص ہوتی ہے۔
2- اطراف کے علاوہ حصہ جسم سے نکلتا شروع ہوتے ہیں۔	2- بالوں کے پاس سے نکلتا شروع ہوتے ہیں۔
3- عضلاتی ثقاہت بہت شدید ہوتی ہے	3- عضلاتی ثقاہت زیادہ نہیں ہوتی۔
4- درد گلو نہیں ہوتا۔	4- درد گلو ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — اس امر کی تدابیر کریں کہ دانے قلیل تعداد میں نکلیں اور جو بھی نکلیں بخوبی
پختہ ہو سکیں اور ان میں نچاؤ پیپ وغیرہ نہ پڑے/ مبردات و سکنات استعمال کرائیں۔
0 — عوارض پر بھرپور نگاہ رکھیں نیز ان کے تدارک/ ازالہ کی تدابیر کریں۔
0 — قوائے جسمانی کا تحفظ ضروری ہے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔
0 — رفع قبض کی تدابیر کریں/ مصفیات استعمال کرائیں۔
0 — حسب ضرورت نیم گرم پانی سے جسم پر اسفنج کریں۔
واضح رہے کہ جدری کے دانوں کے نکل آنے کے بعد علامتی علاج زیادہ موزوں
تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے گئے بندھے اصولوں پر ہی کار بند نہ رہیں مریض کو ہوا دار کر۔

وغیرہ میں قیام کرائیں اور ماحول کی صفائی پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

جدری کے دانوں کے نکلنے سے پہلے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔ ان کے استعمال کرانے سے دانے گھیل تعداد میں نکلنے ہیں اور عوارض میں شدت نہیں ہوتی۔

اصل السوس مقشر 2 گرام، گل لالہ ایک گرام، عدس مسلم 9 گرام، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو 375 ملی لیٹر عرق شاہترہ میں جوش دیں، جب 125 ملی لیٹر رہ جائے تو صاف کر کے شربت نیلوفر 12 ملی لیٹر حل کریں نیز خاکسی 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
گل لالہ صحرائی، گل سرخ، لک منسول، خاکسی ہر ایک 4 گرام، عناب 9 عدد، انجیر زرد 3 عدد — تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق شاہترہ، عرق کیوڑہ، عرق مکو، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے تو چھان کر شربت کدو/ شربت عناب 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

گل لالہ بستانی، لک منسول، کتیرا، ہر ایک 1 گرام — تینوں کو پیس کر شربت کیوڑہ 12 ملی لیٹر ملا کر چٹائیں — اس کے بعد گل لالہ، خاکسی، عدس سیاہ، پنجب کیوڑہ، گل سرخ، ہر ایک 6 گرام، انجیر زرد 4 عدد کو عرق شاہترہ، عرق مکو، عرق کیوڑہ، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت عناب 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
بعض اطباء عرق شاہترہ، عرق مکو کی مقدار 125 ملی لیٹر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

گل لالہ 1 گرام، عدس مسلم 12 گرام، عناب 5 عدد، اصل السوس مقشر 3 گرام کو 175 ملی لیٹر عرق شاہترہ میں جوش دیں اس کے بعد مردار پد 7 عدد اس میں حل کر کے شربت نیلوفر 12 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 3 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔
مویرہ منقی 7 عدد، لک منسول 3 گرام — دونوں کو عرق بادیان 150 ملی لیٹر میں جوش دیں، جب 60 ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر سرد کر کے نوش کرائیں۔

وانے جب نکل آئیں تو یہ نسخے استعمال کرائیں۔ واضح رہے کہ اس مرطے میں سرد تدابیر اور داخلی طور پر سرد دواؤں کے استعمال سے احتراز کریں اسی طرح کسی شدید ضرورت کے بغیر مسہلات کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔

مویز منقی 9 عدد، عناب 5 عدد کو عرق گاؤ زبان، عرق عب الثعلب، ہر ایک 70 ملی لیٹر میں جوش دے کر نبات سفید 12 گرام، ملا کر چھان لیں اور خاکسی 7 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

شدید حرارت ہو تو یہ نسخہ دیں:

گل نیلوفر، مکوشک، شاترہ، ہر ایک 5 گرام، بہدانہ 3 گرام، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں۔ صبح کے وقت صاف کر کے شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے خاکسی 7 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

شدید حرارت کے ساتھ اگر مریض حار المزاج ہو، موسم بھی گرم ہو نیز سراسی کیفیت طاری ہو جائے تو یہ نسخہ مفید ہے۔

مغز تخم کا ہو 5 گرام، مغز تخم کدو 6 گرام، عناب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو عرق شاترہ میں پیس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 7 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرائیں۔

اگر خفقان یا غشی جیسی کیفیت طاری ہو جائے تو مذکورہ بالا دونوں نسخوں میں سے کسی کے ساتھ خمیرہ مروارید 5 گرام استعمال کرائیں۔ خمیرہ مروارید کا نسخہ درج ذیل ہے:

بہن سفید، بہن سرخ، تودری سرخ، تودری سفید، تخم بادرنبویہ، مروارید، زعفران، عنبر، مشک، ہر ایک 12 گرام، بادرنبویہ، زہر مہرہ، ہر ایک 25 گرام، تخم خرف، گل گاؤ زبان، ہر ایک 120 گرام، زہر مہرہ، مروارید، زعفران، مشک، عنبر کو روح کیوڑہ میں کھل کر اور باقی تمام دواؤں کو عرق بید شک، عرق گلاب، ہر ایک 1 لیٹر میں نیم کوب کر کے بھگو کر ڈھانک دیں اور صبح کو جوش دے کر صاف کر کے شکر 2 کلو گرام ملا کر قوام تیار کریں اور باقی کھل کردہ دوائیں ملا کر حسب دستور خمیرہ تیار کریں۔

اگر مریض حار المزاج نہ ہو، نہ ہی موسم گرم ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:
 مکوشک، کوہ ابریشم، خاکسی، ہر ایک 5 گرام، گل گاؤ زبان، 3 گرام، مویز مٹی
 9 عدد، عتاب 5 عدد، نبات سفید 12 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر
 نوش کرائیں۔ اگر ضعف قلب وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ خیرہ مروارید حسب سابق استعمال کریں۔
 انجیر زرد ایک عدد، بادیان، عنب الثعلب، ہر ایک 1 گرام، برگ لالہ 50
 ملی گرام، نخود، گل نیلوفر، ہر ایک 5 گرام — تمام دواؤں کو عرق کو، عرق کیوڑہ، عرق گاؤ زبان،
 ہر ایک 25 ملی لیٹر میں رات کے وقت بھگو دیں، صبح کو چھان کر خاکسی 3 گرام، لک مغدول
 ایک گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

انجیر زرد 2 عدد (کھڑے کھڑے کی ہوئی) کو عرق گاؤ زبان 60 ملی لیٹر میں جوش
 دیں۔ جب 30 ملی لیٹر رہ جائے تو چھان کر زعفران 125 ملی گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
 عوارض کے تدارک / ازالہ کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

ہذیان کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے:

شیرہ تخم کاہو 2 گرام، شیرہ اصل السوس 1.5 گرام، لعاب بہدانہ ایک گرام،
 شربت نیلوفر 12 گرام، عرق کو، 35 ملی لیٹر میں نکال کر نوش کرائیں۔

کرب و اضطراب، سوزش اور خفقان کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

زہر مہرہ خطائی، مروارید ناسفہ، ہر ایک 500 ملی گرام، شربت یاقوت، شربت گاؤ زبان،
 ہر ایک 6 ملی لیٹر، ورق نقرہ، ایک عدد، حسب دستور ملا کر کھلائیں اس کے بعد شربت کیوڑہ،
 شربت عتاب، ہر ایک 6 ملی لیٹر میں عرق کو، عرق بید مشک (حسب ضرورت) ملا کر خاکسی
 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

گل لالہ صحرائی، طباشیر، مروارید ناسفہ، ہر ایک 1 گرام، خاکسی 4 گرام —
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر چھان لیں اور کبوترے کے انڈے کی زردی حسب ضرورت
 میں ملا کر چٹائیں — اس کے بعد شربت کیوڑہ 12 ملی لیٹر، عرق کو، عرق بید مشک، ہر ایک
 25 ملی لیٹر، ملا کر نوش کرائیں۔

کرب، جنگلی تنفس، غشی اور جدری اسود میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

طباشیر، زہر مہرہ خطائی، یا قوت ربانی، مردارید نافضہ، رب السوس، ہر ایک 1 گرام، دانہ جیل، کبریا ہر ایک 500 ملی گرام، برگ گل لالہ 2.5 گرام — تمام دواؤں کو پین کر شربت عناب، شربت سیب، ہر ایک 25 ملی لیٹر ملا کر ورق طلا 1 عدد، ورق نقرہ 3 عدد کا حسب دستور اضافہ کر کے تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔

دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

کرفس، بادیان، مکو خشک، کتیرا، لک منسل، ہر ایک 1 گرام، انجیر ایک عدد، عناب 2 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور خاکسی 2 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

انجیر زرد نکلاے کی ہوئی 2 عدد، عدس مقشر 7 گرام، لک منسل، کتیرا، بادیان، ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور زعفران 125 ملی گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

نخود خام، عدس مقشر نمکوب، ہر ایک 8 گرام، انجیر زرد 2 عدد پانی میں جوش دے کر حلیت خالص 65 ملی گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

دانے ظاہر ہونے کے بعد فوراً پوشیدہ ہو گئے ہوں، کرب و اضطراب، اور غشی وغیرہ کا غلبہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

کنگنی 5 گرام، انجیر زرد 2 عدد — دونوں کو عرق کرفس، عرق بادیان، ہر ایک 35 ملی لیٹر میں جوش دے کر نبات سفید سے شیریں کر کے نوش کرائیں۔

زردی بیضہ بوتری میں شہد ملا کر چٹائیں۔

یہ سب اور حرارت دماغ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں:

گل نیلوفر، شاہترہ، مکو خشک، ہر ایک 3 گرام، بہدانہ ایک گرام، عناب 2 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر 12 ملی لیٹر ملا کر خاکسی 3 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

رفع قبض کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

مردارید 500 ملی گرام، زہر مہرہ، کھربا، بسد، ہشب، مرجان، ہر ایک 1 گرام،
طباشیر، گل ارمنی، بزر الورد، ہر ایک 2 گرام— تمام دواؤں کو پیس کر 1 گرام، ہمراہ شربت
حب الّاس 12 ملی لیٹر چنائیں۔ اس کے بعد عرق بارنگ 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
طباشیر، گل سرخ، تخم کاہو، تخم کاسنی، تخم خرفہ، ساق، ہر ایک 6 گرام، گلنار، صندل
سفید، تخم حنا، ہر ایک 3 گرام، انیسون 1.5 گرام— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق
گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں اور 3 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں۔

دانوں کو پکانے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:

بادیان، مکو، لک مشول ہر ایک 2 گرام، برگ گل لال، 1 گرام، انجیر ایک عدد،
مویز منقّی 3 عدد، گندر ڈیرہ عدد، نخود، ماش، لوبیا، ہر ایک 9 گرام— تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر چھان لیں اور دن میں تین مرتبہ نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / ادویہ برزّے کار لائیں:

بے ہوشی اور نبض کی سرعت کی صورت میں پاشویہ کریں— شیر زن ناک میں چکائیں۔
دانوں میں خارش ہو تو برگ چھاؤ کی دھونی دیں— روغن زیتون میں چونے کا
پانی ہم وزن ملا کر لگائیں۔ مرہم رال / مرہم کافوری لگائیں۔ دونوں کے نسخے درج ذیل ہیں:
مرہم رال:

موم سفید، کافور قیصوری، رال، کات سفید، ہر ایک 18 گرام— موم کے علاوہ
تمام دواؤں کا علاحدہ علاحدہ سفوف کریں، موم کو روغن گاؤ 75 ملی لیٹر میں پگھلائیں اس کے
بعد رال کا سفوف پھر کات سفید کا، اس کے بعد کافور کا سفوف ڈال کر خوب چلائیں۔

مرہم کافوری:

سفیدہ کاشغری، روغن سرشف (دودھ میں پکایا ہوا) موم سفید، سفیدی بیضہ مرغ،
ہر ایک 48 گرام، کافور 12 گرام— موم کو روغن میں ملا کر آگ پر رکھیں اور کافور، سفیدہ

کاشغری الگ الگ باریک پیس کر ملائیں اور آگ سے اتار کر سرد کریں، پھر سفیدی بیضہ مرغ ملا کر یک ذات کریں۔

زخم پڑ جانے کی صورت میں۔ برگ نیم کے جوشاندہ سے زخموں کو دھو کر مرہم کافوری لگائیں۔ یا کافور 6 گرام کو روغن تارپین 35 ملی لیٹر میں حل کر کے لگائیں۔

زخموں میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

برگ نیم کے جوشاندہ سے زخموں کو صاف کر کے صبر کو آب برگ شفتالو میں ملا کر لگائیں۔ برگ نیم سبز، سیوس گندم، اسپند سوختی، ملا کر زخموں پر دھونی دیں۔

دانوں کو پکانے اور خشک کرنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کریں۔

بابونہ، بنفشہ، ختم حطی، سیوس گندم، اکلیل الملک، ہر ایک 60 گرام۔ تمام دواؤں کو 5 لیٹر پانی میں جوش دیں، پھر اس کو کھلے منہ کے برتن میں مریض کی چار پائی کے نیچے رکھ دیں، اس بھپارہ سے دانے پک اور خشک ہو جائیں گے۔

شدید حرارت اور موسم گرما کی صورت میں، ٹکڑوں، ہتھیلی اور پنڈلیوں پر خالی سینٹیاں کھینچیں۔ سرکہ 12 ملی لیٹر، روغن گل 25 ملی لیٹر میں ملا کر عرق گلاب 60 ملی لیٹر کا مزید اضافہ کر کے کپڑا بھگو کر سر کے تالو پر بار بار رکھیں۔ یہ نخلخہ سوگھانا بھی سودمند ہے۔

صندل سفید، خس، ایک 6 گرام، کافور ایک گرام۔ تمام دواؤں کو آب برگ کاسنی سبز 25 ملی لیٹر، روغن گل 12 ملی لیٹر، سرکہ 13 ملی لیٹر میں ملا کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور مریض کو سوگھائیں۔

دانوں کو خشک کرنے کے لیے۔ عرق گلاب میں کافور گھس کر لگائیں۔

خاکستر چوب گز، سفیدہ کاشغری، دونوں کو خوب باریک کر کے چھان لیں اور

دانوں پر چھڑکیں۔

زرد چوب تازہ 120 گرام، گیاء دوب، برگ نیم تازہ، ہر ایک 12 گرام، برنج

سفید، 25 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر پیسٹ بنائیں اور کسی ملائم چیز سے

دانوں پر لگائیں۔

کھرٹا تارنے اور داغ وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔
 کھرٹا تیار ہوں اور ان کے نیچے رطوبت نہ ہو تو روغن کنجد نیم گرم لگائیں۔ تھوڑا
 سا نمک پیس کر روغن کنجد میں ملائیں اور نیم گرم مالش کریں۔ کھرٹا تارنے میں مفید ہیں۔
 آنہ ہلدی، کوڑی سوختہ، سرکنڈہ کی جڑ، ہموزن — تمام دواؤں کو بھیڑ کے دودھ
 میں پیس کر رات کے وقت لگائیں اور صبح کے وقت سیوس گندم کے جوشاندہ سے دھو دیں۔
 سیوس جو، تخم خبازی، تخم عطی، ہموزن — تمام دواؤں کو بکری کے دودھ میں پکا کر
 پیسٹ تیار کریں اور ضاد کریں۔

ریوند چینی 12 گرام، آرد جو 25 گرام — دونوں کو باہم پیس کر پانی میں گوندھ
 کر ضاد کریں۔ دانوں کے خشک ہو جانے کے بعد جو ابھار رہا جاتا ہے اس کو زائل کرنے
 میں مجرب ہے۔

برنج سفید، مغز بادام تلخ، ہر ایک 96 گرام، بانس کی جڑ 120 گرام، آرد نخود،
 مغز خبذہ دانہ، مغز خرزہ، ہر ایک 85 گرام، آرد مٹر 60 گرام، مقل، مردار سنگ، ہر ایک 50
 گرام، قسط، ایرسا، شاخ گوزن، ہر ایک 35 گرام، پوست بیضہ سرخ، نظرون، برادہ عاج،
 زراوند طویل، ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو علاحدہ علاحدہ باریک کریں اور گرم پانی
 میں ایشہ کی طرح تیار کر کے رات کے وقت جسم پر ملیں اور صبح کو گرم پانی سے دھونے کی
 ہدایت کریں۔ صرف چند دن میں ہی دھبے اور داغ زائل ہو جائیں گے۔

0 — اس مرض میں اعضا کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ورنہ بعض اعضا کے
 ضائع ہو جانے / ان کی طبی کارکردگی کے غیر معمولی طور پر متاثر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔
 ذیل میں اس طرح کے چند نسخے تحریر کیے جا رہے ہیں۔

آب کشیز میں کافور اور ساق حل کر کے چھان لیں اور قطور کریں۔
 آنکھوں میں — آب تخم انار قطور کریں۔

اگر بیاض چشم کا اندیشہ ہو تو — زرد چوب کو آب لیموں میں کھل کر کے سرمہ
 بنائیں اور لگائیں — ہلیلہ، آملہ، دونوں کو پانی میں بھگو کر چھان لیں اور خیساندہ آنکھ میں پکائیں۔

کان کے تحفظ کے لیے درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:
 روغن گل میں تھوڑا سا کافور حل کر کے کان میں حسب دستور چٹکائیں:
 پوست کیکر، پوست انار، مازو — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں
 اور کسی قدر گرم حالت میں کانوں میں چٹکائیں۔
 ناک کے تحفظ کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں۔
 صندل سفید کو آب کشیزبزی میں گھس کر ناک کے آس پاس لگائیں اور ناک میں
 چٹکائیں۔
 مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، ہندوانہ — تمام دواؤں کو پیس کر شیر زن میں حل کر
 کے قطور کریں۔

آب انار مع پوست نچوڑ کر ڈالیں۔
 ناک میں زخم بھی ہو تو یہ نسخہ دیں:
 مردار سنگ 3 گرام، سیندور 3.5 گرام، زنجبیل مح گرہ، موم سفید، ہر ایک 14
 گرام، فوفل ایک عدد، شاخ نیم جو دو پتوں کے درمیان ہوتی ہے 7 عدد — تمام دواؤں کو
 روغن گاؤ 85 ملی لیٹر میں جلائیں۔ ترکیب یہ ہے کہ پہلے شاخ نیم کو سوختہ کریں اس کے بعد
 زنجبیل کی گرہیں جلائیں پھر فوفل جلائیں اس کے بعد موم پگھلا کر اول الذکر دونوں دوائیں
 جلائیں اور مرہم تیار کر کے لگائیں۔

مفاصل کے تحفظ کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں۔
 صندل، شیاف، مایشا، گل ارمنی، گل سرخ، کافور (کسی قدر) — تمام دواؤں کو
 عرق گلاب میں گھس کر سرکہ ملا کر مفاصل پر لگائیں۔




* حصہ

MEASLES

اس مرض میں نزلہ و زکام کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور منہ میں رخساروں کے اندرونی جانب چھوٹے چھوٹے نقطے، جن کے گرد سرخ دائرہ ہوتا ہے، نکل آتے ہیں اور چوتھے دن جسم پر سرخ، چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ یہ حادثہ نوعی متعدی مرض (Acute Specific Infections Disease) ہے، جو میکسو وائرس گروپ (Myxoviruses Group) کے نتیجہ میں ڈراپلیٹ تعدیہ (Droplet Infection) کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ یہ 6 ماہ سے 6 سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے۔ 6 ماہ سے قبل اور 40 سال کے بعد شاذ و نادر ہی پیش آتا ہے، عمر میں ایک مرتبہ عام طور سے لاحق ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تین سے زائد مرتبہ شاذ طور پر ہوتا ہے۔

* خسرہ، کھسرہ، سرچہ وغیرہ اس کے ہندستانی نام ہیں۔ انگریزی میں Morbilla بھی کہتے ہیں۔

اقسام



اسباب

(۱) میکسو وائرسز گروپ کا ایک مخصوص ٹیب وائرس — دہائی طور پر عام طور سے موسم سرما اور بہار میں یہ مرض پھیلتا ہے، صفاوی مزاج لوگ، صفاوی خلط کی تولید میں معاون اشیا کا استعمال، اس مرض کی قبولیت کی استعداد میں اضافہ کر دیتا ہے، مرض کی سرایت، مریض کی رطوبت، اسکے استعمال کے کپڑے، اور تنفس کے ذریعہ لگتی ہے۔ یہاں تک یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ اس مرض کا تعدیہ نزلہ کے دوران، اس مرض کے مخصوص دانے کے ظاہر ہونے سے قبل بھی ممکن ہے اور یہ خطرہ علامات کے رونما ہونے کے 14 دن بعد تک برقرار رہتا ہے۔

اس کی مدت حضانت 7-21 دن ہے لیکن عام طور سے 10 دن ہے۔ تاہم
 مناعت منفعلہ (Passive Immunity) اس کی مدت کو طویل کر سکتی ہے۔

علامات

(الف) ہسبہ خفیف:

مرض کا آغاز شدید علامتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے لرزہ (Riger) یا

اس کے بغیر اور بعض اوقات تشنج (Convulsion) ہو کر بخار چڑھتا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ شدت نہیں ہوتی چنانچہ 102-104 ف تک رہتا ہے۔ دوسرے دن کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور 48 گھنٹے اسی حالت میں رہتا ہے۔ چوتھے دن پھر بڑھ کر 102-104 ف تک پہنچ جاتا ہے، پیشانی میں درد محسوس ہوتا ہے، شدید نزلہ و زکام کی شکایت ہوتی ہے، آنکھوں میں سرخی، خارش اور دکھن سی ہوتی ہے اور آنسو/پانی بھی بہتا ہے، بار بار چیخیں آتی ہیں، روشنی سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات سبز رنگ کے اسہال بھی آتے ہیں — مذکورہ علامات دانوں کے نکلنے سے کم دہشت 72 گھنٹے پہلے نمودار ہوتی ہیں، ان ہی ایام میں اس مرض کی بعض مخصوص علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔

(I) کاپلکس اسپاٹس (Koplik's Spots):

اس میں منہ میں رخسار کی اندرونی جانب اور بعض اوقات ہونٹوں کی اندرونی جانب، نیلگوں، سفید چھوٹے چھوٹے مرکز (نقطے) ہوتے ہیں، ان کے گرد شوخ سرخ رنگ کا حلقہ ہوتا ہے اور درمیانی مقام (جیسا کہ ذکر ہوا) نیلگو سفید ہوتا ہے، یہ نقطے بعض اوقات مسوڑھوں میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ اصل دانوں (حصبہ کے) نکلنے سے 72 گھنٹے قبل نکلنے کی وجہ سے، یہ تقدمتہ المعرفہ کا کام کرتے ہیں۔ جسم پر حصبہ کے دانوں کے نکلنے کے مرحلے میں ان نقطوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ 3-4 دن تک موجود رہتے ہیں۔

مے پر:

آنکھ کی اندرونی طرف، ناک کی جانب درم آمیز ایک مخصوص ہلائی شکن پیدا ہو جاتی ہے، جو 24-48 گھنٹے قبل نمودار ہوتی ہے اور حصبہ کے اصل دانوں کے نکلنے کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔

دانے نکلنے سے پہلے عام طور سے خشک کھانسی آتی ہے، گلے میں خراش اور التهاب ہوتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، تنفس میں سرعت ہوتی ہے، فم معدہ میں درد محسوس ہوتا ہے اور قے کی شکایت ہوتی ہے، سبز پر تناؤ ہوتا ہے۔ بعض اوقات منہ اور ناک کے پاس معمولی

درم ہوتا ہے۔ ان علامتوں کے بعد (چوتھے، پانچویں دن) خشکاش کے دانوں کی مانند چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نکل آتے ہیں، بعض اوقات دانوں کے نکلنے سے کچھ پہلے علامتوں میں کسی قدر تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی علامتوں میں اور بھی شدت آ جاتی ہے۔ چنانچہ گردن، کچھ ران وغیرہ کے غدو میں خفیف درم پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی حجرہ سے متعلق اس قدر شدید علامات رونما ہوتی ہیں کہ خناق و بانی کا شبہ ہوتا ہے۔

عام طور سے دانوں کے نکلنے کا وقت جب بالکل قریب آ جاتا ہے تو جسمانی درجہ حرارت 104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے، تنفس مزید سریع ہو جاتا ہے، چہرہ کی رنگت نیلگوں ہو جاتی ہے اور ذات الریہ شععی کا دھوکا ہوتا ہے، اعضاء بول میں خراش ہو کر کثرت بول کی شکایت ہو سکتی ہے، اسہال بھی آ سکتے ہیں، ناک کی رطوبت گامی ہو جاتی ہے، اس کے بعد دانے ظاہر ہوتے ہیں، جو آپس میں مل کر ہلالی شکل کے دھبے بنا دیتے ہیں، یہ دانے سب سے پہلے کینٹی، پیشانی، کان کے پیچھے اور رخساروں پر نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے جلد بھی کسی قدر متورم ہو جاتی ہے اور مریض کا چہرہ بھر بھرا ہوا/ متورم دکھائی دیتا ہے، آنکھوں میں سرخی ہنوز برقرار رہتی ہے، دانوں کے نکلنے کا عرصہ کم و بیش 48 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں یہ تمام جسم پر پھیل جاتے ہیں، تین چار دن میں دانوں کا نکلنا بالکل بند ہو جاتا ہے، ان دانوں کی رنگت بڑی حد تک سرینس کے جلد کی رنگت پر موقوف ہوتی ہے۔ چنانچہ گورے، بھورے، گلابی مائل یا سانولے مریضوں میں یہ سیاہ/ تانبے کے رنگت کے ہوتے ہیں۔ ان دانوں کی جلد کے نیچے عام طور سے جریان خون ہوتا ہے، جلد بھیگی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے ایک خاص نوع کی بو آتی ہے اور اگر حرارت بہت زیادہ ہو تو جلد خشک اور گرم محسوس ہوتی ہے، دانوں کی وجہ سے جسم میں خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔

بعض شدید حالتوں میں دانے قلیل تعداد میں نکلتے ہیں اور ان کی رنگت اور شہادت بھی مخصوص ہوتی ہے، تنگی تنفس کی صورت میں عام طور سے جسم کی رنگت نیلگوں ہوتی ہے اور دانے کم تعداد میں نکلتے ہیں۔ عام طور سے دانوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حرارت جسمانی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جب دانے کم ہونے لگتے ہیں تو اسی تناسب سے

تفریقی علامات

حمی قرمزیه Scarlet Fever	حصہ Measles
1- قشعریرہ، درد سر، درد گلو اور تھکے سے مرض کا آغاز ہوتا ہے۔	1- مرض کا آغاز شدید نزلہ سے ہوتا ہے۔
2- طفحات دوسرے دن رونما ہوتے ہیں۔	2- طفحات دانے چوتھے دن ظاہر ہوتے ہیں۔
3- طفحات دردی، ابھرے ہوئے، گہرے سرخ ہوتے ہیں اور پہلے گردن اور سینے پر نکلتے ہیں۔	3- طفحات حلیمی اور ہلالی مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں اور پہلے چہرے پر نکلتے ہیں۔
4- زبان توتی ہوتی ہے۔	4- زبان پر سفید تہہ جمی ہوتی ہے۔
5- شدید درد گلو ہوتا ہے۔	5- سعال کی شکایت ہوتی ہے۔
6- پیشاب زلالی خارج ہوتا ہے۔	6- پیشاب طبعی رنگ کا ہوتا ہے۔
7- طفحات تیزی سے پھیلتے ہیں۔	7- طفحات بتدریج پھیلتے ہیں۔
8- التهاب کلیہ ہوتا ہے۔	8- عوارض میں ذات الریہ وضعی ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — سردی سے محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ضعیف العمل مہر دات استعمال کرائیں۔
- 0 — عوارض کے تدارک / ازالہ کی تدابیر کریں۔
- 0 — قوائے جسمانی کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — مفرحات اور مقویات قلب استعمال کرائیں۔
- 0 — تلخین شکم لازمی ہے۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے¹ بروئے کار لائیں:

مویر منقی 9 عدد، عناب 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد، خاکسی 5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام / شربت عناب 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح و شام نوش کرائیں۔ بعض اوقات اس میں گل بنفشہ 7 گرام، زعفران ایک گرام کا اضافہ کیا جاتا ہے اور کبھی خاکسی کو اوپر سے چھڑک کر استعمال کرایا جاتا ہے۔

عام طور سے مرض کا آغاز نزل و زکام سے ہوتا ہے۔ اس کے ازالہ کے لیے یہ نسخہ دیں: مویر منقی 9 عدد، عناب 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد، خاکسی، تخم خبازی، تخم خطمی، ہر ایک 5 گرام — خاکسی کے علاوہ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام / شربت عناب 25 ملی لیٹر سے شیریں کر کے خاکسی چھڑک کر نوش کرائیں۔ اگر دانوں کے نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو انجیر 3 عدد کو پانی میں جوش دے کر 125 ملی گرام، زعفران حل کر کے نوش کرائیں۔

جب دانے نکلنے لگیں تو شفا یابی تک یہ نسخہ استعمال کرائیں:

خمیرہ مردارید 3 گرام کھلا کر شیرہ عناب 5 عدد، شیرہ مویر منقی 7 عدد، عرق کلو 75 ملی لیٹر میں نکال کر نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

اگر شدید قبض ہو تو صبح کے وقت شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر نیم گرم نوش کرائیں:

آش جو میں، بنفشہ، نیلوفر ہر ایک 5 گرام، سپتال 9 عدد، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔ بعض اوقات صرف مویر منقی کھلانے سے بھی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔

اسہال کی صورت میں شیرہ حب الّاس 12 گرام / حب الّاس 7 گرام آش جو

* اوزان، بالغ اشخاص کو مد نظر رکھ کر تحریر کیے گئے ہیں۔ بچوں میں حسبِ عمر کم کریں۔

جسمانی حرارت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ نبض بھی حرارت کے تابع ہوتی ہے، اس کے برخلاف تنفس میں عام طور سے سرعت ہوتی ہے، دانوں کی شدت کے مرحلے میں زکام اور کھانسی کی شکایت بھی عروج پر ہوتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، درد سر، اضطراب، خفیف ہڈیاں، بے خوابی وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا۔ حلق میں درد محسوس ہوتا ہے اور ذریعے جڑے کے نیچے والے غدد چھوٹنے پر دیکھتے ہیں۔ ابتدا مرض میں زبان پر سفید، دبیز فرجی ہوتی ہے اور دانوں کے نکل جانے کے بعد زبان سرخ ہو جاتی ہے اور پے پلا کے سرخ ابھار نمایاں ہوتے ہیں۔ جب انحطاط کا مرحلہ شروع ہوتا ہے (یہ عام طور سے ساتویں دن شروع ہوتا ہے) تو دانے مرجھانے لگتے ہیں اور کم و بیش اس کے 24 گھنٹے کے اندر بخار اتر جاتا ہے، آنکھیں دن دانوں پر سے گہوں کی بھوسی کی مانند پھلکے جھڑتے ہیں۔ اس وقت جسم میں خارش محسوس ہوتی ہے۔ تاہم چند دنوں تک معمولی کھانسی اور آواز میں بھاری پن رہتا ہے۔ اس مرض میں انجام عام طور سے بخیر ہوتا ہے لیکن اگر عوارض شدید ہوں، ذات الریہ، ذات الجنب، ہیپتہ، خناق، نخجہ، ریب، سل بطنی / ریوی وغیرہ ہو جائے تو انجام تشویش ناک ہو سکتا ہے۔

(ب) حصہ شدید:

(I) حصہ خبیث:

اس میں عام طور سے دانے / طفحات (Eruptions) اچھی طرح نہیں نکلتے، بخار نہایت شدید ہوتا ہے، کرب و اضطراب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، عضلات کانپتے ہیں، تنگی تنفس کے ساتھ ساتھ شدید ضعف قلب ہوتا ہے اور اگر دانے بہت زیادہ نکلے ہوں تو اس کی زیادتی ہی مریض کی حالت کو ابتر بنا دیتی ہے۔ حصہ کی یہ قسم عام طور سے مہلک ثابت ہوتی ہے۔

(II) حصہ اسود:

سیاہ رنگ کے بے قاعدہ دانے نکل کر بہت جلد دب جاتے ہیں، آغاز سے ہی علامتوں میں شدت ہوتی ہے۔ چونکہ اس نوع کے ساتھ ذات الریہ بھی ہوتا ہے جس کے

سبب تنفس جلد جلد اور رک رک کر ہوتا ہے، مسامع الصدر سے پوانکائی اور کرپچائی شن بھی سنائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات شدید تشنج بھی واقع ہوتا ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں مریض ہلاک ہو سکتا ہے۔

(III) حصہ زنی / دسوی:

اس میں جسم کے بہت سے باغی پردوں (Mucous Membranes) مثلاً ناک، منہ، مقعد وغیرہ سے جریان خون (نزف الدم) ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب میں بھی خون آنے لگتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ دانوں کے نیچے جریان خون واقع ہونا اس قدر مہلک نہیں ہوتا، جس قدر دوسرے مقامات سے۔ عام طور سے ضعف اور کمزوری لاحق ہو کر بیہوش طاری ہو جاتی ہے اور مریض فوت ہو جاتا ہے۔

تفریقی علامات

دردیہ Roseola	حصہ Measles
1- نزلہ اور کھانسی خفیف ہوتی ہے۔	1- نزلہ اور کھانسی بہت نمایاں ہوتی ہے۔
2- حرارت خفیف ہوتی ہے۔	2- حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
3- طفحات پہلے جسم کے درمیانی حصہ پر نکلتے ہیں۔	3- طفحات پہلے چہرے پر نکلتے ہیں۔
4- طفحات جدا ہوتے ہیں۔	4- طفحات ملے ہوتے ہیں۔
5- طفحات چکنے، چمکدار اور غیر ہلالی ہوتے ہیں۔	5- طفحات سیاہ، ابھرے ہوئے اور ہلالی ہوتے ہیں۔
6- کسی قدر درد دلو ہوتا ہے۔	6- گلے میں درد (عام طور سے) نہیں ہوتا۔
7- تقشر نہیں ہوتا۔	7- تقشر (چھلکے اترتا) ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

حمی قرمزیه Scarlet Fever	حصہ Measles
1- قشعریرہ، درد سر، درد گلو اور تے سے مرض کا آغاز ہوتا ہے۔	1- مرض کا آغاز شدید نزلہ سے ہوتا ہے۔
2- طفحات دوسرے دن رونما ہوتے ہیں۔	2- طفحات/ دانے چوتھے دن ظاہر ہوتے ہیں۔
3- طفحات وردی، ابھرے ہوئے، گہرے سرخ ہوتے ہیں اور پہلے گردن اور سینے پر نکلتے ہیں۔	3- طفحات جلیبی اور جلائی مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں اور پہلے چہرے پر نکلتے ہیں۔
4- زبان توتی ہوتی ہے۔	4- زبان پر سفید تہہ جی ہوتی ہے۔
5- شدید درد گلو ہوتا ہے۔	5- سعال کی شکایت ہوتی ہے۔
6- پیشاب زلالی خارج ہوتا ہے۔	6- پیشاب طبی رنگ کا ہوتا ہے۔
7- طفحات تیزی سے پھلتے ہیں۔	7- طفحات بتدریج پھلتے ہیں۔
8- التهاب کلیہ ہوتا ہے۔	8- عوارض میں ذات الریہ شعی ہوتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — سردی سے محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ضعیف العمل مہر دات استعمال کرائیں۔
- 0 — عوارض کے تدارک/ ازالہ کی تدابیر کریں۔
- 0 — قوائے جسمانی کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — مفرحات اور مقویات قلب استعمال کرائیں۔
- 0 — تلخین شکم لازمی ہے۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:

مویز منقی 9 عدد، عناب 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد، خاکسی 5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام / شربت عناب 25 ملی لیٹر حل کر کے صبح و شام نوش کرائیں۔ بعض اوقات اس میں گل بنفشہ 7 گرام، زعفران ایک گرام کا اضافہ کیا جاتا ہے اور کبھی خاکسی کو اوپر سے چھڑک کر استعمال کرایا جاتا ہے۔

عام طور سے مرض کا آہا ز نزلہ و زکام سے ہوتا ہے۔ اس کے ازالہ کے لیے یہ نسخہ دیں: مویز منقی 9 عدد، عناب 5 عدد، انجیر زرد 2 عدد، خاکسی، تخم خبثی، تخم حنظل، ہر ایک 5 گرام — خاکسی کے علاوہ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام / شربت عناب 25 ملی لیٹر سے شیریں کر کے خاکسی چھڑک کر نوش کرائیں۔ اگر دانوں کے نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو انجیر 3 عدد کو پانی میں جوش دے کر 125 ملی گرام، زعفران حل کر کے نوش کرائیں۔

جب داسنے نکلنے لگیں تو شفا یابی تک یہ نسخہ استعمال کرائیں:

خمیرہ مردارید 3 گرام کھلا کر شیرہ عناب 5 عدد، شیرہ مویز منقی 7 عدد، عرق مکو 75 ملی لیٹر میں نکال کر نبات سفید 25 گرام سے شیریں کر کے خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

اگر شدید قبض ہو تو صبح کے وقت شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر نیم گرم نوش کرائیں:

آتش جو میں، بنفشہ، نیلوفر ہر ایک 5 گرام، سپتاں 9 عدد، عناب 5 عدد — تمام دواؤں کو جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں۔ بعض اوقات صرف مویز منقی کھلانے سے بھی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔

اسہال کی صورت میں شیرہ حب الّاس 12 گرام / حب الّاس 7 گرام آتش جو

* اوزان، بالغ اشخاص کو مد نظر رکھ کر تحریر کیے گئے ہیں۔ بچوں میں حسبِ عمر کم کریں۔

میں پکا کر استعمال کرائیں۔

قرص طباشیر قابض 3 گرام، شربت انار میں ملا کر چٹائیں۔ قرص کانسی درج ذیل ہے۔

طباشیر، گل سرخ، تخم کاہو، تخم کاسنی، تخم خرفہ، ساق، ہر ایک 6 گرام، صندل سفید، تخم حاض، گلنار، ہر ایک 3 گرام، انیسون 1.5 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں۔

اگر مذکورہ بالا دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو یہ نسخہ دیں۔

سفوف ملین 5-7 گرام رب ہی میں ملا کر کھلائیں۔ سفوف کانسی یہ ہے: اسپنخول مسلم، تخم ریحان، تخم مردہ نشاستہ، گل ارشی، طباشیر، تخم حاض بریاں، صمغ عربی ہموزن۔ اؤل الذکر تین دواؤں کے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور باقی کو مسلم شامل کریں۔

کھانسی کی صورت میں لعوق سپتال 12 گرام کو عرق گاؤ زبان 75 ملی لیٹر/عرق برنجاسف 60 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔

موسم گرما میں تسکین حرارت کے لیے۔ تازہ پانی میں تھوڑا سا عرق کیوڑہ/ شربت کیوڑہ ملا کر نوش کرائیں۔ موسم سرما میں عرق گاؤ زبان، عرق مکو پلائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر/ نسخے بروئے کار لائیں:

خاکسی باریک کر کے جسم اور بستر پر چھڑکیں۔

دانوں کے تاخیر سے نکلنے کی صورت میں سابق میں مذکور نسخہ استعمال کرانے کے

بعد جسم پر گرم پانی کا بھپارہ دیں۔

گل سرخ، کند، مہر، انزوت، دم الاخوین، ہموزن کو باریک پیس کر چھڑکیں۔

کمرے کو گرم رکھنے کے لیے موسم گرما میں صندل، مورہ کی لکڑی کی دھونی دیں

اور موسم سرما میں جھاؤ انار اور انجیر کی لکڑی کی دھونی دیں۔

حمیقا *

CHICKEN POX



اس مرض میں پہلے خفیف طور پر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے 24 گھنٹے بعد پشت اور سینے پر سرخ رنگت کے دانے نکل آتے ہیں، یہ سلسلہ مزید 48 گھنٹے تک برقرار رہتا ہے۔ ابتدا میں یہ دانے سخت ہوتے ہیں۔ بعد میں ان میں آبی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی قدر پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہفتہ عشرہ بعد دانے خشک ہو جاتے ہیں اور اس پر کھربڑ جم کر گر جاتی ہے۔ یہ مرض 10 سال سے کم عمر کے بچوں میں خزاں اور سرما کے موسم میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

- (I) خلطی اعتبار سے صفراوی / دموی خلط کا غلبہ
- (II) جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ پریس گروپ کا ویری سے لازوسٹر (Varicella Zoster) نامی وائرس ہے، جو فلٹر سے بھی باسانی گزر جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ یہ بیماری عددی سرایت (Droplet Infection) کی صورت میں عارض ہوتی ہے۔

* کنگر پتھر، باد آبلہ، جدری کاذب، موتی جھرہ، موتیا ٹیلا Varicella وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

بعض مخصوص حادثہ امراض مثلاً خسرہ، خناق و بائی اور سرخ بخار میں مبتلا اشخاص میں اس مرض کی قبولیت کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔
اس مرض کی مدت حضانت 11-21 دن ہے۔

علامات

عام طور سے سرایت کے 14 دن بعد کرب و اضطراب ہوتا ہے اور خفیف بخار ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے بعد پشت، سبز اور گردن پر معمولی داغ نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد یہ گہرے گلابی رنگ کے، بکثرت نمودار ہوتے ہیں اور ثور (دانے) میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور صرف چند گھنٹے میں ہی آبی رطوبات کے حامل ہو جاتے ہیں اور 24-48 گھنٹے بعد ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، تیسرے چوتھے دن یہ دانے کپڑوں کی معمولی رگڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پانچویں، چھٹے دن ان پر کھربڑ جم جاتی ہے اور نویں دسویں دن یہ کھربڑ گر جاتی ہے اور وہاں گلابی رنگ کے نشان رہ جاتے ہیں، جو رفتہ رفتہ سفید ہو جاتے ہیں۔ دانوں کے خشک ہونے کے مرحلے میں جلد پر خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے، شدید صورتوں میں چھالے/ دانے بڑے حجم کے/کنگری نس (جلد کو مردار کرنے والے) اور زنی ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور سے کوئی خاص پیچیدگی رونما نہیں ہوتی۔

تفریقی علامات

جدری Small Pox	حمیقا Chicken Pox
1- بخار کے 48 گھنٹے بعد دانے پہلے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔	1- بخار کے 24 گھنٹے بعد دانے پہلے پشت پر نمودار ہوتے ہیں۔
2- پانچویں دن رطوبت پیدا ہوتی ہے۔	2- عام طور سے 48 گھنٹے بعد آبی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے۔

- | | |
|--|---|
| 3- پانچویں چھٹے دن دانے مرجھانے لگتے ہیں اور کھرٹڑ جمنے لگتی ہے۔ | 3- دس، گیارہ دن بعد دانے مرجھانے لگتے ہیں۔ |
| 4- مریض کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔ | 4- بعض اوقات مریض کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ |
| 5- عوارض شدید نہیں ہوتے۔ | 5- عوارض نسبتاً شدید ہوتے ہیں۔ |

اصول علاج

- 0 — مریض کو علاحدہ قیام کی ہدایت کریں۔
- 0 — حسب ضرورت مسکنات و میردات استعمال کرائیں۔
- 0 — دانے اگر نہ نکل رہے ہوں تو ان کو نکالنے کی غلطیہ کرائیں۔
- 0 — خارش کے ازالہ کی تدبیر کریں۔
- 0 — قبض کی صورت میں خفیف ملینیات استعمال کرائیں۔
- 0 — مقویات قلب استعمال کرائیں۔

علاج


- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- تبرید و تسکین کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں:
- عرق گاؤ زبان میں شربت کیوڑہ / شربت عناب / شربت نیلوفر حسب ضرورت ملا کر نوش کرائیں۔
- یہ نسخے بھی اس مرض میں مفید ہیں:
- عناب 5 عدد، موہر منقہ 9 عدد — دونوں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور
- خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ شیریں کرنے کے لیے نبات سفید حسب ضرورت کا
- اضافہ کر سکتے ہیں، عرق گاؤ زبان 125 ملی لیٹر کا اضافہ بھی سودمند ہے۔

پیاس کی شدت میں یہ نسخہ دیں:

عناّب 5 عدد، مغز تخم کدوئے شیریں 7 گرام کو عرق کاؤ زبان 150 ملی لیٹر میں
پیس کر شیرہ حاصل کریں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔
دانوں کے نکلنے میں تاخیر ہو اور قلب میں سوزش، حرارت اور ضعف محسوس ہو تو یہ
نسخہ دیں:

عناّب 7 عدد، موہر متقی 9 عدد — کو پانی میں جوش دے کر صاف کرنے کے بعد
خاکسی 3 گرام چمڑک کر نوش کرائیں اور شیرہ مروارید 3 گرام نکلائیں۔
شربت عناّب 25 ملی لیٹر ہمراہ عرق شاہترہ 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
0 — خارجی طور پر یہ نسخہ / تدابیر بروئے کار لائیں:

دانوں میں خارش اور سوزش کی صورت میں — صندل سرخ پیس کر جسم پر ملیں اور
کچھ دیر بعد معمولی پانی سے شستہ کرائیں۔
آبلے ٹوٹ گئے ہوں تو مرہم کافوری لگائیں۔
تمام جسم اور دانوں پر یہ سفوف چھڑکیں۔
گل قہولیا 25 گرام، کافور ایک گرام، زرد چوب 3 گرام — تمام دواؤں کو
باریک پیس کر چھڑکیں۔



حمیراء *

اس مرض میں سطح جلد پر سرخ، بیضوی یا گول شکل کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات جسمانی درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ملاحظہ رہے کہ اس بیماری کی علامات حمراء (سرخبادہ) اور حبہ (خسرہ) سے ملتی جلتی ہیں، وہابی مرض ہوتے ہوئے بھی پھیلنے میں شدت نہیں ہوتی۔

اسباب

حمراء/حبہ کے اسباب

علامات

ابتدا میں خفیف زلہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی کسی علامت کے رونما ہوئے بغیر سارے جسم پر عام طور سے اور چہرہ، کلائی، اور پیروں پر خاص طور سے سرخ، بیضوی یا گول شکل کے دانے نکل آتے ہیں، جو سطح جلد سے کسی قدر بلند ہوتے ہیں۔ ان میں

* حمراء کی تصفیر ہے۔

عرق گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں۔

کھانسی آرہی ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

مغز بادام، کتیرا، ہر ایک 2 گرام، مغز تخم کدو 4 گرام، لعاب بہدانہ 5 گرام — حسب دستور شیرہ حاصل کر کے نبات سفید سے شیریں کریں اور لعوق بنا کر استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدابیر بروئے کار لائیں:

مناسب دوائیں پانی میں جوش دے کر بھپا رہ کریں۔

صندل سفید، برگ مور و کی دھونی دیں — موسم گرما میں از حد مفید ہے اور موسم سرما میں انار/انجیر/جھاڑ کی لکڑی جلائیں۔



کالا آزار *

KALA AZAR

اس مرض میں ایک مخصوص طفیلی کے جسم میں اثر انداز ہو جانے کی وجہ سے بے قاعدہ طور پر خفیف بخار ہوتا ہے، خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز جگر اور طحال بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ اطباء قدیم کا خیال ہے کہ اس میں غلط سوداوی میں جوش اور نلیاں پیدا ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس جوش و غلیان کی وجہ سے اس مخصوص طفیلی کی سرایت ہو۔ یہ مرض گرم ممالک اور ساحلی علاقوں میں کثیر الوقوع ہے۔ موسم سرما اور 20-2 سال کی عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اسباب

(۱) لیس میڈیا ڈونووانی^۱ (Leishmania Donovanii) نامی طفیلی۔ یہ طفیلی سینڈ فلائی (Sandfly) کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ اس کی شکل جو، کی سی، لمبائی 4 مائیکرو

• حی اسود، اس کا طبی نام تجویز کیا جاسکتا ہے۔

۱ ڈاکٹر لیش مین نے 1903 میں اس طفیلی کو دریافت کیا تھا اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

میٹر اور چوڑائی / عرض 2-1 مائیکرو میٹر ہوتا ہے۔ سینڈ فلائی جب کسی صحت مند شخص کو کاٹتی ہے تو یہ طفیلی اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد تمام احشا، خاص طور سے طحال (تلی) کے کیسوں، ہڈی کے گودے (رخ العظام) پیچھے پھردوں کے کیسوں، غدود لمفاویہ اور جگر میں بہت زیادہ تعداد میں حملہ آور ہوتا ہے اور مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

(II) قدیم اطبا کا خیال ہے کہ مرض کی وجہ سے سوداوی غلط میں غلیان اور جوش

واقع ہوتا ہے۔

علامات

امراضیاتی نقطہ نظر سے جب طفلی احشا اور غدود لمفاویہ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی مسلسل خراش سے طحال اور جگر دونوں بڑھنے لگتے ہیں اور اس میں صلابت / رخت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہڈی کا زردی مائل گودا سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں غیر طبیعی نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، غدود لمفاویہ میں بھی غیر طبیعی عظم (بڑھاؤ) ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسم پر مخصوص طرح کے دانے بھی نکل آتے ہیں، کبھی زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ان مقامات سے رطوبات حاصل کر کے خورد بینی معائنہ کیا جائے تو یہ مخصوص طفیلی وہاں موجود ہوتا ہے۔

طفیلی کی سرایت کے 14 دن سے 18 مہینے کے بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، جس کی نوعیت عام طور سے لازمی نوعیتی ہوتی ہے۔ یہ بخار 2-4 ہفتہ تک رہتا ہے۔ اس درمیان طحال اور جگر، دونوں بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد وقفہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت ایک حال پر رہتا ہے، کچھ عرصہ بعد دوبارہ بخار چڑھتا ہے۔ بعد میں شدت میں کمی واقعی ہونے لگتی ہے اور خفیف سا بخار ہمیشہ رہتا ہے، جسم سے بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، قلت الدم کی شکایت ہوتی ہے، جلد کا رنگ میلا ہو جاتا ہے، لاغری اور ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات طحال بڑھ کر ناف تک آ جاتی ہے، لاغری کی وجہ سے بعض اوقات چہرے کا گوشت چمک جاتا ہے اور بازو کے عضلات میں ذبول پیدا ہونے لگتا ہے پسلیاں بھی تنگی ہو جاتی ہیں، جگر اور طحال کے بڑھ

جانے کی وجہ سے شکم آگے کو نکل آتا ہے۔ مزمن صورت میں پاؤں اور ٹخنے پر درم آ جاتا ہے اور شکم کی بیرونی عضلاتی دیوار پر بالائی وریدیں ابھری ہوئی، پھولی پھولی دکھائی دیتی ہیں۔ شدید صورتوں میں زیر جلد زف ہوتا ہے اور اس کے دسبے بظاہر جلد پر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ناک اور مسوڑھوں سے بھی خون بہتا ہے، لمبی ہڈیوں کے سرے پر درد ہوتا ہے۔ عام طور سے چہرے پر درم نہیں ہوتا، کبھی استقاء ہو جانے پر چہرے پر درم ہو سکتا ہے۔ پیچیدگی کے طور پر استقاء اسہال، زحیر، قروح معوی، ذات الریہ اور اس وغیرہ رونما ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آکلہ نم (گوشت خورہ دہن - Gangrenous - concurum oris/Stamotitis) بھی ہوتا ہے۔

خفیف صورتوں میں عام طور سے شفا حاصل ہو جاتی ہے لیکن جب عوارض شدید ہوں تو مرض مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔

مخصوص رطوبات جسمانی کے معائنہ سے مرض کی تشخیص میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

اصول علاج

- 0 — سوداوی غلط کافج و تنقیہ کریں۔
 - 0 — جگر اور طحال کے طبعی افعال کی نگہداشت کریں۔
 - 0 — عوارض کے تدارک / ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔
- ملاحظہ رہے کہ اس مرض میں کونین اور سم الفار کے مرکبات از حد مفید ثابت ہوتے ہیں اور تیز سہلات سے اجتناب لازمی ہے۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- ابتدا مرض میں اطباء یہ نسخہ استعمال کراتے ہیں:
- گل بنفشہ، برگ جھاڑ، برگ شاہترہ، خم کاسنی، خم خطمی، مکوشنگ، ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر

معمولی خارش بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ چھوٹے اور گھنے ہوتے ہیں تو حرا کے دانوں سے اور جب بڑے ہوتے ہیں تو حصہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تالو اور حلق کے درمیانی سوراخ (Fauces) پر دموی احتلا یا سرخ دھبے/دھاریاں نمودار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوزتین بھی متورم ہو جاتے ہیں، آنکھیں سرخ، خفیف کھانسی وغیرہ آتی ہے، گردن کے پچھلے حصہ کی گلیاں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ 2-3 دن میں علامات زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بالکل رونما نہیں ہوتی بلکہ معمولی حرارت اور اعضاء شکنی ہوتی ہے۔

تفریقی علامات

حصہ	حمیرا
1- مرض کی مخصوص علامات رونما ہونے سے قبل کا عرصہ (تمہیدی عرصہ) طویل ہوتا ہے۔	1- مرض کی مخصوص علامات رونما ہونے سے قبل کا عرصہ (تمہیدی عرصہ) مختصر ہوتا ہے۔
2- بخار اور نزلہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔	2- نزلہ اور بخار خفیف ہوتا ہے۔
3- دانوں کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔	3- دانوں کا رنگ ہلکا ہوتا ہے۔
4- اجتماعی رقبہ بناتے ہیں۔	4- اجتماعی رقبے نہیں بناتے۔
5- فرق کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔	5- تیزی کے ساتھ سارے بدن میں پھیلتے ہیں اور ابتدا چرے سے ہوتی ہے۔
6- دانوں سے بھوس جھڑتی ہے۔	6- دانوں/دھبوں سے بھوس نہیں جھڑتی۔

اصول علاج

- 0 — قوی طبعی میں ضعف و اضمحلال نہ آنے دیں/مفرحات و مقویات قلب استعمال کرائیں۔

0 — رفع قبض کریں۔

0 — حسب ضرورت تسکین حرارت کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

عناّب 4 عدد، مویز منقّی 6 عدد۔ دونوں کو تھوڑے پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور خاکسی 4 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔ ابتدا مرض میں مفید ہے۔

یہ نسخہ بھی دے سکتے ہیں:

عناّب 5 عدد، مویز منقّی 9 عدد، انجیر زرد 2 عدد، خاکسی 5 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 25 گرام / شربت عناّب 25 ملی لیٹر سے شیریں کر کے صبح، شام نوش کرائیں۔

داغے نکلنے لگیں تو دو، تین دن یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

خمیرہ مروارید 5 گرام کلا کر شیرہ عناّب 5 عدد، شیرہ مویز منقّی 9 عدد، عرق مکو 75 ملی لیٹر میں نکال کر نبات سفید 12 گرام ملا کر خاکسی 5 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

قبض ہو تو یہ نسخے استعمال کرائیں:

شربت بنفشہ 25 ملی لیٹر نیم گرم کر کے نوش کرائیں۔

بنفشہ، نیلوفر، ہر ایک 6 گرام سپٹاں 9 عدد، عناّب 5 عدد — تمام دواؤں کو آتش

جو میں جوش دے کر مل چھان لیں اور نوش کرائیں۔

اگر اسہال آرہے ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

قرص طباشیر قابض 3 گرام ہمراہ شربت انار استعمال کرائیں۔ قرص کا نسخہ

درج ذیل ہے۔

طباشیر، گل سرخ، تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم کاسنی، سماق، ہر ایک 6 گرام، گھٹا، صندل

سفید، تخم حماض، ہر ایک 3 گرام، انیسون 1.5 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر

عرق گلاب میں گوندھ کر قرص بنائیں۔

کھانسی آرہی ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

مغز بادام، کثیرا، ہر ایک 2 گرام، مغز تخم کدو 4 گرام، لعاب بہدانہ 5 گرام۔ حسب دستور شیرہ حاصل کر کے نبات سفید سے شیریں کریں اور لعوق بنا کر استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ تدابیر بروئے کار لائیں:

مناسب دوائیں پانی میں جوش دے کر بھپارہ کریں۔

صندل سفید، برگ مورود کی دھونی دیں۔ موسم گرما میں از حد مفید ہے اور موسم سرما میں اتار/انجیر/جھاڑ کی لکڑی جلانیں۔



Learn Unani By Abul Waseem

کالا آزار *

KALA AZAR

اس مرض میں ایک مخصوص طفیلی کے جسم میں اثر انداز ہو جانے کی وجہ سے بے قاعدہ طور پر خفیف بخار ہوتا ہے، خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز جگر اور طحال بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ اعلیٰ قدیم کا خیال ہے کہ اس میں خلط سوداوی میں جوش اور غلیان پیدا ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس جوش و غلیان کی وجہ سے اس مخصوص طفیلی کی سرایت ہو۔ یہ مرض گرم ممالک اور ساحلی علاقوں میں کثیر الوقوع ہے۔ موسم سرما اور 20-2 سال کی عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اسباب

(۱) لیس میڈیا ڈونووانی^۱ (Leishmania Donovanii) نامی طفیلی۔ یہ طفیلی سینڈ فلائی (Sandfly) کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ اس کی شکل جو، کی سی، لمبائی 4 مائیکرو

* حی اسود، اس کا طبی نام تجویز کیا جاسکتا ہے۔

۱ ڈاکٹر لیش مین نے 1903 میں اس طفیلی کو دریافت کیا تھا اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

میٹر اور چوڑائی / عرض 2-1 مائیکرو میٹر ہوتا ہے۔ سینڈ فلائی جب کسی صحت مند شخص کو کاٹتی ہے تو یہ طفیلی اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد تمام احشا، خاص طور سے طحال (تلی) کے کیسوں، ہڈی کے گودے (رخ العظام) پھیپھڑوں کے کیسوں، غدود لفاویہ اور جگر میں بہت زیادہ تعداد میں حملہ آور ہوتا ہے اور مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔

(II) قدیم اطبا کا خیال ہے کہ مرض کی وجہ سے سوداوی خلط میں غلیان اور جوش واقع ہوتا ہے۔

علامات

امراضیاتی نقطہ نظر سے جب طفیلی احشا اور غدود لفاویہ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی مسلسل خراش سے طحال اور جگر دونوں بڑھنے لگتے ہیں اور اس میں صلابت / رخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہڈی کا زردی مائل گودا سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں غیر طبعی نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، غدود لفاویہ میں بھی غیر طبعی عظم (بڑھاؤ) ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسم پر مخصوص طرح کے دانے بھی نکل آتے ہیں، کبھی زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال ان مقامات سے رطوبات حاصل کر کے خوردبینی معائنہ کیا جائے تو یہ مخصوص طفیلی وہاں موجود ہوتا ہے۔

طفیلی کی سرایت کے 14 دن سے 18 مہینے کے بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، جس کی نوعیت عام طور سے لازمی نوعی ہوتی ہے۔ یہ بخار 2-4 ہفتہ تک رہتا ہے۔ اس درمیان طحال اور جگر، دونوں بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد وقفہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت ایک حال پر رہتا ہے، کچھ عرصہ بعد دوبارہ بخار چڑھتا ہے۔ بعد میں شدت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور خفیف سا بخار ہمیشہ رہتا ہے، جسم سے بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، قلت الدم کی شکایت ہوتی ہے، جلد کا رنگ میالا ہو جاتا ہے، لاغری اور ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات طحال بڑھ کر ناف تک آ جاتی ہے، لاغری کی وجہ سے بعض اوقات چہرے کا گوشت چمک جاتا ہے اور بازو کے عضلات میں ذبول پیدا ہونے لگتا ہے پسلیاں بھی تنگی ہو جاتی ہیں، جگر اور طحال کے بڑھ

جانے کی وجہ سے شکم آگے کو نکل آتا ہے۔ مریض صورت میں پاؤں اور ٹخنے پر درم آ جاتا ہے اور شکم کی بیرونی عضلاتی دیوار پر بالائی دریہ میں ابھری ہوئی، پھولی پھولی دکھائی دیتی ہیں۔ شدید صورتوں میں زیر جلد زخف ہوتا ہے اور اس کے دھبے بظاہر جلد پر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ناک اور مسوڑھوں سے بھی خون بہتا ہے، لمبی ہڈیوں کے سرے پر درد ہوتا ہے، عام طور سے چہرے پر درم نہیں ہوتا، کبھی استسقاء ہو جانے پر چہرے پر درم ہو سکتا ہے۔ پیچیدگی کے طور پر استسقاء اسہال، زحیر، قروح معوی، ذات الریہ اور سس وغیرہ رونما ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آکلہ نم (گوشت خورہ دہن - Gangrenous - concurum oris/Stamotitis بھی ہوتا ہے۔

خفیف صورتوں میں عام طور سے شفا حاصل ہو جاتی ہے لیکن جب عوارض شدید ہوں تو مرض مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔

مخصوص رطوبات جسمانی کے معائنہ سے مرض کی تشخیص میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

اصول علاج

- 0 — سوداوی خلط کا نفع و تنقیہ کریں۔
 - 0 — جگر اور طحال کے طبعی افعال کی نگہداشت کریں۔
 - 0 — عوارض کے مدارک / ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔
- ملاحظہ رہے کہ اس مرض میں کونین اور سم الفار کے مرکبات از حد مفید ثابت ہوتے ہیں اور تیز مسہلات سے اجتناب لازمی ہے۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:
- ابتدا مرض میں اطباء یہ نسخہ استعمال کراتے ہیں:
- گل بنفشہ، برگ جھاڑ، برگ شاہترہ، خم کاسنی، خم عطلی، کو خشک، ہر ایک 6 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر

شریت بزوری 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ اگر معمولی حرارت بھی رہتی ہو تو تخم مٹھی اور گل
بخشہ کی بجائے تخم سنبلالو، آفسٹین روی، ہر ایک 3 گرام، انجیر زرد 3 عدد ملائیں۔
اگر بخار کے ساتھ اسہال کی شکایت ہو نیز استثنائی علامات بھی پائی جا رہی ہوں
تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

باد آور 3 گرام، شکائی 3.5 گرام، تخم کاسنی، بخ کاسنی، تخم خربزہ، خار خشک خورد،
ہر ایک 5 گرام، تخم کشوت (پوٹلی میں باندھ کر) گل عافیت، ہر ایک 3 گرام — تمام
دواؤں کو آب آہن تاب میں بھگو کر صاف کر کے پارنگٹ 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
عام طور سے اول الذکر نسخہ استعمال کرانے کے بعد حقیقہ غلط موثر پر توجہ دیں۔
سوداوی غلط کے نفع و حقیقہ کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں:

شاہرہ بادرنجبویہ، بادیان، ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان، اصل السوس، مقشر، ہر ایک
5 گرام، عتاب 5 عدد، سپتال 9 عدد — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو
دیں اور صبح کو ل چھان کر گلتھ 25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ جب نفع کے آثار نمایاں
ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

ایارن فیکر 3 گرام، لاجورد منقول، عاریقون، ماش سفید، گوگل، ترب سفید مدبر،
کتیرا پوست ہلیلہ زرد — ہر ایک 4 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام
شیریں 75 ملی لیٹر میں چب کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 7-9 گرام، ورق نقرہ
3 عدد میں لپیٹ کر رات کے درمیانی حصہ میں گرم پانی سے نکلنے کی ہدایت کریں۔ صبح کو
شیر خشک، گلتھ آفتابی، ہر ایک 40 گرام، مغز فوس خیار صفر 60 گرام، کو آب برگ کاسنی
سبز مرق، آب بادیان، سبز مرق، ہر ایک 200 ملی لیٹر میں ملا کر چھان لیں اور روغن بادام
شیریں 4 ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں۔ اور اس کے بعد مہر دواؤں استعمال کرائیں۔
حقیقہ سودا کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

افتیون ولایتی (پوٹلی میں باندھ کر) سفاح فستقی، گل سرخ، تخم خیارین، تخم کاسنی،
ہر ایک 30 گرام، برگ گاؤ زبان 9 گرام، گل نیلوفر 6 گرام، آلو بخارا 50 عدد — تمام

دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر صاف کریں اور سرکہ 120 ملی لیٹر، نبات سفید 500 گرام ملا کر شربت بنائیں اور 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

اس مرض میں درج ذیل نسخہ بے حد مفید ہے:

سم الفار سفید 125 گرام، کونین، نوشادر، مغز تخم کرنجہ، قلعہ سیاہ، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیش کر آب لیہوں میں کھل کر کے 125 ملی گرام کی گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں درج ذیل عرق کے ساتھ استعمال کرائیں۔

بادیان، بخ بادیان، بودینہ، پوست بخ کبر، انیسون، تخم کاسی، پوست بخ کاسی، گل غافث، افستین روی، تخم کرفس، بخ کرفس، ہر ایک 75 گرام، تخم کشوت (پوٹی میں باندھ کر) پر سیاوشاں، سنبل الطیب، اسارون، ریوند چینی، مائیں خورد، ہر ایک 60 گرام، مویز منقی 120 گرام، برگ جھاؤ ایک کلو گرام، سرکہ انگوری 500 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو 10 لیٹر پانی میں بھگو دیں 24 گھنٹے بعد 6 لیٹر عرق کشید کریں اور 85 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

یہ نسخے بھی مفید ہیں:

عرق کاسی، عرق مکو، عرق شاہترہ، ہر ایک 50 ملی لیٹر، شربت بزروی 25 ملی لیٹر۔ تمام عرقیات کو باہم ملا کر شربت حل کر کے نوش کرائیں۔

آب برگ کرنجہ سبز مرق، آب مکو سبز مرق، آب کاسی سبز مرق، ہر ایک 50 ملی لیٹر۔ تمام دواؤں کو ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔

تخم کاسی، شاہترہ، مکوشک، برگ جھاؤ، کشیز خشک، گل نیلوفر، ہر ایک 6 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر صبح، شام نوش کرائیں۔

جگر بڑھ جائے تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

بادیان 6.5 گرام، افستین 3 گرام، بھانج فستقی، تخم کشوت (پوٹی میں باندھ کر) گل غافث، ہر ایک 5 گرام، مکوشک، تخم کاسی، ہر ایک 6 گرام، برگ گاؤ زبان 4 گرام، مویز منقی 9 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور شربت دیا، 25 ملی لیٹر حل کر نوش کرائیں۔ غذا کے بعد یہ نسخہ

استعمال کرائیں۔

نوٹاورد، نمک، سندری صاف کردہ، نمک سیاہ، نمک لاہوری، سہاگہ بریان، نرہجور، ہلیہ سیاہ، پوست ہلیہ کاہلی، باؤ بونگ، قفل سیاہ، زنجیل، ہر ایک 50 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں کھل کریں اس کے بعد پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 2-4 گولیاں کھلائیں۔

گل سرخ 25 گرام، زرشک 12 گرام، تخم خیارین، تخم خرفہ، ہر ایک 7 گرام، کافور قہوری، عصارہ انستین، زعفران، ایرس، سنبل الطیب، ریوند چینی، لک مغول، طباشیر، شمرۃ الطرفاء، ہر ایک 3 گرام، عصارہ عافث 2 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ پھان کر لعاب بہدانہ سے گوندھ کر چوٹی چوٹی گولیاں بنائیں اور 5 گرام کھلا کر اوپر سے آب کاسنی سبز مردق، آب شاہترہ سبز، ہر ایک 60 ملی لیٹر، بھین بزدی 25 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے:

چونہ سفید، سنگھیا سفید، کات سفید، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق لیموں میں گوندھ کر دانہ باجرہ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

اگر طحال بھی بڑھ گئی ہو تو یہ نسخہ سود مند ہے:

برگ جھاؤ مغز تخم کدوئے شیریں، تخم خرفہ، تخم کاسنی، تخم خربزہ، تخم قرطم، بادیان، تخم سنبھالو، ہر ایک 12 گرام، سنبل الطیب، گل بنفشہ، اصل السوس، تخم حطی، انستین رومی، گل عافث پوست بخ کاسنی، کرمازج، ہر ایک 7 گرام، سویز منقی 25 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دے کر مل چھان کر رکھیں اور قد سیاہ 50 گرام، سرکہ جاسن 175 ملی لیٹر، آب مکہ سبز 180 ملی لیٹر، آب کاسنی سبز مردق 60 ملی لیٹر ملا کر حسب دستور شربت بنائیں اور 25 ملی لیٹر، صبح شام نوش کرائیں۔

سوء التقلیہ کے ساتھ چہرے اور اطراف پر جھج ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں:

دواء الکرم 5 گرام کھلائیں اس کے بعد شیرہ بادیان، شیرہ تخم کاسنی، ہر ایک

6 گرام، شیرہ تخم کشوث 3 گرام، عرق کمو، عرق بادیان، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت کو دینار 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ دواء الکرم کا نسخہ درج ذیل ہے۔

اسارون، انیسون، تخم کرفس، ریوند چینی، دوق، مرکبی، ہر ایک 15 گرام، رب السوس جج قلمی، مصطکی رومی، گل غافث، ہر ایک 10.5 گرام، قوہ 7 گرام، قسط شیریں، گل اذخر، حب بلساں، ہر ایک 3.5 گرام، زعفران 40 گرام، سنبل الطیب، 19 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر روغن بلساں 18 لٹھ لیٹر میں حب کر کے تمام دواؤں کو کی تین گنا شکر کے قوام میں ملائیں اور 5-7 گرام استعمال کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر اختیار کریں:

ناسک 12 گرام سرکہ میں حل کر کے پودینہ خشک، برگ سداب، ہر ایک 6 گرام، آب مگوہنہز میں پیس کر روغن گل 6 ملی لیٹر ملا کر مقام جگر و طحال پر لپ کر لیں۔ برگ جھاؤ سبز پیس کر مقام جگر و طحال پر حناد کریں۔




Learn Unani By Abdulhussain Sami

طاعون

PLAGUE

اس مرض میں جسمانی درجہ حرارت میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے بعض غدود میں غیر معمولی درم اور شدید سوزش و حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ یہ شدید متعدی وبائی مرض ہے، اور نہایت تیزی کے ساتھ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ چوہے و پسو کی پیدائش اور افزائش کے ایام میں وبائی طور پر پھیل سکتا ہے۔

اقسام



اسباب

بے سیلی پیسٹریلا پستس (Bacilli Pasteurella Pestis) نامی گرامی منفی جراثیم — یہ جراثیم جو ہوں کا خون چوسنے اور ان کے بالوں میں چبے رہنے والے زی نوپ سلاچیو پستس (Enopsylla Cheopis) نامی پیوویں / یا پیوویں کی اور دوسری اقسام کے ذریعہ پھیلتا ہے، جس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ سرایت زدہ جو ہے کا خون چوسنے کے بعد جب یہ پیو کی صحت مند انسان کو کاٹنے ہیں تو اس کا مخصوص جراثیم عروق لفاویہ کے ذریعہ دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے اور انتشار جراثیمی پیدا کرتا ہے نیز کچھ ران (Femoral) بغل (Axillary) اور گردن کے غدود میں التهاب ہو جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ یہ جراثیم 1.5-2 مائیکرومی لیٹر لمبا 0.5-0.6 مائیکرومی لیٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس کے کنارے گول اور رنگے پر دونوں کنارے رنگ قبول کر لیتے ہیں۔ تاہم درمیان کا حصہ رنگ قبول نہیں کرتا۔ یہ کم دیش 85 درجہ سینٹی گریڈ حرارت میں 60 منٹ کے اندر مر جاتا ہے، تیز دھوپ میں 3-4 گھنٹے میں اور خشک ہونے پر 6-8 دن میں مر جاتا ہے، سردی کا ماحول اس کو بہت راس آتا ہے اور اس میں دیر تک زندہ رہتا ہے۔

ان جراثیم کے پھیلنے کی نوعیت یہ ہے کہ سرایت زدہ جو ہے جب جراثیمی سمیت سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو سرایت زدہ پیوان کا خون چوسنے میں ناکام رہتے ہیں اور غذا کی تلاش میں ان کے بالوں سے نکل کر قریبی جگہوں مثلاً کپڑے، بستر، صندوق، کتاب اور دوسرے استعمال کے سامان میں چلے جاتے ہیں اور جب ایک صحت مند انسان ان چیزوں کو چھوتا / استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم پر چڑھ جاتے ہیں اور خراش پیدا کر کے ان جراثیموں کو انسان کے خون میں منتقل کر دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض اوقات طاعون کے وہ مریض جن کے پیچھے پڑے اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں ان کے تنفس میں بھی یہ جراثیم پائے جاسکتے ہیں، بلغم اور تھوک میں یہ جراثیم زیادہ تعداد میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

علامات

3-5 دن میں مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں، بعض اوقات 10 دن بھی لگ سکتا ہے۔ ذیل میں ہر نوع کی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

(الف) طاعون خفیف:

اس میں مرض کی علامات بہت خفیف ہوتی ہیں اور اکثر اوقات دو ایک علامتوں کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں ملتی۔ یہ نوع عام طور سے طاعون پھیلنے کی بالکل ابتدا یا بالکل آخر میں پیش آتی ہیں۔ بہر حال مرض کی واضح علامات رونما نہ ہونے کی وجہ سے مریض خود بھی کسل مندی اور اضمحلال کے علاوہ کوئی دوسری شکایت نہیں کرتا اور عام طور سے اپنے روز مرہ کے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، تاہم بغل، کنبہ ران وغیرہ کے غدود میں سوجن ضرور ہوتی ہے، جس کو مریض معمولی خیال کرتا ہے اور یہ سوجن ہفتہ عشرہ (10-7 دن) میں از خود تحلیل ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات سوجن میں پیپ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی معمولی بخار بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہلاکت نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایسے مریض مرض کے تعدیہ میں بہت اہم اور موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو علاحدہ رکھنا از بس ضروری ہے۔

(ب) طاعون شدید / حاد:

(۱) طاعون غدوی:

سرايت کے 3-5 دن میں ہی مرض کی مخصوص علامات رونما ہونے لگتی ہیں، ابتدا میں عام جسمانی کمزوری، ٹکان، درد سر، درد کمر اور اضطراب محسوس ہوتا ہے۔ تھوڑی سردی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد شدید جاڑے کے ساتھ اصل علامات رونما ہوتی ہیں اور جسمانی درجہ حرارت 103-104 تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات درجہ حرارت 106-107 ف تک بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہڈیاں اور بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ بہر حال بھوک زائل ہو جاتی ہے۔ شدید پیاس لگتی ہے، مٹی اور تے کی شکایت

ہوتی ہے۔ نبض سرچ 120-140 فی منٹ چلتی ہے نفس میں بھی سرعت ہوتی ہے، آنکھیں
مخمور، زردی مائل ہوتی ہیں۔ ان کے گرد جلتے پڑ جاتے ہیں اور ٹنگی بندھ کر دیکھنے جیسی ہوتی
ہیں، چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، پنہرہ متفکر اور دماغی قوتوں میں خلل نمایاں ہوتا ہے۔
بعض اوقات مریض کو ہاتھ پیر مارنے اور بے فائدہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی بے اختیار
خواہش ہوتی ہے، کبھی کبھی درجہ حرارت دوسرے دن کم ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن کے اندر
ہی غدد میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، ان میں شدید درد اور سوزش ہوتی ہے۔ 1-2 دن میں
ہی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، بدیں نکل آنے کے بعد درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ غدد
میں گھلاوٹ پیدا ہو کر خلیات میں مقامی موت رونما ہوتی ہے، ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔

بعض اوقات احتباس بول کی شکایت ہوتی ہے اور کبھی مقعد، ناک اور منہ سے
خون جاری ہو جاتا ہے اور کبھی جلد کے نیچے خون کے دھبے رونما ہونے لگتے ہیں جن سے جسم
کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، پیشاب میں رطوبت بیشیہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیسہ مخاطیہ
کے تھلکے بھی پائے جاتے ہیں، بخار تیز ہونے کی حالت میں اگر خون کا خورد بینی معائنہ کیا
جائے تو مخصوص طاعونی جراثیم دکھائی دیتے ہیں، خون کے سفید دانوں (W.B.C.) کی
تعداد زیادہ ہوتی ہے، نفس بھی خاص نوعیت کا آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ انجام خراب ہونے
پر آئے تو دماغی و اعصابی علامات شدید ہوتی ہیں، ہڈیاں و کوما کے بعد موت واقع ہو جاتی
ہے۔ لیکن اگر طبیعت، مرض پر غالب آجائے تو زبان کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے، جسمانی
درجہ حرارت اعتدال پر آنے لگتا ہے اعصابی/ دماغی علامات ختم ہو جاتی ہیں، گلیوں میں
پیپ پڑ کر خود بخود پھٹ جاتی ہیں اور ان سے سخت ناگوار بو پیدا ہوتی ہے اور مریض رفتہ رفتہ
صحت یاب ہو جاتا ہے۔

60-70 فیصد غدد کینچ ران میں بدیں نکلتی ہیں، 15-20 فیصد بغل میں اور
5-15 فیصد گردن میں، شاذ و نادر طور پر شکم کی غدد جاذبہ (غدد ماساریقی) میں بدیں نکلتی
ہیں، گلیوں کا متورم ہو کر پیپ پڑ کے پھوٹ جانا اچھی علامت تصور کیا جاتا ہے۔

(II) طاعونی عفنی:

اس کی علامات شدید ہوتی ہیں اور مادہ مرض کسی غدود (Gland) یا کسی خاص حصہ جسم تک محدود نہیں ہوتا اور آنا کا ناموت ہو جاتی ہے۔ اس میں عام طور سے غدود میں بدیں پیدا نہیں ہوتیں اور بالفرض ہوتی بھی ہیں تو بہت چھوٹی اور ردی قسم کی، دوسری علامتیں بھی شدید ہوتی ہیں۔ چنانچہ درد سر، دوران سر، بے خوابی، ہڈیان اور بے ہوشی وغیرہ ہوتی ہے، تے اور خون آمیز اسہال بھی آسکتے ہیں، تمام خون میں طاعون کے جراثیم دوڑتے پھرتے ہیں، جلد/غشا مخاطی کے نیچے عام طور سے جریان خون ہوتا ہے اور 24-36 گھنٹے میں مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

(III) طاعون نیونیائی / ریوی:

اس صورت میں تعدیہ کا مرکز ریہ (پھیپھڑہ) ہوتا ہے اور مرض تنفس کے ذریعہ پھیلتا ہے، مریض کے تھوک اور بلغم میں طاعونی جراثیم موجود ہوتے ہیں، حملہ مرض سے پہلے ریہ کے مزمن امراض کی سرگذشت ملتی ہے جو اس مرض کی قبولیت کی استعداد میں اضافہ کر دیتی ہے، اس میں عوارض/علامات نہایت خطرناک اور شدید ہوتی ہیں، پھیپھڑہ متعدد جگہوں پر ٹھوس ہو جاتا ہے، اس کا درمیانی حصہ زیادہ تر جملائے مرض ہوتا ہے اور مسامع الصدر کے ذریعہ سننے پر بالوں کی رگڑ جیسی آواز سنائی دیتی ہے، تنفس میں سرعت ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، ہڈیان ہوتا ہے، پہلے خشک کھانسی آتی ہے اس کے بعد خون آمیز بلغم خارج ہوتا ہے، سینہ میں درد محسوس ہوتا ہے تنفس میں دشواری ہوتی ہے، شدید ضعف اور نفاہت ہوتی ہے، غدود کچ ران، بغل وغیرہ کو ٹٹولنے پر محسوس ہوتا ہے تاہم سو جن بالکل نہیں ہوتی۔ عام طور سے 2-3 دن میں موت واقع ہو جاتی ہے، شفا یابی کا تناسب 2 فیصد سے بھی کم ہوتا ہے۔

تفریقی علامات

التهاب غده نكفیه Parotitis/Mumps	طاعون Plague
1- التهاب غده ابتدائی اور اصل مرض ہوتا ہے۔	1- غده نكفیه کا التهاب ثانوی طور پر رونما ہوتا ہے۔
2- تنقح عام طور سے نہیں ہوتا۔	2- غده نكفیه میں تنقح ہو جاتا ہے۔
3- خصبوں میں بھی التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔	3- خصبوں میں التهاب نہیں ہوتا۔
4- ہڈیان کم ہوتا ہے۔	4- ہڈیان شدید ہوتا ہے۔
5- یہ جرثومہ نہیں پایا جاتا۔	5- مخصوص جرثومہ طاعون پایا جاتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — اصل سبب مرض کا ازالہ کریں/چوہوں اور پھوس کے ختم کرنے کا انتظام کریں۔
- 0 — مرض کے ابتدائی مرحلے سے ہی مقویات قلب استعمال کریں۔
- 0 — سمجھات سے پرہیز کرائیں۔
- 0 — آرام کی تاکید کریں اور مریض کو علاحدہ، بلند مقام پر قیام کرنے کی تاکید کریں۔
- 0 — عوارض کے ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے بردے کار لائیں:
- دروغ عطری، گل ارغی، جدوار خطائی، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک 6 گرام، قاذر ہر حیوانی، جو ہر لیونی، تھر ہندی، کافور، ہر ایک 12 گرام، زعفران 3 گرام، آب نیم 12

لی لیٹر — تمام دواؤں کو آب نیم میں پیس کر عرق گلاب میں گوندھ لیں اور ناش کے بقدر گولیاں بنا کر ایک گولی ہمراہ عرق صندل صبح، شام استعمال کرائیں۔

جدوار، گیرو، برادہ صندل سفید، زہر مہرہ خطائی، زرد چوب، کیور کچری، کھریا مٹی، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو عرق گلاب میں گھس کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی کھلائیں (بعض اطباء گولی کو گھس کر لیپ کراتے ہیں)

جدوار خطائی، کافور، درونج عقری، گل ارمنی، ہر ایک 12 گرام، زعفران 7 گرام — تمام دواؤں کو آب برگ نیم میں پیس کر مسور کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 2-3 گولیاں ہمراہ عرق صندل استعمال کرائیں۔

زعفران، مرکی، کافور، صبر زرد، ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہر تین گھنٹے پر کھلائیں۔
ابریشم خام، عصارہ ریوند چینی، زہر مہرہ، کافور، کھریا مٹی، گل سرخ یشب سبز، بہن سفید، درونج عقری، ہر ایک 12 گرام، زعفران 6 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ لیں اور پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہر چوتھے گھنٹے پر استعمال کرائیں۔
جدوار خطائی، گل ارمنی، ہر ایک 6 گرام، کافور 10.5 گرام، تخم لیموں کاغذی، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک 6.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق نیلوفر، میں کھل کر کریں اور پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہمراہ عرق نیلوفر، عرق گاؤ زبان ہر ایک 60 لی لیٹر، شربت انار میخوش 35 لی لیٹر، صبح، دوپہر، شام استعمال کرائیں۔

خود سفید، قاذر ہر حیوانی، نارنیل دریائی، پوست تنج مدار، ہر ایک 10 گرام — تمام دواؤں کو عرق پیاز میں پیس کر دانہ ناش کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی 2 گھنٹے کے وقفے سے کھلائیں (بعض اطباء گولیوں کو آب پیاز سفید میں گھس کر غده (گٹھی) پر ضاد بھی کراتے ہیں۔

گل گاؤ زبان، برگ گاؤ زبان، کوہ ابریشم مقترض، ہر ایک 4 گرام، تبرہندی 35 گرام، آلو بخارا 5 عدد — تمام دواؤں کو عرق نیلوفر، عرق بید سادہ، ہر ایک 60 لی لیٹر،

عرق کیوڑہ 25 ملی لیٹر میں بھگو کر 12 گھنٹے بعد مل چھان لیں اور شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر ملا کر طباشیر کبود، زہر مہرہ خطائی (ہر ایک کردہ) ہر ایک 1 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

گل نیم، چراستہ، شاہترہ، ہر ایک 10 گرام۔ تمام دواؤں کو الگ الگ بھگو دیں۔ صبح کو چراستہ، شاہترہ کا زلال لے کر گل نیم تر شدہ میں چیں کر ملائیں اور جوش دیں۔ جب خشک ہونے لگے تو زعفران ایک گرام، جدوار 3 گرام چیں کر ملائیں اور پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں صبح و شام کھلائیں۔

جدوار خطائی، درونج عقرلی، زچکور، بہمن سفید، ہر ایک 6 گرام، صندل سرخ، گل ازنی، گل خنوم، زراوند حرج، طباشیر، حب بلساں، دارچینی، جلیبیانا، ہر ایک 4 گرام، یشب سبز، یاقوت سبز، مروارید ناسفہ، زہر مہرہ، زعفران، ہر ایک 3 گرام، مخمر اعجب 1 گرام، ورق طلا 1.5 گرام، ورق نقرہ 3.5 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق بید مشک، عرق گلاب میں خوب چیں کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں ہمراہ عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، ہر ایک 75 ملی لیٹر، صبح و شام استعمال کرائیں۔

عقیق سرخ، مرجان، زہر مہرہ، ہر ایک 12 گرام، درونج عقرلی، جدوار خطائی، یاقوت، کافور، ہر ایک 6 گرام، مروارید ناسفہ، ورق نقرہ، ورق طلا، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق گلاب میں کھل کر کے پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں ہر چھ گھنٹے استعمال کرائیں۔

ختم خرفہ سیاہ، گل نیلوفر، زرنک منقی، ہر ایک 6 گرام، مغز کنول مکہ 7 عدد، آلو بخارا 5 عدد، تر ہندی 35 گرام۔ تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق نیلوفر، عرق بید مشک، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں بھگو دیں اور شربت لیموں 25 ملی لیٹر ملا کر زہر مہرہ، طباشیر، ہر ایک 2 گرام چیں کر شامل کریں پھر مل چھان کر برف سے سرد کر کے تھوڑا تھوڑا نوش کرائیں۔ حسب ضرورت آب انگور، آب انار شیریں، آب سیب شیریں ہر ایک 25 ملی لیٹر کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

کافور 12 گرام کو ہر ایک کر کے 6 گرام عرق مغرغ کے ساتھ نوش کرائیں۔

کرب و اضطراب میں بھی مفید ہے۔

کھیرائے شمع، یشب سبز، صندل سفید، مروارید ناسفت، دانہ بیل، یا قوت احمر، گل گاؤ زبان، ہر ایک 6 گرام، برگ گاؤ زبان، طباشیر کیوں، شیرہ آملہ، زہر مہرہ خطائی، ابریشم مقرض، گل سیوتی، ہر ایک 9 گرام، زرشک متقی 12 گرام، مرہ آملہ 9 گرام، آب سیب 35 ملی لیٹر، شربت آلو بخارا 250 ملی لیٹر، ورق طلا 3 گرام، ورق نقرہ 12 گرام، کافور قیصری 1.5 گرام، نبات سفید چار گنا جملہ ادویہ — حسب دستور معجون تیار کریں اور 3-1 گرام استعمال کرائیں۔ مقوی قلب اور مفرح بھی ہے۔

کبریت مصفی، مرکی، جدوار خطائی، پیپتہ کلاں، کافور، زعفران، ہر ایک 12 گرام، مغز تخم نیم، صبر زرد، ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو عرق گلاب میں پیس کر دانہ مٹر کے برابر گولیاں بنائیں اور ہر تیسرے گھنٹے 2 گولیاں ہمراہ عرق نیم استعمال کرائیں۔
منفک 3 گرام، دانہ بیل خورد، مغز اھلب، کافور، مروارید ناسفت، ہر ایک 6 گرام، طباشیر، ابریشم مقرض، بہمن سفید، ہر ایک 12 گرام، گل سرخ، گل گاؤ زبان، کشیز خشک مقشر، ہر ایک 25 گرام، مغز تخم کاہو 40 گرام، تخم خیاریں 60 گرام، صندل سفید 120 گرام — تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر تین گنا نبات سفید کے قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور آخر میں ورق نقرہ 35 گرام ملائیں اور 5 گرام کھلائیں۔ مفرح بھی ہے۔
0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / نسخے بروئے کار لائیں:

فلقل سیاہ، جدوار بنفسی، ہموزن کو پانی میں پیس کر مناد کریں۔

زرنباہ، خردل، گل ارمنی، گل مختوم، جدوار، ہر ایک 12 گرام، صندل سرخ، صندل سفید، ہر ایک 25 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سرکہ میں پیس کر گولیاں بنائیں اور خشک کر لیں، ضرورت پڑنے پر ایک گولی سرکہ میں گھس کر مناد کریں۔

خردل 12 گرام، گل ارمنی، گل مختوم، جدوار خطائی، زرنباہ، ہر ایک 6 گرام، زرد چوب بغیر بجھا چوٹا، جدوار خطائی ہر ایک 3 گرام، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک 4.5 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ میں ملائیں اور گھٹیوں میں مناد کریں۔

گھیکوار کا گودا باندھیں اور تکمید کریں۔۔۔ یہ ضاد ہر 40 منٹ پر بدلنے رہیں۔

کچلہ 1 عدد، برگ نیم سبز، جدوار خطائی، درونج عقرنی، ہر ایک 3 گرام، قفل سیاہ، سم الفار، ہر ایک 1 گرام۔ تمام دواؤں کو آب برگ نیم میں پیس کر مقام درم پر ضاد کریں۔
مازو، مرکبی، جاؤ شیر، زرسنگار، ہر ایک 7 گرام، سلکچ 3.5 گرام، گندور، زراوند طویل، ہر ایک 10.5 گرام مقل ازرق، مردار سنگ، ہر ایک 6 گرام، رلتج، موم جام، ہر ایک 50 گرام، اشق 25 گرام۔ اشق، موم، جاؤ شیر، گندور، مرکبی کو روغن زیتون میں پگھلائیں اور باقی تمام دواؤں کو باریک کر کے ملا کر خوب جوش دیں۔ جب مرہم کا قوام تیار ہو جائے تو اتار کر محفوظ کر لیں، یہ محلول درم ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیقہ مواد کے لیے بھی مفید ہے۔

ہالون مقل ازرق، مین پھل، ریوند چینی، زرد چوب، تخم کناں، صبر زرد، جدوار خطائی، صابن دیسی، نمک طعام ہر ایک 3 گرام، برگ نیم سبز 6 گرام۔ تمام دواؤں کو گھیکوار کے گودے میں پیس کر نیم گرم ضاد کریں اور اوپر سے تکمید کریں۔
عوارض مثلاً بے خوابی، بے ہوشی، غفلت، شدت پیاس، درد سر اور قے وغیرہ کے ازالہ کے لیے یہ تدابیر سودمند ہیں۔

بے خوابی کے لیے یہ تدابیر بروئے کار لائیں:
روغن بنفشہ، روغن کدو تاک میں چٹائیں اور اطراف پر ملیں۔
شربت خشخاش 35 ملی لیٹر، عرق گلاب 75 ملی لیٹر میں ملا کر برف سے سرد کر کے نوش کرائیں۔

روغن خشخاش، روغن تخم کدو، ہوزن ملا کر سر پر مائل کریں۔
خشخاش، بنفشہ، نیلوفر، ہوزن کو پانی میں جوش دے کر سر پر فطول کریں۔
بے ہوشی اور غفلت کے لیے یہ تدابیر اختیار کریں:
کافور، صندل سفید، ہر ایک 12 گرام کو عرق کیوڑ، عرق بید مشک، ہر ایک 18 ملی لیٹر میں ڈال کر ایک شیشی میں محفوظ کر لیں اور خلفہ کے طور پر سونگھائیں۔
درد سر اور ہڈیاں کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

سرکہ، عرق گلاب، روغن گل میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھیں۔
عطر خش / عطر صندل / نخلہ کا فوری سونگھائیں۔

تے کی صورت میں — گل ارنی، زرنجک، کافور، ساق، صندل سفید، ہر ایک 3
گرام، عرق گلاب میں پیس کر نم معدہ پر لپ کریں۔
ضعف قلب کی صورت میں مقوی قلب دوائیں کھلانے کے بعد صندل، کافور کو
عرق گلاب میں گھس کر کپڑا بھگو کر مقام قلب پر رکھیں۔
0 — ذیل میں تحفظی تدابیر کے طور پر چند نئے درج کیے جا رہے ہیں، وہابی
ایام میں ان کا استعمال، صحت مند لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے۔
جدوار خطائی 250 ملی گرام، کافور 125 ملی گرام عرق لیموں / سرکہ میں پیس کر
نوش کرائیں۔

مہر زرد، 12 گرام، مرکی 25 گرام، زعفران 11 گرام — تمام دواؤں کو
باریک کر کے 2 گرام دن میں ایک مرتبہ کھلائیں۔
جدوار شیریں، قاد زہر حیوانی، نارنجل دریائی، فلفل سیاہ، ہر ایک 3 گرام، درونج
عقرنی 4 گرام، مروارید ناسفہ 2 گرام — تمام دواؤں کو سرکہ / عرق گلاب میں پیس کر چنے
کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں صبح کے وقت کھلائیں۔
گل مختوم، امیرساء، حب الفار، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
روغن گاؤ میں جب کر کے تین گنا شہد کے قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور 1.5
گرام کھلائیں۔



خنازیر *

SCROFULA

اس مرض میں گردن کے غدود لمفاویہ (Lymphatic Glands) سوج جاتے ہیں اور مریض اپنی گردن پھرانے سے قاصر رہتا ہے اور دوسری علامات رونما ہوتی ہیں جس سے عام جسمانی کارکردگی پر بھی خراب اثر پڑتا ہے۔ یہ بیماری بچوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

(I) بلغم غلیظ/ سوداوی، غلیظ خون کا غلبہ۔

(II) نازک اندام ہونا/ ضعف و لاغری۔

(III) نزلہ و زکام۔

(IV) کھانسی۔

(V) التهاب لوزتین کا بار بار حملہ۔

* اطبا اس کی وہ تشبیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مرض میں مریض کی گردن سور (خنزیر) کی گردن کی طرح موٹی ہو جاتی ہے۔ بعض اطبا کا خیال ہے کہ یہ مرض سور کو بکثرت ہوتا ہے، یا اس میں گلٹیاں، سور کے بچوں کی غیر معمولی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سوج جاتی ہیں۔

- (VI) امراض جلد مثلاً اکزیما وغیرہ۔
 (VII) سیلان اذن (کان بہنا)۔
 (VIII) نقص تغذیہ / سوء ہضم۔
 (IX) غیر صحت بخش رہائش۔
 (X) دماغی / جسمانی محنت کی زیادتی۔
 (XI) کلرودرود۔
 (XII) کثرت مباشرت / جلق۔
 (XIII) نشہ آور اشیا کا بکثرت استعمال۔
 (XI) آتشکی / سلی مادہ / وراثت۔

جدید تحقیقات کے مطابق مادہ سل، اس کا اصل سبب ہے، باقی اسباب، اسباب
 معدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

علامات

ابتدا میں غدود (Glands) بڑھنے لگتے ہیں، ان کو حجرہ کے دونوں یا ایک جانب ہاتھ لگا کر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ان میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس درمیان مریض کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے اور عام کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، شروع میں ان غدود کے اوپر کی جلد ادھر ادھر سرکتی رہتی ہے، متورم گلیٹیاں (غدود) علاحدہ علاحدہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، ان میں درد بھی ہوتا ہے اور بالائی جلد سے بھی پیوست ہو جاتی ہیں۔ ان میں پیر کی مانند ایک خراب مادہ پیدا ہوتا ہے جو جلد اور قریبی ساختوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھٹ کر زخم / ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ قریب کے تمام غدود گلنے لگتے ہیں اس وقت مریض کے پاس بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم سے غیر معمولی بدبو آتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بھی کسی قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ معالجہ سے شفا حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی از خود یہ رطوبات چونہ کی شکل اختیار کر کے

خشک ہو جاتی ہیں، ورنہ شدید عوارض لاحق ہو کر صحت واقع ہو جاتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — خلط موثر کا نفع و تحقیق کریں۔
- 0 — حسب ضرورت محلات استعمال کرائیں / زخم کو پھوڑنے والی دوائیں (مخبرات) دیں۔
- 0 — تقویت جسم پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — جسمانی صفائی اور صبح و شام ہوا خوری کی تاکید کریں۔
- 0 — ازالہ درد کی تدابیر کریں۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں۔
- خلط غالب کے نفع و تحقیق کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- بادیان، پوست بخ بادیان، شاہترہ، عنب الثعلب، سفانج، بادرنجبویہ، اسطوخودوس، ہر ایک 7 گرام، انیسون 3 گرام، انجیر زرد 4 عدد، مویز متقی 25 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور گلقد عملی 50 گرام ملا کر مل چھان لیں اور استعمال کرائیں۔
- مسہل کے طور پر آٹھویں دن اسی نسخہ میں حسب ذیل دواؤں کا اضافہ کریں۔
- ترید سفید، ریوند خطائی، ہر ایک 5 گرام، زنجبیل 2 گرام، ہلیہ سیاہ، برگ ستاکی، ہر ایک 12 گرام، مغز فلوں خیار شہر 60 گرام، ترنجبین 50 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت دینار، شربت اسطوخودوس، ہر ایک 25 ملی لیٹر، شیرہ مغز بادام 5 عدد مل کر کے نوش کرائیں۔

تحقیق و اسہال کے دوسرے دن درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں:

- عود صلیب ایک گرام، دانہ بیل خورد 2 گرام — دونوں کو باریک پیس کر جوارش جالینوس 7 گرام میں ملا کر ورق نقرہ ایک عدد نیپ کر کھلائیں اس کے بعد تخم کشوٹ،

انیسون، ہر ایک 3 گرام، بادرنجبویہ، بادیان، ہر ایک 6 گرام، گاؤ زبان 5 گرام— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شربت بڑوری مار 35 ملی لیٹر، خم کنوچہ 5 گرام ملا کر نوش کرائیں۔— منہج، مسہل اور تہرید کا یہ نسخہ 3-4 مرتبہ استعمال کرائیں۔

بھیڑ کی گردن کے غدود، خشک شدہ 20 عدد، قرنفل 12 گرام، جوز ہوا 4 عدد، بساہ 5 گرام، زنجبیل ایک کلو گرام— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور مریض کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے 12-25 گرام کھلائیں، تین دن کھلانے کے بعد تین دن کا وقفہ ضرور دیں۔

زنجبیل، فلفل سیاہ، پتیل، ہلیلہ، ہلیلہ، آملہ، ہر ایک 4.5 گرام، بیل خورد 5 عدد— تمام دواؤں کا باریک سفوف تیار کریں اور پوست ہلیلہ، آملہ، پوست ہلیلہ، تربد سفید، خراشیدہ، مغز فلوں خیاشنہ، ہر ایک 250 گرام، تمام دواؤں کو 5 لیٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں، صبح کو اس قدر جوش دیں کہ 1/3 حصہ رہ جائے اب مل چھان کر گوگل 500 گرام حل کر کے پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو سفوف کردہ دوائیں شامل کر کے گولیاں بنائیں اور 7-10 گرام کھلائیں۔

بھیڑ کی گردن کی غدود خشک شدہ 18 گرام، غاریقون، زرنباہ، شیطرج، نوشادر، ہر ایک 10 گرام، قرف، سنبل الطیب، انیسون جوز ہوا مصطکی روہی، قرنفل، ہر ایک 7 گرام، پوست ہلیلہ، آملہ، تربد سفید، خراشیدہ، ہر ایک 25 گرام، بھانج، اسطوخودوس، ہر ایک 17.5 گرام— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد کے قوام میں اطرینفل تیار کریں اور 12 گرام بوقت خواب استعمال کرائیں۔

پوست درخت سرس 60 گرام، فلفل سیاہ 6 گرام— دونوں کو پیس کر چھان لیں اور شہد 175 ملی لیٹر میں حسب دستور مجون بنا کر 12 گرام صبح، شام کھلائیں— صرف پوست درخت سرس 60 گرام کو پانی میں جوش دے کر شہد/شکر سے شیریں کر کے نوش کرانا بھی مفید ہے۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:

برگ حنا خشک، موئے بیش سرخ سوختہ، آہک آب نادیدہ (بغیر بجھا ہوا) ہر ایک 35 گرام، نیلا تو تیا بریاں 12 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر بیش سیاہ کے مکھن میں ملا کر ضاد کریں — محلل اور میجر ہے۔

سرخان تازہ (تازہ کیلڑا) کوٹ کر دن میں 2 مرتبہ ضاد کریں — تین دن بعد برگ دستورہ سیاہ، نمک شورہ ہوزن پیس کر صبح، شام تین دن تک رکھیں، جب دُغم پک جائے تو نشتر سے شکاف دیں۔


سرکین گاؤ خشک، اشق، خطمی، بابونہ ہوزن — تمام دواؤں کو پانی میں باریک پیس کر ضاد کریں — محلل ہے۔

گدش، زراوند، ہر ایک 5 گرام، اشق 10 گرام — تمام دواؤں کو باریک کر کے شہد ملا کر ضاد کریں — محلل ہے۔

بخ سوسن کبود، تخم کنوچ، تخم کتاں، تخم حلبہ ہوزن — تمام دواؤں کو شراب میں پکا کر ضاد کریں — منضج اور میجر ہے۔

تخم کتاں، ایرسا، صبر، مرکی، نانخواہ، ہر ایک 2 گرام، فللمویہ، چراغ، مقل، اشق، راتنج، حلتیت، قسط، فرنیون، بہروزہ، زراوند مدحرج، قافل سیاہ، ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی میں گوندھ لیں اور قرص بنائیں۔ حسب ضرورت ایک قرص تھوڑے پانی میں حل کر کے ضاد کے طور پر لگائیں۔

بخ سوسن کو مرہم داخلیوں کے ساتھ ملا کر ضاد کریں۔
ایرسا، زراوند مدحرج، زفت، ہر ایک 3 گرام کو پیس کر مرہم داخلیوں 9 گرام ملا کر ضاد کریں۔



توشہ

YAWS

اس مرض میں ٹریپونیا پرٹی نیو (Treponema Pertenu) نامی جرثومہ کے، جسم میں سرایت کر جانے کی وجہ سے توت (توشہ) کی مانند ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، اس ابھار کی ترکیب میں ریشہ دار ساخت (Fibres Tissue) کا غلاف، ذراتی کریات (Granular Cells) اور کریات ماہ الدم (Plasma Cells) حصہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں اس مرض کو آنکھ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ تحقیقات نے اس کو آنکھ سے علاحدہ تاہم اسی زمرے کا مرض قرار دیا ہے۔

سبب

ٹریپونیا پرٹی نیو (treponema Pertenu) نامی جرثومہ کی سرایت۔

علامات

جرثومی سرایت کے 3-4 ہفتہ بعد مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ تاہم ان ایام میں رات کو مریض، جوڑوں میں درد محسوس کرتا ہے لیکن وہ کوئی سبب تلاش نہیں کر پاتا، کچھ دنوں

بعد سر میں درد ہونے لگتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں، ان میں کسی قدر صلابت ہوتی ہے، یہ پھنسیاں / دانے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصہ بعد مٹر کے دانوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات چند دانے مل کر ایک بڑا ابھار بھی بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ان سے چھلکا اترنے لگتا ہے اور نیچے سے سرخی مائل سے کی مانند سطح نمودار ہوتی ہے، یہ بہت حد تک توت سے مشابہ ہوتی ہے ان سے سفیدی مائل زرد رنگ کی رطوبت رسی ہے، توش کے خشک ہونے پر زرد رنگ کی کھرٹ جم جاتی ہے، کھرٹ کی یہ شکل آتشکی زخم روپیا (Syphilitic Rupia) سے بہت مشابہ ہوتی ہے، کھرٹ کو اتار دینے پر وہاں رطوبت رس کر دوبارہ کھرٹ بن جاتی ہے۔ دانوں کے بار بار نکلنے رہنے سے متاثر عضو میں درد ہوتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دانے بڑھ کر جسم کے بیشتر حصے کو گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ دانے خشک ہو جاتے ہیں تو کھرٹ اتر کر ہلکے رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں، جو کچھ عرصہ بعد از خود زائل ہو جاتے ہیں۔ شفا عام طور سے 6 ہفتہ میں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایک سال یا اس سے زیادہ کی مدت درکار ہوتی ہے۔

مزمن صورتوں میں اس کے عوارض آتشک سے ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ ہڈیوں کو استر کرنے والی عشا میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، جوڑوں میں بھی التهاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی ہڈیوں میں بوسیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور تالو اور منہ میں زخم رونما ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں اس کی تشخیص صرف لیپورٹری ٹسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، ورنہ معالج آتشک کے شبہ میں بتلا رہتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مصفیات خون استعمال کرائیں۔
- 0 — جسمانی صفائی پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — ریسپورہ، مردار سنگ اور سیماپ کے مرکبات استعمال کرائیں

علاج

0 — مصفی خون کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

برگ شاہترہ، سر پھوکہ، گل سرخ، پوست ہلیلہ زرد، جہم کشیز، دھاس، صندل سفید، برہم ڈنڈی، نیل کلنھی، ہر ایک 3 گرام، برگ حنا 2 گرام، زیرہ سفید، فلفل سیاہ، گل کچال، ہر ایک ایک گرام، برگ بکائن، برگ نیم، ہر ایک 12 گرام۔ برگ حنا اور کشیز کو پانی میں بھگو کر مل چھان لیں اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر اسی پانی میں گوندھ کر پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور 2-4 گولیاں صبح کو ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

شاہترہ، سر پھوکہ، نیل کلنھی، صندل، ہر ایک 12 گرام، نر کچور، چوب چینی، ہر ایک 9 گرام، عشبہ، برگ حنا، کھیلہ، ہر ایک 15 گرام، چراغ شیریں، منڈی، عناب ہلیلہ سیاہ، ہر ایک 27 گرام، برادہ شیشم 12 گرام — تمام دواؤں کو نیم کوب کر کے آٹھ گنا پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دیں۔ جب پانی 1/3 حصہ رہ جائے تو مل چھان کر ہموزن شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 25 ملی لیٹر ہمراہ عرق مصفی خون نوش کرائیں۔

عشبہ مغربی، برفانج فستقی، افقیون ولایتی، گاؤ زبان، دار چینی، ہر ایک 25 گرام، چوب چینی، صندل سفید، صندل سرخ، گل سرخ، ہر ایک 12 گرام، ہلیلہ سیاہ، 7 گرام، ہلیلہ زرد 6 گرام — تمام دواؤں کا سنوف تیار کریں اور 750 گرام شکر 500 ملی لیٹر شہد کے قوام میں ڈال کر حسب دستور معجون تیار کریں اور 35 گرام ہمراہ عرق عشبہ استعمال کرائیں۔

0 — سیماب کے درج ذیل مرکبات میں سے کوئی ایک استعمال کرائیں۔

سیماب 3 گرام، اجوائن 7 گرام، قند سیاہ 20 گرام — پہلے اجوائن اور قند سیاہ کو باہم ملائیں۔ اس کے بعد سیماب ملا کر خوب کھل کریں، جب مل ہو جائے تو تھوڑا سا گندم کا آنا ملا کر 17 عدد گولیاں بنائیں اور ایک گولی سرد پانی سے کھلائیں — اس کے بعد جوش دہن کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے شور بانوش کرائیں نیز پوست درخت کچال، بیج جنگلی پیر جوش دے کر اسی سے غرارہ کرائیں۔


سیماب مصفی، اجوائن دیسی، اجوائن خراسانی، بلاور، نارچیل کہنہ، بڑنگ کاٹلی،
قد سیاہ، ہر ایک 12 گرام — پہلے قد سیاہ اور سیماب کو باہم ملا کر خوب کھل کریں۔ اس
کے بعد باقی دواؤں کو ملا کر کوئیں اور جنگلی پیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح کے
وقت دہی کے ساتھ کھلائیں۔

رسکپور، فلفل سیاہ، ہر ایک 3.5 گرام، سنج حنظل 7 گرام، قرظ 21 عدد —
تمام دواؤں کو آب برگ پانی میں کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک ایک
گولی صبح و شام استعمال کرائیں۔

رسکپور، دار چکنہ، قرظ، ہر ایک 12 گرام کو لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر 3 لیٹر
گائے کے دودھ میں کھل کریں، جب گولیاں بننے لاق ہو جائے تو جنگلی پیر کے برابر
گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی صبح، شام ہمراہ حلوہ کھلائیں۔

مردار سنگ، کافور، ہر ایک 9 گرام، قرظ 3.5 گرام — تمام دواؤں کو آب
برگ تنبول 250 ملی لیٹر میں خوب کھل کریں، جب پانی خشک ہو جائے تو 18 گولیاں
بنائیں اور ایک ایک گولی صبح، شام کھلائیں۔

اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی، اجودہ، ہر ایک 12 گرام، مردار سنگ 3 گرام، قد
سیاہ کہنہ 35 گرام — تمام دواؤں کو آب درخت بسکھراہ میں پیس کر 8 عدد گولیاں بنائیں
صبح کو ایک گولی ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔



جمرۃ

ANTHRAX

اس مرض میں جلد میں ورم حاد پیدا ہو جاتا ہے جو بتدریج آس پاس کی لحمی ساختوں کو بھی گھلا دیتا ہے اور بڑھ کر اس میں چھلنی کی مانند بہت سے سوراخ کر دیتا ہے، بعد میں یہ گلی ہوئی ساختیں جھپچھڑے کی مانند خارج ہوتی ہیں۔ یہ مرض عام طور سے گردن، پشت اور سرین پر 45-50 سال سے زائد عمر کے کمزور اور لاغر لوگوں میں ہوتا ہے۔

اسباب

- (I) حاد، اکال صفرابی مادہ۔
- (II) خون حاد۔
- (III) بے سیس این تقریکس (Bacillus Anthracis) نامی خورد بینی جراثیم جو اون۔ چڑے اور متاثر جانوروں کے ذریعہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔
- (IV) نفرس۔
- (V) ذیابیطس۔
- (VI) عام جسمانی ضعف کے دیگر اسباب۔

علامات

اس نئی مدت حضانت 2-5 یوم ہے۔ ابتدا میں مقام مرض پر سخت، سرخ اور غیر المناک ابھار ہوتا ہے، جو کچھ ہی عرصہ بعد دردناک اور خارش والا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اس کے بعد اس سے آبلہ نمودار ہوتا ہے اور ایک معمولی پھوڑا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد پھیل کر بہت بڑا ہو جاتا ہے، جب یہ پھوڑا ہے تو اس میں بہت سے سوراخ دکھائی دیتے ہیں، جن سے پیپ رستی رہتی ہے اور دبانے پر غلیظ، خون آمیز پیپ خارج ہوتی ہے، جب ان سوراخوں کی درمیانی جلد پھٹ جاتی ہے تو وہاں بہت بڑا، غار جیسا زخم دکھائی دیتا ہے جس میں تارکلی ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں شدید درد، سوزش اور ٹیس محسوس ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، لاغری اور ضعف کا غلبہ ہوتا ہے۔ مردہ جلد کے خارج ہو جانے سے صحت یابی شروع ہو جاتی ہے۔

ملوٹا رہے کہ نحیف و لاغر لوگوں اور ذیابیطس کے مریضوں میں حمرة نہایت خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مسکنات درد ادویہ استعمال کرائیں۔
- 0 — ہفت اندام کی فصد کھولیں۔
- 0 — حسب موقع پنڈلیوں پر چھوٹے لگانے، سینٹیاں کھینچیں۔
- 0 — مصفیات خون استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — تسکین درد کے لیے پوست خشخاش کو پانی میں جوش دے کر تکمید کریں۔
 - 0 — ہفت اندام کی فصد کھولیں اور اس کے فوراً بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
- آب اناس 125 ملی لیٹر عرق کیوڑہ، 35 ملی لیٹر شربت توت 30 ملی لیٹر میں تخم فرنجشک

7 گرام ملا کر نوش کرائیں۔

0 — مصفی خون کے طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں۔

شاہترہ، آکاش نیل، کاسنی، خبازی، نیلوفر، پوست بلیلہ زرد، بلیلہ سیاہ، گل منڈی، صندل سرخ، صندل سفید، برادہ شیشم، گل بنفشہ، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو نیکوب کر کے آٹھ گنا پانی میں جوش دیں اور جب پانی 1/3 حصہ رہ جائے تو مل چھان کر تین گنا شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور 25 ملی لیٹر ہمراہ عرق مصفی خون استعمال کرائیں — عرق مصفی خون کا نسخہ درج ذیل ہے:

برگ بکائن، پوست بکائن، برگ نیم، پوست نیم، پوست کپتال، پوست مولسری، دودھنی خورد، برگ بھنگرہ سیاہ، شاخ برگ جوانہ، برگ حنا، پوست گولر، شاہترہ، سر پھوک، گل نیلوفر، برادہ صندل، برادہ شیشم، برگ بید سادہ، فوہ، گل سرخ، کشیز خشک، ختم کاسنی، خج کاسنی، ہر ایک 120 گرام — تمام دواؤں کو نیکوب کر کے 24 لیٹر پانی میں 24 گھنٹے تک بھگوئے رکھیں۔ اس کے بعد 12 لیٹر عرق کشید کریں اور 145 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

خوردنی طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہے — صفراوی خلط کے غلبہ میں مجرب ہے۔

گل نیلوفر، ختم کاسنی، ہر ایک 7 گرام، تمر ہندی 12 گرام، آلو بخارا 5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت اتار 25 ملی لیٹر ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔

غلبہ صفرا کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

تمر ہندی 75 گرام، گل سرخ، برگ ساء کی، ہر ایک 25 گرام کو عرق گلاب 325 ملی لیٹر میں بھگو دیں اور مل چھان کر شیر خشک 50 ملی لیٹر مل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

ذخم پھوٹ جانے کے بعد برگ نیم کو پانی میں جوش دے کر اسی سے تنقیہ مقامی کریں۔ اس کے بعد سہاگہ چوکیہ کو پانی میں ڈال کر گرم کر کے ایک کپڑا بھگو کر نکمید کریں۔ آب برگ شریفہ سبز، ذخم کے دھونے کے بعد لگائیں / بعض اہل با برگ شریفہ سبز کو

آگ پر سینک کر زخم پر باندھتے ہیں۔

مردار سنگ (عرق گلاب میں باریک کیا ہوا) 12 گرام، گل ارغی 25 گرام،
کافور 3 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر مسکھاؤ (21 مرتبہ دھلا ہوا) ملا کر مرہم
بنائیں اور زخم پر لگائیں۔

کندر، زنگار، سفیدہ قلعی، صبر، انزروت، ہموزن، گل ارغی — تمام دواؤں کو برابر
باریک پیس کر پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت سرکہ اور پانی میں حل کر کے
زخم پر لگائیں۔

شدید صورت میں، خراب گوشت کو صاف کرنے کے بعد یہ مرہم استعمال کرائیں۔
مردار سنگ، زراوند، کھیلہ، زرد چوب، ہر ایک 25 گرام، بازو 12 گرام — تمام
دواؤں کو باریک پیس کر موم اور روغن زرد حسب ضرورت ملا کر مرہم بنائیں اور زخم پر لگائیں۔



Learn Unani By Abdul Wahid Saman

حمرہ *


ERYSIPELAS

اس حاد فوی متعدی مرض میں جلد میں ایک مخصوص جراثیمہ سرایت کر جاتا ہے اور حسب موقع صفراوی/دموی خلط میں جوش و غلیان کا باعث ہوتا ہے اور بذات خود خون میں مخصوص سمیت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جلد میں سوزش، ورم اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیات تحت الجلد ساخت بلکہ متصل عروق جاذبہ اور ذہ میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ساتھ میں شدید بخار ہوتا ہے اور دوسری مرضی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔۔۔ یہ مرض 40 سال سے زیادہ عمر والوں میں کثیر الوقوع ہے، ویسے کسی بھی صنف میں، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ تاہم وضع حمل کے فوراً بعد عورتیں زیادہ تر اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔


* اس کو سرخیادہ بھی کہتے ہیں۔

اقسام

(الف) بنیادی قسم 1



(ب) ظاہری اعتبار سے



اسباب

(I) اسٹریپٹوکوکس پائی جے نس (Strepto Coccus Pygenus) کی
سرایت۔ جو کسی معمولی سطحی خراش / ناف کے اطراف سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ختنہ کے
زخم / مریض اشخاص کے جسمانی تقرب / کھوپڑی / چہرے کے کسی سطحی خراج میں نشتر وغیرہ
لگانے کے نتیجہ میں بھی سرایت ہو سکتی ہے۔

* بعض اہل باغیہ خلط کے اعتبار سے حمرہ، حمرہ فلغمونی، فلغمونی حمرہ اور فلغمونی وغیرہ اقسام بیان کرتے ہیں۔

(II) عام جسمانی ضعف، نقص تغذیہ، دھوپ/آگ کے پاس زیادہ دیر تک رکتا، گردوغبار، گندگی، ضعف جگر، ضعف گردہ، وجع المفاصل، نفرس، حفظانِ صحت کی عدم پابندی، کثرت سے نوشی، ذیابیطس، ماہواری کی بے اعتدالی، موسم خزاں اور سرما وغیرہ اس کے اسبابِ معدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 واضح رہے کہ بعض اوقات یہ مرض دبائی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہوا کے ذریعہ دوسروں کو سرایت زدہ کرتا ہے۔

علامات

عام طور سے سرایت کے 2-5 دن بعد اور بعض اوقات 14 دن بعد مرض کی علامات رونما ہوتی ہیں۔

ابتدا میں یک بیک درد سر، ٹکان، پڑمردگی کی شکایت ہوتی ہے اور 24 گھنٹے بعد لرزہ کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو کر 102-103 ف تک پہنچ جاتا ہے، درد سر بعض اوقات اس شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ قرانیطس (سرسام صغراوی) کا دھوکا ہوتا ہے۔ متاثرہ حصہ جسم پر حرارت، تناؤ اور درد محسوس ہوتا ہے، بار بار لرزہ کے ساتھ جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے (بخار چڑھتا ہے) جو ان مریضوں میں اس مرحلے میں عام طور سے نکسیر چھوٹی ہے اور بچوں میں ہاتھ پیروں میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اس کے چند گھنٹے/ایک دن بعد جلد میں سرخی آ جاتی ہے اور چھوٹے سے خوب گرم محسوس ہوتی ہے۔ اس میں کسی قدر ابھار بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ متورم/ماؤف جلد کا کنارہ صحت مند جلد سے علاحدہ ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، سرخی اور درم عام طور سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس کے پیچھے والی جلد صحت مند جلد کی سطح پر آتی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ درم/سرخی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ اگر یہ سرخی چہرے پر ہو رہی ہو تو اس کی کیفیت وقوع اس طرح ہوتی ہے کہ ابتدا میں چہرہ پر کہیں ایک سرخ سا درم/دھبہ نمودار ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے ناک/کان/گوشہ دہن/رخسارہ/زیریں پونے کی جانب سے سرخی/دھبہ نمودار ہوتا ہے، جو بتدریج پھیل کر تمام چہرے، گردن، سر

اور شانہ تک پہنچ جاتا ہے، چہرہ متورم ہو کر بد ہیئت ہو جاتا ہے، ناک بھی متورم ہو جاتی ہے۔ نرم جلد پر درم اور بھی نمایاں ہوتا ہے اور دبانے سے گڑھا پیدا ہو جاتا ہے اس کے برعکس جہاں کی جلد تہی ہوئی ہوتی ہے، وہاں درم بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتا۔ تاہم درد میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے۔

شدید صورتوں میں درم میں زردی مائل رطوبت بحر کز آبلہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جسمانی درجہ حرارت ابتدا ہی سے 104-105 ف تک پہنچ جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، اس پر بھورے رنگ کی تہہ جمی ہوتی ہے، رات کے وقت کرب و اضطراب میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے، شدید ہڈیاں ہوتا ہے، نبض مہملی چلتی ہے۔ درم کے پانچویں، چھٹے دن جسمانی درجہ حرارت اعتدال پر آ جاتا ہے، سرخی اور درم میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نبض بتدریج مہملی اور ضعیف چلنے لگتی ہے اور چھلکے اتر کر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی درم میں پیپ پڑ جانے سے صورت حال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آبلے ٹوٹ کر زخم بن جاتے ہیں، قریب کی غدود جاذبہ (جاذب گلیاں) بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور مقامی ساخت مردار ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں رطوبت بیضیہ (المیومن) زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات اندر سے حلق اور حجرہ میں بھی درم پیدا ہو جاتا ہے جس سے نکلنے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ غدود جاذبہ میں درم پیدا ہو جانے پر سرخ رنگ کی دھاریاں بغل/کنج ران کے غدود جاذبہ کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف نمایاں ہوتی ہیں، گورے رنگ کے مریضوں میں یہ دھاریاں اور بھی نمایاں ہوتی ہیں۔ اس وقت غدود (گلیوں) میں شدید درد ہوتا ہے، ضعیف، شرابی اشخاص میں یہ صورت نہایت تکلیف دہ طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا علاماتیں حمہ خالص سے تعلق رکھتی ہیں۔

(II) حمہ غیر خالص (مفلغونی):

اس کا تذکرہ علاحدہ سے کیا جا رہا ہے۔

(III) حمہ ساذج/سادہ:

اس میں درم صرف جلد تک ہی محدود رہتا ہے۔

(IV) حمہ منتشر:

درم نسج خلوی (خانہ دار بافت Cellular Tissue) میں پھیلتا رہتا ہے اور مقامی تامل بھی ہوتا ہے۔

(V) غیر منتظم:

اس صورت میں درم، سرخی اور سوزش کم ہوتی ہے، جو جسم کے مختلف حصوں میں بے قاعدہ طور پر پھیلتی ہے، جسمانی درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا لیکن حرارت میں بہت بلند اتار چڑھاؤ آتا ہے، مرض عرصہ تک پریشان کرتا ہے۔ یہ صورت وجع النساصل، نفرس، امراض کلیہ، میں مبتلا افراد، معمر اشخاص میں بعض اوقات معمولی سی خراش سے پیدا ہو جاتی ہے۔

بہر حال جملہ انواع میں، اگر شفا کی طرف رجحان ہوتا ہے تو 10-15 دن کے اندر ہی مرض میں افادہ کی علامات اور آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بصورت دیگر احتباس تنفس اور بعض دوسری پیچیدگیاں رونما ہوتی ہیں اور مریض ہلاک ہو سکتا ہے۔

تفریقی علامات

حمہ غیر خالص	حمہ خالص
Erysipelas Phlegmonous	Erysipelas Pure
1- فلفمونی کا درم جسم کے کسی بھی حصہ میں (یکساں طور پر) ہو سکتا ہے۔	1- حمہ (سرخی) اور درم عام طور پر چہرے پر رونما ہوتا ہے۔ چنانچہ ناک/کان/رخسار کے کنارے سے شروع ہو کر تمام چہرے پر پھیل جاتا ہے۔
2- سبزی مائل ہوتا ہے، زردی کی آمیزش بالکل نہیں ہوتی۔	2- نہایت سرخ ہوتا ہے جس میں زردی (برنگ زعفران) شامل ہوتی ہے۔

- 3- بخار لازمی طور پر ہوتا ہے۔
 4- حرہ کے مقام پر دباؤ ڈالنے سے سرخی زائل ہو جاتی ہے اور سفیدی آ جاتی ہے لیکن دباؤ ختم ہونے پر دوبارہ سرخی آ جاتی ہے۔
 5- سوزش زیادہ ہوتی ہے اور درد کم ہوتا ہے۔
 3- بغیر بخار کے بھی ہو سکتا ہے۔
 4- سبزی مائل رنگت، دباؤ سے زائل نہیں ہوتی۔
 5- تناؤ اور درد زیادہ ہوتا ہے۔

یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری تصور کی جاتی ہے کہ یونان کے اطباء صفراوی خلط کے حرہ کو ”حرہ خالص“ کہتے ہیں اور اگر صفراوی خلط میں کسی قدر خون کی بھی آمیزش ہو جائے تو پھر یہ ”حرہ غیر خالص“ کہلائے گا۔ شیخ الرئیس ابن سینا کا کہنا ہے کہ اطباء عام طور سے خالص صفراوی درم کو حرہ (اور اگر یہ چہرے پر ہو تو ماسرا) اور خالص دموی درم کو فلفمونی کہتے ہیں۔ یہاں ایک مرکب صورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت خلط غالب کی رعایت سے نام تجویز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر صفراوی خلط میں معمولی مقدار میں خون کی آمیزش ہو تو ”حرہ فلفمونی“ اور اگر دموی خلط غالب ہو تو فلفمونی حرہ کا نام دیا جاتا ہے۔

اصول علاج

- 0 — مریض کو علاحدہ مقام پر قیام کرائیں۔
 0 — حسب دستور صفراوی/ دموی خلط کو اعتدال پر لانے کی تدابیر کریں اور مصفیات استعمال کرائیں۔
 0 — خلط غالب کا حقیقہ کریں۔
 0 — ابتداء مرض میں روادع کا طلا کریں۔
 0 — تسکین درد کی تدابیر کریں۔
 0 — احتیاط کے ساتھ سرد، قابض دواؤں کا طلا کریں۔
 0 — حرہ غیر خالص (فلفمونی حرہ) میں اگر قوی مضبوط ہوں، نبض ممتلی اور

بطی چل رہی تو فصد کھولیں، بچوں اور نحیف و لاغراشخاص کی فصد کھولنا موزوں نہیں ہے، ماسرا
میں فصد کھولیں اور پنڈلیوں پر ینکلیاں کھینچیں۔
0 — رفع قبض کی تدابیر کریں۔

علاج

0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

ابتدا میں یہ نسخہ دیں:

گل سرخ، گل نیلوفر، شاہترہ، چراسہ، منڈی، سب کاسنی، ہر ایک 5 گرام، عناب
5 عدد — تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور پھر مل چھان کر شربت عناب 25 ملی لیٹر ملا کر
نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی ابتدا میں استعمال کرا سکتے ہیں۔

لعاب بہدانہ، شیرہ خم کاہن، ہر ایک 3 گرام، شیرہ عناب 5 عدد — عرق شاہترہ،
عرق مرکب مصفی خون، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 25 ملی لیٹر حل کر کے
نوش کرائیں۔

منفج اور مسہل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں:

گل نیلوفر، خم کاسنی، ہر ایک 7 گرام، آلو بخارا 5 عدد، عناب 7 عدد، ہلیہ زرد
25 گرام، تمر ہندی 12 گرام — تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو
جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد 50 گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں۔
جب نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں (یعنی 3-4 دن بعد) اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کا
اضافہ کریں۔

شیر خشک، تربجین، مغز مٹوس خیار فہم، ہر ایک 50 گرام — حسب دستور
استعمال کرائیں۔

ابتدا میں تحریر کردہ دونوں نسخے مصفی خون کے طور پر مستعمل ہیں۔ تصفیہ خون کی

غرض سے یہ نسخے بھی سودمند ہیں اور حرہ میں خاص طور سے استعمال کیے جاتے ہیں۔

ہلیلہ زرد، سر پھوکہ، گل سرخ، برگ شاہترہ، خم کشیز، نمکوفتہ، دھاپ، صندل سرخ، برہمڈٹری، نخل کھنسی، ہر ایک 3 گرام، برگ حنا 2 گرام، گل کپتال، قلفل سیاہ، زیرہ سفید، ہر ایک 1 گرام، برگ نیم، برگ بکائن، ہر ایک 5 عدد — برگ حنا اور کشیز کو پانی میں بھگو کر زلال حاصل کریں اور باقی تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر اسی سے گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب دستور استعمال کرائیں۔

برگ نیم 6 گرام، سر پھوکہ 5 گرام، شاہترہ 4 گرام، گیرہ 2 گرام، گل منڈی، برہمڈٹری، چرائیہ، چاکو، صندل سرخ، زچکور، پوست ہلیلہ کابلی، پوست ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ، آنولہ، رسوت، ہر ایک ایک گرام — تمام دواؤں کو کوٹ کر رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھان کر نوش کرائیں۔

صندل سرخ، رسوت، ہر ایک 2 گرام، انجون، مردار سنگ، چاکو، زچکور، ہر ایک 1 گرام، زرد چوب، برگ حنا، برگ نیم، برگ بکائن، ہر ایک 15 عدد — تمام دواؤں کو کوٹ کر گوندھ لیں اور باجرہ کے برابر گولیاں بنائیں اور 2 گولیاں صبح کے وقت ہمراہ عرق مرکب مصفی خون 25 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

رسوت، گیرہ، برگ شاہترہ، مغز خم بکائن، مغز خم نیم، خم شاہترہ، منڈی، برہمڈٹری، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، خم کاسنی، برادہ صندل سرخ، برادہ صندل سفید، انجون، دلائی، ہر ایک 2 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب برگ کاسنی، سبز مردوق سے گوندھ کر مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور 1-2 گولیاں صبح کے وقت کھلائیں۔

اس مرض میں یہ نسخے بھی مفید ہیں:

شب یمانی، رسوت، سہاگہ بریاں، ہر ایک 4 گرام، زیرہ سیاہ 6 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی ہمراہ عرق عشب (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔

چاکو، قلفل سیاہ، قلفل دراز، بادیان، برگ حنا، برگ نیم، برگ شاہترہ، برگ بانہ،

گلو، کشیز خشک، بلبلہ کلاں، ہموزن — تمام دواؤں کو باریک کر کے محفوظ کر لیں اور 12 گرام، سفوف رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور نوش کرائیں۔
صندل سرخ، حنا، کشیز، ہر ایک 14 گرام، گل معصر 7 گرام — تمام دواؤں کو نیمکوب کر کے دو حصہ کر لیں اور ایک حصہ رات کے وقت 50 ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں اور دوسرا حصہ صبح کے وقت اسی قدر پانی میں بھگو دیں اور شام کو چھان کر نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / ادویہ استعمال کرائیں:

آخر میں ذکر کیے ہوئے نسخہ کا پھل مقام مرض پر ضہاد کریں۔

اقاقیا، صندل سرخ، صندل سفید، گلار، گل سرخ، ہموزن — تمام دواؤں کو آب کاسنی سبز، آب کشیز سبز میں پیس کر ضہاد کریں۔

صندل سرخ، گل ارمنی، شیاف مایشتا، حضض کی، سفیدہ قلعی، سیاری دکھنی بزرالینج سفید، مردار سنگ، ریوند چینی ہر ایک 2 گرام، بخ لجاج، افیون، ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو پیس کر آب کشیز سبز، عرق گلاب، سرکہ میں گوندھ کر اقراص بنائیں اور حسب ضرورت پانی میں گھس کر طلا کریں۔

صندل سرخ، صندل سفید، گل سرخ، گل ارمنی، کو خشک، فوخل، ہموزن — تمام دواؤں کو پیس کر آب مکوب سبز، آب کشیز سبز میں حل کر کے ضہاد کریں۔

کشیز، سبز، صندل، برگ خرف، برگ بارتک، اسپغول، ہموزن کو حسب دستور ملا کر مقام مرض پر ضہاد کریں — حمہ کے ابتدائی مرحلے میں مفید ہے۔

برگ سداب کو سرکہ اور روغن گل میں پیس کر طلا کریں۔

رسوت کو عرق گلاب میں حل کر کے طلا کریں — مسکن درد ہے۔

صندل سرخ، سفیدہ، گیرو، سنگجراحت، ہر ایک 3 گرام کو عرق گلاب میں پیس کر مقام مرض پر طلا کریں — مسکن ہے۔

آب کشیز سبز، روغن گل — دونوں کو ملا کر طلا کریں۔

سفیداب، گل آبیولیا، مکوشنگ، مردار سنگ، هموزن — تمام دواؤں کو روغن گل میں
پیس کر طلاء کریں۔

بابونہ، اکیلل الملک، شہیت، بزرگتال، هموزن — تمام دواؤں کا حسب دستور
ضماد کریں — محلل اور ام ہے۔

یہ روغن بھی مفید ہے:

صندل سرخ، چاکسو، کمیلہ، ہر ایک 3 گرام، سنگ جراحی، فوغل، کات سفید،
لوہ چوں برگ حنا، شب میانی، ہلیلہ سیاہ، دج خراسانی، ہر ایک 1.5 گرام، برگ نیم، دھابہ،
ہر ایک 14 گرام، فلفل سیاہ 7 گرام، برگ بکائن 28 گرام، نیلو توتیا، ایک گرام، روغن تلخ
3.5 ملی لیٹر — پہلے چوں (برگ) کو ہار یک پیس کر نصف لوہ چوں کے ساتھ دوبارہ پیس کر
اقراص بنائیں، اس کے بعد روغن تلخ کو آگ پر رکھ کر اس میں یہ اقرص ڈال کر جلائیں۔ باقی
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اسی روغن میں ملا کر لوہے کی کڑاہی میں درخت نیم کی شاخ کا
دستہ بنا کر خوب چلائیں اس کے بعد محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت مقام مرض پر لگائیں۔
برگ نیم، گل معصفر، صندل سرخ، زرد چوب، هموزن — تمام دواؤں کو پانی میں
گھس کر ضاد کریں۔


رسوت، کات سفید، صندل سرخ، صندل سفید، هموزن کو آب کشینتر ہیز مروق میں
پیس کر ضاد کرانا، زخم ہو جانے کی صورت میں سود مند ہے۔

آتشف

SYPHILIS

اس مرض میں تمام بدن، خاص طور سے اعضاء تناسل پر پھنسیاں نمودار ہو کر خاص قسم کے دغم بن جاتے ہیں اور ایک طویل عرصہ تک پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مادہ مرض موروٹی طور پر بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ٹریپونما پالیدم (Treponema Pallidum) نامی جرثومے سے پیدا ہوتا ہے اور نہایت خبیث تصور کیا جاتا ہے۔

اقسام



۱۔ اس کو آتشک مقامی (Soft Chancer) بھی کہتے ہیں، آتشک کے ذیل میں املا کی روش اختیار کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ آتشک نہیں ہے۔

اسباب

ٹریپونیم پالیڈم (Treponema Pallidum) نامی جرثومہ کی سرایت:

اس سرایت کے درج ذیل چار ذرائع ہیں:

- (I) براہ راست (Direct)۔
- (II) بالواسطہ (Indirect)۔
- (III) اتفاقی / حادثاتی (Accidental)۔
- (IV) خلقی (Congenital)۔

ملاحظہ رہے کہ 90-95 فیصد مریض اس مرض میں براہ راست طور پر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سرایت زدہ شخص سے جنسی روابط (Sexual Intercourse) کا نتیجہ ہے۔ دوسرے درجہ پر بالواسطہ سرایت ہے، مریض کا جھوٹا کھانے اور استنجا خانے کے مشترک سامان استعمال کرنے سے یہ تعدیہ ہوتا ہے۔

تیسری صورت اتفاقی / حادثاتی ہے، اس میں معالجاتی مرحلے میں ڈاکٹر، نرس اور دوائی وغیرہ مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوقات سرایت زدہ شخص کا خون لینے سے بھی مرض منتقل ہو جاتا ہے۔ چوتھے درجہ پر خلقی / موروثی سرایت ہے، جو سرایت زدہ ماں باپ سے جنین تک پہنچتی ہے۔

یہ جرثومہ بہت چھوٹا 8/10، 15/20 مائی کرو ملی میٹر حجم کا ہوتا ہے، اس کی ہیئت بے ہوئے دھاگے کی طرح لہر دار (12-14 لہر لیے ہوئے) ہوتی ہے، رنگت سفید، کسی قدر سیاہی مائل نیلگوں ہوتی ہے، فلٹر سے گزر نہیں پاتا اور حرکت میں بھی بہت سست ہوتا ہے، جسم کے باہر صرف چند گھنٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے، نمی میں بھی زندہ نہیں رہ پاتا، اسی طرح 51 درجہ سینٹی گریڈ کی حرارت میں مر جاتا ہے۔

عام طور سے سرایت کے 3-6 ہفتہ بعد مرض کی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔ سرایت زدہ مقام پر اثر انداز ہونے کے بعد یہ غدود لفاویہ کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد عروق دمویہ جاذبہ کے ذریعہ سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ اس طرح مرض کے

اثرات مقامی نہ ہو کر عمومی ہو جاتے ہیں۔

علامات

حقیقی:

(الف) آتشک اکسابی:

مرض کے زمانہ راحت اور سرگرمیوں اور دائرہ اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تین درجوں/مرطوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(1) پہلا درجہ (Primary Stage):

اس مرض میں پہلے سرایت زدہ مقام پر زرد، تانبے کی مانند ایک سخت ابھار پیدا ہوتا ہے، یہ کبھی سرخ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھار درمیان سے دبا ہوا ہوتا ہے، جو بہت جلد بیضوی یا گول ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ اس کی درمیانی سطح جھکی/کٹی ہوتی ہے یا اس میں دھم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے گرد سرخ رنگ کا حلقہ ہوتا ہے، جو عام سطح جلد سے کسی قدر متورم ہوتا ہے، چھونے پر دانہ اور گرد و نواح کی جلد نسبتاً زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے اور کسی ٹھوس چیز کا احساس دلاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی تختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قریبی لمفاوی غدد بھی متورم ہو جاتے ہیں، جو ہلانے سے زیر جلد متحرک ہو جاتے ہیں، ان میں درد وغیرہ نہیں ہوتا۔ غلاف پر دانہ ہو تو تختی بٹن کی مانند محسوس ہوتی ہے لیکن شخہ پر یہ صلابت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ سرایت زدہ مقام اگر خضیہ کی جلد ہو تو وہاں کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو جاتا ہے اور تختی کے ساتھ سیاہی مائل چھلکا اترتا ہے۔ عام طور سے دانے میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تاہم انگوٹھے/انگلیوں کے پوروے پر ہو تو دردناک ہوتا ہے۔ عورتوں میں یہ دانہ خفرتین کبیرین اور خفرتین صغیرین پر نمودار ہوتا ہے۔ یہاں اس صلابت کے ساتھ کسی قدر نرم رخ کی بھی کیفیات پائی جاتی ہیں، تاہم اس مرحلے میں دانوں میں پیپ وغیرہ نہیں پڑتی۔ نیز مرض کی شناخت بھی کسی قدر دشوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔

(II) دوسرا درجہ (Secondary Stage):

یہ درجہ ابتدائی درجے کے ختم ہونے کے 6-7 ہفتے بعد شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں مریض کو کرب و اضطراب ہوتا ہے، طبیعت سست اور بھیجی ہوتی ہے، کبھی کبھی خفیف بخار بھی ہوتا ہے، جو بعض اوقات شدید ہو جاتا ہے، جس پر طیریائی بخار کا دھوکہ ہوتا ہے، آتشکی کمی مواد کے دوران خون میں شامل ہو جانے کی وجہ سے ظاہر بدن پر گلابی رنگ کے 1-3 ملی میٹر حجم کے دانے نکل آتے ہیں، یہ سینہ، پشت، چہرہ، بازو، ہتھیلی، سکوے اور اعضاء تناسل پر بکثرت دیکھے جاسکتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ان کا رنگ سیاہی مائل تا بھیجی ہو جاتا ہے، ان میں جلن اور درد اور خارش وغیرہ نہیں ہوتی۔ تمام جسم کے لمفاوی غدود متورم ہو جاتے ہیں، درد سر کی شکایت ہوتی ہے، عضلات اور مفاصل میں بھی درد ہوتا ہے، رات کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مقام نمو کے اعتبار سے دانوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کہیں تو کچے گوشت کی مانند اور کہیں سیاہی مائل ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد یہ دانے غائب ہو جاتے ہیں اور وقتی طور پر داغ رہ جاتا ہے، پھر وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بال پھیکے، بے رونق ہو جاتے ہیں، واڑھی، سر اور بھٹوں کے بال باریک ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ تاہم ان کی جڑیں موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اُگ آتے ہیں۔ بعض اوقات طبقہ عنقیہ میں درم پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں درد، بصارت میں نقصان کی شکایت ہو جاتی ہے، پانی بھی بہتا رہتا ہے، کبھی کبھی ثقل سماعت کی شکایت بھی ہوتی ہے، ناخن دبیز، بے رونق اور خشک دکھائی دیتے ہیں اور ان میں اکھڑنے کا رجحان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔

ظاہر جسم پر دانوں کے نکلنے کے ساتھ منہ کے پردہ مخاطی پر زخم اور قرہی مقامات پر سفید خاکستری بلندیوں، بڑے بڑے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جو مسوں سے بہت حد تک مشابہت رکھتے ہیں، ان سے سبزی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے، مقعد، مہبل اور کنج ران کے پاس یہ ابھار بہت زیادہ ہوتے ہیں، حلق میں درم/ زخم کی وجہ سے آواز میں بھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، چہرے پر بھی سسے نما دانے پیدا ہو جاتے ہیں، جو ناک، ہونٹ، تھوڑی پر زیادہ ہوتے ہیں۔ شدید صورتوں میں تالو کے پاس زخم ہو کر ناک کے سوراخ تک پہنچ جاتا ہے،

اس سے رطوبت رتی ہے — 6-7 ماہ بعد عصبی مراکز بھی جتلائے مرض ہو جاتے ہیں اور دماغی نغای رطوبت میں یہ جڑوے سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور شریان میں سدہ وغیرہ پیدا رنے ہیں باچھوں کے پاس مخصوص نوعیت کی دھاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قلب الدم کی شکایت ہوتی ہے۔

(III) تیسرا درجہ (Tertiary Stage):

ابتدائی درجہ کے کم و بیش 7 تا 15 سال بعد یہ مرحلہ پیش آتا ہے، بلکہ عام طور سے درجہ دوم کے معالجہ کے بعد یہ درجہ شروع نہیں ہوتا، لیکن معالجہ میں بے پردہی کی وجہ سے درجہ ذیل علامات رونما ہوتی ہیں۔

درجہ دوم کی علامتوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ دماغ میں شریانی انسداد کی وجہ سے قاع ہو جاتا ہے، ہتھیلی اور ٹکڑوں پر چھیل کی شکایت ہو جاتی ہے، زیر جلد نیچوں میں درم کے بعد بغیر کسی تکلیف کے قرحہ بن جاتا ہے، پنڈلیوں پر یہ قرحہ کثیر الوقوع ہے — مرضی علامات زیادہ تر ہڈیوں میں رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان میں درم پیدا ہو جاتا ہے، استہا میں بھی گموی نما ابھار پیدا ہو جاتے ہیں اسی صورت میں تکالیف میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں پیدا ہو جائیں تو صرع (مرگی) کا دورہ پڑنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ قوت مناعت کمزور ہو جاتی ہے اور مریض انواع و اقسام کے امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

(ب) آتشک خلقی:

اس صورت میں نوزائیدہ کو مادہ مرض سرایت زدہ ماں/باپ سے حاصل ہوتا ہے، اس صورت میں آتشک کا ابتدائی پہلا درجہ رونما نہیں ہوتا بلکہ دوسرے درجہ کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ سرایت زدہ بچے پیدائش کے وقت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پیدائش کے وقت عام صحت مند بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن 2-3 ہفتے بعد مرضی علامات رونما ہونے لگتی ہیں اور آئے دن کمزور اور دبے ہوتے جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے، جسم کی رنگت خاکستری، چہرہ بجھا ہوا اور بوڑھوں کے چہرے کی مانند تھری دار ہوتا ہے،

باجھوں کے پاس مخصوص نوعیت کی شکلیں پڑ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تمام پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مقعد کے گرد خاکستری، سفید مائل ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ سرین اور ان کی اندرونی سطح پر تانے کے ہم رنگ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، پاؤں کے تلوؤں اور ہتھیلیوں کی رنگت بھی تابی ہو جاتی ہے، زکام کی علامات پائی جاتی ہیں، اس کے بعد ناک پر ورم اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں، تنفس میں خراہٹ ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے، آواز موٹی اور بھدی ہو جاتی ہے، بعد میں ناک کے زخم میں تامل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ناسوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بال پتے اور بے آب ہو جاتے ہیں، دودھ کے دانت تاخیر سے نکلنے ہیں اور ان کے گرنے کے بعد جو مستقل دانت نکلتے ہیں وہ بد صورت، دندانہ دار/بج کی طرح ہوتے ہیں، بہراپن عارض ہوتا ہے۔ عام طور سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پپٹوں کے پاس چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کے جوڑ متورم ہو جاتے ہیں اور کچھ دن بعد بچہ ہڈیوں کی مالا ہو جاتا ہے۔ بطلان اشتہا، اسہال اور اعضا میں گھلاوٹ (ڈیول) کے بعد بچہ فوت ہو جاتا ہے، اگر مرض کا اثر دماغی نغاضی رطوبات پر بھی ہو تو فالج بھی پیش آ سکتا ہے اور مرگی (صرع) کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں، دق دسل بھی ہو سکتا ہے۔

(2) آتشک غیر حقیقی/ مجازی

یہ بھی متعدی مرض ہے لیکن اس کا تعدیہ خالص مقامی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ متاثر مرد/عورت سے غیر متاثر فرد کے عضو مخصوص میں قرح کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اس کا جرثومہ، آتشک کے جرثومے سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی سمیت دوران خون میں شامل ہو کر آتشک حقیقی کی مانند عوارض نہیں پیدا کرتی۔

کی سواد نکلنے کے 24 گھنٹے بعد عضو مخصوص پر کسی قدر خارش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک یا چند پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں، تیسرے دن ان میں رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، چوتھے، پانچویں دن آبلہ بن جاتا ہے، پھر رطوبت گدل ہو کر پیپ بن جاتی ہے۔ بعد

باچھوں کے پاس مخصوص نوعیت کی شکلیں پڑ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تمام پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مقعد کے گرد خاکستری، سفید مائل ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ سرین اور ان کی اندرونی سطح پر تانبے کے ہم رنگ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، پاؤں کے ٹکڑوں اور ہتھیلیوں کی رنگت بھی تاریبی ہو جاتی ہے، زکام کی علامات پائی جاتی ہیں، اس کے بعد ناک پر ورم اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں، شخص میں خراہٹ ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے، آواز موٹی اور بھدی ہو جاتی ہے، بعد میں ناک کے زخم میں ناکل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ناختوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بال پتلے اور بے آب ہو جاتے ہیں، دودھ کے دانت تاخیر سے نکلتے ہیں اور ان کے گرنے کے بعد جو مستقل دانت نکلتے ہیں وہ بد صورت، دندانہ دار/بیخ کی طرح ہوتے ہیں، بہراپن عارض ہوتا ہے۔ عام طور سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پچھوں کے پاس چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے، ٹانگوں کی ہڈیاں نیڑھی ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کے جوڑ متورم ہو جاتے ہیں اور کچھ دن بعد بچہ ہڈیوں کی مالا ہو جاتا ہے۔ بطلان اشتہا، اسہال اور اعضا میں گھلاوٹ (ڈیول) کے بعد بچہ فوت ہو جاتا ہے، اگر مرض کا اثر دماغی نصابی رطوبات پر بھی ہو تو فالج بھی پیش آسکتا ہے اور مرگی (صرع) کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں، دق و سل بھی ہو سکتا ہے۔

(2) آتشک غیر حقیقی/ مجازی

یہ بھی متعدی مرض ہے لیکن اس کا تعدیہ خالص مقامی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ متاثر مرد/عورت سے غیر متاثر فرد کے عضو مخصوص میں قرحہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اس کا جراثیم، آتشک کے جراثیم سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی سمیت دوران خون میں شامل ہو کر آتشک حقیقی کی مانند عوارض نہیں پیدا کرتی۔

کی مواد لگنے کے 24 گھنٹے بعد عضو مخصوص پر کسی قدر خارش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک یا چند پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں، تیسرے دن ان میں رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، چوتھے، پانچویں دن آبلہ بن جاتا ہے، پھر رطوبت گدل ہو کر پیپ بن جاتی ہے۔ بعد

اس سے رطوبت رتی ہے۔ 6-7 ماہ بعد عصبی مراکز بھی جتناے مرض ہو جاتے ہیں اور دماغی نغائی رطوبت میں یہ جڑوے سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور شریان میں سدہ وغیرہ پیدا رتے ہیں باجھوں کے پاس مخصوص نوعیت کی دھاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قلب الدم کی شکایت ہوتی ہے۔

(III) تیسرا درجہ (Tertiary Stage):

ابتدائی درجہ کے کم و بیش 7 تا 15-20 سال بعد یہ مرحلہ پیش آتا ہے، بلکہ عام طور سے درجہ دوم کے معالجہ کے بعد یہ درجہ شروع نہیں ہوتا، لیکن معالجہ میں بے پرواہی کی وجہ سے درجہ ذیل علامات رونما ہوتی ہیں۔

درجہ دوم کی علامتوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ دماغ میں شریانی انسداد کی وجہ سے فالج ہو جاتا ہے، ہتھیلی اور ٹکڑوں پر چنبل کی شکایت ہو جاتی ہے، زیر جلد نیچوں میں ورم کے بعد بغیر کسی تکلیف کے قرحہ بن جاتا ہے، پنڈلیوں پر یہ قرحہ کثیر الوقوع ہے۔ مرضی علامات زیادہ تر ہڈیوں میں رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، احتشاش میں بھی گمردی نما ابھار پیدا ہو جاتے ہیں اسی صورت میں تکلیف میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں پیدا ہو جائیں تو صرع (مرگی) کا دورہ پڑنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ قوت مناعت کمزور ہو جاتی ہے اور مریض انواع و اقسام کے امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

(ب) آتشک خلقی:

اس صورت میں نوزائیدہ کو مادہ مرض سرایت زدہ ماں/باپ سے حاصل ہوتا ہے، اس صورت میں آتشک کا ابتدائی/پہلا درجہ رونما نہیں ہوتا بلکہ دوسرے درجہ کی علامات رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ سرایت زدہ بچے پیدائش کے وقت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پیدائش کے وقت عام صحت مند بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن 2-3 ہفتے بعد مرضی علامات رونما ہونے لگتی ہیں اور آئے دن کمزور اور دبے ہوتے جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے، جسم کی رنگت خاکستری، چہرہ بجھا ہوا اور بوڑھوں کے چہرے کی مانند جھڑی دار ہوتا ہے،

باچھوں کے پاس مخصوص نوعیت کی شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تمام پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مقعد کے گرد خاکستری، سفید مائل ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ سرین اور ان کی اندرونی سطح پر تانبے کے ہم رنگ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، پاؤں کے ٹکڑوں اور ہتھیلیوں کی رنگت بھی تاریبی ہو جاتی ہے، زکام کی علامات پائی جاتی ہیں، اس کے بعد ناک پر ورم اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں، شخص میں خرخراہٹ ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے، آواز موٹی اور بھدی ہو جاتی ہے، بعد میں ناک کے زخم میں ناکل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ناسخوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بال پتلے اور بے آب ہو جاتے ہیں، دودھ کے دانت تاخیر سے نکلتے ہیں اور ان کے گرنے کے بعد جو مستقل دانت نکلتے ہیں وہ بد صورت، دندانہ دار/بیخ کی طرح ہوتے ہیں، بہراپن عارض ہوتا ہے۔ عام طور سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پچھوں کے پاس چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کے جوڑ متورم ہو جاتے ہیں اور کچھ دن بعد بچہ ہڈیوں کی مالا ہو جاتا ہے۔ بطلان اشتہا، اسہال اور اعضا میں گھلاوٹ (ڈیول) کے بعد بچہ فوت ہو جاتا ہے، اگر مرض کا اثر دماغی نغاصی رطوبات پر بھی ہو تو فالج بھی پیش آسکتا ہے اور مرگی (صرع) کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں، دق و سل بھی ہو سکتا ہے۔

(2) آتشک غیر حقیقی/ مجازی

یہ بھی متعدی مرض ہے لیکن اس کا تعدیہ خالص مقامی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ متاثر مرد/عورت سے غیر متاثر فرد کے عضو مخصوص میں قرحہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اس کا جراثیم، آتشک کے جراثیم سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی سمیت دوران خون میں شامل ہو کر آتشک حقیقی کی مانند عوارض نہیں پیدا کرتی۔

کی مواد لگنے کے 24 گھنٹے بعد عضو مخصوص پر کسی قدر خارش محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک یا چند پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں، تیسرے دن ان میں رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، چوتھے، پانچویں دن آبلہ بن جاتا ہے، پھر رطوبت گدل ہو کر پیپ بن جاتی ہے۔ بعد

میں قرحہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں شدید درد اور سوزش ہوتی ہے۔ مردوں میں یہ زخم حشفہ/مجری بول کے منہ پر/ اس کے اندر یا عضو تناسل کی جلد پر ہوتا ہے اور عورتوں میں مہبل کے کنارے پر اور بعض اوقات فم رحم پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ ران کے غدد متورم ہو جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ گریں بن جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد پھوٹ جاتی ہیں۔ تحلیل کے متاثر ہونے کی صورت میں پیشاب کے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی غلیظ مواد خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات عضو تناسل کی جلد یا عضو تناسل گلنے لگتا ہے جس سے سریش نہایت کرب اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسمانی صفائی اور خاطر خواہ علاج کی صورت میں یہ مرض 20-25 دن میں بالکل ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عرصہ تک پریشانی کا باعث بنتا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ عام طور سے آتشک کا زخم زیادہ گہرا نہیں ہوتا، اس کے اطراف میں درم، کنارے صاف، کسی قدر نمایاں اور زخم کی سطح خوردہ سی، خاکستری رنگ کی ہوتی ہے، اس سے مواد کا اخراج بھی آتشک حقیقی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
آتشک حقیقی اکتسابی اور آتشک غیر حقیقی/ مجازی/ مقامی کی تشخیص میں ابتدائی دنوں میں دشواریاں پیش آسکتی ہیں۔ اس لیے ذیل میں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

تفریقی علامات

آتشک غیر حقیقی/ مجازی
Soft Chancer

1- سرایت کے 24 گھنٹے بعد عضو مخصوص پر ایک پھنسی پیدا ہوتی ہے جو تیسرے دن آبلہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، چوتھے، پانچوں دن اس کی رطوبت کدھر ہو کر پھوٹ جاتی ہے اور اس میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔

آتشک حقیقی
Syphilis

1- سرایت کے 3-4 ہفتے بعد متاثر عضو پر سخت ابھار/ پھنسی پیدا ہوتی ہے، جس کی صلابت ہن کی مانند ہوتی ہے۔ اس میں عام طور سے پیپ وغیرہ نہیں پڑتی۔

- 2- ابھار کے رونما ہونے کے کم و بیش 8-10 دن بعد کینج ران کی غدد متورم اور سخت ہو جاتی ہیں۔ تاہم وہ چکتی اور صدیدی نہیں ہوتیں۔
- 3- مکی مادہ دوران خون میں شامل ہو کر تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور شدید مرضی عوارض کا باعث ہوتا ہے اور علاج سے بھی شفا دیر میں حاصل ہوتی ہے۔
- 4- ابھار/ دانوں میں درد نہیں ہوتا۔
- 2- آبلہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کینج ران کی غدد متورم ہو کر پینپ دار ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھوٹ جاتی ہیں۔
- 3- مکی مادہ مقامی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عوارض میں شدت نہیں ہوتی اور علاج سے جلد ہی مرض رفع ہو جاتا ہے۔
- 4- آبلے دردناک اور سوزش زدہ ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- 0 — مریض کی علاحدہ رہائش کا نظم کرنے کی ہدایت کریں۔
- 0 — مقامی صفائی اور پاکیزگی پر خصوصی توجہ دیں۔
- 0 — آنفک کی تمام قسموں میں سیلاب، قوتیا، مردار سنگ اور زنگار کے مرکبات داخلی اور خارجی طور پر استعمال کرائیں۔ ان کے ساتھ مصفیات خون بھی استعمال کرائیں۔
- 0 — ضعف اور لاغری کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں۔
- 0 — حسب ضرورت مسکنات درد استعمال کرائیں۔

علاج

- 0 — داخلی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں۔

نسخہ منج:

شاہترہ، چرائیہ، سرچوکہ، گل منڈی، ہلیہ سیاہ نیم کوفتہ، برادہ صندل سرخ، ہر

ایک 7 گرام، عتاب 5 عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت عتاب 50 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ موسم سرما میں صندل کی بجائے عشب مغربی 7 گرام کا اضافہ کریں۔ یہ نسخہ مادہ میں نفع پیدا کرتا ہے۔ 15 دن بعد درج ذیل مسہل دوائیں استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل:

حب اللیل، ریشہ عظمیٰ، رخ حنظل، سناہ کی، ہر ایک 7 گرام کو اودھ پیہ منہج کے ساتھ رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح کو مغز فلوں خیار صبر 60 گرام، ترنجبین 50 گرام، شیر خشک 25 گرام حل کر کے مل چھان لیں اور روغن بادام 6 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ تہریہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تہریہ:

خمیرہ گاؤ زبان 12 گرام / معجون عشب 7 گرام، ورق نقرہ ایک عدد میں پیست کر کھلائیں اوپر سے شیرہ عتاب 5 عدد، لعاب بہدانہ 3 گرام، عرق مرکب مصفیٰ 150 ملی لیٹر عرق بادیان، عرق شاہترہ، ہر ایک 75 ملی لیٹر میں نکال کر شربت عتاب، شربت بزدلی، ہر ایک 25 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔ یہ نسخہ تہریہ ایک دن کے وقفہ سے چند بار استعمال کرائیں۔

سیماب، رسکپور، مردار سنگ و غیرہ کے یہ مرکبات بطور خاص فائدہ مند ہیں: سیماب، معطلی، عاقر قرحا ہر ایک 2 گرام، سم الفار ایک گرام، 20 عدد آب لیموں میں خوب سخی کریں اس کے بعد مونگ کے دانہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور ایک گولی شام کو بکری کے گوشت کے شوربے کے ساتھ استعمال کرائیں۔

سیماب 3 ملی لیٹر، اجوائن 7 گرام، قد سیاہ 20 گرام۔ پہلے اجوائن اور قد سیاہ کو خوب ملائیں، اس کے بعد سیماب ڈال کر کھل کر لیں، جب تینوں یک ذات ہو جائیں تو تھوڑا سا گندم کا آٹا ڈال کر 17 گولیاں بنائیں اور سرد پانی کے ساتھ کھلائیں۔ اس کے

استعمال سے بعض اوقات منہ آجاتا ہے ایسی صورت میں پوست کپتال، بخیر جنگلی، پانی میں جوش دے کر غرارہ کرائیں۔

سیماہ، کنجد سیاہ، مازو سبز، اجمود، اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی، بھلاواں، عاقر قرحا، ہر ایک 9 گرام، قد سیاہ— تمام دواؤں کو اس قدر کھل کر لیں کہ یکذات ہو جائیں اس کے بعد 2 گرام کی گولیاں بنائیں اور دہی کے ساتھ کھلائیں۔

سیماہ، رسکپور، بھلاواں (گھنڈی کے بغیر) عاقر قرحا، اجوائن خراسانی، اجمود، ہر ایک 12 گرام، نیلا تو تیا 6 گرام— تمام دواؤں کو باریک پیس کر کھل کر لیں، جب دوائیں خوب مل جائیں تو قد سیاہ ملا کر خوب کھوئیں اس کے بعد جنگلی پیر کے برابر گولیاں بنائیں اور پیاز کے پھلکے میں ننگے کی ہدایت کریں۔

سیماہ مصفی، اجوائن دیسی، اجوائن خراسانی، بھلاواں، نارچیل کہنہ، بڑنگ کالی، قد سیاہ کہنہ، ہر ایک 12 گرام— پہلے سیماہ کو قد سیاہ میں ملا کر کوئیں اس کے بعد تمام دواؤں کو شامل کر کے خوب کوئیں اور جنگلی پیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح کو ہمراہ دہی استعمال کرائیں۔

سیماہ 12 ملی لیٹر، سم الفار 3 گرام، دونوں کو آب لیوں 120 ملی لیٹر میں خوب کھل کر لیں۔ اس کے بعد عاقر قرحا، مصطکی، ہر ایک 12 گرام ملا کر دوبارہ کھل کر لیں جب باریک ہو جائے تو کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی کھلائیں اور بخیر نوش کرائیں۔

رسکپور کے درج ذیل مرکبات مفید اور مجرب ہیں۔
رسکپور، قلفل سیاہ، ہر ایک 3.5 گرام، بخ حنظل 7 گرام، قرفل 21 عدد—
تمام دواؤں کو آب پانی میں کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور صبح، شام ایک ایک گولی استعمال کرائیں۔

رسکپور، قلفل سیاہ، ہیل خورد، گیر، ہر ایک 3 گرام، قد سیاہ 9 گرام— تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی قد سیاہ / روٹی کے گودے میں پیٹ کر کھلائیں۔

رسکپور، 9 گرام، قرضل 26 عدد— دونوں کو پانی میں پیس کر 125 ملی گرام کی گولیاں بنائیں اور ایک گولی بالائی کے ساتھ کھلائیں۔

رسکپور، نمک سنگ، ہر ایک 12 گرام، دار چکنہ، سیندور، ہر ایک 35 گرام— تمام دواؤں کو کوٹ کر کے 65 ملی گرام کی گولیاں بنائیں اور ایک گولی بالائی میں پیٹ کر کھلائیں۔
رسکپور مصفی 12 گرام کو کھنی بوٹی کے پانی میں 10 مرتبہ کھل کریں اور ہر مرتبہ اس قدر پانی ڈالیں کہ دوا ڈوب جائے اس کے بعد پنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی حلوے میں رکھ کر کھلائیں۔

مردار سنگ کے درج ذیل مرکبات خوردنی طور پر استعمال کرائیں۔

مردار سنگ 3 گرام، اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی، اجمودہ، ہر ایک 12 گرام قد سیاہ، کہنہ 35 گرام— تمام دواؤں کو آب درخت بسکھڑہ میں پیس کر 8 عدد گولیاں بنائیں اور آب برنج کے ساتھ کھلائیں۔

مردار سنگ 6 گرام، ہلیہ زنگی، سہاگہ، کات سفید، ہر ایک 12 گرام نیلا توتیا 3.5 گرام— تمام دواؤں کو آب لیوں کاغذی میں 3 دن کھل کریں اس کے بعد جنگلی ہیر کے ہندر گولیاں بنائیں اور صبح کے وقت ایک گولی کھلائیں۔

مردار سنگ، کافور، ہر ایک 9 گرام، قرضل 4.5 گرام— تمام دواؤں کو آب برگ تنبول 200 ملی لیٹر میں چار پیر کھل کر کے 18 گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی صبح و شام استعمال کرائیں۔

مردار سنگ کے مرکبات سے اگر بد اثرات رونما ہو رہے ہوں تو ان کا استعمال روک کر مسہلات بروئے کار لائیں۔

توتیا اور زنگار کے مرکبات بھی اس مرض میں مفید ہیں۔ ذیل میں چند مرکبات تحریر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اگر ان کے استعمال سے بد اثرات رونما ہوں تو استعمال روک کر کچی اور دودھ زیادہ استعمال کرائیں۔

توتیا سبز 12 گرام، شب میانی بریاں 25 گرام، سہاگہ سفید 35 گرام، ہلیہ

زنگی 50 گرام، طباشیر 6 گرام— تمام دواؤں کو 100 عدد لیوں کے عرق میں کھل کر
کے پنے کی برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح، شام کھلائیں۔

توتیا سبز بریاں، شکر ف بریاں، زنگار، مردار سنگ بریاں، رال، ہر ایک 2 گرام،
خرمہرہ زرد سوختہ 4 عدد، سپاری سوختہ ایک عدد— پہلے شکر ف، مردار سنگ اور توتیا کو کھل
کریں اس کے بعد خرمہرہ، سپاری ڈالیں پھر زنگار اور رال ملائیں اور 150-250 ملی گرام
گندم کی مرغن روٹی میں رکھ کر کھلائیں اس کے بعد بھی مرغن روٹی کھلائیں۔

سم الفار کے یہ مرکبات بھی مفید ہیں:

سم الفار 5 گرام، نیلا توتیا 10 گرام، کات سفید 20 گرام، سفزخم نیم 50
گرام، سر پھوکہ 80 گرام— تمام دواؤں کو آب کھٹائی خورد میں کھل کر کے پنے کے
برابر گولیاں بنائیں اور صبح کے وقت ایک گولی کھویا یا مکھن کے ساتھ کھلائیں۔

سم الفار 12 گرام، کات سفید 25 گرام، عرق لیوں کاغذی، آب کھٹائی خورد،
آب بیتا ناسی، ہر ایک 500 ملی لیٹر میں خوب کھل کریں، خشک ہونے پر دانہ موگ کے
برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی کھوئے کے ساتھ کھلائیں۔

ذیل میں عشب، چوب چینی اور شاہترہ وغیرہ ادویہ نباتیہ پر مشتمل چند مفید نسخہ جات
تحریر کیے جا رہے ہیں۔

عشب مغربی 50 گرام، پوست ہلیہ زرد، صندل سرخ، سناہ کی، ہر ایک 12
گرام— تمام دواؤں کو باریک پیس کر 7-9 گرام، ہمراہ آب نیم گرم استعمال کرائیں۔

عشب مغربی 35 گرام، چوب چینی 10.5 گرام، برادہ صندل سفید، برادہ صندل
سرخ، جوانسہ، چھانسیہ، ہر ایک 7 گرام، برادہ چوب آنخوس، برادہ چوب نے سار، ہر ایک 8
گرام، عتاب 15 عدد— تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش
دے کر مل چھان لیں اور نبات سفید 500 گرام میں شربت کا قوام بنا کر 35-70 ملی لیٹر
نوش کرائیں۔

عشب مغربی 60 گرام، شاہترہ، بسفانج فستقی، تربد سفید، خوف خراشیدہ، افقیون،

پوست ہلیلہ کالمی، ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ، ہر ایک 8 گرام، آملہ 105 گرام، برگ شاہد کی 35 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر تین گنا شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور 7-12 گرام کھلائیں۔

چوب چینی 25 گرام، عشبہ مغربی 35 گرام باد رنجویہ، برگ شاہترہ، برادہ چوب شیشم، تخم شاہترہ، اقیون (پوٹلی میں باندھ کر) تخم کاسنی، برادہ صندل سرخ، گاؤ زبان گل منڈی، ہر ایک 9 گرام۔ تمام دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں ترکیبیں اور صبح کو جوش دیں جب 750 ملی لیٹر پانی بچ رہے تو مل چھان کر نبات سفید 750 گرام حل کر کے شربت بنائیں اور 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

چوب چینی، گل سرخ، برفاج فستقی، سناسکی، صندل سفید، صندل سرخ، باد یان، ہر ایک 14 گرام۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت 2 لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دیں جب پانی 1/3 حصہ رہ جائے تو نبات سفید 250 گرام ملا کر شربت تیار کریں اور 25 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

شاہترہ، پوست بخ نیم، امر نیل، درخت تلو، سر پھوک، پوست ہلیلہ زرد، ہر ایک 1 کلو گرام، چراغہ 500 گرام، بخ یا سیمین، گاؤ زبان، گل سرخ، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک 250 گرام۔ تمام دواؤں کو 26 لیٹر پانی میں اور 24 گھنٹے بعد 6 لیٹر عرق کشید کریں۔ 75 ملی لیٹر عرق میں 35 ملی لیٹر شہد حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر درج ذیل نسخے / تدابیر بروئے کار لائیں۔

رسکپور 6 گرام، دم الاخوین 3 گرام۔ دونوں کو پیس کر گھی (ایک سو ایک بار دھلا ہوا) میں ملا کر مرہم تیار کریں اور زخموں پر لگائیں۔ اس کے بعد یہ دوا چھڑکیں۔

کات سفید، سپاری سوختہ، سنگ جراثیم، ہلدی سوختہ، دم الاخوین، سیندر، اصل السوس مقشر ہموزن۔ تمام دواؤں کو ہر ایک کر کے ذرور کریں۔

نیلا تو تیا بریاں ایک گرام، مردار سنگ، کات سفید، سنگ جراثیم، ہر ایک 2 گرام، جدوار سوختہ، خر مہرہ زرد سوختہ، ہر ایک 5 گرام، فوغل سوختہ ایک عدد۔ تمام دواؤں


کو باریک کر کے ذرور کے طور پر استعمال کرائیں۔
روغن زرد (گھی) سو بار دھلا ہوا لگا کر آلودہ سوختہ لودھ پٹھانی، شب یلانی، نیلا تو تیا
بریاں — تمام دواؤں کو باریک کر کے چھڑکیں۔

دم الاخوین، شادند، اقا قیا، گلنار، انزروت، ہوزن — تمام دواؤں کو باریک بنیں
کر ذرور کریں۔

برگ نیم 60 گرام کو کوٹ کر تکیہ بنائیں اور روغن کچھ سفید 250 ملی لیٹر میں
جلائیں اس کے بعد صاف کر کے موم سفید 60 گرام پگھلائیں اور سنگ جراثیم، خمرہ زرد
سوختہ، کات سفید، سپاری سوختہ، ہر ایک 12 گرام ملا کر مرہم بنائیں اور زخموں پر لگائیں۔
مردار سنگ 3 گرام، رال 5 گرام، رتن جوت 6 گرام کافور 4 گرام، رسکپور
6.5 گرام — کافور کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک کر لیں، موم 25 گرام، روغن گل 60
ملی لیٹر، موم کو روغن گل میں پگھلائیں اس کے بعد تمام دواؤں کا سفوف ڈال کر دستے سے
چلائیں، پھر کافور شامل کر کے خوب چلائیں بعد میں سفیدی بیضیہ مرغ ایک عدد ڈال کر
یکذات کر کے استعمال کرائیں۔

کندر، رال کہنہ، سیماب، ہر ایک 12 گرام / ملی لیٹر، تو تیا ہبز 3 گرام — تمام
دواؤں کو گھی 110 ملی لیٹر میں ڈال کر اپنی دستہ سے خوب چلائیں، جب سیماب اچھی طرح
حل ہو جائے تو مرہم کے طور پر استعمال کرائیں۔

چونہ سفید، کبیلہ، نیلا تو تیا، پوست ہلبہ زرد، کات پاڑیہ، مردار سنگ، ہر ایک 12
گرام — تمام دواؤں کو پانی میں کوٹ کر ایک طشت میں پھیلا دیں، جب خشک ہو جائے تو
سفوف کر کے محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت 12 گرام سفوف کو 35 ملی لیٹر گائے کے گھی
میں ملا کر مرہم کے طور پر استعمال کرائیں۔




سوزاک

GONORRHOEA

اس مرض میں ایک مخصوص بڑوہ کی سرایت کی وجہ سے بھری بول (Urethra) میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے اور پیپ خارج ہونے لگتی ہے نیز دوسری مخصوص مرضی علامات رونما ہوتی ہیں۔ یہ شدید متعدی بیماری ہے۔

اقسام



اسباب

(۱) غیر طبعی مباشرت/کمل طور پر انزال نہ ہونا۔

(II) مساحت۔

(III) گونوکوکس (Gono Coccus) نامی جرثومہ کی سرایت۔

لمحوظ رہے کہ یہ جرثومہ جوڑے (جفت) کی صورت میں چار، آٹھ بارہ کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو کریات زوجہ کہتے ہیں۔ یہ غشا مخاطی پر بہت تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مرض کا اثر آنکھ اور اعضاء تولید کی غشا مخاطی پر بہت سرعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہر حال یہ مرض مباشرتی امراض میں شمار کیا جاتا ہے اور تعدیہ کے ذرائع میں متاثرہ/سرایت زدہ مرد/عورت کے علاوہ سوزا کی مواد سے آلود اشیا بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔

علامات

سرایت کے 3-5 دن کے بعد مرض کی علامات رونما ہونے لگتی ہیں، ابتدا میں مجری بول میں درد اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔ بعد میں التهاب بھی پیدا ہو جاتا ہے، پیشاب میں دشواری ہوتی ہے کبھی کبھی اس میں پیپ بھی شامل ہوتی ہے۔

(الف) حاد:

تازہ (Penis) میں حرارت اور سوزش محسوس ہوتی ہے اس کے بعد التهاب پیدا ہو جاتا ہے۔ دہانہ مجری بول پر سرخی اور ورم نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے وقت شدید سوزش اور درد محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد نیلگوں رنگ کی رقیق پیپ خارج ہونے لگتی ہے اور کچھ ران کے غدود میں بھی ورم پیدا ہو جاتا ہے، پیپ کا رنگ متغیر ہو کر سبزی مائل زرد ہو جاتا ہے اور غلظت غالب آ جاتی ہے، کمر اور کولے میں درد محسوس ہوتا ہے، نہایت شدید صورتوں میں مجری بول کے متورم ہونے کے سبب احتباس بول کی شکایت ہو جاتی ہے، پیشاب میں خون بھی آسکتا ہے، عضو مخصوص کی دردناکی اس درجہ کو پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سا کپڑا چھو جانے سے مریض مضطرب ہو جاتا ہے، عام طور سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، قبض اور بطلان اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، خارج شدہ پیپ کے خوردبینی معائنہ میں

جڑوے پائے جاتے ہیں۔

(ب) مزمن:

یہ صورت عام طور سے حادث صورت کے نامناسب علاج / نگہداشت کے گزر جانے کے بعد پیش آتی ہے، عوارض میں تخفیف ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات بالکل معدوم ہو جاتے ہیں، تاہم مادہ مرض موجود ہوتا ہے، رطوبت صدیدی بھی رقیق ہوتی ہے جو عام طور سے ذکر کے سوزاں پر چمکی رہتی ہے، صبح کو بیدار ہونے کے فوراً بعد مریض اپنے ذکر کو دبائے تو تھوڑی سی پیپ خارج ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی اگر معالجہ میں بے پرواہی برتی گئی تو عوارض خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ بحری اطلیل میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، لحم زائد پیدا ہو کر احساس بول کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، التهاب مثانہ، التهاب خصیہ، التهاب حوض کلیہ، عفون دم، تسم دم، التهاب غدہ نری آشوب چشم اور سوزاکی وجع الفاصل وغیرہ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — مدرات بول استعمال کرائیں / حسب ضرورت پیکاری کریں۔
 - 0 — مصفیات استعمال کرائیں / پیپ وغیرہ کا تحقیق کریں۔
 - 0 — خفیف ملین شکم دوائیں استعمال کرائیں۔
 - 0 — پیشاب میں سوزش، درد ہو تو اس کے ازالہ پر توجہ دیں اور مبردات استعمال کرائیں۔
- اس مرض کا علاج بہت توجہ سے کرنا چاہیے اور بظاہر شفا یابی کے بعد بھی دوا کو جاری رکھنا ضروری ہے۔

علاج

- 0 — خوردنی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں:

ابتداء مرض میں یہ نسخے مفید ہیں:

شیرہ خرفہ، شیرہ خار خشک، شیرہ خربوزہ، شیرہ ختم خیارین، ہر ایک 6 گرام، پانی میں نکال کر نبات سفید 18 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ سوزش زیادہ ہو تو اس نسخہ میں لعاب ریشہ حطی 6 گرام، لعاب بہدانہ 3 گرام کا اضافہ کریں۔

پوسٹ فالہ 12 گرام ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر شربت بزدوری 50 ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔

شیرہ ختم کاسنی 5 گرام، عرق گاؤ زبان 150 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بزدوری 50 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

ختم کاہو، ختم خیارین، ختم کاسنی، خار خشک، ختم خربوزہ، برادہ صندل سفید، ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر شیرہ حاصل کریں اور شربت بزدوری بارہ 35 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

تسکین درد اور ادوار بول کے لیے یہ نسخے بھی استعمال کرا سکتے ہیں، ان کو شدید سوزش اور درد میں ہی بروئے کار لائیں:

خار خشک، ختم خرفہ، ختم کاہو، ختم کاسنی، کشیز، صندل سفید، آملہ ہر ایک 5 گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان لیں اور شربت صندل 25 ملی لیٹر ملا کر صبح، شام نوش کرائیں۔

پیشاب کے وقت نہایت درد ہو تو یہ نسخہ دیں۔

لعاب گل حطی 3 گرام، شیرہ ختم ششاش 4 گرام، شیرہ ختم خیارین، پانی میں نکال کر شربت بزدوری بارہ 25 ملی لیٹر حل کر کے اسپنول 6 گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

پیشاب کی زیادتی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

شورہ قلمی، دانہ ہیل کلاں، ہر ایک 21 گرام۔ دونوں کو ہر ایک پیس کر 6 خوراک بنائیں اور 3 خوراک ہمراہ آب تازہ 3 دن اور باقی 3 خوراک سرانجی کے چادلوں کی بیچ کے ساتھ 3 دن استعمال کرائیں۔



سوزاک میں یہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں:

ست گلو 6 گرام، ست سلاجیت، دانہ ہیل خورد، طباشیر، ہر ایک 2 گرام، نبات سفید 12 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر 6 گرام کھلائیں۔ اس کے بعد خار خشک 6 گرام، کاسخ، گلو تازہ، ہر ایک 4 گرام کا پانی میں شیرہ نکال کر شربت خشکاش، شربت بزدوری ہر ایک 18 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

چوب کنار دشتی سوختہ، گل ٹیسو، ہر ایک 12 گرام، ست گلو، ست سلاجیت، ریوند چینی، طباشیر، ہر ایک 6 گرام، جوا کھار، شورہ قلعی، دانہ ہیل کلاں، ہر ایک 4 گرام، نبات سفید 50 گرام۔ دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر 9 گرام ہمراہ آب سرد استعمال کرائیں۔ کشتہ قلعی 6 گرام، کباب چینی، دانہ ہیل خورد، طباشیر، ہر ایک 2 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر پہلے دن ایک گرام، دوسرے دن 1.5 گرام، اسی طرح 7 دن تک 500 ملی گرام بڑھا کر کھلائیں۔

عوارض میں تخفیف کے بعد یہ نسخے بروئے کار لائیں۔

کباب چینی 25 گرام، ہیل خورد، اندر جو شیریں، ریوند چینی، زیرہ سفید، شورہ قلعی، ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر 7 گرام ہمراہ شیر گاؤ صبح و شام استعمال کرائیں۔

طباشیر، تخم خرفہ سیاہ، تخم خشکاش، تخم خربزہ، تخم خیاریں، صمغ عربی، دانہ ہیل کلاں، کباب چینی، کشتہ قلعی، ریوند چینی، خس، کات سفید، ست گلو، سلاجیت، تال کھانا، تخم کاسنی، زیرہ سفید، گیرد، زرد چوب، آملہ خشک، شورہ قلعی، برگ حنا، سپتاں، نشاستہ کشیز خشک، ہر ایک 3 گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ہموزن نبات سفید ملا کر 5-6 گرام ہمراہ آب تازہ صبح، شام کھلائیں۔

ست گلو، ست سلاجیت، کشتہ قلعی، کباب چینی، کات سفید، خس سپتاں، تال کھانا، کچھ سیاہ، برگ حنا، گلزار فارسی، گوند کثیر، ہر ایک 6 گرام، امیراں، ریوند چینی، ہر ایک 4 گرام، زیرہ سفید 3 گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر ہموزن نبات سفید

ملائیں اور 2 گرام ہمراہ شربت بزوری 50 ملی لیٹر نوش کرائیں۔
 کتیرا، دم الاخوین، حب کا کچ، تخم خشکاش، گل مختوم، گل ارنی رب السوس طباشیر
 ہر ایک 2 گرام، تخم خرفہ مقشر، نشاستہ، مغز تخم خیارین، مغز تخم خربزہ، ہر ایک 3 گرام، صدف
 سوختہ، ریونہ چینی، ہر ایک 1 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور
 5 گرام ہمراہ عرق شاہترہ 85 ملی لیٹر، شربت صندل 35 ملی لیٹر صبح، شام نوش کرائیں۔
 گندہ بہروزہ، نشاستہ، ہوزن کو باریک کر کے لعاب اسپنول میں چنے کے برابر
 گولیاں بنائیں اور پہلے دن 7 گولیاں ہمراہ لعاب اسپنول استعمال کرائیں اس کے بعد 14
 دن تک ایک ایک گولی کا اضافہ کرتے رہیں۔

نبات سفید، ورق نقرہ، ہر ایک 6 گرام، کشیدہ قلعی، ست گلو، ست سلاجیت، دانہ
 ہیل خورد، صف، مروارید ہر ایک 6.5 گرام، ست بہروزہ 11 گرام، چوب چینی
 4 گرام — تمام دواؤں کو باریک پیس کر لعاب اسپنول میں ایک گرام کے برابر گولیاں
 بنائیں اور صبح، شام ایک گولی ہمراہ شربت انجبار (حسب ضرورت) استعمال کرائیں۔
 درج ذیل مفرد ادویہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

برگ سپستان کو پانی میں خوب پیس کر نوش کرائیں۔
 خار خشک کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں۔
 کیکر کی کوئیل 3.5 گرام کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح کو شیرہ حاصل
 کریں اور شربت بزوری بارود (حسب ضرورت) شامل کر کے نوش کرائیں۔

0 — خارجی طور پر یہ نئے نئے بروئے کار لائیں:

نازہ میں پچکاری کے لیے یہ نئے استعمال کرائیں:

شیاف مایٹا، شیاف ایض خوب باریک پیس کر لعاب اسپنول میں مل کر کے
 چھان لیں اور پچکاری کریں۔

پوسنت انار، مازہ، ہر ایک 6 گرام، شب یمانی نیم بریاں، برگ مورو، ہر ایک
 3 گرام، گل سرخ 35 گرام — تمام دواؤں کو 120 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں۔ جب 75

ٹی لیٹرہ جائے تو چھان کر دم الاخوین 6 گرام خوب باریک پیس کر چھان کر پچکاری کریں۔
 آملہ، ہلیلہ، ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو 75 ٹی لیٹر پانی میں رات کے
 وقت بھگو دیں۔ صبح کو مل چھان کر اس میں گل ارٹھی، دم الاخوین، انزروت، کتیرا، رسوت،
 سفیدہ کاشغری، نشاستہ، مردار سنگ، کاغذ سوختہ، نیل ولایتی، کافور، ہر ایک ایک گرام کا خوب
 باریک سفوف ملائیں اور ایک بوتل میں محفوظ کر کے ضرورت کے وقت بوتل ہلا کر سیال نکال
 لیں اور پچکاری کریں۔

رسوت، کات سفید، ہر ایک 12 گرام، انیون، کافور ہر ایک 1 گرام۔ تمام
 دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح کو چھان کر نیم گرم کر کے پچکاری کریں۔
 گل ارٹھی، سفیدہ کاشغری، ہر ایک 12 گرام، انیون 9 گرام، نیلہ توتیا سوختہ 3
 گرام۔ تمام دواؤں کو خوب باریک پیس کر ایک لیٹر گدھی کے دودھ میں مل کر کے پچکاری کریں۔
 شب میانی، مصطکی، نیلہ توتیا بریاں، مردار سنگ ہر ایک 6 گرام، سرمہ اصفہانی،
 مازوہنر، کات سفید، رسوت ہر ایک 12 گرام۔ تمام دواؤں کو 500 ٹی لیٹر میں بھگو دیں
 اور چھان کر انیون، روغن بہرہ، ہر ایک ایک ٹی لیٹر/گرام ملا کر چھان کر پچکاری کریں۔



عارضہ نقصان مناعت

AIDS

یہ ایک نہایت خطرناک متعدی مرض ہے، اس میں انسان کی قوت مناعت ضعیف / زائل ہو جاتی ہے اور طبیعت کا مدافعتی عمل کمزور پڑ جانے کی وجہ سے جسم میں تعدیہ قبول کرنے کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر کم و بیش ایک سو امراض عارض ہو سکتے ہیں۔ ضعف، بطلان عمل اور قتل کے بعد مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسباب

(I) ایچ آئی وی (Human Immuno Deficiency Virurs) نامی

تھب کا تعدیہ۔

(II) ہم جنسی۔

(III) زانی مزاج۔

علامات

امراضیاتی نقطہ نظر سے یہ تھب (Virus) خون کے کریات بیضا کے کریات

لغاد یہ (Lymphocytes-T4) کے خلیات پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے طبعی افعال کو متاثر

کرتے ہیں۔ چنانچہ کب کے دوران خون کے ذریعہ جسم میں سرایت کر کے Genes کو منتشر کر دیتے ہیں اور خلیہ کے ڈی این اے کو متاثر کر دیتے ہیں، یہاں ایک طویل عرصہ تک کسی طرح کا رد عمل پیدا کیے بغیر، خاموش، ساکن پڑے رہتے ہیں اور جب کبھی یہ فعال ہوتے ہیں تو نئے وائرس کے ذرات کربات لفافہ یہ۔ ٹی 4 کو شدت کے ساتھ برباد کرنے لگتے ہیں جس سے ان کی تعداد کے خلاف مزاحمت کمزور پڑنے لگتی ہے اور قوت مناعت بالکل معدوم اور زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو جسم پر انواع و اقسام کے وائرس اور جراثیم کے حملہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان مناعی طور پر بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔

درجہ اول:

اس مرض میں مریض صحت مند دکھائی دیتا ہے، جو دراصل اس وائرس (کب) کی مدت حفاظت ہے۔ تاہم مریض کو کسی قدر اضمحلال اور کسل مندی کا احساس ہوتا ہے، طبیعت بھی بھی ہوتی ہے، قوت فیصلہ متاثر ہو جاتی ہے۔

درجہ دوم:

اس مرحلے میں ایلیز کی مخصوص علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں چنانچہ 60 دن کے اندر غیر متوقع طور پر 4-5 کلو گرام تک وزن کم ہو جاتا ہے، رات کو پینہ آتا ہے۔ کسی ظاہری سبب کے بغیر جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے اور یہ صورت ہفتوں رہتی ہے۔ اسی طرح کسی سبب ظاہری کے بغیر خشک / تر کھانسی آتی رہتی ہے۔ کچھ ران، بغل اور گردن کی غدود لفافہ یہ میں ورم اور التهاب پیدا ہو جاتا ہے، منہ کے اندرونی حصہ میں سفید رنگ کے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں، جلد کا طبعی رنگ بھی بگڑ جاتا ہے، نیز منہ، ناک، مقعد اور جلد پر بھی ورم پیدا ہو جاتا ہے، کسی ذہنی یا جسمانی کارکردگی کے بغیر کمزوری اور لاغری محسوس ہوتی ہے۔

درجہ سوم:

اس مرحلے میں قوت مناعت بالکل معدوم ہو جاتی ہے اور مریض میں دوسرے

امراض سے تحفظ/دفاع کی صلاحیت باطل ختم ہو جاتی ہے اور سیکڑوں طرح کے عوارض میں مبتلا ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔

عارضہ نقصان قوت مناعت (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) کی تشخیص کے سلسلے میں ابھی تک کوئی یقینی اور واضح تشخیصی اصول کا پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ کسی مخصوص ٹسٹ کے ذریعہ جسم کی قوت مناعت معلوم کرنا ہنوز دشوار ہے۔ تاہم سرلیٹ کی روئیداد خصوصاً معاشرتی اور ہمسی روئیداد سے ایڈز کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اور درج ذیل ٹسٹ سے اس مرض کی تشخیص میں بہر حال مدد ملتی ہے۔

(I) آئی بی/ڈبلو بی ٹسٹ (Immuno Blotting/ Western

- Blotting Test)

(II) آر آئی پی اے (Radio Immuno Precipitation

- Analysis)

اصول علاج

0 — مقوی اعصاب اور محرک دوائیں استعمال کرائیں۔

0 — حسب ضرورت محلات استعمال کرائیں۔

0 — مانع و دافع کتب (Anti Viral) دوائیں استعمال کرائیں۔

0 — مبرد و خشک تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کریں۔

0 — جسم میں فرہی لانے کی تدابیر کریں اور مفرحات استعمال کرائیں۔

علاج

0 — تقویت اعصاب کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں:

گاؤ زبان 35 گرام، کشیز خشک مقشر، ابریشم خاص مقطر، بہمن سرخ، بہمن سفید،

گل گاؤ زبان، صندل سفید، تخم بالنگو، تخم فرنج مکھ، بادرنجبویہ، اسطوخودوس، تودری سفید،

تودری سرخ، ہر ایک 12 گرام — تمام دواؤں کو 2 لیٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں

اور صبح کو جوش دے کر نصف پانی اڑادیں۔ اس کے بعد مل چھان کر نبات سفید/شکر 1200 گرام ملا کر قوام تیار کریں اور ہر 2 گرام باریک تھن کر کے ملائیں اس کے بعد ورق طلا، ورق نقرہ ہر ایک 6 گرام اضافہ کر کے خوب ملائیں اور 3-6 گرام، ہمراہ عرق بادیان، صبح کو استعمال کرائیں۔

یہ نسخہ بھی سودمند ہے:

ابریشم مقرض خام 500 گرام، اگر 4 گرام، سنبل الطیب، پوست ترنج، معطلی رومی، قزقل، دانہ ہیل خورد، ساونج ہندی، ہر ایک 5 گرام، صندل سفید 6 گرام، عرق گلاب، عرق گاؤ زبان، عرق بید مشک، آب سیب، آب انار، آب ہی، ہر ایک 165 ملی لیٹر، بارش کا پانی 2 لیٹر — تمام دواؤں کو مذکورہ عرقیات اور پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر چینی 120 گرام، شہد 250 ملی لیٹر ملا کر خیرہ کا قوام تیار کریں اور زعفران 5 گرام کو عرق بید مشک، میں حل کر کے قوام کو خوب گھوٹیں، ورق نقرہ 6 گرام ملا کر خوب حل کریں اور 7-9 گرام ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں۔

یا قوت رانی 3 گرام، مرداریدہ مسفہ 60 گرام، کھریا شمی 18 گرام، مشک خالص لا جو رد مفسول، ہر ایک 3.5 گرام، کندر، تمام ہر ایک 7 گرام، زعفران، عود ہر ایک 9 گرام، درونج عقرلی، اسطوخودوس ہر ایک 6 گرام، حنبر اشہب 8 گرام، دار چینی 12 گرام — تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے شہد/شکر تین گنا کے قوام میں ملائیں اور 3-5 گرام، ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

0 — قدیم اطباء نے شبنم و غلہ میں یہ نسخہ استعمال کرایا ہے — چونکہ اس مرض کے عوارض شبنم و غلہ سے نہ صرف ملتے جلتے ہیں بلکہ اس مرض کی قبولیت کی استعداد شبنم و غلہ کے عادی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ دوائیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔
خم سنبالو، خم سداب، ہموزن کو باریک پیس کر 5 گرام ہمراہ شربت گاؤ زبان 35 ملی لیٹر نوش کرائیں۔

خم بہدانہ، خم کاہور، ہر ایک 4 گرام کو باریک پیس کر شربت فواکہ 35 ملی لیٹر استعمال کرائیں۔

جذام LEPROSY

اس مرض میں جلد پر مخصوص قسم کے ابھار (گوثر) پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعصاب میں درم پیدا ہو کر متاثر عصبی شاخ سے متعلق اعضا میں بے حس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پیروں کی انگلیوں، ناک اور کان وغیرہ پر بے حس/خدر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اعضا متروہ اور بے حس ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، مریض کی شکل خوفناک ہو جاتی ہے۔

اقسام

جذام Leprosy



اسباب

- (I) خون کی سودا دیت / فساد / احتراق۔
- (II) سیماب / خام کشتہ حالت کا استعمال۔
- (III) بدبودار خشک مچھلیوں کا بکثرت استعمال۔
- (IV) ناقص، غلیظ غذائیں۔
- (V) حیض / نفاس کی حالت میں مباشرت۔
- (VI) غلیظ و کثیف رہنا۔
- (VII) میکوبیکٹیریم لپرائے (Mycobacterium Laprae) نامی خورد

بجی جڑوہ)

علامات

عمومی:

مرضی علامات ٹیکڑیائی سرایت کے 6 ماہ۔ 20 سال کے بعد رونما ہوتی ہیں۔ ابتدا میں جسم کا رنگ سرخ، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جنس میں دشواری ہوتی ہے، بکثرت چھینکیں آتی ہیں، نتھنے اندر سے خشک ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی بو کا احساس نہیں ہوتا گویا قوت شامہ باطل ہو جاتی ہے، چہرے اور سینہ سے بکثرت پسینہ آتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے، مریض کی آواز بھاری، کھکھیائی ہوئی ہوتی ہے، ہال پتلے ہو جاتے ہیں، زبان کی عروق دبیز ہو جاتی ہیں، جسم پر بھاری بوجھ کا احساس ہوتا ہے، مفاصل میں انجماد اور تضیق ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد مخصوص علامات رونما ہوتی ہیں۔

خصوصی:

(I) جذام عقبری:

اس میں مرض کا دائرہ اثر جلد اور عشا مخاطی تک ہوتا ہے، ابتدا میں اضمحلال اور

عدم انشراح (پرمردگی اور طبیعت میں یوجصل پن) کی شکایت ہوتی ہے، سوء ہضم، اسہال اور غنودگی وغیرہ رونما ہوتی ہے، اس کے بعد جی مفرہ (Remittant Fever) کی طرح کا بخار ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد ظاہر جلد پر سرخ، چمکدار اور ابھرے ہوئے دھبے نمودار ہوتے ہیں، یہ جسم کے کھلے حصوں پر عام طور سے ہوتے ہیں، چند یوم بعد دھبے زائل ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ بخار آنے پر ابھر آتے ہیں اور پھر ان پر چھوٹے چھوٹے سخت دانے پیدا ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ خروشے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور رنگ زردی مائل، بھورا ہو جاتا ہے۔ یہ عقد/ابھار/کافضیں جسم کے کھلے حصوں، پیشانی، ناک، کان کی لو وغیرہ پر بکثرت ہوتی ہیں۔ یہ اعضا متورم ہو جاتے ہیں، سر کے بال بھورے اور سفید ہو کر گرنے لگتے ہیں، ناک بہتی ہے جس میں یہ جڑوے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی جاری رہتا ہے، پچھلے متورم اور مسترخ ہو جاتے ہیں، اور ان میں چھوٹی چھوٹی سخت گرہیں پیدا ہو جاتی ہیں، چہرہ مخصوص شکل کا ہو جاتا ہے، اطراف (ہاتھ پیر) بے ڈول اور بے حس ہو جاتے ہیں، نالو اور ناک کی ہڈی میں تامل پیدا ہوتا ہے اور اعضا گلنے لگتے ہیں۔

(II) جذام خدری:

اس صورت میں مرض کا اثر اعصاب اور مرکز اعصاب پر ہوتا ہے، مخملی اعصاب اس مرض سے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ابتدا میں طبیعت کمدر رہتی ہے اور جسم میں خفیف سی حرارت رہتی ہے۔ اس کے بعد اعضا میں تیز سنسنہٹ/جھنجھٹ محسوس ہوتی ہے، درد اور چھین بھی ہوتی ہے۔ جڑوے اعصاب جلد میں اپنی تعداد بڑھانے لگتے ہیں جن کی وجہ سے التہابی اور انحطاطی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ عصبی عوارض کی وجہ سے عصبی درد کا آغاز ہو جاتا ہے، جلد، عظام اور دوسری ساختوں میں کمزوری اور لاغری پیدا ہو جاتی ہے، متاثر مقام کی حس زائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مقام پر کسی بھی طرح کا احساس مفقود ہو جاتا ہے، بے حس اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آگ وغیرہ کی حرارت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے پورے سخت، چمکدار اور متورم ہو جاتے ہیں اور لونی مادہ میں کمی واقع

ہونے کی وجہ سے مقامی جلد کا رنگ بھورا/سفید ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد پورے مردار ہو کر گلے، سڑنے لگتے ہیں، ناک بیٹھ جاتی ہے، ہاتھ، پیر، بلکہ اعضا کے بڑے بڑے حصے بھی خلیات کی موت کی وجہ سے مردار ہو کر لٹک جاتے ہیں۔ بعض اوقات مفاصل کھل جاتے ہیں اور مریض لولا لٹکڑا ہو جاتا ہے، ذہول اور اسہال کی وجہ سے مریض نہایت کمزور ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔

(III) جذام مرکب:

اس میں جذام عقدی اور جذام خدری، دونوں کی مخصوص علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ کبھی مرض کی ابتدا جذام عقدی سے ہوتی ہے اس کے بعد ٹھیلی اعصاب متاثر ہو کر جذام خدری رونما ہوتا ہے، دور کبھی مرض کا آغاز ٹھیلی اعصاب کے متاثر ہونے اور جذام خدری سے ہوتا ہے اور انجام جذام عقدی پر۔ بہر حال چند سال کے بعد، انجام کار موت واقع ہو جاتی ہے۔

اصول علاج

- 0 — خلط غالب/فاسد کا حقیقہ کریں۔
- 0 — مصفیات استعمال کرائیں۔
- 0 — تربیب مزاج کریں۔
- 0 — مریض کو علاحدہ مقام پر رکھیں اور اس کے استعمال کی تمام اشیاء بھی علاحدہ رکھیں۔

علاج

- 0 — حسب ضرورت صاف/اسلیم/باسلین کی فصد کھولیں۔
- 0 — خلط فاسد کے نفیج و حقیقہ کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ منہج سوداء:

شاہترہ، بادیان، اسطوخودوس، ہر ایک 7 گرام، گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اصل السوس
مغشتر، ہر ایک 4 گرام، جیرسیاوشاں 5 گرام، سپتاں 11 عدد، عناب دلائی 5 عدد — تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان لیں اور گلقدہ آفتابی 25 گرام حل کر کے نوش
کرائیں۔ جب نسخہ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل:

ہلیلہ سیاہ 30 گرام، افیتون دلائی 27 گرام، برگ سناہ کی، اسطوخودوس، ہر ایک
21 گرام، برفانج نمکوفتہ 15 گرام، گل سرخ 12 گرام، برگ گاؤ زبان، برگ بادرنجبویہ، ہر
ایک 9 گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک 6 گرام، تربد موصوف 3 گرام، دھجیل 1.5 گرام،
خریق سیاہ 1 گرام — تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر ل چھان لیں اور حجر ارشی، لاجورد
مفسول، نمک سیاہ، غاریقون، فحم، حظل، صبر ستوطری ہر ایک 1 گرام ملا کر نوش کرائیں۔
0 — غلبہ خون کی صورت میں فصد کے ذریعہ حسب قوت زیادہ مقدار میں
خون نکالیں اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

گل سرخ، گل بنفشہ، عنب المقلب، فحم کاسنی، شاہترہ، چرائیہ، افیتون، برفانج،
صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک 7 گرام، عناب 9 عدد — تمام دواؤں کو عرق گلاب، عرق
شاہترہ، ہر ایک 500 ملی لیٹر، بھگو دیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر ل چھان کر گلقدہ
25 گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ شام کو بھی یہی نسخہ استعمال کرائیں۔ 15-16 دن تک یہی
نسخہ استعمال کرائیں، اس کے بعد اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کا اضافہ کریں۔

برگ سناہ، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کاہلی، ہلیلہ سیاہ، ہر ایک 5 گرام،
مغز فلوں خیار صغیر ترنجبین، ہر ایک 60 گرام، شیر خشت 35 گرام — تمام دواؤں کو
عرق گلاب میں تر کر کے گلقدہ 35 گرام، روغن بادام 6 ملی لیٹر اضافہ کر کے ل چھان کر
نوش کرائیں۔ دوسرے دن تہریہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

خیرہ گاؤ زبان 12 گرام، ورق فقرہ ایک عدد میں پیٹ کر کھلائیں اس کے بعد شیرہ عتاب 5 گرام، عرق شاہترہ/عرق مرکب مصفی خون 150 ملی لیٹر میں نکال کر شربت عتاب 50 ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

0 — تربیب مزاج کے لیے درج ذیل نسخہ/تدابیر بروئے کار لائیں۔

بکری کا دودھ نوش کرائیں۔

روغن کدو، عورت کا دودھ ناک میں چکائیں۔

مام الجھن نوش کرائیں۔

حمام کے بعد روغن کدو/روغن بنفشہ کی جسم پر مالش کریں۔

0 — جذام میں اطباء نے درج ذیل نسخوں کو مفید پایا ہے۔

برہم ڈنڈی تازہ 25 گرام، قفل سیاہ 7 عدد — دلوں کو پانی میں پیس کر نوش

کرائیں۔

برگ حتا 12 گرام، کورات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اس کا زلال

حاصل کر کے نبات سفید 12 گرام سے شیریں کر کے 40 دن تک نوش کرائیں۔

شاہترہ، برہم ڈنڈی، گلند باہری، پوست ہلیہ زرد، ہموزن — تمام دواؤں کو نمکوب

کر کے 12 گرام دوا کورات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں۔

سعد کوئی، چراغہ، پانچگی، پوست بکائن، صندل سفید، ہر ایک 3 گرام، گلو، پوست

ہلیہ، آملہ، ہر ایک 4 گرام، باؤ بڑنگ، زرد چوب، تچ، زنجبیل، اندر جو، سنگلی، بھنگرہ، کھٹائی

کلاں، بچے سار، ہر ایک 2.5 گرام — تمام دواؤں کو 500 ملی لیٹر پانی میں جوش دیں،

جب 85 ملی لیٹر پانی بچ رہے تو چھان کر شہد 12 ملی لیٹر نبات سفید 13.5 گرام، حل کر

کے نوش کرائیں۔

پوست شاخ نیم، پوست بچ نیم، برگ نیم، پوست شاخ انجیر دھتی، ہر ایک 85

گرام، کشیز، شاہترہ، چراغہ، منڈی، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابل، ہلیہ سیاہ، آملہ،

فیطرج، گل سرخ بادیان، سناہ کی، درون عقری، بھانج، ہر ایک 35 گرام — تمام دواؤں

کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد کے قوام میں معجون بنائیں اور 12 گرام ہمراہ عرق شاہترہ صبح، شام استعمال کرائیں۔

0 — مصفی کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں:

سر پھوکہ، چراغ، چوب تحسینار، گل منڈی، خم نیم، خم بکائن، پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کالبی، ہلیہ سیاہ، پوست ہلیہ آملہ، دھاسہ، زرد چوب، ہر ایک 125 گرام، پوست درخت نیم، پوست درخت بکائن، نل کلنھی، خم پنواڑ، کشیز خشک، گل نیم، گل نیلوفر، گل بکائن، گل سرخ، خم کاسنی، بخ کاسنی، ہر ایک 250 گرام، گل بنفشہ، برگ گاؤ زبان، شیطرج ہندی، ہر ایک 60 گرام، باجی 50 گرام — تمام دواؤں کو نمکوب کر کے 20 لیٹر پانی میں بھگو دیں، 30 گھنٹے بعد 8 لیٹر عرق کشید کریں اور 125 ملی لیٹر درج ذیل معجون کے ساتھ روزانہ نوش کرائیں۔

نسخہ معجون:

گل سرخ، گل گاؤ زبان، گل نیلوفر، گل بنفشہ، خم بادرنجبویہ، بادرنجبویہ خم شاہترہ، برگ گاؤ زبان، ہر ایک 12 گرام، بمقاج فصیحی، خم کاسنی، مویرہ منقی، انقیون دلائی، ہر ایک 25 گرام، عناب دلائی، بادیان، سنبل الطیب، عود عرق، ہر ایک 3 گرام — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر محفوظ کر لیں، مربی آملہ، مربی ہلیہ 7 ہر ایک 6 عدد عرق لکاب، عرق کیڑہ میں بھگو کر گھٹلیاں نکال لیں اور مل چھان کر دو گنا شہد اور ہوزن نبات سفید کے ساتھ قوام تیار کریں اور مذکورہ سنوف ڈال کر حسب دستور معجون تیار کریں۔ 12-6 گرام، مذکورہ عرق کے ساتھ دیں۔

0 — ملحوظ رہے کہ اس مرض سے ابتدائی مرحلے میں شفا حاصل ہو سکتی ہے۔

بعد میں شفا مشکل ہو جاتی ہے۔

مصادر

- 0 — اختیارات قاضی
ڈاکٹر اقبال احمد قاضی
پاٹلی پترالیتھو پریس، سبزی باغ، پٹنہ — 1987
- 0 — اکسیر اعظم (جلد سوم)
حکیم محمد اعظم خاں
مطبع نئی نول کشور، لکھنؤ — 1906
- 0 — اصول طب
حکیم محمد کمال الدین حسین ہمدانی
لیتھوکلر پرنٹرس، علی گڑھ — 1980
- 0 — امراض الاطفال
حکیم خورشید احمد شفقت اعظمی
سپریم آفسیٹ، مالویہ نگر، نئی دہلی — 1989

- 0 — بیاض کبیر (حصہ دوم)
حکیم محمد کبیر الدین
شوکت بک ڈپو، شوکت بازار، اندرون شاہ درسیہ گیٹ گجرات — 1977-78
- 0 — تجربات طیب
حکیم محمد سعید
نوید پرنٹنگ پریس، ناظم آباد — کراچی، 1983
- 0 — ترجمہ کبیر (جلد سوم)
حکیم محمد کبیر الدین
اسلامی پریس، بازار نور الامراء — حیدر آباد، 1950
- 0 — ترجمہ کبیر (جلد چہارم)
اسلامی پریس، بازار نور الامراء — حیدر آباد، 1960
- 0 — حمایت القانون (اردو ترجمہ)
عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا / حکیم محمد کبیر الدین
کوہ نور پرنٹنگ پریس — دہلی، 1959
- 0 — جامع الطالغ
حکیم انیس احمد صدیقی
لاہور آرٹ پریس — لاہور — 1985
- 0 — حمایت اجامیہ
حکیم محمد کبیر الدین
محبوب الطالغ پریس — دہلی — 1933
- 0 — الحادی الکبیر فی الطب (جلد 12-13)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرہ المعارف العثمانیہ حیدر آباد، دکن — 1962

- 0 ——— الحادی الکبیر فی الطب (جلد 14-15)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد، دکن — 1963
- 0 ——— الحادی الکبیر فی الطب (جلد 16-17)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد، دکن — 1964
- 0 ——— الحادی الکبیر فی الطب (جلد 18)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد، دکن — 1965
- 0 ——— الحادی الکبیر فی الطب (جلد 19)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد، دکن — 1966
- 0 ——— خزائن الطب
ڈاکٹر محمد نصیر الدین لاہور
- 0 ——— خزینۃ العلاج
حکیم محمد عبدالحکیم
- 1909 ——— مطبع مجبائی — لکھنؤ،
- 0 ——— دہلی کے منتخب مرکبات
حکیم رام بھایا
- 1979 ——— اعلیٰ پریس — دہلی،
- 0 ——— ذخیرہ خوارزم شاہی (اردو ترجمہ) جلد 5-9
سید اسماعیل جرجانی / حکیم ہادی حسین خان
مطبع فنی نول کشور — لکھنؤ، 1299ھ

- 0 — رہنمائے تشخیص
حکیم احتشام الحق قریشی
نظامی پریس لکھنؤ، 1984
- 0 — سرریات
حکیم سید محمد حسان نگرانی
نیو پبلک پریس، دہلی، 1988
- 0 — طفیلی اجسام
حکیم مرزا عبدالنور بیگ
سرفراز پریس — لکھنؤ، 1973
- 0 — طب اکبر
حکیم محمد اکبر ارزانی
ہندو پریس — 1281ھ
- 0 — عمل طب (ٹیلرز پریکٹس آف میڈیسن)
ای بی پولن / ڈاکٹر محمد عثمان، ڈاکٹر غلام دستگیر
دارالمطبع، جامعہ عثمانیہ سرکار عالیہ، حیدرآباد، دکن، 1945
- 0 — فردق الامراض
حکیم نذیر الدین احمد
محبوب الطابع برقی پریس، دہلی — 1938
- 0 — کتاب الحیات
حکیم سید علی حیدر جعفری
لیتھوکلر پرنٹرس، علی گڑھ — 1978
- 0 — کامل تشخیص
ڈاکٹر صادق حسین
حمایت الاسلام پریس، ریلوے روڈ، لاہور — 1981

- 0 ————— کامل الصناعہ (اردو ترجمہ) جلد اول و دوم
ابوالحسن علی بن العباس الجوسی / غلام حسین کشوری
مطبع خشی نول کشور، لکھنؤ — 1889
- 0 ————— کتاب الکلیات (اردو ترجمہ)
ابوالولید محمد بن رشد / سی، آر یو ایم
نیو پبلک پریس — دہلی، 1987
- 0 ————— فردوس الحکمت
ابوالحسن علی بن سہل بن الطبری / حکیم رشید اشرف ندوی
ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، کراچی — 1981
- 0 ————— القانون فی الطب (جلد 4)
شیخ الرئیس ابن سینا
مطبع نامی پریس، لکھنؤ — 1905
- 0 ————— مخزن حکمت (جلد اول)
حکیم غلام جیلانی
مفید عام پریس، چتر جی روڈ، لاہور — 1931
- 0 ————— مخزن حکمت (جلد 2)
حکیم غلام جیلانی
کھنہ لیتھو پریس، دہلی — 1957
- 0 ————— ماہیت الامراض
حکیم محمد شریف جاسمی
مصباح الحکمت موسوم بہ دستور العلاج
حکیم محمد فیروز الدین
دار الکتب، رفیق الاطباء، اندرون موچی دروازہ، لاہور — 1939
- 0 ————— رسالہ الحکیم نومبر، دسمبر 1932
لاہور.....

Learn Unani By Abdul Waris Salman

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی چند مطبوعات

ماہیت الامراض (ترمیم و اضافے کے ساتھ)



مصنف: سید اسد رضا زیدی

صفحات: 286

قیمت: 60/- روپے

علم الاودیہ یونانی دوا سازی



مصنف: محمد رaza علی

صفحات: 236

قیمت: 49/- روپے

ہمارے جسم کا معجزاتی نظام



مصنف: قیصر سر مست

صفحات: 216

قیمت: 41/- روپے

بچے کی صحت



مصنف: ستیہ گپتا

صفحات: 97

قیمت: 39/- روپے

ہندوستان کے مشہور اطباء



مصنف: حکیم حافظ سید صیب الرحمن

صفحات: 292

قیمت: 109/- روپے

فطری علاج



مصنفین: حسن الدین احمد

غلام احمد

صفحات: 114

قیمت: 46/- روپے

₹ 613/- (set)

ISBN: 978-81-7587-754-2



राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language

Farogh-e-Urdu Bhawan, FC- 33/9, Institutional Area,
Jasola, New Delhi-110 025

Learn Unani By Abdul Waris Salman

معالجات

جلد چہارم

Learn Unani By Abdul Waris Salman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

معالجات

جلد چہارم

امراض جلد و متعلقات جلد

حکیم وسیم احمد اعظمی



قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل

حکومت ہند

ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی-110066

فون 6179657, 6103381, 6103938

MOALIJAT Vol I r

By

Wasim Ahmad Azmi

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سنہ اشاعت : 1997 شک 1919

پہلا ایڈیشن : 2000

قیمت : 100/-

سلسلہ مطبوعات : 714

ناشر : ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان،

ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی۔ 110066

طابع : سپریم آفسیٹ پریس، المونیئم ٹرنی دہلی

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمو پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں جبلت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ٹھہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انھوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جاسکا، وہ بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو مادرِ تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہنی انسانی کی نشوونما طبی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو مادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خالی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست

99	جرب	13	محقق تشریح و متانج جلد
105	حک	19	برص
112	نار فارتی	24	بہق
119	قوبا	30	کلف
128	حصف	36	نمش
133	سقف	40	برش
140	بنات الیل	43	خیلان
144	شہور لبنیہ	49	خضرت و سواد
149	بطم	51	قتماہ
152	ہشور غریبہ	57	وشم
159	جاوسیہ	59	شری
164	نقاطہ	70	آثار قروح و جدری
171	حمہرت جلد	72	بادشنام
175	التهاب جلد	76	فساد لون
178	نقشہ جلد (صدفیہ)	82	تثا یل
83	سحوج جلد	88	خزاز و ابرید
185	نقشہ جلد	92	نملہ

	امراض شعر		شقوق جلد، اطراف و
291	مختصر تشریح و منافع شعر	188	وجہ و شفت
294	دار الثعلب	192	تشنج جلد راس
299	انتشار شعر	194	سقا قاذوس
304	تشقق شعر	197	اسره
307	صلح	200	خسر و تصقیع
312	شیب	203	انتقاج اصابع
317	نعامة	205	تقرح شد قین
319	تزیین شعر	208	کثرت عرق
	تخفظ شعر	212	احتباس عرق
	تطویل شعر	216	عرق الدم
321	انہات شعر	219	عرق مستن
324	منع نبات شعر	221	نتن جلد راس
325	حلق شعر	223	صنان
327	تجید شعر	227	ورم رتو
328	ابطاع شیب	231	ورم صلب
330	فعل و مقام صیبان	236	ورم ریجی
	امراض اظفار	239	فلغمونی
337	مختصر تشریح و منافع اظفار	244	قروح بلخیہ
338	ظفرہ طلقیہ	248	دبیلہ
341	تعقف اظفار	254	خراج
343	تشقق اظفار	258	دل
346	صفت اظفار	263	سرطان
		273	عرق مدنی
		279	دوالی
		283	دار الفیل

383	صدر (وجج المفاصل)	349	تفصیح اظفار
400	نقرس	352	احتقان دم تحت ظفر
412	وجج الظفر	354	رض اظفار
420	وجج القطن	356	جذام اظفار
423	وجج الخاصره	360	برص اظفار
427	وجج الركبه	363	تقلع اظفار
432	وجج الساقين	366	داخس
436	وجج العقب		
440	عرق النساء		
447	اورام مغاير	371	امراض مفاصل وعظام
		374	مختصر تشريح و منافع مفاصل وعظام
453	مصادر	380	حدید
			ريج الشوك

Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض جلد

Learn Unani By Abdul Waqar Salman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

تشریح

(i) Cuticle or Epidermis	(أ) بشرة
(ii) Cutis vera or Dermal	(ب) ادمة
Subcutaneous Tissue	(ج) منسوجات تحت الجلد

جلد کا بالافاضہ مکتبہ، قشمر، ۱۹۵۷ء سے ۱۹۶۱ء تک چھپنے لگا اور پرتہ دار
ہوتے ہوئے یہ اومہ (حقیت پر جاگ) ۱۹۶۱ء اور ۱۹۶۲ء میں دو دفعہ شائع ہوئی۔

اس کے دو سطح ہوتی ہیں،

(I) بالائی سطح :-

بالائی سطح کی ساخت میں سینک کی مانند چھوٹے چھوٹے ذرات پائے جاتے ہیں، جو گھس کر اترتے رہتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے ذرات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس طرح پرپسینہ کے مسامات ہوتے ہیں اور کہیں کہیں بال اور روئیں بھی دکھائی دیتے ہیں، طبی اصطلاح میں اس طبقے کو طبقہ قرنیہ (Corny Layer) یعنی سینک کی ساخت والی پرت کہا جاتا ہے۔

(II) زیریں سطح :-

یہ سطح لکڑہ نما ہوتی ہے، طبی اصطلاح میں اس طبقے کو طبقہ مخاطیہ شبکیہ (Retemucosum) کہتے ہیں، اس کی دبازت مختلف حصہ جسم میں مختلف ہوتی ہے، جلد کی تمام تر رنگت اس طبقے کی رہیں ہے، بالائی اور زیریں سطح کی یہ تقسیم بحیثیت مجموعی جلد کے فرالض میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتی، بلکہ جہاں یہ دونوں سطحیں بعض فرالض علاحدہ علاحدہ طور پر انجام دیتی ہیں وہیں ان میں شدید پیوستگی بھی ہوتی ہے، مثلاً بالائی طبقے کی زیریں سطح اور ادمہ کی بالائی سطح کے لکڑہ نما ہونے کی وجہ سے بالائی سطح اور ادمہ کے دندانے (لکڑے) ایک دوسرے کی سطح میں پیوست ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک چھپچھا سا لمفاوی مواد ہوتا ہے جو اس پیوستگی کو مزید مستحکم بناتا ہے، بشرہ کی ساخت میں خلیات کی کئی تہیں حصہ لیتی ہیں، بشرہ کی زیریں سطح جو ادمہ کی بالائی سطح سے ملتی ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو لمفاوی مادہ ہوتا ہے اس سے اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے، چنانچہ بشرہ کا وہ حصہ نرم، ملائم اور اسفنجی ہوتا ہے، یہاں کی خلیات میں زندگی ہوتی ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک خلیہ اپنی زندگی پوری کر کے مردہ ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک نیا ذی حیات خلیہ آ جاتا ہے اور نیچے سے اس کے

دباؤ کی وجہ سے مردہ خلیہ اوپر کی طرف کھسک جاتا ہے۔ یہاں مردنی کے نتیجے میں اس کی طبعی ملائمت اور نرمی جاتی رہتی ہے اور جب وہ ابھر کر بالائی سطح جلد پر آ جاتا ہے تو اور بھی زیادہ سخت اور بے جان ہو جاتا ہے، اور خارجی حوادث سے ادمہ کو محفوظ رکھنے کے فرائض انجام دینے لگتا ہے،

(ب) ادمہ :-

جلد کی یہ پرت زیادہ لمبلی اور مضبوط ہوتی ہے، مختلف غروں، اجناس اور اعضاء میں اس کی دیا زت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بوڑھوں اور عورتوں میں یہ سطح زیادہ دبیر، بچوں اور جوانوں میں نسبتاً پتلی ہوتی ہے، پتھیلیوں، پاؤں کے تلوؤں میں سب سے زیادہ دبیر، آنکھ کے پوٹوں، قفیب اور خصینوں میں سب زیادہ پتلی ہوتی ہے۔ اسی طرح خود اس کی اندرونی سطح کی نسبت بیرونی سطح زیادہ کثیف ہوتی ہے۔

ادمہ کی ساخت (بناوٹ) میں بھی دو طبقے حصہ لیتے ہیں، یہ کیسی، ریشہ دار انسب سے بنے ہوئے ہیں اور عروق دمویہ اور عصبی ریشے کا ان میں جال سا بچھا ہوا ہے،

(I) زیریں سطح :-

ادمہ کی زیریں سطح میں شحم کے ذرات اور پسینہ اور شحم پیدا کرنے والے غدود اور بال کی جڑوں کے نشیب پائے جاتے ہیں، عروق دمویہ عصبی ریشے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی ساخت میں ایسے عضلاتی ریشے بھی حصہ لیتے ہیں جو یرودت کے احساس پر سکڑتے اور حرارت کے نتیجے میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، - ادمہ کے اس طبقے کو طبی اصطلاح میں شبکیہ

(Reticular) کہا جاتا ہے،

(II) بالائی سطح:-

اس سطح پر، اوپر کی طرف چھوٹے چھوٹے مخروطی شکل کے ابھار ہوتے ہیں، ان میں حسی اعصاب کی شاخیں آکر ختم ہوتی ہیں، ان، کسی قدر شبہی ابھار کو اصطلاح طب میں رطوبت لمبہ (Papillae) کیا جاتا ہے، جس حصہ جسم میں قوت لمس زیادہ ہوتی ہے وہاں دراصل ابھار زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور جہاں یہ ابھار دور دور، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں قوت لمس زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، ان ابھاروں سے اعصاب کے کچھ تار (ریشے) کچھ بالائی جلد پر بھی آجاتے ہیں، تاہم اس مرحلے میں بھی حسی اعصاب کے اختتامی سروں پر جلد کی بالائی دبیز پرت موجود ہوتی ہے، اگر یہ پرت موجود نہ ہوتی تو ان کو چھونے پر لمس کی بجائے درد کا احساس ہوتا،

(ج) منسوجات تحت الجلد:-

یہ جلد کا سب سے نیچلا طبقہ ہے اور اس میں خمی مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، بال اور پسینہ کے کچھ غد بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، عروق کے ذریعہ اور تک دھوی رسد اسی کے ذریعہ ہوتی ہے، اعضاء میں تناسب قائم رکھنا بھی اسی کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی متعدی، دق، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طبقے کے خمی اجزاء میں کمی آنے لگتی ہے اور کچھ عرصہ بعد مرلین ٹریوں کا مار رہ جاتا ہے،

منافع

جلد کے ذریعہ بہت سے کام انجام پاتے ہیں، اور ان کی کارکردگی میں معمولی فتور، مرض کا باعث ہو سکتا ہے، ذیل میں اس کے وظائف اور منافع مختصر طور پر تحریر کیے جا رہے ہیں،

(I) اندرونی اعضاء کا تحفظ:-

جیسا کہ ابتدائی سطور میں تحریر کیا گیا ہے کہ جلد، اندرونی اعضاء اور گوشت، ہڈیوں وغیرہ کا لباس ہے، وہیں اس میں بیرونی صدمات اور کیمیائی رد عمل سے محفوظ رہنے اور رکھنے کی بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، اس کی اس کارکردگی میں بالائی جلد کا سینک نما رنگین مادہ اور شحم کی تہیں نمایاں حصہ لیتی ہیں، چنانچہ سینک نما خلیات بہت سے طبعی اور آلاتی صدمات کو روک لیتی ہیں اور سبھی تہیں شدید چوٹوں اور صدمات کو اندرون تک اثر انداز ہونے سے روک دیتی ہیں، اس طرح اندرونی جسم کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔

(II) انجذاب:-

جلد کا دوسرا بڑا کام، عمل انجذاب ہے اس سے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی، جراثیم وغیرہ جہاں اپنے طبعی قوی اور خواص کے ذریعہ خراش والے مقام سے اندرون جلد سرایت کرتے ہیں وہیں جلد کی اپنی قوت جذب بھی ان کے اس کام کو آسان بنا دیتی ہیں، اور اس قوت جذب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ روغنی / آبی رطوبات کا بھی انجذاب ہوتا ہے، جو دواؤں / تدابیر کے صورت میں استعمال کی جاتی ہیں۔

(III) دفع فضلات:-

جلد کا تیسرا اہم فعل، فضلات جسمانی کو باہر کی طرف دفع کرنا ہے، اگرچہ اس کا عمل امعاء اور گردوں کی نسبت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی یہ کارکردگی بہر حال اہمیت کی حامل ہے، بلکہ بعض امراض کلیہ (گردہ کی بیماریاں) میں جب اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے تو جلد دفع فضلات کا اپنا کام زیادہ وسیع پیمانے پر انجام دینے لگتی ہے، اس وجہ سے بعض حالات میں مرین کے جسم سے پیشاب کی سی بواقی ہے، پسینہ کے ساتھ ساتھ بعض نہایت

آپے اور خاسد مواد جلد ہی کے ذریعہ دفع ہوتے ہیں۔

(لا) توازن حرارت :-

جلد کا چوتھا اہم فعل، جسم کی حرارت میں توازن و اعتدال قائم رکھنا ہے، صحت کی حالت میں عام طور سے جسمانی حرارت ایک ہی حال پر رہتی ہے۔ اور جب کسی خارجی سبب سے جسم کو حرارت پہنچتی ہے تو اندرون جسم سے خون، جلد کی دموی عروق میں زیادہ مقدار میں آجاتا ہے، جہاں خارجی حرارت اس میں بخیری عمل شروع کر دیتی ہے اس طرح بڑھی ہوئی حرارت جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور پسینہ وغیرہ آکر جسمانی حرارت اعتدال پر آجاتی ہے، اس طرح خارجی برودت کی وجہ سے جب جسمانی حرارت میں کمی کا اندیشہ ہوتا ہے تو عروق دمویہ سکڑ جاتی ہیں، نتیجہ کے طور پر بخیری عمل بہت کم ہو جاتا ہے اس طرح حرارت اندرون جسم محصور ہو کر توازن رہتی ہے۔

(لا) حس :-

جلد کا پانچواں اہم فعل، احساس ہے، اس کی اسی قوت کی وجہ سے حرارت، برودت، اور درد وغیرہ کا احساس ہوتا ہے اور انسان مستقبل میں پیش آنے والے غیر متولی نمرات سے حفظ و تقدم کرتا ہے، انسان کے علاوہ بعض جاندار میں جلد کے ذریعہ عمل تنفس بھی انجام پاتا ہے، مینڈرک کو ۲۱ زمرے میں شمار کیا جاتا ہے،

برص

LEUCODERMA

اس مرض میں سطح جلد پر سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، — گوگرد، اس سے اعذار کے افادہ متاثر نہیں ہوتے تاہم مرینر کا معاشرتی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو ان کے بنا کر نفسیاتی احساسات کو اکثر کا باعث ہوتا ہے،

اقسام

اقسام بلو اظہر جات،

برص

Leucoderma

تیز رفتاری / المان پندیر

Improving

راہ / مروت / مروت

Quiescent

حاد / منتشر

Acute

اے اے اے

(D) قوت، تیز رفتاری اور قوت، تیز رفتاری

(E) مروت، مروت، مروت

(۱۱) متاثر عضو کا غذا میں بلغم کا زیادہ صرف ہونا

(۱۲) زیادہ خون

(۱۳) سینگیاں کھجوانا

(۱۴) سینہ درد لگانا / بعض اوقات غذا ذات وغیرہ / بند یا لگانا

(۱۵) نرودود کا استعمال / پلاسٹک کی چپل وغیرہ — نرودود کے استعمال سے

بروز متاثر ہوتا ہے،

(۱۶) دودھ ملو نہ کرکے

(۱۷) ۱۰ ماہوں کا لپا

علامات

متاثر عضو کا جامد کارنگ، سفید، ہوا ہوتا ہے، سفیدی کا اثر نہ صرف جلد بلکہ اندر تک ہوتا ہے، سطح جلد نسبتاً زیادہ چکن ہوتی ہے، بعض اطباء کا خیال ہے کہ دودھ، ہما گوشت، بغیر خون والے حیوانات کے گوشت جیسا ہوتا ہے، متاثرہ جسم کا ہمارا سطح کبھی دبی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی عام سطح کے برابر ہوتی ہے، اس پر انگٹے والے بال کچھ عرصہ بعد سفید ہو سکتے ہیں، اطباء کا خیال ہے کہ پپوٹوں، (پپوٹوں کے روتا)، (پوروتا)، ہونٹوں اور مناسل پر نمودار ہونے والا برص دیر میں اچھا ہوتا ہے، میرا کچھ ہذا پر ہے، اسی طرح اگر متاثرہ جلد کو گرگڑنے پر دہ سرخ ہونا ہے تو کچھ بار شفا آتا ہے، اگر جلد کو اٹھا کر سوئی چھبھونے پر سفید رطوبت خارج ہو تو یہ مرض کے مستحکم ہو جانے کی علامت ہے ایسی صورت میں شفا یا تو دشوار ہوتی ہے اور اس کے برخلاف، سرخ، مائل رطوبت / خون نکلے تو بہت جلد شفا حاصل ہوتی ہے۔

متاثرہ مرض اگر بہت جلد بڑھتا ہے چنانچہ داغ کا رقبہ بھی بڑھتا ہے اور

رسمتوں پر شفا داغ نمودار ہوتے ہیں۔ برص ساکن میں

متاثرہ مرض اگر دیر میں لگے محدود ہوتا ہے

اگر متاثرہ مرض اگر دیر میں لگے اور مقام مرض معمولی رہے

سے سرخ ہو جاتا ہے، میرے مشاہدے میں اس طرح کے متعدد واقعات آئے ہیں کہ مرد کے نرودھ استعمال کرنے، عورتوں میں سینہ در لگانے، بندیا لگانے کے بعد دوسرے دن وہاں کی جلد سفید ہو گئی، اسی طرح بعض مریضوں میں ہلا شنگ کے چپل پہننے سے بھی یہ مریض رونما ہوا ہے، چنانچہ مریض سے استفادہ کے بعد مریض کے سبب کا پتہ چلتا ہے، ملحوظ رہے کہ یہ مریض بہت ہسٹیلہ ہے اور معمولی بد پرہیزی اور معالجہ میں لاپرواہی سے اور بھی شدت کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔

اصول علاج

- قوتِ غاذیہ، قوتِ مغیرہ و مشبہ میں تحریک اور قوت پیدا کرنے کی تدابیر کریں،
- مصیفات استعمال کرائیں
- بلغمی خلط کا تنقیہ کریں۔
- تولید خون میں معاون غذائیں استعمال کرائیں / فولاد کے مرکبات استعمال کرائیں،
- بلغم کی تولید میں معاون غذاؤں کا استعمال لازمی طور پر بند کرادیں،

علاج

- تنقیہ بلغم کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔
- برگ ستارہ کی، تربہ سفید، حب النیل، شحم خنظل ہر ایک ۹ گرام، سیلنہ، کیترا، مقل اندق کل سرخ، سنبل الطیب، صمغ عربی، نمک سیاہ، ہر ایک ۳ گرام، حب الملوک مدبر، ۹ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے روغن گل ۳ ملی لیٹر سے چرب کریں اور شہد ۲ ملی لیٹر میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں ۱-۲ گولیاں استعمال کرائیں،
- ہلیلہ کلاں، زرد چوب، نمک لاہوری ہموزان۔ تمام دواؤں کو باریک،

پیس کر شیرہ حنظل میں تین دن کھل کر پیا اور جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ۱ — گولیاں کھلائیں۔

○ مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
 سر پھوک، برگ شاہترہ، گل سرخ، پوست ہلیلہ زرد، تخم کشنیز، ہر ایک ۳ گرام،
 دھلیا، مندل سفید، برہم ٹونڈی، نیل کنٹھی، ہر ایک ۵ گرام، برگ حنا ۲ گرام، فلفل
 سیاہ، گل کچنال، زیرہ سفید، ہر ایک ایک گرام، برگ بکائون، برگ گندم، ہر ایک ۱۲ گرام،
 کشنیز اور برگ حنا کے علاوہ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر سفوف تیار
 کریں اور کشنیز و برگ حنا کو پانی میں بھگو کر مل چھان لیں اور اسی پانی میں سفوف کو
 گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۲ — ۴ گولیاں صبح کو پانی کے ہمراہ کھلائیں۔
 ○ تنقیہ بلغم اور تصفیہ خون کے نسخوں کے بعد یہ دوائیں بروئے کار
 لائیں۔

بابی، تخم پنواڑ، انجیر زرد، چاکسو، ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں
 کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ایک پوٹلی میں باندھ کر رات کے وقت گرم پانی میں
 بھگو دیں اور صبح کو اس کا زلال نوش کرائیں، اور پھوک (فلفل) کو پیس کر
 مقام مرض پر ضما د کریں،

بابی، شکر ہوزن - دونوں کو پیس کر ۱۸ گرام، یومید استعمال کرائیں
 جندبیدسترہ ۲ گرام، عاقر قرحا ۵ گرام، تخم شقائق النعمان ۱ گرام، اطرطال
 ۳ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر ۷ خوراک بنائیں اور روزانہ ایک خوراک
 ہمراہ آب نیم گرم کھلائیں اس کے بعد مریض کو کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنے کی تاکید کریں۔
 عاقر قرحا، تربہ سفید، زنجبیل، ہر ایک ۲ گرام، اطرطال ۳ گرام
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر شہد تین گنا کے قوام میں بخون تیار کریں اور ۳ گرام، روزانہ
 کھلائیں، کھلانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنے کی ہدایت کریں۔

گلنار، گبرو، گندھک، املہ سار، بابی، ہوزن، تمام دواؤں کا سفوف
 تیار کریں اور ۵ گرام کی مقدار میں پوٹلی میں باندھ کر رات کے وقت گرم پانی میں
 ڈال دیں اور دن میں اس کے زلال کو نوش کرائیں، اور پھوک کو

داعوں پر لگائیں۔

○ ——— خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں

بابی، تخم پنواڑ، فوہ، اجمود، تخم ترب، کدھک، آمہ سار، ہڑتال طبعی، منفر
جمال گوڑ، تخم پلاس، ہیرا کیس، ہر ایک ۵ گرام۔ ——— تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر سرکہ میں گولیاں بنائیں اور خشک کر لیں، ضرورت کے وقت ایک گولی کو سرکہ
میں گھس کر مقام برص پر لگائیں۔

لہسن، نوشادر، توتیا، ہموزن، ——— تمام دواؤں کو آب لیموں میں

پیس کر طلا کریں، اسپند ۷ گرام، سہاگ تیلہ ۵۰ گرام، زعفران، آمہ، ہر ایک ۵، ۳ گرام ———
اسپند اور آمہ کو رات کے وقت تھوڑے پانی میں بھگو دیں، صبح کو آب بھاؤ سے خوب
باریک پیس کر سہاگ اور زعفران حل کر کے طلا کریں۔

مازو، شیطرچ، پھلی کی ہڈی راکھ، سرکہ، زاج سرخ، ہموزن، ———
تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی سے گوندھ کر ٹیکہ بنائیں اور خشک کریں، حسب ضرورت
ایک ٹیکہ سرکہ میں گھس کر طلا کریں۔

حب السلاطین، خردل کو پانی میں پیس کر طلا کریں، ——— سوزش
موس ہو تو یب کو ہٹا کر روغن گل لگائیں،

— ○ —

بہق

PITYRIASIS

اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ پر، خاص طور سے گردن، سینہ، بازو اور شکم پر مختلف رنگوں کے داغ پیدا ہو جاتے ہیں اور انہی رنگوں کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی جاتی ہے،

اقسام

بہق

Pityriasis

بہق اسود
Pityriasis Nigra

بہق ابیض
Pityriasis Alba

اسباب

- (۱) قوت متغیر و بدن کا معمولی ضعف
- (۲) خون میں بلغمی اجزاء کی زیادتی
- (۳) سرد پانی سے غسل کرنا / موسم سرما کی سرد ہوائیں

(IV) سوداء / آمیز خون کا جلد کی طرف جانا / غلیظ سوداء (خون میں)
 (V) جلد میں ایسے تغیرات واقع ہونا کہ وہاں پہنچنے والا خون، سوداء میں
 مستحیل ہو جائے۔

(VI) احتباس حیض
 (VII) غلیظ، سوداوی غذاؤں، _____ مثلاً شور مچلی، بیگن وغیرہ کا
 بکثرت استعمال۔

جدید اطباء کے نزدیک اس کا اصل سبب ہنوز نامعلوم ہے، تاہم ان لوگوں کا
 خیال ہے کہ یہ مرض درج ذیل حالات میں کثیر الوقوع ہے، اس لیے ان حالات کو کسی حد
 تک سبب کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

(I) کم درجہ کا اسٹریپٹوکوکل تعدیہ =
 Low Grade Streptococcal Infection

(II) زحیر

(III) التهاب معدی معوی

Broad Spectrum Antibiotics

(IV)

Lack of Sunlight

(V) دھوپ کی کمی

(VI) جسم میں بعض حیاتیات کی کمی،

علامات

(I) بہق ابھین :-

ابتداء میں چھوٹے چھوٹے، خفیف زردی مائل دھبے پیدا ہوتے ہیں جو رفتہ رفتہ
 بڑھتے جاتے ہیں اور باہم مل کر بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ زردی مائل
 سفید ہو جاتا ہے، _____ ان کی ذاتی سطح، جلد کی سطح سے کسی قدر اونچی ہوتی
 ہے لیکن عام مشاہدہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا، سطح پر چمکا ہٹ بھی عام جلد کی سطح
 سے زائد ہوتی ہے اور اس پر نہایت باریک چھوٹی چھوٹی بھوسا لگی رہتی ہے،
 بعض مریضوں کو مقام مرض پر شدید خارش محسوس ہوتی ہے اور بعض کو خارش وغیرہ
 کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، _____ ملحوظ رہے کہ بہق ابھین کا داغ عام طور سے

گولائی لیے ہوتا ہے، اور اس پر اگنے والا بال سیاہ یا بھورا ہوتا ہے اور مرض کا اثر برص کے برخلاف گہرائی تک نہیں ہوتا، اسی لیے سوئی چھونے سے وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ — بلغمی مزاج لوگوں میں کثیر الوقوع ہے۔

(۳) بہق اسودہ۔

ابتداء میں چھوٹے چھوٹے سیاہی مائل داغ پیدا ہوتے ہیں جو بتدریج پھیل کر بہت بڑا دائرہ بنالیتے ہیں اور مزید سیاہ ہو جاتے ہیں، اس متاثرہ حصہ کو خوب رگڑتے سے بھوسا بھڑتی ہے اور وہ مقام سرخ ہو جاتا ہے، یہ نوع صفرادی مزاج نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ شدید حالات میں یہی نوع ”برص“ میں مستحیل ہو جاتی ہے،

اصول علاج

- — بہق ابیض میں بلغمی خلط کے تنقیہ کی تدابیر کریں۔
- — غلیظ، دیر، ہضم اور بلغم کی تولید میں معاون غذاؤں سے پرہیز کریں۔

- — جسمانی صفائی اور طہارت پر بھی توجہ دلائیں،
- — بہق اسود میں سوداوی خلط کا تنقیہ کریں۔
- — فصد کھولیں،
- — سوداوی خلط کی تولید میں معاون غذاؤں سے پرہیز کریں،

علاج

- — بلغمی خلط کے تنقیہ کے لیے مسہل کی غرض سے یہ نسخے استعمال کریں،
- ایارچ فیکراہ، مرہم گرام، تربد موصوف مقشر، گرام، حب البیل، غاریقون مغرل،

انسون، شحم حنظل، ہر ایک ایک گرام، صمغ عربی، کبیرا، نمک ہندی، مصطکی رومی، گل سرخ، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، مقل اذرق ۵۰۰ گرام۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر روغن بادام ۹ ملی لیٹر میں چرب کر کے آب مقل کی مدد سے دائرہ ماش کے برابر گولیاں بنائیں اور ۱۲ گولی رات کو اور باقی نصف صبح کو تہاڑے کھلائیں، پوست حنظل، شحم حنظل، ہر ایک ۲۵ گرام، بیخ حنظل ۳۰ گرام، انیتمون دلائی (پوٹلی میں باندھ کر) سنار مکی، ہر ایک ۱۳ گرام، تمام دواؤں کو ۵۰۰ ملی لی لیٹر پانی میں جوش دیں جب ۲۵۰ ملی لیٹر باقی رہے تو چھان کر شکر ہوزن ملا کر شربت بنائیں اور ۲۵۰ — ۵۰۰ ملی لیٹر نوش کرائیں، خوردنی طور پر یہ نسخے بھی مفید ہیں

بھلاواں (گھنڈی دور کیا ہوا) ۲۵۰ گرام کو گائے کے ۱۲۵۰ ملی لیٹر دودھ میں جوش دیں، جب دودھ گاڑھا ہو کر جم جائے تو بھلاواں کو نکال کر صاف کر کے کبجہ سیاہ ۲۵۰ گرام کے ساتھ باریک کریں جب خوب مل جائیں تو دار چینی، جوز بوا، سادج، نارنگ، قرفل، قسط تلخ، ہر ایک ۲۵ گرام، بلبہ سیاہ، بابچی، ہر ایک ۲۵۰ گرام، کوٹ چھان کر ملائیں اور شہد خالص، ۵۰۰ ملی لیٹر شکر ۵۰۰ گرام کے قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۲۴ گرام صبح، شام استعمال کرائیں۔ بولست بلبہ کابلی، پوست بلبہ، آملہ، برگ سنار مکی، ہر ایک ۳۵ گرام، دوقو ۵۰ گرام، وج ۸۵ گرام، مصطکی رومی ۵۰۰ گرام، افسنتین رومی ۱۱ گرام، مویر مستقی، ۹ عدد، تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے شہد کے قوام میں اطرینفل بنائیں اور ۹ گرام صبح، شام استعمال کرائیں۔ خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں۔

صندل سفید، صندل سرخ، نشاستہ، ہر ایک ۱۲ گرام، سم الفار ۳۰۰ ملی گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر عرق گلاب میں حل کر کے لگائیں، مردار سنگ، گندھک آملہ سار، سہاگہ، تخم ترب، دال ہوزن، تمام دواؤں کو باریک کر کے عرق لیموں میں کھرل کر کے طلا کر لیں۔ سہاگہ خام، زریخ ہوزن، دونوں دواؤں کو پیس کر انبہ خام

شہی میں حل کر کے صماد کریں اور دھوپ میں بیٹھنے کی ہدایت کریں۔
 تخم ترب، باپچی، تخم سرس ہوزن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر سرکہ
 ملا کر مقام مضاف پر لگائیں،

تخم پنواڑ ۱۲۵ گرام، سرشفت زرد، اجوائن، باؤ بڑنگ، تخم ترب، زرد چوب،
 نمک سانجھر، صبر سقوٹری، سہاگہ بریاں، گوگھرو، دار ہلد، قسط تلخ ہر ایک ۷ گرام،
 توتیا سبز، ۳ گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک کر کے دہی میں ملا کر طلا کریں اور
 دھوپ میں بیٹھنے کی ہدایت کریں اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھوئیں،

نیلا توتیا، سم الغار، سہاگہ بریاں، ہر ایک ایک گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں
 کو پیس کر ۷ ملی گرام کی گولیاں بنائیں اور صندل کو آب لیموں میں گھسنے کے بعد
 ایک عدد گولی اس میں حل کریں اور صماد کریں۔ ایک گھنٹے بعد سرد پانی سے دھونے
 کی ہدایت کریں۔

آکاس بیل ۱۲۵ گرام، باپچی، توتیا، گندھک، سہاگہ، چوک، ہر ایک ۵۵ گرام،
 فلفل سیاہ ۳ گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پیس کر آب آکاس میں کھرل کر کے
 لگائیں۔

○۔۔۔۔۔ بہت سیاد میں سودا کے تنقیہ کے لیے خوردنی طور پر یہ
 نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل سودا :-

ہلیلہ سیاہ ۳۰ گرام، بسفانج نیمکوفتہ ۱۵ گرام، افیتون ولایتی ۲۸ گرام،
 (پوٹلی میں بندھا)، اسٹونخودس، برگ سنار مکی، ہر ایک ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام،
 برگ بادرنبویہ، برگ نکاؤ زبان، ہر ایک ۹ گرام، بادیان ۶ گرام، ترمید موصوف،
 ۳ گرام، زنجبیل ۵ گرام، خربق سیاہ ایک گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو
 پانی، بوجہ، دیر، اور مل چھوڑ کر غار لقون، لاجورد مغسول، نمک سیاہ، ہر ایک
 ۱ گرام پیس کر ۷ ملایتی اور نوش کرائیں،۔۔۔۔۔ حسب ضرورت صبر سقوٹری،
 تخم منطل، ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

ہلیلہ سیاہ، اقیتمون، ہموزن کو کوٹ چھان کر ۷۰ بنہ منقعی کے ساتھ ملائیں اور
حسب دستور معجون بنائیں اور ۲۵ گرام تنک استعمال کرائیں،
خوردنی طور پر یہ نسخے بھی مفید ہیں۔

ہلیلہ سیاہ، آملہ، شونیز، ہر ایک ۱۲ گرام، زیرہ سفید ۸ گرام۔
تمام دواؤں کا باریک سفوف تیار کریں، صبح اور رات میں سوتے وقت ۴ کر م
کھلائیں۔

پوست ہلیلہ کابل، پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، آملہ، زرشک ۱۰ گرام،
ہر ایک ۳۵ گرام، برگ شاہترہ، اقیتمون، یادہ نجویر، عود صلیب، ہر ایک ۲۵ گرام،
ترید سفید ۵ گرام، خالیقون ۱۰۰ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۷۰ بنہ منقعی کے ساتھ ملائیں اور
۵۰ گرام، عرق کیوڑہ، عرق گاؤ زبان، ہر ایک ۵۰۰ ملی میٹر میں ۱۰ گرام،
دوائیں ملائیں اور ۷۰۰ گرام استعمال کرائیں۔

خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں
کنکی سیاہ سرکہ میں پیس کر مقام مرض پر لگائیں
صندل سفید ایک گرام، سم الفار ۱۳ ملی گرام،
پیس کر بتلا پیپ کریں اور تھوڑی دیر بعد دھونے کے بعد اینٹ کریں۔
زرخ، زاج، گوگرد ہموزن کو کوٹ کر ۷۰ بنہ منقعی کے ساتھ ملائیں اور
مردار بننا سفتہ کو سرکہ کہنہ میں کھرا کر کے مقام مرض پر لگائیں۔



کلف

LENTIGO/FRECKLE


اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ کی جلد پر ہلکے پیلے، بھورے یا سیاہی مائل غیر لمبی دھبے رونما ہوتے ہیں، یہ دھبے (جائیاں) مختلف سائز کے ہوتے ہیں، چہرہ پر بشت، ہاتھ، پیشانی وغیرہ پر یہ دھبے کثیرالوقوع ہیں۔ یہ دھبے نفسیاتی الجھنوں کا باعث ہیں ورنہ مریض کی عام صحت پر اس سے کوئی خراب اثر مرتب نہیں ہوتا۔

اقسام

اسباب کے اعتبار سے اس کی متعدد انواع ہیں،

کلف

Freckles Lentigo



اسباب

- (I) دم غرق (جلا ہوا خون) کا عروقِ شعریہ کے ذریعہ سطحِ جلد تک پہنچ کر جمع ہونا۔
- (II) غیر معمولی خارجی حرارت / تمازت کا اثر انداز ہونا۔
- (III) مسلسل رگڑ / چوٹ / خراش / دباؤ۔

(۱۵) ایام حمل

(۱۶) حیف کی خرابی / بے اعتدالی

(۱۷) مائع حمل ادویہ کا استعمال

(۱۸) جگر کے بعض امراض — مثلاً

۱) ضعف جگر

۲) ضمور جگر

(۱۹) بعض امراض — مثلاً

۱) حکو و جرب مزمن

(۲) قمل عاذ

(۳) قوبا

(۴) نقاطات

(۵) حمی اجامہ

(۶) ضمور بانقراس

(۷) تشک

(۸) سرطان

(۹) وجع المفاصل

(۱۰) غوطہ جونی

(۱۱) لمحال کے بعض امراض

(۱۲) غلیظ اور سوداوی خلط پیدا کرنے والی غذاؤں کا بکثرت استعمال

علامات

(I) کلف حری :-

اس قسم میں کلف (جھائیاں) عام طور سے جسم کے کچے ہونے کی علامتوں پر رونما ہوتے ہیں اور متاثرہ حصہ کا رنگ بھورا یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے ،

(۱۱) کلف ضربی :-

مسلسل رگڑ، خراش وغیرہ کے پڑنے کی روئیداد ملتی ہے اور وہاں کی جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے، ————— یہ نوع پوشیدہ اعصاب میں کثیرالوقوع ہے،

(۱۲) کلف رحمی :-

اس میں جھائیاں / غیر طبعی دھبے عام طور سے پیشانی، چہرے سرپستان، مہبل، عانہ اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان شکم کی جلد پر رونما ہوتی ہیں،

(۱۳) کلف کبدی :-

جھائیاں (کلف) چہرے، پیشانی اور ہاتھ کی جلد پر رونما ہوتی ہیں۔

اصول علاج

- سوداوی خلط کا تنقیہ کریں۔
- خارجی حرارت / تمازت سے جسم کو محفوظ رکھنے کی تدابیر کریں۔
- اصلاح غذا اور جودت ہضم کی تدابیر کریں۔
- ایام حیض کی بے اعتدالی، سبب مرض ہو تو اس کا ازالہ کریں،
- دیگر امراض کی صورت میں ان کے دفعیہ کی تدابیر کریں۔

علاج

○ — سوداوی خلط کے تنقیہ کے لیے درج ذیل نسخے استعمال

کرائیں،

ہلید سیاہ ۳۰ گرام، بسفاج نیمکوفہ ۵۰ گرام، ایتیمون دلاستی ۲۰ گرام، برگ سنار، مکی اسطوخودوس، ہر ایک ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ بادرنجیو یہ، برگ کاؤزاں، ہر ایک ۴ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۶ گرام، خربق سیاہ ۱ گرام،

ترید موصوف ۳ گرام، زنجبیل ۵، ۱۱ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر حجار منی، لاچورد مغسول، نمک سیاہ، غارلقون، ہر ایک ایک گرام، پس کر ملائیں اور استعمال کرائیں، مزید قوی الاثر بنانے کے لیے صبر سقوٹری، تخم خنظل، ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں، یہ نسخہ اعلیٰ درجہ کا مسہل سودا ہے،

اگر نفخ و اسہال و تیرید کی ضرورت ہو تو یہ نسخہ بر دئے کار لائیں، تاہم ملاحظہ ہے کہ سودا، مخترق خون یا صفراء سے پیدا ہوا تو نسخوں میں اس کی رعایت ضرور رکھیں۔

نسخہ منفع سودا :-

گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۳ گرام، بادیان، شاہترہ، اسطوخودوس، ہر ایک ۷ گرام، پد سیاہ شاہ ۵ گرام، سیستان ۱۱ عدد، عتاب ولایتی ۵ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقدہ آفتابی، ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، جب نفخ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل سودا :-

نسخہ منفع میں، بسفاج فستقی، فیتمون ولایتی (پوٹلی میں باندھ کر) قعب الزریرہ، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ زرد، غارلقون مغربل، ترید اکبر آبادی مجوف خراشیدہ، برگ سنار کی، مغز فلوس خیار شبنز، شیرہ مغز بادام ۱۲ عدد، پانی میں بھگو کر مل چھان کر ملائیں اور نوش کرائیں، تیرید کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تیرید :-

آٹھ مربی گرم پانی میں دھو کر ورق فقرہ لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد لعاب گاؤ زبان ۵ گرام، پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے ختم کریں، ۷ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

○ ————— مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
 عشبہ مغربی، بسفاج، فستق، اقیقون ولایتی، گاؤ زبان، دار چینی، ہر ایک
 ۲۵ گرام، گل سرخ، صندل سفید، صندل سرخ، چوب چینی، ہر ایک ۱۲ گرام،
 پوست بلیہ زرد ۶ گرام، بلیہ سیاہ ۷ گرام، ————— تمام دواؤں کو
 کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور شکر ۵۰ گرام، شہد ۵۰ ملی لیٹر کے
 قوام میں ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۶۰ گرام ہمراہ عرق عشبہ
 استعمال کرائیں۔

○ ————— خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 کف دریا آب یمنوں میں گھس کر دن میں ۲-۳ بار لگائیں،
 رسوت آب نگر زندہ میں / باپچی، تخم نیم سرکہ میں / ہڑتال ٹاب کشنیز سبز میں۔
 گھس کر لگائیں،
 تخم ترب، تخم خربزہ، آرد باقلا (سرکہ میں بھگو کر خشک کردہ) مغز بادام
 متشتر، کتیرا، اکلیل الملک، قسط، ہموزن، ————— تمام دواؤں کو باریک
 پیس کر بھٹڑ کے دودھ میں حل کر کے لگائیں۔
 آرد باقلا، سیندور، تخم ترب، گل معصفر، ہموزن، —————
 تمام دواؤں کو باریک کر کے پانی میں ملا کر بوقت خواب ملا
 کریں۔

سہاگہ ۶ گرام، پیس کر روغن یا سمین ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر
 ملا کریں،
 برگ کنیر سبز پانی میں جوش دے کر مقام مرق کو دھوئیں،
 پوست بیفہ مرغ سرکہ میں پیس کر لگائیں،
 ————— قسط کو مار العسل میں ملا کر لگائیں۔
 روغن تخم ترب، تخم ترب (سفوف کردہ) شہد ملا کر کلف
 پر لگائیں،
 سنبل الطیب ۶ گرام، سرکہ قند / شراب کہنہ ۱۲ ملی لیٹر میں ملا کر

کلف پر لگائیں۔

سر سول زرد۔ ۱ گرام، گائے کا دودھ۔ ۲ ملی لیٹر میں ہلکی آغ پر جوش
دیں، جب تمام دودھ خشک ہو جائے تو سایہ میں خشک کریں اور
باریک پیس کر پانی ملا کر کلف پر لپیپ کریں اور تھوڑی دیر بعد عمل کر
بھاردیں۔

دیگر شرکی امراض کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

نمش

NAEVI

اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ پر، سیاہ گول / سرخی مائل سیاہ / جسم کی
طبعی رنگت سے مختلف، کسی قدر سطح جلد سے ابھرا ہوا چھٹ (لہسن) پیدا ہو جاتا
ہے، جس پر سیاہ / بھوڑے / سفید بال بھی اگ آتے ہیں، ————— یہ عام طور
سے پیدا کنشی طور پر ہوتا ہے، پشت، سرین، چہرے، بازو اور گردن پر زیادہ تر
دیکھنے میں آتا ہے، زیادہ بڑا ہونے کی صورت میں سماجی اور نفسیاتی الجھنوں کا باعث
ہوتا ہے۔

اسباب

(I) خلقی (جو غالباً جینی حالت میں سوداوی خلط کے غلبہ کا نتیجہ ہوتا ہے)

(II) سودا، محرق

(III) غلیظ، سودا کی تولید میں معاون غذاؤں کا بکثرت استعمال،

لہسن، * ، Birth Marks ، Mother Marks ، دیگر اس کے

متزادات ہیں، ————— جدید طریقہ علاج کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت
تفصیل سے ملتا ہے اور سافٹ نیوی، سارڈ نیوی، رسکو لہ نیوی، لمفیٹک نیوی،
گیلنڈلر نیوی، قانیر وے لہ نیوی اور میسوڈر مل نیوی وغیرہ بنیادی اقسام
قرار دی جاتی ہے،

(۱۷) جمع ربیع میں عرصہ تک مہستلار ہونا۔

(۱۸) ایام حمل / احتباس حیض

(۱۹) سورج کی تمازت

علامات

سطح جلد پر بیگنی / سرخی مائل سیاہ / سیاہ رنگ کا گول داغ / چٹ پٹ جاتا ہے، عام طور سے یہ سطح جلد سے خفیف ابھرا ہوا ہوتا ہے مگر بعض اوقات سطح جلد کے برابر ہوتا ہے، اس پر بال بھی اگ آتے ہیں، عام طور سے یہ پیدا نشی ہوتا ہے، تاہم بعد میں بھی عارض ہو سکتا ہے، کبھی کبھی یہ اپنی وضع بدلنے کا بھی رجحان رکھتا ہے، لیکن اس وضع کی تبدیلی نہایت خفیف اور بر سہا برس کے بعد بھی اس قدر معمولی ہوتی ہے کہ نہایت توجہ اور غور کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے،

اصول علاج

- سوداوی خلط کا تنقیہ کریں،
- غلیظ سوداوی خلط کی توبہ میں معاون اشیاء کے استعمال سے احتراز کی تاکید کریں،
- سورج کی تمازت اور احتراق سودا کے جلد امکانات کا تدارک کریں۔
- حسب ضرورت متاثرہ جلد کو عملیہ کے ذریعہ علاحدہ کریں،
- یہ طریقہ یورپین ملکوں میں عام ہے۔
- مصفیات استعمال کرائیں،

علاج

- خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

منفع اور مسہل سودا کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
گاؤ زبان، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۵ گرام، شاہترہ، بادیان، بادرنجبویہ ہر ایک
۷ گرام، عناب ۵ عدد، سیستان ۹ عدد۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت
گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھان کر گلتند ۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں،
جب نفخ کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں۔

ایار ج فیکرا ۳ گرام، لاجورد مقسول، غاریقون، گوگل، تربید سفید مدبر پوست
ہلیلہ زرد، کیترا سفید، ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو چھان کر دروغن بادام
شیریں ۵، ملی لیٹر میں چوب کر کے چنے کے برابر گویا بنائیں اور ۷-۹ گرام درق
نقرہ ۳ عدد میں لپیٹ کر رات کے ۱-۲ بجے گرم پانی کے ساتھ نکلنے کی تاکید
کریں، صبح کے وقت شیر خشک ۵ گرام، مغز فلوس خیار شیر، ۴۰ گرام،
گلتند آفتابی ۳۰ گرام کو آب بادن سبز ۳۰ ملی لیٹر، آب کاسنی سبز ۲۰ ملی لیٹر کے پانی میں
حل کر کے چھان لیں اور دروغن بادام ۳۰ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں،
مصطفیٰ خون کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

چوب چینی، برگ شیشم، ہر ایک ۵ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کاہلی،
عناب، ہر ایک ۴۰ گرام، برگ سناہ کی ۲ گرام، تمام دواؤں کو نیکوب
کر کے رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر تربجیں، شیر خشک،
شکر، ہر ایک ۸۰ گرام ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور صبح کے وقت ۵۰ ملی لیٹر
شربت نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے،

برگ نیم، پوست درخت نیم، برگ بکائن، پوست بکائن، پوست کچنال،
پوست مولسری، دودھتی خورد، برگ بھنگرہ سیاہ، شاخ برگ جوانہ، پوست گولر،
برگ حنا، منڈی، شاہترہ، سبھوکہ، دھمایا، چوب بکے سار، گل نیلوفر، برادہ سفید،
برادہ شیشم، گل سرخ، کشیز خشک، تخم کاسنی، بیج کاسنی، فوہ، برگ بید سادہ،
ہر ایک ۱۲۰ گرام، تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۲۵ ملی لیٹر پانی میں بھگو دیں،
اور ۲۴ گھنٹے بعد ۱۱ لیٹر عرق کشید کریں اور ۱۲ ملی لیٹر نوش کرائیں،

○ خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کر لیں،
 آرد باقلا (سرکہ میں بھگو کر خشک کیا ہو) مغز بادام مقشّر، حنّہ ترب، حنّہ تربہ بندہ ۵،
 اکیلل الملک، کیترا، قسط، ہر ایک ۱۲ گرام،
 دودھ میں ملا کر دن میں ۲-۳ مرتبہ لگائیں۔
 واضح رہے کہ نمش خلقی عالج پذیر نہیں ہے، نمش غیر خلقی / آکٹا با، موداد ۱۰
 خلط کے تنقید سے نائل ہو سکتا ہے، - حتیٰ عالج، آپریشن کے ذریعہ مٹاؤ
 جلد کا دور کرنا ہے۔

○

Learn Unani By Abdul Wajid Salman

برش

LENTIGO

اس مرض میں جسم بعض حصوں، خانہ، لورے، چہرے، پرتھوٹے، چھوٹے سیاہ، مائل، دھندلے رنگ، کے نقطے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات زیر نقطے سرخی مائل یا نیلے رنگ، کے بھی ہوتے ہیں، کلف کا نسبت یہ دور دور ہوتے ہیں۔

اسباب

- (I) دم محرق کا عروق شعریہ کے ذریعہ زیر جلد جمع ہو جانا
- (II) غلیظ سوداوی خلط کا غلبہ / سوداوی خلط میں معاون غذاؤں کا استعمال
- (III) خارجی حرارت
- (IV) دم شریانی

علامات

جسم کے کسی بھی حصہ، خاص طور سے چہرے پر دور دور، سیاہ یا سرخی مائل، نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہرہ بد نما اور مریض نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے

اصول علاج

- سوداوی خلط کے تنقیہ کا اہتمام کریں
- حرارت اور تمازت سے مقدور بھر بچنے کی ہدایت کریں۔

- --- مصفیات خون استعمال کرائیں
- --- مولد سودا، غذاؤں سے پرہیز کرائیں
- --- محرار جاذب ادویہ خارجی طور پر استعمال کرائیں۔

علاج

تنقید: خلط سوداوی کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 افیمون ۸ گرام، تربد موصوف، غاریقون سفید، ہر ایک ۵/۴ گرام،
 تینوں دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر سکجین (حسب ضرورت) کے ساتھ دن
 میں دو مرتبہ استعمال کرائیں۔
 یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

حب الملوک مدبر ۲۵ گرام، زنجبیل (بے ریشہ) ۵/۴ گرام، کات گلابی،
 ۲۴ گرام، تمام دواؤں کو شیر مغز فلوس خیار خبیز میں کھل کر کے
 گولیاں بنائیں اور ۵ ملی گرام استعمال کرائیں،
 مغز کشنیز، مغز بادیان، ہر ایک ۱۲ گرام، مغز حب الملوک مدبر (بریان در
 روغن زرد) ۳ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر شہد ملا کر فلفل سیاہ کے
 برابر گولیاں بنائیں اور ۲-۴ گولیاں کھلائیں،

○ --- مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں
 شاہترہ، گلو، سبز، سرچوکر، گل منڈی، برگ جتا، چرائتہ، بسفاج، ہلیہ سیاہ،
 ہر ایک ۴ گرام، صندل سرخ، صندل سفید، ہیل خورد، گاؤ زبان، پر سیاہ شاہ،
 ہر ایک ۲۵ گرام، برادہ شیشم ۶۲ گرام، عناب ۶۰ گرام، تمام دواؤں
 کورات کے وقت ۱ لیٹر پانی میں بھگوئیں اور ۷ لیٹر عرق کشید کریں،
 ۸۵ ملی لیٹر ہمراہ شربت عناب ۲۵ ملی لیٹر، نوش کرائیں،
 آب برگ شاہترہ سبز مروق ۱۰۰ ملی لیٹر، شربت عناب ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
 نوش کرائیں،

○ --- خارجی طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں

کف دریا آب میوں میں گھس کر لگائیں، — محرارہ جاذب ہے،
 بابچی، تخم نیم، سرکہ میں گھس کر لگائیں، محرارہ جاذب ہے،
 تخم خرنیزہ، کیترا، جوار کی بھوس، ہر ایک ۶ گرام، ترمس ۳ گرام، جو مقشتر،
 ۱۲ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ کر پانی میں بھگو دیں اور رات کو سوتے
 وقت لگا کر سونے کی ہدایت کریں اور صبح کو دھو ڈالنے کی تاکید کریں۔
 ارد باقلا (سرکہ میں بھگو کر خشک کیا ہوا)، مغز بادام، ہر ایک ۱۲ گرام، تخم خرنیزہ،
 تخم ترب، اکلیل الملک، کیترا، قسط، ہر ایک ۱۲/۵ گرام، تمام دواؤں
 کو باریک پیس کر دودھ میں ملا کر دن میں ۲ — ۳ مرتبہ لگانے کی ہدایت کریں۔
 زیرہ کرمانی ۱۲ گرام، زرد چوب ۳ گرام کو باریک کر کے ارد جوار میں ملا کر پانی
 میں ملا کر لگائیں،
 قسط کو مار العسل میں ملا کر لگائیں،
 پوست درخت نیم، پوست درخت سرس، پوست درخت انار، زرد چوب،
 دار ملہ، سعد کوفی، بودھ پٹھانی، ہوزن، — تمام دواؤں کو پیس کر پانی
 میں ملا کر لگائیں،
 پوست خرنیزہ خشک، پوست نارنگی، گل گڑ، ہر ایک ۹ گرام، تخم کاسنی،
 تخم پیٹھ، ہر ایک ۸ گرام، — تمام دواؤں کو پیس کر روغن بادام (حسب
 ضرورت) میں ملا کر لگائیں۔




خیلان

FRECKLES

اس مرض میں سطح جلد سے کسی قدر بلند پین کے سرے (Pin-Head) سے لے کر مڑ کے برابر یا اس سے بھی بڑے، سرخ، معمولی سرخ، کالے، نیلگوں ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں اور کبھی ان سے معاشرتی الجھن پیدا ہو جاتی ہے، یہ ابھار، (تل)، جسم کے کھلے ہوئے حصوں یا مخصوص رخسارے، گردن، اور بازو کے پاس کثیر الوقوع ہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ مثلاً غسل آفتابی کے عادی لوگوں میں پشت پر، اور بلاؤز وغیرہ کی عادی عورتوں میں کھلے ہوئے حصہ پر، گورے چٹے لوگ اس مرض میں مبتلا ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، سیاہ فام لوگوں میں اس مرض کی قبولیت کی استعداد بہت کم ہوتی ہے، ۸ سال کی عمر میں / موروثی طور پر بھی وقوع پذیر ہے،

اقسام


(الف) پیدا انش کے اعتبار سے



(ب) رنگ اور ساخت کے اعتبار سے

خیلان

Freckles



اسباب

- (I) غلیظ سوداوی خون / دم فترق
 - (II) مقامی طور پر میلے نن (Melanin)
 - (III) عروق شریہ (Capillaries)
 - (IV) ضرور کبد، التهاب کبد، وجع المفاصل، حمل وغیرہ۔
- ہو جانا،
- کی غیر معمولی زیادتی
- کا بڑھ جانا / کشادہ / پھیلنا

علامات

جلد (Skin) کی سطح ظاہری پر، کسی قدر بلند ابھار پیدا ہو جاتا ہے، جو مادہ مرض کے اعتبار سے مختلف رنگ، ساخت و شکل کا ہوتا ہے۔ ذیل میں اس کی چند مشہور اقسام کی علامات تحریر کی جا رہی ہیں،

(I) خیلان ارغوانی :-

خال (تل) = Freckle (گلابی، سرخ یا سرخی مائل اور بڑی حد تک سطح جلد کے برابر ہوتا ہے، اس کا وقوع چہرے اور گردن پر زیادہ ہوتا ہے۔) عام طور سے یہ خلقی طور پر رونما ہوتا ہے لیکن ولادت کے ہفتہ عشرہ بعد بھی نمایاں

یہ شہوت کی مانند، مسلج جلد سے ابھرا ہوا، سرخ یا سرخی مائل، _____
 اور ہلکے سیٹی میٹر سے دس سیٹی میٹر تک کا ہو سکتا ہے بعض حالات میں اس سے بھی
 بڑا ہو سکتا ہے، چوٹ وغیرہ کے لگنے سے اس سے خون بہنے لگتا ہے، _____
 یہ نوع چہرے، ماتھ وغیرہ پر کثیرالوقوع ہے۔ خلقی طور پر پیدائش کے وقت یا
 ہفتہ عشرہ بعد رونما ہوتا ہے، _____ اطباء کا خیال ہے کہ یہ عروق شعریہ
 کے کشادہ ہو کر پھیلنا اور گردوار ہو جانے کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اسی
 لیے وہاں سے دب جاتا ہے اور دباؤ کے ملتے ہی اپنی اصل وضع پر آ جاتا ہے،

یہ شوخ سُرخ رنگ کا، قریباً ایک سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اس کو بغور دیکھنے پر درمیانی حصہ میں مکڑی (عنکبوت) کے پیروں یا ستاروں (نجم - نجوم) کی کرتوں کی مانند دھاریاں غیظی حصہ کی طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اسی مناسبت سے اس نوع کو خیلاں نجی / کوکبی / عنکبوتی کہتے ہیں، _____ ناک، رخسارے اور پیشانی پر کثیر الوقوع ہے، _____ اظہاء کا خیال ہے کہ یہ نوع بھی عروق شعریہ کے پھیل جانے سے یا ضور کبد، التهاب کبد، وجع المفاصل اور حمل وغیرہ کے نتیجہ میں، اکتسابی طور پر رونما ہوتی ہے،

عام طور سے یہ عروق دموئیہ (Blood Vessels) کے دھانوں پر واقع

ہوتے ہیں لہذا معمولی عملیہ (آپریشن) سے بھی جریان خون ہونے لگتا ہے، جو مہلک/بہریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، ————— بہر حال چند اصول ضروری اختیار کریں، ممکن ہے کسی قدر افاقہ ہوئے، اکتسابی صورت میں افاقہ عرض کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

○ ————— فصد کھولیں

○ ————— تنقیہ سودا کر کریں

○ ————— سرخ رنگ کے تل کے علاوہ انواع میں عملیہ (آپریشن) کی

کسی قدر گنجائش ہے،

○ ————— مصفیات استعمال کرائیں۔

علاج

○ ————— فصد کھولیں۔

○ ————— تنقیہ سودا کر کے بے منفج و مسہل کے طور پر درج ذیل نسخیات

استعمال کرائیں،

نسخہ منفج سودا :-

اسلو خودوس، بادیان، شاہترہ، ہر ایک ۲ گرام، پر سیاوشاں ۵ گرام، گاؤربا، اصل السوس، بادرنجبویہ، ہر ایک ۳ گرام، عناب ولایتی ۵ عدد، سپستان ۱۱ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد آفتابی ۵ گرام جل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، ————— نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں مثلاً پیشاب گاڑھا، مکدر اور سیاہی مائل آنے لگے اور نبض عریض اور ملائم چلنے لگے تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل سودا :-

فصب الزریرہ، بسفاج، فستقی، ہر ایک ۲ گرام، افیتون ولایتی (پوٹلی میں

باندھ کر، ہلیلہ کابلی، ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ ہر ایک ۶ گرام، افسنتین رومی ۵ گرام،
خارلقون مغربی ۶ گرام، برگ ستارہ کی ۱۲ گرام، تربد اکبر آبادی ۴ گرام، —
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مغز قلوبس خیار شیزہ ۸ گرام ملا کر مل چھان لیں،
اور روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔

— مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں۔

○ چوپ بینی، برگ شیشم، ہر ایک ۵ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی،
عنا ب، ہر ایک ۶ گرام، برگ ستارہ کی ۳۶ گرام، — تمام دواؤں کو
نیمکوب کر کے رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل
چھان لیں، ترنجبین، شیر خشک، شکر، ہر ایک ۴۸۰ گرام کے قوام میں ملا کر
حسب دستور شربت تیار کریں اور صبح کو ۵۰ ملی لیٹر، ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں،
یہ نسخہ بھی مفید ہے،

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، پوست بہیرہ، ہر ایک ۱۲ گرام،
شاہترہ، گلو ر سبز آمد، زیرہ سفید، ہر ایک ۲۵ گرام، کشنیز خشک، گل معطر،
ہر ایک ۱۲۵ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شکر تین گنا کے
قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۷ — ۸ گرام، ہمراہ عرق کاؤ زبان /
پانی استعمال کرائیں۔

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں۔
مطہر سوئی سے خال (تل) کے مقام کو گودیں، جب خون نکل آئے تو
سرکہ اور عرق گلاب سے دھوئیں، تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد یہ عمل چند بار دہرائیں،
خیلاں توتی میں یہ عمل ہرگز نہ کریں،
مقام مرض کو گرم پانی سے دھوئیں اس کے بعد چوب انگور سبز سوختہ کرتے وقت جو
رطوبت خارج ہو اس کو لگائیں۔

پوست کدوئے شیریں سرکہ میں پیس کر ضاد کریں۔
فلفل، قسط تلخ، مغز بادام، تلخ، زنج سوسن، آسمانخونی، کندش

تخم ترب، خاک یسحاب، ہموزن کو بار یک پیس کر سرکہ اور پانی میں
ملا کر رات کے وقت طلا کر میں اور صبح کو پر سیاوشاں اور سبوس گندم
کے جوشاندہ سے دھونے کی ہدایت کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

خضرت و سواد

ECCHYMOSIS

اس مرض میں جلد کے نیچے مردہ خون جمع ہو جانے سے مقامی طور پر سبزی یا سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، ————— یہ دراصل علامت ہے، جو ضرب، رگڑ (دھچکا) اور زخم وغیرہ کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے۔

اسباب

(I) چوٹ لگنا

(II) رگڑ پڑنا

(III) زخم

علامات

چوٹ وغیرہ کے بعد وہاں کا خون مردہ ہو کر سبز یا سیاہی مائل ہو کر زیر جلد جمع ہو جاتا ہے اور خارجی طور پر دیکھنے سے وہاں کی جلد نیلگوں یا سیاہ نظر آتی ہے، ————— ملحوظ رہے کہ اچھا، قدیم خضرت و سواد کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مقام مرض کا سرخ، سرخی مائل سبز یا گہرا سرخ ہونا بھی، اسی کے ذیل میں تصور کرنا چاہیے، ————— خون میں غلظت کے نتیجہ میں رنگ نیلگوں اور مردہ ہونے کی صورت میں سیاہ ہو جاتا ہے،

اصول علاج

-خون میں معمولی غلظت کی صورت میں رگڑ وغیرہ کے ذریعہ خون خارج کریں اور اگر خون نہایت غلیظ ہو کر منجمد ہو گیا ہو تو نشتر وغیرہ سے جلد کو ہٹا کر خوں بستہ صاف کریں۔
-تسکین درد کی تدابیر کریں۔
-خون میں رقت پیدا کریں اور عملیات استعمال کرائیں

علاج

-تسکین درد کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں
- کوکنار ۱۲ گرام، نمک طعام ۴ گرام، سبوس گندم ۳۵ گرام کو حسب دستور پانی میں جوش دے کر نپول کریں۔
- مردار سنگ کو باریک کر کے گیہوں کی روٹی کے گودہ میں ملا کر لیپ کریں،
- سرکہ میں جلد دار گھس کر لیپ کریں،
- نمک طعام شہد میں ملا کر لگائیں، بعض اطباء مصیر اور شہد لگاتے ہیں،

-خون میں رقت پیدا کرنے کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- برگ ترب (مولی کا پتہ) پیس کر ضا د کریں،
- برگ پودینہ سبز پیس کر ضا د کریں،
- بورہ ارمنی کو سرکہ میں ملا کر لگائیں

-خون بستہ نہ ہوا ہو تو سوئی چھو کر خون خارج کریں،
- بصورت دیگر نشتر کے ذریعہ جلد کو چیر کر زیر جلد چھ شدہ بستہ خون کو نکال دیں،
-اس کے بعد علق البطم اور بورہ ارمنی کو پیس کر ضا د کریں تاکہ عروق دمویہ کا صفحہ بند ہو جائے۔

قتار

اس مرض میں دھوی فساد (خون کا فساد) کی وجہ سے جریان خون ہو کر زیر جلد سرخ، سیاہی مائل دھبے / نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، رنگ کی مناسبت سے ہی اس مرض کو قمار / ار جوانیہ کہا جاتا ہے، یہ دواصل بعض امراض میں ایک علامت کے طور پر رونما ہوتا ہے لیکن اطباء نے اس کو مرض کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

اقسام
(الف)

قتار

قتار شدید / نراذہ

قتار خفیف / سادہ

قتار

(ب)

قتار عصبیہ

قتار حدادیہ

قتار فمائیہ

اسباب

(I) فساد خون، ————— دسج دیل امراض سے عام طور پر خون میں فساد واقع ہو جاتا ہے، اس طرح گویا یہ امراض اس مرض کا باعث ہوتے ہیں۔

(I) جدری

(II) حصبہ

(III) حمی ہڈ یا نیہ

(IV) حمی دماغیہ

(V) حمی حمراء

(VI) التهاب بطانہ قلب، خبیث

(VII) ہزال طہری

(VIII) طاعون

(IX) صفر کبدہ

(X) کلیہ کے بعض امراض

(XI) حداری امراض ————— شمرہ

(XII) بعض ادویہ

علامات

(الف)

(I) قیما، خیف، سادہ :-

جسم کے مختلف حصوں میں ہلکے سرخ / سرخ / نیلگوں / ارغوانی رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، ان کا بزم سرسوں کے دانہ کے بقدر ہوتا ہے، عموماً یہ گول ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہونے کی صورت میں سطح سے ابھرے نہیں ہوتے، دبانے سے غائب بھی نہیں ہوتے، عام طور سے یہ سارے سم پر نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھی پاؤں اور ٹانگوں

میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، بہر حال کچھ عرصہ بعد دھبوں کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے اور یہ زندگی بھر بے پڑ جاتے ہیں اور ۱۰-۱۲ دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔

(لا) قنماہ شدید / نرزی :-

اس میں جریان خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے چنانچہ زیر جلد خون کی دافر مقدار جمع ہو جاتی ہے اور لازمی طور پر دھبے سطح جلد سے ابھر آتے ہیں، شدید صورتوں میں جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، متاثرہ عضویں تقریح اور تا کل بھی ہو سکتا ہے، نرزی عضو کے اعتبار سے مزید شدید عوارض رونما ہو کر موت بھی واقع ہو سکتی ہے، نرزی کی وجہ سے سور القینہ کی شکایت بھی ہوتی ہے نصف اور پست ہمتی لازمی طور پر رونما ہوتی ہے۔

(ب)

(ا) قنماہ فجائیہ :-

اس میں زیر جلد بہت تیزی کے ساتھ جریان خون ہوتا ہے اور نتیجہ کے طور پر ۲-۴ گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے،

(ب) قنماہ حداریہ :-

دھبہ المفاصل کی علامات پائی جاتی ہیں، اور زیر جلد جریان خون ہوتا ہے، شام کے وقت علامات بہت واضح ہوتی ہیں، مرض کی مدت طویل ہوتی ہے، ہلاکت قلیل الوقوع ہے، ملاحظہ رہے کہ قنماہ کو التهاب مفاصل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، بہر حال پھپھیدگی کے طور پر التهاب بطانہ قلب، التهاب قلب وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، مرض کی باری آتی رہتی ہے، خلق خاص طور سے متاثر ہوتی ہے۔

(ج) قنماہ عصبیہ :-

یہ صورت بچوں میں کثیر الوقوع ہے، رونما ہونے والے دھبے شری / نرینی نوعیت

کے / احراری ہوتے ہیں، یہیں پیدگی کے طور پر مفاصل، گردے ادا معاء کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، چنانچہ التهاب مفاصل، اسہال (دھوی) درد شکم، تے التهاب کبد اور بول الدم کی شکایت ہوتی ہے۔ اس مرض کا اعادہ ہفتہ — ایک مہینہ کے اندر ہو سکتا ہے۔

اصول علاج

- ——— مصیفات خون استعمال کرائیں اور عوارض کے ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔
- ——— جید الکیموس، مقوی غذائیں / دوائیں استعمال کرائیں،
- ——— استراحت کی تاکید کریں۔
- ——— حسب ضرورت حامل اور قابض دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

- ——— خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- تھیفہ خون کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔
- برگ نیم، پوست نیم، برگ بکائن، پوست بکائن، پوست کچنال، پوست مولسری، دودھی خورد، برگ بھنگرہ سیاہ، شاخ برگ جوانسہ، پوست گور، برگ حنا، منڈی، شاہترہ، مرچوکر، دھایا، چوب سبب سادہ، گل نیلوفر، برادہ مندل سفید، بیج کاہنی، تخم کانسہ، فوہ، برگ بید سادہ، گل سرخ، کشنیر خشک، برادہ شیشم، ہر ایک ۱۲۰ گرام، ———
- تمام دواؤں کو نیمکوب کر کے ۲۵ ملی لیٹر پانی میں ۲۴ گھنٹے تک بھگوئیں اس کے بعد ۱۲۵ ملی لیٹر عرق کشید کریں اور صبح، شام ۱۵۰ — ۱۴۰ ملی لیٹر ہمراہ شربت عناب ۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

خونچان، قرنفل، کباب چینی، حسک، یخیدان، سنبل الطیب، زنجبیل، زربنادا، اسارون، سادج ہندی، قفل دراز، عنبر، جد دار خطائی، دانہ ہیل خورد، دانہ

ہیل کلاں، ہر ایک ۹ گرام، دارچینی، سودنجان شیریں، شقائق مصری، خصیۃ الثعلب،
مصطکی، عود ہندی، اندر جو شیریں، زعفران، ہر ایک ۴ گرام، مغز چروہ، مغز حب الفلفل،
مغز تخم قرطم، مغز حبہ الحضرار، ہر ایک ۲ گرام، مغز چغوزہ، مغز نار جیل بریاں،
ہر ایک ۹ گرام، چوب چینی ۴۷۵ گرام، ————— چوب چینی کو ۴ لیٹر پانی میں بھگو
دیں، اس کے بعد باریک تراش کر اسی پانی میں اس قدر جوش دیں کہ
ایک لیٹر پانی رہ جائے، پھر شہد، قرنجین، ہر ایک ۴۷۵ گرام ملا کر حسب دستور قوام
بنائیں اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر ملائیں اور معجون تیار کریں۔ مقدار خوراک —
۷ گرام ہے۔

شاہترہ ۲۵۰ گرام، پانی ۵ لیٹر، میں بھگو دیں اور ۲ گھنٹے بعد ۲۷۵ ملی لیٹر عرق کشید
کریں اور ۶۰ ————— ۱۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

عشبہ مغربی ۱۸۰ گرام، چوب چینی ۱۲۰ گرام، دونوں کو شب میں ۴ لیٹر پانی میں
بھگو دیں، اور صبح کو ۲ لیٹر عرق کشید کریں ۶۰ ————— ۱۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں،
ملفوظ رہے کہ اس بیماری میں فولاد اور سنگیہا کے مرکبات بے حد مفید پائے
گئے ہیں، ذیل میں اس بابت چند نسخے تحریر ہیں۔

برادہ فولاد کو عرق لیموں سے صاف کریں، اس کے بعد عرق گہرہ اندہ میں بھگو دیں
۲۰۔۔۔۔۔ ۳۰ دن میں جب برادہ حل ہو کر خشک ہو جائے تو کپڑے سے چھان لیں اور
۷۵ گرام ہمراہ بالائی کھلائیں۔

اس طرح حسب ضرورت سنگیہا کے مرکبات بھی استعمال کرائیں۔

حاجس کے طور پر یہ نسخہ مفید ہے،

کشینز بریاں، تخم خشخاش سیاہ، تخم خشخاش سفید، ہر ایک ۷۰ گرام، کبریا،
بسد، مردارید، تخم خرفہ مقشر، ہر ایک ۶۰ گرام، قرن الاہل سوختہ، پوست بیفہ مرغ،
سوختہ، صمغ عربی، کیترا، ہر ایک ۴۵ گرام، کوڑی سوختہ، بنرالنج سفید، ہر ایک
۲۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ کر لعاب اسپنول میں قرص بنائیں اور
۷ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

تتمار حدار یہ میں یہ نسخہ خاص طور سے مفید ہے ،
 تخم کرفس ، بادیان ، کف دریا ، فلفل سفید ، صعتر ، نمک ہندی ، برگ خدا ہر ایک
 ۵ گرام ، ماہیز ہرج ، بوزیدان ، شیطربج ہندی ، یتا کبر ، ہر ایک ۷ گرام ، کشینز کوہی ،
 گل سرخ ، زنجبیل ، ستونیا ، ہر ایک ۱۰ گرام ، سورنجان شیریں سفید ۱۹ گرام ، بلیڈ زرد ،
 ۲۵ گرام ، تردید سفید ۵ گرام ، تمام دواؤں کو باریک کر کے روغن بادام
 ۳۵ ملی لیٹر میں چرب کریں ، پھر شہد ۵۳ ملی لیٹر کے قوام میں ملا کر حسب دستور معجون تیار
 کریں ، گرام ہمراہ عرق شاہترہ استعمال کرائیں ۔



Learn Unani By Abdul Waris



TATTOOING

— اس خوشنامہ دیدہ زیب نشان / داغ کو ”دشم“ کیا جاتا ہے، جو عورتیں اور بعض علاقوں کے مرد چہرے، بازو اور سینے وغیرہ پر گود کر بناتے ہیں، — یہ مرض نہیں ہے۔

اسباب

- (I) شوق و ذوق
(II) سرمہ نیل ملا کر سوتی کے ذریعہ گودنا — وغیرہ

علامات

عورتوں کے بازو، گلے اور چہرے پر سیاہ / سبز رنگ کے گودنے کی علامات پائی جاتی ہیں، — یہاں ایک بات ملحوظ رہے کہ بعض اوقات گودنا کسی پیدائشی نشان کو دبانے کے لیے یا کسی تل وغیرہ کو نحس جان کر چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے، — اول الذکر صورت جبرائیم پیشہ افراد میں کثیر الوقوع ہے،

اصول علاج

- دشمن کی علامات کو دور کرنے کی تدابیر کریں۔
— آبلانے والی دوائیں لگائیں۔

علاج

پورہ ارمنی کو گرم پانی میں ملا کر متاثر حصہ پر ملیں۔ اس کے بعد ملک البطم شہد میں ملا کر لگائیں اور تین دن بعد صاف کر کے نمک ملیں اور دوبارہ ملک البطم حسب دستور لگائیں۔

○ بھلاواں کا شہد لگائیں، گودنے کی جگہ پر سوئی کی مدد سے بھلاواں لگائیں۔

○ ہر تال، سنگ سرمہ، کنڈر، ہر ایک ایک گرام کو سرکہ میں پیس کر متاثر حصہ پر لگائیں۔

○ داغ کو سوئی سے گودیں اس کے بعد اس پر سہاگہ اور چونہ چھڑکیں۔

○ نطرون، کنڈش، صمغ اجاص سموزن کو کوٹ چھان کر پرانے سرکہ اور شہد میں ملا کر مقام وشم پر طلا کریں،

○ صابون کو آب اشجار میں حل کر کے وشم پر لگائیں۔


○ دیگ بر دیگ، فلافیون کو گھس کر طلا کریں۔



* شری URTICARIA

اس مرض میں اچانک پورے جسم میں یا مقامی طور پر چمکتے کی شکل کے دو دوڑے پرجاتے ہیں، یہ جلد سے کسی قدر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی رنگت جلد کی رنگت سے کسی قدر ہلکی ہوتی ہے، شدید خارش ہوتی ہے معمولی بخار، متلی اور تھوہ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، عام طور سے چند منٹوں / گھنٹوں کے بعد دوڑے غائب ہو جاتے ہیں لیکن مرم صورت میں ۵ - ۷ دن تک رہ سکتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ مرض ہر علاقے اور ہر جنس میں ہو سکتا ہے۔

اقسام



طب جدید کے مطابق اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔

۴۶۔ اس کو چھپاکی، پتی، جل پتی، دھا پتروغیرہ بھی کہتے ہیں،

اسباب

انفعالات نفسانی :-

- (I) خوشی و مسرت
- (II) شرمندگی و خجالت و پشیمانی
- (III) فکر و تشویش / بے پروائی
- (IV) غیظ و غضب پر قابو پانے کی کوشش
- (V) کام و غیرہ کی زیادتی سے ذہنی دباؤ
- (VI) اجنبی شخص / گراں قدر شخص سے ملاقات

غذا / غذائی بے اعتدالی :-

- (I) انڈا / انڈے سے بنی ہوئی غذائیں
- (II) دودھ / دودھ میں تیار شدہ غذائیں
- (III) کستور / مچھلی (ایک قسم کا صدف)
- (IV) جھینگا
- (V) تیز، نمکین غذاؤں / گوشت کا بکثرت استعمال
- (VI) ثقیل اور نفاخ غذائیں
- (VII) باسی غذائیں

اوویات :-

- (I) اسپرین
- (II) پنسلین
- (III) سلفونامائیڈس
- (IV) سیلی سیلٹس

- (۵) آیوڈائیڈس
(۶) کوفین
(۷) کوپنیا
(۸) اتلی دفقیر یا سیرم کا ٹیکہ

طفیلی اجسام :-

- (I) ویچیریر یا بن کرافٹی
(II) بروگی لائی
(III) لوآ لوآ
(IV) ہائیڈائیڈسٹ
(V) حیات (دیدان مدورہ) Round Worm
(VI) حب القرع Tape Worm
(VII) دیدان کا بیہ Hook Worm
(VIII) دیدان خیطیہ Thread Worm

پلودے :-

- (I) فضا یوں موجود بھولوں کے پراگ
(II) پلودوں/بھولوں کی خوشبو

گزیدگی :-

- (I) چھڑ/بھڑ
(II) کھٹل/بچھو
(III) پسو ----- وغیرہ

فعلیاتی: —

(۱) شدید دباؤ

(۲) سردی

(۳) شدید ریاضت

(۴) ارتعاش

متفرقات: —

(۱) یمباہ رحم

(۲) خون میں کیلسیم کم ہونا

(۳) عملی تھکنہ

(۴) دانتوں کی خرابی / سٹال

(۵) خون میں صفراء / مادہ / بلغم / سودا کا غلبہ

(۶) ایام حیض کی بے اعتدالی

(۷) کثرت سے نوشہ

(۸) فساد استہالہ کی وجہ سے پیدا ہونے والا گرم اور تیز لمبوات

(۹) قوت مناعت میں کمی

(۱۰) اک / کا / ہ / طا / م / محدود / ام / م / گندہ / بگندہ وغیرہ سے

بعض امراض۔

علامہ ت

عمومی: —

۱۔ ۴، سطح جلد پر پینا زرد رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، بعد عام سطح جلد سے
ذرا بلند ہوتے ہیں، ۱-۲ کے گندہ پینا زرد رنگ، ۱-۳ کے گندہ پینا زرد رنگ، ۱-۴ کے گندہ پینا زرد رنگ،

یا بے قاعدہ ہو سکتا ہے، ان دھبوں و دوڑوں میں شدید خارش اور سوزش ہوتا ہے، بعض اوقات مرض کی شدت کے نتیجے میں جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں بعد یہ ابھار آہستہ آہستہ غائب ہونے شروع ہوتا ہے اور ۱۲-۱۳ گھنٹے بعد بالکل غائب ہو جاتا ہے، یہ دوڑے مقامی یا عمومی طور پر پیدا ہوتے ہیں،

خصوصی:-

غلبہ خون / صفراء کی صورت میں چکتنوں (دوڑوں) کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور بالکل اچانک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہونے سے پہلے مقامی طور پر سرخی اور سوزش پائی جاتی ہے، دن میں خارش اور سوزش نسبتاً شدید ہوتی ہے، غلبہ بلغم کی صورت میں دوڑوں کی رنگت سفیدی مائل ہوتی ہے اور رات کے وقت خارش اور سوزش نسبتاً زیادہ محسوس ہوتی ہے، غلبہ سودا کی صورت میں رنگت خاکستری / سیاہی مائل ہوتی ہے، ملحوظ رہے کہ بلغمی اور سوداوی خلط کے غلبے میں واقع ہونے والی شری عام طور سے مزمن نوعیت کی اور کافی پریشان کن ثابت ہوتی ہے، آرٹھی کیریائی برائٹس میں اعضا شکنی ہوتی ہے، دوسرے اور خفیف بخار بھی ہوتا ہے، تپ ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے، اس کے ۱۲-۱۴ گھنٹے کے اندر دوڑے نکل آتے ہیں، ان میں نہایت شدید خارش اور سوزش ہوتی ہے، اور مرض کا دورہ عام طور سے ۷-۱۰ دن تک رہتا ہے، دورہ ختم ہونے کے بعد دوڑوں سے باریک بھوس سی جھڑتی ہے، آرٹھی کیریائی ان ٹری ٹینس میں مرض کا حملہ باری سے ہوتا ہے، چنانچہ کبھی یہ دوڑے روزانہ اچھڑاتے ہیں اور کبھی دو تین دن کے وقفے سے، آرٹھی کیریائی دانے ڈائیٹ، مرض کی نوعیت مزمن ہوتی ہے، شام کے وقت مسلج جلد پر دھبے و دوڑے پڑ جاتے ہیں جو رات میں نہایت شدت اختیار کر لیتے ہیں اور ۵-۶ گھنٹے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس عرصہ میں مریض جسم کو کھجلا کھجلا کر خارش ڈال دیتا ہے، مرنہ کاج استمواد، خار، سیب سے دوا، بچہ، بوز، کتب، بخار نہیں ہوتا، اور عرصہ تک مرض رکھتے رہتے، وجہ سے عام صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، آرٹھی کیریائی کو روزانہ دوڑے گوا، سخت اور سرخ رنگ کے ہوتے

ہیں، اور اس کا درمیانی حصہ نسبتاً اونچا اور زرد، ہماکل ہوتا ہے، مریض مریض نوعیت کا اور برسوں تک رہتا ہے، اس میں مرد اور بوڑھے اشخاص مبتلا ہونے کی استعداد زیادہ رکھتے ہیں،

اصول علاج

- حملہ مریض کی صورت میں صرف ایک، نمکین مسہل دیں۔
- فوری طور پر مرد و تر / سرد و خشک ادویہ استعمال کرائیں،
- مسامات جلد کو کھولنے کی تدابیر کریں،
- کیلسیم کے مرکبات دیں۔
- مصفیات خون استعمال کرائیں،
- حسب ضرورت فصد کھولیں / قے آور دوائیں استعمال کرائیں،
- ہضم طعام کی طرف توجہ دلائیں اور غذا پر خصوصی نظر رکھیں،
- بیش حسیت کو کم کرنے کی تدابیر کریں،
- مریض کے اسل سبب کا ازالہ کریں،

علاج

○ غلبہ خون و صفراء کی صورت میں داخلی اور خارجی طور پر یہ تدابیر / نسخے بروئے کار لائیں۔

ہفت اندام کی فصد کھولیں۔
 فصد کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 شاہترہ ۶ گرام، عناب ۵ عدد، دونوں کو عرق شاہترہ ۲۰ ملی لیٹر میں جوش دیں،
 اور مل چھان کر شیرہ تخم کاسنی ۶ گرام (پانی میں نکالا ہوا) سکنجبین ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
 نوش کرائیں،
 یہ نسخہ بھی مفید ہے،

لعاب بہدانہ ۳ گرام، شیرہ عناب ۵ عدد، شیرہ صندل ۲۵ گرام، عرق شاہترہ،
 عرق مکوہ ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

خاکسی، اسپخول، ہر ایک ۷ گرام، ہمراہ عرق گلاب استعمال کرائیں،
آب کاسنی سبز مروق ۸۵ ملی لیٹر، سکنجین ۲۵ ملی لیٹر میں خاکسی چھڑک کر نوش کرائیں،
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

بلبلہ زرد، ستارہ کی، ہر ایک ۷ گرام، تمر ہندی ۲۵ گرام، مغز فلوس خیار سبز،
شیر خشک، ترنجبین، ہر ایک ۵۰ گرام، آلو بخارا ۷ عدد، شیر خشک اور ترنجبین کے علاوہ
تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں پھر مل چھان کر ترنجبین، شیر خشک ملا کر مل چھان کر
شیرہ مغز بادام شیرہ ۵ عدد نکال کر حل کریں اور نوش کرائیں، ————— اس کے
بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں،

تخم کاسنی، تخم کشوت، تخم خرفہ، ہر ایک ۵۰ گرام، مغز تخم خیار، مغز تخم کھیرا
ہر ایک ۸ گرام، کثیرا، نشاستہ، مازو سبز، صمغ عربی ہر ایک ۲۱۵ گرام، کافور ۲۲۵ ملی گرام،
تمام دواؤں کو حسب دستور ہر ایک کر کے چھان لیں اور ۱۰۰ گرام، ہمراہ
سکنجین سادہ ۲۵ ملی لیٹر، روزانہ استعمال کرائیں،

گل صد برگ زرد ۲۵۰ گرام، آب نیچ کیلہ ۲ لیٹر، دونوں کورات کے وقت ملا دیں
اور صبح کو عرق کشید کریں اور ۲۵ ملی لیٹر، شام کے وقت نوش کرائیں، ————— بعض
الہاء اس کے ساتھ قرص کافور ۷ گرام استعمال کراتے ہیں،
مضی کے طور پر یہ نسخہ مفید ہے،

عنب الثعلب، گل سرخ، برادہ آبوس، برادہ شیشم، گل نیلوفر، ہر ایک ۸۸ گرام
تخم کاسنی، عنب، اقیقہ، تخم بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۲۵ گرام، برگ شاہترہ ۵۰۰ گرام،
تمام دواؤں کو ۱۳ لیٹر پانی میں بھگو دیں اور ۸ لیٹر عرق کشید کریں، ۱۲۰
ملی لیٹر، صبح، شام نوش کرائیں، ————— شرفا زیادہ دن کا، تو اسی نسخہ میں عشبہ
مغز ذی، چوب چینی، ہر ایک ۶۰ گرام کا اضافہ کر کے عرق کشید کریں۔

خارجی طوبہ درد ذیل نسخہ استعمال کرائیں،
گبرد، بھگدہ، دونوں کو باقیہ بنیاد پر لٹائیں،
روغن کاک، عرق کاک،
بر ۲، بزم، تخم تر پندہ کو پانی میں پیس کر لٹائیں،

برگ بانس کو پانی میں جوش دے کر اسی سے غسل کرائیں،
عنب الثعلب، کشیز، کاج، ————— تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر
تھوڑا سا جو کا آٹا ملا کر لگائیں،

رسوت، صندل سفید، ہر ایک ۶ گرام، کا قوڑا گرام، سرکہ ۲۵ ملی لیٹر، عرق گلاب
۱۲۰ ملی لیٹر، ————— تمام دواؤں کو پیس کر عرقیات میں ملا کر طلا کریں،
جھر کو سرکہ میں حل کر کے لگائیں،

خاکسی کو ہار یک پیس کر روغن گل میں ملا کر جسم پر مالش کریں،
○ خلد بلغم شور کی صورت میں داخلی اور خارجی طور پر یہ نسخے (تدابیر
بروسے کار لائیں۔

بادیان ۶ گرام (ہار یک کردہ)، گلقد ۲۵ گرام، کو عرق گلاب، عرق بادیان، ہر ایک
۱۲۰ ملی لیٹر میں جوش دے کر چھان لیں اور سکنجبین ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،
عرق کمر، عرق شاہترہ، عرق بادیان، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، سکنجبین سادہ ۲۵ ملی لیٹر،
————— تمام عرقیات کو باہم ملا کر خاکسی ۶ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،
اگر نفع و تنقیہ کی ضرورت محسوس ہو تو یہ نسخے استعمال کرائیں،

نسخہ منفع بلغم :-

ینخ کا بنی، ینخ بادیان، ینخ بکوفس، ینخ اذخر، بادیان، پرسیا و شاں،
اسطوخودوس، ہر ایک ۶ گرام، اصل السوس مقشر ۵ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، مویر منقہ
۹ عدد، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو ہلکا
جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد حسی ۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش
کرائیں، ————— جب نفع کے آثار پائے جانے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ
استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل بلغم :-

ترہ سفید جوف خراشیدہ ۵ گرام، غارلقون مغز بل ۶ گرام، سنار ۶ گرام،

۱۲ گرام، ————— ان دواؤں کو نسخہ منفع کے ساتھ رات کے وقت بھگو دیں، مغز فوس
خیار شبنم ۸۵ گرام، شکر سرخ ۵ گرام کو بھی رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر نسخہ
منفع میں ملا کر روغن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر، گلقد آفتابی ۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔
۱۰۔ دوسرے دن تبرید کے لیے یہ نسخہ دیں۔

نسخہ تبرید :-

گلقد آفتابی ۳۵ گرام، عرق بادیان ۱۵ ملی لیٹر میں ملا کر چھان لیں اور تخم ریحاں
۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

تفتیزہ بلغم کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے،

پوست ہلیلہ زرد ۷ گرام، تربد سفید ۳ گرام، زنجبیل ایک گرام، سقمونیا، انیسون،
کتیرا، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے آب کر فس میں گوندھ
کمرگوں بنائیں اور کھلائیں، ————— یہ ایک دن کا نسخہ ہے،

لبا شیر، پودینہ، ہر ایک ۷ گرام، کافور ۱۲۵ گرام، صندل ۲۰ گرام، —————
تمام دواؤں کو باریک کر کے ہمراہ آب انار ترش استعمال کرائیں،

پوست ہلیلہ کابلی، ہلیلہ سیاہ، ہر ایک ۸ گرام، تربد ۱۷ گرام، غارقون، بادیان،
ہر ایک ۷ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک بیس کر سفوف تیار کریں اور ۲۰ گرام
کھلا کر ۱۰۰ الجین ۲۵۰ ملی لیٹر میں نبات سفید ۳۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں،
کبابہ، گل سرخ، ہر ایک ۸ گرام، ملاز و سبز، گرام، تخم انجیر ۵۰ گرام، —
تمام دواؤں کو باریک کر کے سفوف بنائیں اور ۱۰۰ گرام ہمراہ سکجین
زرد، ۱۰۰ ملی لیٹر نوش کرائیں،

خارجہ طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں،

عود، عنب، الشلب، ہر ایک ۲ گرام، کشنیز خشک ۳ گرام، ————— تمام
دواؤں کو انکار سے پرہیز کر جسم پر اس کا دھواں پہنچائیں،

ابو انوار، گیرد، ۱۰۰ رکہ باہم پیس کر جسم پر ملیں۔

مردارینہ، ۵ گرام، گوگرد ۲۵ گرام کو سرکہ اور روغن گل میں پیس کر طلاء کریں،

عاقراً قرعہ کو پیس کر روغن کچھد میں ملا کر مالتش کریں،
 افستین، افیتھون ہندی، سداب، ہر ایک ۳۵ گرام، — تمام دواؤں کو
 پانی میں ہوش دے کر چھان لیں اور اسی سے غسل کرائیں،
 بادام تلخ کو شراب میں پیس کر ہلا کر لیں۔
 گرم پانی سے تکید کر کے مغز بادام تلخ - بورہ ارمنی، تخم تربہ وزن کو باریک
 پیس کر لعاب حلبہ میں ملا کر جسم پر لگائیں۔
 ○ غلبہ سودا کے نتیجہ میں شری کا وقوع شاذ طور پر ہوتا ہے،
 تاہم چند نئے درج کیے جاتے ہیں،
 منفع و مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع سودا :-

گاؤزبان، بادرنجبویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۱۰ گرام، پر سیاہ و شاد ۵ گرام،
 اسطوخودوس، شاہترہ، بادیان، ہر ایک ۱۰ گرام، عذاب والیتا ۵ عدد، سیسہ ۱۱
 عدد، — تمام دواؤں کو پانی میں جو ش دے کر ہلچواتیے اور گلتھہ آدھیا
 ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو مسہل کے طور
 پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ مسہل سودا :-

برگ سارنگی، تربہ سفید، تخم تنزل، حب النیل، ہر ایک ۱۰ گرام، مقل زرق، کیترا،
 سیلو صغ عربی، گل - رن، نمک سیاہ، حب الطیب، ہر ایک ۱۰ گرام، حب الملوک، مدیرہ
 ۵ گرام، — تمام دواؤں کو باریک کر کے روغن گل ۵۰ یا ۱۰۰ ڈال کر شربہ مصفیہ ۲۰ ڈال کر
 ملا کر فلفل سیاہ کے برابر گویا، ۱۰ یا ۲۰ گویا اور ۲۰ گویا لگائیں،
 یہ نسخہ شری سودا دہیہ یا نیار ہے،

ہلیلہ سیاہ، پلاست، ایلمہ کابلہ، ہر ایک ۱۰ گرام، تار یقوت، ۵ گرام، افیتھون،
 بسفاج، اسطوخودوس، گاؤزبان، ہر ایک ۱۰ گرام، نمک سیاہ، الماجورد، ہر ایک —

۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ۱۰۰ گرام،
بمراہ مائز الجبن ۱۱ ملی لیٹر نوش کرائیں،

لعاب تخم کنوچہ ۵، ۲ گرام پانی میں نکال کر دو غن تھوڑی مقدار میں ڈال کر ہار کھنڈ
نوش کرائیں،

○ _____ مصفی کے طور پر حسب ضرورت اور شرط، درج ذیل نسخے استعمال
کرائیں۔

آش جو/ آب پالک/ آب خبازی ۵، ۱۱ ملی لیٹر میں سکبجین قندی ۱۰ ملی لیٹر نیم گرم نوش
کرائیں، مقلی صفا ہے۔

تخم ترب ۲، ۲ گرام، تخم شبت ۳ گرام، نمک طعام ۲ گرام، _____ تمام دواؤں
کو باریک پس کر شہد میں ملا کر استعمال کرائیں، _____ آب گرم کے ساتھ بھی
استعمال کرا سکتے ہیں، مقلی بلغم ہے۔

مولی کو چیر کر اس میں خریق سیاہ بھر دیں اور سکبجین میں ڈال کر رات بھر جگوائے
رکھیں، صبح کو مولی کھلا کر سکبجین عسلی، لوبیا سرخ کے پانی میں ملا کر نوش کرائیں،
مقلی سودا ہے،

○ _____ کیلیم کی کمی کی صورت میں اس کی فراہمی کا اہتمام کریں،

○ _____ غذاؤں کے انتخاب میں محتاط رہنے کی ہدایت کریں،

○ _____ فعل ہضم کو درست رکھنے کے لیے قبض، نفخ و قراقر و غیرہ میں
بیان کردہ نسخے استعمال کرائیں۔

○ _____ دیدان امعاء کی صورت میں قاتل و مخبرج دیدان دوائیں دیں



آئناز قروح و جدري

MARKS OF ULCERS, POX

یہ دراصل زخموں اور جدري (Small Pox) کے نشانات ہیں، جو بدن پر پڑ جاتے ہیں، اور معاشرتی نقطہ نظر سے ان کے ازالہ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے،

اسباب

(۱) حملہ انواع کے، جسم پر نشان ڈالنے والے زخم،
(۲) جدري ————— وغیرہ

علامات

مرض کے ختم ہو جانے کے بعد جسم پر گہرے / معمولی نشانات پڑ جاتے ہیں، جو بہت بد نما ہوتے ہیں اور مریض معاشرہ میں اپنے آپ کو ضم کرتے ہوئے عجیب محسوس کرتا ہے، اگرچہ ان نشانات سے اس کے طبی افعال متاثر نہیں ہوتے،

اصول علاج

- ————— مقامی طور پر جلا بھیدا کرنے والی دوائیں استعمال کرائیں،
- ————— جسم میں خرابی کی تدابیر کریں۔

علاج

- ————— مردار سنگ کو سفید کر کے روغن گل کے ساتھ متاثرہ عضو پر لگائیں،
- ————— لبط کی چربی اور داخلیوں لگائیں،
- ————— مردار سنگ، بانس کی خشک جڑ، خشک بڑیاں قسطہ، تم بکائیں،
- ————— چاول، تم خر پنرہ، تمام دواؤں کو خوب باریک کر کے آب قاقلی / آب خر پنرہ میں ملا کر لگائیں،
- ————— لعاب حلبہ، تخم کتاں، آب خر پنرہ باہم ملا کر لگائیں،
- ————— افسنتین روغن کو باریک کر کے شہد میں ملا کر لگائیں،
- ————— بلودینہ نہری کو شراب میں پکا کر لگائیں،
- ————— ناتخواہ / مغز بادام تلخ کو شہد میں پیس کر لگائیں،
- ————— یخ نے فارسی / مر مکی / یخ قشقاہ / الحار خشک کو پیس کر سرکہ میں ملا کر لگائیں،
- ————— ریوند چینی / فاوا نیا کو سرکہ میں پیس کر فساد کریں،
- ————— عصاۃ کرب کو شراب میں حل کر کے لگائیں،
- ————— ایرسا، قسطہ، مردار سنگ مغسول، شاخ گوزن سوختہ،
- ————— بوریق، اشق ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر لگائیں،
- ————— عصاۃ کرفس، فراسیون باریک شدہ کو شہد میں ملا کر
- ضماد کریں۔



بادشنام*

ROSACIA

اس مرض میں بعض اعضا خاص طور سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں پر ایک میلی/بجڑی سی سرخی نمودار ہوتی ہے۔ یہ مرض موسم سرما میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

- (1) برودت کے باعث دھوی بخارات اور مادہ فعلات کا زیر جلد محسوس ہو جانا،
- (2) کثرت سے نوشی۔

علامات

اس کی علامات عام طور سے جذام کی ابتدائی علامات کے مشابہ ہوتی ہیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں پر بد نما، سرخ داغ پڑ جاتے ہیں، مادہ کی زیادتی اور حدت کی صورت میں قروح بھی نمودار ہو سکتے ہیں،

اصول علاج

○ ————— فصد کھولیں،

* صحیح لفظ بادشنام (فارسی) ہے، لیکن کثرت استعمال سے بادشنام ہو گیا، اب الجام میں بھی اسی نام سے متعارف ہے،

- جو تک لگائیں ،
- سینگییا کھینچیں
- مسہلات کے ذریعہ تنقیہ مواد کریں ،
- حمام میں نفع مسام کریں ،
- مناسب / ضا د استعمال کرائیں / اطلیہ و مراہم بھی مفید ہیں ۔
- متاثر مقام کو کھردرے پڑے سے رگڑ کر سرخ کر کے نمک و عقیقہ لگائیں ،
- جذام ابتدائی کا (اصول علاج و علاج) اختیار کریں ۔

علاج

- سراد کی فصد کھولیں ،
- مطبوخ ہلید سے تنقیہ کریں ،
- مار الجین / آب شاہترہ مروق بہرہ سکنجبین اقیتمونی علونجانی
- استعمال کرائیں ، اس کے بعد اطریفل شاہترہ علونجانی استعمال کرائیں ،
- نسخہ سکنجبین اقیتمونی علونجانی :-

کاؤ زبان ، گل بنفشہ ، گل نیلوفر ، حنب الثعلب ، ہر سیاوشاں ، شاہترہ ، بسفاج
 فستقی ، ہادر بنجویہ ، تخم کاسنی ، تخم خیارین ، تخم خربزہ ، تخم کشوث ، زنج کاسنی ،
 پوست یخ بادیان ، اصل السوس ، اسطوخودوس ، قنطاریون ، ہر ایک ۸ گرام ، خنجر
 گل سرخ ۶۶ گرام ، ستار مکی ، اقیتمون ، ہر ایک ۳۶ گرام ، حناب ، انجیر زرد ، ہر ایک
 ۲۰ عدد ، مویز منقہ سیستان ، ہر ایک ۴۰ عدد ، اقیتمون کے علاوہ حسب ضرورت
 دواؤں کو کوٹ کر سرکہ انگوری ۵۰۰ ملی لیٹر آب شیریں ۵۰۰ ملی لیٹر میں رات میں بھگوئیں
 پھر اس قدر جوش دیں کہ سرکہ اور پانی کا ایک تہائی حصہ ہی باقی رہ جائے ، اس کے بعد
 اقیتمون کو ایک پوٹلی میں باندھ کر اس میں ڈال کر دوبارہ جوش دیں ، پھر اتار کر اقیتمون کو
 بستہ کو بھوڑ لیں اور اس جو شانہ میں شیر خشت اصل ، تربنجبین خراسانی ، ہر ایک

۲۵۰ گرام، شکر سلیمانی ۳۵۰ گرام، گلقد آفانی ۹۰ گرام، حل کر کے جوش دیں اور بھاگ
تارتے رہیں، اس طرح جب قوام تیار ہو جائے تو محفوظ کریں اور ۵۰ — ۵۰ گرام،
ہمراہ مار الجبین نوش کرائیں،

نسخہ اطریفل شاہترہ علوی خانی:—

برگ شاہترہ ۵۰ گرام، حود صلیب، لبغایج، مندلی سفید، لباشیر، لاچورد مغسول،
ہر ایک ۲ گرام، گل سرخ ۴ گرام، برگ سنارکلی، اقیتمون، ہر ایک ۲۵۰ گرام، پوست بلیہ
زرد، بلیہ سیاہ، پوست بلیہ آملہ، گائوتربان، اسطوخودوس، ہر ایک ۳۰ گرام، تربہ
سفید ۴ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام ۵۰۰ ملی لیٹر،
میں چرب کریں اور گل کبر، گل سرخ، کشنیر خشک، تخم کاسنی، گل بنفشہ، حنبل الثعلب،
ہر ایک ۴ گرام، عویز متقی ۸۵ گرام، مقل اذرق ۳۰ گرام کو باریک کر کے روغن بادام
میں چرب کر کے دونوں کو ملائیں اور تین گنا شہد کے ساتھ قوام تیار کریں اور ۹-۱۲
گرام کھلائیں،

○ ————— چناپیس کر آب کشنیر سبز مرق میں حل کر کے
ضاد کریں،

○ ————— جسم کو کسی سخت چیز سے رگڑ کر خون آلود کر کے دہاں
نمک چھڑکیں تاکہ باقی ماندہ خون تحلیل ہو جائے، / صابن اور انجیر ملا کر ضاد
کریں۔ اس کے بعد اس کو گرم پانی سے دھوئیں،

○ ————— زردچوب، زراوند، مردار سنگ، پوست انار، ہر ایک
ہموزن کو باریک پیس کر کے سرکہ اور روغن گل میں مرہم بنا کر استعمال
کرائیں،

○ ————— مردار سنگ ۳۴ گرام باریک پیس کر محفوظ کریں اور
موم ۸۰ گرام کو روغن گل ۵۰۰ ملی لیٹر میں پگھلا کر اس میں مردار سنگ کا سفوف

ملائیں اور کسی قدر سرکہ ملا کر مرہم بنائیں اور استعمال کرائیں،
 ○ ————— برگ شاہترہ، برگ نیم سبز، برگ سرو، برگ گز، گام گز،
 بادیان، ہر ایک ۳۶ گرام کو پانی میں جوش دے کر پھیرا رکھیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

فساد لون

DYCHROMIA

اس مرض میں جسم کا طبعی رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی طبعی چمک اور آب ختم ہو جاتی ہے اور سبب کے اعتبار سے مختلف رنگت اختیار کر لیتا ہے،

اسباب

- (I) زیر جلد فاسد مادہ کا اجتماع ،
- (II) خون میں غیر ضروری مواد کا غلبہ ،
- (III) بعض اغذیہ کا بکثرت استعمال مثلاً
 - (I) غذا کے شور / سرکہ ،
 - (II) اجوائن / زیرہ ،
 - (III) خشک اغذیہ ،
 - (IV) امراض معدہ و امعاء و کبد / مٹی کھانا (وحم) / امراض مزمنہ ،
 - (V) کھڑا ہوا پانی نوش کرنا ،
 - (VI) غم و فکر ،
 - (VII) کثرت مباشرت ،
 - (VIII) نقص تغذیہ ،
 - (IX) غیر معمولی حرارت / برودت ،
 - (X) بعض امراض حادہ ،

علامات

جلد کا رنگ عام طور سے سبب مرض کے تابع ہوتا ہے، چنانچہ دھوپ کی زیادتی، زیادہ سوئی، نیکیلی اشیاء / اغذیہ کے کثرت استعمال اور یرقان اسود کی صورت میں جلد کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شدید استفراغ، کثرت جماع، شدید درد، غم و فکر اور جسم میں صفراوی مادہ کے خلیہ کی صورت میں رنگت زرد پڑ جاتی ہے، مرضی امراض میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، مودہ کے امراض، ناموافق غذا وغیرہ کی صورت میں جسم کی رنگت سفیدی مائل ہو جاتی ہے، ————— دیگر اسباب کو بھی اسی طرح قیاس کریں۔

اصول علاج

- ————— خلیہ خلط قاصد / غالب کی صورت میں اس کا تنقیہ کریں،
- ————— مودہ و جگر کے امراض اس کا سبب ہوں تو ان کا ازالہ کریں،
- ————— ناموافق اغذیہ مرض کا سبب ہوں تو ان کو ترک کر دینے کی ہدایت کریں،

- ————— سورما القنیدہ / کثرت استفراغ کی صورت میں تحلیل و استفراغ کو روکنے کے بعد مقوی دوائیں / غذائیں استعمال کرائیں،
- ————— درد وغیرہ کی صورت میں اُن کا ازالہ کریں،
- ————— مصفیات استعمال کرائیں،
- ————— مفرحات استعمال کرائیں،
- ————— غیر ضروری حرارت / برودت سے پرہیز کرائیں،

علاج

- ————— خلیہ صفراوی کی صورت میں منہج، مسہل اور تہریہ کا مہول اختیار کرتے ہوئے یہ نسخے استعمال کرائیں۔

نسخہ منفع :-

گل بنفشہ، گل سرخ، مکور، تخم خطمی، شاہترہ، تخم کاسنی، نیمکوب، ہر ایک
۵ گرام، گل نیلوفرہ ۵ گرام، عذاب، آلو بخارا، ہر ایک ۵ عدد۔ تمام دواؤں
کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقد آفتابی/غیرہ بنفشہ
۲۵ گرام ملا کر دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، ۳، ۴ دن یہ نسخہ استعمال
کرائیں، اس کے درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

مذکورہ سابق نسخہ منفع حسب دستور تیار کریں صرف گلقد/غیرہ بنفشہ کی مقدار ۲۵ گرام،
کی بجائے ۵ گرام کر دیں، اور مغز غلوس خیار شیرہ ۵ گرام، تربخین خراسانی،
حمر ہندی مقشر، ہر ایک ۵ گرام، ان دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان
کر نسخہ منفع میں ملا دیں اور شیرہ مغز بادام شیریں ۵ عدد ملا کر نوش کرائیں،
پیاس لگنے پر صرف عرق مکور اور عرق کاسنی تھوڑی مقدار میں نوش کرائیں،
دوسرے دن درج ذیل نسخہ تبرید استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

لعاب بہدانہ ۳ گرام، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپتول مسلم
۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،
○ خلیہ سودا کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع :-

کاوڑ بان، اصل السوس مقشر، بادربخوبیہ، ہر ایک ۵ گرام، بادیان، شاہترہ،
اسطوخودوس، ہر ایک ۵ گرام، عذاب ولایتی ۵ عدد، اسپتال ۱۱ عدد۔
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد آفتابی ۲۵ گرام حل کر کے

چھان لیں اور نوش کرائیں۔ — موطا ہے کہ جس خلط کے احتراق سے
سودا کی تولید ہوتی ہو، اس کی رعایت نسخ میں ضروری ہے،

نسخہ مسہل :-

مذکورہ نسخہ منفع میں :- — بسفاج فستقی، اقیتمون ولایتی (پوٹلی میں
باندھ کر) قصب النذیرہ، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ زرد، ہلیلہ کابل، غارلقون مغزبل،
ترید اکبر آبادی جو فی خراشیدہ، برگ سنار، کئی، مغز فلکس خیار شیر، شیر مغز بادام کا
افادہ کریں۔ — دوسرے دن یہ نسخہ تہرید استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

آط مرہ گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق پلیٹ کر کھلائیں اس کے بعد لعاب۔
گاؤزباں ۵ گرام، پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
تخم ریحاں، گرام پھڑک کر نوش کرائیں،
○ — مصلی خون کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

چوب چینی، برگ شیشم، ہر ایک ۲۵ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابل،
عنا ب، ہر ایک ۱۰ گرام، برگ سنار، کئی ۲۵ گرام، — تمام دواؤں کو نیکو
کر کے رات کے کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان لیں اور ترنجبین،
شیر خشک، چینی، ہر ایک ۲۸۰ گرام کا قوام بنائیں اور مذکورہ دوائیں شامل کریں اور
۲۵ ملی لیٹر ہمراہ پانی استعمال کرائیں،
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

عنا ب، شاہترہ، نیلوفر، اکاش بیل، کاسنی، تجازی، پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ،
منڈی، منڈل سرخ، منڈل سفید، برادہ شیشم، گل بنفشہ، ہر ایک ۱۲ گرام، —
تمام دواؤں کو نیکو کر کے آٹھ گنا پانی میں جوش دیں اور جب پانی $\frac{1}{2}$ حصہ
رہ جائے تو مل چھان کر دواؤں کے تین گنا ٹھکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور ۲۵ ملی لیٹر
ہمراہ عرق مصلی خون استعمال کرائیں،

○ سور القینہ / ضعف وغیرہ مریض کا موجب ہوں تو یہ نسخے استعمال کرائیں،

مرداریدہ ۱۲ گرام، ہندل سفید، بٹاشیر کھربا، یشب، ہر ایک ۶ گرام، رب انار، رب سیب، رب بھی، ہر ایک ۶ ملی لیٹر، چینی ۲۰ گرام، عرق کیوڑہ، حسب ضرورت، کھل کر نے والی دواؤں کو باریک کریں اور عرق کیوڑہ میں قوام بنا کر مذکورہ ادویہ، ورق نقرہ ۶ گرام، ورق طلا ۵ گرام ملا کر خوب کھل کر لیں، اور خیرہ بنائیں اور صبح، شام ۲ گرام، ہمراہ عرق گاؤڑہ (۱۰۰ ملی لیٹر، شربت عذاب ۱۰۰ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں،

زہر مرہ ۱۲ گرام، مرداریدہ، زعفران، عنبر، مشک، ہر ایک ۱۲ گرام، — تمام دواؤں کو عرق کیوڑہ میں کھل کر کے محفوظ کر لیں، — بادر نجویہ ۵ گرام، بہمو، سرخ، بیدار، تودہ سرخ، تودری سفید، ہر ایک ۱۲ گرام، گل گاؤڑہاں، تخم بڑہ، ہر ایک ۱۱ گرام، عرق گلاب، عرق بید مشک، ہر ایک ایک لیٹر، — مذکورہ دواؤں کو نیچے کے مذکورہ عرقیات میں بھگو کر ڈھک دیں، صبح کو جوش دے کر چھانچا لیں اور آگے لگ گرام ۱۰ کے قوام میں ملائیں، — اس کے بعد مذکورہ روح کیوڑہ میں کھرا کر دوا میں شامل کریں، اور حسب دستور خیرہ بنا کر صبح کو ۵ گرام ہمراہ عرق بادیان / پانی استعمال کرائیں،

○ — امراض معدہ / المعاد / کبد میں ان امراض کے ذیل میں بیان کردہ نسخہ استعمال کرائیں،

○ خارجی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں،
آرد باقلا، آرد نخود، تخم خربزہ، تخم ترب، مغز بادام، نشاستہ، بقیہ، بونہ اڑنا، پس کر روغن گل حسب ضرورت ملا کر دودھ میں حل کریں اور رات کو سوتے وقت لگائیں، صبح کو آرد نخود، سفوف سنبل الطیب مل کر نیم گرم پانی سے دھوئیں اور روغن یاسمین لگائیں۔

آرد جو، آرد باقلا مقشر، آرد کر سنہ، آرد ترمس، نشاستہ، آرد حدس، ہر ایک ۶ گرام، مغز تخم خربزہ ۵، اگر کم کثیر ۴ گرام — تمام دواؤں کو کوٹ پس کر ابلنے کے طور پر استعمال کرائیں،

زرد چوب، بڑنگ کابل، ہیل، زعفران، قوہ، سنبل الطیب، سعد کوفی، حلب
 یخ کبر، بسفاج، یخ نے، فوغل، مامیراں، زریخ، ہوزن، — تمام
 دواؤں کو دودھ میں پیس کر غمزہ کے طود پر لگائیں،
 مغز تخم تربوز، مغز بادام، آرد برنج، تخم خربزہ، مغز تخم خیارین، یخ بنفشہ،
 خشنماش سفید، زیرہ سفید، گلنار، گل سرخ، گل معصفر، پوسست — نارنگی،
 برگ دیارنیم، برگ خارشتر، گل ببول، گل خطمی، صدف سوختہ، —
 تمام دواؤں کو خوب با ریک کر کے لعاب اسپغول، لعاب بہداتہ میں ملا کر لگائیں،



Learn Unani By Abdul Waris Chohan

نآلیل

WARTS

اس مرض میں جسم پر مختلف شکلوں کے مٹے نکل آتے ہیں جس سے جلد بد نما ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ اذیت کا باعث بھی ہوتے ہیں،

اقسام

(۱) عمر کے اعتبار سے

نآلیل

Warts

نآلیل شیخونی

نآلیل طفلی

(ب) کیفیت اور شکل و صورت کے اعتبار سے

نآلیل

Warts

منکوس متشقق متعلق مسامری قرنی ہر سیوس خیللی عدسی علی

اسباب

- (I) صفراء/خون کی وجہ سے فاسد ہونے والی رطوبات،
- (II) نہایت غلیظ، خشک بلغمی/سوداوی مادہ/دونوں
- (III) کثیف اور غلیظ غذاؤں کا استعمال
- (IV) دلدش اور ریاضت کی کمی/ترک کر دینا
- (V) تشنگی فساد خون

علامات

جسم کے مختلف حصوں، خاص طور سے چہرہ، گردن، ہاتھ، مچھل اور اندام نہانی، جلد پر بھاری پیرا ہو جاتا ہے، عام طور سے یہ ابھار چھوٹا، خاردار دانوں، کما طرح ہوتا ہے، (۱۱) ابھاروں، (۱۲) سلسلہ خشکائی والی اور گوبھی کے پھوٹا، کما طرح ابھار ہوتی ہے، (۱۳) عموم میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تاہم بعض اقسام تکلیف دہ ہوتی ہیں اور درد، سوزش اور نمارش کا باعث ہوتی ہیں، — آتشک کے مریضوں، یا آتشک میں مبتلا والدین کے بچوں میں یہ علامت شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔

ذیل میں جملہ اقسام کی علامتوں کو مختصراً تحریر کیا جا رہا ہے۔

(I) لطفلی: —

یہ بچہ، بڑا، اکثر ہاتھ پیروں اور جسم کے دوسرے حصوں میں نمودار ہوتی ہے۔

(II) شیخونی: —

یہ ۴ - ۵ - ۱۰ سال کی عمر کے بعد فریبہ اندام، شحمی جسم والوں میں کثیراً لائق ہے، اور یہ جو تھانڈا، یا ٹھنڈا ٹھہر سکتی ہے۔

(III) منکوس: —

یہ بچہ اندر کی طرف گوشت میں پیوست ہوتے ہیں۔

(IV) متشقق :-

یہ بڑی، گول اور ریشہ دار ہوتی ہیں۔

(V) متعلق :-

یہ بخور (مسے) ٹکلی ہونی مدام ہوتی ہیں۔

(VI) مسماری :-

ان بخور کی جڑ باریک اور سر میخ کی مانند ہوتا ہے۔

(VII) قرنی :-

یہ قرن (سینگ) کی طرح ٹیڑھی میڑھے، دقاہیہ،

(VIII) طرسیوس :-

یہ بخور متفرق ہوتی ہیں چنانچہ ان کے نیچے پیپ ہوتا ہے۔

(IX) خیطی :-

یہ دھاگہ کی مانند ہوتی ہیں اور بخور توں میں کثیرالوقوع ہیں، بالخصوص گردن پر نمودار ہوتی ہیں، بعض اطباء اس کو "حنطی" کا نام دے کر لمبی، سرخی مائل، گندم نما بتاتے ہیں۔

(X) عدسی :-

یہ ٹائیل (مسے) مسود کی مانند، چپٹے، زرد اور چمکے ہوتے ہیں اور بیضا اور پر بکثرت نکلتے ہیں۔

(XII) علمی :-

یہ ٹولول (مس) چھوت دار ہوتا ہے اور درجنوں کی تعداد میں نکلتا ہے، جسم کے کسی بھی حصہ میں نکل سکتا ہے، پیر کے تلوے پر بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ پھل کر ان سے جو خون خارج ہوتا ہے وہ تعدیہ کا سبب بنتا ہے۔

• اصول علاج

- اصل سبب مرض کا ازالہ کریں،
- حسب ضرورت فصد کھولیں،
- خلط موثر کا تنقیہ کریں،
- مسوں کو گرانے کی تدابیر کریں،
- مصفیات خون استعمال کرائیں،
- رفع قبض کریں۔

علاج

○ تفسیر خون کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخ :-

شاہترہ، ہلید سیاہ، ہر ایک ۵ گرام، سرچوک، منڈی، برگ جھاؤ، گل سرخ،
ہر ایک ۴ گرام، چراستہ، عشبہ مغربی، ہر ایک ۴ گرام، عذاب ۵ عدد، تمام
دواؤں کا جو شانہ / خیسانہ استعمال کرائیں،
○ نفج بلغم کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

نسخ :-

بنج کاسنی، بنج بادیان، بنج کرفس، بنج اذخر، بادیان، ہر ایک نیمکوب، پریاوشان،

ہر ایک، گرام، اصل اسوسن منقشر نیکوب ۵ گرام، اسلو خود دوس ۵ ر ۷ گرام، انجیر زرد، ۵ عدد، مویز منقہ ۹ عدد، ————— تمام دواؤں کو شام کے وقت پانی میں بھگوئیں اور صبح کو معمولی جوش دے کر مل چھان کر گلقد غسل ۸ گرام سے تیسریں کر کے نوش کرائیں، ————— مسہل کے طور پر، دن بعد اسی نسخہ میں درج ذیل ادویہ کا اضافہ کریں،

نسخہ:-

تریدہ سفید جوف خراشیدہ ۵ گرام، غارلقون مغربل ۲ گرام، سنار کی ۲ گرام، کو مذکورہ دواؤں میں شامل کریں اور مغز فلوس خیار شہزہ ۸ گرام، شکر سرخ ۵ گرام کو پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر گلقد آفتابی ۲۸ گرام سے تیسریں کر کے روغن بید انجیر ۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، ————— مسہل کے دوسرے دن تبرید کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید:-

گلقد آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۵ ملی لیٹر میں مل چھان کر تخم ریحاں ۲ گرام چھریں کر نوش کرائیں۔

○ ————— سوداوی خلط کے نفع و تنقیہ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع سودا:-

بسفاج فستقی، اقیقون ولایتی (سہ بست) قصب الزریرہ، ہیلہ سیاہ، ہیلہ زرد، ہیلہ کابی، غارلقون مغربل، تریدہ جوف خراشیدہ، برگ سنار کی، مغز فلوس خیار شہزہ، شیرو مغز بادام وغیرہ سے حسب ضرورت تقویم تیار کریں اور نوش کرائیں، ————— اور تبرید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید:-

آلہ مربی گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد

لعاب گاؤزبان ۵ گرام، پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر سے شیشوں
کر کے تخم ریحاں، ۵ گرام ادھر سے پھر دک کر نوش کرائیں،

نسخہ مسہل سودا :-

گاؤزبان، بادرنجویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۳ گرام، برسیاوشاں ۵ گرام،
اسطوخودوس، بادیان، شاپترہ، ہر ایک ۵ گرام، عناب دلائی ۵ عدد، سپستان ۵ عدد،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلغند آفتابی / تربنجن خراسانی
۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔

- خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،
- زنجار ۳ گرام، شہد ۱۲ گرام میں ملا کر لگائیں،
- شب یمانی بریاں، سہاگ بریاں، نوشادر، کات سفید،
- ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر لگائیں،
- زرد چوب کو پیس کر کاغذ میں لپیٹ کر تہی کی طرح بنائیں اور
- سرے کو آگ میں جلا کر مے کو اس سے داغ دیں،
- متقل / باہی سرکہ میں پیس کر لگائیں،
- شب یمانی بریاں، سہاگ بریاں، بورہ ارمی کو سرکہ میں
- ملا کر لگائیں،

- اند مال زخم کے لیے مرہم سفیدہ کا شغری استعمال کرائیں،
- روغن گل، مرغ کی چربی ملا کر مسوں پر ملیں۔
- نمک اور سرکہ ملا کر لگائیں۔



حزاز، ابریہ *

SEBORRHOEA

اس مرض میں جلد کی چکنائی پیدا کرنے والے غدود کے فعل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خاصہ رطوبات کی پیدائش میں ان اذ ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر جلد کی طرف دفع ہو کر جلد پر، باریک غشاء کی مانند جم جاتی ہیں اور بعد میں خشک ہو کر بھوسی کی طرح جھڑنے لگتی ہیں، بعض اوقات مادہ کی غیر معمولی رداست کی صورت میں جلد زخمی ہو جاتی ہے، یہ مرض سر اور بھوؤں میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

- (I) جلد میں چکنائی پیدا کرنے والے غدود کے فعل کا فتور،
- (II) سر / متاثرہ عضو کی جلد کا سوہ مزاج،
- (III) بلغم سوء / شولہ رطوبات / سودا، آمیز خون / فساد خون،
- (IV) سور القینہ،

* داؤد النطاکی کا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کا درد ہے جو عام طور سے سر کی جلد (کھال) میں عارض ہوتا ہے، ایسی صورت میں بقول حکیم غلام جیلانی اس کو Lichen اور جب بدن کے مختلف حصوں مثلاً جگرہ پشت اور سر کی جلد وغیرہ میں بغیر شور کے ہو تو Seborrhoea کہتے ہیں، شور بھی ہو سکتے ہیں، روسی بظفار، بھوسی وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں، (مؤلف)

(۶) مزاج میں یبوست کا غلبہ / دماغی کام کی کثرت ،

(۷) ضعف دماغ / عام جسمانی ضعف ،

(۸) ردی بخارات کا سر کی طرف صعود کرنا ،

(۹) بخار انگیز اغذیہ ۔ — مثلاً

(۱) خردل

(۲) ہند دانہ

(۳) باتلا — وغیرہ

(۴) تیز اور چہرہ بھری چیزوں کا بکثرت استعمال

علامات

سر ، بھوؤں اور داڑھی کے بالوں کی جڑ سے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے
چھلکے / ردسی / بھوسی وغیرہ جھڑتی ہیں ، یہ چھلکے سفید ، سفید ہوتے ہیں اور بالوں میں
نظر آتے ہیں ، گھنے دندانے کی کنگھیوں کے کرنے سے خارج ہوتے ہیں ،
بعض اطمینان اس کو التهاب جلد کی ایک نوع قرار دیتے ہیں ۔ — یہ بعض
اوقات بالکل خشک ہوتی ہیں اور کبھی اس (حرز) سے معمولی رطوبت رستی ہے پھر پھر
کبھی تو بے قاعدہ خشک چھلکے دار نشان ہوتے ہیں جس میں شروع میں چھوٹی سی سرخ ،
خشک پھنسی سی ہوتی ہے ، دو چار دن بعد اس میں پیپ پڑ جاتی ہے ، جو جلد ہی
خشک ہو کر کھرند بن جاتی ہیں ، اور چھلکوں کی شکل میں اترتی رہتی ہیں ، عام طور سے
ان چھلکوں / بھوسوں میں چکنا پٹ بھی ہوتی ہے ، — شدید حالات میں
معمولی خارش بھی ہو سکتی ہے ،

اصول علاج

○ — جلد کے غدہ دہنیہ کے فعل کو اعتدال پر لانے کی تدابیر
کریں ،

○ — غلبہ یبوست کی صورت میں ترطیب مزاج کریں ،

- _____ منفع و مسهل اخلاط ردیہ استعمال کرائیں،
- _____ مصفیات خون استعمال کرائیں،
- _____ حمام کرائیں اور حفظانِ صحت کے عام اصولوں پر عمل کرائیں،
- _____ بخار انگیز، تیز، چمپریری اغذیہ سے پرہیز کرائیں،
- _____ جالی دواؤں سے سر کو دھوئیں،

علاج

- _____ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں،
- _____ آب چقندر، آرد نخود، خطمی، سبوس گندم کو سرکہ میں ملا کر، سر کو دھوئیں، اس کے بعد روغن بنفشہ اور روغن کدو سر میں لگائیں،
- _____ آرد نخود ۵ گرام، سبوس گندم، آرد حلبہ، ہر ایک ۱۲ گرام، خردل ۲۵ گرام خطمی، گرم، تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر سرکہ اور عرق گلاب ملا کر سر میں اچھی طرح مل کر دھوئیں،
- _____ آرد کر سنہ، ترمس، ہر ایک ۲۲ گرام کو لعاب اسپنول میں ملا کر سر میں لگائیں اور کچھ دیر بعد سر کو دھونے کی ہدایت کریں۔
- _____ مغز خربزہ، آرد باقلا، سبوس گندم کو سر میں ملیں، اس کے بعد دھو کر روغن بنفشہ لگائیں،
- _____ آرد نخود، بوریق، آرد حلبہ، پشکری سفید، مویزج، خردل، تمام دواؤں کو باریک کر کے سرکہ میں ملا کر سر میں خوب ملیں، اس کے بعد بالوں کو دھونے کی ہدایت کریں،
- _____ ذہرہ گاؤ ۵/۳ گرام، بورہ ارمی، گرم، آب چقندر ۱۲۵ ملی لیٹر، شہد حسب ضرورت کے ساتھ ملائیں اور سر میں لگائیں،
- _____ ذہرہ گاؤ اور روغن سر شف لگاتا بھی سودمند ہے،
- _____ آب لیموں میں شکر ملا کر سر میں لگائیں اور ۴ گھنٹے بعد سر کو دھونے کی ہدایت کریں،

○ آملا، پوست ہلیلہ، بھنگرہ، خجست الحدید، تخم نیل، (حب زین)،
شب یمانی ہوزن۔ تمام دواؤں کو پیس کر سرکہ میں ملا کر سر میں ملیں،

○ اگر نرس سر میں ہو تو سر منڈوا کر روغن بادام / روغن آملا
کی مالش کریں اور جو اکھاڑ ۶ گرام کو پانی میں جوش دے کر سر کو دھوئیں،
داخلی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

○ کشتہ فولاد، جواکش جالینوس میں ملا کر کھلائیں اس کے
بعد شیرہ بادیاں ۷ گرام، شیرہ تخم کشوث ۵ گرام، شیرہ صویر منقہ ۹ عدد، پانی ۲۵ ملی لیٹر
میں نکال کر شربت اتار ۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں، اور غذا کے
بعد جبہ انوار اقی کھلائیں۔



Learn Unani By Abdul Waheed Khan

نملہ

HERPES

اس مرض میں جلد پر سرخ یا زردی مائل رنگ کے کسی قدر شفاف، گچھان دانے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں سوزش اور چھوٹی کے رینگنے جیسا احساس ہوتا ہے، ۱۲-۱۳ دن میں یہ دانے پک کر خشک ہو جاتے ہیں، اور ان پر کھر بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات یہ پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے مکدر دھوبت خارج ہوتی ہے، اور دوسری مرضی علامات بھی رونما ہوتی ہیں۔

اقسام

نملہ

Herpes

نملہ منطقیہ

Herpes Zoster

نملہ بسیط

Herpes Simplex

حقانیہ

Prepuise Herpes

شفویہ

Lip. Herpes

اسباب

- (I) خلیہ و قسا د خلط صفراء
- (II) عصبی فتور
- (III) بد ہضمی
- (IV) سور مزاج جگر
- (V) ریہ کے بعض امراض
- (VI) بعض انواع کے بخار، خاص طور سے طیریاتی بخار، حمی دماغی نخاعی،
- (VII) تسمم مثلاً سنگھیا
- (VIII) تعدیہ آتشک، سوزاک
- (IX) قشب (Virus) مثلاً — ہرپس سیمپلکس وائرس۔
- (H.S.V-1) ہرپس سیمپلکس وائرس — ۲ (H.S.V-2) ، ویری سلا
- زوسٹر وائرس (V.Z.V.)

علامات

عمومی :-

ابتداء میں سطح جلد پر حرارت اور سوزش محسوس ہوتی ہے، اور متاثرہ مقام کسی قدر سرخ اور متورم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دلم چھوٹی چھوٹی، سرخ / زردی مائل پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں، یہ پہلے دن گول اور شفاف ہوتی ہیں لیکن ۲۸ - ۲، گھنٹے میں تھوڑی چھٹی اور کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی ہیئت انگور کے خوشوں جیسی ہوتی ہے، ان میں شدید خارش اور سوزش محسوس ہوتی ہے، اگر مادہ مرض زیادہ حاد نہ ہو تو نملہ آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن شدید صورتوں میں بڑھنے کی نوبت نہیں آتی بلکہ وہ مقام سرخ ہو کر متقرح ہو جاتا ہے اور مادہ کی حدت گوشت کو کھا جاتی ہے،

خصوصی :-

(۱) نملہ بسیط :-

ابتداء میں مقام مریض پر حرارت اور سونٹیوں کی چھن کا احساس ہوتا ہے اور مقامی طور پر سرخی اور دم بھی ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور بعض اوقات کسی قدر بڑی، مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر پھنسیاں نکل آتی ہیں، پھنسیاں نکلتے وقت جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، یہ پھنسیاں ہونٹ، سینہ، گلے، بازو، حشفہ وغیرہ پر زیادہ نکلتی ہیں، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جب ختم ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس، قد آگے دوسری پھنسیاں نکل آتی ہیں، اس مناسبت سے ”نملہ ساعدہ“ (چلتے والی پھنسیاں چوٹیوں پر) بھی کہا جاتا ہے۔ کثرت وقوع عضو، کے اعتبار سے اس کی چند ذیلی انواع ہیں،

(۱) نملہ شفیویہ :-

یہ پھنسیاں عام طور سے بخار اور نزلہ و زکام کے بعد ہونٹوں خاص طور سے باپھوں پر نکلا کرتی ہیں، اور کبھی کسی ظاہری سبب کے بغیر بھی نکلتی ہیں، ہونٹوں پر نکلنے کی وجہ سے نملہ شفیویہ (ہونٹوں والی نملہ) کہا جاتا ہے، یہ بہت چھوٹی اور شفاف ہوتی ہیں، ابتداء میں زرد رنگ کے اور کچھ عرصہ بعد خشک ہو کر بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے گھرنڈ بن جاتی ہیں جو ۶-۹ دن میں از خود گر جاتی ہیں اور وہاں کچھ دنوں تک سرخ درخ رہتا ہے،

(۲) نملہ ختانیہ :-

اس میں پہلے خلاف حشفہ (Prepuce) کے اندر یا باہر سرخ رنگ کے، الگ الگ دھبے دکھائی دیتے ہیں، جو کچھ عرصہ بعد چھوٹے چھوٹے شفاف آبلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان میں شدید خارش اور سوزش ہوتی ہے، بیرونی سطح کے دانے

عام طور سے ۸، ۹ دن میں خشک ہو کر کھرڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن اندرونی دانے شدید علامات رونما کرتے ہیں چنانچہ کبھی یہ پھوٹ کر قرص بن جاتے ہیں جس کے نتیجے میں غلاف حشفہ دبیز ہو جاتا ہے، اگر یہ دانے متواتر نکلتے اور قرص بن کر خشک ہوتے ہیں تو غلاف حشفہ غفرونی خواص اختیار کر لیتا ہے،

(ب) نملہ منطقیہ :-

ابتداء میں لمرزہ کے ساتھ بخار ہوتا ہے، قے آتی ہے اور مقام مرض پر سوزش اور ٹیس کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے، درد میں سونگی کی سی چبھن بھی ہوتی ہے، پھر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں، جو بعد میں شفاف ہو جاتے ہیں اور اس قدر گھنے ہوتے ہیں کہ گویا انگور کے خوشے ہوں، ان کا حجم کنگنی کے برابر ہوتا ہے، ہر خوشے کے گرد ایک سرخ ہالہ ہوتا ہے، مرض کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہالہ، ہلالی شکل اختیار کر لیتا ہے، چوں کہ یہ مرض اعصاب کی خرابی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے اس لیے اعصاب کے متوازی نکلتا ہے، جیسا کہ تحریر کیا کہ ابتداء میں دانے شفاف ہوتے ہیں، لیکن تیسرے دن ان میں گدلی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے، چوتھے پانچویں دن مرجھا جاتے ہیں اور ان پر بھوری کھرنڈ جم جاتی ہیں، لیکن اس کے پاس دوسرے دانے نکل آتے ہیں۔ بہر حال ۱۵-۲۰ دن میں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تاہم زخم کے نشان پر عصبی نوعیت کا درد ۱-۲ دن رہتا ہے، اور بخار کی شدت نیز درد کی وجہ سے مرین پر نقاہت طاری ہو جاتی ہے،

بعض اوقات یہ دانے ہاتھ اور گھٹنے پر نکلتے ہیں، چند دنوں بعد ان میں گدلی رطوبت آجاتی ہے اور پھر پیپ پڑ کر متقرح ہو جاتے ہیں، اس وقت شدید خارش اور سوزش کا احساس ہوتا ہے، ایک ماہ میں یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔
 الجبار کا خیال ہے کہ یہ مرض کمزور نوجوانوں میں کثیر الوقوع ہے۔

اصول علاج

- _____ خلیہ صفرار کی صورت میں صفرار کا تنقید کریں۔
- _____ اطفال حرارت اور تسکین حلت کا اہتمام کریں۔
- _____ مصفیات استعمال کرائیں۔
- _____ عصبی فتور کی صورت میں اس کا ازالہ کریں۔
- _____ تلیسین شکم کریں۔
- _____ مدملات استعمال کرائیں، درد کے ازالہ کی تدابیر کریں۔

علاج

- _____ خلیہ صفرار کی صورت میں نفج و تنقید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
- _____ نسخہ منضج :-

تخم کاسنی، تخم کشوث، غلب الشلب، پوست بیلہ زرد، ہر ایک ۷ گرام،
 تمر ہندی ۲۵ گرام، آلو بخارا ۷ عدد، تمام دواؤں کو گرم پانی میں
 بھگو دیں، اس کے بعد مل چھان کر تر بنجیں ۲۵ گرام ملا کر صبح، شام نوش
 کرائیں، جب نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسی نسخہ میں درج
 ذیل ادویہ کا اضافہ کریں،

نسخہ مسہل :-

نسخہ مذکورہ بالا میں شیر خشک، مغز قلوں بخار شبنم، ہر ایک ۵۰ گرام ملا کر
 مل چھانی لیں اور نوش کرائیں، مسہل کے بعد چند روزیہ
 نسخہ استعمال کرائیں۔

عرق کاسنی، عرق شاہترہ، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر، سکنجیبی بزدوری ۲۵ ملی لیٹر ملا کر صبح، شام نوش کرائیں،

لعاب بہدانہ ۳ گرام، شیرہ عتاب ۵ عدد، عرق شاہترہ ۱۵۰ ملی لیٹر میں نکال کر شربت عتاب ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، اگر بخار بھی ہو تو اوپر سے خاکسی بگم پھڑک کر نوش کرائیں۔

○ مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،
پوست یزغ نیم، پوست شاخ انجیر دشتی، شاہترہ، چرائنتہ، کشیز خشک،
پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابی، پوست بہڑہ، ہلیہ سیاہ، املہ، بادیان، شیطرج،
گل سرخ، سنار کی، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد
تین کے قوام میں حسب دستور محون بنائیں اور ۱۰ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال
کرائیں،

پوست نیم، برگ نیم، پوست بکائن، برگ بکائن، پوست کچال، پوست موسلی،
دودھنی خورد، شاخ برگ جوانہ، پوست گولر، برگ حنا، منڈی، شاہترہ، سرخوکر،
دھاسہ، گل نیلوفر، برادہ مندل سفید، برادہ شیشم، کشیز خشک، گل سرخ
تخم کاسنی، یزغ کاسنی، فوہ، برگ بید سادہ، ہر ایک ۱۲۵ گرام،
تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۲۵ لیٹر پانی میں بھگو دیں، ۲۴ گھنٹے بعد ۲ لیٹر عرق
کشید کریں۔ اور ۱۵۰ ملی لیٹر ہمراہ شربت عتاب ۵۰ ملی لیٹر، صبح کے وقت نوش کرائیں،
○ تلپین شکم کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

حسب السلاطین مدبر ۶ گرام، مغز بادام، مغز تخم ازندہ، ہر ایک ۱۲ گرام،
نبات سفید ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک کر کے موٹھ کے دانہ کے
برابر گولیاں بنائیں اور ۱-۳ گولیاں استعمال کرائیں،
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

ہلیہ زرد، سنار کی، ہر ایک ۶۰ گرام، زیرہ سیاہ، بولایہ خشک، گل سرخ،
مصلیٰ رومی، ہر ایک ۱۲ گرام، زنجبیل ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک
پیس کر سفوف تیار کریں اور ۱۰ گرام ہمراہ آب میمگرم استعمال کرائیں،

○ اظفار حرارت (حرارت بھانا) کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
مغز تخم خیار، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز تخم خربزہ ہوزن کو پانی میں پیس کر
شیرہ حاصل کریں اور نوش کرائیں،

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخے/تدابیر بروئے کار لائیں،
مازو، صندل، پوست انار، گل ارمنی ہوزن کو سرکہ، عرق گلاب میں گھس کر
مقام مرض پر لگائیں،

ما مٹیا، اقاقیا، رسوت، صندل ہوزن کو آب کاسنی، آب کور میں گھس کر
نماد کے طور پر استعمال کرائیں،

گل ارمنی، صندل سرخ، صندل سفید، شیاف ما مٹیا، تخم کاسنی، کافور،
لمبا شیر، حصفن ہوزن کو آب کور سبز میں پیس کر لپی، گولیاں بنائیں اور خشک
کر کے محفوظ کر لیں، ضرورت کے وقت آب کور سبز مدق، عرق گلاب اور کسی قدر سرکہ میں
گھس کر مقام مرض پر طلا کر کریں،

تسکین درد کے لیے یہ نسخے بطور خاص مفید ہیں،
بزررا لینج ۲ گرام، افیون ۳ گرام، برگ بھنگ ۴ گرام کو پانی میں پیس کر لپی کریں،
پوست خشتا ش کو پانی میں جوش دے کر ٹکڑ کر کریں،

اگر زخم میں ماکل پیدا ہو جائے یا بشور، زخم بن جائیں تو یہ نسخے استعمال کرائیں،
مازو سبز، مردار سنگ، زرد چوب، ہر ایک ۳ گرام، گلنار، مورد، عصارہ یونانہ، ہر ایک
۴ گرام۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر لوم اور روغن گل کے ساتھ مرہم بنائیں اور
نملہ متاکلہ پر لگائیں،

مازو خام ۴ گرام، مورد خشک ۵ گرام، ۶ گرام۔ دونوں کو باریک پیس کر لوم،
روغن گل میں ملا کر مرہم تیار کریں اور لگائیں،

مازو سبز، کندر، ہر ایک ۴ گرام، قلع دیس ۱ گرام، شب بمانی، مرکبی، ہر ایک
۳ گرام، زراوند ۲ گرام۔ تمام دواؤں کو کوٹ کر شراب میں گوندھ لیں اور
قرص بنا کر سایہ میں خشک کریں، حسب ضرورت ایک قرص پانی میں گھس کر لگائیں۔

جرب

SCABIES

یہ ایک شدید، متعدی مرض ہے، جس میں ایک مخصوص طفیلی (Parasite) جلد پر حملہ آور ہو کر شدید خارش، سوزش، التهاب اور دوسری مرضی علامات پیدا کرتا ہے۔
یہ مرض ملائم جلد میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

اسباب متعدده :-

(I) احتراق / فساد خون

(II) نمکین، غلیظ غذاؤں کا بکثرت استعمال

(III) گرم ادویہ

(IV) شور اور شیریں اشیاء

اس مرض کا اصل سبب سارکوپٹیس اسکیبیائی (Sarcoptes Scabiei)

نامی طفیلی ہے، جو سطح جلد پر حملہ آور ہوتا ہے، اس طفیلی کی مادہ، نر سے بڑی ہوتی ہے چنانچہ اس کا سائز $300 \mu \times 400 \mu$ ، اور رنگ بھورا ہوتا ہے، اس کو خوردبین کے بغیر بھی دیکھا جاسکتا ہے، نر طفیلی کی حیات بہت مختصر ہوتی ہے، چنانچہ یہ جوڑا کھانے کے کچھ عرصہ بعد ہی مر جاتا ہے، مادہ طفیلی میں سالنے چار عدد چھوٹے حلقہ پیچھے زائد سے ہوتے ہیں ان زائد سے پر پیستے لگے ہوتے ہیں اور پیچھے بھی چار زائد سے ہوتے ہیں لیکن ان پر پیسنے کی بجائے لمبے، سخت قسم کے کانٹے ہوتے ہیں یہ حاملہ ہوتے

کے بعد جلد میں ترچھے رخ میں سوراخ کرتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اندر سوراخ کرتی جاتی ہے، انڈے بھی دیتی جاتی ہے، اس طرح زیر جلد وہ بے قاعدہ خط میں ————— سوراخ کر دیتی ہے، یہاں کی جلد کا خوردبین کے ذریعہ معائنہ کرنے پر انڈے دکھائی دیتے ہیں اور بعض اوقات مادہ طفیلی بھی پکڑیں آ جاتی ہے، ————— بہر حال جلد کی پرتوں کے درمیان کے یہ انڈے، طفیلی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان کے بچے جلد کی خلیوں (کی تقسیم کے عمل سے سطح جلد پر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک نئی، تروتازہ نسل سطح جلد پر حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بالوں کی جڑ کے پاس قیام کرتی ہے، کچھ ہی عرصہ کے بعد نئی نسل کے طفیلی بڑے ہو کر از سر نو جلد میں سوراخ کرنے لگتے ہیں، طفیلی کی اس کارکردگی سے سطح جلد پر بہت سی باریک، اور انتہائی مختصر لکیریں پیدا ہو جاتی ہیں جو جرب کی مخصوص علامت تصور کی جاتی ہیں، ————— یہ مرض، مریض کے قرب اور اس کے استعمال کے کپڑوں سے صحت مند لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، کیوں کہ کپڑے کی رطوبت میں یا براہ راست کپڑے میں یہ طفیلی اس کے انڈے موجود رہتے ہیں،

علامات

طفیلی جس مقام پر جلد میں سوراخ کرتا ہے، وہیں ایک چھالا پیدا ہو جاتا ہے جس میں شفاف یا خاکستری (بھوری) رطوبت بھری ہوتی ہے، جس میں شدید خارش ہوتی ہے، شفاف چھالے میں بعض اوقات ایک سفید نقطہ دکھائی دیتا ہے یہ ہی طفیلی ہے، ————— بہر حال یہ طفیل جسم کے ایسے مقامات پر زیادہ حملہ کرتا ہے جہاں بالائی سطح کی جلد قدرتا بہت پتلی ہوتی ہے، مثال کے طور پر انگلیوں کے اطراف اور درمیان میں، کلائی اور بغل کے سامنے، سرین اور اعجاز، تناسل وغیرہ میں، شدید صورتوں میں جسم کے کسی بھی حصہ میں حملہ آور ہو سکتی ہے ————— چھالوں میں کچھ عرصہ بعد پیسہ پڑ جاتی ہے، اور جب یہ ٹوٹتا ہے تو رطوبت نکل کر وہاں کھرنڈ جم جاتی ہے، نئی نسل چوں کہ اپنی کوششوں میں مصروف رہتی ہے، اس لیے خارش ہوتی رہتی ہے، خارش کی شدت سے مریض اس کھرنڈ کو اکھاڑ دیتا ہے تو وہاں سے خون بہنے لگتا ہے، کھلا تے وقت

ہوں کہ قوی جلد پر بھی تحارش آجاتی ہے اور ناخن میں اس طیفلی کی موجودگی سے وہ جگہ بھی سرایت زدہ ہو جاتی ہے، ————— اس مرض کی ثانوی سرایت = Secondary Infection) بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ————— عام طور سے اس مرض میں خاندان کے کئی افراد ایک ساتھ مبتلا ہوتے ہیں،

اصول علاج

○ ————— مرین کا لباس، بستر اور استعمال میں آنے والے اسی طرح کے دوسرے سامان کو بالکل علاحدہ رکھیں اور استعمال کے بعد ہر مرتبہ گرم پانی سے دھوئیں،

- ————— جسمانی صفائی پر خصوصی توجہ کی ہدایت کریں،
- ————— مصیفات خون استعمال کرائیں،
- ————— خلط غالب کا تنقید کریں،
- ————— مقامی طور پر گندھک کے مرکبات استعمال کرائیں،
- ————— تسکین درد و تحارش کریں،

علاج

- ————— گرم پانی میں برگ نیم / گندھک ڈال کر نہانے کی ہدایت کریں،
- ————— مصفی کے طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

شاہترہ ۶ گرام، عذاب ۵ عدد، ————— دونوں کو عرق شاہترہ ۲۵ ملی لیٹر میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شیعہ مغز تخم کدو، خیادین، ہر ایک ۶ گرام، پانی میں پس کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

شاہترہ ۶ گرام، چرائتہ، سرچھوکہ، ہلیہ سیاہ، ہندل سفید، ہندل سرخ، گل منڈی، برگ حنا، ہر ایک ۵ گرام، عذاب ۵ عدد، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شہد ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں،

عذاب، شاہترہ، گل گاؤ زبان، برگ منڈی، ہندل سفید و سرخ، سرچھوکہ،

چرائیت، برگ حنا، پوست ہلیہ زرد، برادہ ستیتم، برادہ چوب آبنوس (آبنوس کی لکڑی کا برادہ) برادہ چوب بھسیار، گل منڈی، ہرن کھری، گنند باہری، ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر شربت نیلو فر ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں،

پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابل، ہلیہ سیاہ، پوست ہلیہ، گل سرخ، ایتیمون (گلاب میں بسایا ہوا) کشنیز مفسر، قصب الزریہ، ہر ایک ۷ گرام، مغز تخم کدوئے شیریں ۳۱۱ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن گاؤں چرب کریں اور تین گنا شکر تری کے قوام میں ملا کر اطرین تیار کریں اور ۳۲ گرام کھلائیں۔

یہ نسخہ تین شکم کمرتا ہے اور مہفتہ بھی ہے،

تخم کشوٹ ۱۰۰ گرام، زرشک، بہدانہ، گل سرخ، ہر ایک ۱۸ گرام، گل بنفشہ ۲۵ گرام، بسفاج سبز، اصل السوس، گل گاؤ زبان، ستارہ کی، پوست ہلیہ کابل، ہلیہ سیاہ، ہر ایک ۷۰ گرام، پوست ہلیہ زرد، تمر ہندی، ہر ایک ۱۱۰ گرام، آلو بخارا، گل نیلو فر تازہ، ہر ایک ۳۰ عدد، عناب، سپستان، ہر ایک ۵۰ عدد، تمام دواؤں کو کوٹ کر آب شاہترہ - ایٹر میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو اس قدر جوش دیں کہ پانی صرف ۴ لیٹر ۲۵۰ ملی لیٹر رہ جائے۔ اس کو چھان کر ۲۵ - ۱۵ ملی لیٹر ہمراہ مار الجبن نوش کرائیں،

اگر عارض سارے جسم میں ہو تو یہ نسخہ ہر دوئے کار لائیں، ان میں منفیات و مہلات

بھی شامل ہیں،

شاہترہ، تخم کاسنی کوفہ، گل سرخ، ہر ایک ۴ گرام، ایتیمون، افسنتین، نیلو فر، گاؤ زبان، ہر ایک ۳ گرام، عناب ۵ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح خفیف جوش دے کر چھان لیں اور کلقتند ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں، تین دن کے بعد ایتیمون کی مقدار ۴ گرام کر دیں، افسنتین، اور گاؤ زبان کی بجائے چرائیت دھاسہ، بادیان، کشنیز خشک، اسطوخودوس، ہر ایک ۴ گرام، آلو بخارا، عدد شامل کریں، یہ نسخہ تین دن استعمال کرنے کے بعد اس میں ستارہ کی ۱ گرام، پوست ہلیہ زرد ۷ گرام کا اضافہ کریں اور صاف کر کے

مغزِ خلوس خیار شنبہ ہگرام، ترنجبین ۵۰ گرام، روغن بادام ۲ ملیٹر ملا کر مسہل دیں، اسی طرح بار بار یہ نسخہ استعمال کرائیں، ————— چند دنوں بعد اطرینفل صغیر ۱۱ گرام کھلا کر شیرہ عذاب ۶۰ ملیٹر، شیردھاسہ، شیرہ کاسنی، ہر ایک ۶ ملیٹر، سبجبین افیمونی ۲۵ ملیٹر ملا کر نوش کرائیں، ————— رات میں اطرینفل شامترہ ۲۵ گرام کھلائیں۔

○ ————— سودا کے مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
بلبلہ سیاہ ۳۰ گرام، بسفاج نیمکوفہ ۱۵ گرام، افیتھون ولایتی ۲۰ گرام، اسطوخودوس برگ سنار کی، ہر ایک ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ گاؤ زبان، برگ بادرنجبویہ، ہر ایک ۹ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۶ گرام، تربد موصوف ۳ گرام، زنجبیل ۵۱۱ گرام، خربق سیاہ ایک گرام۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور غارلقون مجرا منی، لاجورد مغسول، نمک سیاہ، ہر ایک ایک گرام، ملا کر نوش کرائیں، ————— مزید قوی الاثر بنانے کے لیے شحم حنظل اور صبر سقوطری، ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔

○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں۔

گندھک آلمہ سار۔ کاقور، ہر ایک ۳ گرام، نیلا تو تیا ایک گرام، —————
دونوں کو باریک کر کے روغن گاؤ (۲۱ بار دھلا ہوا) میں ملا کر بدن پر ملیں اور دھوپ میں بیٹھنے کی ہدایت کریں، دو گھنٹے بعد آرد نخود اور حناملہ کر غسل کرائیں، ————— یہ عمل تین دن تک کرائیں انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی۔

برگ کنیر سفید ۳ کینو گرام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ۲۰ لیٹر پانی میں ہلکے آج پر جوش دیں۔ جب ۱۰ لیٹر رہ جائے تو چھان کر روغن کنجد ۲۵۰ ملیٹر ملا کر دوبارہ جوش دیں اس کے بعد نیچے اتار کر سرد پانی میں ڈال دیں، اس سے روغن اوپر آجائے گا۔ اب ہاتھ سے روغن اتار لیں اور اس میں تو تیا سبز ۳ گرام، سفیدہ قلعی ۱ گرام، شبدر بمانی ۵۱۱ گرام، مردار سنگ ۵۱۱ گرام، رسپیور ۹ گرام باریک پیس کر ملائیں اور جسم پر ملیں۔

خا، کیملہ، کات سفید، مردار سنگ، ہر ایک ۳ گرام، سیاب ۳ گرام، نیلا تو تیا بریاں ۲ گرام، دانہ الاچی سفید ۱ گرام، ————— خا، کیملہ اور کات سفید کو سیاب کے

ما تھ سحت کریں اس کے بعد دوسری دوائیں ملائیں اور خوب سحت کریں پھر روغن زرد
 وہاں دھویا ہوا ملا کر جسم پر مالش کریں،

توتیائے کرمانی، تخم پنواڑ، ہر ایک ۲ گرام، مغز تخم خرلوزہ، مغز تخم خیارین،
 عالی زیری، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو سرکہ، روغن گل، ہر ایک —
 ۴۰ ملی لیٹر میں کھل کریں، جب مرہم سا بن جائے تو جسم پر لگائیں۔
 برگ نیم کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور گندھک ملا کر غسل کرائیں،




Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

حک

PRURITS

اس مرض میں ظاہر جلد پر کسی خراش یا دانے کے بغیر، کسی حسّی عصب کے افعال میں
فجور واقع ہو جانے سے خارش محسوس ہوتی ہے، ——— خفیف صورتوں میں مریض کو بہت
زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن شدید صورتوں میں کرب و اضطراب ہوتا ہے، بے خوابی اور اس
میں اختلال تک نوبت آ سکتی ہے،

اقسام



اسباب

انفعالات نفسانی :-

- (I) شدید غم / غصہ
- (II) نفسیاتی الجھنیں

ادویات :-

- (I) اسپرین
- (II) مانج محل پلس
- (III) ایفون سے متعلق ادویات

امراض نسواں :-

- (I) احتباس حیض
- (II) بعض امراض رحم
- (III) ایام حمل
- (IV) ایام حیض میں خراب کپڑوں / روئی کا استعمال

امراض معدہ و امعاء :-

- (I) امعاء سے غذا کے عمل جذب میں نقص
- (II) سرطان شکم
- (III) دیدان امعاء
- (IV) امعاء مستقیم کے بعد امراض

متفرقات :-

- (I) گرم غذاؤں کا بکثرت استعمال

(۱) گرم لباس / اون کے بنے ہوئے سوئیٹر، بنیان

کے بغیر پہننا،

(۱۱) گردہ کے نرمی امراض،

(۱۲) غدہ درقیہ کے بعض امراض،

(۱۳) بولی چھوت،

(۱۴) سیرم میں فولاد کی کمی،

(۱۵) ذیابیطس شکری،

(۱۶) یرقان اصفر،

(۱۷) دبح المقامل،

(۱۸) تقرس،

(۱۹) جلد کے خشک ہونے کے ساتھ ساتھ فصل کرتے

وقت بکثرت صابن استعمال کرنا (یہ صورت سن رسیدہ لوگوں میں کثیرا وقوع ہے)،

(۲۰) فسادخون / بغم شور،

(۲۱) پیشاب میں لائیم / گزلیٹ / کیلیم فاسفیٹ کا

بکثرت اخراج،

(۲۲) موسمی تغیرات،

علامات

عمومی :-

خفیف صورتوں میں مریض کو کسی بھی طرح کی بے آرامی یا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جب کسی قدر شدید یا بہت زیادہ شدید ہو تو مریض بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، بے خوابی ہوتی ہے، اور دیر تک مضطرب رہنے کی وجہ سے حواس پر خراب اثر پڑتا ہے، ———— مرض کا آغاز عام طور سے پتھلیوں سے ہوتا ہے، اس کے بعد سینہ، پشت، بطن، ران اور دوسرے اطراف میں ہونے لگتی ہے، ———— تاہم یہ ضروری نہیں ہے، کہ ان تمام حصوں میں ایک ہی ساتھ خارش محسوس ہو، ———— مرض کا احساس

آمام و سکون کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے، مشغولیت کے لمحات میں بہت کم ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بالکل ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات میں، جب مریض اپنی مصروفیات سے نجات پا جاتا ہے تو خارش کا احساس شدت سے ستاتا ہے، خاص طور سے اگر مریض نے گرم تدابیر اختیار کی ہوں تو عوارض نہایت شدید ہوتے ہیں، مریض کھجلا کھلاتے جلد میں خارش ڈال دیتا ہے، بالآخر نڈھال ہو جاتا ہے، — عمر رسیدہ لوگوں میں اس کا سبب عام طور سے حسی اعصاب میں ضعف کے بالمقابل قدرتی تبدیلیاں ہیں، اس صورت میں بہت زیادہ کھجلا نے کے باوجود جلد پریشان نہیں رہتا، بشرطیکہ ناخن وغیرہ نہ لگے ہوں۔

بعض اوقات غیر محسوس نوعیت کی بہت چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور مریض کو بے چین کر دیتی ہیں، جلد کھردری اور خشک ہو جاتی ہے، اور مریض نہ صرف ناخن بلکہ لکڑی اور ٹھیکری یا کسی اور چیز سے کھجلا نے لگتا ہے، بعض اوقات جسم میں کسی قدر سرخی بھی نمودار ہوتی ہے،

مقامی :-

ایسی خارش جسم کے کسی ایک حصہ تک محدود ہوتی ہے اور مقام مرض کو بغور دیکھنے پر خارش کا کوئی مقامی سبب ضرور دکھائی دیتا ہے،

(I) حکمہ بصفن :-

قوتوں میں خارش محسوس ہوتی ہے اور مریض کھجلا کھجلا کر خارش ڈال دیتا ہے، بعض اوقات وہاں سے سفید، بھوسا سی گرتی ہے،

(II) حکمہ مقعد :-

مقعد (Anus) کے پاس شدید خارش محسوس ہوتی ہے، شدت کی وجہ سے مریض بعض اوقات غفل کے آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے کھجلا نے لگتا ہے اور شرمندہ ہونے لگتا ہے، — تیز مراری خلط کی صورت میں عوارض

شدید اور بلغم مشور میں نسبتاً خفیف ہوتے ہیں، دموی خلط کی صورت میں خارش کے ساتھ متعدد میں کسی قدر گرانی بھی ہوتی ہے، ————— تفصیل حکم معقد کے ذیل میں، ”معالجات امراض نظام ہضم و تولید و تناسل میں ملاحظہ کریں۔

(III) حکمت فرج :-

فرج میں شدید خارش محسوس ہوتی ہے، اور مرینہ کھولا کھولا گرم مقامی جلد پر خارش ڈال دیتی ہے، خارش کا دورہ رات میں زیادہ ہوتا ہے، گرم غذاؤں اور لباس سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، مباشرت کی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے، ————— مزید تفصیل ”امراض نسوان“ میں ملاحظہ کریں،

اصول علاج

○ اہل سبب مرض کا ازالہ کریں، چنانچہ سورہ ہضم کی صورت میں مقویات معدہ استعمال کرائیں، جگر کے فعل میں خرابی ہو تو اس کو اعتدال پر لانے کی تدابیر کریں اور نسوانی امراض وغیرہ مرض کا باعث ہوں تو ان کا ازالہ کریں۔

○ ————— قلیظ، گرم غذاؤں سے پرہیز کرائیں،

○ ————— جسمانی پاکیزگی اور طہارت پر خصوصی توجہ دلائیں،

○ ————— خلط غالب کا تنقیہ کریں۔ / مصفیات استعمال کرائیں،

○ ————— حسب ضرورت فصد کھولیں،

○ ————— تسکین خارش کی تدابیر کریں،

علاج

○ ————— مسہل کے طور پر یہ نسخے استعمال کریں،
 غاریقون مغربل، عاقرقرحہ، سعد کوئی، ہر ایک ۱۲ گرام، ستارکی، گل سرخ،
 ہر ایک ۶ گرام، بادام تلخ ۳ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ تین گنا شہد
 میں ملائیں اور ۵۰۰ گرام، ہمراہ آب حناب اور عرقہ پودینہ استعمال کرائیں،

○ _____ مصفی کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
ہلیلہ سیاہ، شاہترہ، گل منڈی، سر پھوک، عشبہ، چرایتہ، ہرایک، گرام،
عنا ب، مدد، _____ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگوئیں
اور صبح کو مل چھان کر نوش کرائیں،

گل خطمی، گل بنفشہ، گل نیلوفر، گل سرخ، شاہترہ، عنب الثعلب،
تخم کاسنی، ہرایک ۵ گرام، عنا ب و دانہ، _____ تمام دواؤں کو رات کے
وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
نوش کرائیں۔

تخم کاسنی، نیلوفر، پوست ہلیلہ زرد، شاہترہ، چرایتہ، ہرایک _____
۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور
صبح کو مل چھان کر شربت عنا ب ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

شاہترہ، چرایتہ، دھما، پوست ہلیلہ زرد، ہرایک ۶ گرام، _____
تمام دواؤں کو رات کے وقت عرق شاہترہ ۲۵۰ ملی لیٹر میں بھگوئیں اور صبح کو چھان
کر ۱۲ ملی لیٹر شہد ملا کر نوش کرائیں،

برگ شاہترہ ۳۵ گرام، پوست ہلیلہ کابی، پوست ہلیلہ، ہرایک ۳۰ گرام،
چوب گز ۱۱ گرام، ہلیلہ سیاہ، آملہ منقی، ہرایک ۱۰ گرام، گل سرخ ۶ گرام،
ریوند چینی ۵ گرام، برگ سنار کی ۲۰ گرام، نہات سفید، تمام دواؤں کے برابر
_____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ۱۲ گرام، ہمراہ
نقوع شاہترہ استعمال کرائیں،

○ _____ خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،
مردار سنگ، سفید قلعی، کافور، ہرایک ۵ گرام۔ _____ تمام دواؤں کو
سرکہ میں پیس کر روغن گل ملا کر لگائیں۔
خشناش ۱۲ گرام کو بکری کے دودھ ۶۰ ملی لیٹر میں پیس کر روغن گل ۲۵ ملی لیٹر
ملا کر جسم پر مالش کریں،

ایون ۱۳ گرام، سہاگہ ۲۸ گرام (۳۴ گرام بہیاں اور ۱۴ گرام خسام)

تمام دواؤں کو ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی پانی میں گھس کر خارش کے مقام پر لگائیں،

آب برگ تنباکو سبز، روغن کنجد ہوزن کو ملا کر جوش دیں، جب پانی اڑ کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اتار کر سرد کر لیں اور اس سے جسم کی مالش کرائیں،

گل ارغوی ۳ گرام، زعفران، کافور، ہر ایک ۲ گرام، روغن بادام ۲۵ ملی لیٹر، دواؤں کو سرکہ، عرق گلاب، ہر ایک ۲۵ ملی لیٹر میں پیس کر ضا د کریں،

تخم خشتا ش، کنجد مقشر، سہاگہ، مردار سنگ، برگ حنا، ہر ایک ۲ گرام، روغن یا سمین / روغن گل / عرق لیموں میں پیس کر تھوڑا سا کافور ملا کر جسم پر مالش کرائیں اور ۲-۳ گھنٹے بعد غسل کرنے کی ہدایت کریں۔

دوسرے شرکی امراض کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔



Learn Unani By Abulhasan Ali Nadwi

نار فارسی

ECZEMA

اس مرض میں پتلی رطوبت سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں سطح جلد پر پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں شدید سوزش اور درد ہوتا ہے، پھنسیوں کے پھوٹ جانے سے غلیظ مادہ نکل کر جم جاتا ہے، جو کھرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے نیچے رطوبت موجود ہوتی ہے، جو رس کر قریب جلد میں سوزش اور التهاب پیدا کرتی رہتی ہے۔
یہ مرض ہر انسان کو ہو سکتا ہے لیکن بعض پیشہ کے لوگوں میں کثیراً وقوع ہے،

اسباب

معدنی / کیمیائی :-

- (I) صابن / صوف
- (II) پینٹ / پالش
- (III) رنگ سازی کے مادے / بالوں کے خضابات
- (IV) فوٹو پرنٹ دھونے والا مادہ
- (V) کریم / پاؤڈر / عطریات / لپ اسٹک
- (VI) کریم / گھڑی کی چین / ایر رنگ
- (VII) نیکلس
- (VIII) بعض خراب معدنی اجزاء سے تیار شدہ

فیولرات ،

(IX) سگے / دروازے کا ہنڈل

ادویات :-

(I) سلفا / فارمالین
(II) پپنی سلین / پیرکلورائڈ / بن آیوڈائڈ آف

مرکری / لائسٹل

(III) اسٹریپٹومیٹین
(IV) آئیوڈین / کوئین
(V) آرنیکا آئیڈو فارم کی جلد میں سرایت

پلاسٹک / ربر کی اشیاء :-

(I) ہینڈ بیگ
(II) فٹق کی بیٹیاں
(III) جوتے / دستانے / کتھوم / موزہ بند (تسمہ)

/ چیل

امراض معدہ و امعاء :-

(I) ہضم کی خرابی
(II) ویدان اعمار
(III) قبض مزمن
(IV) امعاء کے ذہریلے مواد

غذائی بے اعتدالی :-

(I) لہسن / خردل / ڈیلے کا دودھ / لوبیا / گو بھج
ستور یا گائے وغیرہ کے گوشت کا بکثرت استعمال -

(II) مرجع و مصالحہ والی اغذیہ کا بکثرت استعمال

الفعالات نفسانی:-

(I) غمّہ و غضب

(II) خوف

(III) رنج و غم

عورتوں کے امراض:-

(I) حیض کی بے اعتدالی

(II) حمل

(III) حیض کے ایام میں غلیظ گازات کا استعمال

بعض پیشے:-

(I) تار کا کام کرنے والے (معدنی سرایت کی وجہ سے)

(II) رنگ بنانے والے (کیماوی سرایت کی وجہ سے)

(III) باغبانی / دھوبی / پانی میں بھیکتے رہتے اور صابن

(وغیرہ سے)

متفرقات:-

(I) صفراوی غلط کاریق خون میں مل جانا

(II) ضعف اعضاء / عام جسمانی کمزوری

(III) شدید حرارت / برودت

(IV) تیز و تند ہوا

(V) نفرس

(VI) وجميع المقاميل حاد

- (LVI) دانتوں کے امراض
 (LVII) لوزیتین کے امراض
 (LVIII) ذیابیطس
 (LIX) گردہ کے بعض امراض
 (LX) مثانہ کے بعض امراض
 (LXI) قلب کے بعض امراض
 (LXII) بیش حسیت
 (LXIII) بعض پھولوں کے زر
 (LXIV) وراثت

علامات

ابتداء میں مقام مرض کی جلد میں سرخی نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی، گھنی پھنسیاں نکل آتی ہیں جن میں شفاف رطوبت بھری ہوتی ہے، جو شدت کی خارش اور سوزش کا احساس دلاتی ہے، کچھ عرصہ بعد پھنسی پھٹ جاتی ہے اور اس سے کسی قدر گاڑھی رطوبت نکل کر سطح جلد پر جم کر کھرنڈ بناتی ہے، اس کھرنڈ کے نیچے رقیق مادہ پھر بھی موجود رہتا ہے، قریبی جلد میں درد اور المناکی کے ساتھ سرخی پائی جاتی ہے، مقام مرض کی جلد کا رنگ بیگنی سرخ ہو جاتا ہے، رقیق مادہ کے رستے رہنے سے مرض تدریجاً ترقی کرتا رہتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی حصہ پر ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے تو کہیں ابلے پڑے ہوتے ہیں۔ تو کہیں کھرنڈ جم جاتی ہے تو کسی حصہ میں زرد آب (Serum) رس رس کر مقامی طور پر سوزش پیدا کرتا ہے، بعض اوقات کسی قدر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کمزور اور مستحکم بچوں میں یہ مرض ناک، کان اور سر پر زیادہ حملہ کرتا ہے، نفرس کے مریضوں میں یہ مرض ٹانگوں میں بکثرت ہوتا ہے، ہاتھ، پیر، کمر، کان، پیپوٹے، ناک، بھٹتی، خبیے اور مقعد وغیرہ پر یہ مرض عام طور سے رونما ہوتا ہے، یہ مرض ثانوی تعدیہ کے مرحلے میں بہت تکلیف دہ

ثابت ہوتا ہے چنانچہ اگر شور پر اسے فلو کوکس کا حملہ ہو جائے تو جلد پر پھوڑے ہو جاتے ہیں اور اسٹریٹو کوکس کے حملہ کی صورت میں زہر بادی کی علامات رونما ہو سکتی ہیں۔

اصول علاج

- _____ حسب ضرورت تنقیہ مواد کریں۔
- _____ مسکنات استعمال کرائیں۔
- _____ تصفیہ خون کریں۔
- _____ مائع عفونت دوائیں استعمال کرائیں۔
- _____ جسمانی صفائی اور پاکیزگی پر خصوصی توجہ کی ہدایت کریں۔
- _____ غلیظ، نفاس غذاؤں کے استعمال پر پابندی عائد کریں۔
- _____ مرض کی اصل سبب کا ازالہ کریں۔

علاج

- _____ فصد کھولیں۔
- _____ صفراوی خلط کی نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع صفرار :-

عنب الثعلب، گل بنفشہ، گل سرخ، تخم خطمی، شاہترہ، تخم کاسنی، نیکوب، ہر ایک، گرام، گل تیلوفر، گرام، آلو بخارا، عتاب، ہر ایک ۵ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پاؤں میں بھگو دیں اور صبح کو مل پھان کر گلقد آفتابی ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔ — چار یا پنج دن تک یہ نسخہ استعمال کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسی میں اس نسخہ مسہل کا اضافہ کریں۔

نسخہ مسہل صفراء :-

مغز فلوس خیار شبنم ۸ گرام، ترنجبین خراسانی، تمر ہندی، محشر، ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو چھان کر نسخہ منفع میں ملا کر شیرہ مغز بادام شیریں ۵ عدد پانی میں نکال کر شامل کریں اور نوش کرائیں، گلفندہ کی مقدار ۵۰ گرام کر دیں، دوسرے دن مبرد کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تبرید :-

لعاب بہدانہ ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر ملا کر اسپنول مسلم ۶ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔
 تنقیز مواد کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے،
 صبرہ ۲ گرام، بسفاج، سقمونیا، پوست ہلیلہ زرد، مصلیٰ، ہر ایک ۱۲ گرام،
 جبرائلی ۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر آب کاسنی سے گولیاں بنائیں اور رات میں سوتے وقت ۲ گرام ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔
 ○ مصلیٰ خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

آب شاہترہ سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق، ہر ایک ۴۰ ملی لیٹر، شربت عناب ۲۵ ملی لیٹر، تمام عرقیات کو باہم ملا کر نوش کرائیں۔

برگ شاہترہ ۵۰۰ گرام، عنب الثعلب، برادہ شیشم، برادہ آبنوس، گل سرخ، گل نیلوفر، ہر ایک ۲۵۰ گرام، صندل سفید، تخم کاسنی، عناب اقیتمون، تخم بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۲۵ گرام، تمام دواؤں کو ۱۳ لیٹر پانی میں بھگو دیں ۲۴ گھنٹے بعد ۴ لیٹر عرق کشید کریں اور روزانہ صبح کو ۱۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں، یہ نسخہ بھی مفید ہے،

عشبہ مغربی، بسفاج فستقی، اقیتمون ولایتی، کاؤ زبان، دارچینی، ہر ایک ۲۵ گرام، چوب چینی، گل سرخ، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام،

ہلید سیاہ، گرام، پوسٹ ہلید زرد ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور شکر ۵۰، گرام، شہد ۵۰۰ ملی لیٹر کا قوام بنا کر مذکورہ سفوف ملائیں، جب معجون تیار ہو جائے تو ۹ گرام ہمراہ عرق عشب نوش کرائیں۔

○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،
روح کچھ میں ملائم کپڑا بھگو کر کھرنڈ پر رکھیں، جب کھرنڈ نرم ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ اتاریں۔

تسکین کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں۔

مرہم سفیدہ کا فوری لگائیں،

سفیدہ، مردار سنگ، صندل، کافور، ————— تمام دواؤں کو عرق گلاب میں پیس کر طلا کریں۔

سفیدہ کا شغری، مردار سنگ، ہر ایک ۸ گرام، کیترا ۳ گرام، اقیون ایک گرام، کافور ۲ گرام، رسوت ۵ گرام، محوم سفیدہ ۱ گرام، روحن گل ۵، ملی لیٹر۔ ————— حسب دستور مرہم تیار کریں اور اس میں لعاب بہداز ۲ گرام پانی میں نکال کر سفیدی بیضہ مرغ ایک عدد کا اضافہ کریں اور مقام مرض پر لگائیں۔

منزخم شفتا، لوسونختہ، شب یمانی (پانی میں بھی ہوئی)، باہم پیس کر طلا کریں، برگ نیم، برگ حنا، کیلا، سفیدہ کا شغری ہوزن، ————— تمام دواؤں کو ریک سفوف کر کے درور کریں۔

صندل سرخ، گل نیلوفر، صبر زرد ہوزن کو باریک کر کے پھڑکیں۔


○ ————— دیگر اسباب کی صورت میں ان کا مخصوص علاج کریں۔

اس مرض میں جلد کے ظاہری حصہ میں درشتی اور خشونت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک مخصوص شکل و صورت کی ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ ملحوظ رہے کہ اطباء جدید اس کا سبب باقی کرم قرار دیتے ہیں اور اطباء قدامت ان کے جو اسباب اور علامات قلمبند کرتے ہیں وہ بھی اس کے متعدی ہونے کی غمازی کرتے ہیں۔

اقسام

(۱) مقام وضع تبدیل کرنے کے اعتبار سے

١٩




✽ داد، گمر لون، وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔

(ب) جنس کے اعتبار سے

قوبا


Ring Worm



(ج) مقام مرض کے اعتبار سے

قوبا

Ring Worm



اسباب

(د) لیلیف اور عروق میں سودا، غلیظہ کا اختلاط

(ک) رقیق رطوبت اور بلغم مارغ

سہ ہاتھ وہ بھی کہتے ہیں۔

(III) ردی خلط حاد، رقیق / غلیظ سودا کا غلبہ

(IV) غلیظ، ثقیل اور نقاخ افذیر

(V) بھیکے کپڑے پہننا۔

(VI) فطر (پھپھوند) Fungus

Trichophyton (I)

Microsporum (II)

Epidermophyton (III)

(VII) شیریں اشیاء کا بکثرت استعمال

(VIII) جسمانی کثافت

(IX) متاثر شخص کے جسمانی استعمال کی اشیاء مثلاً دستار، ٹوپی، برش، کنگھا، تولیہ

وغیرہ استعمال کرنا / بعض جانور

علامات

مریضاتی طور پر اس قدر وضاحت ضروری ہے کہ فطر (پھپھوند) Fungus (گول یا بیضوی شکل یا خالی نالیوں کے خول کی صورت میں نظر آتی ہیں، جو ہر سمت میں پھیلتی اور بڑھتی رہتی ہیں، جب یہ جلد میں گھسے ہیں تو جسم ان کی مدافعت کے لیے زیادہ خون بھیجتا ہے، اس کے ساتھ ہی مقام مرض پر چھوٹے چھوٹے، ابھرے ہوئے چھلے نمودار ہو جاتے ہیں جن کے کنارے سطح جلد کی نسبت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، اور ان میں سرخی ہوتی ہے، ————— چند دنوں بعد مقام مرض کے مرکز میں پھپھوند کمزور پڑ جاتی ہیں، انھیں خوراک بھی کم ملتی ہے، طبیعت مدبرۃ بدن اور مدافعتی قوتیں ان پر قابو پا لیتی ہیں، مرکز مرض میں پھپھوند کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے مقام مرض کا مرکز ہموار اور چپٹا ہو جاتا ہے، اور اس کی سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے اور نقشہ (چھلکا اترتا) بھی بند ہو جاتا ہے، تاہم کناروں پر جہاں پھپھو ابھی نو عمر اور صحت مند ہوتی ہیں، ان کی جلد میں ابھار ہوا ہوتا ہے، جن کے مقابلہ کے لیے جسم جراثیم کش مادہ (مصلحات) دیاں بھیجتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے قبا کا رقبہ محدود ہو جاتا ہے، اور پھپھوند چھلے

(Ring) کی حدود سے آگے بڑھتے نہیں پاتیں۔

لموئی علامات :-

ابتداء میں مقام مرض پر سرخی مائل چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوتے ہیں جو بعد میں باہم مل کر دائرہ (Ring) کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کچھ عرصہ بعد پھوٹ جاتی ہیں اور ان سے بھوسہ کی طرح کھرنڈ نکلتی ہے، دائرہ کے کنارے سطح جلد سے کسی قدر بلند دیر ہوتے ہیں اور دائرہ کا وسطی حصہ سطح جلد کی طرح ہی سطح ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا سرخی مائل ہو سکتا ہے، ان میں میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے جو مرین کو بے چین کر رہتی ہے، غلبہ صفراء کی صورت میں حواریں شدید ہوتے ہیں،

خصوصی علامات :-

(۱)

(I) قوبا متقشر :-

جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، اس میں مقام مرض سے بھوسہ جھڑتی ہے، اس میں مادہ مرض جلد کی گہرائی میں ہوتا ہے، اور پھلی کے چوٹنے کی طرح اس سے گول گول پھلکے اترتے ہیں، یہ دراصل قوبا کی مزمن نوعیت ہے،

(II) قوبا سیاہی :-

قوبا کی یہ قسم چوں کہ اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے اسی لیے اس کا نام سیاہی (چلتے والا) رکھا گیا ہے۔

(ب)

(I) قوبا دموی :-

یہ فساد خون نیز اس میں فاسد رطوبات کے استخراج سے پیدا ہوتا ہے، فساد خون

کی دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں نیز اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اخراج رطوبت بھی ہوتا ہے۔

(II) قوبا سوداوی:-

یہ صورت، کسی خلط محترق کے سودا میں تبدیل ہو جانے کے بعد پیش آتی ہے اس کا رنگ میٹھالا ہوتا ہے، اس میں چبھی اور خلش نہیں ہوتی اور نسبتاً بوست کا خلبہ ہوتا ہے،

(III) قوبا رطوبی:-

یہ صورت فساد رطوبت اور اس کی عفونت پر دلالت کرتی ہے، مقام مرض سفید سرخی/ زردی مائل ہوتا ہے، درد شدید نوعیت کا خارش لذت آگیاں ہونے کی بجائے المناک ہوتی ہے۔

(ج)

(I) قوبا ر جلد الراس:-

طوطو رہے کر قوبائے جلد الراس (T. Tonsurans) میں دراصل پھپھوند کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انھیں سر کی جلد میں لہیں ٹکے کی جگہ مل جائے، چنانچہ ابتداء میں بالائی جلد میں نا محسوس طور پر پھیلتی ہیں۔ لیکن جب جسم کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے وہ مدافعتی مصللات بھیج کر اس کا تدارک کرتا ہے، لیکن جب مدافعتی قوتیں عملاً اور پھپھوند کے مقابلہ میں کمزور ثابت ہوتی ہیں تو اس کے گرد حلقہ ڈال کر جم جاتی ہیں جس سے داد/قوبا کے کنارے ابھر جاتے ہیں، اس ابھار کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پھپھوند اور جسمانی مصللات میں محاذ آرائی ہوتی ہے، تاہم پھپھوند زیادہ مدت تک بالائی جلد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بہت جلد جلد کی اندرونی پرت (طبقة) میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ بالوں کے غد کیسیہ تک پہنچ جاتی ہیں، یہاں یہ پھپھوند خوب بڑھتی ہیں اور بال اور اس کے غد کیسیہ کا تعلق توڑ دیتی ہیں، جس سے بال کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھپھوند افزائش نسل کر کے بال کی تباہی کا سامان کرتی ہیں اور بال کی بیرونی سخت کھال پر عملاً اور ہوتی ہیں، اور بال آخر بال ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے، یہاں ایک نکتہ ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ پھپھوند، بال کی جڑ پر بالعموم حملہ نہیں کرتی، بلکہ اس سے کچھ

اد پر حملہ کرتی ہے۔

بہر حال یہ نوع ایک گول پٹکتے کے طور پر نمودار ہوتی ہے اور یہاں بالوں کی بلیدگی نسبتاً باریک ہوتی ہے، بغور دیکھنے پر جلد، گلابی، کسی قدر مستورم اور باریک، کھوسا جیسے پھلکوں سے ڈھکی ہوتی ہے، پھدرے، پھیلے ہوئے لمبے، اور تندرست بالوں کے علاوہ بالوں کے متعدد ٹوٹے ہوئے ٹنڈ دکھائی دیتے ہیں، جو عام طور سے غیر شفاف، سیاہ یا گہرے بھورے رنگ کے، مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان مڑے ہوئے بالوں کو چٹمی سے پکڑ کر اکھاڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ عام طور سے دریمان سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
 یہ نوع غریب بچوں اور حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارنے والوں میں کثیرالوقوع ہے۔

(۱۱) قوبا لائفی / تیج دائر / بے بال جلد والا :-

یہ نوع بعض جانوروں مثلاً بلی اور کتے وغیرہ سے ثانوی تعدیہ کے طور پر رونما ہوتی ہے، اور اس کی علامتوں کا انحصار بڑی حد تک کھچھوند کی نوعیت پر ہوتا ہے، اس میں التهابی کیفیات (سوزش سرخی اور درم وغیرہ) نسبتاً زیادہ واضح ہوتی ہیں ان میں دائرہ نما چلکتیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مرکزی حصہ خود بخود صحت مند ہو جاتا ہے، کناروں کے ابھار کی نسبت ان میں پستی ہوتی ہے جس سے پیچدار شکل ابھرتی ہے، پھیلنے والے، ابھرے ہوئے کناروں سے ذرا اندر آبلے وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ہر آبلہ بذات خود ایک دائرہ بناتا ہے، ————— بہر حال قوبا کی یہ قسم ایک روپے کے سکتے سے، سٹھیلی برابر ہو سکتی ہے، تشخیص کے لیے مقام مزنی کے قشور کا خود دہنی امتحان کیا جاتا ہے، جس میں کھچھوند کا حال موجد ار، شاخ دار دکھائی دیتا ہے،

(۱۲) قوبا لائفی / انجیری / ذقنی :-

اس میں کھچھوند کی وجہ سے ٹھڈی اور رخسارے کے بال والے حصے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہاں کی جلد میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے، درمیانی طبق جلد میں قلعاب

اور دم بھی ہو جاتا ہے، پھپھوند، ابتدا میں بالوں پر حملہ آور ہو کر دامن استرخانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بالوں کا اکھاڑنا آسان ہو جاتا ہے، یہاں پھپھوند نسبتاً زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی اور زیادہ گہرائی میں در ریزش کرتی ہے، پیپ بھی پیدا ہو جاتی ہے، خود بینی امتحان میں پھپھوند کی نشاندہی کی جاسکتی ہے،

(۵) قوبا ظفر :-

ناخنوں کے قوبا (Tinea of The Nails) میں ناخن لمبا اور ٹیڑھا ہو کر انگلیوں کے سروں پر آ جاتا ہے، اس کی کور موٹی، سطح کھردری، نا ہموار اور رنگ میللا زرد ہو جاتا ہے، اور اس میں ٹوٹنے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، ان ٹوٹے ہوئے حصوں کے خورد بینی مشاہدہ سے پھپھوند کا پتہ چلتا ہے،

(۷) قوبائے ساقی / حاشیہ دار :-

اس میں پاؤں کی انگلیوں، سبھیل، تلوے، چڑھے اور بغل خاص طور سے مبتلا ہوتی ہے، چڑھوں سے پیچھے کی طرف جمان، سرین اور شکم کا زریں حصہ بھی مبتلا مرض ہوتا ہے۔ اس میں بھی مرض حاشیوں (کناروں) پر پھیلتا اور مرکز میں کھینک ہونے کا رجحان رکھتا ہے۔ اس میں مرضی عوارض زیادہ ہوا کرتے ہیں۔

اصول علاج

- امتلاہ خون کی صورت میں فصد کھولیں۔
- خلط ردی کا تنقیہ کریں۔
- جسمانی طہارت پر خصوصی توجہ دیں۔
- مسکنات درد استعمال کرائیں۔
- مصفیات خون استعمال کرائیں۔
- جو نکلیں لگائیں۔
- ممنفجات استعمال کرائیں اس کے بعد مسہلات دیں۔

علاج

- ————— مزمن صورت میں ہفت اندام / باسلیق کی فصد کھولیں۔
- ————— عورتوں میں دونوں پیروں میں، صافن کی فصد کھولیں،
قوباء متقشر و ساعی میں مفید ہے۔
- ————— مطبوخ ایتیمون سے نفع دیکر حب لاجورد، مطبوخ ایتیمون
غاریقونی سے تنقید کریں، اس کے بعد ماہ الجبن / چوب چینی استعمال کرائیں۔
- ————— چرائتہ، ہلیلہ سیاہ، شاہترہ، برگ حنا، ہر ایک ۵/۳ گرام
کودات میں پانی نیگرم (حسب ضرورت) میں بھگو کر، صبح کو مل چھان کر فلفل سیاہ ۱۱ عدد
نیمکوفہ شامل کر کے نوش کرائیں، ہم دن برابر استعمال کرنے سے مرض زائل ہو جاتا
ہے، عتاب، بسفاج اور ایتیمون کا اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
- ————— سر پھوک، برگ گز، گل بکائن، تخم کاسنی، گل کاسنی، مکور،
ایتیمون، ہر ایک ۲۵۰ گرام، برادہ کشیشم، برادہ آب نوس، ہر ایک ۵، اگر گرام، منڈی ص
نخ و برگ گل، ایک کلو گرام، عتاب کلاں ۲۵۰ گرام، بسفاج ۱۵۰ گرام، دروخ عقربی
۵۰ گرام، گل گاؤ زبان ۱۱۰ گرام، گل نیلوفر ۲۵۰ گرام، تمام دواؤں کو
رات میں پانی میں بھگو کر صبح کو دس بوتل (کم و بیش ۵ لیٹر) عرق کشیدہ کریں اور
۱۱۔ ۲۵۰ ملی لیٹر ہمراہ شربت عتاب ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں
- ————— خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،
- ————— مردار سنگ، کبریت اُلمہ سار، نوشادر، سہاگر بریاں، فلفل
گرد، نازد، کات سفید، صمغ عربی، تخم ترب، (یا ایفون) ہر ایک ۲/۵ گرام، نیلا توتیا، ۱۲
گرام، تمام دواؤں کو پیس کر عرق لیموں ملا کر گویاں بنائیں اور ضرورت
کے وقت قوبا (دار) کو کھج کر مذکورہ گولی کو عرق لیموں / سادہ پانی میں گھس کر
لگائیں،
- ————— باپچی، گھونگچی، سرسوں، ہر ایک، گرام، تخم پنواڑ ۱۲/۵
گرام، نیلا توتیا ۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب لیموں

میں گولیاں بنائیں اور ضرورت کے وقت سرکہ میں گھس کر لگائیں۔

○ — — — — — کندر، شب یمانی، کبریت، ایلو، ہر ایک ۴ گرام، صمغ عربی،

۸ گرام، — تمام دواؤں کو سرکہ انگوری میں پیس کر دھو، میں تین مرتبہ لگائیں۔

○ — — — — — کلونجی، مندارل سرخ، سرکہ کہنہ، کوآ، بیکر، کنسینر بنز مروتی

میں پیس کر لگائیں،

○ — — — — — باہچی، زبردہ سیاہ، تخم پنواڑ، گندھوا، آملہ سار، گندھک زرد،

ہموزن، — تمام دواؤں کو رات میں پانی میں جگوائیں اور صبح کو پیس کر دھو،

کنبد شامل کر کے طلا کر لیں۔ اور دو گھنٹہ بعد گرم پانی اور سرکہ سے دھو ڈالنے کے

ہدایت کریں،

○ — — — — — روغن گل، سرکہ کہنہ ہموزن، زبردہ ارمنی، ۱۱ گرام، پیس کر

طلا کر لیں،

○ — — — — — حلیت، انجیر کو، سرکہ، خوب، باریک، پیس کر طلا کر لیں،

○ — — — — — زرداند، خربق، سیاہ، انام، تل، آب، پیس کر لیں، باریک

پیس کر لیں،

○ — — — — — آب برگ سیم بنز مروتی، طلا کر کے ریخندہ و تجر کر لیں،

○ — — — — — اشق سرکہ میں اعلیٰ کر کے ضاد کر لیں،

○ — — — — — پوست بیخ پاگ، جوت، انام، قرظ، زبردہ سیاہ، ہر ایک

۱۲ گرام، لہسن اداز، — تمام دواؤں کو پانی، خوب، باریک، پیس کر لیں،

○ — — — — — تخم ترب، لفظ زرد، ہر ایک ۱۰ گرام، نیلا توپا، ۱۱ گرام،

— تمام دواؤں کو آب ترب (موڈا کھانڈ) یا (کھرا) کر کے گویا، بنائیں اور

حسب ضرورت گولی کو آب ترب / ادھ جائیہ، گھنٹہ کر لیں،

○ — — — — — سہاگہ تیار، گندھک، زبردہ، پیکور ہموزن،

تمام دواؤں کو عرق کلابیہ، اعلیٰ کر کے طلا کر لیں۔

حصف

MILIARIA RUPRA

اس مرض میں جسم کی ظاہری جلد پر، باجرے کے دانوں کی مانند چھوٹی چھوٹی پھنسیاں / دانے نکل آتے ہیں، بعض اوقات سر کی جلد بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، تاہم یہ دانے ہتھیلیوں اور تلوؤں پر نہیں نکلتے، ان میں شدید جلن اور سوتیوں کی سی چھین، محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کو شور شو کی (کانٹوں جیسی پھنسیاں) بھی کہتے ہیں۔ موسم گرم، گرم ممالک اور دریا کے کنارے آباد شہروں میں یہ مرض کثیر الوقوع ہے۔

اسباب

(I) صفراء کا غلبہ / رقیق، تیز رطوبات کا خون کے ساتھ مل کر زیر جلد بند ہو جانا۔

(II) غیر معمولی ثقیل اور کثیف مواد / کثافت جلد / عدم صفائی جسم

(III) شدید گرمی / گرم کپڑے پہننا / موسم گرم میں گرم اشیاء کا داخلی استعمال

(IV) شدید محنت اور ریاضت

(V) بکثرت پسینہ آنا / تیز معرق دواؤں کا استعمال

(VI) پسینہ آنے کے فوراً بعد سرد، تازہ پانی سے نہانا

(VII) حمیات / امراض حادہ

(VIII) جسمانی کمزوری

علامات

سطح جلد پر (ہتھیلیوں اور تلوؤں کو چھوڑ کر) نہایت چھوٹی چھوٹی، بعض اوقات ہاجرے کے دانوں کے بقدر سرخ، سوزشی پھنسیاں نکل آتی ہیں، جن میں کانٹے یا سوئیاں چھبنے جیسا احساس ہوتا ہے، یہ پھنسیاں کبھی تو متفرق طور پر ہوتی ہیں اور باہم مل کر خوشہ (گچھا) سا بنادیتی ہیں، ان کو کھانے سے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، انجام کار شدید سوزش، چھین اور درد محسوس ہوتا ہے، بے دردی سے کھلا دینے کی صورت میں مرچیں لگنے کی سی سوزش محسوس ہوتی ہے، پسینہ نکلنے کے وقت ان عوارض میں امتاذ ہو جاتا ہے، جلد میں سختی اور کھر کھر پن آ جاتا ہے، سوداوی خلط کے غلبہ کی صورت میں یہ بثور سر کی جلد میں بھی نمودار ہوتی ہیں، ان میں آبی رطوبت بھی موجود ہو سکتی ہے، بشرطیکہ دقیق مائی رطوبت، صفراء میں، زیادہ مقدار میں شامل ہو جائیں، ایسی صورت میں دانوں کا رنگ سرخ یا زرد ہونے کی بجائے سفیدی مائل ہو جاتا ہے،

تفریقی علامات

جاورسیہ Miliaria Rupra	حصف
۱۔ سرخی نہیں ہوتی	۱۔ دانوں کے پسیندے پر سرخی، زردی ہوتی ہے۔
۲۔ سوزش اور چھین نہیں ہوتی،	۲۔ دانوں میں سوزش اور کانٹے چھبنے کا احساس ہوتا ہے،
۳۔ عام طور سے جسمانی درجہ حرارت میں امتاذ ہو جاتا ہے۔	۳۔ بخار نہیں ہوتا۔

اصول علاج

○ پسینہ آنے کے فوراً بعد سرد پانی سے غسل کرنے سے احتراز کی تاکید کریں،

○ مسامات کے بند ہونے کی صورت میں مفتوح مسام دوائیں پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرائیں اور اس کے بعد سر کو اور عرق گلاب جسم پر ملیں،

○ حسب ضرورت فصد کھولیں،

○ مسہل بار د دیں،

○ مرطبات استعمال کرائیں،

○ سرد اور قالین سرقیات / ادویہ کا خارجی استعمال کرائیں،

○ غیر معمولی حرارت اور پسینہ سے مرین کو محفوظ رکھنے کے

تدابیر کریں،

○ عطقیات اور مصفیات استعمال کرائیں،

○ جسمانی صفائی اور طہارت پر خصوصی توجہ دیں۔

علاج

○ خود دنی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں۔

لعاب بہدانہ، شیرہ تخم کاہو، مقشہ، شیرہ مغز کدوئے شیریں، ہر ایک ۳ گرام، شیرہ بختاب، ۵ عدد، کوہانی میں نکال کر شربت حناب / شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں، مبرد ہے۔

مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

گل سرخ، گل بنفشہ، ہر ایک ۴۰ گرام، تخم کاسنی، تخم خیار، تخم خربوزہ، ہر ایک ۴۰ گرام، آلو بخارا، عصارہ ریوند چینی، ہر ایک ۳۰ گرام، زرشک ۲۸ گرام، مغز حب الملوک مدبر ۳۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۵۰۰ گرام کے بقدر اقرص

بنائیں اور ایک قرص کھلائیں، ————— اگر مرین نازک مزاج ہو تو بادیان ۶ گرام،
تخم خلمی ۵ گرام، سپستان ۷ عدد کو پانی میں جوش دے کر گلاب ۵ گرام، حل کر کے
مل چھان کر روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے، قرص کھلانے کے بعد نوش کرائیں، —————
اسہال کے بعد نسخہ استعمال کرائیں،

اسپغول مسلم، نبات سفید ہوزن کو گرم پانی کے ساتھ بگلنے کی ہدایت کریں،
اور تبرید کی غرض سے پہلا نسخہ استعمال کرائیں۔
تصفیہ خون کے لیے یہ نسخہ برص کے کارلائیں،

پوست نیم، پوست شاخ انجیر دشتی، چرائتہ، شاہترہ، کشنیز خشک،
پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابل، پوست بہیرہ، آلہ، ہلیلہ سیاہ، الشیطنج،
بادیان، سارک، گل سرخ، ہر ایک ۵ گرام، قند سفید دو گنا، شہد ہوزن جملہ ادویہ۔
تمام دواؤں کو باریک کر کے چھان لیں اور شکر و شہد کا قوام بنا کر
حسب دستور یہ دوائیں شامل کر کے بھون بنائیں اور ۱۲ گرام استعمال کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے،

شاہترہ ۲۵ گرام، کو پانی ۵ لیٹر، میں ۲۴ گھنٹے تک بھگوئیں اس کے بعد ۲
لیٹر عرق کشید کریں اور ۶۰ ————— ۱۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں، یہ نسخہ بھی
کار آمد ہے،

عشبہ مغربی ۸۰ گرام، پوب چینی ۱۲۰ گرام، دونوں کورات کے وقت ۴ لیٹر پانی
میں بھگوئیں اور صبح کو ۲ لیٹر عرق کشید کریں اور ۶۰ — ۱۲۰ ملی لیٹر ہمراہ شربت عناب
۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں،

⑤ خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

اگر ہتھوڑا ظاہر ہو جائیں تو سبوس گندم اور اکیلل الملک کو پانی میں جوش دے کر
اسی پانی سے غسل کرائیں، اس کے بعد سر کو اور عرق گلاب / نمک طعام، حنا اور سرکہ
ملا کر جسم پر لگائیں،

سوزش کی صورت میں برف کی ٹلی سے ٹکود کریں،
گل ملتانی، لعاب خلمی یا پانی میں گھس کر مناد کریں،

صندل سفید عرق گلاب میں گھسی کر لیپ کریں،
 روغن گل ۱۲ ملی لیٹر، سرکہ ۲۵ ملی لیٹر، عرق گلاب ۶۰ ملی لیٹر میں کافور ایک گرام
 حل کر کے گرمی دانوں پر لگائیں،
 آب کشنیز سبز مرق، سرکہ، عرق گلاب کو باہم ملا کر جسم پر ملیں،
 تخم خشخاش ۳۵ گرام، بکری کے دودھ میں پیس کر لگائیں،
 برگ حنا، کیترا، ہر ایک ۱۲ گرام، کو باریک پیس کر روغن گاؤ ۳۵ ملی لیٹر ملا کر
 حصف پر ملیں۔

مازو، زرد جو بھوزن، باریک پیس کر سرکہ اور روغن گل ملا کر حمام میں پسینہ
 آنے کے بعد ملا کر لگائیں، ————— ایک گھنٹہ بعد سرد پانی سے دھونے کی ہدایت
 کریں۔

سفیدہ قلعی، آرد جو، آب لیموں، سرکہ، گل ارمنی، روغن گل، —————
 تمام دواؤں کو ملا کر جسم پر ملیں، اور تھوڑی دیر بعد حمام کی ہدایت کریں۔
 صندل سفید، پوست اتار، کز مازج، گل ارمنی، ہر ایک ۴ گرام، چاروں
 دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ ۲۵ ملی لیٹر، عرق گلاب ۱۰۰ ملی لیٹر میں حل کر کے جسم کے
 متاثرہ حصوں پر ملا کر کریں۔




* سعفہ

FAVUS

اس مرض میں بشرہ (Cuticle) اور بالوں کے کیسہ دار غدود (Fungus = فطر) پر ایک مخصوص نوعیت کی بھچوٹ (Fungus = فطر) اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایک چھوٹی، زرد رنگ کی، گول مکہ نما چکٹی رونما ہو جاتی ہے، جس کا درمیانی حصہ گہرا اور حاشیہ بتدریج ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مرض عام طور سے سر کی جلد پر ہی نمودار ہوتا ہے تاہم بازوؤں، کانڈھوں، رانوں، عصوتناسل اور فوطوں پر بھی ہو سکتا ہے، سرد علاقوں میں کثیر الوقوع ہے،

اقسام



اسباب

(I) سودا و خبیث، جس میں حار، ردی و طوبت بھی شامل ہو

(II) بلغم شور / صفرا / کانغلیہ / فساد خون

(III) کثیف و غلیظ رہنا۔

(IV) Trichophyton Schoenleini نامی پھپھوند کا تعدیہ، —

جو مریض کی پگڑی، ٹوپی کے استعمال اور پالتو جانوروں سے صحت مند لوگوں کو ہوتا ہے۔

علامات

(۱) عمومی:—

پھپھوند (Fungus) کے تعدیہ کی وجہ سے بشرہ (Epidermis) کسی قدر اوپر اٹھ جاتا ہے تاہم اس کا اندرونی، مرکزی حصہ سطح جلد کے برابر رہتا ہے اور حاشیہ کسی قدر پتلا پیلا رہتا ہے، جس کو سعفی پیالہ (Favus Cup) کہتے ہیں، یہ پیالے رفتہ رفتہ بہت زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں اور باہم مل کر دبیرزد بیٹری بنا دیتے ہیں جن کی سطح کھردری، بے قاعدہ، شہد کے چھتے جیسی ہو جاتی ہے، جس میں سے ایک ناگوار بو نکلتی ہے، بلکہ بڑی حد تک یہ بو، چوہوں کی بو سے مشابہ ہوتی ہے، بالوں کے تعدیہ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر بال اگر تے لگتے ہیں۔ اور گنچ پیدا ہو جاتا ہے۔ — (تدار میں) مقام مرض پر کسی قدر سرخی اور خفیف سوزش بھی ہوتی ہے، بال میں شدید خارش کا احساس ہوتا ہے، کھڑکے سے ایک، دو بال آر پار ہو کر نمایاں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آنتہ آندہ اور بشرہ کا پھپھوند کے ذریعہ بچ گئی، وجہ سے گر جایا کرتے ہیں۔

(ب) خصوصی:—

(I) سعفہ رطب:—

اس میں تمام آندہ سے زرد پانی نکلنا اور پانی سے زیادہ شہد کے

نوعیت کا ہو تو شہد کے چھتے کی طرح ان کے ہر خانے میں رطوبت بھری ہوتی ہے، اس کو
ایجو قسم، کسی قدر گول اور سخت ہوتی ہے، ان میں بہت زیادہ سوداخ ہوتے ہیں اور
ان میں گوشت کے دھوئی کی مانند رطوبت بھری رہتی ہے۔ بعض اوقات ان کا رنگ
سرخ ہوتا ہے اور سرپستان کی مانند ابھری ہوتی ہیں اور ان میں مائیت خون
(Serum) کی مانند رطوبت ہوتی ہے،

(آ) سعفہ یا بس :-

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سعفہ کی یہ قسم رطوبت سے خالی ہوتی ہے، اس میں سفید
رنگ کے، پتلے، جھوٹے چھوٹے چھلکے اترتے ہیں جو بہت حد تک درد سے مشابہ ہوتے
ہیں، اس کی بعض اقسام میں تخم انجیر کی مانند ایک مادہ پایا جاتا ہے،

اصول علاج

- خلط غالب کا تھقیہ کریں،
- تعلیق / فصد کھولیں،
- بالوں کو منڈوانے کی ہدایت کریں،
- مقامی صفائی اور طہارت کی طرف مکمل توجہ دیں،
- غذا کی اصلاح کریں۔
- بمقام مرض پر مناسب روغن لگائیں،

علاج

- مٹائی اور پر سودا و ردی کے غبار کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع :-

کاو ز (۱۰)، بادرنجبویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۴ گرام، پر سیاوشاں ۵
گرام، لکھنودو ۲، ادیانہ، شاہترہ، ہر ایک ۲ گرام، سپستان ۱۰ عدد غناب ولایتی

۵ عدد، _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر
گلقدن آفتابی ۲۵ گرام ملا کر دوبارہ چھان لیں اور مرین کو نوش کرائیں، _____ جب
نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

قصبہ الزریرہ ۱۵، اسطوخودوس، بسفنج فستقی، ہر ایک ۵ گرام، افسنتین دومی ہلیلہ
کابل، ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، ہر ایک ۶ گرام، سنار کلی، اقیمون ولایتی (پوٹلی میں باندھ
کر) ۱۰ گرام، غار یقون مغربل ۱۰ گرام، تربد اکبر آبادی ۵ گرام، _____ تمام
دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر محفوظ کر لیں اور مغز فلوس خیار شبنم ۸ گرام
بھگو کر مل چھان کر اس میں ملائیں اور شیرہ مغز بادام ۵ عدد کا اضافہ کر کے نوش
کرائیں، _____ دوسرے دن تبرید کا یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

نسخہ تبرید :-

آطمر بنی گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق پیسٹ کر کھلائیں اس کے بعد
عاب کاؤ زبان، ۵ گرام پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
تھم ریحاں، ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،
○ _____ بلغم شور کے تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منضج بلغم :-

بنج کاسٹی، بنج کرفس، بنج بادیان، بنج اذخر، بادیان نیکوب، پر سیاوشاں،
اسطوخودوس، ہر ایک ۵ گرام، اصل السوس منقشر نیکوب ۵ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، مویر مٹی،
۹ عدد، _____ تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو خفیف
جوش دے کر مل چھان کر گلقدن عسلی ۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، _____ دن
بعد درج ذیل نسخہ مسہل دیں۔

نسخہ مسہل :-

مذکورہ بالا نسخہ منفع میں تربہ سفید بخوف خراشیدہ ۵ گرام، غارلقون مغربل ۷ گرام، ستارہ کی ۱۲ گرام کا حسب دستور اضافہ کریں، اور مغز فلوس خیابہ شبنم ۸۵ گرام، شکر سرخ ۵ گرام پانی میں بھگو دیں، صبح کو مل چھان کر اس میں ملائیں اور دو عن پیدا بغیر ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، پانی کے بجائے عرق بادیان نیم گرم پلاتے رہیں، دوسرے دن درج ذیل نسخہ تبرید بروئے کار لائیں۔

نسخہ تبرید :-

گلقد آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے مل چھان کر تخم ریحاں ۴ گرام چھلک کر نوش کرائیں، بعض اوقات تنقید کے لیے حب ایارج کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نسخہ درج ذیل ہے،

ایارج فقراہ ۲۵ گرام، تربہ موصوف مقشر ۵ گرام، انیسون، غارلقون مغربل، حب النیل، شحم حنظل، ہر ایک ۵۲ گرام، صمغ عربی، گل سرخ، کیترا، مصلکی رومی، نمک ہندی، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، مقل اذرق ۵۲ گرام، ضروری دواؤں کو پیس کر روغن بادام شیریں ۹ ملی لیٹر میں چرب کر کے آب مقل کے ہمراہ دانہ ماش کے برابر گویاں بنائیں اور نصف گولی رات میں اور باقی نصف صبح کو خالی پیٹ استعمال کرائیں،

○ تصفیہ خون کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

عشبہ مغربی، بسفاج قسطنق، اقیمنون ولایتی، ایکاؤزبان، دارچینی، ہر ایک ۲۵ گرام، چوب چینی، گل سرخ، مندل سرخ، مندل سفید، ہر ایک ۱۲ گرام، ہلیہ سیاہ، ۷ گرام، پوست ہلیہ زرد ۴ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور شکر ۵۰۰ گرام / شہد ۵۰۰ ملی گرام کا قوام بنا کر مذکورہ دوائیں شامل کریں اور ۱۲ گرام ہمراہ عرق عشبہ استعمال کرائیں،

○ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / ادویہ بروئے کار لائیں،

حسب ضرورت باسلیق کی فصد کھولیں (تعلیق کریں)،
بالوں کو کتر کر دہاں نشاستہ کی بار بار پلٹس لگائیں تاکہ پھلکے ختم ہو جائیں،
اس کے بعد روغن کدو شیریں سے چرب کرنے کسی آرد (موچنہ) سے بال کو جڑ
سے اکھاڑ دیں درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں۔

مردار سنگ، توتیا، سہاگہ، گندھک، مازو، پلست انار، برگ حنا، زردچوبہ،
کیلہ، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر روغن تلخ ۲۰۰ ملی لیٹر
میں جوش دے کر متاثر حصہ پر ملا کر کریں۔

کیلہ، چونا قلعی، برگ حنا، ہر ایک ۲ گرام، نیلہ تھوٹھا ۴ گرام، کات سفید
۱۱ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن تلخ میں جوش دے کر
متاثر حصہ پر لگا کر ایک گھنٹہ تک دھوپ دکھانے کی ہدایت کریں، اس کے
بعد دھو دیں۔

کیلہ، اکیلل الملک، گل ارمنی، عدس مقشر، برگ حنا، ہوزن،
تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن گل ہوزن جملہ ادویہ، ملا کر
استعمال کرائیں۔

زردچوبہ، مغز بادام تلخ، گلنار، کاغذ سوختہ، مازو، برگ مور،
ینج سوسن، کیلہ، اقا قیا کو باریک پیس کر سرکہ اور روغن گل میں
حل کر کے ملا کر کریں۔

لعاب تخم خطمی، بنفشہ، تخم کنوچہ، تخم کتاں پانی میں پیس کر مقام مرض پر
لگائیں، سعد یا بس میں مفید ہے،

برگ یا سمین، برگ نیم، برگ فراش، برگ بسکھرو، برگ بید انجیر، برگ بکائی،
ہر ایک ۲۸ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر قرص بنائیں اور روغن کنجد
۲۵۰ ملی لیٹر میں خوب جلاتیں، جب سیاہ ہو جائے تو نکال کر محفوظ کر لیں، اور کیلہ، برگ حنا،
سہاگہ بریاں، مردار سنگ، زردچوبہ سوختہ، باجی سوختہ، آملہ سوختہ، فلفل
گرو سوختہ، کات سفید، ہر ایک ۷ گرام، نیلہ تھوٹھا پیس کر مذکورہ بالا روغن
میں ڈال کر نیم کی لکڑی سے حل کر کے، (بالوں کو تراش اور صاف کر کے) لگائیں،

آملہ سوختہ، نیلہ توتیا سوختہ، فلفل سیاہ سوختہ، پوست خشتخاش سوختہ،
مردار سنگ بریاں ہوزن، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن زرد (۱۰۰
بار دھویا ہوا) میں ملا کر ملا کر کریں۔

تخم کدو ۲۰ گرام، توتیا نئے مغسول ۳۳ گرام، شنگرف ۳۱ گرام، —————
تمام دواؤں کو تازہ دودھ میں پیس کر ضا د کریں،
جب کچھ بال اگنے لگیں تو روغن بیفہ مرغ استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Saman

بنات اللیل

اس مریض میں، رات میں، جلد کی ظاہری سطح پر، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، نکلی آتی ہیں، جن کو کچھلانے میں ابتداءً لذت اور بعد میں شدید سوزش محسوس ہوتی ہے، مریض مضطرب ہو جاتا ہے، ————— ملحوظ رہے کہ یہ پھنسیاں موسم سرما میں، رات کے وقت ہیجان میں آتی ہیں اور ان کے نکلنے کی کیفیت بھی کسی قدر بنات اللیل جیسی ہوتی ہے اس لیے ان کو یہ نام دے دیا گیا۔

اسباب

- (i) جلد کا میلا اور کثیف ہونا،
- (ii) غلیظ لزج اخلاط کا غلبہ،
- (iii) مسامات کا غیر معمولی طور پر تنگ یا بند ہونا،
- (iv) جلد کی درشتی،
- (v) داخلی یا خارجی طور پر برودت کا غلبہ،
- (vi) سوزہضم،

علامات

موسم سرما کی رات میں، جب برودت کا غلبہ ہوتا ہے تو جسم کے بعض حصوں

* تانوں کا ایک جھرمٹ

میں ہلکی خارش محسوس ہوتی ہے، متاثرہ حصہ کسی قدر دیر اور سخت ہو جاتا ہے، پھر وہاں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں، جن کو کھلانے میں ابتداءً بڑی لذت حاصل ہوتی ہے لیکن بار بار کھانے سے وہاں شدید سوزش اور درد کا احساس ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات ان سے رطوبت پہنے لگتی ہے، ————— مرین کی رو بہداد مضموم کرنے پر سبب کی تعیین میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔

اصول علاج

- ————— فصد کھولیں۔
- ————— غلط غالب کی رعایت کرتے ہوئے استفراغ کریں۔
- ————— مفتحات، مرونات وغیرہ استعمال کرائیں۔
- ————— جسمانی صفائی اور طہارت پر خصوصی توجہ دیں۔
- ————— داخلی اور خارجی، دونوں طرح کی برودت سے مقدور بھرا احتیاط کریں۔
- ————— مقیات کا استعمال زیادہ سودمند ہے۔

علاج

- ————— غلیظ، لزج غلط کے غلبہ کی صورت میں درج ذیل نسخہ منفع و مسہل و تبرید استعمال کرائیں،
- نسخہ منفع :-

ینغ کاسنی، ینغ بادیان، ینغ اذخر، ینغ کرفس، بادیان نیکوفت، پرسیاوشان، اسلوخودوس، ہر ایک، گرام، اصل السوس مقشر نیکوب، ہ گرام، انجیر زرد، عدد، مویز منقہ، عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگوئیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر مل چھان کر گلقدہ حسی۔ ہ گرام ملا کر دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، سات دن تک یہی نسخہ استعمال کرائیں، آٹھویں دن درج

درج ذیل نسخہ سہل بروئے کار لائیں،

نسخہ سہل :-

مذکورہ بالا نسخہ منفع میں تربید سفید محو خراشیدہ ۵ گرام، ستار کی ۱۲ گرام، غار یقون مغزیل ۳ گرام کا اضافہ کریں، ————— اور مغز فلوس خیار شبنر ۵ گرام، شکر سرخ، ۵ گرام کورات کے دقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر مذکورہ نسخہ میں ملائیں اور کلقتند آفتابی ۵ گرام حل کر کے روغن بیدانجیر ۲ ملی لیٹر ڈال کر نوش کرائیں، ————— اور پیاس لگنے کی صورت میں صرف عرق بادیان نیم گرم نوش کرائیں، ————— دوسرے دن درج ذیل نسخہ تہرید استعمال کرائیں۔

نسخہ تہرید :-

کلقتند آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۱۴ ملی لیٹر میں ملا کر چھان لیں اور تخم ریکاں ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

غلظت بلغمی خلط کے اخراج کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے،

آرد تربید موصوف ۸ گرام، حب النیل بریاں ۴ گرام، پوست ہلیلہ زرد، زنجبیل، ہر ایک ۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو حسب دستور پیس کر روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر سے چرب کریں اور مغز بادام ۳۱ عدد، نبات سفید ۵ گرام ملا کر ۱-۳ گرام استعمال کرائیں،

خوردنی طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہیں،

تخم کمرنس، بادیان، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، ریوند چینی، گل سرخ، ہر ایک ۹ گرام، تربہ بین ہوزن جملہ ادویہ، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ۱۲ گرام ۳ دن تک کھلائیں،

کشیز خشک، تخم خرفہ، تخم کاسنی، ہر ایک ہوزن، کباب چینی نصف حصہ، ————— حسب دستور صوف بنائیں اور ۱۸ گرام استعمال کرائیں،

○ خارجی طور پر یہ ہدا بیر نسخہ استعمال کرائیں،
مسمات جلد کو کھولنے کے لیے حمام کرائیں،
آرد باقلا، مرکی، صبر، شگوفہ حنا، ہوزن کو آب بادیان میں پیس کر مٹھا
کریں،

آرد عدس، صبر ہوزن کو سرکہ اور شہد میں ملا کر جسم پر مالش کریں،
سیوس گندم، تخم خربزہ کو پانی میں پیس کر جسم پر مالش کریں،
شترخار، اکیلل الملک، برگ چقند، سداب، گور ہوزن کو پانی میں جوش
دے کر مل چھان لیں اور اس کا نطول کریں، اس کے بعد روغن قسط
جسم پر ملیں۔

صبر، مرکی کو باریک کر کے شہد، سرکہ کی گاد (تلیٹ) پورہ اڑنی کو آب کرفس
میں حل کر کے لگائیں،
زعفران، برگ حنا کو باریک کر کے آب کرفس میں حل کر کے لگائیں،

○ تے لانے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
تخم ترب، گرام، تخم شبت ۳ گرام، نمک طعام ۲ گرام، تمام
دواؤں کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر کھلائیں، اگر ضرورت محسوس
کریں تو آب گرم کے ساتھ کھلائیں۔



بثور لبنیہ

ACNE

اس مرض میں جلد کے غدود ہنیہ کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور روغنی رطوبات زیادہ بنتی ہیں لیکن ان غدود کے دھانوں (مسکھ) کے بند ہو جانے کی وجہ سے اندر ہی اندر جمع ہوتی ہیں۔ ان گلیٹوں (غدد) میں خفیف ورم پیدا ہو کر چھوٹی چھوٹی سفید یا زردی مائل، توکیلی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی جڑیں سخت اور سرخ ہوتی ہیں، ان میں دیم پڑ جاتی ہے، اس صورت میں پھوٹ کر خشک ہو جاتی ہیں اور دھان سیاہ داغ رہ جاتا ہے۔
 بلوغت کے ابتدائی چند سالوں میں یہ مرض کثیر الوقوع ہوتا ہے اور ۲۵-۲۸ سال کی عمر میں از خود ختم ہو جاتا ہے،

اسباب

اسباب معده :-

(i) غلبہ خون / فساد خون / قلت خون۔

(ii) شدت حرارت / شدت برودت۔

(iii) فساد ہضم۔

(iv) کثافت جلد

(v) کثرت افکار

(vi) گرم غذاؤں / مشروبات کا بکثرت استعمال

(vii) حیض کی بے اعتدالی / معتاد خون کا بند ہو جانا، مثلاً لواءیر یا خواجہ،

- (۱۰) ایام گل
(۱۱) عام صحت کی خرابی / تازہ ہوا کی کمی
(۱۲) جسمانی اور طبوساتی عدم صفائی
(۱۳) موروٹی / خاندانی طور پر جلد کا روغنی ہونا
(۱۴) دھامن سی کی کمی۔
(۱۵) روغنی صابن / کریم وغیرہ کا بکثرت استعمال

اسباب و اصل :-

- (۱) مردانہ جوہر (Male Hormones) کے افزائ میں اضافہ ہو جانا۔
(۲) شحمی غد (گٹھیاں) کے افزائ کی کیاوی ترکیب میں فساد واقع ہونا،
(۳) ایکٹی بی سی لائی۔

علامات

چہرے، گردن، اور سینے پر چھوٹے چھوٹے سفید یا زردی مائل، نوکیلے دانے نکل آتے ہیں، اس کی اصل (جڑ پیندے) سخت اور سرخی ہوتی ہے، کچھ عرصہ بعد یہ دانے پک جاتے ہیں اور پھوٹ کر خشک ہو جاتے ہیں تو بھی وہاں کیل کی مانند ایک غلیظ سیاہ مادہ رہ جاتا ہے، جس کو مرین ناخن کے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ مادہ اندر سے نکل آتا ہے تو کچھ فاسد خون یا زرد آب (Serum) خارج ہوتا ہے اور بعد میں اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نئے دانے نکلنے لگتے ہیں، مرین جس قدر ان کو اکھاڑتا یا زخموں کو چوڑتا ہے، چہرہ بد نما ہوتا جاتا ہے اور بالآخر چہرے پر سیاہ رنگ کے بد نما داغ پڑ جاتے ہیں، شدید صورتوں میں داغ کی وجہ سے جلد میں کسی قدر ابھار بھی پیدا ہو جاتا ہے جو چہرہ کے کرم خوردہ ہو جانے جیسی شبیہ پیش کرتا ہے، چہرے کی رونق، ملاحت اور جاذبیت غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہے، ————— صورتوں میں یہ مریض اکثر اوقات شدید معاشرتی الجھنیں پیدا کرتا ہے،

امراضیاتی نقطہ نظر سے علامات کے رونما ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چربی کی تولید میں معاون عدد اپنے دہنی (روغنی) اجزاء کو جلد سے باہر دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پسینہ کی عروق، جو ظاہر جلد پر نکلتی ہیں، وہ روغن (چکنائی) کی زیادتی کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ اس چکنائی میں، ایکٹی بے سی لس کی نشوونما بخوبی ہونے لگتی ہیں، جب یہ جراثیم بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں تو ظاہر جلد (مرامات جلد) پر حملہ کرتے ہیں، چنانچہ اس وقت ایک ٹوکیلا دار، سطح جلد پر نمودار ہوتا ہے، جس کا سرا سیرا ہی مائل ہوتا ہے، اس دانے کے مواد کو نکال دینے سے قریبی جلد اس کے سخی مواد کی وجہ سے سرخ ہو جاتی ہے، مواد اگر زیادہ گہرائی میں ہو تو سوزش اور التهاب بھی پایا جاتا ہے۔

اصول علاج

- غلیظ خون کی صورت میں معدلات استعمال کرائیں،
- حدت کی صورت میں مطہیات اور فساد خون کی صورت میں مصفیات استعمال کرائیں۔
- حسب ضرورت تنقیہ کریں۔
- عمل ہضم کی بہتری کی تدابیر اختیار کریں،
- جالی اشیاء سے متحذروں کی تاکید کریں،
- محملات استعمال کرائیں،

علاج

- خون کی حدت / فساد کی صورت میں درج ذیل نسخہ جات آزمائیں

بردئے کارلائیں۔

سرا رو کی قہد کھولیں۔

تصفیہ خون کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

برگ بکائن، پوست بکائن، برگ نیم، پوست نیم، پوست بکناں، پوست لوسلہ، پوست گولر، برگ حنا، برگ بھنگرہ سیاہ، دودھنی خورد، منڈی، سرچھوکر، شاہترہ،

چوتھے سار، گل نیلوفر، برادہ صندل سفید، برگ بید سادہ، برادہ شیشم، فوہ، بیج کاسنی، تخم کاسنی، کشنیز خشک، ہر ایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۱۲ لیٹر پانی میں ۲۳ گھنٹے بھگوئے رکھیں اس کے بعد ۶ لیٹر عرق کشید کریں اور ۵۰ ملی لیٹر، ہمراہ شربت عناب ۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

عشہ مغربی، بے غاٹج فستقی، ایتیمون ولایتی، گاؤ زبان، دار چینی، ہر ایک ۲۵ گرام، گل سرخ، چوب چینی، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام، ہلیلہ سیاہ، ۷ گرام، پوست ہلیلہ زرد ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، شکر ۵۰ گرام، شہد ۵۰۰ ملی لیٹر کا قوام بنا کر مذکورہ سفوف ملائیں اور حسب دستور میجون بنائیں، ۱۔ ۲۰ گرام ہمراہ عرق عشہ استعمال کرائیں۔

○ ————— تنقید کی غرض سے درج نسخہ استعمال کرائیں، سودا، صفرا، اور بلغم کے تنقید میں از حد مفید ہے۔

ایا راج فیکرا ۵۰ گرام، تربد موصوف ۶ گرام، حب الفیل، انیسون، خلیقون مغربی، شحم خنظل، ہر ایک ۲۱ گرام، کیترا، صمغ عربی، گل سرخ، نمک ہندی، مصطلکی رومی، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام، مقل ازرق ۷۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن بلام ۱۰ ملی لیٹر میں چرب کر کے آب مقل کے ہمراہ دانہ ماش کے برابر گولیاں بنائیں اور نصف گولی رات کو اور باقی نصف صبح کو نہار منہ کھلائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے،

جمال گوٹہ مدبر، ہلیلہ سیاہ، ہر ایک ۱۲ گرام، آرد چاول سانٹھی ۲۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۲ گولیاں ہمراہ آب سرد کھلائیں۔

○ ————— ر فح قبض کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

ہلیلہ زرد، ستار کلی، ہر ایک ۶ گرام، زہرہ سیاہ، گل سرخ، پودینہ خشک، مصطلکی رومی، ہر ایک ۱۲ گرام، زنجبیل ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے سفوف تیار کریں اور ۷ گرام، ہمراہ آب نیکرم نوش کرائیں۔
گل بنفشہ، گل سرخ، گل نیلوفر، تربد سفید، ہر ایک ۲۵ گرام، تربد جبین ۱۰ گرام

شیش ۲۴ گرام، شہد ۲۴ ملی لیٹر، ————— تربجین کو عرق گلاب میں بھگو کر
شہد میں قوام کر کے، باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر ملائیں اور حسب دستور مہون تیار کریں،
۱۸-۲۵ گرام، ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں۔

○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

کافور، زعفران، ہر ایک ۲۵۰ ملی گرام، گل غنوم، گل ارمنی، ہر ایک ۳۰۵ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب، سرکہ انگوری میں پیس کر طلا کریں۔
سدا ب، برگ دقلی ہوزن کو پانی میں پیس کر طلا کریں،

کف دریا، زراوند مدحرج، تخم ترب، ہر ایک ۳۵ گرام، ابہل ۱۸ گرام، افسنتین،
۶ گرام، یخ سوسن آسمانجونی ۵۰۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی
کے مدد سے ٹکیہ بنائیں اور خشک کر کے محفوظ کریں، حسب ضرورت پانی میں گھس کر طلا کریں،
کف دریا، مغز بادام تلخ مقشر ہوزن، ————— دونوں آہستہ آہستہ پیس کر
طلا کریں اور صبح کو آرد خود اور آب آٹے سے دھونے کی ہدایت کریں۔

تخم ترب، یخ نئے، گل بنفشہ، حنبل الشلب، کیترا، ہر ایک ۶ گرام، —————
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب کید اور آب برگ حنا سے گوندہ کر رات کو لگائیں اور صبح
کو دھونے کی ہدایت کریں،

آرد خود بریاں مقشر ۶ گرام، مردار سنگ ۳ گرام، سفیدہ کا شغری ۳ گرام، —————
تمام دواؤں کو پیس کر تازہ دودھ میں حل کر کے متاثر جگہ پر ملیں،
خشک ہو جانے پر آب برگ نیم سے دھوئیں اس کے بعد روغن یا سمین لگانے کی
ہدایت کریں،

ترمس، تخم خشتا ش سفید، مغز تخم خربزہ، مغز تخم باقلا، مغز بادام تلخ، ہر ایک
۶ گرام، زعفران ۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو پیس کر محفوظ کریں اور حسب ضرورت
تھوڑا سا سفوف پانی میں ملا کر صاف کریں اور لگھٹے بعد گرم پانی سے دھو کر
روغن یا سمین لگانے کی ہدایت کریں،



بلم

اس مرنی میں، حب البلم (جبتہ الخضراء Terebinth) کے برابر یا اس سے کسی قدر بڑے، سیاہ رنگ کے دانے پنڈلیوں پر پیدا ہو جاتے ہیں، جو بعد میں متفرق ہو کر صدیدی (ہیپدار) ہو جاتے ہیں،

اسباب

(I) سودائے مفرق

(II) غلیظ، ماحلط

علامات

بلم میں پنڈلیوں پر، جبتہ الخضراء کے بقدر یا اس سے کچھ بڑے، سیاہ رنگ کے دانے پیدا ہوتے ہیں اور شدید، متفرق صورت میں ان سے سیاہ رنگ کی ہیپ خارج ہوتی ہے، غلبہ سودا کی دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں، ان کے اندال کا عمل نہایت کست ہوتا ہے کیوں کہ پنڈلیوں کی طرف سارے بدن سے مولا جذب ہوتا ہے،

اصول علاج

- بلم میں حسب ضرورت باسلیق کی قصد کھولیں،
- پنڈلیوں پر جونکیں لگائیں،

- پچھنے لگا کر شیشوں کے ذریعہ مواد جذب کریں،
- متعجات دمسہلات اخلاط (غالب) استعمال کرائیں،
- مصیفات خون نوش کرائیں،
- تے آور دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

- (I) بلغم میں درج ذیل تدا بیر اور نسخجات استعمال کرائیں،
- دونوں با سلیق، البطین اور جہہ کی فصد کھولیں،
- قیصوم خاکستر، چوب جھاؤ خاکستر، مایمیراں، زراوند طویل،
- پوست ینغ کبر، حنا سوخته، ہموزن، تمام دواؤں کو سرکہ اور روغن زیتون
- میں ملا کر بلغم پر ملا کر کریں،
- صمغ عربی کو سرکہ میں خوب بھگوئیں اس کے بعد بلغم پر ملا کر کریں،
- سکنجبین اور آب گرم کے ذریعہ تے کرائیں،
- جلاب کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
- غنا ب ۱۰ عدد، تخم کاسنی ۵، اگرگرم، شکر، ترنجبین، ہر ایک ۳۵ گرام،
- تمام دواؤں کو حسب دستور استعمال کرائیں،
- تیلیبی شکم کے لیے یہ نسخہ مجرب ہے،
- سنارکلی، ہلید زرد، ہر ایک ۵، ۲۴ گرام، آلو سیاہ ۲۰ عدد، گل سرخ،
- تخم شاہترہ، ہر ایک ۵، ۱۰ گرام، بنفشہ، نیلوفر، ہر ایک ۵، ۱۰ گرام، تربدہ ۵، ۱۰ گرام،
- مویز منقہ ۲۰ عدد، تمام دواؤں کو ۵ لیٹر پانی میں جوش دیں، جب
- پانی صرف ۴۰۰ لیٹر رہ جائے تو مغز فلوس خیار شہر، ترنجبین، ہر ایک ۳۵ گرام ملائیں
- اور مل چھان کر سقمونیا مشوی ۲ گرام ملا کر صبح کو نوش کرائیں،
- (II) توشہ میں درج ذیل تدا بیر / نسخجات استعمال کرائیں،
- سرارو کی فصد کھولیں،
- مرہم رسل سے توشہ کو زائل کریں، مرہم کانفو

درج ذیل ہے،

جاد شیر، زنگار، گندہ بہر وزہ، مرصافی، ہرایک، گرام، زراوند طویل، کندر،
ہرایک ۱۰، اگر گرام، مقل ارزق سم اگر گرام، مردار سنگ ۵، اگر گرام، اشق ۲۵، گرام، موم سفید،
رال، ہرایک ۶، اگر گرام، خشک دواؤں کا سفوف بنائیں اور گوندیز دواؤں
کو موم میں پکائیں اور روغن زیتون (حسب ضرورت) ملا کر مرہم تیار کریں۔
یہ مرہم بھی مفید ہے۔

موم سفید، کافور قیصوری، رال، کات سفید، ہرایک ۸، اگر گرام، تمام
دواؤں کو علاحدہ علاحدہ سفوف کریں اور موم کو روغن کاؤ ۵، ملی بیڑ میں پگھلائیں،
اس کے بعد رال، کات سفید اور کافور ملائیں اور خوب گھونٹیں اور مقامی تنقیہ کے
بعد لگائیں۔




Learn Unani By Abul Wajid Siddiqui

بثور غریبہ

اس ذیل میں چند ایسے بثور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو شاذ و نادر نمودار ہوتے ہیں، اور حسب مادہ مرض شدید / خفیف مرضی علامات رونما کرتے ہیں،

اقسام

بثور غریبہ



اسباب

- (۱) غلیظ سوداوی خلط کے نتیجے میں رطوبت کا معرق ہو کر جم جانا،
- (۱۱) غلیظ خون کے بخارات / فساد خون
- (۱۱۱) زائد رطوبات کا اجتماع
- (۱۷) ضعف / برودت جگر

علامات

(آ) بشور ذات الاصل :-

یہ سفید رنگ کی، اوپر کو ابھری ہوئی، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں، ان کی جڑیں سخت ہوتی ہیں اور غد کی طرح محسوس ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنی سختی کے برعکس یہ ذہیل بنا دیتی ہیں، یہ عام طور سے نفع، بہت تاخیر سے قبول کرتی ہیں، چنانچہ اوپری حصہ نفع قبول کر کے مٹھ کھول دیتا ہے، اور اس سے مواد نکلنے لگتا ہے لیکن جڑیں بدستور سخت رہتی ہیں اور کافی عرصہ کے بعد تحلیل ہوتی ہیں، اس میں درد بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ————— اطار نے ان کو بدترین نوع میں شمار کیا ہے،

(ب) بشور سرخ صلب :-

یہ سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیاں ہیں جو ڈوبتی ابھرتی رہتی ہیں، چنانچہ جسم کے کسی حصہ پر نمودار ہونے کے بعد گم ہو جاتی ہیں اور پھر دوسرے حصہ پر ظاہر ہوتی ہیں، ان میں درد نہیں ہوتا، بڑی ہشیلی ہوتی ہیں اور کافی عرصہ تک رہتی ہیں،

(ج) بشور اصداغ :-

یہ پھنسیاں چھوٹے دلوں کی مانند ہوتی ہیں، ان میں سرخی اور رقت اور استرخار پایا جاتا ہے، تاہم ان میں پیپ نہیں پڑتی، تاہم دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نفع ہو گیا ہے، لیکن نشتر لگانے پر صرف تازہ خون خارج ہوتا ہے، عام طور سے یہ ناصور میں تبدیل ہو جاتی ہیں،

(د) لفاخات :-

یہ پھنسیاں لمبی اعصاب میں پیدا ہوتی ہیں، ابتداء میں یہ چھوٹی چھوٹی، اس کے بعد بڑی، فراخ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اسباب کے ذیل میں مذکور ہوا، اس کا سبب زائد رطوبتوں کا اجتماع ہے، اسی لیے جب رطوبات بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو استسقاء

لجی ہو جاتا ہے،

(لا) شور قفا :-

یہ پھنسیاں نسبتاً بڑی اور گدڑی پر نکلتی ہیں، ان میں شدید درد ہوتا ہے، بعض اہلہ کا خیال ہے کہ مقام دماغ اور مبادی اعصاب کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا مرین بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

○ مادہ مرض کی رعایت کرتے ہوئے فصد کھولیں اور حسب ضرورت منفعیات و مسہلات استعمال کرائیں۔

○ طینات اور مملات ہجرات استعمال کرائیں،

○ تسکین درد کی تدابیر کریں،

○ تصفیہ خون کریں،

علاج

(لا) ذات الاصل :-

○ فلیظ سوداوی غلط کی صورت میں نفخ و تنقیر کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع سودا :-

بادیان، شاہترہ، اسطوخودوس، ہر ایک ۷ گرام، پر سیاوشاں ۵ گرام، گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اصل السوس بمقشر، ہر ایک ۳ گرام، سپستان ۱۱ عدد، عناب ۵ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور تر بنجین خراسانی / گلقد آفتابی حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، دو تین دن کے بعد اسی نسخہ میں تخم خطمی، یخ کاسنی، یخ بادیان، ہر ایک ۷ گرام، مویز منقہ و عدد انجیر

۵ عدد کا اضافہ کریں،۔۔۔۔۔ جب نفع مادہ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو درج ذیل ادویہ سے تنقیہ کریں۔

نسخہ مسہل سودا :-

قصب الزریرہ، بسفاج نستقی، ہر ایک، گرام، افسنتین رومی، ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ زرد، ہلیلہ، ہر ایک ۴ گرام، ایتھون ولایتی (پوٹلی میں باندھ کر)، برگ سنارکلی، ہر ایک ۹ گرام، غار یقون مغربل، تربد اکبر آبادی، ہر ایک ۳ گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر مغز قلوں خیار شبنم ۵ گرام حل کر کے دوبارہ مل چھان کر روغن بادام ۹ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،۔۔۔۔۔ اگر مسہل کے دبیان میں نفع درکار ہو تو ان دواؤں کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ شور ذات الاصل میں بہر حال نفع کی نرصہ تک ضرورت رہتی ہے،

خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / دوائیں بروئے کار لائیں،
باسایق کی فصد کھولیں،

اسپنول کو پانی میں کھول کر لگائیں،

تسکین درد ہو جائے اور پیپ پیدا ہو جانے کے امکانات ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرائیں،
تخم کنوچہ، اسپنول، ہر ایک ۲ گرام، برگ چقندر، برگ کاسنی، ہر ایک ۴ گرام،۔۔۔۔۔
دونوں برگ، کو کوٹ کر روغن کتجد میں پکائیں، جب نرم ہو جائیں تو تخم کنوچہ اور اسپنول زردی بیضہ مرغ ڈال کر ضما د کریں،

اشق کو زردی بیضہ مرغ میں ملا کر ضما د کریں،۔۔۔۔۔ درم پھوٹ جائے گا،
۔۔۔ اس کے بعد زخم بھرنے والے مرہم استعمال کرائیں۔

(لا) بشور صلب سرخ :-

○ — بشور سرخ صلب میں درج ذیل تدابیر و نسخے استعمال کرائیں۔

فصد کھولیں،۔۔۔۔۔ اس کے بعد درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

شہترہ، چرائتہ، پوسٹ ہلیلہ زرد، ہر ایک، گرام، عناب ۵ عدد،۔۔۔۔۔
تمام دواؤں کو گرم پانی میں بھگو دیں اس کے بعد مل چھان کر شہد سے شیریں کر کے نوثر کرائیں،۔۔۔۔۔ جب حدت کچھ کم ہو جائے تو نفع مادہ کے لیے یہ نسخہ دیں،

نسخہ منفع :-

گل بنفشہ، شاہترہ، تخم خیارین نیکوفتہ، ہر ایک ۵ گرام، نکاؤ زبان، یخ کاسنی، ہر ایک ۵ گرام، عنب الثعلب ۳۵ گرام، نسپستان ۲۰ عدد، آلو بخارا ۷ عدد، مویرہ منقی ۹ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شہد سے شیریں کر کے نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کا اضافہ کریں۔

نسخہ مسہل :-

سنارہکی، ۱۲ گرام، مغز فلوں خیار شہرہ ۵ گرام پانی میں بھگو کر مغز بادام ۹ عدد پیس کر ملائیں اور نوش کرائیں۔
تنقیہ کے بعد درج ذیل معجون استعمال کرائیں۔

پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابلہ، پوست ہلیہ، ہر ایک ۱۲ گرام، آلو منقی، گلوہ، شاہترہ، زیرہ سفید، ہر ایک ۲۵ گرام، کشنیز لمقشر، گل مصفر، ریم منڈی، برگ حنا، صندل سرخ، دھلیہ، ہر ایک ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو گڑ چھان کر شہد دو گنا اور کشمش سبز ہوزن میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۲ گرام ہمراہ عرق منڈی ۱۲۰ ملی لیٹر استعما کرائیں، عرق منڈی کا نسخہ درج ذیل ہے،

منڈی ایک کلو گرام، پوست نیم، چرانتہ، ہر ایک ۵۰ گرام، مسکھوکر، پوست ہلیہ زرد ہر ایک ۲۵ گرام، برادہ صندل سرخ، برفاچ، عنب الثعلب، ہر ایک ۱۲۵ گرام، عنباب ۵۰ عدد، تمام دواؤں کو گڑ کر ۱۱ لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو عرق کشید کیا جائے۔ جدوار، زنجبیل، گیرد، رسو، ہوزن، تمام دواؤں کو آب، مکو، بیزریا پیس کر ضا د کریں۔

III) ثبورہ اصداغ :-

قیفال کی فصد کھولیں۔

تنقیہ کی غرض سے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

اسطوخودوس، گل سرخ، پوست ہلیلہ کابلی، پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، آطہ معشر، ہر ایک ۲۰ گرام، کشنیز معشر ۱۰۰ گرام، تربخین ۸۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے بھان لیں اور روغن بادام (حسب ضرورت) سے چرب کریں، اس کے بعد شکر ۲۵۰ گرام، اور تربخین کا قوام بنا کر حسب دستور اطر لفل بنائیں اور ۵/۷ — ۱۰ گرام ہمراہ عسرق کاؤ زبان استعمال کرائیں،

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ کابلی، پوست ہلیلہ، آطہ منقی، ہر ایک ۲۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام شیریں، املی بیڑ میں چرب کریں ۱۰ فیتون، برگ سنار کی، مصطکی، تربد سفید، اسطوخودوس، بسفاج، ہر ایک ۲۱ گرام، ————— فیتون اور مصطکی رومی کو علاحدہ علاحدہ اور دوسری دواؤں کو ایک ساتھ کوٹ چھان کر کشمش، مویز منقی، ہر ایک ۲۰ گرام کوٹے ہوئے میں ملائیں اور شہد خالص ایک لیٹر کے قوام میں اطر لفل تیار کریں ۶ - ۵ گرام ہمراہ عرق بادیان استعمال کرائیں۔

باقلا، ترس، جو، مٹر کو باریک کر کے سرکہ اور آب بادیان میں گوندھ کر ضاد کریں، اور مناسب قیر وطنی ملیں،

(۴) نفاخات :-

مطہر سوئی کی نوک سے ثور کو پھوڑیں اور رطوبت خارج کریں۔ اور پسینہ لانے والی دوائیں استعمال کرائیں۔

تقویت جگر کے لیے یہ نسخے بروئے کار لائیں،

مرکی، سنبل الطیب، مصطکی رومی، فوفل، نارمشک، ہموزن، ————— تمام دواؤں کو باریک کر رکھ لیں، روغن نار دین / روغن بلسان / روغن قسط کو تھوڑی موم کے ساتھ پگھلا کر آٹھ سے اتار کر سفوف ملائیں اور خلور معہ کی حالت میں معدہ اور مقام کبد پر ضاد کریں،

۲، ۳ روز بعد پیدہ ضاد بروئے کار لائیں،



MILKARY

(1) مریض کے جسم پر پورے (Pores) ہزاروں اور ہزاروں سطحی اپنی ہونے سے ہوتے ہیں۔
 (2) Sweat Glands: یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔
 یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔
 یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔
 یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

۱۰۰

دیکھنا کہ یہ کون سے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

(3) یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ گلینڈز ہونے والے ہیں جو ہر جسم پر ہوتے ہیں۔

علامہ اوس

موتیوا (۱) طرز نشانی، چھوٹے آنسو، یہ دانہ نام درہ، شہداء اور بڑے پتھر
کترت، سپائے نشانی، اور یہ کچھ کچھ پتھر پر اور کچھ دور دور ہوتے ہیں، ۱۲۰ گنتے
ہیں، یہ مرتبہ پتھر اور دوسرے دانے کا آئینہ، انہما اور دانہ، گریڈ اور
موسم میں تمام طور پر، تن کو نکال کر نام، نمائندہ، ہوتا ہے پتھر، خدق، یہ دانہ، ۱۰۰ کے
پتھر دلوں میں سترقی ہیں، ہوتے، نہ ہوتے، (کائنات کی) جہنم ہوتے، نہ ہوتے، ۱۰۰ کے
گھر کسی طرح کا ہوتا ہے، اور نہ (۱۰۰) کی شفا، رطوبت، گدلی ہوتی ہے۔

اصول علاج

- — غلط خالی کا تنقیہ کریں / فساد کھولیں
- — بار دغریقاً توغیر کریں
- — قوی کی بجائی، تدا بیر کریں
- — جسمانی غذا اور پاکیزگی پر خصوصی توجہ دیں
- — مسفیقات خواہ استعمال کریں
- — تثبیل اور انقار غذاؤں سے پرہیز کریں

علاج

○ — غلط خالی، کے تنقیہ کے لیے حسب ذیل نسخے استعمال کریں۔
تھمر بندہ ۶۰ گرام، کل، ریش، برگ، سارگی، ہریا، ۱۰ گرام۔ تمام
دواؤں کو رات کے وقت پانی میں جھگو کر صبح کو ۱۰ چائے اور شیر خشک ۲۰ ملان کر ملا کر
نوش کریں، ————— نمائندہ نمائندہ میں، —————
نیلو فر کل، بفتہ، کاسٹی ٹیکوفتہ، ہریا، ۱۰ گرام، غناب، ولایت، ۲۲ عدد، برگ، سار
۲۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت نیگارم پانی میں جھگو کر صبح کو ۱۰ چائے
لیں اور شیر خشک ۵۰ مل لٹر حل کر کے نوش کریں، ————— غلبہ غلط صفر میں

میں اور تجربہ سے

حرارت بچانے (الفاظ حرارت) کے لیے یہ نسخہ استعمال

○

کرایہ۔

آب انگوتر میں ایک مائیسر، شکر بڑھ بکلو گرام، حسب دستور شربت کا قوام بنائیں اور ۲۱ میں (قلوب سر) ۵ گرام، تم تلخ، بین، فیہ، اندر جو شیریں، تم گڑ، رابا، ۱۰ گرام، عرق کیوڑ، ۱۰ گرام، ملائیں اور ۲۵۔ ۳۵ ملی لیٹر صبح کو نوش کرائیں، تیرہ بجے ۱۰۔ ۲۰ گرام کورات کے وقت پانی میں بکاو دیں اور صبح کو معمولی جوش دے کر اپنے انیس، اور ایک کینو گرام شکر ملا کر شربت کا قوام بنائیں اور ۲۵۔ ۳۵ ملی لیٹر، ہمراہ آبیہ لازم نوش کرائیں۔

کمانہ کو فر ۱۱ گرام کورات کے وقت پانی میں بکاو دیں اور صبح کے وقت خفیف جوش دے کر ۲۰ چھان، شکر ایک کینو گرام ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور ۲۵ ملی لیٹر ہمراہ آبیہ تازہ منا۔ عرق، استعمال کرائیں

تفنیہ خواں کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں

○

پوست یخ نیم، پوست شاخ انجیر دشتی، شاہترہ، چرائتہ، کشنیر خشک، پوست ہلدی، پوست بایلی، پوست کابلی، پوست بہیرہ، آملہ، ہلدی سیاہ، شیطر ج، بادبان، سنار، کئی، ۲۰ سرخ، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد/شکر ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۰ گرام ہمراہ آبیہ تازہ استعمال کرائیں۔

شاہترہ، سر بھوک، صندل، تیل کنٹھی، ہر ایک ۲۰ گرام، نر پور، چوب چینی، ہر ایک ۱۰ گرام، چرائتہ شیریں، غناب، منڈی، ہلدی سیاہ، ہر ایک ۲۰ گرام، برگ حنا، کھیلہ، غشیہ، ہر ایک ۱۵ گرام، برادہ شیشم ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو نیکوب کر کے آٹھ گنا پانی میں جوش دیں، جب ۱/۲ حصہ پانی رہ جائے تو مل چھان کر ہوزن شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور ۲۵ گرام ہمراہ عرق مصفی استعمال کرائیں، عرق مصفی کا نسخہ درج ذیل ہے،

شاہترہ، چرائتہ، سر بھوک، گل بڑی، ہلدی سیاہ، صندل، سرخ، برادہ شیشم، برگ نیم، پوست یخ کثیر، مغز بکائن، پوست یخ بکائن، برادہ آبنوس، مغز تم نیم،

Learn Unani By Abdul Waris Salman

○۔۔ صغراوی غلط کے تفتیح کے لیے درج ذیل نسخہ منفع و تبرید
و تبرید بھی استعمال کرنا سودمند ہے،

نسخہ منفع:-

کل بنفشہ، عنب الثعلب، فل سرخ، شہاب ترہ، تم خطمی، تم کاسنی نیکو۔۔۔
ہر ایک، گرام، گل نیلوفرہ گرام، آلو بخارا، عناب، ہر ایک ۵ عدد، تمام
دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر کلاتہ راق تیار،
خمیرہ بنفشہ ۱ گرام، ملا کر دوبارہ چھان کر نوش کرائیں،
ذیل کا نسخہ مسہل استعمال کریں۔

نسخہ مسہل:-

مذکورہ نسخہ منفع تیار کریں، لکھنڈ / خمیرہ کی مقدار بڑھا کر ۵ گرام کر دیں اور مغز لوہا
خار شہزہ ۵ گرام، تربخین ترا سانی، تمر ہندی، قشیر ہر ایک ۵ گرام، تمام
دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر کلاتہ راق تیار،
شیرہ مغز بادام شیریں ۵ عدد کا اضافہ کر کے نوش کرائیں،
تبرید استعمال کرائیں۔

نسخہ تبرید:-

لعاب بہد ۳ گرام، پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر سے شیریں کر کے
اسپتھول مسلم ۴ گرام چھڑا کر نوش کرائیں۔

۱۔ زخموں کی دیکھ بھال اور جراثیم کش کے استعمال سے جلد کے طبقات بشیرہ اور
معدنیہ کے درمیان خون کی مائیت متراش ہو جائے۔ یہ اور بشیرہ کے نیچے رگوں کی مائیت جمع ہو
جاتی ہے اور اس طرح باور کا، انڈا، قلمبر، سٹیل پر پڑ پڑے آبلے (نفاحات) نکل آتے
ہیں۔ مثلاً شیشیا پر انگوئے سے رگڑنے پر بشیرہ کا ترہا۔ ان سے علاحدہ ہو جاتی ہے
اور ایک ٹوٹتا ہوا تار بن کر رہ جاتا ہے۔ ————— (ان کی اولاد) کبھی اربابیت آگ سے جلے پھپھولوں
کی طرح ہوتی ہے۔ ————— بعض اوقات ان آبوں (پھپھولوں) میں مائیت کی بجائے
سرخ ہوا یا سفید ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان کو نفاحات (Rupia) کہا جاتا ہے۔

نقاط

نقاط مزیدی

زقار لرحام

نفاطه منسرمون طبعیه

نفاطہ حادثہ انفرانیہ

نقاط حاصله و تفلیس

انقاط حاد منفرد

(۱۰) قیاد بنیم

(۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

(۵، ۶)

(۱۰) انصاف و انانیت: در دین و دنیا

(۷۵) ذائقہ منہ سے آتی ہے، کان سے آتی ہے،

(اللائق) بعضا شربا، ثم كرم، ثم مال، مستأجر.

(۱۲) تا علوم انسانی

علامہ

-: 56

(جراثیمیں)، جو ششہ (تھوڑا) وجہ سے خیندن بنار ہوتا ہے (۱) کے بعد سطح اند
نابز (پر گول، نکلی: رخ) کے چھوٹے چھوٹے دے نمودار دیتے ہیں، کچھ مہر تہا اور وہ
ششہ: اپنے دار ہوتا ہے اور ان میں رطوبت مانیہ بھر جاتی ہے یہ (۲) کچھ عمارت
الہ (۳) اور بھی نہایت کھنڈے سے پیر (۴) ان کے (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲

نظامہ ماد منفرد:-

یہ صورت، سید، نوگوا میں، کتب خانوں سے بہت زیادہ پیرایہ اور صرف مایا، ہی

(منفرد) آبلہ نکلتا ہے، اور اس میں وہ تمام کی نیا، وجود، دوتا، ہیں جو حادثے (نموہ) بیا، میں مذکور ہوتی ہیں،

نقاطہ حادث طفلیہ:-

یہ صورت بچوں (اطفال) میں کثیرا لوقوع ہے، چنانچہ ان کے ہاتھ پیروں میں آبلہ نکلتا آتے ہیں، آبلے خراب ہو کر قرصہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ان پر عام طور سے یہاں مکرناڑ جم جاتی ہے،

نقاطہ حادث غائثرانیہ:-

اس نوع میں آبلوں میں غائثرانی کیفیت (تعفن و تامل و غیرہ) پیدا ہو جاتی ہے، اور مریض لاغر اور نحیف ہو کر ہلاک بھی ہو سکتا ہے،

مزمن:-

یہ عام طور سے حادث کے نتیجہ کے طور پر رونما ہوتی ہے، یا ابتداء ہی سے خفیف نوعیت کی ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا، آبلوں میں شدید بخیر ہوتا ہوتی، ان کی جڑ میں سرخ سا حلقہ دکھائی دیتا ہے،

نقاطہ مزمن طبقبہ:-

اس نوع میں ابتداء میں سینہ پر ایک آبلہ نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اطراف میں بکثرت آبلے نکل کر ایک حلقہ سا بنا لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے تمام جسم پر پھیل جاتے ہیں، ان میں تیزی سے نکلنے اور مرجھانے کا عمل جاری رہتا ہے، مزمن کے جسم سے ایک مخصوص بو آتی رہتی ہے، ————— ملحوظ رہے کہ سن رسیدہ لوگوں اور خیر فوارا لاغروں میں یہ نوع مہلک بھی ہو سکتی ہے،

بہر حال نقاطہ کی ان جملہ انواع میں کردیات بیفار ----- اور اسنڈل میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، حمہ الدم (ہیموگلوبین) میں نمایاں کمی پیدا ہو جاتی ہے

ای۔ ایس۔ آر۔ بڑھا ہو جاتا ہے،

اصول علاج

- غلیانی خون کو خارج کرنے کے لیے فصد کھولیں
- منصفیات صفراء کے بعد مسہلات بارده سے تنقیہ کرائیں
- مطقیات و مصفیات استعمال کرائیں / منغلطات خون استعمال کرائیں،
- مجففات اور مدملات بھی حسب ضرورت استعمال کرائیں
- معالجہ کے وقت استمالی نقص پر خصوصی توجہ دیں

علاج

- خلط غالب کی رعایت سے فصد کھولیں
- صفراء کا منفع و مسہل و تبرید استعمال کرائیں۔ نسخہ ذیل ہے

نسخہ منفع صفراء :-

گل بنفشہ، گل سرخ، شاہترہ، تخم خلمی، غلب الثعلب، تخم کاسنی، نیکوفہ، ہر ایک ۲۵ گرام، گل نیلوفرہ گرام، عنب، آلو بخارا، ہر ایک ۵ عدد، تمام دواؤں کورات کے وقت گرم پانی میں جگودیں اور صبح کو مل، چھان کر گلقدار آفتابی زخمیرہ بنفشہ ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں، یہ نسخہ ۳۰ دن استعمال کرائیں، اس کے بعد درج ذیل نسخہ مسہل نوش کرائیں،

نسخہ مسہل صفراء :-

مذکورہ بالا نسخہ منفع تیار کریں صرف گلقدار کی مقدار میں اضافہ کر دیں، یعنی ۲۵ گرام کی بجائے ۵۰ گرام کر دیں، اس کے بعد مغز فلوس خیار شبزہ ۸ گرام، تمر بنجین خراسانی، تمر ہندی مقشّر، ہر ایک ۳۰ گرام، تمام دواؤں کورات کے وقت

پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل جھان کر مذکورہ بالا نسخہ منفع میں ملائیں اور شیرہ مغز یا دام شیریں ۵ عدد نکال کر حل کر کے نوش کرائیں، اگر پیاس محسوس ہو لو پانی کی بجائے عرق کور اور عرق کاسنی، تھوڑا تھوڑا پلائیں، دوسرے دن درج ذیل نسخہ تیرید استعمال کرائیں،

نسخہ تیرید:-

عقاب بہداز ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپتول مسلم ۶ گرام چھڑکی کر نوش کرائیں، بعض اطباء درج ذیل نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

عقاب بہداز ۳ گرام، شیرہ عتاب ۵ عدد، عرق شاہترہ، عرق کور، ہر ایک ۶ ملی لیٹر میں نکال کر شربت تیلوفرہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں

○ مصفی خون کے طور پر یہ نسخے بروئے کار لائیں
برگ شاہترہ ۵۰ گرام، گل نیلوفر، گل سرخ، کمر، برادہ شیشم، برادہ آبنوس، ہر ایک ۲۵۰ گرام، صندل سفید، تخم کاسنی، تخم بادرنجبویہ، فیتمون، عناب ولایتی، ہر ایک ۱۲۵ گرام، تمام دواؤں کو ۱۳ ملی لیٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو ۵ لیٹر عرق کشید کریں اور ۱۲۰ ملی لیٹر، صبح کے وقت نوش کرائیں۔

چوب چینی، برگ شیشم، ہر ایک ۳۵ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابل، عناب، ہر ایک ۶۰ گرام، برگ سنار کی ۳۸ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر چھان لیں اور ترنجبین، شیرخشت، شکر، ہر ایک ۴۵ گرام ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور ۵ ملی لیٹر، ہمراہ آب تازہ، صبح کے وقت نوش کرائیں،

○ غلظت پیدا کرنے کے لیے بکری کے سرے پائے کھلائیں
○ اگر آپ بڑے ہو کر رہ جائیں تو مطہر سوئی سے ان کو پھوڑ کر پانی خارج کر دیں اس کے بعد یہ مرہم اندمال کی غرض سے استعمال کرائیں
سفیدہ کاشغری، موم سفید، ہر ایک ۷ گرام، روغن گل ۳۵ ملی لیٹر، پہلے موم

اور روغن کو پگھلا کر ملائیں اس کے بعد سفیدہ ڈال کر خوب گھونٹیں اور آبلوں پر لگائیں /
مردار سنگ کو عرق گلاب اور آب مورد میں حل کر کے لگائیں ،
بعض اہل ہر یہ نسخہ مفید تصور کرتے ہیں

کیلد ، سفیدہ کا شغری ، سیندور ، مردار سنگ ، ہر ایک ۳ گرام ، _____
تمام دواؤں کو باریک پیس کر موم سفیدہ ۱۲ گرام ، روغن زرد ۲۵ ملی لیٹر میں پگھلا کر سفوف
شدہ دوائیں ملائیں اور مرہم کی طرح بنا کر آبلوں پر لگائیں ۔
محض کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں

انزروت ، صبر ، کندر ، زنگار ، سفیدہ کا شغری ، ہموزن ، _____ گل ارمی ہوزن
جملہ ادویہ ، _____ تمام دواؤں کو باریک پیس کر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت
سرکہ اور پانی میں حل کر کے آبلہ پر لگائیں ،
مردار سنگ کو کھرو ، ہموزن ، باریک پیس کر سرکہ ، روغن مورد میں حل کر کے اُبلے
پر لگائیں ۔

○ _____ خارجی طور پر یہ نسخہ بھی مفید اور مجرب ہیں ،
عس مقشر ، مندل حسب ضرورت کو سرکہ میں پیس کر آبلوں پر ضاد کریں ،
خودنی نمک (نمک طعام) سرکہ میں حل کر کے لگائیں ،
برگ نیم / برگ حنا پیس کر آبلوں پر ضاد کریں ،
پوست انار ، سرکہ میں پیس کر ضاد کریں ،

_____ مرہم داخلون لگائیں ، _____ نسخہ درج ذیل ہے ،
تم خطمی ، تم سو ، تم کناں ، اسپنول ، تخم حلبہ ، ہر ایک ۲۵ گرام ، مردار سنگ ۵۰ گرام ،
روغن زیتون کہنہ / روغن کبند ۵۰ ملی لیٹر ، _____ پہلی پانچ دواؤں کو رات کے وقت
پانی میں بھگو دیں اور صبح کو لعاب نکال کر محفوظ کر لیں ، _____ مردار سنگ کو ہر ایک
پیس کر روغن زیتون میں ملائیں اور آگ پر رکھ کر لکڑی وغیرہ سے چلاتے رہیں ، _____
_____ پھر اتار کر روغن کے کسی قدر سرد ہو جانے پر لعاب ڈالیں اور دوبارہ آگ
پر پکائیں ، جب صرف روغن باقی رہ جائے تو چھان کر محفوظ کر لیں اور آب برگ مکور ،
آب برگ کاسنی ، سفیدی بقیقہ مرغ اور روغن گل ، حسب دستور ملا کر لگائیں ، _____

صرف مرہم بھی استعمال کرا سکتے ہیں،

○ ————— استوائی نقص کے ازالہ پر پوری توجہ دیں،

ضعف ہضم ہو تو اس کے ازالہ اور تقویت معادہ کی تدابیر کریں، اس مقصد کے لیے یہ نسخہ جوارش مفید ہے،

سنبل الطیب، ہیل خورد، سیلیم، دارچینی، قرنفل، سعد کونی، زنجبیل، قفل سیاہ،
 قفل دراز، خود بلساں، اسارون، تخم مورد، قسط شیریں، خولنجان، چڑا سیہ شیریں، زعفران،
 ہر ایک ۲۰ گرام، مصطلکی ۵۰ گرام، ————— زعفران کو عرق گلاب / عرق بادیان میں
 سخی کریں، مصطلکی کو علاحدہ سے باریک کریں اور باقی تمام دواؤں کو ایک ساتھ کوٹ
 پیس لیں اور شکر تین گنا / شہد دو گنا کے قوام میں حسب دستور ملا کر جوارش بنائیں اور
 بعد از طعام ۴ - ۱۰ گرام کھلائیں، ————— اور اس کے بعد یہ نسخہ استعمال
 کرائیں،

شیرہ بادیان، گرام، شیر تخم کشوٹ ۵ گرام، شیرہ مویز منقہ ۹ عدد، پانی میں
 نکال کر گلقدہ ۵۰ گرام ملا کر استعمال کرائیں،
 ○ ————— اگر بظاہر کوئی سبب نہ دریافت ہو سکے تو یہ نسخہ اسی طرح

معدل صفراء نسخہ استعمال کرائیں،

لعاب بہدازہ، شیرہ منغر تخم کدو شیریں، شیرہ تخم کاہو مقشر، ہر ایک ۳ گرام،
 شیرہ عناب ۵ عدد، پانی میں نکال کر شربت عناب ۲۵ ملیٹر ملا کر نوش کرائیں،




حمرۃ جلد*

ERYTHEMA

اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور اس پر کسی قدر بلند دھبے یا چٹاخ پڑ جاتے ہیں جی میں سوزش کے ساتھ درد بھی ہو سکتا ہے، ————— یہ مرض عام طور سے مزمن نوعیت کا ہوتا ہے،

اقسام



اسباب

(I) گرمی / تیز دھوپ / تیز گرم ہوا (لو)

* جلد کا سرخ ہونا، احمرار جلد (Erythrodermia) وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں،

- (II) گمردو بخار
(III) خراش آورماده کا جلد
(IV) اعضا کی باہم رگڑ
(V) سورہمضمزمن
(VI) بعض جمی
(VII) سوزشی امراض
(VIII) استسقاہ
(IX) ادویات — خلاً

- (I) پارہ
(II) کونین
(III) بیلا ڈوتا
(IV) اقیون
(V) کلورل
(VI) کاک ایسڈ — وغیرہ

علامات

عام طور پر جلد خشک ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، یا صلح جلد سے کسی قدر بلند، سرخ و دھبہ/چٹاخ پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سوزش اور درد ہوتا ہے، ابتدائی التہابی علامات (سرخ، سوزش اور درد) کے ساتھ بعض اوقات ان دھبوں سے بھوسہ جھرتی ہے، اور کبھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ————— مرض کی ابتدا، اس میں ثانوی علامت کے طور پر احقر، شکنجہ، کرب اور خفیف بخار وغیرہ رونما ہوتا ہے۔ —————
—————
تحت الحاد صورت شرایہوں اور مزمن امراض کلیہ کے شکار لوگوں میں کثیرا لوقوع ہے، اس میں لاغری، اسہال اور بخار بھی ہو سکتا ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ —————
————— مزمن صورت میں سرخی کے ساتھ جلد سے بھوسہ بھی جھرتی ہے، جسم کے

خواتین حصوں میں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، اور پھر یہ خشک ہو کر چھلکے/جھوسی کی شکل میں آتے رہتے ہیں، شدید حالات میں ان چھلکوں سے بستر اٹ جاتا ہے، عام طور سے جلد خشک، اور گرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات بکثرت پسینہ آنے لگتا ہے جس سے غیر متوازن ہوتا ہے اور تقابلاً محسوس ہوتی ہے، ذہنی حالت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، خارجہ نام طور سے نہیں ہوتی، لیکن بعض مریضوں میں غیر معمولی طور پر دیکھی گئی ہے اور انجام — موصوفیہ التهاب (Cellulitis) (التهاب، شععی) (Bronchitis) اور ذات الماریہ وغیرہ آتا ہے۔

اصول علاج

- حرارت خارجی کی صورت میں محض تعدیل مزاج کافی ہے،
- مرطبات و مسکنات استعمال کریں،
- سبب کی تعیین نہ ہو سکے کی صورت میں خفیف مسہل
- استعمال کریں،
- مہذبات خون نوش کریں،

علاج

- خارجی حرارت کی صورت میں تازہ مکھن یا روغن بادام صہ پر ملیں،
- خفیف مسہل استعمال کریں
- عرق مصفی خواجہ (یا سانی — ہمدرد) میں شربت عناب ۱۲ ملی لیٹر
- مل کر نوش کریں،
- توتیا سبز ۲ سرخ عرق کلاب ۱۵۰ ملی لیٹر میں ملا کر کپڑا کر کے
- متاثرہ حصوں پر رکھیں،
- مردار سنگ، کافور، ہر ایک ۱۲ گرام، روغن گل، شمع کلیہ ہر
- (بکڑے گڑھ کی تہذیب) ہر ایک ۲۸ گرام / ملی لیٹر، موم سفید ۲۵ گرام،
- ابتداءً مردار سنگ اور کافور کو پس کر رکھ لیں پھر چربی اور موم کو روغن گل میں

پگھلائیں اور اس کے بعد وہ سفوف اس میں پھرا جی طرح ملائیں سرد کر کے محفوظ کر لیں
اور متاثرہ عضو پر لگائیں،

○ ————— مصفی کے طور پر یہ نسخہ بھی مستعمل ہے،

چمرائے، شاہترہ، منڈی، برادہ صندل، ہر ایک ۵ گرام، آلو بخارا، عناب، ہر ایک
۷ عدد، مغز تخم کدو شیریں نیکوب ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کا جو شاندرہ حاصل کر کے
شربت عناب ۱۲ ملی لیٹر کے ساتھ نوش کرائیں۔

— ○ —

Learn Unani By Abdul Waris Sahman

علامات

متاثرہ سطح جلد نسبتاً نمایاں ہوتی ہے، اور عام طور پر جلد کے طبعی رنگ میں فرق بھی آجاتا ہے، ————— ضربہ اور منقطع کی صورت میں اس کی سرگزشت ملتی ہے، غلبہ خلط ردی کی صورت میں اس کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں، ————— جراثیمی تعدیہ کی صورت میں جلد کا خوردبینی امتحان اس کی توثیق کرتا ہے، غذائی بیش حساسیت کی صورت میں ذرا سا غور و خوض اس مخصوص غذا کی نشاندہی کر دیتا ہے، ————— محمد اور سسی ادویہ کی صورت میں ان کی سرگزشت پائی جاتی ہے اور حمرة الجلد (Erythema) آبلہ اور شری وغیرہ علامات رونما ہوتی ہیں اسی کے ساتھ التهاب جلدی ہوتا ہے، ————— شعاع آفتابی کی صورت میں جلد میں شدید سرخی اور ورم ہوتا ہے، آبلے پھپھو نے، خارش اور درد محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد ان سے پھلکے جھرتے ہیں، اور بعد میں جلد کا رنگ غیر طبعی ہو جاتا ہے، ————— وراثت کی صورت میں عام طور سے (حاد صورت کے علاوہ) بغیر درد کے ورم ہوتا ہے، جو ایک یا دو زیریں اطراف تک ہی محدود رہتا ہے، جس کی بالائی حدود دفعتاً گھٹنے، ٹخنے یا کچھ ران پر ختم ہو جاتی ہے،

التهاب جلد کی ایک مشہور اور کثیر الوقوع قسم کی التهاب جلد دہنی Seborrhoeic Dermatitis) یہ صورت عام طور سے سر میں پیش آتی ہے، جس سے سر کے بال گرنے لگتے ہیں اور خارش محسوس ہوتی ہے، دہنی غد کے آس پاس، چھوٹے، سرخ اور نرم دانے نمودار ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے التهابی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ دانے آپس میں مل کر گول یا بیضوی رقبے بناتے ہیں، جن کا درمیانی حصہ کسی قدر ابھرا ہوا، کٹا ہوا ڈھلواں ہوتا ہے، اور زرد پچکے نظر آتے ہیں، جب ان میں تقشر شروع ہوتا ہے تو ان کے نیچے خفیف رطوبت جھلکتی نظر آتی ہے، ————— یہ التهابی کیفیت چہرہ، سینہ اور پشت میں رونما ہو سکتی ہے۔

اصول علاج

○ ————— مصفیات خون استعمال کرائیں۔

- _____ خلط کی رعایت سے فصد کھولیں،
- _____ رفع قبض کریں،
- _____ مسکنات درد و خارش دیں،

علاج

- _____ بیش مدبر ۲، سنکیما سفید ۱، کات سفید ۲۵ گرام،
تینوں دواؤں کو خوب اچھی طرح کھل کریں اور اس کی ۳۲ جوہ ہمارا آب ادک /
شہد بنائیں اور ایک حب (گولی) ہمراہ شربت حناب و عرق شاہترہ، صبح، شام استعمال کرائیں
- _____ شاہترہ، چرائتہ، ہر ایک ۵ گرام، سرچھوک، منڈی، ہر ایک
۳۵ گرام، برگ جھاڑ، عشبہ مغربی، ہر ایک ۵/۳۵ گرام، ہلہ سیاہ، ۵/۵۵ گرام،
تمام دواؤں کو نیم گرم پانی میں بھگو کر، صبح کرمل چھان کر نوش کرائیں،
- _____ جو بیجینی، سورنجان، ہر ایک ۳ گرام کو پانی میں جوش دے کر
مل چھان کر صافی (ہمدرد) ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے شام کو نوش کرائیں،
- _____ شیرہ بادیان ۶ گرام، شیرہ موہر منقہ ۹ دانہ، گلقد ۳۶ گرام،
میں ملا کر صبح کو کھلائیں
- _____ مہجون چوب چینی ۶ گرام، ہمراہ عرق چوب چینی ۶ ملی لیٹر رات میں
استعمال کرائیں،
- _____ شیرہ مغز بادام شیریں ۵ دانہ، شیرہ مغز کدو شیریں ۳ گرام،
شیرہ تخم کاہو، شیرہ تخم خشخاش، شیرہ کنجد سفید، ہر ایک ۳۰۲ گرام، گائے کے
دودھ میں نکال کر صبح کو نوش کرائیں،
- _____ کیلا مصفی ۳ گرام ہمراہ شیر گاؤ، شام / رات میں استعمال کرائیں،
- _____ مہجون مصفی خاص (ہمدرد) ۶ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں،



تقشر جلد

PSORIASIS


اس مرض میں جسم میں گلگانی / سرخ رنگ کے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا کنارہ کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے اور ان دھبوں پر تہہ بہ تہہ خشک قشور (پھلکے) جمے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کی ظاہری سطح صدف (سیب) / سمک (مچھلی) کی طرح کھردری ہو جاتی ہے، ان قشور کو آہستہ آہستہ کھرچنے سے سفید چمکدار صورت میں چھوٹتے ہیں، آخر میں مذکورہ بالا گلگانی / سرخ دھبہ نمودار ہوتا ہے، یہ دراصل بلند کا مرض من سوزشی، قشوری مرض ہے اور جسم کے ان حصوں پر خاص طور سے ہوتا ہے جہاں آفتابی شعاعیں براہ راست اثر انداز نہیں ہوتیں، چنانچہ کہنی اور گھٹنے اس میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، جسم کے ابھرے ہوئے حصوں اور اطراف کے بیرونی جانب میں زیادہ ہوتا ہے، ۱۵-۲۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے،

اقسام

* سیکہ، صدفیہ، چنبل، موتیا چنبل وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں (مولف)

نماہری شکل و صورت کے اعتبار سے

تلفظ جلد



اسباب

- (I) وجع المفاصل
- (II) انقرس
- (III) آتشک
- (IV) سودائے محترق
- (V) موزہ وغیرہ کی اذیت
- (VI) جسمانی کشاف
- (VII) سورہ ہضم
- (VIII) شراب نوشی
- (IX) جلد پر چوٹ لگنا
- (X) جذباتی تناؤ
- (XI) بعض مخصوص غذائیں / مونگ پھلی کا بکثرت استعمال
- (XII) فوق الادمی خلیات کی تکوین میں کوئی نقص
- (XIII) عروقی بے اعتدالی
- (XIV) حیاتیات کی کمی

چونکہ یہ مریض صرف، جلد تک ہی محدود رہتا ہے اس لیے اس سے ہلاکت نہیں ہوتی بلکہ مریض معمولی زندگی گزارتا ہے، تاہم معاشرہ میں اس کو لاپتہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ذیل میں اس کی بعض اقسام کی خصوصی علامات تحریر کی جا رہی ہیں،

(I) سورانی کس گٹے ٹا:۔

اس میں مرمی علامات خفیف ہوتی ہیں، شروع میں کھوٹی خارش ہوتی ہے، اس کے بعد جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے فاصلے سے نکلتے ہیں، ان دانوں کی نوک پر ایک چھوٹا سا چھلکا (قشر) ہوتا ہے، ان دانوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن ۲۱ - ۲۸ دن میں جھڑنے لگتے ہیں، اور ۳۲ - ۵۶ دن میں زائل ہو جاتے ہیں۔

(II) سوریائی مس اگری گیٹا:-

اس میں بزم پر بے شمار گول گول دانے / ابھار ہوتے ہیں، زیادتی کی وجہ سے گنجان ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں، اور ان سے چمکے اترتے رہتے ہیں، نیز تناسب کے ساتھ بہت جلد دوبارہ رونما ہوتے ہیں،

(III) سورانی کس ان ویٹ ریٹا:-

اول الذکر دونوں اقسام جب مزمن ہو جاتی ہیں اور ان میں جا بجا شقوق ہوتے ہیں تو ان سے مواد خارج ہوتا ہے،

(IV) سورانی کس لیری فارمس:-

اس میں دھبے گول گول اور متفرق طور پر ہوتے ہیں، یہ دھبے سطح جلد کے برابر ہوتے ہیں، کچھ عرصہ بعد ان کی سطح، جلد سے کسی قدر اونچی ہو جاتی ہے، یہ قسم نہایت ہیشیلی اور مزمن ہوتی ہے،

اصول علاج

○ خلط غالب کی رعایت سے منفعیات و مسہلات استعمال کرائیں،
○ ترطیب مزاج کریں / بار در طب و دغن سے جسم کی مالش کریں،

○ حمام کرائیں،
○ سور القینہ کی صورت میں اس کا علاج کریں،
○ رفع قبحن کریں،
○ مصیفات خون نوش کرائیں،
○ خلیہ خون کی صورت میں فصد کھولیں،

علاج

○ خردل، باجی، گندھک آٹھ سار ہوزن، تمام
دواؤں کو پیس کر دہی ۱۳۵ گرام، ملا کر ۳-۴ یوم، جسم میں ملیں،
○ برگ حنا سبز، برگ کیتھ سبز، برگ نار سبز ہوزن (۲۵ گرام)
تینوں کو پیس کر مردار سنگ، سفیدہ کاشغری، رسوت، ہر ایک ۳ گرام کو باریک

پیس کر مذکورہ برگوں پر چھڑک کر مقام ماؤف پر باندھیں،
○ مویزج، ترمس، قردمانا ہموزن، تینوں کو باریک پیس

کر سرکہ میں حل کر کے متاثرہ مقام پر ملا رکھیں۔
○ ریخ سوسن اُسمانجونی کو پیس کر شہد میں ملا کر جسم پر ملیں، اس کے
بعد جسم کو دھونے کی ہدایت کریں۔

○ دانہ اجوائن دیسی ۲۵ گرام کو شیر مدار ۲۵۰ ملی لیٹر میں کوٹ کر
چھوٹی چھوٹی اقراص بنائیں اور روغن کنجد ۱۲۵ ملی لیٹر میں پکائیں، جب اقراص جل کر سیاہ ہو جائیں
تو ان کو بھینک کر، روغن کو چھان کر متاثرہ عضو پر مالش کریں۔ ۳، ۲ گھنٹے بعد بیسن
کے ابلن کو جسم پر ملیں،

خود فی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

○ پوسٹ ہلیلہ زرد، پوسٹ ہلیلہ کابلی، ہر ایک ۱۲ گرام، پوسٹ ہلیلہ، اُملہ
منقی، ہر ایک ۶۰ گرام، شاہترہ ۵۵ گرام، ریوند چینی ۱۳ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان
کر روغن بادام سے چرب کر کے کشمش میں تیار کریں اور استعمال کرائیں، اس کے
بعد سم الفار، سیاب، ہر ایک ۳ گرام، کندہ ۸ گرام، ریوند چینی ۹ گرام، صمغ عربی، گرام، سیاب
کو آب ہیوں میں کھل کر کے باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر اس میں ملا کر مونگ کے دانہ
کے برابر حبوب بنائیں اور احب ہمراہ عرق مصفی خون صبح، شام بعد از غذا استعمال کرائیں،
○ شربت بنفشہ، تربخین، ہر ایک ۵، ۳ گرام، گرم پانی میں حل کر کے
روزانہ صبح کو نوش کرائیں، اس کے بعد تنقید بدن کریں، اس سلسلے میں یہ نسخہ مستعمل ہے،

○ بنفشہ خشک، ہلیلہ کابلی، ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، ہر ایک ۵، ۵ گرام، سنابلکی
۲۵، ۸ گرام، بسفاج، تربد خراشیدہ کوفہ، گل سرخ، نیلوفر، تخم کاسنی، اصل السوس مقشر کوفہ، ہر ایک
۵، ۸ گرام، اسطوخودوس ۱۲ گرام، مویزج منقی ۳۵ گرام، آلو بخارا، عتاب، پستان، ہر ایک ۲۰ عدد،
تمام دواؤں کو ۱۲۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب ۱۰۰ ملی لیٹر رہ جائے تو مغز فلوں
بخار بنز، تربخین، ہر ایک ۱۰۵ گرام ملا کر مل چھان کر نہار مسٹھ نوش کرائیں۔

۱۰. یام کے علاوہ طبیعت (شیر) پتھر اور

- مسکنات درد استعمال کریں،
- حسب ضرورت فوہر کھلیں،
- متقاضی طور پر عرق کلاب وغیرہ (توہا) کریں،
- مبرقات و مفریات استعمال کریں،

علاج

- شدید حالات میں فوہر کھلیں،
- عرق کلاب میں مردار سنگ، پتھر، متاثرہ عضو پر لگائیں،
- گل (رمنی) کو عرق کلاب میں ابولے لگائیں،
- روغن گل لگا کر اس پر گل ترش اور اس باریک کر کے چھڑکیں،
- مردار سنگ، ہلدی، سفیدہ قلعہ کو باریک کر کے روغن گل، موم اور سفیدی بیفہ مرغ کے ساتھ حسب دستور مرہم بنائیں اور لگائیں،
- روغن بنفشہ میں تھوڑا کافور ملا کر روف سے مردار کے متاثرہ مقام پر لگائیں،
- روغن حنا/حنا خاکستر، کیل وغیرہ سے تیار کردہ قیر واپیں،



تقشف جلد

ICHTHYOSIS OF SKIN

اس مرض میں جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس سے بھوسا بھڑکتی ہے جس کے نتیجہ میں جلد بد نما ہو جاتی ہے۔

اسباب

(I) سوداوی خلط کا غلبہ / رطوبات کا استزاق

(II) غلبہ بیہوست

(III) جسم پر کسی سخت چیز کا لگنا

علامات

جسم کی جلد خشک اور سخت ہو جاتی ہے، حدت کی صورت میں بیہوست کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے، اور اگر حدت نہ ہو تو خارش مفقود ہو جاتی ہے، تقشف کی صورت میں حدت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مادہ اپنی تیزی کی وجہ سے جلد میں فساد پیدا کر دیتا ہے، نتیجہ کے طور پر شدید خارش ہوتی ہے، جلد سے بھوسا اور بعض اوقات سفن (چھلکے) اترتے ہیں اور جلد خشک ہو کر سانپ کی کھال جیسی ہو جاتی ہے،

جلد کی خشکی، بھوسا اترنا

اصول علاج

- ————— منفیات و مسہلات و مبردات سودا، استعمال کریں۔
- ————— سرد و تر و غنیات کی مائش کریں،
- ————— حسب ضرورت قابضات استعمال کرائیں،

علاج

- ————— منفع و مسہل سودا، اور تبرید کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،
- نسخہ منفع سودا :-

پستان ۱۱ عدد، عتاب ولایتی ۵ عدد، گاؤ زبان، بادرنجبویہ، اصل السوس مقشر،
ہر ایک ۳ گرام، بلویان، شاہترہ، اسطوخودوس، ہر ایک ۲ گرام، پد سیان شاہ ۵ گرام،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر کلقتہ آفتابی / تربخین
خراسانی ۲ گرام، حل کر کے نوش کرائیں، جب نفع کی علامات رونما ہونے
لیں تو درج ذیل نسخہ مسہل سودا، استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل سودا :-

مذکورہ نسخہ منفع سودا، میں بسفاج مفتقی، اقیمون ولایتی سرہ بستہ، قصب الزیرہ،
لیلجات، قاریقون مغریل، تبرید، برگ سارکی، مغز فوس خیار شہر، شیرہ مغز بادام،
کا حسب دستور اضافہ کر کے نوش کرائیں، ہر مسہل کے بعد درج ذیل
نسخہ تبرید استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

آلمر بنی ۱ عدد گرم پانی میں دھو کر ورق نقرہ لپیٹ کر کھلائیں اوپر سے لعاب
گلاؤ زبان ۵ گرام پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت انار ۲.۵ ملی لیٹر سے شیریں کر کے

- تخم ریحاں ، گرام چھڑک کر نوش کرائیں ،
- ————— تنقیہ کے بعد مارا جیسی نوش کرائیں
- ————— حمام کرائیں اور اس کے بعد روغن بنفشہ ، روغن بادام شیریں ،
- روغن کدو وغیرہ کی جسم پر مالش کریں ،
- ————— روغن بنفشہ ، روغن کدو ، روغن مغز ساق کاؤ ، شحم بط ،
- شحم مرغ ، شحم بز ، موم سفید ، ————— تمام دواؤں سے حسب دستور لپیپ
- تیار کریں اور جسم پر لگائیں ۔
- ————— آرد مسور ، گل سرخ ، دونوں کو سرکہ میں جوش دے کر متاثر حصہ
- پر ملیں ۔



شقوق جلد اطراف و وجہ و شفت

CHAPPED HANDS

اس مرن میں تمام جسم، ہاتھ، پاؤں یا چہرہ کی جلد پھٹ جاتی ہے، جس سے شدید کاٹھن، دقتی ہے۔

اسباب

(I) داخلی/خارجی طور پر بیہوشی (خشکی) کی زیادتی

(II) سرد گرم ہوتا

(III) گرد و غبار

(IV) خراش اور اشیا کا جسم سے جھو جانا

(V) موسم سرما میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کو دھو کر خوب خشک نہ کرنا

(VI) کثرت برد و تھک جیس کی وجہ سے انجام اور کثافت پیدا ہو جائے،

(VII) فساد خون

(VIII) ایام حیض کا قریب ہونا

علامہ

ہاتھ، خصوصاً پاؤں کے تلوؤں اور ایڑی کی جلد پھٹ جاتی ہے، اور اس میں کھردرا پن پیدا ہو جاتا ہے، چلتے پھرنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے خون بھی نکلنے لگتا ہے، کبھی تو یہ مرن تمام جسم کی جلد کو گھیر لیتا ہے،

○ ————— ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰

C _____

(۱) ----- (روا: ضابطہ، مورخہ: ۲۰۱۷ء کوئٹہ اور خجاستان)

○ ————— خیر و نیکیا۔ اگلے۔ یہ مرنے والے وقتاں میں۔

○ ————— فردا (خواہم) سورہ نیا میرا طعنہ ہے، متعجب! کہ میں نے

○ ————— جیسا کہ ایام کے قریب، ونے کم درجہ سے یہ مہینہ، دوسرے
دو ماہ کے درمیان تمام کر لیا، اور دونوں ادا قیم / غرقہ انداز / مابینہ کے فساد کشو لیا،
اور درجہ جیسا، دوا بنو، معتبرا کر لیا،

○ **تقدیر، مزاج کے لیے یہ انہماک متلازمین ہیں،**

نسخہ:

اعلیٰ بہدانہ گرام، عرق خانہ، مہاراجہ جی کے دربار میں، ۱۰ ستمبر ۱۹۲۷ء کو فرمایا گیا ہے۔

۱۔ دو درجہ ہذا کے المونونہکرائیں اور آہستہ آہستہ

ان دونوں کا وزن بڑھائیں
○ ————— سخت چیزوں کے لگنے سے شقاق، ناراضہ، دوا، دقویہ، خزانہ، ۱۱
کرائیں،

نسخہ :-

برگ حنا، شاخ بلوط، گلنار، پوست اتار، جودہ السرو، نیمہ دو داؤ،
کو کوٹ کر سرکہ میں جوش دے کر خاد کریں۔

○ ————— شقوق جلد میں درج ذیل نسخہ جانتے، ۱۱ استعمال کرائیں،
○ ————— کچھ، بنفشہ کو باریک پیس کر کسی مناسب روغن میں ملا کر
لگائیں،

○ ————— سرطان کو روغن کچھ میں اس قدر پکائی کر دو، تاہا، ۱۱ تو
چھان کر موم ملا کر مقام مرض پر لگائیں،

○ ————— روغن جلبہ ۲۵ ملی لیٹر، موم خام، ۱۱ گرام،
دواؤں کو ملا کر پگھلائیں اور لگائیں،

○ ————— آب برگ انجیر سبز، روغن زیتون، موم خام،
کو حسب دستور ملا کر لگائیں،

○ ————— بیگن (دھت پریک کر زرد شدہ) کو روغن کٹا، ۱۱ میں،
جب گل جائے تو روغن کو چھان کر اس میں کسی قدر موم ملا کر لگائیں،

○ ————— روغن کچھ ۶۰ ملی لیٹر میں موم ۱۱ گرام پگھلائیں،
جائے تو شکر سفید رومی ۶ گرام باریک پیس کر ملائیں، اور مقام مرض پر لگائیں،

○ ————— مغز ساق گاؤ، سخم، روغن بنفشہ، مردار رنگ سے تیار کردہ
مرہم استعمال کرائیں،

○ ————— تصفیہ خون کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ :-

شاہترہ ۵ گرام، چرانتہ، عشبہ مغربی، ہر ایک ۳ گرام، سرچوکہ، منڈی، برگ جھاؤ،
گل سرخ، ہر ایک ۴ گرام، ہلیہ سیاہ ۲۵ گرام، عناب ۵ عدد، تمام دواؤں
کورات میں پانی میں بھگوئیں اور صبح کو جوش دے کر مل پھان کر نوش کرائیں،
اسی مقصد سے یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں،

نسخہ :-

رسوت، چاکسو، نرپور، کات سفید ہوزن، تمام دواؤں کو جوش
دے کر صبح کو نوش کرائیں،
○ منفیات و مسہلات سودا کی غرض سے نقشہ جلد میں مذکور نسخہ
استعمال کرائیں۔



تشیح جلد راس

اس مرض میں سر کی جلد میں تشیح واقع ہوتا ہے، ————— گرم و خشک مزاج
لوگوں اور دھوپ میں رہنے والوں میں یہ مرض کثیر الوقوع ہے،

اسباب

- (I) غیر معمولی بیہوشی
- (II) سورج کی تمازت میں کام کرتے رہنا
- (III) گرم و خشک دواؤں / غذاؤں کا بکثرت استعمال
- (IV) کثرت استفرغ
- (V) آب شور میں عرصہ تک رہنا

علامات

سر کی جلد متشیخ (اینٹھ) ہو کر کچھ اس طرح ہو جاتی ہے گویا نہر سی بن گئی ہے،
اس کے ساتھ غلبہ بیہوشی یا استفرغ کی دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہیں،

اصول علاج

- ————— مرطبات استعمال کرائیں
- ————— استفرغ کی روک تھام کریں / سورج کی تمازت سے تحفظ

کی تدابیر کریں۔

- مناسب ادویہ اور روغن ناک، پیچائیہ،
- تھوہ سہا تہیرا کرنے والے تیزاویہ اور دوائیہ بند کرادیں،

علاج

○ تیزاویہ جہنم سے لے کر ۱۰ سالہ دودھ ۲ لٹریں کھائے۔ اچھے

شریت بنفشہ، تربتیہ، برک (۱۰۰) لٹریں / عام نوش کرانیہ،
شریت نیلوفر، شربت خنڈا، شربت بنفشہ، تم ترنہ / تم خیرہ، شربت کرکوش

کرائیں،

- خیرہ، خوں بہار، تیزاویہ، تیزاویہ، کرانیہ،
- روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن ادا، روغن اڈالیہ،
- بنفشہ، خنڈا، کواریہ، لکڑی، لکڑی، لکڑی، لکڑی،
- دودھ کو، روغن اڈالیہ،

بنفشہ، نیلوفر، تم خنڈا، کواریہ، لکڑی، لکڑی، لکڑی، لکڑی،
موم کو، روغن بنفشہ، لکڑی، لکڑی، لکڑی، لکڑی،
روغن بنفشہ، روغن نیلوفر اور عورت دودھ سے، لکڑی، لکڑی،
آب کا، آ، کدو، روغن، روغن اڈالیہ،

○

سفاقلوس

SPHACELUS

۱۱) رزیدہ مادہ کی خرابی کی وجہ سے عروق و شریانیں دب جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا مستند نہ ہو جاتا ہے اور غلہ کی حرارت غیر رزیدہ فنا اور مردہ ہو جاتی ہے، وہ (۱) کے خون میں غلہ کو پیلا کر دیتا ہے جس سے یہ پڑ جاتا ہے، کچھ غیر رزیدہ مستند بہرہ امتحان ہوتا ہے، ہوتا ہے، جس سے بالکل ناکار ہو جاتی ہے اور کسی بھی طور پر اسے رزیدہ نہیں کیا جاسکتا،

۱۲) رزیدہ

(۱) رزیدہ - غیر رزیدہ مادہ
(۲) رزیدہ اور ام مادہ، / غلہ کا اور بھی بگڑ جاتا

علامہ

غیر رزیدہ مادہ کا درجہ ہوتا ہے، جس میں شدید درد اور سوزش ہوتی ہے،
دیر - دیر - وہاں ہاگوشٹ کھنکھاتا ہے، مقام حس باطل ہو جاتی ہے اور وہ عضو مردہ
ہو جاتا ہے، یہ (۱) ہوتا ہے، گوشت کھنکھانے کے بعد (۲) کی ٹہنی بھی مردہ ہو جاتی ہے،
مریض کے جسم میں شدید رزیدہ ہوتا ہے، بخار بھرا رزیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، رزیدہ رزیدہ مریض لائے
اور کزور ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- پچھن لگائیں
- مانع عفونت دوائیں استعمال کرائیں
- نفع کے آثار ظاہر ہوں تو مغزات استعمال کرائیں
- محلات اور مرخیات استعمال کرائیں
- شدید صورتوں میں عملیہ کریں

علاج

- ورم پر گہرا پچھنا لگا کر ردی مواد اور خون خارج کریں اس کے بعد نمک کے محلول کا نطول کریں۔
- اخراج خون کے بعد ارد کر سنہ، عرق گلاب، سنگبین سادہ میں ملا کر لگائیں۔
- مانع عفونت ہے،
- یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں،
- گل ارمنی، سازدوسبز، شبیدمانی، تینوں کو باریک
- پس کر شہد میں ملا کر لگائیں
- محلل کے طور پر، فلتونی کے ذیل میں بیان کردہ محلل دوائیں استعمال کرائیں،
- اگر وہاں کی حس زائل ہو جائے تو عملیہ کے ذریعہ متاثر
- عضو کو کاٹ دیں، عضو کے کاٹنے سے قبل ورم کے چاروں طرف عمل کئی کریں،۔
- کاٹنے کے بعد زخم بھرنے والے مرہم لگائیں، اس مقصد کے تحت
- یہ نسخہ مفید ہیں،
- گندہ بہروزہ، مرصافی، جاوشیر، زنگار، ہر ایک، گرام، زرداوند طویل،
- کندر، ہر ایک ۵/۱۰ گرام، مردار سنگ ۱۴ گرام، اشق ۲۵ گرام، مقل اذرق ۱۱ گرام،
- موم سفید، رال، ہر ایک ۵ گرام، خشک اشیاء کو باریک کر کے گوندا اور

موم میں پکائیں اور اس کے بعد روغن زیتون (حسب ضرورت) ملا کر مرہم بنائیں اور لگائیں۔
 مردار سنگ، زرد چوب، ہر ایک ۳۵ گرام دونوں کو باریک کر کے موم سفیدہ، گرام،
 روغن ۲۰ ملی لیٹر میں ملا کر تھوڑا پانی ڈال کر پکائیں، جب پانی اڑ جائے تو اتار کر محفوظ کر لیں
 اور حسب ضرورت استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

۴۹

اسرہ

CREASE

۱۲) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۱۳) آئیہ، آئیہ، آئیہ، آئیہ۔ ۱۴) انڈیا پہلے انڈیا پہلے
 ہے۔ ۱۵) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۱۶) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔

اسبار

۱۷) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۱۸) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۱۹) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔

علامات

پیشانی، شکر، اور دہانہ پہ۔ ۲۰) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۲۱) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۲۲) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔

اصول علاج

○ — — — — — رکات تیسہ کم

۴۹ اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۰) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۱) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۲) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔
 اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۳) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۴) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۵) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔
 ۵۶) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۷) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۸) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔ ۵۹) اسرہ سے پہلے انڈیا پہ خط لکھا۔

- حسب ضرورت فصد کھولیں،
○ — تفنید، آہرن اور حمام وغیرہ کرائیں
○ — تنقید کے بعد مناسب روغن/قیر و ملی وغیرہ لگائیں

علائق

○ — تنقید کا روغن سے یہ نسخہ استعمال کرائیں
تبریز، کشیز، خشک، ہر ایک ۵۰ گرام، پوست ہلیلہ کالی، پوست ہلیلہ زرد،
پوست ہلیلہ سیاہ، گلاب، بنفش، مقویا مشدود، ہر ایک ۲۵ گرام، طباشیر، آملہ، پوست ہلیلہ،
گلاب، زعفران، زعفران، ہر ایک ۱۰ گرام، کینڑا، سندھ، سفید، ہر ایک ۵۰ گرام،
نہام دواؤں کو کوکوتہ، روغن بادام شیریں ۸، ملی لیٹر میں چرب کر کے رکھ لیں، عتاب،
چیتا، ہر ایک ۱۰۰ عدد، گل بنفشہ ۲۵ گرام، کوکوتہ پانی میں جوش دیں جب ایک لیٹر
باقی رہے، رست تو ۱۲ چھان کر شہد ۳۰۰ گرام، شیرہ مربی ہڑ ۱۲۵ گرام، اس میں ملا کر قوام
تیار کریں اور چرب شدہ دوائیں ملا کر طریقہ عمل تیار کریں، رات کو سوتے وقت ۶ گرام ہمراہ
آب آئینہ استعمال کرائیں،

پوست ہلیلہ کالی، پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، آملہ مقشر، گل سرخ، اسطوخودوس،
ہر ایک ۱۰ گرام، کشیز مقشر، تربخین ۸۰ گرام، — تمام دواؤں کو باریک پیس
کر چھان لیں اور روغن بادام ۲۵ ملی لیٹر میں چرب کریں، اس کے بعد شکر ۲۵۰ گرام اور تربخین
۲۰ گرام ملا کر حسب دستور طریقہ عمل تیار کریں، اور ۱۰ گرام ہمراہ عرق کاؤزبان/آب
آئینہ استعمال کرائیں،

پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کالی، پوست ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ، آملہ منقہ،
ہر ایک ۲۰ گرام، — تمام دواؤں کو کوکوتہ چھان کر روغن بادام شیریں ۱۰۰ ملی لیٹر
میں چرب کر کے رکھ لیں اور برگ سنار کی، مصطلکی رومی، تربد سفید، بسفانج، اسطوخودوس،
افتیحون، ولایت، کشمش، موینہ منقہ، ہر ایک ۲۵ گرام، — مصطلکی کو علاحدہ کھل
کریں اور باقی دواؤں کو کوکوتہ چھان کر شکر ایک کلو گرام کے قوام میں ملا کر حسب دستور
اطریقہ عمل، بائیو، اور صبح کو زہار مسخ اور شام کو سوتے وقت ۱۲ گرام ہمراہ عرق بادیان/

آب تازہ استعمال کرائیں،

تنقید کے لیے بعض اطباء حب ایارج استعمال کرتے ہیں، نسخہ درج ذیل ہے،
ایارج فقرا، تربد، ہر ایک ۹ گرام، حب البیل، انیسون، غاریقون، ہر ایک ۵ گرام،
نمک سانجھ، شحم خنظل ہر ایک ۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق بادیان،
کی مدد سے دانہ مونگ کے برابر حبوب بنائیں اور رات کے پچھلے پہر ۳ - ۸ حبوب ورق نقرہ
میں پیٹ کر عرق گاؤ زبان / عرق بادیان کے ساتھ کھلائیں اور مرلین کو سونے کی ہدایت
کریں، بیدار ہونے کے بعد درج ذیل نسخہ منضج استعمال کرائیں،

نیخ کاسنی، بادیان، گل بنفشہ، ہر ایک ۵ گرام، اسطوخودوس، گاؤ زبان، ہر ایک
۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو
مل چھان کر گل قند ۵۰ گرام نیمبرہ بنفشہ ۵۴ گرام، شکر سرخ ۵۰ گرام حل کر کے دوبارہ مل چھان
کر نوش کرائیں، ————— مسبل کے طور پر اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کا اضافہ
کریں،

سنار کلی، گرام، مغز بادام شیریں ۵ عدد۔ پانی میں پیس کر ملائیں،
○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

موم، روغن بنفشہ، روغن کدو کی قیروطی بنا کر لگائیں،
زوفار طب اور سفیدی بیضہ مرغ کو باہم ملا کر طلا کریں،
لعاب خطمی سے سر کو دھوئیں۔
روغن گل لگائیں،

روغن موم، روغن بنفشہ، کدو کا پانی (گرم رکھ میں دبا کر حاصل کریں) اور اس
میں ملا کر خوب مل کریں اس کے بعد زوفار طب، سفیدی بیضہ مرغ قلیل مقدار میں ملا کر
خوب مل کریں، اور اسی کا اضافہ کرائیں، ۳۲ گھنٹے بعد اضافہ بدل دیا کریں،



خسر و تصقیع

CHILBLAIN

اس مرض میں سردی سے متاثر ہو جانے کے باوجود شہ جسم کو ہمارے رد و ہذا ہے اس کا طبی رنگ اور خصوصی آب و تاب بھی زائل ہو جاتی ہے، لہذا آسان ہے یہ سور سرد ملکوں اور سرد موسم میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

(آ) غیر معمولی خارجی برودت کا جسم پر اثر انداز ہونا

علامات

موسم سرما میں سرد ملکوں میں، سردی لگ جانے سے کچھ عرصہ بعد، رونا ہے علامت غریبہ نہ یہ حد درجہ مصغّل اور کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو ہمارے رد و ہذا ہے اور اس کا رنگ ہلکا مومی ہو جاتا ہے، اطراف (ما تحتیہ وغیرہ) پر (الابنتہ) اور گردن کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد حس زائل ہو جاتی ہے، اور ان میں تجرید (سو) پڑ جاتا ہے، نیز جلد اور اعضا در رفتہ رفتہ سیاہ اور خشک ہو کر غائرانی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان میں تحلیل عمل شروع ہو جاتا ہے اور اعضا نکلنے لگتے ہیں،

خسر و تصقیع - پالا مارنا، برودت سے اطراف ما نہایت سرد ہو جانا

اوستا، وقتاً بہ وقت کے اثر سے عضویہ گرم دم پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں
مقادیرہ طور پر لمبوت کے نتیجے میں، اندازہً، جوتا ہے اور ان رطوبتوں کے دباؤ سے
خاندانی کینہہ تپیدار، ورنہ، ہے۔

اصول علاج

- متاثرہ ۲۰ قسم کو بہت احتیاط کے ساتھ معتدل حرارت کی
طرف لائیں، اور دورانِ خواہ کے عمل کو دوبارہ بروئے کار لانے کی سعی کریں، —
۱۱، دونوں تدابیر یہ کہ اہمیتِ اطلازی ہے۔
- غوارِ صحرانی کا ازالہ کرنے کی تدابیر کریں
- — حسبِ ضرورت پچھنے لگائیں

علاج

- — موسمِ سرما میں، ہمہ وقت گرم کپڑے پہننے کی ہدایت کریں اور
نہا۱۲، طور سے نگر سے باہر نکلتے وقت گرم تدابیر کی پابندی ضرور کرائیں
- — فلفل، یاہ، فرقیون، جذبدیستر، حلتیت وغیرہ کو باریک
کمر کے روغنِ سوسن اور روغنِ یاسمین میں ملا کر لگائیں،
- — اگر بروقت سے اطراف (ہاتھ پیر وغیرہ) متاثر ہو گئے ہوں تو
ایک بیک حرارت نہ پہنچا کر پہلے ہاتھوں سے متاثرہ عضو کی مالش کریں، اس کے بعد ملائم
اور گرم کپڑے سے مالش کریں، اور مرین کے کمرے کو بتدریج گرم کریں اور گرم مشروب
دیں۔

- — اگر اعضا نیلگوں / سبز ہو گئے ہوں تو ان کی مالش کریں اس کے
بعد روغنِ زیتون، روغنِ زنبق، اور روغنِ سوسن لگائیں،

- — اگر عضو میں سبزی یا سیاہی نہ آتی ہو تو اکیلل الملک،
شبتہ، سبوس گندم، آرد گندم، بالونہ، شلیم، شیخ ارمنی، غام، مرزنجوش، تخم کتان،
جلدہ، کوپانی میں جوش دے کر متاثرہ عضو کو اس میں ڈالیں یا نپول کریں، اس کے بعد

پانی صاف کمرے روغن گرم (مذکورہ بالا) لگائیں،
 ③۔ بعض اہل رخصتو کے سبز یا سیاہ ہو جانے کے بعد پچھنے لگتا
 ہیں، چنانچہ متاثر رخصتو پر گہرا پچھنے لگا کر اس کو گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں، پھر سرکہ میو،
 ڈالتے ہیں، اس کے بعد پچھنے کے مقام پر سرکہ اور پانی میں گل ارمی کھولا کر لگاتے
 ہیں، اس کے بعد سرکہ، پانی / شراب سے دھوتے ہیں۔
 ④۔ گرم غذائیں کھانے کی ہدایت کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Saman

انتفاخ اصابع

CHILBLAIN

اس مرض میں انگلیوں میں فوگلات بند ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں صبح کے وقت وہ کسی قدر متورم (سوجے ہوئے) دکھائی دیتی ہیں اور ان میں نمارش ہو رہی ہوتی ہے، — یہ کیفیت صفرائی مزان لوگوں میں، سرما اور تحریف کے موسم میں عام طور پر پیش آتی ہے،

اسباب

(I) ہوا کی برودت کی وجہ سے مقامی جلد کا کثیف اور مسامات کا بند ہو جانا
(II) صبح کے وقت سردی، انہیں اٹھانے کرنا

علامات

انگلیوں میں پھول ہوئی دکھائی دیتی ہیں، انہیں، سوزش، اور خارش بھی ہوتی ہے،
— مزاج کے مزان، معمولات اور موسم وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مرنے
کے تشخیص میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، — شدت کی صورت میں
انگلیوں کا رنگ، بچہ مستغیر ہو کر سبز، مانا، نیلا گوا، ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

- — مقامی طور پر حرارت پہنچائیے،
- — سردیوں کے استعمال اور زرقنہ یا بنکین سے منع کریں،

○ ————— مرص کے ازالہ کے بعد قاطع صفر اور دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

○ ————— سمندر کے کھارے پانی کو گرم کر کے انگلیوں پر دھاریں،
 ○ ————— سبوس گندم، چقندر، کرنب، عدس، قشر، کر سنہ، ترمس، شلجم،
 میں سے کسی ایک کو، پانی میں جوش دیں اور اسی جوشاندہ میں انگلیوں کو ڈبونے کی ہدایت
 کریں،

○ ————— اگر انگلیاں سبزی مائل رنگوں ہو گئی ہوں تو بچھڑکائیں،
 ○ ————— آرد ترمس، کر سنہ دونوں کو آب شلجم میں پیس کر انگلیوں پر فاد کریں،
 ○ ————— بزرالنج کو پانی میں پیس کر انگلیوں پر لگائیں،
 ○ ————— بچھڑکے بعد مسور کو روغن زیتون میں پکا کر ضاد کریں،
 ○ ————— سبوس گندم، انجیر، حلبہ، اسپنتاں، بابونہ، تمام
 دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نطول کریں، اور روغن بنفشہ اور روغن بادام
 کی مالش کریں،

○ ————— قرفل، زنجبیل، برگ حنا، تمام دونوں کو پیس کر
 شہد ملائیں اور لٹوخ کریں۔
 ○ ————— پانی میں نمک ملا کر جوش دیں اور حسب دستور تکیدہ نطول کریں۔



ۛ

تقرح شدقین

اس مرض میں منہ کے کنارے (باچھیں) پک جاتے ہیں، جن کی وجہ سے منہ کا کھولنا،
کھانا پینا، دشوار ہو جاتا ہے،

اسباب

- (I) سر کی طرف سے شور بلغمی خلط کا منہ کے کنارے کی طرف آنا
- (II) گندہ دہن ہونا،
- (III) فسادخون

علامات

منہ کے کنارے (باچھیں) پک کر پھٹ جاتے ہیں، ان میں رطوبت بھری ہوتی ہے جو
رستی رہتی ہے، کبھی پو پڑی پڑ جاتی ہے لیکن، غذا لیتے وقت منہ کھولنے پر یہ کنارے
دوبارہ پھٹ جاتے ہیں، اس صورت میں خون بھی آنے لگتا ہے، مزمن صورتوں میں کنارے
سفید دکھائی دیتے ہیں،

اصول علاج

○ ————— حسب ضرورت فصد کھولیں،

- ————— غلط موثر کا تنقید کریں / مصیقات استعمال کرائیں،
○ ————— انقباض اور مقامی بیوست کو زائل کرنے کی تدابیر کریں۔
○ ————— مقامی صفائی پر توجہ دینے کا مشورہ دیں۔

علاج

○ ————— بلغم کے تنقید کے لیے درج ذیل نسخہ منفع و مسہل و تبرید استعمال کرائیں،

نسخہ منفع و بلغم :-

بنج کاسنی، بنج کرفس، بنج اذخر، بادیان، تخم خطمی، بنج بادیان نیکوب،
پر سیاوشاں، اسطوخودوس، ہر ایک ۷ گرام، اصل اسوس مقشر نیکوب ۵ گرام، مویر منقی،
۹ عدد، انجیر زرد ۵ عدد ————— تمام دواؤں کو شام کو پانی میں بھگو دیں اور
صبح کو ہلکا جوش دے کر مل چھان کر گلقدن عسلی ۵۰ گرام ملا کر نوش کرائیں،
دن بعد درج ذیل نسخہ مسہل و تبرید استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل و بلغم :-

مذکورہ بالا نسخہ منفع میں تربد سفید خراشیدہ ۵ گرام، خاریقون مغربل ۳ گرام،
سنار کی ۱۲ گرام کا حسب دستور اضافہ کریں، ————— اور مغز قلوں خیار شیرہ ۵ گرام،
شکر سرخ ۵ گرام، رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر منفع کے سیال میں ملا کر
گلقدن آفتابی ۵ گرام، روغن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،
پیاس کی صورت میں پانی کی بجائے عرق بادیان نیکوم کر کے نوش کرائیں،
دو مسہل کے بعد ۲، ۳ روز صرف نسخہ منفع نوش کرائیں، اس کے بعد جب ایارج ۱۲ گرام
روغن بادام میں چرب کر کے چاندی کے ورق میں لپیٹ کر رات کے پچھلے پہر نیکوم پانی
عرق بادیان کے ساتھ استعمال کرائیں اور صبح کو نسخہ مسہل سے مغز قلوں خیار شیرہ،
اور روغن بید انجیر حلق کر کے استعمال کرائیں، ————— ۲ مسہل کے بعد ایک مسہل

مغزِ فلوسِ خیاد شیز، اور روغنِ بیدانہ کے ساتھ دیں اور حبِ ایار جِ نزدیک،
 مسہل کے درمیان / وقفہ کے دن یہ نسخہ تہرید استعمال کرائیں،

نسخہ تہرید :-

گلقد آفتابی ۲۵ گرام، عرقِ بادیان ۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے مل جھان لیں اور
 خمِ رجمان ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

○ ————— خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

سرکہ میں ماز و جوش دے کر غرغره کرائیں،

آبِ انار ترش، سرکہ، آبِ سماق کو باہم ملا کر لگائیں،

سفیدہ کا شغری، موم سفید، ہر ایک ۷ گرام، روغنِ گل ۳۵ ملی لیٹر، موم اور روغن

کو پگھلا کر سفیدہ ڈال کر خوب گھونٹیں اور اس کے بعد نہایت احتیاط کے ساتھ زخم
 پر لگائیں۔



کثرت عرق

HYPER HYDROSIS

اس مرض میں جسم سے بکثرت پسینہ خارج ہوتا ہے، جس سے جامد کے افعال میں فتور واقع ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے،

اسباب

- (۱) داخلی/خارجی حرارت
- (۲) امتلاء خلطی رطوبی
- (۳) امتلاء غذائی
- (۴) ضعف قوت ماسک/ضعف قوت
- (۵) مساوات کا فراخ ہونا
- (۶) مادہ مرض کا بحران کے طور پر جامد سے پسینہ کی صورت میں خارج ہونا
- (۷) ضعف اخساب/ذہنی انجمال
- (۸) جسم میں کیلیم کی کمی

علامات

ملفوظ رہے کہ تلوؤں اور ہتھیلیوں سے پسینہ کی دیریش نام طور سے مراہق کی عمر میں بکثرت ہوتی ہے، لیکن بلوغ کے کچھ عرصہ بعد یہ دیریش خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس عمر کے بعد بھی دیریش ختم نہ ہو تو یہ مرض

کی علامت ہے، بعض اوقات الجھن اور اعصابی تناؤ کی وجہ سے بھی پسینہ آتا ہے، لیکن اس میں عام طور سے ہتھیلیاں ہی نم ہوتی ہیں، بعض مرحلوں میں تلوے بھی عرق آلود ہوتے جاتے ہیں، جلد ملائم ہو جانے کی وجہ سے پھپھوند کی نشوونما کے امکانات بڑھ جاتے ہیں،

دماغ / خارجی حرارت اس کا سبب ہو تو ان کی سرگزشت ملتی ہے، امتلاء خلطی / رطوبی اور امتلاء غذائی کی بھی اپنی مخصوص علامات ہوتی ہیں، چنانچہ غذا کی زیادتی کی صورت میں غذا لینے کے بعد پسینہ آتا ہے، خلوص شکم اور کٹھڑی غذا لینے کے بعد پسینہ آنا، رطوبات کی زیادتی کی علامت ہے، اس صورت میں اندراج عرق کے باوجود ضعف کا احساس نہیں ہوتا، ضعف قوت ماسکہ / ضعف اعصاب کی صورت میں پسینہ خارج ہونے کی وجہ سے نقاہت اور ضعف محسوس ہوتا ہے، خفقانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، بعض اوقات غشہ، کم، نوبت آ جاتا ہے، بحران کے ایام میں پسینہ آتا ہے، بحران مرض کی علامت ہے،

اصول علاج

- اگر پسینہ سے ضعف و نقاہت محسوس نہ ہو تو محض بیرونی سرد تدابیر سے تعدیل کافی ہے،
- لباس اور جسم کو کثافت سے پاک و صاف کریں،
- امتلاء غذائی میں ریاضت، قے اور اسہال کرائیں،
- امتلاء خلطی / رطوبی میں استفراغ کرائیں،
- قوت ماسکہ کے ضعف کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں اور قلب و معدہ کی تقویت پر خصوصی توجہ دیں،
- اگر مادہ مرض خارج ہو رہا ہو تو اس کو ہرگز نہ روکیں،

○ ————— کیلیم کی کمی کی صورت میں، اس کی بھر پائی کریں۔

علاج

○ ————— ضعف قوت میں درج ذیل نسخہ مارا اللہ استعمال کریں،

نسخہ مارا اللہ:۔

گوشت بزغالہ ۳ کلوگرام، گوشت چوزہ مرغ ۳ عدد کجشک نہ ۵۰ عدد،
لوہ ۱۵ عدد، بہمن سفید، بہمن سرخ، شفاقل، تودری سرخ، تودری سفید، ہیل خورد،
ہیل کلاں، پوست بیرون پستہ، پوست ترنج، ہر ایک ۴۰ گرام، سعد کوفی حب الاس
زرب، سنبل الطیب، گل گاؤ زبان، اندر جو شیریں، ہر ایک ۳۵ گرام، ناگ سیر،
کباہ خنداں، خوب جان، چوب چینی، ہر ایک ۴۸ گرام، شاہترہ، بادرنجبویہ، شونیسہ،
بسباسہ، جوز بوا، قرنفل، ہر ایک ۸۵ گرام، مشک، اذخر، عنبر اشہب، ہر ایک ۳ گرام،
زعفران ۸ گرام ————— نبات سفید ۵۰۰ گرام، عرق مندل، عرق عنبر، عرق گاؤ زبان،
ہر ایک ۵۰۰ ملی لیٹر، عرق گلاب ۵۰۰ ملی لیٹر، ابر شیم خام، برگ گاؤ زبان، ہر ایک ۳۰ گرام،
تمام خشک دواؤں کو مذکورہ عرقیات میں رات کو تر کریں، صبح کو برگ
ریحان سبز، برگ ترنج سبز، برگ نعناع سبز، ہر ایک ۱۰ گرام کا اضافہ کر کے حسب دستور
۵۰۰ ملی لیٹر مارا اللہ کشید کریں، اور ۵۰ ————— ۱۰۰ ملی لیٹر ہمراہ نوشدارو لولوی علوی
خانی، گرام حل کر کے نوش کریں،

○ ————— گل ارمنی، مردار سنگ، ہوزن ————— تمام دواؤں کو
پیس کر عرق گلاب میں حل کر کے لگائیں۔

○ ————— ضعف کا اندیشہ ہو تو سفیدہ کا شغری روغن گل میں حل
کر کے جسم پر مالش کریں۔

○ ————— گل ارمنی، گلنار، مازو، گل سرخ، مردار سنگ،
ہوزن، تمام دواؤں کو لعاب اسپغولی میں پیس کر جسم پر مالش کریں۔

○ ————— گگرد، مردار سنگ، گل سرخ، ہوزن، ————— تینوں

کو عرق گلاب و آب ہار تنگ میں پیس کر لگائیں،
 ○ ————— مردار سنگ، مازو، صندیل، کافور، ————— تمام دواؤں
 کو روغن مورد میں حل کر کے جسم پر ملیں۔
 ○ ————— مورد، گلنار، گل سرخ، اقاقیا، رسوت، کندر، صندیل سرخ،
 ————— تمام دواؤں کو عرق گلاب میں پیس کر روغن گل ملا کر جسم پر مالش کریں۔
 ○ ————— کشادگی مسامات کی صورت میں مازو پانی میں گھس کر روغن گل
 اور روغن مورد ملا کر تھوڑا سا سفیدہ کا شغری کا اضافہ کر کے لگائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

احتباس عرق

اس مرض میں جسم سے پسینہ خارج نہیں ہوتا بلکہ وہ جسم میں ہی بند ہو کر طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے،

اسباب

- (۱) رطوبت کی کمی / خلطت
- (۲) ضعف قوت دافعو
- (۳) داخلی / خارجی بردوت
- (۴) داخلی / خارجی حرارت
- (۵) مسامات جلد کا تنگ ہونا

علامات

جسم سے پسینہ کا اخراج بند ہو جاتا ہے اور ردی مواد کا طبعی طور پر اخراج نہیں ہو پاتا اور ان کی وجہ سے متعدد سخی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، قوی میں ضعف آجاتا ہے، مرین لافز اور کمزور ہوتا جاتا ہے، جلدی امراض بھی رونما ہونے لگتے ہیں،

اصول علاج

- رطوبات کی کمی کی صورت میں مرطوب اشیا، داخلی طور پر استعمال کرائیں،
- اخلاط کی غلظت میں نفیج و تنقیہ اختیار کریں،
- ضعف قوت دافعہ کی صورت میں طبیعت کو معرقات کے ذریعہ قوی کریں،
- مسامات کو کھولنے / فراخ کرنے کی تدابیر کریں،

علاج

- رطوبت کی کمی کی صورت میں درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

آش جو ہمراہ روغن بادام کھلائیں،
 بکری کے دودھ میں تھوڑی سی شکمڑال کر نوش کرائیں،
 مغز بادام شیریں مقشر ۲۵۰ گرام کو گائے کے ایک لیٹر دودھ میں پیس کر سیبوس اسپغول
 ۲۰ گرام، قند سفید ایک کلو گرام، مسکے گاؤ ۲۵۰ گرام ملا کر نرم آغ پر پکائیں اور حلوی کا
 قوام ہو جائے تو اتار کر ۳۵ گرام ۲۵۰ ملی لیٹر گائے کے دودھ کے ساتھ صبح کو استعمال کرائیں
 روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن نیلوفر وغیرہ سے جسم کی مالش کریں،
 آب شیریں نیلگرم، جسم پر دھاریں،

- اخلاط کی غلظت کی صورت میں نفیج و تنقیہ کے لیے حسب رعایت خلط نسخہ استعمال کرائیں، چونکہ یہ مرض عام طود سے بلغم غلیظ کی وجہ سے عارض ہوتا ہے، اس لیے یہاں اسی کا علاج تحریر کیا جا رہا ہے،

نسخہ منفعی بلغم:-

اسطوخودوس، پرسیاوشاں، یخ کاسنی، یخ کرفس، یخ بادیان، بادیان،
 یخ اذخر، ہر ایک نیمکوب، گرام، اصل السوس مقشرہ گرام، انجیر زردہ عدد، مویز منقہ

۹ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر مل چھان کر کلقتندہ غسلی ۵۰ گرام ملا کر دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل:-

ایا راج فیقرا، تربد، ہر ایک ۹ گرام، حب النیل، انیسون، غارلقون، ہر ایک ۵۰ گرام، شحم حنظل، نمک سانہر، ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق بادیان میں دانہ مونگ کے برابر گویاں بنائیں اور ۳ - ۹ گرام، رات کے آخری حصے میں ورق نقرہ میں پیٹ کر استعمال کرائیں اور اس کے بعد عرق بادیان / عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں، تبرید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید:-

کلقتندہ آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۱۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے چھان لیں، اور تخم ریحاں ۳ گرام، پھڑکن کر نوش کرائیں، روغن شبت، روغن زنبق، روغن خیری، روغن بابونہ وغیرہ کی مالش کریں،

بورۃ الارمنی پسینہ روغن غار میں ملا کر جسم پر ملیں،

دارچینی، شونیز، قصب الزردیرہ پانی میں پیس کر طلا کریں۔

○ ضعف قوت دافعہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

تخم کاسنی، بادیان، تخم کرفس، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو نیکوپ کر کے ۵۰۰ ملی لیٹر پانی اور سرکہ ۲۵۰ ملی لیٹر میں رات کے وقت بھگو دیں دوسرے دن جوش دے کر چھان لیں اور شکر ایک کلو ملا کر سکنجبین کا قوام بنائیں اور ۲۵ گرام، ہمراہ آب کاسنی / عرق بادیان استعمال کرائیں، شربت گل، شربت بنفشہ ملا کر نوش کرائیں

○ خارجی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں

پلو دینہ نہری کا بچھارہ دیں۔

روغن بابونہ میں بورہ ارمنی ملا کر لگائیں،

آب کرفس، عرق کلاب کوسرک، روغن گل میں ملا کر جسم پر ملیں۔

انیسویں کو پانی میں جوش دے کر اسی سے غسل کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

عرق الدم

HEMATIDROSIS

اس مرض میں خون میں رقت اور عدت پیدا ہو جاتی ہے اور قوت ماسکہ کے ضعف کی وجہ سے عروق شریہ کے مٹھ اس کو روکنے سے قاصر ہوتے ہیں جس کے نتیجہ میں گوشت کے دھوون کی مانند پسینہ خارج ہوتا ہے،

اسباب

(I) خون میں صفراوی خلط کی غیر معمولی آمیزش

(II) قوت ماسکہ کا ضعف

علامات

خالص پسینہ کی بجائے، خون آمیز پسینہ خارج ہوتا ہے، جس سے کپڑے بد نما ہو جاتے ہیں اور دموی بومحسوس ہوتی ہے،

اصول علاج

- خون کی جوشش کو فرو کرنے اور قوام کو اعتدال میں لانے کی غرض سے مبردات استعمال کرائیں،
- بیرونی طور پر قابض دوائیں لگائیں،
- مسہلات استعمال کرائیں،

- ہفت اندام کی فصد کھولیں،
○ مناسب ادویہ کے جوشاندہ میں آبرن کرائیں۔

علاج

○ فصد واسہال کی تدابیر کریں، اسہال کی غرض سے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

حب الملوک مدبر، تخم ارٹڈ، پوست ہلیدہ زرد ہر ایک ۷ گرام، جواکھار، سہاگر بریاں چوب فلفل سیاہ، ہر ایک ۳۱ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر فلفل سیاہ کے بقدر گولیاں بنائیں اور ۱-۵ گولی ہمراہ عرق بادیان کھلائیں، یہ نسخہ بھی مفید ہے،

برگ سنار، تربد سفید، تخم خنظل، حب الفیل، ہر ایک ۹ گرام، مقل ازرق، سلینج، کیترا، صمغ عربی، گل سرخ، نمک سیاہ، سنبل الطیب، ہر ایک ۳۳ گرام، حب الملوک مدبر، ۱۹ گرام، شہد ۲۰ ملی لیٹر، روغن گل ۳ ملی لیٹر، آخر الذکر دونوں دواؤں کے علاوہ، دوسری دواؤں کو باریک کریں اور آخر الذکر دونوں میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۱-۳ گولیاں کھلائیں،

○ خون کے غلیان کو کم کرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
آب انگور ترش ایک لیٹر، شکر ۱۵۰ کیلو گرام، کاشربت کا قوام بنائیں اور ٹھنڈی مٹی، ۲۵ گرام، تخم شلغم، بہمن سفید، اندر جو شیریں، تخم گذر، ہر ایک ۶ گرام کو عرق کیوڑہ، میں کھل کر کے شامل کریں اور ۲۵-۳۵ ملی لیٹر نوش کرائیں۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے،

پودینہ سبز، خود خام، آملہ، مصطلی، ہر ایک ۷ گرام، پوست بیرون پستہ ۱۸ گرام، مصطلی کے علاوہ دواؤں کو نیکوب کر کے پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر آب انار ترش ۲ لیٹر اور شکر ایک کیلو گرام کا قوام بنائیں، مصطلی کا سفوف بنا کر قوام میں ملائیں اور ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں،

سکنجبین سادہ ترش، عرق گلاب ہوزن ملا کر ۳۵ ملی لیٹر، صمغ کونوش کرائیں،

عنا ب ۱۰ عدد، پانی میں جوش دے کر صاف کر لیں اور سکنجبین سادہ ۳۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں،

شیرہ عنا ب، گرام، لعاب بہدانہ ۳ گرام، شربت نیلوفر ۳۵ ملی لیٹر میں نکال کر نوش کرائیں،

○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

پوست انار، برگ طرفا، برگ آس، جوز السود، کوکنار، گلنار، غبار آسیا، جفت بلوط، ہموزن کو مارا القم میں ملا کر جسم پر ملیں، ————— مارا القم کا نسخہ درج ذیل ہے،

پوست انار، جفت بلوط، خرفوب تبلی، مازو، مورد، جوز السود، گلنار، پوست سیلاں، طراشیت، قشار، کندر، شب یمانی ہموزن، ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں

اور چھان کر دکھ لیں، ————— بیرونی طور پر قابض ہے،

○ ————— ہفت اندام کی فصد کھولیں،



Learn Unani By Abdul Mannan

عرق ممتن

BROMIDROSIS

اس مرض میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود (Sweat Glands) کے فعل میں فتور واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پسینہ میں بدبو ہوتی ہے،

اسباب

(۱) عصبی عقود (جن سے متعلق پسینہ کا فعل ہے) میں خلل واقع ہونا

علامات

سارے جسم سے عام طور پر اور لمبھ، پاؤں کے تلوے، بغل، سیلون اور شرم گاہ سے خاص طور سے بکثرت، بدبودار پسینہ خارج ہوتا ہے، غیر معمولی بو کی وجہ سے مریض کا محفلوں اور مجلسوں میں اکھٹا، بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے،

اصول علاج

- جسمانی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کریں،
- خارجی طور پر خوشبو استعمال کریں،
- داخلی طور پر مصیفات و معذلات استعمال کریں،

علاج

○ ————— مر، شب یمانی، زرد ورد، ہموزن، ————— تینوں کو باریک
پیس کر جسم پر خاص طور سے ان اعضاء پر چھڑکیں، جہاں نسبتاً زیادہ پسینہ ہو رہا ہو،
○ ————— مردار سنگ، شب یمانی، صندل سفید، ہر ایک ۶ گرام، کافور
۵۰، ملی گرام، عرق گلاب میں گھس کر طلا کریں۔

○ ————— شب یمانی، مر، ساذج، گل سرخ، صندل، سک، سلینو،
سنبل الطیب، ہر ایک ۳ گرام، کافور ۲ گرام، مردار سنگ ۱۲ گرام، ————— تمام
دواؤں کو باریک کر کے عرق گلاب میں اقراص بنائیں اور حسب ضرورت عرق گلاب میں
گھس کر لگائیں،

○ ————— صندل سفید، لودھ، خس، اگر، زعفران، ہموزن، —————
تمام دواؤں کو باریک پیس کر ابٹن کے طور پر استعمال کرائیں،



نتن جلد راس

اس مرض میں سر سے ناگوار ہوا آتی ہے، جس سے مریض کے پاس بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، یہ مرض مرطوب مزاج لوگوں میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

- (I) جسم میں روغنی اجزاء کا غلبہ
- (II) رطوبات کا غلبہ
- (III) حرارت غریزیہ کا ضعیف ہونا
- (IV) عدم صفائی

علامات

مریض کے سر سے خفیف / شدید بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، کبھی تو یہ بو ناگوار لمٹھا س لیے ہوتی ہے اور کبھی ناگوار محو صفت کی حامل ہوتی ہے، یہ مرض بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ پیش آتا ہے،

اصول علاج

○ رطوبات کی تعلیل و تعدیل کی کوشش کریں،

۴۰ نتن جلد راس - سر کی گندگی / بدبو،

- _____ مصفیات استعمال کرائیں،
○ _____ انقباض مسامات کی تدابیر کریں،
○ _____ خوشبو لگائیں،

علاج

- _____ مادہ کے تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
نہنجیل ۶ گرام، بادیان، گل سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام، تربد موصوف ۲۵ گرام، برگ
سنارکی، ریوند خطائی، ہر ایک ۳۵ گرام، حب الہیل ۶۰ گرام، نبات سفید ہونڈن جملہ ادویہ،
_____ حسب دستور گویاں بنائیں اور ۹ گرام کھلائیں،
○ _____ گل انبہ ناشگفتہ (کلی) ۵، گرام، بسباسہ ۳۵ گرام،
دولوں کو باریک پیس کر کوٹ چھان کر ۱۲ گرام، صبح، شام کھلائیں،
○ _____ عرق گل سرس ۵، اعلیٰ لیٹر، شربت عناب ۲۵ ملی لیٹر ملا کر
نوش کرائیں،

- _____ مصفی کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
پوست یخ نیم، پوست یخ انجیر دشتی، پوست ہلیلہ کابلی، پوست بہیڑہ، ہلیلہ سیاہ،
آملہ، شیطرج، بادیان، سنارکی، گل سرخ، ہر ایک ۲۵ گرام، _____ تمام دواؤں
کو کوٹ چھان کر تمام دواؤں کے تین گن شکر کا قوام کو ملائیں اور حسب دستور معجون
بنائیں اور ۱۰ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں،
○ _____ عروق اور مسامات بدن میں انقباض پیدا کرنے کے لیے یہ
ادویہ استعمال کرائیں،

برگ سوسن، مردار سنگ، پوست درخت صنوبر، توتیا، سرو کا پھل سوختہ،
کندر، دقاق، _____ تمام دواؤں کو کھل کر کے شراب میں ملا کر مقامی طور پر
لگائیں۔

صنان

STENCH OF THE ARMPIT

اس مرض میں بغل (Axilla) سے بد بو آتی ہے، شدید صورتوں میں مریض کے پاس بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے،

اسباب

- (۱) اخلاط کا متعفن ہو کر ظاہر جلد کی طرف رجوع کرنا
- (۲) عدم طہارت جسم
- (۳) نظام بول کے بعض امراض / فسادات
- (۴) نظام ہضم کے بعض امراض
- (۵) غیر معمولی جسمانی حرکت / ریاضت / کثرت جماع
- (۶) ایسی غذاؤں / دواؤں کا بکثرت استعمال، جن میں ظاہر بدن کی طرف تیز مواد کو دفع کرنے کے معمولی / غیر معمولی خواص موجود ہوں۔ مثلاً

- (۱) حلیت
- (۲) حلبہ
- (۳) لہسن
- (۴) یخ انجدان
- (۵) برگ انجدان
- (۶) خردل

(۷۱۱) ثبوت

(۷۱۲) جرجیر

علامات

مریض کے جسم، بالخصوص بغل سے بہت ہی ناگوار بھبھک اٹھتی ہے کہ مریض کے پاس بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، ————— مرض کے سبب کے اعتبار سے بو، میں فرق پیدا ہوتا رہتا ہے، ————— ابتدائی مرحلے میں خود مریض کو بھی اس ناگوار بو کا احساس ہوتا ہے، لیکن مرض نرسن ہو جانے کی مہورت میں یہ احساس کسی قدر کم ہو جاتا ہے، ————— شدید صورتوں میں اس بو کی وجہ سے نازک مزاج مصاحب کو قے بھی ہو سکتی ہے،

اصول علاج

- ————— ردی خلط کا تنقیہ کریں،
- ————— مقامی طہارت اور صفائی پر خصوصی توجہ کی ہدایت کریں،
- ————— شدید ریاضت / حرکت والے کام بند کرنے کا حکم دیں،
- ————— حدت کو کم کرنے کی غرض سے مبردات استعمال کرائیں،
- ————— حسب ضرورت مصفی خون دوائیں استعمال کرائیں،
- ————— ہضم کی اصلاح کریں،

علاج

- ————— تنقیہ کی غرض سے یہ نسخے استعمال کرائیں، سوداوی، بلغمی اور صفراوی اخلاط کے تنقیہ میں مجرب ہیں۔
- پوست خنظل، تخم خنظل، ہر ایک ۲۵ گرام، زنج خنظل ۳ گرام، افیتیمون ولایتی (پوٹلی میں بندھی ہوئی) سنائے کمی، ہر ایک ۲۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، جب ۲۵۰ ملی لیٹر رہ جائے تو مل چھان کر نبات سیفہ ہوزن

کے ساتھ شربت بنائیں اور ۲۵ - ۵۰ ملی لیٹر ہمراہ آب گرم نوش کرائیں،
شدید حالات میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

حب الملوک مدبر، تخم انڈ، پوست ہلیلہ زرد، ہر ایک ۱ گرام، سہاگہ بریاں، چوب
قلقل سیاہ، ہر ایک ۱۳ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر قلقل سیاہ کے برابر
حبوب بنائیں اور ایک گولی ہمراہ عرق بادیان یا ۲، ۳ گولیاں ہمراہ عرق گلاب استعمال کرائیں،
تسکینِ حدت کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

○ آب انار ترش ۲ لیٹر، پودینہ سبز، خود خام، مصطلی، آملہ، ہر ایک ۱ گرام، پوست
بیرون بستہ ۸ گرام، مصطلی کے علاوہ تمام دواؤں کو نیکوب کر کے پانی میں جوش دیں اس
کے بعد مل چھان کر آب انار، خشک ایک کلو گرام ملا کر شربت کا قوام بنائیں اس کے بعد سرد
ہونے پر مصطلی باریک کردہ اس میں ملائیں، ۲۵ ملی لیٹر ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں،
○ خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

مقامی طہارت کے بعد شبِ یمانی، برگِ سوسن، سنبل الطیب، صندل، مردار سنگ،
باریک پیس کر لگائیں،

اگر پسینہ وغیرہ کی حدت کی وجہ سے وہاں کی جلد متقرح ہو گئی ہو تو سرکہ اور عرق
گلاب باہم ملا کر صفائی کریں، اس کے بعد ہی دوائیں لگائیں،
مردار سنگ، گل سرخ، کافور کو عرق گلاب میں پیس کر لپ کر دیں،
مرکل، شبِ یمانی باریک پیس کر زرد کر دیں،

بادیان ۵، ۳ گرام، مرکل ۲۵ گرام، دواؤں کو باریک پیس کر چھان لیں
اور شرابِ ریحان میں سل کر کے خشک کریں، پھر دوبارہ باریک کر کے جسم پر چھڑکیں،
برگ آڑو پیس کر بغل میں طیں اس کے بعد گرم پانی سے دھونے کی ہدایت کریں،
پوست / برگ جامن کو پانی میں جوش دے کر غسل کرنے کی ہدایت کریں،
جو شانہ باز بخان سے بغل کو دھونے کی ہدایت کریں،
ناگہ موختہ، تخم شبت، چروخی، بیس، کرچھڑکیں،

صندل، زعفران، اگر، لودھ، حس، تمام دواؤں کو باریک
پیس کر اٹھن بنائیں اور جسم پر ملیں،

○ ————— خوردنی طور پر یہ دو نسخے مجرب ہیں۔
گل انہ ناشگفتہ (پور) ۵ گرام، بسباسہ ۳ گرام، دونوں کو باریک کر کے ۲۵ گرام
کھلائیں،

دیوند خطائی ۵۰ گرام کو نیمکوب کر کے ۶۰ ملی لیٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں،
اور شبنم میں رکھ دیں، ————— صبح کو چھان کر نوش کرائیں، ————— اور اس کے
ساتھ گندم کی روغنی روٹی کھانے کو کہیں۔

————— ○ —————

Learn Unani By Abdul Waris Chaman

ورم رخو

SOFT SWELLING

اس مرض میں جسم پر سفید، نرم ورم پیدا ہو جاتا ہے جو عام طور سے دبانے سے دب جاتا ہے،

اسباب

- (۱) بلغمی خلط کی زیادتی / کثرت رطوبت
- (۱۱) سرد و تر غذاؤں کا بکثرت استعمال
- (۱۱۱) ترک ریاضت
- (۱۱۲) انسداد عروق
- (۱۱۳) دوران خون کا ضعف / قلت خون
- (۱۱۴) امراض کلیہ، ریہ — وغیرہ

علامات

ورم ڈھیلا اور نرم ہوتا ہے اور مقام ورم پر سفیدی ہوتی ہے، دبانے سے دب جاتا ہے، بعض اوقات سرخی، حرارت اور درد بھی ہوتا ہے لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی۔
 ————— امراض قلب اور ریہ کی صورت میں ورم پہلے پیروں پر نمودار ہوتا ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ شکم اور تمام جسم پر پھیل جاتا ہے ————— قلت خون کی صورت میں ورم کا پہلا اثر پوٹوں پر نمودار ہوتا ہے، چلتے پھرنے سے مرض میں اضافہ اور آرام

نہرنے سے افادہ ہوتا ہے، ————— التہاب یکلہ میں درم پوٹوں اور چہرے پر نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد تمام جسم متورم ہو جاتا ہے، درم صبح کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے درم تحلیل ہو جاتا ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے،

اصول علاج

- ————— خلط غائب کا تنقیہ کریں،
- ————— اطباء کا اصول اختیار کریں،
- ————— محملات استعمال کرائیں،

علاج

○ ————— بلغمی خلط کی زیادتی کی صورت میں یہ نسخے استعمال کرائیں،
بادیان، اصل السوس، ہر ایک ۵۰ گرام، کوپانی میں جوش دے کر کلقتندہ علی ۵۰ گرام،
حل کر کے چھان لیں اور نوش کرائیں۔
درج ذیل نسخہ تنقیہ بلغم میں تجرب ہے،

سنبل الطیب، دارچینی، عود بلسان، حب بلسان، مصطکی روٹی، اسارون، اسینو،
زعفران، ہر ایک ۱۰ گرام، نمک ہندی، شحم خنظل، ہر ایک ۵۰ گرام، صبرزد ۲۰ گرام،
تمبہ سفید، حب النیل، خاریقون، انیسون، ہر ایک ۱۲۰ گرام، ————— تمام دواؤں
کو کوٹ چھان کر عرق بادیان میں گوندہ کر داز مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور ۱-۹
گرام، ورق نقرہ میں پیٹ کمرات کے آخری حصہ میں کھلائیں، اس کے بعد عرق کاؤ زبان/
عرق بادیان نوش کرائیں اور سونے کی ہدایت کریں،
بعض اطباء یہ نسخے بھی استعمال کراتے ہیں،

تم کرفس، قسط تلخ، ریوند چینی، انیسون، اسارون، بادیان، ہر ایک ۷ گرام،
سنبل الطیب، ۳۵ گرام، زہرہ سیاہ ۵۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو
بادیک پیس کر سفوف بنائیں اور ۷ گرام، ہمراہ عرق کور/ عرق بادیان ۳۵ ملی لیٹر
استعمال کرائیں،

تخم کرفس، بڑنگ کابلی، شیطرج، فلفل، فلفل، قلمویہ، دار فلفل، بادیان، نمک سیاہ،
ہر ایک ۵/۳ گرام، پوست ہلیلہ زردہ عدد، زنجبیل ۵/۳ گرام۔ ————— تمام دواؤں
کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۷ گرام ہمراہ عرق بادیان ۵/۵ ملی لیٹر، نوش کرائیں،
خارجی طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں۔

افسنیتین، سرکہ میں پیس کر ضما د کریں،
عفص سعد کوفی، صبر، زعفران پیس کر لگائیں،
زودفا خشک، زیرہ کرمانی، صعتہ فارسی، چوب انگور خاکستر ہوزن، —
تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن نار دین میں جوش دیں اور فلفل کو ملا ہمارہ کر کے
روغن کو ورم پر لگائیں۔

○ ————— رطوبات کے تنقیہ کے لیے بعض اوقات قے آور دوائیں
استعمال کرائی جاتی ہیں، چنانچہ ضرورت محسوس ہو تو، تخم ترب کو پانی میں
جوش دیں اور چھان کر نیم گرم نوش کرائیں، ————— اس طرہ دو تین دن قے کرائیں
اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں،

افسنیتین ۱۲ گرام، تخم کشوت، تخم ترب، ہر ایک ۵/۳ گرام، عصارہ غافقہ ۲ گرام، لک
مفسول ۲/۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب مقطر ۱۰۰ گرام میں سفوف بنائیں
اور ۷ گرام، ہمراہ سکنجبین بزدوری ۵/۳ ملی لیٹر، استعمال کرائیں،

○ ————— امراض جگر اور ریہ، مرض کاسید، ہول، توان کا ازالہ کریں،
○ ————— معدہ پر ورم کے اثرات ہوں، تو گلتہ زردہ ۱۰ گرام میں سفوف بنائیں،
مصطلکی ۳ گرام ملا کر کھلائیں، ————— اور یہ نسخہ ضما د استعمال کرائیں،

سرکی، اشہ، صبر، مصطلکی رومی، سنبل الطیب، ہوزن، ————— تمام دواؤں
کو باریک پیس کر روغن نار دین اور موم میں ملا کر معدہ پر ضما د کریں،
اطراف (ہاتھ پیر) میں ورم ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نار دین، نار مشک، زنجبیل، دار فلفل، ہر ایک ۵/۳ گرام، عصارہ سوسن، گل سرخ،
ہر ایک ۲/۲ گرام، مصطلکی، سنبل الطیب، ہر ایک ۲/۲ گرام، سقمونیہ مشوی ۱/۲ گرام،
صبر سقوطی ہوزن، ————— تمام دواؤں کو کوٹ کر فلفل سیاہ کے برابر گویاں،

- بنائیں اور سائے میں خشک کر کے ہم۔ ہ گرام بوقت خواب کھلائیں،
- ۔۔۔۔۔ مرطب غذاؤں سے قطعی پرہیز کرائیں اور ریاضت کی تاکید کریں۔
- ۔۔۔۔۔ انسداد عروق کی صورت میں امالہ کریں، جس کی صورت یہ ہے
- کہ متوہم حصہ کے اطراف میں لذاع اور ہیچ تدابیر/ دوائیں استعمال کرائیں، اس مقصد کے
- تحت ملنی مکھی کے اطراف کو علاحدہ کر کے روغن نار دین میں جوش دے کر لگائیں، —
- سابق میں مذکورہ مالش کے روغن بھی امالہ میں مفید ہیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

ورم صلب

SCIRRHUS

اس مرض میں متاثرہ مقام پر ورم صلب (سخت ورم) برآ، سہ جاتا ہے، جس سے بعض اوقات حس و غیرہ تک زائل ہو جاتی ہے۔ — بعض اطباء اس کو جذام کا تقدم تصور کرتے ہیں،

اقسام

(۴) خلطی اعتبار سے

ورم صلب

Scirrhus

ورم صلب سوداوی بلغمی

(مرکب)

ورم صلب بلغمی

Phlegmatic Scirrhus

ورم صلب سوداوی


Melanotic Scirrhus

Phlegmato-Melanotic

Scirrhus

* یونانی زبان میں اس مرض کو سکیروس کہتے ہیں۔

(ب) مرض کی نوعیت اور شدت و خفت کے اعتبار سے



علامات

خالص سوداوی خلط کے غلبہ کی صورت میں درم کے مقام پر کیسے کی سی رنگت پائی جاتی ہے، سختی اور صلابت بہت زیادہ ہوتی ہے، غلبہ بلغم کی صورت میں درم کا رنگ قلعی کے رنگ جیسا ہوتا ہے، مرکب (سوداء اور بلغم) صورت میں رنگت ملی جلی ہوتی ہے،

درم صلب خالص میں مقام درم پر درد محسوس نہیں ہوتا اسی طرح دہاں کی حس بھی زائل ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف درم صلب غیر خالص میں مقامی طور پر درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن حس پائی جاتی ہے،

اصول علاج

○ خلط غائب ہو کر کا تنقید کریں،

- کمال احتیاط کے ساتھ محلل ملین دوائیں استعمال کرائیں،
○ صلابت تحلیل نہ ہو تو خراج کا اصول علاج اختیار کریں،

علاج

○ بلغمی مواد کے نفع و تنقید کے لیے داخلی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منصف سودا :-

گاؤ زبان ، بادرنجبویہ ، اصل السوس مقشر ، ہر ایک ۴ گرام ، بادیان ، ریشیا ہترہ ،
اسطوخودوس ، ہر ایک ، گرام ، بر سیادشاں ۵ گرام ، پستاں ۱۱ عدد ، جناب ولایتی ،
۵ عدد ، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلفندہ آفتابی ۲۵
گرام حل کر کے نوش کرائیں ، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو دفعہ ذیل
نسخہ مسہل استعمال کرائیں ،

نسخہ مسہل سودا :-

منصف مذکورہ بالا میں بسفاج فستق ، افیتمون ولایتی (پوٹلی میں باندھ کر) قہبانہ
ہلیلہ سیاہ ، ہلیلہ کابلی ، ہلیلہ زرد ، غار لیقون مغربل ، تربد نجوف خراشیدہ ، ہر ایک ۴ گرام ،
برگ سنار کی ۲۱ گرام ، مغز فلوں خیار شبنم ۵ ، گرام حسب دستور ملا کر شیرہ مغز بادام
۵ عدد ملا کر نوش کرائیں ، دوسرے دن نسخہ تبرید استعمال کرائیں

نسخہ تبرید :-

آط مرئی گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر کھلائیں اس کے بعد
جناب گاؤ زبان ۵ گرام ، پانی میں نکال کر مل چھان کر شربت اتار ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
تخم ریجاں ، گرام چھڑک کر نوش کرائیں ۔
○ غلبہ بلغم کی صورت میں نفع و تنقید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں ،

نسخہ منفع بلغم :-

اصل السوس مقشر نیمکوب ۵ گرام، اسطوخودوس، پرسیاوشاں، ہر ایک ۵، ۶ گرام،
بادیان، یخ بادیان، یخ اذخر، یخ کرفس، یخ کاسنی نیمکوب، ہر ایک ۴ گرام، انجیر زرد،
۵ عدد، مویز منقی ۹ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں
اور صبح کو خفیف جوش دے کر مل چھان کر گلقدہ آفتابی ۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں،
جب نفخ کے آثار نمایاں ہوں تو یہ نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل بلغم :-

فاریقون مغربل ۲ گرام، سنارہ کی ۱۲ گرام، تربد موصوف خراسانیہ ۵ گرام،
تمام دواؤں کو مذکورہ بالا نسخہ منفع کے ساتھ رات کے وقت بھگو دیں اور
صبح کو مل چھان کر محفوظ کر لیں، مغز فلوں خیارد شبنم ۵ گرام، شکر سرخ ۵ گرام پانی میں
بھگو کر مل چھان کر اس میں ملائیں اور گلقدہ آفتابی ۵ گرام، روغن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے
نوش کرائیں، پیاس لگنے پر پانی کی بجائے عرق بادیان نیمگرم نوش
کرائیں، دوسرے درجہ ذیل نسخہ تیریدہ استعمال کرائیں،

نسخہ تیریدہ :-

گلقدہ آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے مل چھان کر تخم ریحاں
۴ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

○ اگر سوداوی اور بلغمی دونوں اخلاط مرض کا باعث ہوں تو

اسی اعتبار سے نسخہ تجویز کریں،

○ خارجی/مقامی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

جو بھی علل دوا تجویز کریں اس میں تلین کی بھی خاصیت ہونی چاہیے ورنہ

وہ دم مہلب، مزید سخت ہو جائے گا۔

ابتداء میں مغز فلوں خیارد شبنم روغن بادام شیریں، موم، حسب دستور ملا کر

لگائیں، _____ اور اگر درم تحلیل نہ ہو تو حلبہ، اکیلل الملک، بابونہ، خطمی کا اہنا قدہ
کریں،

خطمی، بابونہ، اکیلل الملک سبوس گندم، _____ تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر چھان کر روغن بنفشہ، روغن بابونہ ملا کر لگائیں،

چربی بطل، چربی ماکیاں، مغز ساق گاؤ، موم زرد، _____ تمام دواؤں کو
روغن میں بگھلائیں اور قیر و طی بنائیں، _____ اور خطمی کے جوشاندہ سے مقام درم
کو نطول کر کے یہ قیر و طی لگائیں،

انزوت، حلبہ، تخم کتاں، تخم منوچہ، زوفا خشک، عنب الثعلب، کیترا، _____
تمام دواؤں کو کوٹ کر دودھ میں پکائیں اور پھر روغن سفید، مرغ اور روغن گل ملا کر
اس قدر کوٹیں کہ مرہم بن جائے اور نیگرم قناد کریں۔

تخم منجد، گل سرخ، تخم کتاں، تخم حلبہ، بابونہ، تخم شبت، اکیلل الملک، شادہ زہ،
ہموزن، _____ تمام دواؤں کو عرق کلاب میں پیس کر لگائیں،

توتیا سبز، سہاگہ بریاں، سببی، ہلدی، ہر ایک ۵/۳ گرام، _____ تمام دواؤں
کو پیس کر میدہ گندم، تخم حلبہ، ہر ایک، گرام، پوست درخت پیل، دیونہ چینی، ہر ایک
۷/۱ گرام، برگ سبھا لو، برگ نیم، ہر ایک ۱۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی میں
جوش دے کر قناد کریں،

سبوس گندم کو خوب با ریک پیس کر چھان لیں اور سلجھیں، اشق ملا کر مقام درم
پر باندھیں،

خاکستر خرمہ ۵ گرام، خطمی ۵/۲ گرام، _____ دونوں کو شہد / سلجھیں میں
پیس کر لگائیں۔



درم ریچی

EMPHYSEMA

اس مرض میں اعضاء کے رخنوں اور خلاؤں میں ریر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض پریشان رہتا ہے اور بعض اوقات اس کے معمولات پر بھی اثر پڑتا ہے،

اسباب

- (۱) سوء مزاج کبد
- (۲) ضعف معدہ
- (۳) حمی
- (۴) بواسیر
- (۵) ثقیل ہنفاخ غذاؤں کا بکثرت استعمال
- (۶) حمی بلغمی کے بعد
- (۷) عرصہ تک ریاضت کرنے کے بعد یک بیک ترک کر دینا

علامات

درم بہت خفیف نوعیت کا ہوتا ہے اور اکثر اوقات تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اگر محسوس ہو تو دبانے سے دب جاتا ہے لیکن دباؤ ہٹتے ہی ریاہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، شدید صورتوں میں ہاتھ پیروں کو دبانے سے ڈکا ر آتی ہے، جس سے مریض کو کسی قدر راحت ملتی ہے، رات کے وقت علامات اور عوارض میں شدت

پیدا ہو جاتی ہے۔

اصول علاج

- _____ بلغمی خلط کا تنقیہ کریں،
- _____ مقام ورم پر سیکنگھیاں کھینچیں،
- _____ سور مزاج جگر کا ازالہ کریں،
- _____ مقویات معدہ استعمال کرائیں،
- _____ ثقیل اور نفاخ چیزوں سے پرہیز کرائیں،
- _____ کا سرایاح دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

- _____ تنقیہ بلغم کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
زنجبیل ۶ گرام، گل سرخ، بادیان، ہر ایک ۱۲ گرام، برگ سنارکی، ریوند خطائی،
ہر ایک ۳۵ گرام، تربد موصوف ۲۵ گرام، حب الینیل ۶ گرام، نبات سفید ہوزن جملہ
ادویہ، _____ تمام دواؤں کو باریک کر کے ۹ گرام کھلائیں،
شدید صورتوں میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،
ایارچ فیکراہ ۲۴ گرام، تربد موصوف مقشر ۹ گرام، انیسون، خاریقون مخربل،
حب الینیل، شحم حنظل، ہر ایک ۲۴ گرام، صمغ عربی، کیترا، گل سرخ، مصطکی رومی،
نمک ہندی، ہر ایک ۵۰۰ ملی گرام مقل ازرق ۵۲۴ گرام، _____ تمام دواؤں کو
پیس کر روغن بادام میں چرب کر کے آب مقل میں دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور
رات کو ۱۰ گولی، اور صبح کو نہار مجتھ ۱۰ گولی دیں۔
○ _____ تنقیہ کے بعد یہ نسخہ نوش کرائیں۔
شریت بزوری حارہ ۲۵ ملی لیٹر میں عرق بادیان ۸۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،
○ _____ سور مزاج کبد، سبب مرض ہو تو مقویات جگر استعمال کرائیں
اور سور القینہ کے ذیل میں بیان کردہ دوائیں دیں۔

○ ————— محی بلغمی سبب مرض ہو تو یہ نسخہ بروئے کار لائیں، بہترین
منفعہ بلغم ہے،

پوست یخ بادیان، پوست یخ کاسنی، اذخر، ہر ایک ۷ گرام، یخ کرفس، اصل السوس
مقشر، ہر ایک ۵ گرام، بادرنجبویہ، عنب الشعلب، ہر ایک ۵ ر، گرام، مویزہ منقی ۵ گرام،
مصطکی رومی ۳ گرام، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور
صبح کو مل چھان کر گلقد عسلی۔ ۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، —————
جب نفیج کے آثار پیدا ہو جائیں تو اول الذکر نسخہ استعمال کرائیں،
○ ————— خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

نر بنادر جدوار کو پانی میں گھس کر مقام ورم پر مناد کریں،
صبر ۱۲ گرام، مغز فلوں خیار خنزہ ۲۵ گرام، عرق کور، سبز مرق میں ملا کر مناد
کریں اس کے بعد برگ بیدانچہ سرخ، روغن بابونہ / روغن گل سے چرب کر کے باندھیں،
سودنجان تلخ، بابونہ، زنجبیل، نمک طعام، ہر ایک ۷ گرام، ————— تمام
دواؤں کو پیس کر روغن ترگس، روغن بابونہ، ہر ایک ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر نیم گرم مالش کریں،
سنبل الطیب، بزرالنج، ہر ایک ۹ گرام کو باریک پیس کر روغن گل ۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے لگائیں،
آرد جو، آرد باجرہ کو نیم گرم کر کے مالش کریں،
چوب انگور خاکستر، جھاؤ، اہل سرور، ————— تمام دواؤں کو پانی میں
پیس کر مناد کریں،

○ ————— کاسر ریاح کے طور پر (خوردنی ذریعہ سے) یہ نسخہ استعمال
کرائیں،

زیرہ، ناخواہ، کاشم کرویا، ہر ایک ۳ گرام، انیسون ۸ گرام، ————— نبات
سفید دوگنا، نبات سفید کے علاوہ، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے نبات
سفید کے قوام میں ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۸ گرام استعمال کرائیں،
حب الرشاد، ناخواہ، تخم کرفس، بادیان، پودینہ خشک، نعام، انیسون، ہر ایک
۹ گرام، شکر سرخ ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے ۵ گرام صبح، شام کھلائیں،



فلغمونی

PHLEGMON

اس مرض میں نسیج خلوی (Cellular Tissue) میں دُموی دُم پیدا ہو جاتا ہے، نتیجہ کے طور پر پیپ بڑ جاتی ہے یا تامل اور فائبرائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

اسباب

(۱) دُموی عفونی مادہ کا نسیج خلوی میں داخل ہو جانا، ————— درج ذیل احوال اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

- (۱) ضربہ و اسقظہ
- (۲) حرق انفار (آگ سے جل جانا)
- (۳) قروح کی زیادتی اور ردی مواد کا عدم اخراج،
- (۴) ترک ریاضت / عدم استفراغ
- (۵) غیر معمولی دھوپ / گرم کپڑے پہننا
- (۶) بھاری چیز اٹھانا
- (۷) متلازمہ کی حالت میں کثرت سے نوشی

حام کرنا۔

علامات

لمحوظ رہے کہ عام طور سے علامتوں کا اعضاد سبب مرض پر ہوتا ہے تاہم مقام متاثر گرم اور دردناک ہوتا ہے، ابھار بھی ہوتا ہے، مقام مرض کی رنگت سرخ ہوتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، درد کا انحصار اور کمی و بیشی شرائین کی ماؤفیت پر ہوتی ہے، چنانچہ جب شرائین زیادہ ماؤف ہوں تو درد ٹھیس کے ساتھ نہایت شدید ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیشاب سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، بنفٹ عظیم چلتی ہے، ————— مقامی طور پر اخراج خون ہوتا ہے، یا دہاں دھوی دھبے بڑ جاتے ہیں،

معالجہ کی بے پرواہی، قوت مدافعت کے ضعف یا سہمی اور متعفن مواد کی زیادتی کی صورت میں ورم بہت تیزی سے متفرج ہو کر پھیلتا ہے اور مقامی ساخت میں تا کل پیدا ہو جاتا ہے، درد میں غیر معمولی شدت، ہڈیاں، بے خوابی اور بخار ہوتا ہے، ————— بعض اوقات خانغرائی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور عوارض کے طود پر تفریع الدم وغیرہ ہو جاتے ہیں۔

اصول علاج

- ————— ابتدائی مرحلے میں مانع عفونت ضداد لگائیں،
- ————— پیپڈ بڑ جانے کی صورت میں نشتر لگائیں،
- ————— قصد کھولیں، تعلیق کریں،
- ————— حسب ضرورت روادعات اور عملات استعمال کرائیں،
- ————— منقبجات بھی استعمال کرا سکتے ہیں،
- ————— حسب ضرورت عملیہ کر کے فاسد اجزاء کو نکال دیں،

علاج

- ————— تحقیق کی غرض سے درج ذیل تدابیر / نسخے استعمال کرائیں۔

با سلیق کی فصد کھولیں،
تعلیق کریں،

بہداز ۳ گرام، سپستان ۹ عدد، عناب ۳ عدد، تخم خطمی ۶ گرام،
تمام دواؤں کو عرق شاہترہ میں جوش دے کر مل چھان کر نہات سفید ۱۸ گرام ملا کر نوش کرائیں،
عناب الثعلب ۵ گرام، گل سرخ، اصل السوس، ہر ایک ۵/۱۴ گرام، گل بنفشہ ۶ گرام،
خبازی ۵/۱۴ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگوئیں،
اور صبح کو مل چھان کر شربت بنفشہ / شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،
خون کے غلیان اور جوش کو کم کرنے کے لیے میرد کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
لعاب بہداز ۳ گرام، شیرہ عناب، عدد، عرق کاسنی، عرق کور، عرق شاہترہ،
ہر ایک ۴۰ ملی لیٹر میں بحال کر شربت نیلوفر ۲۵ ملی لیٹر ملائیں اور خاکسی ۵ گرام چھڑک
کر نوش کرائیں،

○ _____ روادع) کے طور پر درج ذیل
نسخہ استعمال کرائیں،

مندل سفید، مندل سرخ، گل ارمنی، گل سرخ، عناب الثعلب، فوغل ہوزن کو
آب کاسنی سبز، آکشینز سبز، آب کور سبزیں پس کر ضاد کریں،
رسوت ۵/۱۴ گرام، موم سفید، گرام، روغن بنفشہ، روغن گل، ہر ایک ۳۰ ملی لیٹر،
رسوت کو باریک کر لیں اور موم کے ساتھ دونوں روغنوں میں لکھلائیں اور مقامی طور پر
لگائیں،

برگ حنا، صبر ستو طری، مندل سرخ، زعفران، رسوت، گل سرخ،
ہر ایک ۵/۱۴ گرام، پوست ہلیلہ زرد، اقاقیا، گل ارمنی، عدس، عصارہ مامبیا،
ہر ایک ۲۵ گرام، افیون ۲۱۰ گرام، زرد چوب ۹ گرام، تمام
دواؤں کو باریک کر کے آب مامبیا میں تر کر کے خشک، کریر، اور قرص بنائیں،
حسب ضرورت ایک قرص آب کشینز سبز میں لکھیں کہ مقام ورم
پر ضاد کریں،

گیرو، ہلیلہ سیاہ، پوست انار، فوغل، مندا، ریشہ، مرزا، نکا، کاکت، میٹھا

اقاقیا، رسوت ہموزن، _____ تمام دواؤں کو پیس کر اقرص بنائیں اور
آب برگ مکور سبز یا سرکہ میں گھس کر لگائیں۔

○ _____ محل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
مغز فلوں خیار شبنم ۱۲ گرام، عنب الثعلب، گل خطمی، اکیلل الملک، ہر ایک
۵ گرام، بابونہ ۹ گرام، _____ تمام دواؤں کو آب برگ مکور سبز میں پیس
کر ضاد کریں،

تخم خشخاش نیمکوب کر کے گائے کے دودھ میں پکائیں جب گل جائے
تو پیس کر رکھ لیں، گل سرخ، زعفران، دونوں کو باریک پیس کر موم مصفی، روغن گل
اور مذکورہ بالا دوا ملائیں اور ضاد کریں،

لعاب اسپغول، لعاب حلبہ، لعاب ریحاں، ہر ایک ۶ گرام، موم زردہ ۲ گرام،
روغن کنجد ۳۵ ملی لیٹر، _____ تمام دواؤں کو پانی میں ڈال کر جوش دیں، جب
پانی اڑ جائے تو چوب انکور خاکستر، شب یمانی بریاں، زنگار، ہر ایک ۳ گرام باریک
کمر کے ملائیں اور مقام ورم پر لگائیں،

اکلیل الملک، خطمی، شبت، پر سیاوشاں، صبر، _____ تمام دواؤں
کو باریک پیس کر لعاب تخم کتاں میں ملا کر لگائیں،
شیاف مامٹیا، صبر، رسوت — تینوں کو آب کاسنی سبز مرقہ میں پیس
کر لگائیں۔

○ _____ منفع کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
پیاز نرگس کو باریک کتر کر تخم کتاں، یخ سوسن باریک کردہ ملائیں اور ضاد کریں،
پیاز نرگس باریک کتر کر روغن خیری / زوغن زیتون میں پکائیں، جب گل جائے
تو ضاد کے طور پر لگائیں،

زوفار طب، تخم کتاں، تخم کنوپہ، یخ سوسن، تخم حلبہ، پر سیاوشاں، انجیر زرد،
_____ تمام دواؤں کو پانی اور روغن زیتون میں جوش دے کر گلائیں اور
ضاد کریں،

گل خطمی، گل بابونہ، گل بنفشہ، تخم شبت، اکیلل الملک، تخم حلبہ، تخم کتاں،

ہمو زن۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں پکا کر ضاد کریں اور اس کے اوپر
برگ پان تازہ باندھیں،

○۔۔۔۔۔ مغفر کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
مغز ہند دانہ، مغز اخروٹ، برگ کرنب پختہ، پیاز پختہ، خردل، خیر ترش،
تمام دواؤں کو بار یک پیس کر مرہم کی طرح بنائیں اور ضاد کریں،
زفت رطب، غسل بھلاواں، ہر ایک ۳ گرام۔۔۔۔۔ دونوں کو خوب ملائیں،
اس کے بعد ورم کے سرے پر ضاد کریں،

مغز تخم بید انجیر، تخم حلبہ، تخم کنوچہ، انزروت، برگ چقندر، مغز خستہ تمر ہندی،
خیر روٹی، تمام دواؤں کو گائے کے دودھ میں پکا کر زردی بیقہ مرغ،
اور روغن بید انجیر، پتہ گائے، ملا کر مرہم تیار کریں اور لگائیں،
○۔۔۔۔۔ ضرورت کے وقت علیہ کریں اور فاسد و خراب حصہ کو ملاحظہ
کریں۔



قروح بلخنیہ

BULKHIAN ULCERS

اس مرض میں جسم کے کھلے ہوئے حصوں مثلاً چہرہ، پیشانی، رخسار اور تھوڑی وغیرہ کی جلد اور عشاء، مخاطی میں مخصوص نوع کے قروح پیدا ہو جاتے ہیں، جو عوام طور سے مزمن صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن ممالک میں کالا آزار نہیں ہوتا وہاں اور مشرقی ملکوں میں کثیر الوقوع ہیں، ————— بعض اطباء کا خیال ہے کہ اورنگ زیبؒ کے عہد میں یہ مرض وبائی صورت اختیار کر گیا تھا، اسی مناسبت سے اس کو ”اورنگ زیبی“ بھوڑا“ بھی کہتے ہیں، قروح لاہوری، دہلی، بغدادی اور دہل الشرق وغیرہ اس کے دوسرے مترادف نام ہیں۔

اسباب

- (I) ایک مخصوص پتھر / رتیلہ کا کاٹ لینا
- (II) صفراوی خلط کا غلبہ
- (III) سودائے فترق
- (IV) بھیر، بکری، اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ سے مکھیوں / دوسرے اڑنے والے کیڑوں کے ذریعہ انسانوں تک پہنچنا

علامات

ابتداء میں سلع جلد پر ایک پھنسی نمودار ہوتی ہے، جس کو بظاہر کوئی اہمیت

نہیں حاصل ہوتی، چند دنوں بعد یہ دانہ پھنسی بڑھنے لگتی ہے اور ایک کی بجائے متعدد پھنسیاں مل کر پھیلی کے برابر جگہ گھیر لیتی ہیں، ان کے کنارے عام سلج جلد سے ابھرے ہوئے اور سخت، کھردرے ہوتے ہیں، اور قریبی جلد بھی کسی قدر بھڑکتی ہے، ان پھنسیوں سے معمولی رطوبت رستی رہتی ہے جو اس پر جم کر کھرنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کھرنڈ کو تار دینے سے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہے، اور اس خون کا لود سلج پر بھی (بخوردیکھنے پر) متعدد دانے نظر آتے ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان ثبور اور قروح کی جڑیں جلد کے اندر تک پیوست ہیں، ————— بہر حال کچھ عرصہ بعد پھر کھرنڈ اُجماتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پیپ پڑ جانے کی صورت میں ضد اخلاؤ بھی بڑھ جاتے ہیں، ————— یہ مرض بڑا ہی ہیشلا ہے، چنانچہ عام طور سے دوسرے زخموں کی طرح اس سے خون یا غیر معمولی پیپ کا اخراج نہیں ہوتا، کھرنڈ اُٹنے اور اترنے کا عمل کئی سال تک جاری رہتا ہے، اور قرص پھیلتا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ درد بھی نہیں ہوتا، ————— قرص کے کنارے کی کھرنڈ کے خوردبینی امتحان سے اس کے مخصوص جراثیم کی نشاندہی آسانی ہو جاتی ہے،

اصول علاج

ملاحظہ رہے کہ اس کا علاج بہت دشوار ہے کیوں کہ اس کا مادہ بہت ہی دوا اور خراب ہوتا ہے، جلد علاج قبول نہیں کرتا۔ تاہم مستقل مزاجی سے علاج کرنا شفا یابی کی ضمانت ہے،

- ————— خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- ————— مصفیات خون استعمال کریں،
- ————— درد کی صورت میں مسکنات کا استعمال مفید ہے،
- ————— مقامی تنقیہ اور طہارت کا اہتمام کریں،
- ————— مرطبات اور مبردات استعمال کریں،

علاج

○ ————— خلط غالب کا تفتیہ کریں، چنانچہ اگر صغریٰ خلط کا غلبہ ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

تمر ہندی ۶۵ گرام، گل سرخ، برگ ستائے کی، ہر ایک ۲۵ گرام، —————
تمام دواؤں کو ۳۰ ملی لیٹر عرق گلاب میں بھگوئیں اس کے بعد مل چھان کر شیر خشک
۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

نیلوفر، گل بنفشہ، کاسنی نیکوفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عناب ولایتی ۲۲ عدد،
برگ ستارہ کی ۲۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور پھر مل چھان
کر شیر خشک ۵۰ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش کرائیں،

○ ————— مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

شاہترہ، نیلوفر، آکاش بیل، خباز کی، کاسنی، پوست ہیلہ زرد، ہیلہ سیاہ،
گل منڈی، مندل سرخ، مندل سفید، برادہ شیشم، عناب، گل بنفشہ، ہر ایک
۱۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو نیکوب کر کے اٹھ گنا پانی میں جوش دیں اور
جب پانی ۱/۲ حصہ رہ جائے تو مل چھان کر دواؤں کی تین گنا، شکر ملا کر شربت کا
قوام تیار کریں اور ۲۵ ملی لیٹر ہمراہ عرق مصفی خون ۱۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں، —————
عرق مصفی خون کا نسخہ درج ذیل ہے،

برگ نیم، پوست نیم، برگ بکائن، پوست بکائن، برگ بھنگرہ سیاہ،
پوست مونسری، پوست کچنال، دودھنی خورد، شاخ برگ جوانہ، پوست گور،
برگ حنا، شاہترہ، گل منڈی، سر پھوک، دھایا، گل نیلوفر، برادہ مندل سفید،
برادہ شیشم، گل سرخ، کشنر خشک، تخم کاسنی، یخ کاسنی، فوہ، برگ پید سادہ،
ہر ایک ۱۲۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۲۵ ملی لیٹر پانی میں ۲۴ گھنٹے بھگو
دیکھیں، اس کے بعد ۱۲۵ ملی لیٹر عرق کشید کریں اور استعمال کرائیں،

○ ————— غلبہ سودا بر عرق کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

ہیلہ سیاہ، ۴ گرام، بسفاج نیکوفہ ۵ گرام، ایتیمون ولایتی، ۲ گرام،

اسطوخودوس، برگ سنارکلی، ہر ایک ۲ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ گاؤزبان،
برگ بادرنجبویہ، ہر ایک ۹ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۶ گرام، تربد موصوف،
۳ گرام، خربق سیاہ ایک گرام، زنجبیل ۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی
میں جوش دے کر مل چھان لیں اور جراثیمی، لاجورد محسول، نمک سیاہ، غاریقون،
ہر ایک ایک گرام پس کر ملائیں اور نوش کرائیں، اسہال آکر سودائے
مخترق کا اخراج ہو جائے گا، اگر اور زیادہ قوی کرنا مقصود ہو تو اسی
نسخہ میں شحم خنظل، صبر سقطری، ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کر دیں،

○ مقامی تنقیہ اور طہارت پر خصوصی توجہ دیں،

چنانچہ زخم کو جو شانہ برگ نیم سے دھوئیں،

○ مقامی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

کیلہ، برگ حنا خشک، بجھا ہوا چونا، گندھک ہوزن، تمام
دواؤں کو باریک پس کر چھان لیں اور تین گنا روغن یا سمین میں ملا کر صبح کو (مقامی
تنقیہ کے بعد) زخم پر لگائیں، رات میں صرف روغن یا سمین لگائیں،
رات کی رانی کے تازہ پتے پس کر ضاد کریں،

رال، سیندور، نیلا تھوٹھا، ہر ایک ۳ گرام، تینوں دواؤں کو
علاحدہ علاحدہ باریک پیسیں اور روغن کنجد ۶۰ ملی لیٹر، جوش دے کر اس میں پہلے
رال، پھر نیلا تھوٹھا، اور اس کے بعد سیندور ملائیں، سرد ہونے پر
زخم پر لگائیں،

گندھک آٹھ سار، پارہ، مردار سنگ، سفیدہ کاشغری، برگ حنا خشک،
قنبلیہ ۱۲ گرام، رسکپور ۶ گرام، موم ۸۰ گرام، روغن یا سمین ۲۵۰ ملی لیٹر،
پہلے گندھک اور پارہ کی کجلی کریں اور اس کے بعد باقی دوائیں ملائیں اور خوب کھرل
کریں، پھر موم کو روغن یا سمین میں پگھلا کر ان میں ملائیں اور مرہم بنا کر زخموں
پر لگائیں۔



علاج

○ _____ خلط غالب کا تھپہ کریں، چنانچہ اگر صفراوی خلط کا غلبہ ہو تو

درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

تمر ہندی ۶۵ گرام، گل سرخ، برگ سنائے کی، ہر ایک ۲۵ گرام، _____
تمام دواؤں کو ۳۰ ملی لیٹر عرق گلاب میں بھگوئیں اس کے بعد مل چھان کر شیر خشک
۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

نیلوفر، گل بنفشہ، کاسنی نیمکوفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عناب ولایتی ۲۲ عدد،
برگ سنار کی ۲۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور پھر مل چھان
کر شیر خشک ۵۰ ملی لیٹر اضافہ کر کے نوش کرائیں،

○ _____ مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

شاہترہ، نیلوفر، آکاش بیل، خبادی، کاسنی، پوست بیلہ زرد، بیلہ سیاہ،
گل منڈی، مندل سرخ، مندل سفید، برادہ شیشم، عناب، گل بنفشہ، ہر ایک
۱۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو نیکوب کر کے آٹھ گنا پانی میں جوش دیں اور
جب پانی ۱/۲ حصہ رہ جائے تو مل چھان کر دواؤں کی تین گنا، شکرملا کر شربت کا
قوام تیار کریں اور ۲۵ ملی لیٹر ہمراہ عرق مصفی خون ۱۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں _____
عرق مصفی خون کا نسخہ درج ذیل ہے،

برگ نیم، پوست نیم، برگ بکائن، پوست بکائن، برگ بھنگرہ سیاہ،
پوست مولسری، پوست کچنال، دودھنی خورد، شاخ برگ جوانسہ، پوست گولہ،
برگ حنا، شاہترہ، گل منڈی، سر پھوک، دھایا، گل نیلوفر، برادہ مندل سفید،
برادہ شیشم، گل سرخ، کشنیز خشک، تخم کاسنی، یخ کاسنی، فوہ، برگ بید سادہ،
ہر ایک ۱۲۰ گرام، _____ تمام دواؤں کو نیکوب کر کے ۲۵ ملی لیٹر پانی میں ۲۴ گھنٹے بھگو
دیکھیں، اس کے بعد ۵/۱۲ ملی لیٹر عرق کشید کریں اور استعمال کرائیں،

○ _____ غلبہ سودا بر عرق کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

بیلہ سیاہ، ۳ گرام، بسفاج نیمکوفہ ۱۵ گرام، ایتھون ولایتی ۲۴ گرام،

اسطوخودوس، برگ سنار کی، ہر ایک ۲ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ کاؤزبان، برگ بادرنجویہ، ہر ایک ۹ گرام، بادبان، انیسون، ہر ایک ۶ گرام، تربد موصوف، ۳ گرام، خربق سیاہ ایک گرام، زنجبیل ۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور حجر ارمنی، لاجورد محسول، نمک سیاہ، غاریقون، ہر ایک ایک گرام پس کر ملائیں اور نوش کرائیں، اسہال آکر سودائے مختراق کا اخراج ہو جائے گا، اگر اور زیادہ قوی کرنا مقصود ہو تو اسی نسخہ میں شحم خنظل، صبر سقطری، ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کر دیں،

○ مقامی تنقیہ اور طہارت پر خصوصی توجہ دیں، چنانچہ زخم کو جو شانہ برگ نیم سے دھوئیں،

○ مقامی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،

کیلہ، برگ حنا خشک، بجھا ہوا چونا، گندھک ہوزن، تمام دواؤں کو باریک پس کر چھان لیں اور تین گنا روغن یا سمین میں ملا کر صبح کو (مقامی تنقیہ کے بعد) زخم پر لگائیں، رات میں صرف روغن یا سمین لگائیں، رات کی رانی کے تازہ پتے پس کر ضاد کریں،

رال، سیندور، نیلا تھو تھا، ہر ایک ۳ گرام، تینوں دواؤں کو علاحدہ علاحدہ باریک پیسیں اور روغن کنجد ۶۰ ملی لیٹر، جوش دے کر اس میں پہلے رال، پھر نیلا تھو تھا، اور اس کے بعد سیندور ملائیں، سرد ہونے پر زخم پر لگائیں،

گندھک آٹھ سار، پارہ، مردار سنگ، سفیدہ کا قشقری، برگ حنا خشک، قنبلیہ، ہر ایک ۱۲ گرام، رسکپور ۶ گرام، موم ۸۰ گرام، روغن یا سمین ۲۵۰ ملی لیٹر، پہلے گندھک اور پارہ کی کجلی کریں اور اس کے بعد باقی دوائیں ملائیں اور خوب کھرل کریں، پھر موم کو روغن یا سمین میں پگھلا کر ان میں ملائیں اور مرہم بنا کر زخموں پر لگائیں۔




دبیلہ

ABSCCESS

اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ میں گول، بڑا یا پھیلا ہوا، پیپ دار پھوڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات مواد کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے، اگر مادہ شدید عار ہو تو درد بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے اس صورت میں دبیلہ عار/خراج کیا جاتا ہے۔

اقسام


دبیلہ



لے اس کا تذکرہ علاحدہ سے کیا جا رہا ہے۔

(ب) بعض الجبار اس کی درج ذیل مرضیاتی تقسیم کرتے ہیں،

دبیلہ



اسباب

- (I) ضعف حرارت غریزیہ
- (II) فساد، سقم / خام مواد کی پیدائش / ضعف معدہ،
- (III) مہلکات کا بکثرت استعمال
- (IV) ترک ریاضت

علامات

(۱) عمومی:-

درد عام طور سے مفقود ہوتا ہے، اچھار (دبیلہ) دبانے سے صدید اور خون آمیز پھوڑے کی نسبت بہت کم دیتا ہے، تاہم عدد عقد کی نسبت سخت نہیں ہوتا، سلو کی طرح میں حرکت وغیرہ بھی نہیں ہوتی، رنگت، جلد سے مشابہ ہوتی ہے، ——— نشتر دینے پر اس میں سے بدبودار سیاہ رنگ کی لمبی کی مانند شئی نکلتی ہے، ٹھیکری، ناخن کی کترن ہر تال، چوڑ، بال، اوتیل کی گاد کی مانند اشیاء برآمد ہوتی ہیں، ——— مواد اگر بہت زیادہ ردی ہو جائے تو پیپ پڑ جاتی ہے، اس صورت میں دبانے سے دبیلہ نسبتاً جلد دب جاتا ہے،

(ب) خصوصی :-

(۱) دبیلہ مزمن :-

دبیلہ بہت آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے اور اس میں حرارت، سرخی، اور درد وغیرہ نہیں ہوتا، ————— دبیلہ کا اطلاق عام طور سے اسی پھوڑے پر ہوتا ہے،

(۲) دبیلہ عفونی :-

اس میں حرارت، سرخی اور ورم و درد ہوتا ہے، اس کی وجہ دموئی عفونت ہوتی ہے،

(۳) دبیلہ فحی ریکی :-

اس میں پیپ کے ساتھ کسی قدر ہوا بھی بھری ہوتی ہے،

(۴) دبیلہ ساعیہ :-

دبیلہ کی یہ قسم، زیر جلد بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، ورم اپنی وضع بدلتا رہتا ہے، سوزش، سرخی اور درد ہوتا ہے،

(۵) دبیلہ غدی :-

دبیلہ کی یہ قسم کچ ران، بغل وغیرہ میں کسی ظاہری سبب اور علامت کے بغیر پیش آتی ہے، مقامی درد یا جلد کے رنگ میں کوئی تغیر بھی واقع نہیں ہوتا تاہم نشتر سے شکاف دینے پر بہت زیادہ پیپ خارج ہوتی ہے،

(۶) دبیلہ معکوسہ :-

دبیلہ کی یہ قسم عام طور سے مہلک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مادہ مرض بہت اندر پوست ہوتا ہے اور اوپر سے کوئی خاص مرضی علامت رد نہا نہیں ہوتی، اسی مناسبت سے اس کو ”اندھا پھوڑا“ بھی کہتے ہیں، ————— ہر حال جب نشتر دیا جاتا ہے تو خون

خارج ہوتا ہے کیونکہ عام طور سے نشتر مقام مرن / مادہ تک نہیں پہنچ پاتا اور جب بہت گہرا نشتر دیا جائے تو عمومی علامات کے ذیل میں بیان کردہ اشیاء (کلچکری، بال، ناخن کے ٹکڑے، وغیرہ کی مانند) نکلتی ہیں،

اصول علاج

- _____ بلغمی خلط کا تنقیہ کریں،
- _____ معدہ کی اصلاح کریں،
- _____ مقویات استعمال کرائیں،
- _____ علامات استعمال کرائیں،
- _____ عملیہ کریں،

علاج

- _____ بلغمی خلط کے نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفعی :-

اسطوخودوس، پرسیاوشاں، ہرایک، گرام، یخ کاسنی، یخ بادیان، یخ اذخر، یخ کرفس، ہرایک ۵ گرام، بادیان ۶ گرام، اصل السوس مقشر، تمام دواؤں کو نیکوب کریں، موثر منقحی ۹ عدد، انجیر زردہ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر گلفندہ عسلی ۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو مسہل کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

ہلیلہ کلاں، زردچوب، نمک لاہوری ہموزی، تمام دواؤں کو پس کر شیرہ حنظل میں تین دن کھرل کریں اس کے بعد جھگی بیر کے برابر گولیاں بنائیں،

اور ۲۔ گویاں کھلائیں اس کے ۳ گھنٹے بعد مرغن کچھ دی کھانے کو دیں،
 ○ تنقیہ کے بعد درج ذیل ادویہ خارجی طور پر استعمال کرائیں،
 لعاب خطمی، تخم کتاں، تخم حلبہ، چربی گوزن، چربی گاؤ، روغن گل،
 تمام دواؤں کو باہم پکا کر مرہم بنائیں اور ضاد کریں،
 برگ بلاب، (عشق بیچ) کو روغن کنجد / روغن بادام میں پکا کر لگائیں،
 بعض اطباء بلاب کو کھلاتے بھی ہیں۔

پرساوشاں پس کر ضاد کریں،
 پلودینہ بستانی کو آرد جو کے ساتھ پکا کر لگائیں،
 خطمی، شراب کو باہم جوش دے کر لگائیں،
 گندہ بہروزہ کو شہد کے ساتھ لگائیں،
 السی حلبہ، ہر ایک ۱۲ گرام، بیاز سفید ایک عدد، نمک طعام، ریوند چینی، برگ
 برگ نیم، ہر ایک ۶ گرام، آرد گندم ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک کر کے
 پلش کے طور پر ٹیگ کر مابندھیں، نفع لاتا ہے،
 ○ زخم پھوٹ جائے یا نشتر کے ذریعہ مواد خارج کر دیا گیا
 ہو تو ان دواؤں کے جو شانہ سے زخم کو دھوئیں،

مار العسل / برگ نیم اور شہد کے جو شانہ سے زخم کو دھوئیں،
 ○ اند مال زخم کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں،
 مردار سنگ، سفیدہ کا شغری، ہر ایک ۳۱ گرام، کافور ۲ گرام، موم سفید
 ۲۵ گرام، روغن کنجد ۵۰ ملی لیٹر، پہلے موم کو روغن میں پگھلا لیں،
 اس کے بعد پہلی تین دواؤں کو باریک کر کے ملائیں اور سرد ہونے پر سفیدی بیضہ مرغا
 ایک عدد ملا کر خوب گھونٹیں اور زخم پر لگائیں،

موم سفید، کافور قیسوری رال، کات سفید، ہر ایک ۱۸ گرام،
 آخری تینوں دواؤں کو علاحدہ علاحدہ باریک کر کے، موم کو روغن گاؤ ۵۰ ملی لیٹر
 میں پگھلا کر پہلے رال کا سفوف، اس کے بعد کات سفید اور پھر کافور ملا لیں اور
 مقام مرض پر لگائیں،

○ تقویت جسم کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

منز با دام شیریں مقشتر ۲۵۰ گرام، گائے کے دودھ ایک لیٹر میں پیس کر شیرہ نکالیں اور سبوس اسپغول ۱۲۰ گرام، قند سفید ایک کیلو گرام، مسک گاؤ ۲۵۰ گرام ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب حلوے کا قوام تیار ہو جائے تو اتار کر محفوظ کر لیں اور ۳۵ گرام، ۲۵۰ ملی لیٹر گائے کے دودھ کے ساتھ صبح کو استعمال کرائیں،

بیضہ مرغ ۲۰ عدد کو پانی میں جوش دے کر زردی حاصل کریں اور روغن گاؤ (گائے کا گھی)، ۲۵۰ ملی لیٹر میں بریان کر کے خستہ کریں اور بنات سفید ۲۵۰ گرام، عرق بہار نارنج، عرق بید مشک، ہر ایک ۶۰ ملی لیٹر کا قوام بنا کر زردی بیضہ ملا کر خوب حل کریں، اس کے بعد جاتفل، جادو تری، ہر ایک ۵ گرام باریک پیس کر زعفران، مشک خالص، ہر ایک ایک گرام، عرق بید مشک میں حل کر کے شامل کرائیں اور ۶ - ۱۲ گرام صبح، شام کھلائیں،

○ ہضم کو درست رکھنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نوشادر، نمک طعام، نمک لاہوری، سہاگہ بریاں، نرچکور، ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیکابلی، باؤ بڑنگ، فلفل سیاہ، تربخیل، ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق گلاب میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ۲ - ۳ صوب دو دنوں وقت بعد غذا کھلائیں۔

خراج

ACUTE ABSCESS

اس مرض میں بڑا درم حار پیدا ہو کر متعج (پپ دار) ہوتا ہے، اور اس میں شدید درد، ٹیس اور التهاب پایا جاتا ہے۔

اسباب

- (I) ضعف طبیعت اور تعفن قبول کرنے والا مرکز / ضعف قوت مناعت
- (II) اجسام خبیثہ کی سرایت
- (III) فساد خون / غلبہ سودا،
- (IV) ردی نوعیت کا ریاض
- (V) بد ہضمی
- (VI) نام ہیمانی ضعف

علامات

ابتداءً ساخت شدید طور پر متورم ہو جاتی ہے، مقامی طور پر حرارت اور سرخی بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی سخت تمدد اور بعض میں شدید ٹیس والا درد ہوتا ہے، عام طور سے درد کی خفت اور شدت کا انحصار عضو متاثر پر ہے، چنانچہ اگر خراج عصبی اعضاء میں ہو تو عوارض اور علامات نہایت شدید ہوتی ہیں، اور بڑی حد تک خراج کی گہرائی بھی مرض کی شدت کا باعث ہوتی ہے، بہر حال

جب ورم میں پیپ پڑنے لگتی ہے تو مقام ورم کچھ زیادہ گرم ہو جاتا ہے، صلابت، ٹیس درد اور تمدد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پیپ پڑ جانے پر عوارض میں کثیف آجاتی ہے مقام ورم نرم پڑ جاتا ہے اور ٹپک پیدا ہو جاتی ہے، نیز انگلی سے دبانے پر دب جاتا ہے اور اگر پیپ زیادہ مقدار میں ہو تو چھونے پر تموج (لہر) سا محسوس ہوتا ہے، کسی قدر خارش بھی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پیپ پڑنے کے وقت جسمانی درجہ حرارت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ لہر آتا ہے شدید سردی اور کرب و اضطراب ہوتا ہے، جسم عرق آلود ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ، تھمایا ہوا ہوتا ہے،۔۔۔۔۔ درد کی شدت کی وجہ سے مریض ورم کے اصل مقام کے علاوہ، دوسرے قریبی مقامات پر بھی درد محسوس کرتا ہے، خراج کا مادہ اگر خارج ہو تو ابتدا ہی سے تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی قریبی ساخت کو کھادیتا ہے، مواد اگر اندر کی طرف بہنے لگے تو وہاں کی ساخت کو متاثر کرتا ہے، اگر خراج اندرونی گوشت میں ہو تو شگاف نہایت اند تک دے کر مواد خارج کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات شگاف دیتے وقت، تشخیص پر دھوکا ہونے لگتا ہے کیوں کہ بظاہر صبح گوشت کو چیر کر اندر نشتر دینے کی نوبت آ جاتی ہے، بوجہ لچائی نقطہ نظر سے اگر خراج میں ابھار نسبتاً زیادہ اور سرخی، حرارت بھی زیادہ ہو تو یہ نفج، تحلیل اور انفجار جلد قبول کرتا ہے، پھیلا، نیچے دبا ہوا، کم سرخی اور درد والا خراج نفج دیر میں قبول کرتا ہے۔

اصول علاج

- فصد کھولیں
- مسہل باردا استعمال کرائیں
- محللات، منفعیات، مغبرات اور منقیات استعمال کرائیں،
- عملہ کریں، اس کے بعد محللات استعمال کرائیں،
- مقویات استعمال کرائیں،

علاج

○ _____ قدر کے ذریعہ زیتونہ کو اودھیں۔

○ _____ مسہل کے طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ہلید سیاہ ۳۰ گرام، سفیج نیکوفتہ ۵۰ گرام، انیسون ولایتی ۲۰ گرام، برگ سناکلی اسٹو خود ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ بادرنجبویہ، برگ گاؤزبان، ہریک، ۹ گرام، بادیان، انیسون، ہریک ۶ گرام، تربد موہوف ۲ گرام، زنجبیل ۵۰ گرام، خربق سیاہ، (شحم منقل، صبر سقوطی، ہریک ایک ایک گرام، قوی الاثر بنانا مقصود ہو تو)۔

_____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر مکا، سیاہ، جگراد منی، تھاریقونا

لابورہ منقول، بریا، ایک گرام، کو باریک، پس کر ملائیں اور نوش کریں

○ _____ منفع کے طور پر یہ نسخہ استعمال کریں،

رسوت ہندی، مرکبی، رال سفید، شنب یمانی، ہیزن، تمام

دواؤں کو باریک کر کے بہروزہ، موم زرد، ہوزن جملہ ادویہ، روغن کنجد، نیر، موم دو گنا،

_____ ملا کر آگ پر پکائیں اور مرہم کے طور پر استعمال کریں۔

پیار ز کو پانی میں پکائیں، جب پیاز کل جائے تو روغن زیتون میں بریاں کر کے

نیم گرم، گرم پد بانہیں۔

چفتارہ کو روغن کنجد میں پکا کر نیم گرم بناد کریں،

بورق، میوینج، عاقر قرحا، ہوزن کو باریک پس کر شہد میں ملا کر بناد کریں،

انجیر خشک کو نمک کے پانی میں پکائیں اور اس میں زوفا اور مستر ملا کر بانڈھیں،

نوشادر ۱۲ گرام، بہروزہ ۳ گرام، روغن زیتون ۲۰ ملی لیٹر، سردار سنگ ۱۶ گرام،

تمام دواؤں کو باہم پس کر لگائیں۔

خرما کو روغن گاؤ میں پکا کر بناد کریں۔

مغز جنم از بند، تخم کنوچہ، ہوزن کو پانی میں باریک پس کر بناد کریں،

گرم پانی کا نھول کریں،

○ _____ منفع کے طور پر یہ نسخہ روغن زیتون میں

حاصل بلادر، زفت رطب، ہوزن کو آگ پر ملا کر بھوڑے پر لگائیں،
 اشق ۶ گرام، لہسن، ملک ابلم، ہر ایک ۳ گرام، نظرون، کبریت زرد، ہر ایک
 ۳ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے مریم بنا کر استعمال کرائیں،
 موم، راتیاخ، ہر ایک ۵۰ گرام، روغن گاؤ ۵۰ ملی لیٹر، زفت خشک، شہد ہر ایک
 ۱۰۰ ملی لیٹر، زنجار ۶۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو باہم پیس کر روغن زیتون میں
 ملا کر لگائیں،

بیج نرگس کو پانی میں پکا کر روغن سوسن میں بریاں کریں اور شہد ملا کر فساد کریں،
 ○ ————— حسب ضرورت عملیہ کریں، اور اس بابت مقام مرض کی وضع
 نوعیت کو ملحوظ رکھیں،

○ ————— اندمال کی عرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔
 سفیدہ کا شغری، موم سفید، ہر ایک، گرام، روغن گل ۳۵ ملی لیٹر،
 موم کو روغن گل میں پگھلائیں اس کے بعد سفیدہ ڈال کر خوب گھونٹیں اور مریم کے طور پر
 استعمال کرائیں،

کافور قیسوری، موم سفید، رال، کات سفید، ہر ایک ۱۸ گرام، ————— تمام
 دواؤں کو علاحدہ علاحدہ باریک کریں، موم کو روغن گاؤ ۵۰ ملی لیٹر میں ملائیں، اس کے
 بعد رال کا سفوف، پھر کات سفید اور اس کے بعد کافور ملا کر یکذات کریں اور لگائیں،
 زنجار، گندہ بہرہ، مرصافی، جاوشیر، ہر ایک، گرام، کندر، زراوند طویل ہر ایک
 ۵۰ گرام، مقل اندق ۵۰ گرام، مردار سنگ ۱۶ گرام، اشق ۲۵ گرام، رال، موم سفید،
 ہر ایک ۳۱ گرام، ————— خشک دواؤں کو باریک کریں اور موم میں پکائیں اس کے بعد
 روغن زیتون حسب ضرورت ملا کر مریم تیار کریں اور استعمال کرائیں،

○ ————— تقویت کے لیے حلہ جات، معجون اور خمیرے استعمال کرائیں،
 ○ ————— سودا کی تولید میں معاون غذاؤں سے قطعی پرہیز کرائیں۔



دمل

BOILS

اس مرض میں ہنوبری شکل کی، سخت، گول، ابھار والی بڑی پھنسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں درد بھی ہوتا ہے، قریبی جلد بھی سخت اور کسی قدر اودھائی ہو جاتی ہے، یہ مرض گردن کے پچھلے حصہ، پشت، سر، ران، پیش بازو وغیرہ پر اکثر وقوع ہے، بعض اوقات بالائی لب پر بھی ہو جاتا ہے۔

اسباب

- (I) غلیظ، فاسد رطوبت آمیز مادن خون
- (II) خون پیدا کرنے والی غذاؤں کا بکثرت استعمال / نقص تغذیہ
- (III) کثرت سے نوشی
- (IV) ضعف ہضم
- (V) عام جسمانی ضعف / قوت مناعت کی کمی
- (VI) ذیابیطس
- (VII) شکم سیر ہونے کے فوراً بعد جماع کرنا، حمام کرنا، سواری کرنا وغیرہ
- (VIII) عرصہ تک مباشرت نہ کرنا
- (IX) جسم کے بعض دوسرے حصوں کی مزمن مرہبتیں
- (X) بعض مخصوص پیشہ کے لوگ — مثلاً حجام وغیرہ

علامات

ابتداء میں درد ناک قسم کا، سرخ اور کسی قدر ابھرا ہوا دھبہ دکھائی دیتا ہے، جو رفتہ رفتہ ایک بڑی پھنسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چھوٹے میں سخت اور درد ناک ہوتا ہے، اس کی قریبی جلد بھی سخت اور تورم ہو جاتی ہے، سرخی بدستور رہتی ہے، کچھ عرصہ بعد، اس کا بالائی، کسی قدر نوکیلا سرانرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے پیپ اور کبھی چھیمچھرا نکلتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد اتہابی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور زخم مندمل ہونے لگتا ہے اور صرف ایک چھوٹا سا ابھار باقی رہ جاتا ہے، —————
دل اگر زیادہ بڑا ہو تو پیپ بڑے وقت شدید بخار آتا ہے، لہزہ بھی طاری ہو سکتا ہے، ————— ہو نٹوں کے پاس، یا کان کے بیرونی سوراخ کے پاس کا دل شدید عوارض رونما کرتا ہے، آخر الذکر مقام کا دل ٹیس دار، پھیلا ہوا اور درد پیدا کرتا ہے، ہو نٹوں کے پاس ہو تو قلع الدم) کا باعث ہو سکتا ہے،

اصول علاج

- ————— حدت کو کم کرنے کی تدابیر کریں،
- ————— مصفی خون دوائیں استعمال کرائیں،
- ————— محلات، منفیات اور منفحات استعمال کرائیں،
- ————— تسکین درد کی تدابیر کریں،
- ————— علیہ کریں، اس کے بعد مدطات استعمال کرائیں،
- ————— دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں،

علاج

- ————— مصفی کے طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،
شاہترہ، چرائٹہ، ہرایک، گرام، سرچھوکہ ۶ گرام، تخم کاسنی، تخم کاسنی، تخم کشنیز،
ہرایک ۶ گرام، تمر ہندی ۱۲ گرام، عذاب، عدد، آلو بخارا عدد،

تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت عذاب ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے صبح، شام نوش کرائیں،

پوست یخ نیم، پوست شاخ انجیر دشتی، کشنیز خشک، چرائسہ، شاہترہ، ہلیلہ زرد، ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ کاہلی، پوست بہرہ، آملہ، شیطرج، بادیان، گل سرخ، ستار کلی، ہر ایک ۲۵ گرام، قند سفید دواؤں کی دوگنا، شہد ہموزن جملہ ادویہ، ————— خشک دواؤں کو باریک کریں اور قند و شہد کا قوام بنا کر حسب دستور معجون تیار کریں اور ۱۲ گرام ہمراہ پانی / عرق بادیان نیم گرم نوش کرائیں،
دل میں یہ نسخہ بھی مفید ہے،

شقایق النملان، کورات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر شربت عذاب سے شرب کریں۔

○ ————— محلل کے طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،
پوست یخ اردلہ، یخ بسکیرہ، زنجبیل ہموزن کو پیس کر نیم گرم ضاد کریں۔
اسگندھ ناگوری کو پانی میں گھس کر لگائیں،

اجوائن کو باریک پیس کر سرکہ / آب لیون میں پکائیں اور نیم گرم لگائیں،
کنڈش، آرد جو ہوزن، شراب کہنہ میں حل کر کے لگائیں،
چوز کو روغن زیتون / سفیدی بیفہ مرغ میں ملا کر لگائیں،
پوست درخت گل سرخ کو سرکہ میں پیس کر ضاد کریں،
فلفل سیاہ، قرنفل، ————— دونوں کو پانی میں گھس کر لگائیں،
پوست یخ کبر کو آب کشنیز بہنریں پیس کر لگائیں،

○ ————— منفعی کے طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں،
تخم کتاں، تخم کنوچہ، اسپغول، تخم سن، ہر ایک ۱۲ گرام، آرد گندم ۵۰ گرام
تمام دواؤں کو دودھ میں پیس کر بلٹس تیار کریں اور دمل پر باندھ لیں،
تخم کتاں، حلیہ ہوزن، ————— دونوں کو پانی میں پکائیں اور تھوڑا سا
بہروزہ ملا کر اتار لیں اور نیم گرم ضاد کریں،
برگ نیم پیاز، دیو ند چینی، ہر ایک ۱۲ گرام، تخم حلیہ، تخم کتاں، اکلیل الملک،

ہر ایک، گرام، تخم سرس، مین پھل، زنگار، ہر ایک ۹ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ
چھان کر سرکہ / شراب میں ملا کر ضاد کریں،

آد جو / آد مسور / آد مونگ، گیر و ہوزن کو سرکہ میں پکا کر ضاد کریں۔
انزروت، تخم کنوچہ، ترمہندی، مغز بیدانجر، تخم کتاں، کیترا، ہر ایک ۳ گرام، روٹی
کا خیر ۹ گرام، ————— تمام دواؤں کو کائے کے دودھ میں پکائیں، جب دوائیں گل جائیں
تو زردی بیضہ مرغ ۲ عدد، زہرہ گاؤ ۲۵ گرام، صابن ۲۸ گرام حل کر کے
مرہم تیار کریں اور لگائیں،

○ ————— منفرات کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
چونہ (بغیر بجھا ہوا) پوست درخت برگد خاکستر، ————— دونوں کو
پانی میں پیس کر دمل کے اوپری حصہ پر لگائیں،
حب السلاطین، مغز نار جلیل ہوزن، ————— دونوں کو باریک
پیس کر دمل پر لگائیں،

چونہ بغیر بجھا ہوا ۹ گرام، پوست درخت پیل خاکستر ۱۰ گرام،
سجی ۵۰ گرام، ————— تینوں دواؤں کو پانی میں ملا کر دمل کے سرے پر لگائیں
جب خشک ہو جائے تو گڑ کر بیٹی باندھ دیں۔

زفت رومی، ابوائن، زنگار، تخم کتاں، تخم حلبہ، راتیج، جوز القی،
مقل، مرکی، توتیا ہندی، ریوند چینی، زنجبیل، شیر مدار، شیرانجر،
————— خشک دواؤں کو باریک کر کے مذکورہ شیر میں ملائیں اور زخم
(دمل) پر لگائیں۔

○ ————— عملیہ (آپریشن) یا پھنسی ٹوٹنے کے بعد، زخم
بھرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
انزروت، دم الاخوین، زراوند طویل ہوزن، ————— تینوں دواؤں کو
باریک پیس کر زخم پر چھڑکیں،

سنگ بھری، مردار سنگ ہر ایک ۹ گرام کو باریک پیس کر رکھ لیں اور روغن کنجد
۴۱ ملی لیٹر میں سیندھ ۵۰ گرام ڈال کر جلائیں اس کے بعد موم سفید، گرام ڈالیں

بہر مذکورہ معفوق کردہ دوائیں ملا کر خوب خل کریں اور زخم پر لگائیں،
 مردار سنگ، نیلا تھوٹھا، ہر ایک ۱۰ گرام، رتن جوت ۲۵ گرام، تینوں دواؤں کو
 ادبک کریں اور موسم ۵۰ گرام کو روغن کبجد ۱۰۰ ملی لیٹر میں پگھلا کر مذکورہ دوائیں ملا کر
 خوب گھونٹیں اس کے بعد مرہم کے طور پر زخموں پر لگائیں۔




Learn Unani By Abdul Waris Salman

سرطان


CANCER

اس مرض میں جسم کی خلیات کی تقسیم میں خلل واقعہ اور اس کی طبی خصوصیات میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، ان غیر طبی خلیات کے چاروں طرق طبی خلاف بھی نہیں ہوتا اس لیے یہ کیکڑے کی مانند اپنی ارد گرد کی سیج میں تیزی کے ساتھ پھیلنے کا رجحان رکھتے ہیں، خلیات کی بگڑی ہوئی ساخت اور ان کی غیر طبی بڑھتی ہوئی تعداد جسم میں کوئی سودمند کام انجام نہیں دیتی بلکہ اس کے برعکس طفیلی اجسام (Parasites) کی مانند جسم سے نہ صرف اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں بلکہ صحت مند، کارآمد خلیات کی خوراک خود ہی ہضم کر جاتی ہیں اور جراثیم کی طرح قریبی ساختوں میں بھی فساد پیدا کر دیتی ہیں، اس طرح گویا سیج میں خلیات کے غیر طبی اور مسلسل اجتماع سے یہ مرض وجود میں آتا ہے۔

اقسام



سرطان مقامی/عضوی



سرطان



اسباب

(I) سوداوی خلط کی غیر معمولی تولید، اس کی درج ذیل وجوہ ہو سکتی ہیں،

(II) جگر کی غیر طبعی حدت

(III) ضعف طحال

(IV) سودا کی تولید میں معاون غذاؤں کا بکثرت استعمال

(V) سودا، عرق

(VI) صفراء عرق

(VII) بلغم فاسد

(VIII) متواتر ضرب / مزمن خراش / بعض دائرہ میں جو اگرچہ حقیقی سبب نہیں ہوتے تاہم اس

مرض میں معاون ضرورت ثابت ہوتے ہیں۔

واقعہ ہے کہ سرطان کے یقینی اسباب ہنوز دریافت نہیں ہو سکے ہیں، اور مذکورہ

بالا اسباب (بالخصوص سوداوی خلط) کو اچھا قدیم (کسی قدر) یقینی سبب قرار دیتے ہیں۔

علامات

(۲) عمومی علامات :-

مقام مرض کارنگ سرخ اور بعض اوقات زرد ہوتا ہے، جلیں اور جھین محسوس ہوتی ہے، مقامی طور پر کسی دوا کے استعمال سے سوزش اور جھین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اطراف کی جلد میں دکاوت بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات دوا کے استعمال کی وجہ سے اشتقاق بھی ہو جاتا ہے اور فاسد، خراب مواد خارج ہونے لگتا ہے۔ اور تشنجی درد، بخار اور قشریدہ وغیرہ رونما ہو سکتا ہے۔ ————— سرطان کا دائرہ اثر بہت پیمیدہ ہوتا ہے اور وہ قری ساختوں میں پیوست ہوتا ہے نیز صحت مند ساختوں کو کھانے لگتا ہے، قریبی عروق میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ صفراوی خلط کے احتراق کی صورت میں تا کل ایک نمایاں علامت کے طور پر ہوتا ہے، کنارے موٹے اور بیرونی جانب اٹے ہوئے ہوتے ہیں، چربی جیسی ایک سرخ / سبز چیز دکھائی دیتی ہے، زخم کی رنگت سیاہ اور اس میں موجود ریشے سبز ہوتے ہیں،

(ب) خصوصی علامات :-

(۱) سرطان غیر مہلک :-

اس کی رسولیاں چھوٹی / بڑی، ہر دو انواع کی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات یہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں کہ عقو کے طبعی افعال میں دخن پیدا ہونے لگتا ہے، چوں کہ یہ رسولیاں ایک غلاف میں رہتی ہیں جس کی وجہ سے فاسد مواد کا اخراج نہیں ہو پاتا اس لیے ان کے غلیات سے خبیث روئیدگی نہیں ہو پاتی تاہم یہ بھی کسی بھی وقت مہلک ثابت ہو سکتی ہیں،

(۲) سرطان مہلک :-

یہ بحدی شکل کی، کانٹہ دار ہوتی ہیں اور بہت بے ترتیبی کے ساتھ بڑھتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر غلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی طرح محدود ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جس نیچ پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کو سرعت کے ساتھ بڑھ کر دہم برہم کر دیتی ہیں،

(III) سرطان عمومی :-

اس میں مادہ مرض خون میں سرایت کر کے خون کے اجزاء کے طبعی تناسب میں فساد پیدا کر دیتا ہے، چنانچہ کريات حرار الدم کی تعداد ۷۰-۱۲۰ لاکھ تک ہو جاتی ہے، ہیمو گلوبن (مادہ لونہ) ۱۶-۲۵ گرام، ای۔ ایس۔ آر، نہایت سست، (پہلے گھنٹے میں قریباً ۲ ملی میٹر)، ہوتا ہے، خون کی لزوجیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمزوری اور تکان کی شکایت ہوتی ہے، سرد و دوار کی شکایت ہوتی ہے، سر میں بھاری پن بھی ہوتا ہے، جو اس مکدر ہوتا ہے، مزاج میں چاچڑاہن ہوتا ہے، چہرے پر غیر معمولی سرخی ہوتی ہے،

(II) سرطان مقامی/محلی :-

سرطان ثدی :-

یہ صورت عورتوں میں کثیر الوقوع ہے، اس کے رخو ہونے کی وجہ سے خراب مادہ اس طرف بہت جلد منجذب ہو جاتا ہے، اس مرض میں مبتلا عورتوں کے خون میں کوسٹرول کے پیش رو مادے سے مشابہ ایک چیز پائی جاتی ہے، پستان میں صلابت اور سکڑن ہوتی ہے، سیریم کیلسیم لیول اونچا ہوتا ہے۔ ای۔ ایس۔ آر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے،

سرطان عنق رحم اور رحم :-

عنق الرحم کا سرطان بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور قریبی ساختوں میں پیوست ہو جاتا ہے، مثلاً اور امعاء مستقیم میں بکثرت پیوست ہوتا ہے، لمفاوی عروق کے ذریعہ غانہ کے غد میں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے برخلاف جسم رحم کا سرطان اس تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتا، رحم سے خارج ہونے والی رطوبات کے معائنہ سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، (تفصیل کے لیے امراض نسوان ملاحظہ کریں)

سرطان انشیں :-

خصیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، غلاف خصیہ کے نہ پھٹنے تک، خصیہ کی شکل برقرار

رہتی ہے، لیکن جب وہ پھٹ جاتا ہے تو بے قاعدہ شکل کا ابھار نمودار ہوتا ہے، اور ابھار کی شاخیں اصل سے زائد نرم ہوتی ہیں۔ درد کی علامات دیر میں نمایاں ہوتی ہیں، متعاقب بے حسی بھی ہوتی ہے،

سرطان عظام :-

متاخر عضو کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات درم بھی ہوتا ہے اور معمولی دباؤ سے ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے، بعض اوقات کوئی مرضی علامت رونما نہیں ہوتی بلکہ کسی اور علاج کے لیے جب اکسے یا جاتا ہے تو کینسر کا پتہ چلتا ہے، یہ شاذ طور پر پایا جاتا ہے،

سرطان کبد :-

مقام مرض (کبد) پر غیر معمولی درد محسوس ہوتا ہے گھلاوٹ بھی ہوتی ہے، عظم کبد کی شکایت ہوتی ہے، یرقانی علامات بھی رونما ہوتی ہیں، مادہ ٹو (ہیوگلوبن) کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے،

شدید لمفاوی سرطان :-

اس صورت میں خون اور لمفاوی غدوں میں لمفو سائٹس کا غیر معمولی اجتماع ہوتا ہے اور عدد کا حجم بڑھ جاتا ہے، ان کی کارکردگی میں تیزی آ جاتی ہے، اس طرح آئے دن لمفو سائٹس کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے، جلد کی آب ختم ہو جاتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے، جسمانی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوتا ہے، جریان خون کا یرجمان ہوتا ہے، جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے،

تفریقی علامات

سرطان	سقیروس
۱- ابتدا، اور اصل کے طور پر نمودار ہوتا ہے مرض کی علامات	۱- عام طور سے کسی نہ کسی درم کے تابع ثانوی طور پر ہوتا ہے اور یکایک

- | | |
|---|---|
| ۱۔ یکہ بیکہ / بتدریج رونما ہوتی ہیں۔ | ۱۔ واقع نہیں ہوتا۔ |
| ۲۔ سرطانی عروق / مقام میں حرارت اور ذکاوت زیادہ ہوتی ہے، | ۲۔ حرارت کم ہوتی ہے اور ذکاوت بڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ بلکہ اکثر صورتوں میں حس زائل ہو جاتی ہے، |
| ۳۔ دردِ صحت اور مزبان شدید ہوتا ہے | ۳۔ شدید نہیں ہوتا۔ |
| ۴۔ سرطانی عروق / ریٹے کی کڑے کے پیروں کی مانند قریبی ساختوں میں پیوست، مائل بہ سوداء، کموت سبزی ہوتے ہیں۔ | ۴۔ رنگت عام طور سے سرخ ہوتی ہے۔ |
| ۵۔ سرطانی مقام دبانے سے باسانی دباؤ قبول کرتا ہے | ۵۔ دبانے سے دباؤ قبول نہیں کرتا۔ |
| ۶۔ مرض بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ | ۶۔ علامات / مرض کی رفتار سست ہوتی ہے، |
| ۷۔ تشنایابی کی توقع کم ہی ہوتی ہے، | ۷۔ شفا یابی عام طور سے ہوتی ہے، |

احوال، علاج

- سوداوی خلط کے تنقیہ کی تدابیر کریں، _____ اس مقصد کے تحت منصفیات سوداء استعمال کرانے کے بعد مسہلات سوداء دیں، / عورت اس مرض میں مبتلا ہو تو مددِ حیات بھی استعمال کرائیں،
- _____ حسب ضرورت فہار کھولیں، لیکن اس کی نسبت

سہا، زیادہ موزوں ہے،

- تنقیہ کے بعد متعادل مائل بہ رطوبت تدابیر بروئے کار لائیں،
- تنقیہ بدن کے بعد مقامی استعمال کی دوائیں استعمال کرا سکتے ہیں،
- یہ بات ذرا غور سے کہ اگر سرطان خفیہ طور پر، آہستہ آہستہ رونما ہوئی ہو تو
- ۱۔ انجھ پیڑ چھڑنے لگے، باک، اسرہ، منصفیات، مسہلات، سوداء استعمال کرائیں،

اور سرد و تر، صالح خون پیدا کرنے والی غذائیں کھلائیں،

علاج

○ ————— خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

منفع سودا کی غرض سے یہ نسخے استعمال کرائیں،

گاوزبان، اصل السوس مقشر ہر ایک ۵ گرام، شاہترہ، بادیان، بادرنجبویہ، ہر ایک ۵ گرام، عناب ۵ عدد۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں جھگو دیں، صبح کو مل چھان کر گلتھ ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، اسی کے بقدر ترنجبین بھی حل کر سکتے ہیں،

جو کا میدہ ۲۵ گرام، تخم خلمی، تخم خجاری، ہر ایک ۵-۱۰ گرام، عناب ۲۰ عدد پستان ۱۹ عدد، برگ سپستان ۵ عدد، ترنجان، عرق سوسن (حسب ضرورت) تمام دواؤں کو پانی میں پکائیں اس کے بعد شکر سفید ۵ گرام حل کر کے مل چھان کر نوش کرائیں،

جب نفج کے آثار نمایاں ہو جائیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

سناہ کی، برگ اسطوخودوس، گل بنفشہ، بسفاج، ہر ایک ۵-۲۰ گرام، ہلیلا زرد، ہلیلا کاجلی (گٹھلی نکالا ہوا) ہلیلا سیلہ، ہر ایک ۵-۱۰ گرام، باد آورد، شاہترہ، ہر ایک ۲۵ گرام، تمر شری، دانہ انار، ہر ایک ۳۵ گرام، شمشش (خوبانی) خشک، عناب، پستان، موزی، سپستان، ہر ایک ۲۰ عدد، آلو بخارا، عدد، گل نیلوفر ۵ گرام، انبر باریش، غار یقون مغربل، ہر ایک ۵-۱۰ گرام، سورنجان ۱۰ گرام، قنطاریون دقیق، قشر اصل ماہیز، رت، ہر ایک ۱۰-۲۰ گرام، تخم خیار، تخم قنار، ہر ایک ۵ گرام، تخم کاسنی، ۵-۱۰ گرام، ایتھوان ۳ گرام، (پونلی میں) اندہ کر۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں پھر خیار شبنم ۵ گرام حل کر کے چھان لیں اور اس کے بعد مجر امنی، لاجورد مغسول، زراوند، ہر ایک ۱۰-۲۰ گرام، شکر سفید ۵-۱۰ گرام ملا کر رات کے آخری حصہ میں نوش کرائیں،

یہ نسخہ بھی مفید ہے،

ایار ج فیکر ۳ گرام، لاجورد مغسول، ماش سفید، گول، تدبیرینہ بزرگ، تدبیرینہ چھوٹا، پلاست ہلیلا زرد، غار یقون، ہر ایک ۱۰ گرام، تمام دواؤں کو کوکھ چھوٹا کر

روحن بادام میں گوندھ کر چنے کے برابر گویاں بنائیں اور ۷ - ۹ گرام، ورق نقرہ ۳ عدد، میں پیسٹ کردات کے وقت گرم پانی سے نکلنے کی ہدایت کریں،

صبح کو۔ — گلقدن آفتابی، شیر خشک، ہر ایک ۲۰ گرام، مغز فلوس خیا و شیر ۹۰ گرام، کو عرق بادیان سبز، ۱۳۵ ملی لیٹر، آب کاسنی سبز ۲۰۰ ملی لیٹر میں مل چھان لیں اور درون بادام، ۳۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

مغز تخم قشار، مغز تخم خیار، مغز تخم کدوئے شیریں، ہر ایک ۱۰۰ گرام، تخم خرفہ ۱۰۰ گرام، تخم خشخاش سفید ۱۴ گرام، جو کایمدہ ۳۵ گرام، — جو کو پانی میں پکا کر گھلائیں اس کے بعد مذکورہ تخم کو اس میں ڈال کر پکائیں جب تیار ہو جائے تو نبات سفید سے شیریں کر کے استعمال کرائیں۔ ترطیب اور تبرید جسم کے لیے مفید ہے، جید الکیموس، زود ہضم غذائیں دیں،

○ — — — فصد کھولیں اور اس بات کا دھیان دیں کہ فصد اسی طرف کی کھولی جائے جس سمت سرطانی و دم موجود ہو، اور اگر قوی، غم اور مزاج، ہوزوں ہوں تو اس قدر خون خارج کریں کہ مرین غشی کے قریب پہنچ جائے، اس کے بعد صاف خون پیدا کرنے والی دوائیں اور غذائیں استعمال کرائیں،

○ — خارجی طور پر درج ذیل دوائیں بروئے کار لائیں،

روحن گل زیتونی، موم، آب کشنیز سبز، آب عنب الثعلب سبز، توتیا سے مستسول، آب کشنیز سبز اور آب عنب الثعلب سبز کو اسرب کے ہادوں میں اسی دست سے اس قدر سحق کریں کہ پانی کاڑھا ہو جائے، اس کے بعد موم کو روحن گل زیتونی میں پگھلا کر اس میں مائیں اور یکذات کریں اور ضاد کے طور پر لگائیں،

مردار سنگ، موم، بہرہ، ہر ایک ۱۰۰ گرام، حلیک ۱۰ گرام، شگرف ۳۶ گرام، اشق، کندر، ہر ایک ۲۵ گرام، روحن کجند، روحن زیتون، حسب ضرورت، — رقیق اور نرم دواؤں کو روغنیات میں پگھلائیں اور دوسری سخت دواؤں کو خوب باریک پیس کر اس میں یکذات کر کے بطور مرہم لگائیں،

دوا ۱۰۰، ۲۳۱ گرام، شگرف ۷۰ گرام، موم ۳۳ گرام، روحن گل ۶۶ ملی لیٹر، شرا ۱۰۰ کرہ (حسب ضرورت) — شگرف اور دوا سنگ کو باریک کریں اور ملا کر

خوب کھل کریں، اس کے بعد روغن گل میں موسم کو پگھلا کر خوب ملائیں اور سرکہ ملا کر کھل کریں، پھر سفوف کردہ دواؤں کو ملا کر اس قدر کھل کریں کہ وہ یکذات ہو جائیں اور بطور مرہم استعمال کرائیں،

یہ مرہم بھی اذہمیفند ہے،

جاوشیر، زنجار، بہروزہ، مر، ہر ایک، گرام، راتینج، موسم، ہر ایک ۵۰ گرام، زراوند، لوبان، ہر ایک ۵۰ گرام، مردار سنگ ۱۷ گرام، گوگل کبود ۳ گرام، روغن زیتون، موسم گرما میں ۳۸ ملی لیٹر، موسم سرما میں ۲۸ ملی لیٹر، سخت دواؤں کو خوب ہار یک کریں، اور نیم سیال / نرم دواؤں کو روغن زیتون میں پگھلائیں اس کے بعد تمام دواؤں کو ایک ساتھ اس قدر کھل کریں کہ یکذات ہو جائیں، ————— بطور مرہم استعمال کرائیں،

اسفنداج، رصاص، آب حلی العالم، لعاب اسپنول / گل ارمنی / صبر سقو طری، موسم، روغن گل، آب کشیز سبز، ————— تمام دواؤں کو باہم ملا کر خوب سحق کریں اور بطور قیر ملی استعمال کرائیں،

توتیائے کرمانی، (کوٹ چھان کر)، مردار سنگ، سفیدہ قلعی، ہر ایک ۲ گرام، روغن موسم، روغن گل، ہر ایک ۲ ملی لیٹر، ————— ابتدائی تین دواؤں کو خوب ہار یک کریں نیز کپڑے سے چھان کر محفوظ کر لیں اور روغن موسم، روغن گل ان میں ملا کر خوب کھل کریں، جب یکذات ہو جائیں تو مرہم کے طور پر استعمال کرائیں،

گل ارمنی، گل مختوم، روغن گل، ————— تمام دواؤں کو سیسہ کے بادل اور دستے سے اس قدر کھل کریں کہ سیاہ ہو جائے، ————— اب مرہم کے طور پر استعمال کرائیں، تفرج سرطان میں مفید ہے،

سفیدہ قلعی، گل ارمنی، روغن زیتون، عصارہ کاہو، حسب دستور

سابق مرہم تیار کریں،

سفیدہ اسرب، گل مختوم، عصارہ کاہو / عصارہ جہ العالم / آب اسپنول معدنی دواؤں کو تینوں سیال میں سے کسی ایک، روغن گل، اسرب کے بادل، دستے میں کھرا کریں، جب یہ یکذات ہو جائیں تو سرطان پر ضار کریں، گل مختوم، سرکہ، دوتوں کو سیسہ کے بادل اور دستے سے کھرا کریں،

گل ارمنی، اسفنداج، صبر، کندر، روغن گل، ————— پہلی چار دواؤں کو
خوب باریک کر کے روغن میں ملا کر کھل کریں، اور سرطان پر لگائیں، ————— سرطان
متفرج میں مفید ہے،

اسفنداج، ابان، آرد گندم، ہر ایک ۵-۱۰ گرام، گل ارمنی / گل مختوم صبر زرد مغسول،
ہر ایک ۵ گرام، روغن گل (حسب ضرورت)، ————— پہلی پانچ دواؤں کو باریک کر کے
روغن گل میں کھل کریں اور لگائیں،

سفیدہ قلعی، تو تیاغے مغسول، روغن گل، اول الذکر دونوں دواؤں کو باریک
کر کے روغن گل میں پیسیں اور مرہم تیار ہونے پر استعمال کرائیں،

آرد گندم، ابان سفیدہ قلعی، گل مختوم، گل ارمنی، صبر مغسول، ہر ایک
۲/۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے مرطوب زخم پر بھڑکیں اور اگر زخم
خشک ہو تو روغن گل میں ملا کر مرہم کے طور پر لگائیں،

سرطان محرق، موم، روغن گل، ————— قیر وطنی بنا کر استعمال کرائیں،
○ ————— عملیہ سے پہلے اور بعد میں خارجی طور پر درج ذیل تدابیر /

ادویہ استعمال کرائیں،

موم، روغن گل، اسرب خلکوک، لعاب اسپنول، لعاب بہدانہ، شہد، —————
حسب دستور ضلالتیا کرہیں اور عملیہ (آپریشن) سے پہلے چند یوم متواتر مناد کریں،
اس سے سرطان کی صلابت میں کسی قدر کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھر دے
سخت کپڑے سے ملیں، جب آس پاس کی عروق نمایاں ہو جائیں تو عملیہ کریں۔
اگر عملیہ ممکن ہو تو بروئے کار لانے کے بعد درج ذیل مرہم میں گاز، لت کر کے
رکھیں۔

زوفائے مرطب، لعاب بہدانہ، روغن موم (روغن بنفشہ والا)، آب عنب الثعلب سبز،
تمام دواؤں کو ہاون میں پیس کر یکذات کریں اور لگائیں، ————— اوپر
سے اسفنج کو آب عنب الثعلب سبز میں جھگو کر رکھیں،
مزید معلومات کے لیے جراحات کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔



ۛ

عرق مدنی

GUINEA WORM

اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ میں بالعموم اور پیر، تلوے، ٹخنے اور پنڈلیوں میں سے بالخصوص ایک قسم کا کڑا نکلتا ہے، جو دھاگے کی مانند ہوتا ہے اور ٹکلی آب و ہوا کے اعتبار سے سفید، سیاہ یا نائل یا خاکستری ہو سکتا ہے،

لمحظ رہے کہ یہ ایک طفیلی مرض ہے، جو مادہ Dracunculus کے بیجوں میں ہوتا ہے، جس کا لاروا غیر شفاف پانی نوش کرنے سے جسم انسانی میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں نہ اور مادہ کیڑوں میں عمل تخفیب (Fertilization) ہوتا ہے اور اس کے کھوڑی دیر بعد میں نر طفیلی مر جاتا ہے، اور مکلس (Calcify) و تحلیل ہو جاتا ہے، مادہ طفیلی مختلف اعضاء کا جائزہ لیتے ہوئے جسم کے ان حصوں کی جلد کے نیچے پہنچ کر رک جاتا ہے جن کے بھیگتے رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جیسے پیر، میں تلو، ٹخنے اور پنڈلیاں وغیرہ، یہاں اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ مرض نوے فیصد ان ہی اعضاء میں ہوتا ہے۔

یہ مرض ریگستانی علاقوں کا مخصوص طفیلی مرض ہے، جو جوانوں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں اور ۲۵-۳۵ سال کی عمر میں اکثر الوقوع ہے، مئی تا ستمبر بالخصوص جولائی کا مہینہ، جب کہ بارش کی وجہ سے فضا میں جس کی کیفیت ہوتی ہے اس طفیلی

ۛ دیدان مدنی، جبل مدنی، عرق جبل، اژدر قیصر، مار شعلہ فشان، رشتہ، تاروا اور قلادیا مدنی وغیرہ اس کے دوسرے نام ہیں۔ (مولف)

کے دماغ (Larvae) کی افزائش کے لیے موزوں اور سازگار ثابت ہوتا ہے۔ ہندوستان میں راجستھان، بمبئی، حیدرآباد، مدراس وغیرہ میں یہ مرض بکثرت پایا جاتا ہے، راجستھان میں چونکہ دیکستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے پانی کے ذخیرہ کا عام رواج ہے اس لیے یہ بیماری کم و بیش ۴۴ فیصد پائی جاتی ہے،

اسباب

- (۱) غیر شفاف / رکا ہوا پانی نوش کرنا
- (۲) غیر شفاف پانی کے ذریعہ کاشت کی ہوئی سبزیاں استعمال کرنا
- (۳) کسی اور بھی ذریعہ سے اس مخصوص طفیلی کے جسم میں داخل ہو جانا

علامات

اس مرض کی مدت حضانت ۸ — ۱۸ ماہ ہے، چنانچہ مادہ طفیلی ایک مدت تک کسی مرضی علامت کے رونما کیے بغیر انسبوعقب باریلون میں نشوونما پاتا ہے، نشوونما پانے کے بعد وہ جب دیگر اعضاء کی طرف چلتا ہے تو ان سے سستی مواد کا اخراج ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی طور پر لمف (Lymph) کے مجموعہ ہونے سے ایک دانہ نما ابھار پیدا ہو جاتا ہے، جو جلد ہی آبلہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ پھوٹ کر زخم بن جاتا ہے جس میں شدید درد اور سوزش ہوتی ہے، مازہ سستی کی وجہ سے زخم کے اطراف میں ورم اور خارش محسوس ہوتی ہے، زخم کے درمیان میں ایک دھاگہ سا ظاہر ہوتا ہے جو موسم اور علاقے کے اعتبار سے سفید، سرخ، سیاہی مائل یا خاکستری ہو سکتا ہے، یہ طفیلی میٹرک کا ہو سکتا ہے، لہجورت دیگر ایک ڈیڑھ فٹ تک کا ہوتا ہے، اس کی ظاہری شکل گول، ڈوری نما ہوتی ہے، زیریں سراگاؤم اور کسی قدر خمیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مزاحمتی انداز میں اس کو کھینچ کر باہر نکالا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں اس سے سفید رطوبت خارج ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ تعداد میں لاروا (larva) موجود ہوتے ہیں، چنانچہ اس رطوبت میں بہت حدت اور تیزی ہوتی ہے، اور جس عضو کو لگ جائے وہاں خارش اور سوزش کا باعث ہوتی ہے،

ابتداء مرض میں جب طفیلی کا کسی مواد خون میں شامل ہوتا ہے تو خفیف بخار آتا ہے، جس کے ساتھ درد سر بھی ہوتا ہے، بیش حساسیت کی شکایت ہوتی ہے، چنانچہ جسم میں سرخ دھبے، دودڑے اور چھپک نکل آتے ہیں، متلی، تھکے اسہال، تنگی تنفس، دوران سر اور شاخو تا در فشی بھی طاری ہو جاتی ہے، خون میں کربیات حمفیہ Eosinophils کی تعداد بڑھ جاتی ہے،

لمحوظ رہے کہ یہ طفیلی اجسام، دھاگے / سوئے کی ہئیت میں ایک ہی آدمی میں مختلف اوقات یا ایک ہی وقت میں، مختلف اعضا میں ۸۰-۵۰ تک مشاہدہ آتے ہیں، بالغ فرض مرض کی تشخیص میں وقت ہو تو زخم پر سرد پانی ڈالنے سے وہاں سے چند منٹ میں ہی سفید، دودھیار طوبت خارج ہوتی ہے، جس میں خوردبین کی مدد سے دیکھنے سے لاروا دکھائی دیتے ہیں،

اس مرض میں مستزاد جراثیمی تعدی کی صورت میں التهاب خلوی (Cellulitis) خراج، (Abscess) اور التهاب مفاصل بھی ہو سکتا ہے،

اصول علاج

- حتی الامکان جوش دیا ہو اپانی استعمال کرنے کی ہدایت کریں،
- زخم کو صاف رکھیں اور روئی کو سرد پانی میں جھگو کر زخم پر رکھیں
- اس طرح تمام دعامیص Larvae خارج ہو جائیں گے،
- غلیظ خون کی صورت میں مخالف جانب کی باسیلیق / صافن کی فصد کھولیں،
- مقام مرض پر چونک لگائیں،
- حسب ضرورت مسہل سودا دیں،
- مقام مرض پر طیس روغن لگائیں اور چمٹی سے عرق (طفیلی) کو آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں،
- عملیہ کریں،

علاج

○ مقامی ملامت کے ظہور کی صورت میں آب کشنیز، آب کاسنی سبز میں ایوا ملا کر متاثر جگہ پر دھاریں اور داخلی طور پر ایلا (صیر) علی الترتیب ۲، ۴، ۶ گرام تین دن کھلائیں۔

○ طفیلی کا سرائل نظر آنے لگے تو اس کو چمٹی کی مدد سے پکڑ کر اہستہ بہتہ کھینچیں اور اس درمیان مقام مرض پر سرد پانی ڈالتے رہیں، ٹٹول کر دیں اور اس کی لمبائی جہاں تک محسوس ہو ملین روغن لگا کر اندر سے کیڑے کے خارج ہونے کی طرف سہلائیں اور باہر کھینچتے رہیں، ملحوظ رہے کہ معمولی سی بے احتیاطی سے کیڑا ٹوٹ سکتا ہے، اگر طفیلی کسی طور پر ظاہر نہ ہو تو اس کو ٹٹول کر اس کی پوری لمبائی کا اندازہ کر کے اسی کے بقدر لمبائی میں شگاف دے کر طفیلی کو نکالیں۔

○ طفیلی کے ظہور کی علامتیں پائی جائیں تو فلفل سیاہ اور کافور کو آب کشنیز سبز میں پیس کر ملا کر کریں، اس سے طفیلی باسانی خارج ہو جاتا ہے اور دوسرے مقامی عوارض ختم ہو جاتے ہیں،

بہر حال خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ ہمارے استعمال کرائیں،

○ گل مار تا شگفتہ ۱۱ عدد، قند سیاہ ۳۵ گرام،
دونوں کو ملا کر جنگلی بیر کے بقدر گولیاں بنائیں اور صبح، دوپہر، شام ایک گولی ہر لہ آب تازہ استعمال کرائیں،

○ صدف ایک عدد کو ہادیک میں کر اسی کے ہوزن نوشادر ملائیں اور عرق گھیکوار کے ساتھ ۳ گھنٹے کھل کر کریں ۱۱ اس کے بعد آگ پر کشتہ بنائیں اور ایک گرام صبح، شام کھلائیں، طفیلی کو خراج کر دیتا ہے،

○ نمود کے پر کی سفید ڈونٹھلی پیڑ کر سفید گودا نکالیں اور اسی سے ہوزن نک سوخند ملا کر پانی کی مدد سے ماش کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح، شام کھلائیں،

○ بعض اہل باد موسکے پر کو چم میں بھر کر حقہ کی نوش کرتے ہیں۔

○ ————— مردار سنگ ایک گرام پیس کر روغن زرد ۶۰ ملی لیٹر ملا کر
بھجڑی کے ساتھ کھلائیں،

○ ————— حلیت ۲۱ گرام، قند سیاہ کہنہ ۸۵ گرام —————
دونوں دواؤں کو ملا کر، چوب بنائیں اور روزانہ ایک جب ہمراہ روغن گائے
۳۵/۵ ملی لیٹر استعمال کرائیں،

○ ————— سہاگہ بریاں ۲۰ گرام، قند سیاہ کہنہ ۱۷۵ گرام —————
دونوں کو ملا کر ۶ گرام کھلائیں،

خارجی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کرائیں،
○ ————— نمک طعام میں شیر مدار ملا کر مقام مرض پر ضاد کریں۔
مخرج اور مسکن درد ہے،

○ ————— زرد چوب، گل پلاس ہوزن ————— دونوں کو پیس کر
پانی میں حل کر کے ناراوا پر لگائیں — دردی کی حالت میں مفید ہے،
○ ————— حلیت، اجوائن دیسی، ہر ایک ۳ گرام، آرد گندم ۶ گرام،
تینوں دواؤں کو باریک کر کے پانی کی مدد سے ٹکیہ بنا کر عرق مدنی
پر باندھیں۔

○ ————— بیخ نے ۱۰ گرام، مردار سنگ ۱۳ گرام، —————
دونوں کو موم ۲۰ گرام، روغن کچد ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر حسب دستور مرہم تیار کریں،
اور مقام مرض پر لگائیں،

○ ————— چوب زرد، اجوائن، السی، ہوزن ————— تمام
دواؤں کو باریک کر کے تھوڑا آٹا اور تیل ملا کر پانی کی مدد سے پلش بنا کر
باندھیں۔

○ ————— حلیت ۳ گرام، برگ بیری، برگ تبا کو ہر ایک ۶ گرام،
تینوں کو پیس کر ضاد کریں۔

○ ————— برگ دھتورہ سبز / خشک کو کوٹ کر چاول کے آٹے اور
میٹھے تیل کے ساتھ پلش بنا کر باندھیں، مسکن درد ہونے کے ساتھ مخرج

طیفلی ہے،

○ ————— قلم حلیہ، صبر، شونیز، ہوزن، ————— تینوں دواؤں کو
چھاچھ میں پکا کر مقام مرض پر رکھیں اور برگ مدار گرم گرم، اوپر سے باندھیں۔

○ ————— میوں کو درمیان سے کاٹ کر اس پر سینہ در چھڑکی کر نیم گرم
کر کے مقام مرض پر باندھیں۔

○ ————— اسپنول ۶ گرام روغن بنفشہ میں پس کر لگائیں

○ ————— طیفلی خارج ہو رہا ہو تو اس کو چھوٹے سے سیسہ پر پیسٹ کر

چھوڑ دیں اس کے وزن سے وہ رفتہ رفتہ خارج ہو جائے گا۔

○ —————

Learn Unani By Abdul Waheed Siddiqui

دوالی

VARICOSE

اس مرض میں پٹلی کی رگیں (عروق) پھول کر موٹی ہو جاتی ہیں اور ان میں جا بجا گہری سی پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، — یہ بیماری مردوں میں شیرا لوقوع ہے،

اسباب

(۱) بہت زیادہ چلنا پھرنا / دیر تک کھڑے رہنا، جس کے نتیجہ میں پٹلی کی عروق میں خون غیر معمولی طور پر جمع ہو جائے مثلاً پوسٹ مین، حامل (فلی) رئیسوں کے دربار میں رہنے والا چراسی / دربان -

(۲) سعداء / بلغم کی تولید میں معاون غذاؤں کا بکثرت استعمال / غلبہ سودہ / بلغم

(۳) وریدوں کی دیواروں کی پیدائشی خرابی

(۴) اوچھ خون کی کواڑوں کی خرابی

(۵) دائمی قبض

(۶) جگر کی خرابی

(۷) ٹانگوں پر بٹا / فیتے باز دھتا

* فارسی زبان میں دوال چڑے کے تسم کو کہتے ہیں، اور اس مرض میں بھی دید میں پھول کر تسم کی مانند دکھائی دیتی ہیں، دوالی ۱۰ وجہ تسمیہ ہی ہے۔

(۱۷) (عورتوں میں) بار بار حمل ٹھہرنا

(۱۷) ضرب

علامات

پنڈلی کی عروق پُر پیچ (گرہ دار) ہو کر ابھرتی ہیں، ان کا رنگ سبز ہوتا ہے، ویسے گہرا سرخ، سفیدی مائل شفاف اور کسی قدر سیاہ بھی ہو سکتا ہے، عروق میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات صرف بوجھ اور تنکان کا احساس ہوتا ہے، مزلن ہونے پر عروق اور بھی گرہ دار ہو جاتی ہیں اور ان میں گوثر نما تھیلیاں سی پیدا ہو جاتی ہے،

غلبہ خون کی صورت میں عروق کا رنگ گہرا سرخ، بلغم کی صورت میں سفیدی مائل شفاف اور سودا، کے غلبہ کی صورت میں سیاہی مائل یا نیلگوں بھی ہو جاتا ہے، پنڈلیوں پر اس سے خراب اثر پڑتا ہے، ان کی غذا طبعی حالت سے پھر جاتی ہے چنانچہ عظامی طور پر اکوتہ اور پھوڑے پھنسیلوں کی پیدائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، پیچیدگی کے طور پر ان عروق میں دموی سدہ پیدا ہو کر دوران خون کے ذریعہ قلب کو متاثر کرتا ہے، دماغ اور پیچھڑوں میں یہ دموی سدہ پہنچ جائے تو کبھی ہلاکت ہو سکتی ہے، سودا کی صورت میں مایوہیا بھی ہو سکتا ہے،

اصول علاج

○ غلبہ بلغم / سودا کی صورت میں حسب ضرورت منفعیات و

مسہلات استعمال کرائیں،

○ فصد کھولیں / قتلانے والی دوائیں پلائیں،

○ اصلاح خون کریں،

○ رفع درد کی تدابیر کریں،

○ آرام کرنے کی ہدایت کریں،

○ ————— پیپ وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج

○ ————— غلبہ بلغم کی صورت میں نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع بلغم :-

یخ کاسنی، یخ اذخر، یخ کرفس، یخ بادیان، بادیان، پر سیاوشاں، اسطوخودوس، ہر ایک، گرام، اصل السوس مقشر، نمکوب، گرام، انجیر زردہ، عدد، مویر منقہ، عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو ہلکا جوش دے کر مل چھان کر گلقدار صلی۔ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں۔

نسخہ مسہل :-

ہلیلہ کلاں، نندہ جوب، نمک لاہوری، ہوزن ————— تمام دواؤں کو باریک پس کر شیرہ شحم منغل میں تین دن کھل کر کریں اس کے بعد جگلی پر کے برابر گویاں بنائیں۔ ۱۔ گویاں کھلائیں، اس کے تین گھنٹے بعد مرغن کھڑی کھلائیں،

○ ————— غلبہ سودا کی صورت میں نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع سودا :-

گلاؤ زبان، یادرجویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک، گرام، پر سیاوشاں، گرام، اسطوخودوس، شاہترہ، بادیان، ہر ایک، گرام، عتاب ولایتی، عدد، سپستان، عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر تر بنجین خراسانی، گلقدار آفتابی، گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

ہلیلہ سیاہ - ۲۰ گرام ، بسفاج نیمکوفتہ - ۱۰ گرام ، افیمون ولایتی ۱۸ گرام ، برگ سنکھا
اسطوخودوس ، ہر ۳۱ گرام ، گل سرخ ۸ گرام ، تربدھو صوق ۲ گرام ، برگ سکاؤڈ زبان ،
برگ بادرنجبویہ ، ہر ایک ۶ گرام ، انیسون ، یادیان ، ہر ایک ۳ گرام ، زنجبیل ایک
گرام ، تمام دواؤں کو جوش دے کر غاریقون ، جیرا منی ، لاجورد معسول ،
نمک سیاہ ، فہم حنظل ، صبر سقطری ، ہر ایک ایک گرام ملا کر نوش کرائیں ،
○ مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں ،

تخم کشنیز ، شاہترہ ، سرچھوکر ، گل سرخ ، برگ حنا ، پوست ہلیلہ زرد ، ہر ایک ۲ گرام ،
دھایا ، مندل سفید ، برہم ڈنڈی ، نیلکنٹھی ، ہر ایک ۵ گرام ، زہرہ سفید ، گل کچنال ،
فلفل سیاہ ، ہر ایک ایک گرام ، برگ بکائن ، برگ نیم ، ہر ایک ۱۲ گرام ،
تمام دواؤں کو (تخم کشنیز اور برگ حنا کے علاوہ) کوٹ چھان کر محفوظ کر لیں اور تخم کشنیز
و برگ حنا کو رات کے وقت تھوڑے پانی میں بھگو کر صبح کو اس کے زلال میں سفوف گوندھ
گھر چنے کے برابر حبوب بنائیں اور ۲-۳ گولیاں ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں ، اور
مارا بلبین نوش کرائیں ،

غناہ - ۱۰ عدد ، غلبہ ۵ ر - ۱۰ گرام کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر
نہات سفید ۳ گرام کے ساتھ نوش کرائیں ،

نمود ، مازو ، جو زالسرو ، اقا قیا ، رامک ، تمام دواؤں کو پانی میں

پیس کر لیب کریں ،

قطران کو بکرے کے مرادہ کے پانی میں حل کر کے دن میں چند بار لگائیں ۔

حبوب انگوٹھا کستر ، کو ردغین دیتون میں حل کر کے مالش کریں ۔



دائرا لفیل

ELEPHANTIASIS

اس مرض میں عروق مجاذبہ (Lymphatic Vessels) کے
مسدود ہو جانے سے جلد اور اس کے نیچے کی ساخت متاثر ہو کر دبیز ہو جاتی ہے،
یہ دراصل فلیریائی سرایت کا ایک اہم نتیجہ ہے، جن میں مرین کا پیرہا تھی کے پیر کی طرح موٹا
اور کھردرا ہو جاتا ہے،

اسباب

- (I) دوالی
- (II) نقرس
- (III) غلیظ بلغمی خلط کا غلبہ
- (IV) غلیظ سوداوی خون
- (V) مادہ سل / مرطبان (شاذ و نادر) / آتشکی مادہ کی غدد لمفاویہ میں سرایت
- (VI) عروق مجاذبہ کا ناکام عملیہ (آپریشن)
- (VII) ویکسیریریا بنکرافٹی (Wuchereria Bancrofti)
- (VIII) بروگی مالائی
- (IX) لوآ لوآ Loa, Loa ، وغیرہ سے متاثرہ نچر کا صحت مند
آدمی کو کاٹنا
- (X) مرطوب مقامات پر قیام کرنا، / پانی کی آلودگی / کثافت

علامات

ابتداء میں متاثریہ کارنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی کرب و اضطراب اور لہرہ کے ساتھ تیز بخار ہوتا ہے، متلی اور تھکی شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد بخار کم ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد مرض کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے عروق جاذبہ میں التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بعد میں ان میں انسداد پیدا ہو جاتا ہے، جلد اور تحت الجلد بافتوں میں واضح طور پر دبازت اور سوجن محسوس ہوتی ہے، کسی قدر سختی بھی ہوتی ہے، سوجن سب سے پہلے پاؤں کی پشت پر آتی ہے اس کے بعد پنڈلیوں تک پھیل جاتی ہے، بانٹوں میں گرہ سی پڑنے لگتی ہیں، شدید درد ہوتا ہے، متورم سہترہ پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بھی نمودار ہو سکتی ہیں، ایک مشاہدہ ہے کہ مرض کے حملے اور چاند سے بہت بڑا رشتہ ہے، چنانچہ ہر مہینہ کی ۱۵ ویں تاریخ کو بخار آتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق ہر پہلی تاریخ کو بخار آتا ہے، پیر کی جلد کبھی صاف لیکن عام طور سے موٹی اور کھردری ہو جاتی ہے، کبھی جلد پھٹ کر اس سے رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے اور کبھی پیر کا چمڑا اس قدر دبیز، بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ انگلیاں چھپ جاتی ہیں، جملنا پھر نادر ہوتا ہے، شدید صورتوں میں پاؤں کی حس بھی باطل ہو جاتی ہے۔ غلیظ بلغمی کی صورت میں پیر کا رنگ سفیدی مائل اور چھونے میں نرم محسوس ہوتا ہے، اس کے برخلاف صوداوی غلطی کے غلبہ کی صورت میں رنگ تیرہ پھر سبزی مائل / نیلگوں اور اس کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، ملحوظ رہے کہ فلیریائی بیضہ زیادہ شدید عوارض پیدا کرتا ہے، کیوں کہ انس کی دہازت زیادہ ہوتی ہے، مریض کے (نامتھ بلٹا سمیٹا) میں فلیریائی کیڑے دیکھے جاسکتے ہیں، جس سے مرض کی تشخیص و تعیین میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، یہ دوران خون کی حالت جانب چلتے ہیں، دن میں خون کا شٹ کرنے پر کیڑوں کا پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ دن میں یا مریض کے جاگنے کی حالت میں، بڑے خدو میں چھپ جاتے ہیں لیکن جب مریض سو جاتا ہے تو چہل قدمی کرنے کے لیے عروق دھویہ میں آ جاتے ہیں، روشنی سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے بے چین، اور تیز روشنی میں سوئے مریض کے خون کا معائنہ کرنے پر ان کا پتہ نہیں چل پاتا اور یہ

بھاگ کر جسم کے بڑے بڑے غد میں چھپ جاتے ہیں،

اصول علاج

- خلط غالب کا تنقید کریں،
- حسب ضرورت قصہ کھولیں، سینگیھا کھینچیں، قے اور دوائیں استعمال کرائیں،
- ازالہ حمی اور رفع درد کی تدابیر کریں،
- ضعف کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں،

علاج

- غلبہ بلغم کی صورت میں نفع و تنقید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منضج بلغم :-

اسطوخودوس، بدسیاوشاں، ینخ کاسنی، ینخ کرفس، ینخ بادیان، ینخ اذخر،
بادیان، ہر ایک ۷ گرام، اصل السوس مقشرہ ۵ گرام، انجیر زردہ عدد، مویز منقہ ۹ عدد،
تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو خیف جوش دے کر
چھان لیں اور گلقد عسلی ۵ گرام، حل کر کے نوش کرائیں، تنقید کے لیے
یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل بلغم :-

سنبل الطیب، دارچینی، حب بلساں، عود بلساں، سینہ مصطکی رومی، ہندو عفران،
اسارون، ہر ایک ۱۰ گرام، صبر زرد بہم گرام، تر بد سیفہ، جب السنبل، غار بقون، انسون،
ہر ایک ۲۰ گرام، شحم منقل، نمک ہندی، ہر ایک ۵ گرام، تمام دواؤں کو
حسب دستور کوٹ چھان کر عرق بادیان میں کھل کر کے مونگ کے برابر گویاں بنائیں
اور ۷ گرام ہمراہ آب گرم استعمال کریں،

شبت، شہد، سرکہ، آب ترب با ہم ملا کر نوش کرائیں، یہ تے آور ہے،
 پیروں پر سینگیہاں کھینچیں،
 ○ غلبہ خلط سوداوی کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع سودا :-

بادرنجیویہ، گاؤ زبان، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۴ گرام، پر سیاوشاں ۵ گرام،
 شاہترہ، اسطوخودوس، بادیان، ہر ایک ۲ گرام، سپستان ۱۱ عدد، عناب ولایتی ۵ عدد،
 تمام دواؤں کو پانی میں چوش دے کر ترنجبین خراسانی، گلقد آفتابی،
 ہر ایک ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں، نسخ کے بعد تنقید کے لیے یہ نسخہ
 استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل سودا :-

ہلیلہ سیاہ ۳۰ گرام، بسفاج نیکوفہ ۵ گرام، فیتمون ولایتی، ۲ گرام، برگ سنابلی،
 اسطوخودوس، ہر ایک ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، بادرنجیویہ، برگ گاؤ زبان، ہر ایک
 ۹ گرام، بادیان، امیون، ہر ایک ۴ گرام، تر بد موصوف ۳ گرام، زنجبیل ۱۵ گرام،
 خربق سیاہ ایک گرام، تمام دواؤں کو پانی میں چوش دیں اور غاریقون مغزل
 لاجورد مغسول، تھرا دمنی، نمک سیاہ، ہر ایک ایک گرام پیس کر ملائیں اور نوش
 کرائیں، زیادہ قوی الاثر بنانا چاہیں تو صبر سقوطری اور شم حنظل،
 ہر ایک ایک گرام کا اضافہ کریں۔

مخالف جانب کی باسلیق کی فصد کھولیں،

تعلیق کریں،

○ غلبہ خون کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 سر بھوک، برہم ڈنڈی، برگ شاہترہ، گل سرخ، پوست ہلیلہ زرد، حم مشیز،
 کنٹھی، سندل سفید، دھایا، ہر ایک ۳ گرام، برگ حنا ۲ گرام، زہرہ سفید،

گل پچال، فلفل سیاہ، ہر ایک ایک گرام، برگ نیم، برگ بکائن، ہر ایک ۱۲ گرام، برگ حنا اور کشنیز کے علاوہ، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر محفوظ کریں اور برگ حنا، کشنیز کو پانی میں بھگو دیں اس کے بعد مل چھان کر سفوف میں ڈال کر گوندھیں اور پھنے کے برابر گویاں بنائیں اور ۲ — ۳ گویاں صبح کے وقت ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔ مخالف جانب کی باسیلیق کو فصد کھولیں،

مسکناات و معدلات خون استعمال کرائیں،

○ ————— خوردنی طور پر درج ذیل دوائیں سودمند ہیں
کندر ایک گرام، زنجبیل ۵۔۱۰ گرام پیس کر اطر یفل صغیر، گرام ملا کر کھلائیں،

سقولو قندریون، اسطوخودوس، ہیلہ سیاہ، ہیلہ زرد، افسنتین، ایتیمون، غافث، ہر ایک، گرام، ————— تمام دواؤں کو جوش دے کر نوش کرائیں،

پوست ہیلہ زرد، پوست ہیلہ سیاہ، پوست ہیلہ کابی، ہر ایک ۱۸ گرام، زنجبیل، فلفل سیاہ، کندر، ہر ایک، گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد کے قوام میں بھون بنا کر ۱۰ گرام روزانہ کھلائیں،

فلفل سیاہ، کندر، زنجبیل، ہر ایک ۱۰ گرام، قردمانا، تخم کر دیا، ہر ایک ۱۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو پیس کر سفوف تیار کریں اور ۱۰ گرام کھلائیں،
○ ————— خارجی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

صبر، مر، اقا قیا، پوست انار، ہموزا، کو سرکہ میں پیس کر ضاد کریں،
فلفل سیاہ، اجمود، تخم شبد، چوب چہن، باؤ بڑنگا، چوب نئے، ہموزا، تمام دواؤں کو پیس کر شہد میں ملا کر نیم گرم کر کے ضاد کریں۔

بودینہ نہری، سنار کی، تمل، تخم بار تنگ، مخز تخم بید انجیر ہوزن کو باریک۔
پیس کر شہد میں ملا کر ضاد کریں،

مرکی، اقا قیا، میرزدد، عصاره لجمۃ التیس، شب یمانی، _____ تمام
دواؤں کو سرکہ میں پیس کر لگائیں،

کنڈہ، اقا قیا، مرکی، تخم رطبہ ہوزن کو آب برگ سرو میں پیس کر ضاد کریں،
اقا قیا، رامک، عصاره لجمۃ التیس، مازو، گلنار، _____ تمام دواؤں
کو پانی میں پیس کر ضاد کریں،

شمر بھاؤ، خاکستر کرنی، بشک نر، آرد حلبہ، تخم ترب، جرییر ہوزن، _____
تمام دواؤں کو پیس کر روغن زیتون میں ملا کر لگائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Chohan

امراض شمع

Learn Unani By Abdul Wasil Salman

Learn Unani By Abdul Waris Salman

مختصر تشریح و منافع شعر

شعر (بال) جنس کے امتیاز میں مساوی ثابت ہوتے ہیں، بیشتر انسانی حصہ جسم پر کھوڑے بہت بال ضرور پائے جاتے ہیں جن کو ہم حصہ جسم کے اعتبار سے روئیں بھی کہتے ہیں، تاہم بعض ایسے بھی حصے ہیں جہاں بال / روئیں نہیں ہوتے مثلاً ہتھیلیاں اور تلوے، وغیرہ، اس کے برخلاف سر، زیر ناف اور نعل میں بال بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، مردوں میں سینے اور چہرے پر بھی بال بکثرت نکلتے ہیں۔

— ایک تخمینہ کے مطابق سر پر کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار بال ہوتے ہیں، سنہری بال والے لوگوں میں بال کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سر میں کم و بیش ایک لاکھ پینتالیس ہزار بال ہوتے ہیں، سرخ بالوں والے لوگوں میں سیاہ بالوں والے لوگوں کی نسبت بال کم اگتے ہیں لیکن دبازت (موٹائی) میں زیادہ ہوتے ہیں، بالوں کی اوسط عمر کا تخمینہ ایک ہزار چھ سو دن لگایا گیا ہے،

البا، قدیم کے نظریے کے مطابق بال کی تولید سوداوی مادہ سے ہوتی ہے اور اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں،

- (I) جسم میں خون صالح کی زیادتی،
 - (II) مزاج حار، رطوبت و بیہوشی معتدل،
 - (III) مسامات جلد کا وسعت و تفتیح میں معتدل ہونا،
- بالوں کی تکوین کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بدنی حرارت، تبخیر کے ذریعہ

رطوبات جسمانی سے دھانی بخارات کو جدا کر کے معتدل مسامات جلد تک پہنچاتی ہے اور وہاں بخارات، مسامات میں رک جاتے ہیں اور ان کے مائی اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں اور ان بخارات میں صرف اسی قدر رطوبت / مائیت باقی رہتی ہے جس سے بالوں کے سوداوی / دھانی اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں، اور چوں کہ حرارت جسمانی کے ذریعہ بتجیر رطوبات جسمانی کا یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے، اس لیے طبیعت اس دھانی بخار کو اندر سے باہر کی طرف خارج کرتی رہتی ہے اور اس طرح بال بتدریج بڑھتے رہتے ہیں،

جدید تحقیقات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ بال کی ساخت میں سینگ کے مادہ کے خلیات پائے جاتے ہیں اور جس مادہ سے جلد کا بالائی طبقہ بنا ہے اسی سے بال بھی بنے ہیں، اس کی بناوٹ سادہ سی ہے، اس کو لمبائی سے چڑنے پر درمیان میں نخاعی نوعیت کا مادہ نظر آتا ہے اور اس کے اُس پاس بال کا موٹا طبقہ ہوتا ہے، جس کو قشر (Cortex) کہتے ہیں، اس کے گرد ایک پتلا سا غلاف ہوتا ہے جس کو پوست کہتے ہیں، ان کی رنگت زیادہ تر نخاعی مادے اور قشر (Cortex) میں موجود ہوتی ہے، ان دونوں طبقات کے درمیان چھوٹے چھوٹے ہوائی جلیے بھی ہوتے ہیں، ————— بال کو دبازت (موٹائی) کے رخ پر کاٹنے سے اس کی شکل چیلٹی / میضوی نظر آتی ہے، سیدھے بال زیادہ گول اور گھنگرے یا لمبے بال زیادہ میضوی ہوتے ہیں، بال کے دو بڑے حصے ہیں،

(I) ظاہری حصہ

(II) باطنی حصہ (جو تحت الجلد انسجہ تک پہنچتا ہے)

بالوں کی جڑ کے گرد ایک کیسہ ہوتا ہے جو نیچے سے چوڑا اور اوپر سے تنگ ہوتا ہے، نیچے پینڈے میں تھوڑا سا ابھار بھی ہوتا ہے جس کو علمہ شعری (بال کا ابھار) کہا جاتا ہے، یہ ابھار بال کا زندہ حصہ ہے اور بال کے تمام نئے خلیات اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اور عروق دمویہ اور اعصاب بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، بالوں کی جڑ میں ایک غددی کیسہ (Follicle) بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جب بال کو جان بوجھ کر اکھاڑتے ہیں تو تمام ظاہری (مردہ حصہ) باہر نکل آتا ہے، اور اس کے اکھرے

ہوئے سرے کو خور سے دیکھنے پر سفید چھپچھپادے کا غلاف نظر آتا ہے، اس کو روٹ شیٹ (Root Sheat) کہتے ہیں، لیکن اس کا اندرونی حصہ (علم شعری) باہر نہیں آتا۔

ہر بال کی جڑ کے پاس ایک دہنی غدہ (Sebaceous Gland) ہوتا ہے جس سے روغن (دہنی) رطوبت نکل کر بالوں کو چکنا رکھتا ہے، بعض بال اس طرح کے بھی ہیں جن کے ساتھ دو دہنی غدہ ہوتے ہیں، اس کے دہن کو سی بلم (Cebum) کہتے ہیں، یہی رطوبت بال کے کیسہ دار غدہ سے مل کر بال کو پہنچتی ہے، بعض بالوں کے کیسہ دار غدہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عضلاتی ریشے بھی ہوتے ہیں، جو وقت ضرورت سکڑ کر دہنی غدہ سے زیادہ مقدار میں رطوبت خارج کرتے ہیں، ان میں سکڑنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے خوف، غصہ یا لرزہ کی حالت میں بال روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں،

بال کی نشوونما اور صحت کا دار و مدار درج ذیل تین امور پر ہے،
(I) خون کی کافی رسد،

(II) غدہ دہنیہ کی رطوبات کی بال کو قدرتی چکنائی کی فراہمی،

(III) بال کے جڑ کی اپنے کیسے سے شدید پیوستگی،

مذکورہ تینوں میں کسی بھی کام میں فرق آجانے سے بال گرنے لگتے ہیں یا دوسرے امراض شعر (بال کی بیماریاں) رونما ہوتے ہیں۔



* داء الثعلب

ALOPECIA AREATA

اس مرض میں گول چکٹے کی صورت میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں اس کے بعد داغ بن جاتے ہیں اور وہاں کے بال گر جاتے ہیں، یہ گول چکٹے عام طور سے سر میں ہی نمودار ہوتے ہیں، تاہم عضو کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو کر وہاں کے بال کو ختم کر سکتے ہیں، —————
 ملحوظ رہے کہ یہ مرض دارالجلد (سانپ کی بیماری) سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے ان دونوں امراض میں فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ دارالجلد میں گول چکٹے کے مقام سے بھوسی بھی جھڑتی ہے،

اسباب

(I) صفراء کا غلبہ / سودا / محترق / بلغم شور محترق کا زیر جلد اجتماع،

(II) غلیظ خون سے پیدا ہونے والے ردی اور فاسد مواد کا زیر جلد اجتماع،

(III) (بعض اطباء کے بقول) عصبی فتور،

* داء الثعلب = لومڑی کی بیماری، ام طور پر اس کو بالکلورہ کہتے ہیں،
 لے داء الثعلب = سانپ کی بیماری، کیونکہ اس سانپ کی کچھول کی طرح
 بھوسی / جلد جھڑتی ہے،

علامات

ابتداء میں جلد کے متاثرہ حصہ پر سرخی نمودار ہوتی ہے، کچھ عرصہ بعد وہاں، گول، دائرہ کی شکل میں چھوٹی چھوٹی بھینسیاں نکل آتی ہیں، مادہ کے اعتبار سے ان میں مختلف رنگوں کی رطوبت بھری ہوتی ہے، بعد میں یہ خشک ہو جاتی ہیں اور وہاں کا بال گرنے لگتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد نکلنے کے برابر بال غائب ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ اسی طرح کے دھبے دوسری جگہوں پر بھی نمایاں ہو کر بالوں کو گراتے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو بال تھوڑا (بال کھایا ہوا) کہا جاتا ہے، اگر بھینسیوں کے خشک ہونے کے بعد وہاں سے بھوسی جھڑنے لگے اور اس کے بعد بال گریں تو اس کو طبی اصطلاح میں داء الحید کہتے ہیں،

اصول علاج

- خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- حسب ضرورت فصد کھولیں،
- تنقیہ کے بعد کھردرے کپڑے سے رگڑ کر مناسب روغن لگائیں،
- مقررہ دوائیں لگائیں تاکہ زخم پر کرم مقامی دوران خون میں اضافہ ہو جائے اور وہاں تغذیہ کی راہ ہموار ہو جائے۔

علاج

- غلیظ سودا کی صورت میں درج ذیل منفعی و مسہل و تبرید کا نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفعی سودا :-

شامترہ، بادیان، اسطوخودوس، ہر ایک، گرام، پر سیاوشاں، گرام، گاڈ زبان،
اسٹیم، اصلا، السوس، مقشہ، ہر ایک، گرام، سیستان، اجدد، عناب ولایتی، اجدد،

تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر گلقد آفتابی ۵۰ گرام
 حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، جب نفج کے آثار نمایاں ہو جائیں
 تو یہ نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل سودا :-

ایا راج فیقرا ۵۰ گرام، تربد موصوف مقشر ۹ گرام، خاریقون مغربل، حب البیل،
 ایسون، ہر ایک ایک گرام، صمغ عربی، کیترا، گل سرخ، مصطکی رومی، نمک ہندی، ہر ایک
 ۵۰۰ ملی گرام، مقل اذرق ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر روغن بادام
 ۹ گرام میں چرب کریں اور آب مقل کے ہمراہ دازہ مسود کے برابر گولیاں بنائیں، $\frac{1}{4}$
 گولی رات کو اور باقی $\frac{1}{2}$ صبح کو نہار منہ کھلائیں،
 مسہل کے طور پر یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں

بلید سیاہ ۳۰ گرام، بسفا سنج نیمکوفہ ۵۰ گرام، برگ سنار کی، اسطوخودوس، ہر ایک
 ۲۱ گرام، اقیصون ولایتی، ۲ گرام (پوٹلی میں بندھی ہوئی)، گل سرخ، ۱۲ گرام، گاؤ زبان،
 برگ بادرنجبویہ، ہر ایک ۹ گرام، ایسون، بادیان، ہر ایک ۹ گرام، تربد موصوف ۳ گرام،
 زنجبیل ۵۰ گرام، خربق سیاہ ایک گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش
 دے کر مل چھان لیں اور خاریقون، حجار منی، لاجورد مفسول، نمک سیاہ، ہر ایک ایک گرام،
 باریک پس کر ملائیں اور نوش کرائیں، اگر مزید قوی بنانا چاہیں تو
 صبر مقوٹری، شہم خنظل، ہر ایک ایک گرام کا بھی اضافہ کر دیں۔

○ تنقیہ صفراء کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں

گل بنفشہ، نیلوفر، کاسنی نیمکوفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عتاب ولایتی ۲۱ عدد، برگ سنار کی،
 ۱۵ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو شیر خشک
 (حسب ضرورت) کا اضافہ کر کے نوش کرائیں،

اگر مذکورہ بالا نسخہ سے تنقیہ نہ ہو رہا ہو تو منفعج کا نسخہ استعمال کرانے کے بعد
 مسہل صفراء دیں، نسخہ منفعج، درج ذیل ہے،

نسخہ منفع صفر ۱ :-

گل بنفشہ، گل سرخ، مکو، خشک، تخم خطمی، شاہترہ، تخم کاسنی، نیکوفتہ، ہر ایک ۵ گرام، گل نیلوفر ۵ گرام، آلو بخارا، عناب، ہر ایک ۵ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقدار آفتابی / غیرہ بنفشہ ۲۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، ۵، ۶ دن بعد مذکورہ بالائے نسخہ، یا نسخہ منفع کے ساتھ درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

مغز فلوس خیار شبنم ۵ گرام، ترنجبین خراسانی، تمر ہندی مقشر، ہر ایک ۵ گرام، بھگو لیں اور صبح کو مل چھان کر نسخہ منفع میں حل کر کے شیرہ مغز بادام ۵ عدد کا اضافہ کر کے نوش کرائیں، تیرید کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تیرید :-

لعاب بہدانہ ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپتول مسلم، ۶ گرام چھراک کر نوش کرائیں۔

○ خون سردی مواد کے تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں
چوب چینی، برگ شیشم، ہر ایک ۲۵ گرام، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، عناب، ہر ایک ۶۰ گرام، برگ سنار کلی ۳۶ گرام، تمام دواؤں کو بھگو کر کے رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر مل چھان کر ترنجبین، شیر شست، شکرہ، ہر ایک ۸۰ گرام ملا کر شربت کا قوام بنائیں اور ۵۰ ملی لیٹر، ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں،

○ خارجی طود پر درج ذیل تدابیر / نسخہ جات استعمال کرائیں،
صفر ای خلط کے تنقیہ کے بعد، گرم سرکہ میں کپڑا بھگو کر بالآخرہ پر تکمید کریں، اس کے بعد روغن گل لگائیں، گندھک کو سرکہ میں باریک پیس کر لپیٹ کریں۔

سوداوی خلط کے تنقیہ کے بعد پیاز اور لہسن سے بالخورہ کو خوب دگر لیں اس کے بعد ریچھ، شیر کی چربی سرکہ میں ملا کر لگائیں، ————— گوکھرو، خردل، یخ نے کو باریک پیس کر بکری کے بال سوختہ میں ملا کر لگائیں،

بلغھی خلط کے تنقیہ کے بعد کھردے کپڑے سے مقام مرض کو رگڑ کر خردل، لہسن باریک پیس کر ضاد کریں۔

غلظت خون کی صورت میں تنقیہ کے بعد مقام مرض کو کپڑے سے رگڑ کر پیاز، لہسن، خردل، فرقیون ہوزن، باہم پیس کر ضاد کریں۔

○ ————— درج ذیل نسخجات بھی مفید ہیں،

ابہل کو سرکہ میں خوب ملا کر مقام مرض پر لگائیں،

پیاز، نظرون، دونوں کو باریک کپڑے میں باندھ کر مقام مرض پر خوب دگر لیں کہ خون نکل آئے، ————— چند بار کے حل سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا،

بھنگرہ کے درخت کے تنے کے پانی میں اصل اسوس پیس کر ضاد کریں،

پوست یخ انجیر، کف دریا، دونوں کو باریک پیس کر لیپ کریں،

مغز حب السلاطین، آب لیموں، آب ادکب میں پیس کر لگائیں،

بکری کی کھر سوختہ کو سرکہ / شراب میں پیس کر ضاد کریں،

قسط، قطران، شہد کو باہم ملائیں اور پیس کر ضاد کریں۔

زفت، بورق، یخ نے خاکستر، ہوزن باریک پیس کر روغن زیتون میں حل کر کے لگائیں،

زنجبیل، نوشادر، دونوں کو پانی میں باریک پیس کر لگائیں،

کندھ، ہڑتال، روغن زیتون میں باریک کر کے باہم ملا کر لگائیں،

نوشادر کو شہد میں ملا کر لگائیں،

گھونگے کے گودے کو روغن تلخ میں اس قدر جلالتیں کہ سیاہ ہو جائے، اور اسے

روغن کو بالخورہ پر لگائیں، ————— مجرب ہے۔



انتشار شعر

PTILOSIS

اس مرض میں سر، ابرو اور داڑھی کے بال بھڑنے لگتے ہیں اور یہ کیفیت نام طور سے متعلقہ اعضا کے ہر حصے میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے،

اسباب

- (۱) بعض حاد / مزمن / متعدی امراض کی وجہ سے بالوں کے تغذیہ میں فتور واقع ہونا
- (۲) غلہ / رطوبت کی وجہ سے مسامات بدن کا کشادہ ہو جانا / غلبہ بیوست کی وجہ سے بدن کے مسامات کا تنگ ہو جانا
- (۳) جلد کے نیچے فاسد مواد کا اجتماع
- (۴) سفع / لغار / قھپ / داد
- (۵) قروح
- (۶) بعض اوقات خلقی طور پر
- (۷) عام جسمانی ضعف و تعاقب / بڑھاپا
- (۸) جسم میں بعض حیاتیات (حیاتیات ۱، ۲، ب، کی کمی -

علامات

بالوں کا بھڑنا / گرنا ہی سب سے بڑی علامات ہے تاہم سبب کی تعیین کے لیے

* تساقط شعرہ بال کا گرنا *

بعض بیماریات ذہن میں رہنا ضروری ہیں مثلاً حاد/مزمن/متعدی امراض کی صورت میں ان کا قدمہ کے طور پر پایا جانا ضروری ہے، اور مرلین لائٹ اور کمزور دکھائی دیتا ہے، غلبہ رطوبت کی صورت میں، رطوبت کی دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں، نیز جلد ملائم، بال نرم و نازک ہوتے ہیں اور ان میں گرنے کا رجحان بھی بہت تیز ہوتا ہے، غایبہ پوست کی صورت میں خشکی کی عام دوسری علامتوں کے ساتھ جلد کثیف ہوتی ہے، بال دبیر اور نمایاں ہوتے ہیں، زیر جلد فاسد مواد کے اجتماع کی صورت میں اس فاسد مواد کی اپنی علامتوں کے ساتھ جلد کا طبعی رنگ، بھی متغیر ہو جاتا ہے،

موروثی/مولودی طور پر یہ مرض نادر الوقوع ہے تاہم بعض ایسے بچے دیکھے گئے ہیں جن کو پیدائشی طور پر یہ مرض تھا، ایسی صورت میں مرض بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے بلکہ مہینوں برسوں کے بعد ہی مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے، عام جسمانی ضعف و نقاہت کی صورت میں بالوں کے گرنے کا عمل بہت تیز ہوتا ہے، بڑھاپے کی صورت میں ابتداً کینٹھی اور چند یا کے باریک ہونے لگتے ہیں اس کے بعد گرتے ہیں، یہ صورت عام طور سے علاج پذیر نہیں ہوتی۔

اصول علاج

○ حاد/مزمن/متعدی امراض کی صورت میں، ان کا علاج کریں، اس کے بعد حسب ضرورت مرطبات اور مقویات استعمال کرائیں،

○ غلبہ رطوبت کی صورت میں قابضات اور غلبہ پوست کی صورت میں مرطبات استعمال کرائیں،

○ زیر جلد فاسد مواد کا اجتماع ہو تو، مواد کی رعایت سے تنقید کریں،

○ سسوقہ/بفا/مجویہ/داد— وغیرہ جلدی اور شعری امراض، اس سبب، دوائ تو ان کا انداز کریں، اور جسمانی صفائی اور طہارت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کریں،

- ————— تعدیل مزاج کریں۔
 ○ ————— عام جسمانی ضعف و نقاہت کی صورت میں مقوی اور مسمن
 (فرہبی لانے والی) دوائیں اور غذائیں استعمال کرائیں،
 ○ ————— حسب ضرورت نمردوائیں مقامی طور پر لگائیں۔

علاج

- ————— اگر بعض دوسرے امراض کے نتیجے میں یہ مرض پیش آیا ہو تو ان امراض
 کے علاج کی طرف متوجہ ہوں،
 ○ ————— غلبہ رطوبت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 اُرد ترید موصوف ۸ گرام، حب النیل بریاں ۴ گرام، پوست ہلید زرد، زنجبیل،
 ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن بادام ۱۳۲ ملی لیٹر میں
 چرب کریں اور مغز بادام شیریں ۲۲ عدد، نبات سفید (مصری) ۵ گرام ملا کر دوبارہ معمولی
 باریک کریں اور ۱ — ۲ گرام استعمال کرائیں، دو تین دست آئیں گے۔
 یہ نسخہ بھی فید ہے۔

ہلیلہ کلاں، زرد چوب، نمک لاہوری، ہوزن، تمام دواؤں کو پیس کر شیرہ حنظل
 میں تین دن کھل کریں اور جنگلی پیر کے برابر گولیاں بنائیں اور ۱ — گولیاں کھلائیں،
 اس کے تین گھنٹے بعد روغن کچڑی کھانے کی ہدایت کریں،
 زنجبیل ۲ گرام، گل سرخ، اصل السوس، ہر ایک ۴ گرام، ترید، برگ سنارکھی،
 ریوند خطائی، ہر ایک ۸ گرام، حب النیل ۵ گرام، نبات سفید، تمام دواؤں کے برابر
 ————— حسب دستور ان کا سفوف تیار کریں اور ۹ گرام تک کھلائیں۔

خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 ہلیلہ کابلی، مازو، اقا قیا کو پانی میں جوش دے کر سریا متاثرہ حصہ پر بطول کریں،
 نیز خشک ہونے کے بعد روغن املہ روغن اُس کی مالش کریں۔
 غلبہ رطوبت کی صورت میں یہ نسخہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔
 نیل الطیب، ہیلی خورد، سلینو، قرفل، سعد کوئی، زنجبیل، فلفل سیاہ، فلفل دراز،

قسط شیریں، عود بلساں، اسارون، تخم مورد، چرانتہ شیریں، دانت صینی، خوبان، زعفران، ہر ایک ۲۰ گرام، مصطکی رومی ۵۰ گرام، _____ مصطکی کو علاحدہ باریا کریں، زعفران کو عرق گلاب میں سمیٹ کر میں اور باقی تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے نبات سفید اکیلو گرام کے قوام میں حسب دستور ملا کر جوارش بنائیں اور ۶ - ۹ گرام ہمراہ عرق کاؤ زبان، صبح کے وقت ناشتہ کے بعد کھلائیں۔

○ _____ غلبہ سبوست کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،
مغز تخم کدو، مغز تخم کاسو، مغز بادام شیریں، مغز نیارہوزن، _____ پانی میں پیس کر ان کا شیرہ نکالیں اور مرین کو نوش کرائیں،
گائے کے دودھ میں شکر ملا کر نوش کرائیں / گدھی کا دودھ پلائیں / مار ابلجن نوش کرائیں،

خارجی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں،
روغن بابونہ / روغن بادام کی مالش کریں
شیخ سوختہ، بادام بریاں، روغن زیتون میں پیس کر مقام مرض پر لگائیں،
سرکہ خلی، اسپغول، برگ بید سادہ کو پانی میں بھگو کر سر / متاثرہ حصہ پر صاف کریں،
○ _____ جسمانی نقاہت کی صورت میں مقوی غذائیں استعمال کرائیں،
○ _____ اگر بالوں کی جلد کی طرف، ان کا غذائی جوہرہ منجذب ہو رہا ہو تو حمر اور جاذب کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

برگ خلی، برگ حنا کو پانی میں جوش دے کر سردھوئیں، اس کے بعد کسی کپڑے سے خشک کر کے خروال کو سر کریں پیس کر لگائیں،
روغن خردل، روغن گل باہم ملا کر لگائیں،

پوست دخت انجیر، برگ انجیر، سمندر جھاگ سوختہ، ہر ایک ۱ گرام، فریون ۱۲ گرام، _____ تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب چاڑ میں حل کر کے لگائیں اور ۸-۱۰ دن بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں،

در اوندہ حرج، لادن، مورد، رسوت، افسنتین سوختہ، ہر ایک ۴ گرام، _____ تمام دواؤں کو خوب باریک کر کے آب کوہ سبز میں حل کر کے لگائیں۔

○ ————— یہ نسخے بھی مفید اور مجرب ہیں ،
 عصارۂ کونبہ میں برگ خنایس کمرنگائیں ،
 حب الّاس کو شراب قابض میں جوش دے کر طلاء کریں ،
 کندر ، مازو ، ہر ایک ۵۰ گرام ، مصطکی ۳۰ گرام ، قردمانا ، مرکی ، ہر ایک ۱۰ گرام ، لاون
 ۵۰ گرام ، ————— تمام دواؤں کو خوب باریک کر کے چھان لیں اور روغن گل میں
 حل کر کے لگائیں ،
 وسمہ ۱۳ گرام ، برگ مورد ۵۰ گرام کو دلیٹر پانی میں جوش دیں ، جب نصف رہ جائے
 تو ۵۰۰ ملی لیٹر روغن کنجد کے ساتھ پکائیں ، جب پانی اڑ جائے تو اس میں لاون ۵۰ گرام
 حل کر کے لگائیں ۔



تشقق شعر

SPLITTING OF THE HAIR

اس مرض میں بالوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے سرے دو یا متعدد حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں،

اسباب

- (۱) سور مزاج یا بس / غلبہ سودا
- (۱۱) خشک غذاؤں کا بکثرت استعمال
- (۱۱۱) بلغم شور
- (۱۲) دھوپ میں زیادہ چلنا پھرنا
- (۱۳) شور زمین کی گرد و غبار کا جسم پر پڑتے رہنا
- (۱۴) مختلف کیفیت کے پانی، مثلاً آب شور، آب شیریں، آب حار، آب بارد کا یکے بعد دیگرے جسم پر پہنچنا

علامات

بال سخت اور بے آب (بے رونق) ہو جاتے ہیں، اس کی نشوونما بھی رک جاتی ہے، سرے پر پھٹ جاتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، جسم کے دوسرے اعضاء پر بھی غلبہ پوست کی علامات پائی جاتی ہیں،

اصول علاج

- جسم میں رطوبت پہنچانے کی تدابیر کریں،
- سوداوی خلط کا تنقیہ کریں،
- فصد کھولیں،
- بالوں کو نرم کرنے والے روغن لگائیں،
- خشک غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کرائیں،

علاج

○ -- ابتدا میں جسم کی تربیب کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 گاوڑ زبان ۳ گرام، گل گاوڑ زبان، کشیز مقشر، برشم خام مقرض، بہمن سرخ، بہمن سفید
 صندل سفید، تخم بانگو، تخم فرنجشک، بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۲ گرام، --- تمام دواؤں
 کو میٹر پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر چھان کر ۱۲۰۰ گرام شمار
 لیا کر قوام بنائیں اور ۱۰ گرام عرق گاوڑ زبان یا ورق نقرہ ایک عدد ملا کر،
 اس کے بعد شیرہ عناب ۵ عدد، شیرہ مغز تخم کدوئے شیریں، شیرہ
 مغز تخم تربوز، ہر ایک ۵ گرام، پانی میں نکال کر نوش کرائیں،
 جب جسم میں تربیب پیدا ہو جائے تو سودا کے نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں

نسخہ منفع :-

اسطوخودوس، برگ بادرنجبویہ، ہر ایک ۴ گرام، عناب ۵ عدد، گاوڑ زبان،
 ایتیمون ولایتی، بسفاج فسفی، ہر ایک ۵ گرام، گل گاوڑ زبان ۳ گرام، برگ شاہترہ،
 ۶ گرام، --- تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل
 چھان کر مکلفدہ ۲ گرام حل کر کے، دن تک نوش کرائیں، جب نفع کے آثار
 نمایاں ہونے لگیں تو اسی نسخہ میں درج ذیل ادویہ مسہلہ کا اضافہ کریں،

نسخہ سہل :-

معزز فلوس خیار شیرہ ۵ گرام، مٹی سرخ ۹ گرام، سنار مٹی ۱۳/۵ گرام کو پانی بھگو کر حسب دستور مل چھان کر شیرہ معز بادام ۹ عدد نکال کر ملائیں اور ادویہ منفیجہ کے ساتھ نوش کرائیں، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو رات کے وقت جب ایتھون کھلا کر صبح کو مذکورہ بالا نسخہ استعمال کرائیں،

○ تنقیہ کی غرض سے قصد بھی کھول سکتے ہیں،

○ اگر خامی حرارت / بیہوشی کا سبب ہو تو مرطب ادویہ مثلاً شیرہ معز تھم کدو، شیرہ معز تخم خربزہ، ہر ایک ۵ گرام، شیرہ عنا، ۵ عدد آب، کدو میں نکال کر نوش کرائیں۔
- مرطب غذائیں مثلاً بکری / گدھی کے دودھ ملیں حسب ضرورت شکر ۲۰ کر کے نوش کرائیں،

○ مزاجی طور پر درج ذیل دوائیں استعمال کرائیں،

دوغن بنڈہ / دوغن بادام شیریں بالوں میں لگائیں،
ادب، خطی / ادب، تخم ریحاں / لعاب اسپغول / لعاب برگ، بید لگائیں،
برگ، کنجد کو جوش دے کر اس جو شانڈہ سے سرد ہوئی،
بیخ نیافر خشک، ہاریا ملیں کر سر میں لگائیے،
اسپغول کو دوغن بنفشہ میں ملا کر سر پر باندھیں اور ۲-۲ گھنٹہ بعد سر کو دھوئے
کی ہدایت کریں۔

برگ، شند، الو، ادب، خطی، باہم ملا کر جوش دیا، اور ۲-۲ گھنٹہ بعد سر کو دھوئے،
نمکیں، اور ۲-۲ گھنٹہ بعد سر کو دھوئے،
استعمال کریں۔

○ استعمال کریں۔




صلع

BALDNESS

اس مرض میں سر کے اگلے حصے کے بال گر جاتے ہیں اور کنبٹی وغیرہ کے بال موجود ہوتے ہیں۔

اقسام



اسباب

- (I) کثرت حرارت قلب
- (II) کثرت جماع
- (III) کثرت مطالعہ
- (IV) غلبہ بوسست
- (V) بعض امراض مثلاً — آتشک، جذام، اوزیمیا مخاطی، ذیابیطس، سل ووق،
- (VI) حیاتیات، ب، کی کمی / فقدان
- (VII) غدہ درقیہ / غدہ خایمہ کے ہارمون کی پیدائش میں نقص
- (VIII) عام جسمانی ضعف
- (IX) ادویات مثلاً — کھیلیم ایسی ٹیٹ (Thallium Acetate)
- (X) ہائیڈنٹوائن (Hydantoin)
- (XI) بعض کھچھوند (Fungus)
- (XII) درات
- (XIII) بڑھاپا

علامات

(۱) عمومی :-

سر کے اگلے حصہ کے بال اڑ جاتے ہیں اور چند بال بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف عام طور سے کینٹی پر بال موجود ہوتے ہیں،

(ب) خصوصی :-

(I) خلقی :-

یہ صورت شاذ و نادر پیش آتی ہے، بال، نوزائیدہ کے بالوں کی طرح ہوتے ہیں، نہ صرف سر بلکہ زیرناق، بغل ابرو اور چہرے وغیرہ پر بھی بال نہیں ہوتے، بلکہ راسخ،

میں بھی نقص موجود ہوتا ہے، مرض بہت دیرے دیرے ترقی کرتا ہے،

(II) اکتسابی :-

(I) شیخوخی :-

بالوں کے اڑنے کا عمل سر کی چوٹی سے شروع ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ سر کے بالکل بالائی حصہ پر ایک بال بھی باقی نہیں رہتا، تاہم غلظت محدودہ (Occipital Bone) پر بال موجود ہوتے ہیں۔

(II) ہرنی :-

اس میں قبل از وقت بال گر جاتے ہیں اور جلدی امراض، دماغی تفکرات شدید جی، وغیرہ اسباب کے قدمہ کی روئیداد ملتی ہے، صلع شیخوخی کی طرح اس کی بھی ابتدا سر کی چوٹی سے ہوتی ہے، اس کی سبب سے بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ سبب کے ازالہ کے بعد یا از خود یہ مرض دور ہو جاتا ہے اور بال اگ اُتے ہیں،

(III) قزعی :-

بالوں کے اڑنے کی صورت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ابتدا میں بال گول، دائروں میں بھڑکتا ہے، یہ دائرہ نہایت بے ترتیبی سے پھیلتا جاتا ہے اور پھر یہ ایک دوسرے سے مل کر بہت بڑے حصے کو بے ترتیبی سے گھیر لیتے ہیں، دائروں کے کنارے پر بال بہت کمزور اور سیدھے ہوتے ہیں دائرہ کے اندر کی جلد ہموار اور بالکل صاف ہوتی ہے،

اصول علاج

○ حرارت اور یوسٹ کے غلبہ کی صورت میں مبردات اور عطیات استعمال کرائیں،

○ امراض حادہ / مزمنہ / متعدیہ اس کا باعث ہوں تو ان کا علاج کریں،

○ ————— جیاتین کے نقص کی صورت میں، حسب ضرورت جیاتین کا غذاؤں میں اہتمام کرنے کی ہدایت دیں،

○ ————— غدہ درقیہ / غدہ نخامیہ کے ہارمونز کی تولید کے لیے متعلقہ ادویہ استعمال کرائیں،

○ ————— مقویات و مفرحات استعمال کرائیں،

○ ————— اگر دواؤں کے رد عمل سے یہ مرض عارض ہو تو ان کا استعمال روک دیں،

○ ————— پیرائز سالی (بڑھاپا) سبب ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے،

○ ————— معدہ کی اصلاح کریں اور غذاؤں کے ہضم پر مکمل توجہ دیں،

علاج

○ ————— آب انار شیریں، آب انار ترش، ہر ایک ۵۰ ملی لیٹر، قند سفید، ۵۰ گرام، آب نعناع سبز ۵۰ ملی لیٹر، پوست بیرق پست، پوست تریج، مصطکی رومی، سنبل الطیب، دانہ ہیل خورد، دانہ ہیل کلاں، جلا شیر گود، زردود، کشنیز خشک، ہر ایک ۵۰ گرام، خود خام، وج ترکی، ہر ایک ۲۵۰ ملی گرام، پانیوں میں قند سفید ملا کر قوام بنائیں اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر حسب دستور ملا کر جوارش تیار کریں اور ۵ گرام بعد غذا ہمراہ عرق گاؤ زبان / پانی استعمال کرائیں، ————— حرارت اور سوزش میں مفید ہے،

یہ نسخہ بھی تجرب ہے،

شیرہ تخم خیارین، شیرہ مغز کدوئے شیریں، ہر ایک ۸ گرام کو پانی میں نکال کر نوش کرائیں، اس کے بعد بکری / گدھی کا دودھ پلائیں،

○ ————— عام جسمانی ضعف / غم و فکری صورت میں درج ذیل مقویات و مفرحات استعمال کرائیں،

تخم بابونہ ۸ گرام، زنجبیل، فلفل سیاہ، شیطرح ہندی، زرد آوند، حرج، یخ بابونہ، مغز چلوڑہ، نار جیل تازہ، ہر ایک ۵۰ گرام، مویز منقہ ۱۰۸ گرام، —————

تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر، شہد تمام دواؤں کے دو گنا کے قوام میں ملائیں اس طرح حسب دستور متحون بنائیں اور صبح کو، گرام ہمراہ آب تازہ کھلائیں، یہ نسخہ بھی مفید ہے،

بہمن سفید، بہمن سرخ، ہر ایک ۵۰ گرام، ثعلب مہری، آفاقا، سعد کوفی، جانقل، تخم شبت، ہر ایک ۳۰ گرام، کندر، مایہ شتر احرابی، ہر ایک ۸۰ گرام، شاہداز، زعفران، بونجان، ہر ایک ۱۲ گرام، عاقر قرحا، شاہ بلوط، ہر ایک ۶ گرام، ورق طلا، فلول، ایک گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر کھلیں اور قند سفید، شہد مصفی، ہر ایک ۲۶۰ ملی لیٹر / گرام ترنجبین ۵۰ گرام کا قوام بنا کر اس میں حسب دستور متحون بنائیں اور ۳ - ۶ گرام ہمراہ شیر گاؤ استعمال کرائیں،

○ ————— خامو جی طور پر درج ذیل نسخجات استعمال کریں،

بر سیاہ شاں، برگ آس، پلومت درخت صنوبر، کندر، ہر ایک ۳۰ گرام، ————— تمام کو بر ملا کر کے لادون، سرکلی، ہر ایک ۲۰ گرام، شراب کہنہ، روغن مولیٰ میں باریک پیسیں اور رات کے وقت سر پر لگائیں اور صبح کو دھوڈا لٹنے کی ہدایت کریں، مازو، ہلید سیاہ، برگ مورد ہموزن کو شراب میں اس قدر جوش دیں کہ یگل جائیں اس کے بعد روغن زیتون ۵۰۰ ملی لیٹر میں لادون ۳۰ گرام، مصطکی ۱۰۰ گرام ڈال کر پکائیں پھر چھان کے پہلی دواؤں کو ملا کر جوش دیں، جب شراب اڑ جائے تو اتار لیں اور روغن کو رات کے وقت سر پر لگائیں اور صبح کو برگ آس کے جو شانڈہ سے دھونے کی ہدایت کریں، شیر زن، روغن بنفشہ، آب کدو، آب بید ہموزن، ناک میں چپکائیں -



* شیب

CANTIES

اس مرض میں سر، دالہی اور مونچھ کے بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں اور مریض، جوان ہونے کے باوجود بوڑھا نظر آتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔
محوظ رہے کہ اطباء نے ہم سال سے قبل بالوں کے سفید ہو جانے کو مرض کے زمرے میں شمار کیا ہے،

اقسام

شیب

Canties

شیب غیر طبعی

Fals Moriness.

شیب طبعی

Real Moriness

* شیب = بڑھاپا - Moriness

اسباب

- (۱) حرارت غریزیہ کا ضعف / بلغمی رطوبات کی زیادتی / نزلہ دماغی
- (۱۱) ترش اور مرطوب غذاؤں کا بکثرت استعمال
- (۱۲) مضر غذائوں کی کمی
- (۱۳) حاد، مجفف، محرق امراض
- (۱۴) انفعالات نفسانی مثلاً — فکر و تردد، خوف و غم، اعصابی و روحانی صدمات
- (۱۵) عام بدنی ضعف
- (۱۶) وراثت
- (۱۷) سینہ و ر کے استعمال سے رد عمل کے طو پر

علامات

شیب طبعی چونکہ مرض نہیں ہے، اس لیے صرف شیب غیر طبعی یہاں زیر بحث ہے، مرض کا اثر رفتہ رفتہ ہوتا ہے چنانچہ ابتدا میں سر کے کچھ بال سفید ہوتے ہیں پھر اس کا دائرہ اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اور موچھ تک پہنچتا ہے اور کچھ عرصہ بعد سر کے بال بالکل سفید اور داڑھی و مونچھ کے بال بہت زیادہ سفید ہو جاتے ہیں، مریض کی روئیداد سے سبب مرض کی تعیین بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، بعض اس طرح کے واقعات بھی مشاہدے میں آئے ہیں کہ صرف چند ہفتے بلکہ دو، ایک دن میں ہی بال سفید ہو گئے، بعض اوقات سینہ و ر لگانے سے بھی بال ایک رات میں ہی سفید ہو گئے۔

اصول علاج

- ایلجات اور مقیات (تے اور دوائیں) سے تنقید بدن و دماغ اور زائد رطوبتوں کا اخراج کریں۔
- نزلہ و غیرہ کے ازالہ کی تدابیر کریں۔
- رطوبتوں کو خشک کرنے کے لیے معتدل مجفف دوائیں استعمال کریں،

○ گرم اور قابض روغن استعمال کرائیں،
○ بلغمی غذاؤں اور کثرتِ مباحثت سے احتراز کی تاکید کریں۔

علاج

○ تنقیہ رطوباتِ بلغمی کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
آرد تربید موصوف ۸ گرام، حب الفیل بریاں ۳ گرام، پوست بلیلہ زرد، زنجبیل،
ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر میں چرب کریں اور
مغز بادام ۳۲ عدد، نبات سفید ۵ گرام ملا کر ۴ گرام استعمال کرائیں،
زنجبیل ۳ گرام، گل سرخ، اصل السوس، ہر ایک ۲ گرام، برگ سنار کی، تربید یونڈ خطائی
ہر ایک ۲ گرام، حب الفیل ۵ گرام، شکر تری بخورن جملہ ادویہ، تمام دواؤں
کو سفوف کی طرح باریک کر کے ۲ گرام تک استعمال کرائیں،
تے لانے کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،
تخم ترب، گرام، تخم شبت ۳ گرام، نمک طعام ۲ گرام، تمام دواؤں
کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر کھلائیں، اگر اس سے تے نہ ہو تو گرم پانی
نوش کرا دیں،

یہ نسخہ بھی مفید ہے،
اصل السوس مقشر نیمکوب، تخم شبت، ہر ایک ۲ گرام، تخم خبازی ۲ گرام، آتش جو
۱۲ ملی لیٹر، تمام دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے
تو پھر مل چھان کر شربت افیمون ۲ ملی لیٹر حل کر کے سرکہ انگوری سے ترش کر کے نوش کرائیں،
تنقیہ دماغ کے لیے یہ نسخہ بھی مجرب ہیں،

پوست بلیلہ زرد، پوست بلیلہ کاہلی، پوست بلیلہ سیاہ، پوست بلیلہ، آملہ منقی،
ہر ایک ۲۰ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر باریک کریں اور روغن بادام
شیریں ۱۰۰ ملی لیٹر میں چرب کریں، برگ سنار کی، بسفاج فستقی، مصطکی
اسطوخودوس، افیمون، تربید سفید، ہر ایک ۲۰ گرام، مصطکی کو علاحدہ کھل کریں
اوساق، دواؤں کو ایک ساتھ باریک کر کے کپڑے میں بھان لیں، کشمش، میوز منقی ہر ایک

۲۰ گرام علاحدہ سے باریک کر لیں، شکر ایک کلوگرام کا قوام بنا کر حسب دستور
 اطرِ یفل تیار کریں اور ۶ — ۲۰ گرام ہمراہ حق بادیان صبح یا بوقت خواب استعمال کرائیں،
 تر بد سفید، کشنیر خشک، ہر ایک ۵۰ گرام، پوست ہلیلہ کابلی، پوست ہلیلہ زرد،
 پوست ہلیلہ سیاہ، سقونیا مشوی، گل بنفشہ، ہر ایک ۵۰ گرام، پوست ہلیلہ، لمبا شیر، گل سرخ،
 گل نیلوفر، ہر ایک ۱۲۵ گرام، مندل سفید، کیترا، ہر ایک ۵۰ گرام، روغن بادام شیریں
 ۵، ملی لیٹر، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام میں چرب کریں، —
 اس کے بعد سپنتاں، عناب، ہر ایک ۱۰۰ عدد، گل بنفشہ ۲۵ گرام، ۲ ملی لیٹر پانی میں
 جوش دیں، جب پانی نصف رہ جائے تو چھان کر اس میں شہد ۳۰۰ ملی لیٹر، شیرہ مرئی ہڑ
 ۵۰ ملی لیٹر ملا کر قوام تیار کریں اور باقی چرب کردہ دوائیں ملا کر اطرِ یفل تیار کریں اور ۶ گرام
 بوقت خواب ہمراہ آبِ نازہ استعمال کرائیں،

بعض الجبار درج ذیل نسخے استعمال کراتے ہیں،

ہلیلہ سیاہ ۳۰ گرام، ہلیلہ ۵۰ گرام، فلفل سیاہ ۵۰ گرام، زنجبیل، گل سرخ،
 دج تمکی، ہر ایک ۵۰ گرام، کندر، لمبا شیر، ہر ایک ۱۴ گرام، مندل، کاسنی،
 ہر ایک ۹ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر ہلیلہ مرئی کے قوام میں میخون تیار
 کریں اور ۹ گرام کھلائیں،

آملہ، اسطوخودوس، زنجبیل، ہلیلہ سیاہ، نانخواہ، ہوزن کوئیس کر سفوف بنائیں
 اور ۹ گرام کھلائیں،

ہلیلہ کابلی ۶۰ گرام، خبث المدیہ ۱۲ گرام، خاریقون ۵۰ گرام، زنجبیل، دار فلفل،
 قرنفل، ہر ایک ۹ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد مصفی میں میخون بنائیں
 اور ۶ گرام استعمال کرائیں۔

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں

برگ سرو، شمر سرو، آبِ آملہ ہوزن کو سرکہ میں پکائیں جب خوب گل جائے تو روغن کنجد
 ملا کر جوش دیں، پانی اڑ جائے تو بالوں پر لگائیں اور نقل کو پس کر صاف کریں
 سبیل الطیب شراب میں جوش دے کر پس لیں اور بالوں میں لگائیں،
 روغن آملہ استعمال کرائیں،

بعض الجباریہ نسخہ بھی استعمال کراتے ہیں،
 مازوہ گرام، سنگ را سخ سم گرام نوشادر م گرام، شب بمانی ایک گرام، —
 پہلے مازو کو بریاں کریں اور تمام دواؤں کو پیس کر لوسہ کی کراہی میں مزید باریک کریں
 اور بالوں کو آب آمہ سے دھو کر یہ سفوف لگائیں پھر آمہ کے پانی سے دھو کر خشک کریں اور
 روغن آمہ لگائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salim

اس مرض میں سر کا بال گر جاتا ہے اور وہاں کی جلد، پُر ادھیڑے ہونے پر بند ہے۔
کی جلد کی مانند ہو جاتی ہے، — — — یہ مرض چونکہ نعامہ (شتر مرغ) کو زیادہ ہوتا ہے
یا جلد، شتر مرغ کی گردن کی جلد جیسی ہو جاتی ہے، اسی لیے علت نعامہ (شتر مرغ کا مرض
کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

(۱) گرم، صفراوی مواد کا سرکی جلد کی طرف انقباض / فساد و سام جلد / تغیر مزاج نشہ
(۲) سرسام / برسام وغیرہ گرم امراض کے ردی علامات / بعضی امراض حادہ

سر کے بڑے بال جھڑ جاتے ہیں اور وہ (ا) چھوٹے ، روئیں دار اور ریشم کی مانند باریک بال موجود ہوتے ہیں ، (ب) نرم و حساس ، (ج) بالہ (کے) قدر اور بھرنے ، (د) اور زرد و لالہ ہوتے ہیں ، (ه) میں نرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ،

توضیح: در اینجا، $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ را می‌توان به صورت $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ نوشت.



○ سر کو منڈھواتے رہنے کی ہدایت کریں،

علاج

○ خون کے غلیان / صفراء کی حدت کو کم کرنے کے لیے یہ نسخہ

استعمال کریں،

آب انگور ترش ایک لیٹر، شکر ۵۰۰ گرام میں شربت کا قوام بنائیں اس کے بعد تخم شلیم، بہمن سفید، اندر جو شیریں، تخم گزر، ہر ایک ۶ گرام، ثعلب مصری ۲۵ گرام، عرق کیوڑہ، میں پیس کر ملائیں اور ۲۵-۳۵ ملی لیٹر نوش کریں،

تخم کاسنی ۲۵۰ گرام کو ۵ لیٹر پانی میں ۲۴ گھنٹے تک بھگوئے رکھیں اس کے بعد ۲ لیٹر عرق کشید کریں، ۵۰-۱۴۵ ملی لیٹر نوش کریں۔

عشبہ مغربی ۸۰ گرام، چوب چینی ۲۰ گرام کورات کے وقت ۳ لیٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح کو ۲ لیٹر عرق کشید کریں، ۴۰-۱۲۰ ملی لیٹر ہمراہ شربت عناب ۵۰ ملی لیٹر نوش کریں،

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کریں،

روغن آس / روغن لاون / روغن آملہ / روغن حب الفار مقامی طور پر لگائیں،

○ غذا کی اصلاح کریں اور مرطب و مبرد غذائیں دیں۔



تنزین شعر

اس ذیل میں چند ایسی تدابیر اور ادویہ تحریر کی جا رہی ہیں جن کے ذریعہ بالوں کو خوبصورت بنایا جاسکتا ہے اور ظاہر کو جاہت میں امانا دیکھا جاسکتا ہے، نیز ان کو گرنے سے روکا جاسکتا ہے

تحفظ شعر

اس عنوان کے تحت وہ تمام ادویہ استعمال کی جاسکتی ہیں، جو بالوں کے گرنے اور بال کے جلد امراض میں استعمال کی جاسکتی ہیں، ————— ان دواؤں میں لطیف حرارت، قوت قبض، بال خاصہ بالوں کی حفاظت کے صلاحیت ہوتی ہے، اطباء نے افاقیا، مازو، سنبل الطیب، سعد کوئی، تخم چقدر، تخم کرفس، آمل، لاون، اُس، پیرسیاوشاں، شقایق وغیرہ کو بالوں کے امراض میں مفید پایا ہے، ————— نسخہ جات، متعلقہ امراض کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔

تطویل شعر

ایک معاشرے، بالخصوص مشرقی معاشرہ میں لمبے بال، حسن کی علامت تصور کیے جاتے ہیں، اس مقصد کے تحت اطباء نے بہت سے نسخے تحریر کیے ہیں، یہاں چند نسخے تحریر ہیں،

پرسیا و شاں، طباشیر، پوست سماق، زرد ورد، مصطکی، گلنار، ہر ایک ۳ گرام،
پوست انار، فوفل، پوست بلیہ، ہر ایک ۸ گرام، پوست بلیہ، مازوئے سبز، ہر ایک ۱۲ گرام،
آملہ منقہ، ۲ گرام، برگ مورد ۸ گرام، تمام دواؤں کو نیکو پ کر کے ۲۴ گھنٹے تک
پانی میں بھگوئیں اس کے بعد روغن کجد، روغن گل، ہر ایک ۲۰ ملی لیٹر ملا کر، ٹلی آٹھ پر جوش دیں،
جب پانی اڑ جائے تو چھان کر نفل پھینک دیں اور روغن کو محفوظ کر لیں، اور بالوں پر لگائیں،
بالوں کو لمبا سیاہ بنائے رکھنے اور گھنا بنانے میں مفید ہے،

○ تم مورد، برگ مورد، گل شقائق، تم چغندر، پوست اخروٹ
تازہ، لاون، پرسیا و شاں، ہر ایک ۸ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ کر
آبلہ ۵۰۰ ملی لیٹر میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو معمولی جوش دے کر سرد کر لیں اس
کے بعد روغن مورد ۲۵۰ ملی لیٹر میں جوش دیں، جب پانی اڑ جائے تو چھان کر محفوظ کر لیں
اور بالوں میں لگائیں،

○ آملہ، برگ بکائن، برگ آس، ہر ایک ۸۶ گرام، خلمی ۶۰ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ کر روغن کجد ۵۰۰ ملی لیٹر میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں اور ۷ دن
بعد چھان کر روغن کو بالوں میں لگائیں،

○ سعد کوئی، سنبل الطیب، گل لالہ، برگ مورد، پرسیا و شاں،
تم کرفس، آملہ، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش
دیں جب صرف ۲۵۰ ملی لیٹر پانی بچ رہے تو چھان کر روغن خیری ۵۰۰ ملی لیٹر کے ساتھ
پکائیں، جب صرف روغن باقی رہے تو اتار کر محفوظ کر لیں اور استعمال کرنے کے اس وقت
اس میں اقیاقہ، پوست درخت صنوبر خاکستر، ہر ایک ۳۰ گرام ملا کر بالوں میں لگانے کی
ہدایت کریں،

○ برگ آس، آملہ، ہر ایک ۳۰ گرام، پوست بلیہ، پوست بلیہ،
ہر ایک ۵، ۱ گرام، پرسیا و شاں، مصطکی، لاون، ہر ایک ۳۶ گرام، طباشیر ۱۱ گرام، فوفل
۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ کر ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں اور چھان کر
روغن گل، ایک لیٹر ملا کر جوش دیں، چھنے ہوئے نفل کو علاحدہ ایک لیٹر پانی میں جوش
دیں اور اس میں ملائیں، جب پانی اڑ جائے تو مع نفل، محفوظ کر لیں اور

حسب ضرورت بالوں میں لگائیں،

○ ————— آٹ خشک ۵۰ گرام، ماند و سبز ۳۰ گرام، فوفل، پوست انار،
ہلیہ زنگی، پوست ہلیہ زرد، برگ مورد، زرنب، مائیں خورد، ہریک ۱۲ گرام، لوہ چوں ۱۰ گرام،
بندالنج ۵۰ گرام ————— سب سے پہلے لوہ چوں کو پوٹلی میں باندھ کر نیلا تو تیا کے
معلول پانی میں تر کریں اور ۱۲ گھنٹے بعد نکال کر کھل کریں اس کے بعد تمام دواؤں کو کوٹ
کر لوہ چوں کے ساتھ ملائیں اور اجوائن خراسانی، اجود کو پانی میں جوش دے کر اسی میں مذکورہ
دواؤں کو ۱۲ گھنٹے تک کھل کریں اور خشک ہونے پر ٹکیاں بنا کر محفوظ کر لیں،
حسب ضرورت بندالنج اور کرفس کے پانی میں حل کر کے بالوں میں لگائیں۔
○ ————— برگ کنجد، برگ کدو کو پانی میں جوش دے کر اسی سے بالوں
کو دھوئیں،

○ ————— چقدر، خردل، ————— دونوں کو پانی میں جوش دیں،
اس کے بعد مل چھان کر اسی پانی سے سر دھوئیں، ————— اس طرح دھونے کے
بعد دوسری دوائیں لگائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔

انبات شعر

بعض اوقات داڑھی، ابرو وغیرہ بالوں کے اگنے میں تاخیر اور کبھی غیر
معمولی تاخیر ہو جاتی ہے، یا وہ کم تعداد میں نکلتے ہیں ان حالات میں بالوں کو اگنے والی دوائیں
استعمال کرنا ناگزیر ہو جاتی ہیں، ورنہ مرلیض کو معاشرہ میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔

اسباب

- (I) حرارت غیر زیر کی کمی
- (II) جسم میں رطوبات کی زیادتی
- (III) مسامات بدن کا زیادہ تنگ یا زیادہ کشادہ ہونا
- (IV) مسامات بدن میں ردی مواد کی پیدائش / اجتماع

(۱۷) عام جسمانی ضعف و لاغری
(۱۸) بعض حیاتیاتین / ہارمونز کی کمی

علامات

بال تاخیر سے، قلیل تعداد میں نکلتے ہیں یا بالکل نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے مرین کو معاشرہ میں اس کا جائز مقام ملنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اگر بال بالکل نہیں نکلتے تو آواز میں نسایت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

اصول علاج

○ جسم میں حیاتیاتین / ہارمونز کی حسب ضرورت مقدار پہنچانے کا اہتمام کریں،

- - حرارت غریزہ کے اضافہ کی تدابیر کریں،
- - مسامات کی تنگی کی صورت میں، فراخ کرنے والی دوائیں اور فراخ ہونے کی صورت میں اعتدال کے ساتھ تنگ، کرنے والی دوائیں استعمال کریں۔
- - ردی اور ذرا درخلط کے توہر / اجتناف کا اہتمام کریں،
- - مقویات استعمال کریں،

علاج

- - مسامات کی تنگی کی صورت میں کثرت سے حمام کرائیں،
- - مسامات کی کشادگی کی صورت میں آب مورد سے لطول کرائیں اور خارجی طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،
- - سرطان نہری ہ عدد، دو ٹکڑے کر کے پانی اور دھن زیتون کے ساتھ پکائیں، جب سرطان چل جائے اور پانی اڑ جائے تو تیل کو صاف کر کے متاثرہ حصہ پر لگائیں،
- - بمادہ دندانہ فیل سوختہ، کو بکری کے دودھ میں حل کر کے لگائیں،
- - پوست درخت انجیر، برگ انجیر، کن دریا سوختہ، ہر ایک، گرم، فریون ۸۰ گرام تمام دواؤں کو پیس کر آب پیاز میں حل کر کے لگائیں، جب متاثرہ حصہ

سرخ ہو جائے تو درج ذیل دوائیں لگائیں،
 لاون، افسنتین سوختہ، زراوند مدحرج، مورد، حنفص سوختہ، ہموزن کو باریک
 پیس کر عرق کور میں ملا کر طلا کر لیں۔

سیاہ بکری کی کھر سوختہ، سیاہ گدھے کی کھر سوختہ، سرگس سوختہ،
 تمام دواؤں کو باریک کر کے روغن زیتون میں ملا کر لگائیں،
 کندش کو پیس کر روغن بیفہ مرغ میں ملا کر لگائیں / صرف روغن بیفہ مرغ لگائیں
 روغن پانی میں تیلنی مکھی سرسیدہ کر کے پیس کر لگائیں،
 قيصوم خاکستر کف دریا، --- دونوں کو روغن زیتون میں پیس کر لگائیں،



Learn Unani By Abdul Waris Khan

منع نبات شعر

کبھی کبھی بعض ایسی جگہوں پر بھی بال نکل آتے ہیں، جہاں ان کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ — چنانچہ ان کے اگنے کے عمل کو روکنے کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں،

اسباب

- (۱) مسامات بدن کا بال اگنے کے لیے حد درجہ موزوں ہونا
- (۱۱) بعض حیاتیاتین/ریارمونز کی جسم میں زیادتی

علامات

بعض ایسے مقامات پر بھی بال اگ آتے ہیں، جو عام طور سے خلاف عادت و طبیعت ہوتے ہیں، اور جن کی موجودگی سے مریض کو بے اوقات شرمندہ ہونا پڑتا ہے،

اصول علاج

- — مقامی طور پر محدد رات استعمال کرائیں،
- — مسامات جلد کو بند کرنے/تفہیق کی تدابیر کریں،
- — غیر ضروری بالوں کو اکھاڑنے کے بعد بال اگنے سے روکنے والی دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

○ ————— بالوں کو کسی طرح اکھاڑ کر درج ذیل ادویہ مقامی طور پر استعمال کریں،


بندالینج، ایفون، شوکران، ————— تینوں کو پانی میں پیس کر طلا کر کریں،
ایفون، سرکہ تلخ، ————— دونوں کو ملا کر طلا کر کریں،
سورنجان پیس کر یا جوہر سورنجان لگائیں،
کف دریا، ایفون، بزرالینج کو سرکہ میں پیس کر لگائیں،
چونہ بجا ہوا ۸ گرام، زریخ ۱ باربک کردہ ۲ گرام، روغن کنجد ۳۵ ملی لیٹر، —————
تینوں کو یا ہم ملا کر تین دن تک دھوپ میں رکھیں اور موقع موقع سے ہلاتے رہیں اس کے
بعد روغن کو نتھار کر متاثرہ حصہ پر لگائیں،
آب برگ انجیر، بیفہ موچہ، (چیونٹیوں کے انڈے) کف دریا، آب ترخ ہوزن کو
خوب ملا کر لگائیں،
جونک کو نمک کے محلول میں ڈال کر اس کی اودگیوں کو دور کریں، اس کے بعد
خشک کر کے پیس لیں اور سرکہ میں حل کر کے لگائیں،
سفیدہ قلعی، کھریا مٹی، پھٹکری، اجوائن خراسانی، ————— تمام دواؤں کو
باربک کر کے پانی میں ملا کر مقامی طور پر لگائیں۔

حلق شمر

اکثر اوقات طبعی اور قدرتی طور پر بعض مخصوص مقامات پر بال اگ آتے ہیں، جن
کو دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ————— ذیل میں ان بالوں کو دور کرنے کے
نئے تحریر کیے جا رہے ہیں،

○ ————— آپ ناویدہ، زریخ، ————— ہوزن دونوں کو
پیس کر چھان لیں اور گرم پانی میں ملا کر طلا کر کریں، اور کچھ گھنٹے بعد دھونے کی ہدایت

کریں، — استعمال سے قبل مناسب روغن ضرور لگائیں۔
 ○ — جو زم گرم، سخی گرم، زریخ زرد ۲۰ گرام، — پانی میں
 بھگو دیں اور تین دن بعد چھان کر پانی ۲ حصہ، روغن کنجد ایک حصہ ملا کر ہلکی آنچ پر جوش
 دیں جب پانی خشک ہو جائے تو روغن کو نکھار کر استعمال کرائیں،
 ○ — کف دیا / کشتہ صدف کو زریخ زرد کے ساتھ جلا کر استعمال
 کرائیں،



Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

تجعیہ شعر

بعض اوقات بالوں کو گھونکر لایا کر اس کے حسن میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے اطباء درج ذیل قابض دوائیں استعمال کرتے ہیں

○ چونہ ۲ گرام، مردار سنگ، مازو، آملہ، برگ مگرم، —————
تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب مور میں ڈال کر بالوں پر لگائیں، — اور بالوں کی
نہیں علاحدہ لپیٹ کر دھاکے سے باندھیں ۲ گھنٹے بعد کھول کر برگ مگرم کے جوشاندہ
سے دھوئیں اور خشک ہونے پر روغن کل اور روغن بنفشہ لگائیں،
○ مازو، پر سیاوشاں، ہوزن کو آب شور میں پیس کر لیپ تیار
کریں اور بالوں کو دھو کر خشک کر کے لگائیں اور بالوں کو پیچا کر کے باندھیں، ۲ گھنٹے بعد
کھول کر دھوئیں اور روغن آس لگائیں۔

○ حب الہاس، چقدر، ہوزن کو پانی میں اس قدر پکائیں کہ یہ گل
جائیں، اس کے بعد چھان کر روغن کنجد ملا کر جوش میں، جب پانی اڑ جائے تو روغن
محفوظ کر لیں اور بالوں کو دھو، خشک کر کے لگائیں،
○ بالوں کو مونڈھنے کے بعد صنوبر خاستر کو روغن آس میں حل
کر کے لیپ تیار کریں اور سر پر لگائیں۔

○ مردار سنگ ۵ گرام، آملہ، برگ سرو، مازو، حلبہ، مانیں،
ہر ایک ۱۸ گرام، ————— تمام دواؤں کو پیس کر آب مور میں ملا کر بالوں پر لگائیں،
اس کے بعد بالوں کو باندھ دیں۔ ۲ گھنٹے بعد دھو ڈالیں۔

البطاع شیب

اس عنوان کے تحت ان تداویر / نسخہ جات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو بروئے کار لانے سے بالوں کو سفید ہونے سے روکا جاسکتا ہے یا بال دیر سے سفید ہوتے ہیں،
○ ————— خوردنی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں،

ہیلہ سیاہ، آملہ، ہر ایک ۳ گرام، شہد بھلاواں ۲ ملی لیٹر، ————— تمام دواؤں کو روغن کاؤ میں ملائیں اور شہد میں میجون بنا کر ۹ گرام استعمال کرائیں،
پوست ہیلہ کابلی، ۴۰ گرام، غار لیقون ۸ گرام، دار فلفل، قمر نفل، ہر ایک ۵۰۰ گرام، خشت الحدیدہ ۱۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر تین گنا شہد کے قوام میں ملا کر حسب دستور میجون بنائیں اور ۱۲ گرام استعمال کرائیں،
ہیلہ سیاہ، آملہ، ہر ایک ۴۰ گرام، انیسون، فلفل دھان، ہر ایک ۵۵ گرام، جوز بوا، فلفل، ہر ایک ۲۰ گرام، نوشادر، ۱ گرام، عسل بلادر ۲۰ ملی لیٹر، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے ۲ کلو ۷۰۰ گرام نبات سفید میں ملا کر ۳۴۵ گویاں بنائیں اور روزانہ ایک گولی بعد غذا دیں۔

ہیلہ کابلی، زنجبیل، دار فلفل، ہمزون، ————— تینوں کو باریک کر کے ۲ گرام روزانہ کھلائیں۔

ہیلہ سیاہ کو منہ میں رکھ کر لعاب نکالتے رہنے کی ہدایت کریں۔

ہیلہ مرنی کو چوتھے رہنے کی ہدایت کریں۔

اسطوخودوس کو مارا عسل کے ہمراہ استعمال کرائیں،

زنجبیل ۵ گرام، اجوائن ۵ گرام، بلیڈ سیاہ ۴ گرام، باریک پیس کردو گنا شہد
میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۲۵ گرام استعمال کرائیں،

○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخے عمل میں لائیں،
آب آملہ، آب خنظل، آب شو نیز سے بالوں کو دھونے کی ہدایت کریں،
روغن ترچلہ سر میں لگائیں،

مازو ہیریاں ۴ گرام، سنگ راسخ ۲ گرام، نوشادر ایک گرام، شب یمانی ۱/۲ گرام، —
تمام دواؤں کو باریک پیس کر لوہے کے برتن میں رکھ کر آب آملہ ملا کر خوب
سلائیہ کریں اس کے بعد بالوں کو آب آملہ سے دھو کر یہ دوا لگائیں -

آب پھلی ببول خام، برادہ فولاد، ہر ایک ۲ گرام، کیسیس ۲ گرام، کالی کھار ۲ گرام،
روغن کنجد ۱۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو روغن کنجد میں ۶ گھنٹے تک کھل کریں،
اس کے بعد لوہے کے برتن میں بند کر کے ۴۰ دن تک زمین کے نیچے کاڑھے رکھیں پھر نکال
کر استعمال کرائیں -




* قمل، قمل مقام، صیبان

PEDICULOSIS NITS

جوئیں پڑ کر جلد میں خارش، سوزش اور بعض اوقات التهاب اور دیگر امراض کا باعث ہوتی ہیں،

اقسام

قمل



اسباب

(I) جسم اور پڑے کی کثافت / حیض اور جنابت وغیرہ کے غسل میں غیر معمولی تاخیر

Small Pediculus

جوں، مقام

Pediculus

* قمل =

باریک مہین جوں، صیبان = Nits = لیکھ = جوں کے انڈے،

- (II) آب و ہوا کی بار بار تبدیلی
 (III) امتلا، اضطراب، دیہ / بکثرت پسینہ خارج ہونا
 (IV) ردی غذاؤں / مخصوص غذاؤں (انجیر وغیرہ) کا بکثرت استعمال
 (V) جوئیں والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا

علامات

(I) قمل الراس :-

سر کی جوئیں کم و بیش ۴ ملی میٹر لمبی، ایک ملی میٹر چوڑی، خاکستری، زردی مائل، سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، اگر یہ سیاہ نہ ہوں تو شکم پر دونوں طرف سیاہ نشان ضرور موجود ہوتے ہیں، یہ جوئیں موسم سرما میں (خامس طور سے) بال کی جڑوں میں بہت زیادہ مقدار میں انڈے دیتی ہیں، یہ انڈے سفید، خشکاش کی مانند ہوتے ہیں، ان کی لمبائی ۰.۵ ملی میٹر کسی قدر مخرومی ہوتے ہیں، ان کا سرا عام طور سے جلد الراس (سر کی جلد) کی طرف ہوتا ہے، ————— ابتدا میں جلد کے پاس ہوتے ہیں لیکن جوں جوں بال بڑھتا ہے، یہ اوپر ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد جوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور سر میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کے خون چوستے، ہنے کی وجہ سے سر کی جلد میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مایہ نیز متعدی حلقہ (Contagious Impetigo) کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ————— مریض کے بار بار سر کھانے، سفید، خشکاش کی مانند چیز کے بالوں میں دکھائی دینے سے بھی ذہن جوئیں کی موجودگی کی طرف جاتا ہے،

(II) قمل العانہ :-

اس کی شکل بہت حد تک کیکرے کی طرح ہوتی ہے اسی لیے اس کو کیکرٹا جوں (Carb Louse) بھی کہتے ہیں، یہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں چنانچہ لمبائی کم و بیش ایک ملی میٹر اور چوڑائی بھی تقریباً اسی قدر ہوتی ہے، جسم مربع (چوکور) ہوتا ہے، ان کے ۴ عدد، لمبی، لمبی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، جن میں پتے بھی ہوتے ہیں، جن کے ذریعہ بالوں سے گھٹی رہتی ہیں، بہت زیادہ ہو جانے کی صورت میں ان کے

انڈے (کھانے کے نتیجے میں) مرلیں کے ہاتھ کے ذریعہ اس کی داڑھی، مونچھ، سینہ اور بغل کے بالوں تک پہنچ جاتے ہیں، ————— انڈے دینے کی کیفیت قبل اس جیسی ہی ہوتی ہے، بار بار کھاتے رہنے سے اگر یمانی دانے، اور نیلگوں، خاکسری اُچلے تک بڑھ سکتے ہیں،

(III) قمل الملبوسات / جسم :-

جوں کی یہ نوع سب سے بڑی، کم دبیش ۳ ملی میٹر لمبی اور ۱۔۵ ملی میٹر چوڑی ہوتی ہے، عام طور سے یہ خاکسری مائل / سفید ہوتی ہیں، لیکن خون چوس لینے کے بعد بہت گہری سرخ ہو جاتی ہیں، یہ مرلیں کے ملبوسات کی شکلوں میں موجود ہوتی ہیں، بعض اوقات چہل قدمی کرتی ہوئی لباس کے غیر شکن اُلو دھتے پر بھی آ جاتی ہیں، ————— انڈے عام طور سے شکن کے اندر ہوتے ہیں، جب کپڑے کو الٹ کر شکن کو دیکھتے ہیں تو باسانی نظر آتے ہیں، ان کی مادہ ایک دن میں کم دبیش ۲۔۵ ————— یہ غذا کے بغیر ۳ دن تک زندہ رہ سکتی ہیں، سردی کی برداشت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے برخلاف ۸ سینٹی گریڈ حرارت پر مر جاتی ہیں،

قمل الجسم کا حملہ رات میں نہایت شدید ہوتا ہے، چنانچہ مرلیں اپنا جسم کھجا کھجا کر خراش دار بعض اوقات لہو لہان کر لیتا ہے، کھجانے کے نشانات کو کمر، ران کے بیرونی اور اندرونی حصے، شانے، پچھلے بغلی موڑ میں خاص طور سے دیکھا جاسکتا ہے، اگر یہ مرض زیادہ عرصہ تک برقرار رہ جائے تو جلد خشک، کھردری ہو جاتی ہے اور اس سے پھلکے اترنے لگتے ہیں،

قمل جسم اور خارش میں بعض اوقات اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں ان کی تفریقی علامات تحریر کی جا رہی ہیں۔

۱۔ مول: اہل حق

- [illegible]

علاج

○ ————— برگ کینر، میویزج، قسط، مغز باطم تلخ، ————— تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر سرور بدن پر لگائیں۔

○ ————— سیاب کو آب برگ حنا/ آب شریفہ/ آب برگ ترب میں خوب سمیٹ کر کے تمام جسم پر ملیں،

○ ————— سیاب کو ابلہ سوختہ، روغن کبجد میں خوب حل کر کے سر میں ملیں،

○ ————— سیاب ۲۵ گرام، گندھک ۵ گرام کو خوب گھونٹیں، جب ایک ذات ہو جائیں تو روغن کبجد ملا کر متاثرہ عضو پر لگائیں، اس کے بعد گرم پانی سے دھونے کی ہدایت کریں،

○ ————— شب میمانی، سہاگہ بریاں کو پانی میں ملا کر اسی پانی سے غسل کرنے کی ہدایت کریں،

○ ————— آب نظرون سے سر کو دھونے کی ہدایت کریں،

○ ————— خربق سفید، سہاگہ، ہر ایک ۳ گرام، بیخ حاتمیں ایک گرام، میویزج ۵، راگرام، سرکہ شراب ۳ ملی لیٹر، تمام دواؤں کو سرکہ میں ملا کر سر پر مل کر نصف گھنٹہ بعد گرم پانی سے دھونے کو کہیں،

○ ————— خمدول، کندس، قسط تلخ، تخم ترب، ہر ایک ۴ گرام، ————— تمام دواؤں کو روغن گل ۶۰ ملی لیٹر میں پیکا کر سیاب ۳ ملی لیٹر حل کر کے

رات کے وقت بالوں پر لگائیں اور صبح کو گرم پانی سے غسل کرنے کی ہدایت کریں،

○ ————— زریخ سرخ، بوزق، میویزج، ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر سرکہ اور روغن گل ملا کر جسم پر ملا کر کریں، چند گھنٹے بعد غسل کرنے کی ہدایت کریں،

○ ————— اشنہ، دقلی، میو سائلہ، فلفل سفید، پوست انار، ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور اسی پانی سے غسل کی ہدایت کریں،

○ ————— پٹرول میں اسفنج تر کر کے بالوں پر لگائیں، اس دوران

آگ کے پاس ہرگز ہرگز نہ جانے دیں۔

○ غلبہ رطوبات کے صورت میں تنقیہ کیے یہ نسخہ استعمال کریں،

ایار ج فیقراہ، ۴ گرام، تربد موصوف مقشرہ ۴ گرام، حب الہیمل، انیسون، خارقیون،
شحم خنظل، ہر ایک ۲، اگر گرام، صمغ عربی، گل سرخ، نمک ہندی، منطکی، کیترا، ہر ایک
۵۵ ملی لیٹر مقل ازرق، ۵۵ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر
روغن بادام ۱۰۰ ملی لیٹر میں تہرب کر کے آب مقل کے ہمراہ دانہ ماش کے برابر گولیاں
بنائیں اور نصف گولی شام کو اور باقی نصف صبح کو نہار کھلائیں،

یہ نسخہ بھی مفید ہے،

ہلیلہ کلان، زرد چوب، نمک لاہوری، نمونہ پیس کر شیرہ خنظل میں تین دانہ،
کھل کریں اور کھلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور ۲-۵ گولیاں کھلائیں۔
دوا کھلانے سے تین گھنٹہ پہلے مرض کچھڑی کمانے کی ہدایت کریں۔



Learn Unani By Aftab-ur-Rahman

ظفرہ طلقیہ

ONYCHOMY COSIS

✽

اس مرض میں ناخن ابرک (طلق = ابرک) کی مانند سفید اور بھر بھرا ہو جاتا ہے ،
اور معمولی سبب سے بھی ٹوٹنے لگتا ہے ۔

اسباب

- (۱) برو دت / بوسست کا غلبہ / غلبہ مسودا
- (۱۱) حرارت کی زیادتی کی وجہ سے رطوبت کا فنا ہو جانا
- (۱۱۱) نقص تغذیہ
- (۱۲) فساد خون / قلت خون
- (۱۳) فنگس (Fungus) کی بعض انواع مثلاً
- (I) ٹرائیکوفائیٹون (Trichophyton)
- (II) مائیکرو سپرون (Micro Sporon)
- (۱۴) خشک ، ارمنی اجزاء کا ناخن کے نیچے جمع ہو جانا

علامات

مرض کا آغاز عام طور سے ناخن کے سرے سے ہوتا ہے ، چنانچہ ابتدا میں اس

✽ اس کو ٹینیا انگویم (Tinea Unguim) بھی کہتے ہیں ۔

کی طبعی رونق اور چمک ماند پڑ جاتی ہے، لوج بھی زائل ہو جاتی ہے، اور وہ بدشکس ہو جاتا ہے، اس کے بعد دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ ابرک کی مانند سفید ہو جاتی ہے، خشکی اُٹھانے سے طبعی لوج زائل ہو جاتی ہے اور ناخن پر معمولی دباؤ پڑنے سے بھر بھر کر گر پڑتا ہے، عام طور سے پہلے ایک ہی ناخن متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے ناخن بھی متاثر ہونے لگتے ہیں، ملحوظ رہے کہ ناخن میں کسی طرح کے درد یا خارش وغیرہ کا بالکل احساس نہیں ہوتا، مرض کی تشخیص، ناخن کے تراشے اور وہاں کے مقامی خشک، ارضی اجزاء کے معائنہ سے بخوبی ہو جاتا ہے

اصول علاج

- _____ غلط غالب کا حسب دستور تنقیہ کریں،
- _____ مرطبات استعمال کرائیں،
- _____ فساد خون / نقص تغذیہ سبب مرض ہو تو ان کی اصلاح کریں۔

علاج

نفج و تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 مار الاصول ۵ دن تک ہمراہ گلقد، سکبجین اور روغن بادام استعمال کرائیں،
 ترکیب استعمال یہ ہے کہ پہلے ۵ دن ہمراہ گلقد، اس کے بعد ۵ دن ہمراہ سکبجین اور آخری ۵ دن ہمراہ روغن بادام، اور جب پیشاب میں نفج کے آثار پائے جائے لگیں تو مطبوخ اقیقون سے تنقیہ کریں، اس کے بعد مار الجبن نوش کرائیں۔
 یہ نسخہ بھی مفید ہے،

اصل السوس، بادرنجبویہ، ہر ایک ۱۰-۱۵ گرام کو پانی میں جوش دے کر گلقد
 فکری ۳۵ گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں، جب نفج کے آثار
 پائے جائے لگیں تو صبر / ایا راج / مطبوخ اقیقون سے تنقیہ کریں،
 ○ _____ مرطب کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
 روغن بادام / بکری کی چربی، ناخنوں پر ملیں۔

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

تَعَقُّفِ اَظْفَارِ*

ONYCHOGRYPHOSIS

اس مرض میں پہلا ناخن کسی وجہ سے گر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نیکلے والا دوسرا ناخن ٹیڑھا اور بد وضع نکلتا ہے اور اگر یہ ناخن بھی کسی وجہ سے گر جائے تو مزوری نہیں کہ اس کے بعد نکلتے والا ناخن بھی ٹیڑھا اور بد وضع نیکلے۔

اسباب

(۱) داد/چنبیل، آتشک، جلد بھر اور داخس وغیرہ کے نتیجے میں پہلے ناخن کا گر جانا اور دوسرے ناخن کے نکلتے کے وقت بار بار کھٹو کر وغیرہ لگنا۔

علامات

پہلے ناخن کے گر جانے کی روئیداد ملتی ہے، اور اس کی جگہ دوسرے نکلتے دانے ناخن کے ابتدائی سرے پر ضرب/کھٹو کر پڑنے کی سرگزشت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی لمبی نشوونما متاثر ہوتی ہے اور ناخن ٹیڑھا اور بد وضع ہو جاتا ہے اور یہ بد وضعی قائم رہتی ہے،

* اطباء جدید جذام اظفار، ظفرہ طلیقہ اور تعقف اظفار کو متراف قرار دیتے ہیں۔

اصول علاج

- ————— ناخن کو نرم کرنے کی تدابیر کریں،
- ————— تلیپین کے بعد ناخن کی بیرونی سطح اور سامنے کے حصے کو احتیاط کے ساتھ تراشیں،

علاج

- ————— موم سفید کو شہد میں پگھلا کر تخم کتاں یا ایک پیس کر ملائیں اور متاثرہ ناخن پر لگائیں۔
- ————— شراب کی پچھٹ (گاد) متاثرہ ناخن پر لگائیں اور جب تک کہ ناخن نرم نہ ہو جائے۔
- ————— موم کو روغن بنفشہ میں پگھلا کر لگائیں،
- ————— مرغ / بطر بکری کی چربی لگائیں،
- ————— فرہ بکری کی چربی، بطر کی چربی، مرغابی کی چربی، مغز ساق گاؤ، موم مذکورہ روغن بنفشہ میں پگھلا کر لگائیں،
- ————— خوردنی طور پر بہت معمولی مقدار میں روغن کنجد کا عرصہ تک استعمال کرائیں،
- ————— جب السمنہ، مغز بادام تلخ، مغز اخروٹ، ہر ایک ۲۰ گرام، کو پیس کر بکری کی چربی ۳۰ گرام، موم ۸ گرام پگھلا کر اس میں ملائیں اور ناخن پر لگائیں۔ اور جب ناخن ملائم ہو جائیں تو خوبصورتی کے ساتھ تراش دیں اور کھوکھلے سے محفوظ رکھنے کی تدابیر کریں۔



تشقق اظفار

ONYCHIATHROPHIA

اس مرض میں ناخن، لمبائی میں سرے کے قریب پھٹ جاتا ہے اور ان میں مزید باریک نوکیلے سرے اور ریشے نکل آتے ہیں اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ — بعض اوقات ناخن کی برتیں اکھڑنے لگتی ہیں اس صورت کو نقشہ اظفار (ناخن کی برتیں ادھرنا کہتے ہیں،

اسباب

(I) غلبہ ہو ست / چنبل / داد / آتشک

(II) سوداوی خلط کی زیادتی

(III) اعصاب کے بعض امراض

علامات

ناخن لمبائی میں سرے کے پاس سے پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی کئی تقسیم ہو کر نوکیلے سرے اور ریشے نکل آتے ہیں جو لباس پہنتے وقت تکلیف کا باعث ہوتا ہے کیوں کہ نوکیلے پن کی وجہ سے کپڑا ان میں الجھ جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے حالات میں بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ریشوں اور نوکیلے سروں کو قدیم الہیاء چوہوں کے دانتوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ”اسنان الفار“ بھی کہتے ہیں۔

اصول علاج

- (I) مرطبات استعمال کرائیں،
 (II) سوداوی خلط کے غلبہ اور انصباب کو زائل کرنے کی تدابیر کریں،
 (III) طبعی دوائیں مقامی طور پر استعمال کرائیں،

علاج

○ مسہل سودا کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 ہلیلہ سیاہ ۳۰ گرام، بسفاج نیکوفتہ ۵ گرام، ایتھمون ولایتی ۲ گرام، برگ سنار مکی،
 اسطوخودوس، ہر ایک ۲۱ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ بادرنجبویہ، برگ گاد زبان، ہر ایک
 ۹ گرام، انیسون، بادیان، ہر ایک ۶ گرام، تربد موصوف ۳ گرام، خربق سیاہ ایک گرام،
 زنجبیل ۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر ہزار مٹی،
 لاجورد محسول، نمک سیاہ، غار یقون، ہر ایک ایک گرام پیس کر ملائیں اور نوش کرائیں،۔
 مزید قوی الاثر بنانے کے لیے شحم حنظل اور صبر سقوطری، ہر ایک ایک گرام،
 کا اضافہ کر سکتے ہیں،

○ مار الجبن نوش کرائیں
 ○ مصفی خون کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 پوست بیخ نیم، پوست شاخ انجیر دشتی، شاہترہ چمرائتہ، کشنیز خشک،
 پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، پوست بہیرہ، ہلیلہ سیاہ، آملہ، شیطر ج، بادیان،
 سنار مکی، گل سرخ، ہر ایک ۲۵ گرام، قند سفید دو گنا، شہد خالص بمقدار جملہ ادویہ،
 تمام دواؤں کا سفوف تیار کریں اور قند سفید اور شہد خالص کے قوام
 میں ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۲ گرام ہمراہ عرق شاہترہ / پانی استعمال کرائیں،
 چوب چینی، برگ شیشم، ہر ایک ۳۵ گرام، عناب، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی
 ہر ایک ۴۰ گرام، برگ سنار مکی ۳۸ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت
 گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر تربنجیس، شیر خشک، شہد خالص،

ہر ایک ۵۴ ملی لیٹر کا فوام ملا کر حسب دستور شربت بنائیں اور ۵۰ ملی لیٹر ہمراہ آب تازہ نوش کرائیں۔

○ ————— مقامی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

دام مغز کو روغن کچد میں ملا کر لگائیں،

سندھو میں باریک کر کے روغن بادام میں آگ بجوش دیں اور سرد کر کے ناخنوں پر

لگائیں،

سرکہ بیک حصہ ۱، روغن کچد ۲ حصہ کو جوش دے کر تھوڑی مقدار میں سرس مل کر

مرام بنائیں اور ناخن پر لگائیں،

تخم کتان، حرف کو شہد میں ملا کر ضاد کریں۔

مغز بادام، تخم خطمی، ————— دونوں کو باریک کر کے تازہ دودھ میں ملا کر

ضاد کریں اور بڑھے ہوئے ناخن کو تراش دیں،

۱ روغن بنفشہ، روغن کدو، روغن نیلوفر سے استعمال کرائیں،

جنگلی پیاز کو روغن کچد میں بریاں کر کے ناخن پر باندھیں،

حب الملح، مغز بادام شیریں، مغز پنبدانہ، ————— تمام دواؤں کو

پیس کر لعاب اسپغول میں حل کر کے لگائیں اور دن میں دوبار دوا بدلیں۔

○ ————— مرطب غذائیں استعمال کرنے کی ہدایت کریں۔



صفرت اظفار

YELLOWNESS OF THE NIAL

اس مرض میں ناخن کا طبعی رنگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بجائے زردی غالب آجاتی ہے،

اسباب

(1) مقامی/عمومی طور پر صفراوی مواد کا غلبہ

(2) قلت خون

علامات

ناخن پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کی طبعی چمک زائل ہو جاتی ہے، غلبہ صفراء عمومی کی صورت میں جسم کے دوسرے حصے بھی پیلے پڑ جاتے ہیں، قلت خون کی صورت میں عام جسمانی نقاہت اور خون کی کمی کی علامات پائی جاتی ہیں،

اصول، علاج

- صفراء کا تنقید کریں
- خون پیدا کرنے والی غذائیں / دوائیں استعمال کرائیں

علامات

عمومی طور پر غلبہ صفراء کی صورت میں درج ذیل نسخہ حیات

منفج و مسہل و تبرید استعمال کرائیں

نسخہ منفج :-

گل بنفشہ، گل سرخ، مکور، تخم خطمی، تخم کاسنی، خماہترہ، ہر ایک، ۵ گرام، گل نیلوفر ۵ گرام، عناب، آلو بخارا، ہر ایک ۵ عدد، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقد آفتابی / خمیرہ بنفشہ ۲۵ گرام ملا کر چھان لیں اور نوش کرائیں، ————— ۳ دن تک یہ نسخہ استعمال کرائیں، پانچویں دن درج ذیل نسخہ مسہل دیں،

نسخہ مسہل :-

مذکورہ سابق نسخہ منفج میں گلقد / خمیرہ کی مقدار ۵ گرام کر دیں اور مغز قلوں خیار شیریں ۵ گرام، تربخین خراسانی، تمر ہندی مقشر، ہر ایک ۵ گرام، رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر مذکورہ نسخہ منفج میں ملائیں اور شیرہ مغز بادام شیریں ۵ عدد نکال کر اس میں حل کر کے نوش کرائیں، ————— پیاس کے وقت پانی کی بجائے عرق مکور اور عرق کاسنی تھوڑا تھوڑا پلائیں، ————— دوسرے دن درج ذیل نسخہ تبرید بروئے کار لائیں،

نسخہ تبرید :-

لعاب بہدانہ ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر میں حل کر کے استعمل ۴ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

اگر نفج کی علامات پہلے سے ہی موجود ہوں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں،

تمر ہندی ۵، ۵ گرام، گل سرخ، برگ سنار کی، ہر ایک ۲۵ گرام کو عرق گلاب ۳۰، ۵ ملی لیٹر بھگو دیں اور مل چھان شیر خشک ۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

نیلوفر، گل بنفشہ، کاسنی نیکوفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عناب ولایتی ۱۲ گرام

برگ سنار کی ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور مل چھان کر شیر خشک ۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

○ قلت خون کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،

مغز بادام شیریں مقشر، تخم خشکاش سفید، ہر ایک ۲۱ گرام، مغز تخم کدو شیریں، زنجبیل، خوبنجان، شقائق، ہر ایک ۸ گرام، مغز تخم خربزہ، مغز تخم لکڑی، مغز تخم گھیرا، تخم خرفہ، ہر ایک ۵۰ گرام، کیترا، گرام، مغز چلوخوڑہ، تودری سرخ، تودری زرد، تخم گزر، تخم ہلون، ہر ایک ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تر بنجین پانی میں گھول کر جلد دواؤں کے ہوزن شکر کا قوام بنا کر حسب دستور تیار کریں اور ۷-۱۰ گرام ہمراہ تازہ دودھ، صبح کے وقت نوش کرائیں، مقوی اور زود بہنم غذائیں کھلائیں،

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں، یہ

نسخہ تنقید صفراء کے بعد استعمال کرائیں زیادہ سودمند ہے،
تخم جرجیر کو سرکہ میں پیس کر ناخنوں پر ضا د کریں،
سکائی، برگ بید، کشنیز سبز، ہوزن کو پیس کر ضا د کریں،
مازو، شب بمانی کو بٹ کی چربی میں ملا کر ناخنوں پر لگائیں،
برگ گلاب، تخم کاسنی کو پیس کر ضا د کریں،
منہدی کی پتی (برگ حنا) پیس کر ناخنوں پر لگائیں،



تقصع اظفار

اس مرض میں ناخن، پوروے کے گوشت سے کسی قدر الگ ہو کر ابھرتے ہیں، یہ ابھار درمیان میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے،

اسباب

(I) زیر ناخن رطوبتوں کی زیادتی

(II) معمولی فساد خون

(III) ضربہ و سقط

علامات

کثرت رطوبات کی عام علامات پائی جاتی ہیں، ناخن، انہی کے پوروے کے گوشت سے علاحدہ ہو کر تھوڑا سا ابھرا ہوتا ہے اور ابھار کے درمیان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو بعض اوقات دیکھا بھی جاسکتا ہے، درد وغیرہ کا احساس بالکل نہیں ہوتا، ضربہ و سقط کی صورت میں اس کی روئیداد ملتی ہے،

ۛ یہ تقلع اظفار سے کمتر صورت ہے، چنانچہ اس کے اسباب خفیف ہوتے ہیں۔

اصول علاج

- خلط بلغم کا تنقیہ کریں۔
- مہضی خون دوائیں استعمال کرائیں،

علاج

- تنقیہ بلغم کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نیچ بادیان، نیچ کاسنی، نیچ اذخر، نیچ کرفس، بادیان، اسطوخودوس، ہر ایک ۱ گرام، پرسیاوشاں ۵ گرام، اصل السوس مقشر، نمکوب ۵ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، مویر منقہ ۹ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو معمولی جوش دے کر مل چھان لیں اس کے بعد گلقدنہ عملی ۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان لیں اور نوش کرائیں، آٹھویں دن درج ذیل نسخہ سہل اسی نسخہ میں شامل کریں۔

— تربد سفید، خوف خراشیدہ ۵ گرام، غارلقون مغربل ۲ گرام، سناہ کلی ۱۲ گرام، مذکورہ نسخہ منفع میں ملائیں، اور مغز فلوس خیبار شبر ۵ گرام، شکر سرخ، ۵ گرام، کورات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان کر اس میں ملائیں اور گلقدنہ عملی ۵ گرام سے شیسویں کریں اور روغن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں، مسہل کے دوسرے دن درج ذیل ادویہ ترید کے طور پر استعمال کرائیں،

گلقدنہ آفتابی ۵ گرام عرق بادیان ۲۰ ملی لیٹر میں حل کر کے چھان لیں اور تخم ریحاں ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں، تنقیہ بلغم کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہیں،

ہلیلہ کلاں، زرد چوب، نمک لاہوری، ہوزن پیس، کرشیرہ حنظل میں تین دن کھل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور ۱ — گولیاں کھانے کی ہدایت کریں، اور ۳ گھنٹے بعد مرغن کچھڑی کھلائیں،

آرد تربد موصوف ۸ گرام، حب الینیل، بریاں ۴ گرام، پوست ہلیلہ زرد، نذنجیل، ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر روغن بادام ۵۰۰ ملی لیٹر میں چرب کریں اور مغز بادام

۳۲ عدد، نبات سفید ۵۰ گرام ملا کر کھلائیں،
مصفی کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

○ —————
شاہترہ، چرانتہ، کشنیز، سرپھو کو، ہر ایک ۴ گرام، پوست ہلیلہ زرد ۲ گرام،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر شہد خالص ۱۸ ملی لیٹر میں حل کر کے نوش کرائیں،
شاہترہ ۹ گرام، صندل سرخ کوفتہ ۳ گرام، ہلیلہ سیاہ کوفتہ ۲ گرام، ————— تمام
دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت عذاب ۲۵ — ۵۰
ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waheed Khan

احتقان دم تحت ظفر*

اس مرض میں ناخن کے نیچے خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے میں ناخن سیاہ نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے ناخن کے نیچے کی رگ کا کٹھ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس سے خون تراوش پا کر ناخن کے نیچے بند ہو کر سیاہ داغ کی مانند ہوتا ہے جو بعد میں کتھی پھر سفید ہو جاتا ہے۔

اسباب

(I) مقامی طور پر خون کا غیر معمولی ترشح
(II) چوٹ لگنا۔

علامات

عام طور سے ناخن پر چوٹ لگنے کی روئیدار دلتی ہے، ناخن سیاہ پڑ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ داغ کتھی ہوتا جاتا ہے، اور ناخن بڑھنے کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف آتا ہے، بالآخر بالکل سرے پر آ جاتا ہے، ایسی صورت میں خلیات کی مقامی موت (نکروسیس) کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے،

* احتقان دم / موت دم تحت ظفر = ناخن کے نیچے خون کا مردہ ہو جانا،

اصول علاج

- — ناخن پر مقامی طور سے آبی حرارت پہنچائیں تاکہ انجماد خون رہ سکے
- — تسکین درد کی تدابیر کریں۔
- — علیہ کریں۔

علاج

- — اگر جوٹ کی وجہ احتقان خون کا اندیشہ ہو تو متواتر انگلی کو گرم پانی میں رکھیں تاکہ خون سمجھ نہ ہو سکے۔
- — دن میں چند مرتبہ ناخن کو ٹیٹھ ڈال کر چوسیں، یہ عمل ہاتھ کے ناخن میں بھی کریں،
- — آرد باقلا، سرطان نہری اور زرنج، پانی میں پیس کر ضاد کریں،
- — گندم کے میدے میں زفت رومی ملا کر تھوڑا سا پکا کر نیم گرم ضاد کریں،
- — فطر اسابیون، میمنج پانی میں پیس کر متواتر لپیپ کرنے کی ہدایت کریں،
- — آرد کرسنہ، سرطان نہری، زفت کو سرکہ میں پکا کر نیم گرم ضاد کریں،
- — انون کو شراب سے دھو کر تخم جرجیر سرکہ میں پیس کر ضاد کرنے کی ہدایت کریں،
- — سلیم کے طور پر ناخن کو ترچھا شکاف دے کر خون یا دھوی رطوبت نکالیں تاکہ خون سمجھ نہ ہو سکے اور پھر نیم گرم روغن ڈالیں، اور پھر ہم باسیقون

○۔۔۔۔۔ برگه مورد نیاز را از مرکز تهیه و به مرکز ارسال نماید

ضما د کریں، اس کے بعد بکری کی چربی میں تھوڑا سا کرب ملا کر ضما د کریں، ————— ابتدائی
 سدا بیر کے طوط پر بہت مفید ہے،

○ — — — برگ انار، برگ پنہ، ہر ایک ۲ گرام، زرد چوب، زعفران،
 ہر ایک ۳ گرام، آرد گندم ۲۵ گرام روغن میں بریاں کھکے خوب ملائیں اس کے بعد ضما د کریں،
 اعلا درجہ کا مسکن درد ہے،

○ برگ سنبھالو، برگ سرو، میدہ گندم، ہر ایک ۴ گرام زرد چوب
 ، گرام، تمام دواؤں کو بار یک بیس کر روغن گل میں پکا کر ضما د کریں۔


○ جوز السرو، مغز پستہ، اہل، بار یک بیس کر نیم گرم لیپ کریں،

○ اگر ناخن کے نیچے خون جم گیا ہو تو آرد گندم کو زفت میں ملا کر

لیپ تیار کریں اور لگائیں،

○ گندھک کو بکری کی چربی میں ملا کر ناخن پر لگائیں،

○ فصد کھولیں۔



جذام اظفار

ONYCHOMYCOSIS

اس مرض میں ناخن سیاہ، بد وضع، دبیز اور گلی ہوئی ہڈی کی مانند خشک ہو جاتے ہیں اور معمولی خراش اور چوٹ لگنے سے گرنے / پھڑکنے لگتے ہیں، —

اسباب

(I) ناخن کے نیچے سودا، محرق کا ایتھار

(II) ناخن کا نقص تغذیہ

(III) فساد خون

علامات

تمام ناخن، خاص طور سے اس کی تہ بد وضعی کے ساتھ دبیز ہو جاتی ہے اور غلبہ سودا کی وجہ سے ناخن سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی طبی پکا، بھی زائل ہو جاتی ہے اور وہ ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو کر کھلا تے وقت زیرہ ریزہ ہو کر گرنے لگتا ہے، بالفرض سارا ناخن گر جائے تو اس مقام پر دوسرا ناخن بھی بد وضع ہی نکلتا ہے ظفرہ ملقیدہ میں ناخن کی رنگت ابرک کی مانند سفید ہوتی ہے، اس کے برخلاف جذام اظفار میں سیاہ ہوتی ہے۔ معالجہ کی غفلت کی صورت میں دوسری انگلیوں کے ناخن بھی متاثر

۴۰ اطباء جدیدہ ملقیدہ اور جذام اظفار کو ایک ہی مرض تصور کرتے ہیں،

ہو سکتے ہیں، بعض اطباء کا خیال ہے کہ اگر مناسب علاج میسر نہ ہو تو فاسد مادہ بڑھ کر تمام بدن کا احاطہ کر لیتا ہے اور جذام پیدا ہو سکتا ہے،

اصول علاج

- قصہ کھولیں،
- خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- خون کی اصلاح کریں،
- مرطبات استعمال کریں،

علاج

○ سودا، جو قوی کے لائق و تنقیہ کے لائق اور نہ لائق ہے، استعمال کریں،

کاؤزبان، بادرنجبویہ، اصل السوس مقشر، ہر ایک ۵ گرام، پر سیاوشان ۵ گرام، شاہترہ، اسطوخودوس، بادیان، ہر ایک ۵ گرام، عناب ولایتی ۵ گرام، سرپستان ۱۱ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور کھنڈہ آفتابی / ترنجبین،

خراسانی ۵ گرام مل کر کے نوش کریں، ملاحظہ رہے کہ جس خلط کے احتراق سے سودا کی تولید ہوتی ہے، نسخہ میں اس کی رعایت ضروری ہے،

مادہ کی علامات رونما ہونے لگیں تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کریں،

ہلید سیاہ ۳۰ گرام، بسفانج نیمکوفتہ ۵ گرام، قیتون ولایتی ۲ گرام، برگ سنار کی

اسطوخودوس، ہر ایک ۲ گرام، گل سرخ ۱۲ گرام، برگ کاؤزبان، برگ بادرنجبویہ، ہر ایک

۵ گرام، بادیان، انیسون، ہر ایک ۶ گرام، ترابو صوفی ۳ گرام، ترنجبیل ۵ گرام،

خزرق سیاہ ایک گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور

حجر ارمی، لاجورد مغسول، غار لقیون، ہر ایک ایک گرام، نمک سیاہ ۲۰ گرام پیس کر

ملائیں اور نوش کریں، دوسرے دن تیرید کی غرض سے یہ نسخہ دے گا

لائیں،

آٹھ مہرہ گرم پانی میں دھو کر چاندی کا ورق پیسٹ کر کھلائیں، اس کے بعد
لعاب کا وزن ۵ گرام، پانی میں بحال کر مل چھان کر شربت انار ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے
تخم دیجاں، ۵ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

بعض ابلہ، ماہر الجبن، تازہ دودھ اور روغن باہم ملا کر نوش کراتے ہیں،

○ اکل / باسلیق کی فصد کھولیں،

○ خارجی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں،

مغز ساق کاؤ، موم، روغن بنفشہ، ہوزن کو باہم ملا کر ناخنوں پر لگائیں،

مرہم داخلوں میں بظ، مرغ اور بکری کی چربی ملا کر ناخنوں پر ملیں،

مرہم داخلوں کا نسخہ درج ذیل ہے۔

روغن زیتون کہنہ ۱۴ ملی لیٹر، مردار سنگ ۵، گرم، تخم خطمی، تخم کٹاں، تخم مر،
اسپنخول، تخم حلب، ہر ایک ۲۵ گرام، — تمام تخم کو رات کے وقت پانی

میں بھگو دیں اور صبح کو لعاب نکال کر محفوظ کر لیں، — مردار سنگ کو ہر ایک

کر کے روغن زیتون میں ملائیں اور آگ پر رکھ کر لکڑی سے ہلاتے رہیں، تھوڑی دیر بعد

روغن کو اتار کر سرد کر لیں اور اس میں مذکورہ لعابات ملائیں اور دوبارہ آگ پر رکھ کر

گرم کریں، جب صرف روغن رہ جائے تو اتار کر محفوظ کر لیں،

۔ اسی، موم، شہد کو باہم ملا کر متاثرہ ناخن پر لگائیں،

ہڑتال منقی پانی میں پس کر ناخن پر لگائیں،

بھڑکا مکھن ناخن پر لگائیں، اس کے بعد مدار کی لکڑی کی دھونی ناخنوں پر

کریں، — محرب ہے۔

○ بعض ابلہ، اطریفیل کبیر کھلانے کی تاکید کرتے ہیں،

اطریفیل کبیر کا نسخہ درج ذیل ہے۔

ہلیلہ سیاہ، ہلیلہ کابلی، پوست بلیلہ، آٹھ، فلفل سیاہ، فلفل دراز، ہر ایک ۵، گرم،

زنجبیل، جاوتری، بوزیدان، پیچیتہ، شقاقل مصری، تودری سرخ، تودری زرد، اندبوشیر،

بہمن سفید، بہمن سرخ، کنجد مقشر، خشکاش سفید، مغز حب القلقل، ہر ایک ۳، گرم،

شہد / شکر ۵، گرم، ۳ گرم، ترنجبین خراسانی ۵، گرم، روغن بادام ۱۰ ملی لیٹر، —

تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن بادام میں چرب کریں اور تر بنجیں اور شکر کا قوام بنا کر
اطریفل تیار کریں۔

○ — — — — — تصفیہ مخون کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
عشبہ مغربی، بسفاج فستق، افیون ولایتی، گاؤ زبان، دارچینی، ہر ایک ۲۵ گرام،
جوببہ جینی، صندل سفید، صندل سرخ، گل سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام، ہلیہ سیاہ، گرام، ہلیہ زرد
۴ گرام، — تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شہد ۵۰۰ ملی لیٹر کے قوام میں ملا کر
حسب دستور معجون بنائیں ۱۲ گرام، عرق عشبہ ۵، ملی لیٹر کے ساتھ استعمال کرائیں۔

— ○ —

Learn Unani By Abdul Waris Salmaan

برص اطفال

اس مرض میں ناخن پر چھوٹے چھوٹے سفید نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، ———
اسی مناسبت سے ان کو ”برص“ کہا جاتا ہے۔

اسباب

(I) نقص تغذیہ کی وجہ سے ناخن کے نیچے غلیظ لزج، فاسد رطوبات کا اجتماع

(II) غلبہ بلغم

(III) سومہ القینہ

علامات

متاثر ناخنوں پر چھوٹے چھوٹے سفید نقطے دکھائی دیتے ہیں، یہ سفید نقطے دراصل
ناخنوں کے نیچے ہوتے ہیں جس کی سفیدی ناخنوں کے شفاف ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی
ہے، ——— عمومی علامت کے طور پر سومہ القینہ / غلبہ خلط بلغمی کی روئید ادائی جاتی ہے۔

اصول علاج

- بلغمی خلط کا تنقیہ کریں،
- سومہ القینہ کی صورت میں اس کا ازالہ کریں اور مقویات اور خون
پیدا کرنے والی غذائیں استعمال کرائیں،

○ ————— برس کا اصول علاج اختیار کریں

علاج

○ ————— خلیہ خلط بلغمی، لڑکھ کی صورت میں درج ذیل نسخہ منفع و مسہل د

برابر اندازاً کرنا،

یخ کما سنی، یخ بادیان، یخ اذخر، یخ کرفس، بادیان، (ہر ایک نیمکوب) ۵ گرام،
 یخ اذخر، یخ کرفس، بادیان، یخ اذخر، یخ کرفس، بادیان، (ہر ایک نیمکوب) ۵ گرام،
 انجیر زرد ۵۰ عدد، مویر منقہ ۹ عدد، ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی
 میں بیکو دیں اور صبح کو معمولی جوش دے کر مل چھان لیں اور گلقد عسلی ۵ گرام ملا کر دوبارہ
 چھان لیں اور نوش کرائیں، ————— دن بعد درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں
 مذکورہ بالا نسخہ منفع بلغم میں تریبد سفید مجوف خراشیدہ ۵ گرام، غاریقون مغربل
 ۱۲ گرام، بیکو ۱۲ گرام ملا کر خوشانندہ حاصل کریں۔ مغز فلوں خیار شبنم ۵ گرام، شکر سرخ
 ۵ گرام کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح کو مل چھان لیں اور گلقد آفتابی
 ۵ گرام سے شیریں کر کے روغن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں (پیس کی صورت میں
 عرق بادیان، نیمکرم نوش کرائیں) ————— دوسرے دن یہ نسخہ تریبد استعمال کرائیں،
 گلقد آفتابی ۵ گرام، عرق بادیان ۵۰ ملی لیٹر میں مل چھان کر تخم ریحاں ۵ گرام،
 چھوڑ کر نوش کرائیں،

اگر نفع موجود ہو تو مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں،
 آرد تریبد موسوف ۸ گرام، حب النیل بریاں ۳ گرام، پوست ہلیلہ، زنجبیل، ہر ایک
 ۵ گرام، روغن بادام ۵۰ ملی لیٹر میں چرب کر کے مغز بادام ۳۱ عدد، نبات سفید ۵۰ گرام
 کے ساتھ ایک کہ کے ۱ — ۳ گرام استعمال کرائیں،

برابر اندازاً، زرد چوہ، نمک لاہوری ہوزن پس کر شیرہ خنظل میں تین دن کھرل
 کر ————— بیکو بیر کے برابر گویاں بنائیں اور — گویاں استعمال کرائیں،
 ○ ————— خارجی طور پر یہ دوائیں استعمال کرائیں،
 تخم جابرہ، تخم جابرہ، یک پیس کر سکنجبین میں ملا کر لگائیں،

زورینخ سرخ، جوز السرد، ہوزن سریش ملا کر ضاد کریں،
 صمغ پستہ، سمبز (بکری کی کھر)، سوختہ، یخ نے، زورینخ کو سرکہ میں پیس کر ضاد
 کریں۔

گوگرد، زورینخ طبعی (ہر تال طبعی)، ہوزن پیس کر سرکہ ملا کر ناخنوں پر لگائیں،
 زفت رطب، موم زرد کو باہم ملا کر ناخنوں پر لگائیں،
 ذرا ریح (تلتی کھی)، شراب کی تلچھٹ کو سرکہ میں پیس کر ضاد کریں،
 مغز تخم زیتون، نخود سرخ، باریک پیس کر گائے کی چربی میں ملا کر ناخن پر لگائیں،
 برگ کبر، شہد میں پیس کر ناخنوں پر لگائیں،
 حابہ، صمغ بلوط باریک پیس کر بطن کی چربی میں ملا کر لگائیں،
 — سوہ القینہ کی صورت میں مولہ خون غذائیں استعمال کرائیں،



Learn Unani By Abdul Mannan

تقلع اظفار

اس مرن میں ناخن، جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں،

اسباب

- (I) انگلیوں کے سرے کا کثرت رطوبات سے مستزنی ہو جانا
- (II) فساد خون کے نتیجے میں ناخن کی جڑ کا گل بنانا
- (III) داخس وغیرہ امراض
- (IV) مزیہ و سقط

علامات

سب سے بڑی علامت تو ناخن کا اکھڑ جانا ہی ہے، دوسرا علامتوں کے طور پر غلبہ بلغم، فساد خون وغیرہ ہو جاتا ہے، استرخار سبب مرن ہو تو درد نہیں ہوتا، لیکن حدت خون سبب مرن ہو تو داخس کی نوعیت کا شدید ٹیس دار درد ہوتا ہے، مزیہ و سقط کی صورت میں ان کی روئیداد ملتی ہے،

اصول علاج

○ غلبہ بلغم / استرخار کی صورت میں منہج و مسہل و تہریہ احوال علاج اختیار کریں،

- _____ فساد خون کی صورت میں مصفیات و معدلات استعمال کرائیں،
 ○ _____ ضرب و سقط کی صورت میں مزید ضرب وغیرہ سے احتیاطی تدابیر
 بروئے کار لائیں،
 ○ _____ حسب ضرورت فصد کھولیں / سینگھیاں کھینچیں،

علاج

- _____ غلبہ بلغم کی صورت میں حسب ترتیب یہ نسخے استعمال کرائیں،
 یارج فقرا، افسنتین، ہر ایک ۷، اگر گرام، غار یقون، تر بد سفید، ہر ایک ۷
 ۲ گرام، رب السوس، گل سرخ، ہر ایک ۱، ایک گرام، تمام دواؤں کو کوٹ
 چھان کر سقمونیا مشوی ۷، ۲ گرام (۷۰ ملی گرام) ملا کر شہد میں حل کر کے ہمراہ آب گرم
 کھلائیں (یہ ایک خوراک ہے) اس کے بعد تخم ترب، شبت، شہد، سلجنین کو پانی میں
 جوش دے کر صاف کر کے نوش کرائیں تاکہ تھے ہو کر مواد خارج ہو جائے، اس کے بعد
 یہ نسخے استعمال کرائیں،
 اسطوخودوس، برگ بادرنجبویہ، تخم کرفس، ہر ایک ۵ گرام، یخ اذخر، بادیان،
 تخم قرطم، انیسون، ہر ایک ۴ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، مویز مفتی ۹ عدد، تمام
 دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو کر صبح کو جوش دیں اور مل چھان کر شہد خالص
 ۵۰ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، یہ نسخہ ۵ دن استعمال کرائیں، سولہویں
 درج ذیل نسخہ مسہل دیں،
 تخم خنظل، صبر سقطری، ہر ایک، گرام، زیتون ۵، اگر گرام، مقل اذرق ۵ گرام،
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں اور پہلے ہفتے
 ۵، ۴ گرام، دوسرے ہفتے ۹ گرام، تیسرے ہفتے ۱۳، ۴ گرام اور چوتھے ہفتے ۱۸ گرام،
 صرف ایک بار استعمال کرائیں، ملحوظ رہے کہ استرخانی کیفیت ذرا تاخیر سے
 زائل ہوتی ہے، اس لیے مرین کو بتادیں کہ علاج کا عرصہ کچھ طویل ہو سکتا ہے تاکہ اس
 کا تعاون حاصل ہو سکے،
 ○ _____ فساد خون کی صورت میں باسلیق / صافن کی فصد کھولیں،

پنڈیوں پر سینگیہاں کھینچیں۔ شربت عتاب اور آتش جو نوش کرائیں،
 — — — داخلہ کے ذیل میں بیان کردہ علاج، بروئے کار لائیں،
 — خارجی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
 ○ برگ مورد، کلنار، کو باریک پیس کر ضا د کریں،
 ارد گندم ۲ گرام، کبریت زرد ایک گرام کو بکری کی چربی میں ملا کر ضا د کریں،
 ○ ضرب و سقط کی صورت میں اس کا علاج کریں۔

— ○ —

Learn Unani By Abdul Waris Salman

دائس

WHITLOW

اس مرض میں ناخن کی جڑ میں دھماکا پیدا ہو جاتا ہے، جو شدید اور دناک دھماکے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، انگلیوں کی جلد کے نسبتاً دیر ہونے کی وجہ سے پیپ بھی گہرائی میں ہوتی ہے اور وہ آسانی سے روئی سطح تک نہیں آ پاتی، اس لیے سوزش، درد اور دھماکا وغیرہ کوائف بھی نہایت شدید اور مضطرب کر دینے والے ہوتے ہیں،

اسباب

(I) غلیظ خون / صفراء کے حامل خون کا ناخن کی جڑ کی طرف اجتماع

(II) بخور کے مادہ کا ناخن کی جڑ کی طرف رجوع کرنا

(III) دیگر مادی اجتماع

(IV) آتشک / خنازیر / چنیل / داد / جلندر

(V) مقامی ضرب / زخم

(VI) عام ضعف

(VII) عملیہ کے نتیجہ میں

علامات

ناخن کی جڑ کے پاس شدید التهابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹیس دار درد ہوتا ہے، جو بھل اور کچ ران تک محسوس کیا جاسکتا ہے، تمدد بھی ہوتا ہے،

عام طور سے یہ ورم ناخن کے پاس سے شروع ہوتا ہے، لیکن پھر ناخن کو بھی اپنے دائرہ اثر میں لے لیتا ہے، ناخن کے نیچے ردی مواد اکٹھا ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر ناخن، انگلی سے اونچا ہو جاتا ہے، زخم بن جانے کی صورت میں خلیات کے مقامی فساد کی وجہ سے ناخن اپنی جڑ سے علاحدہ ہو کر گر جاتا ہے، شدید صورتوں میں انگلی کا پورہ بھی گر سکتا ہے، قرص سے رقیق بدلولداریپ خارج ہوتی ہے، شدت کی صورت میں بخار بھی آ سکتا ہے، جو لہرزہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ابتدائی ایام میں ہی مناسب علاج کرنے سے عام طور سے ورم تحلیل ہو جاتا ہے،

اصول علاج

- ————— فصد کھولیں،
- ————— مقام ماقہ پر جو نیکیں لگائیں،
- ————— خلط غالب کا تنفیہ کریں،
- ————— مسکنات درد اور مہر دات استعمال کرائیں،

علاج

- ————— حسب ضرورت باسلیق کی فصد کھولیں،
- ————— خوردنی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
- ————— آلو بخارا، عناب، ہر ایک ۱۰ عدد، تخم کاسنی ۵ ر. ۱۰ گرام، تینوں دواؤں کو پانی میں بھگو کر مل چھان کر نبات سفید ۵ گرام سے شیریں کر کے نوش کرائیں،
- ————— نیلوفر، گل بنشہ، کاسنی نیمکوفہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عناب ولاتی ۲۱ عدد، برگ سنار ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو پانی میں بھگو کر شیر خشک حسب ضرورت ملا کر نوش کرائیں،
- ————— مسهل صغیر ہے،
- ————— خارجی طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،
- ————— مازو سبز سرکہ میں پیس کر داخن پر لگائیں / اسپغول کو سرکہ میں بھگو کر برف سے سرد کر کے لگائیں اور کچھ وقفہ سے سرد پانی اس پر ڈالتے رہیں،

تخم کنوچہ، تخم کنناں ہوزن کا ضاد کریں، جب نفع ہو جائے تو آپریشن کے ذریعہ مواد خارج کریں۔

آرد عدس، آب انار ترش، تخم انار ترش باہم ملا کر پیس کر ضاد کریں۔
بازو، پوست انار ترش، قوبال مس، انجیر خشک ہوزن، —۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر ضاد کریں۔

بعض اطباء تسکین درد اور تحلیل ورم کے لیے یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں،
سریش ماہی، آب کشنیز میں حل کر کے برف سے سرد کر کے ضاد کریں،
اجوائن خراسانی، افیون، حسب ضرورت کو سرکہ میں پیس کر لیپ کریں،
اقاقیا، حنفی، گل ارغنی، مامیثا، نشاستہ، مندل سفید، ہر ایک ۲ گرام، افیون
ایک گرام، لعاب اسپغول، سرکہ حسب ضرورت، میں حسب دستور حل کر کے ضاد کریں،
کات سفید، ہیل خورد، ناگربان، سہاگہ، سیندور، ہر ایک ۲ گرام، —۔
تمام دواؤں کو باریک پیس کر ضاد کریں۔

تخم کنناں کو کوٹ کر سرکہ میں پکائیں اس کے بعد آرد جو، زردی بیغیہ مرغ ڈال کر
خوب ملائیں اور داخس پر لگائیں،

شب یمانی بریاں، کندر، ہر ایک ۲ گرام، زنگار ایک گرام، —۔ تینوں
کو پیس کر شہد میں ملا کر لگائیں،

اشنان کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اس میں دیر تک انگلی کو ڈبوئے
دکھنے کی ہدایت کریں۔

روغن زیتون، دودھ خام کی قیر ملی بنا کر آب برگہ جھنڈر سبز ملا کر لگائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

امراض مفصائل و عظام

Learn Unani By Abdul Waris Salman

مختصر تشریح و منافع عظام (مفاصل)

عظام (ہڈیاں = Bones) انسانی جسم کا ڈھانچہ بناتی ہیں اس طرح یہ تمام جسم کی بنیاد اور سہارا بھی ہیں، ساخت کے اعتبار سے یہ سخت، مضبوط، ہلکی اور پلکدار ہوتی ہیں، ————— اشکال کے اعتبار سے ان کی درج ذیل چار انواع ہیں،

(۱) لمبی ہڈیاں :-

اس زمرے میں رانی اور بازو کی ہڈیاں آتی ہیں،

(۱۱) چھٹی ہڈیاں :-

اس زمرے میں سرین اور شانے کی ہڈیاں آتی ہیں،

(۱۱۱) چھوٹی ہڈیاں :-

اس زمرے میں ٹخنے اور پہونے وغیرہ کی ہڈیاں آتی ہیں،

(۱۲) بے قاعدہ / بے ڈول ہڈیاں :-

اس زمرے میں پشت کے ہرے وغیرہ آتے ہیں،

ہڈیوں کی بنیاد میں عام طور سے ایک تہائی حیوانی مادہ اور دو تہائی ناکارہ مادہ شامل ہوتا ہے، اس کے برخلاف پھوں کی ہڈیوں میں حیوانی مادہ زیادہ ہوتا ہے۔

بوڑھوں کی ہڈیوں میں خاکی (ارضی) مادہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جب بچے گر پڑتے ہیں تو ان کی ہڈیاں خم کھا جاتی ہیں اور ٹوٹنے کا مرحلہ شدید صورتوں میں ہی آتا ہے، اس کے برخلاف بوڑھوں میں ارضی (خاکی) مادہ کی زیادتی کی وجہ سے ہڈیاں چھوٹے چھوٹے حوادث میں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں،

ہڈیوں کو آڑی تراش کے بعد دیکھنے پر اس کی ساخت میں دو حصے دکھائی دیتے ہیں، جن میں باہر والا حصہ تو ہاتھی دانت کی مانند سخت ہوتا ہے اور اندر والا حصہ سوراخ والا، خانہ دار ہوتا ہے، عظام طول (لمبی ہڈیاں) میں ایک بڑا سوراخ / نالی ہوتا ہے جس میں نخ (گودا) بھرا ہوتا ہے، ہڈیوں کی بیرونی سطح پر ایک غشائی پرت ہوتی ہے، جس میں عروق دموئے کاجال سمیٹا ہوتا ہے، ان ہی سے ان کی دموئی پرورش ہوتی ہے، پنا پنا اگر ان کو اتار دیا جائے تو ہڈیاں مردار ہو جاتی ہیں،

دو یا دو سے زائد ہڈیاں کے ملنے کے مقام کو مفصل (جوڑ) کہتے ہیں، مفصل اسی کی جمع ہے، جوڑ جس شے سے باہم جڑتے ہیں ان کو رباطات (بندھن) کہتے ہیں، رباطات سفید، مضبوط ریشہ دار ساخت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کے سروں پر چسپاں رہتے ہیں اور مفصل کو بیرونی صدعات اور اکھڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں،

○ ————— ماہرین علم تشریح کے مطابق جسم انسانی میں کم و بیش ۱۸۰ مفصل ہیں لیکن معیار بندی کے بعد صرف تین بنیادی قسمیں بنتی ہیں -

(۱) غیر متحرک جوڑ:-

اس زمرے میں دانت اور چہرے اور کھوپڑی کی ہڈی کے جوڑ آتے ہیں،

(۱۱) کم متحرک جوڑ:-

اس زمرے میں پشت پاؤں اور پیڑ و غیرہ کی ہڈیوں کے جوڑ آتے ہیں،

(۱۱۱) متحرک جوڑ :-

اس زمرے میں سر، گردن، شانہ اور کو لھے وغیرہ کے جوڑ آتے ہیں، ہڈیوں پر جہاں عضلات، عروق دہوی، رباطات اور دوسری بہت ساری اشیاء جال کی طرح پھیلی ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ یہ ہڈیاں جسم کے اہم نازک اعضاء کو خارجی صدمات اور آفات سے محفوظ رکھنے کا کام انجام دیتی ہیں مثلاً کھوپڑی کی ہڈی سے اس کے اندر کے اعضاء شریف بیرونی صدمات و آفات سے محفوظ رہنے میں پشت کی ہڈیوں سے حرام مغز (نخاع) سینے کی ہڈیوں سے قلب اور پھیپھڑے وغیرہ بیرونی صدمات سے محفوظ رہتے ہیں۔



Learn Unani By Abdul Wahid Usmani

حدبہ

KYPHOSIS

اس مرض میں پشت پر غیر طبعی، کوزہ کی مانند ابھار پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کا جسم ایک طرف جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے،

اقسام

* حدبہ

Kyphosis



* حدبہ (بدونستی صلب) کو اطباء نے ایک جداگانہ مرض تصور کیا ہے اور ریح الافرسہ و ریح الشوک کو جداگانہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی حدبہ کے اسباب ہیں، تاہم قدیم اطباء کی پیروی کرتے ہوئے ان کو علاحدہ علاحدہ تصور کیا جا رہا ہے۔

اسباب

- (I) پشت کے مہرے کے قریبی عضلات کا ورم / رباطت کا تشنج
- (II) ضرب / سقط، جس سے پشت کے مہرے اکھڑ جائیں
- (III) ریح غلیظہ اور بلغمی خلط کا غلبہ
- (IV) ذات الریہ حاد
- (V) فقرات (مہرے) کا باہم مل جانا بلکہ مکمل طور پر جڑ جانا اور بین الفقراتی غفروف کا بڑھ جانا
- (VI) فرسہ نامی خبیث اور اکال مادہ، جس کی وجہ سے مہروں کے رباطات گل جائیں،
- (VII) حیاتیات کی کمی

علامات

مبلی ستون کے بالائی حصہ میں کبڑا پر پھیدا ہو جاتا ہے، سینہ چپٹا ہو جاتا ہے اور تنفس بڑی حد تک بطنی ہوتا ہے، کیوں کہ مہروں اور پسلیوں کے جوڑے حرکت نہ ہو جاتے ہیں، اعصاب اپنے مقام اخراج پر دب جاتے ہیں جس کے نتیجے میں شکم میں انعکاسی درد (Reflex Pain) ہوتا ہے، عمود فقری کے اوپر سے پیچے تک ڈنڈے نما ہو جانے کی وجہ سے مڑنے، خمیدہ ہونے اور جھکنے کی صلاحیت جاتی رہتی ہے اور غضائیں کے ٹیڑھوں میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جیسا کہ مذکور، حس و حرکت کی کارکردگی پر بھی خراب اثر پڑتا ہے، نتیجہ کے طور پر عصبی اور عضلاتی کمزوری و لاعری پیدا ہو جاتی ہے۔

علیحدہ ریح اور بلغم کی صورت میں رطوبات کی علامات پائی جاتی ہیں، درد ہوتا ہے جو کسی قدر جگہ بھی بدلتا ہے، گرم روغن کی مالش سے راحت ملتی ہے، تشنج کی صورت میں پیوست اور کھنچاؤ کی علامات بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ کیفیت غیر معمولی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، التهاب عضلہ کی صورت میں ابتداء میں پشت میں درد اور شدید بخار ہوتا ہے جو ہر وقت رہتا ہے، اور بخار

○ خلط غالب کا تنقیہ کریں ،
○ التهاب عضلہ کی صورت میں قصد کھولیں ،
○ ضربہ و سقط کی صورت میں مہروں کو اصل وضع پر لانے کی تدابیر کریں اور قابضات دیں ،
○ تشنج کی صورت میں مرطبات استعمال کرائیں ،
○ کاسر ریح ادویہ استعمال کرائیں اور رفع قبض کی تدابیر کریں ،
○ تقویت اعصاب کی تدابیر کریں ،

○ غلیظ بلغمی خلط کے غلبہ کی صورت میں نفع و تنقیہ کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

نسخہ مہینض بلغم :-

یخ کرفس، سداب، تخم کرفس، بادیان، ہر ایک ۵ گرام، اذخر، انیسون، ہر ایک ۳ گرام، اصل السوس ۵۰ گرام، یخ کاسنی، پوست یخ بادیان، ہر ایک ۲ گرام، موہرہ منقہ ۲۵ گرام، انجیر زرد ۴ عدد۔ ————— تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں جھگو دیں اور صبح کو مل جھان کر کھنڈہ علی۔ ۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کریں، جب نفخ کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو یہ نسخہ منسہل

استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل بلغم :-

زنجبیل ۴ گرام، گل سرخ، بادیان، ہر ایک ۱۲ گرام، تربد موصوف ۲۵ گرام، یلونہ
خطائی، برگ سارکی، ہر ایک ۳۵ گرام، حب الینیل ۴ گرام، ————— تمام دواؤں
کو باریک پیس کر ہوزن بنات سفید باریک کردہ ملا کر ۹ گرام استعمال کرائیں،
○ تخم ترب، تخم شبت، پورہ ارمنی کو باریک پیس کر شہد اور
گرم پانی میں گھول کر نوش کرائیں، یہ قے آور ہے، اس سے بلغم کا بھی
تفتیہ ہوتا ہے،

○ تفتیہ کے بعد معجونات حارہ (گرم معجون) استعمال کرائیں، —

چند نسخے درج ذیل ہیں،

گل سرخ، سنبل الطیب، اسارون، مصطلی رومی، دارچینی، ہر ایک ۸ گرام، تخم کرفس،
سرمط، ہر ایک ۳۱ گرام، درونج، زرنباد، ہر ایک ۵۰۰ گرام، ————— تمام دواؤں
کو باریک کر کے چھان لیں اور تین گنا شہد کے قوام میں ملا کر حسب دستور معجون بنائیں
اور ۵، ۳ گرام ہمراہ آب نیم گرم استعمال کرائیں۔

زنجبیل، فلفل سیاہ، زراوند مدحرج، عنب الثعلب، شیطرح ہندی،
ینغ بابونہ، مغز چلتوزہ، نارجیل تازہ، ہر ایک ۳۵ گرام، تخم بابونہ ۸ گرام، موزہ منقی
۱۰۸ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر دو گنا شہد کے قوام میں معجون
تیار کریں اور ۲ گرام ہمراہ آب نیم گرم، صبح کے وقت استعمال کرائیں،

○ ————— التهاب (دوم حار) کی صورت میں منفع و مسہل صفرار کے
طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع صفرار :-

تخم خطی، تخم کاسنی، گل بنفشہ، گل سرخ، شاہترہ، عنب الثعلب، ہر ایک
۲ گرام، گل نیلوفرہ ۱ گرام، عتاب، آلو بخارا، ہر ایک ۵۰۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو

رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقدار فتابی
۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں۔ ۴-۵ دن بعد درج ذیل نسخہ مسہل کا اس نسخہ
میں اضافہ کریں۔ گلقدار فتابی ۲۵ کی بجائے ۵۰ گرام کر دیں،

نسخہ مسہل صفر ۱ :-

مغز فلوں خیاز شبنم ۸۵ گرام، ترنجبین خراسانی، تمر ہندی مقشر، ہر ایک ۴۸ گرام
تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان
کر مذکورہ نسخہ منفع میں ملا کر شیرہ مغز بادام شیریں ۵ عدد کا اضافہ کر کے نوش
کرائیں، پیاس محسوس ہو تو عرق کمور / عرق کاسنی نوش کرائیں،
دوسرے دن تبرید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

لعاب بہد انہ ۳ گرام، پانی میں بکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر میں حل
کر کے اسپتول مسلم ۴ گرام پھڑک کر نوش کرائیں،
○ خارجی طور پر درج ذیل تدابیر / نسخے استعمال

کرائیں،

مضبوط و سفت کی صورت میں ٹپے ہوئے مہرے کو اصل مقام پر لائیں اور
حسب ضرورت فصد کھولیں، اور داخلی جانب ہو تو سینگیہاں کھینچ کر ابھار پیدا
کریں۔ اور قابض دواؤں کا ضاد کریں،

التهاب کی صورت میں یا سلیق کی فصد کھولیں۔ اور

ورم پر لعاب تخم کتاں، چربی مرغ، مغز ساق گاؤ باہم ملا کر ضاد کریں۔

غلبہ بلغم میں تنقیہ کے بعد فلفل، جند بید شتر، عاقر قرحا، فریقون،

صلیت ہوزن، تمام دواؤں کو بار یک کر کے ۱۲ گنا روغن سداب

میں ملا کر ایک شیشی میں رکھ کر ۲ ہفتے تک دھوپ دکھائیں اور اس کے

بعد دن میں تین مرتبہ مالش کریں۔

ابہل، شیخ، آس مرز جوش، عاقر قرحا، جوز السرد، اکلیل الملک، اذخر، میلین
 قردانا ہموزن ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں، جب پانی نصف رہ
 جائے تو روغن سداب دو گنا ملا کر دوبارہ جوش دیں، اس کے بعد جند بیدستر، ابہل،
 فریون پس کر ملائیں اور مقام مرض لگائیں،
 وج، راسن ہموزن کو پس کر آب برگ سرد میں ملا کر ضاد کریں،
 وج، راسن، ابہل کو کوٹ کر شراب میں جوش دیں اور گوگل حل کر کے لیپ
 کریں۔
 قسط، قصب الزریہ، ابہل، میعہ سائلہ، ہر ایک ۳۵ گرام، فریون ۳۵
 گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن نار دین ملا کر ضاد کریں۔



Learn Unani By Abdul Karim Hashmi

رُجَّ الشَّوْكَ

SPINA VENTOSA

اس مرض میں ایک تیز دھکی مادہ ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بازو، ران اور پنڈلی کی ہڈی میں نہایت شدید قسم کا چھیننے والا درد ہوتا ہے، بعض اوقات ہڈیاں فاسد اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جدید تحقیق کے مطابق یہ مادہ سرطانی / سلی نوعیت کا حامل ہوتا ہے،

اسباب

(۱) صفراوی خون کا ہڈیوں میں سرایت کرنا

(۱۱) سرطان

(۱۱۱) سل

علامات

متاثرہ عضو کی ہڈی میں چھین کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے جس میں تمدد سوزش اور خارش بھی ہوتی ہے، درد عام طور سے عضو کی لمبائی میں ہوتا ہے، متاثرہ عضو اس قدر حساس ہو جاتا ہے کہ کپڑا لگ جانے سے بھی درد میں اضافہ ہو جاتا

رُجَّ = ہوا، شوکہ = کانٹا، طبی اصطلاح میں مہروں کی پشت پر کانٹے کی صورت والا زائکہ۔

ہے، شدید صورتوں میں ہڈی بڑھ جاتی ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے اور مرلین ہلاک ہو جاتا ہے،

اصول علاج

- حسب ضرورت فصد کھولیں،
- خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- مصفیات استعمال کرائیں،
- تسکین درد کی تدابیر کریں،

علاج

○ تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
شاہترہ، بنفشہ، تخم کاسنی، سنار ملی، ہر ایک ۱۲ گرام، ہلیلہ زرد ۵ گرام،
تمر ہندی ۳۵ گرام، تخم کشوث (صرہ بستہ) ۵۰ گرام، اسپستان، عناب،
آلو بخارا، ہر ایک ۲۰ عدد، تمام دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں
جوش دیں، جب ۲۵۰ ملی لیٹر رہ جائے تو مغز قلوں خیار شبنم، ترنجبین، ہر ایک
۵۰ گرام ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں،

○ مصفی خون کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،
پوست یخ نیم، پوست شاخ انخردشتی، چرانتہ، شاہترہ، کشیز خشک،
پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، پوست بہڑہ، آملہ، ہلیلہ سیاہ شیطرج، ہادیان،
گل سرخ، سنار ملی، ہر ایک ۲۵ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
شہد / شکر کے قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۱۰ گرام ہمراہ شربت عناب
۲۵-۵۰ ملی لیٹر، نوش کرائیں۔

○ تسکین درد کے لیے داخلی اور خارجی طور پر یہ نسخہ استعمال
کرائیں،
تخم کاہو، بزر البنج سفید، ہر ایک ۵ گرام، شیطرج، ایفون، ہر ایک

ایک گرام،۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو باریک پیس کر چنے کے برابر گویاں بنائیں اور
۲۔ ہ گویاں کھلائیں،۔۔۔۔۔ یہ گولی شدید درد کی صورت میں محذر کے
طور پر استعمال کرائیں،

علس مقشر، استخوان سوخته، خشکاش سفید، ہوزن،۔۔۔۔۔ تمام
دواؤں کو سرکہ میں پیس کر ضاد کریں،

تخم کاسنی، تخم خطمی، مازو، کشیز، بنفشہ، صنب الثعلب، ہر ایک ۱ گرام،
آرد جوہ ۱۴ گرام، تخم کاہو، پوست خشکاش، فوفل، سوربجان تلخ، گل سرخ،
اقاقیا، زردچوب، صندل سرخ، گل ارغنی، ہر ایک ۵/۳ گرام، ایفون ۲/۱ گرام،
تمام دواؤں کو پانی میں پیس کر ضاد کریں۔



Learn Unani By Abdul

حدا


RHEUMATISM

اس مرض میں جسم کے بڑے جوڑوں میں درد، سوزش اور سرخی پائی جاتی ہے، اور اکثر صورتوں میں جسمانی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور مفاصل میں تباہ کن تغیرات رونما ہوتے ہیں جن کے دائرے میں ان کی اندرونی غشاء (غشاء زلالی و Synovial Membrane) رباطات (Ligaments) اور اوتار عضلات، عصاریف اور ان کے غلاف وغیرہ سمجھے جاتے ہیں، اور عام طور سے حسی علامات و عوارض بھی رونما ہوتے ہیں۔


اقسام

حدا

Rheumatism



۴ اس کو وجہ المفاصل بھی کہتے ہیں۔



غلبہ اخلاط :-

- (I) غلبہ خون
- (II) غلبہ صفراء
- (III) غلبہ بلغم
- (IV) غلبہ سوداء
- (V) غلبہ خون و بلغم / غلبہ خون و سوداء / غلبہ صفراء و بلغم

بلغم / غلبہ صفراء و سوداء

انفعالات نفسانی :-

- (I) رنج و غم، تشویش و تردد

غذائی بے اعتدالی :-

- (I) ترش اشیاء کا بکثرت استعمال
- (II) گوشت اور لمبی اغذیہ کا بکثرت استعمال
- (III) شیریں اشیاء کا بکثرت کھانا
- (IV) پر شکم رہنے کی عادت / نقص تغذیہ (ناکافی غذا)

عورتوں کے اسباب / امراض :-

- (I) اعتباس حیض
- (II) عرصہ تک دودھ پلانا
- (III) وضع حمل کی تکالیف

تسم / فساد خون :-

- (I) آتشک
- (II) سوزاک
- (III) نزلہ و یا ئی
- (IV) بعض اقسام کے بخار

متفرقات :-

- (I) موروٹی استعداد
- (II) ترک ریاضت / سخت جسمانی و ذہنی کام
- (III) سرد و تر تدا بیر مثلاً — مرطوب مقامات
- پر قیام کرنا، بارش میں بھیگنا، سردی لگنا، سرد و تر اشیاء کا بکثرت استعمال،
- (IV) موسمی تغیرات
- (V) فساد ہضم

- (VI) کثرت شراب نوشی
 (VII) مزید وسقطہ
 (VIII) بعض متعدی امراض
 (IX) کسی بھی طرح سے جسم میں حاسہ بولی
 کی کثرت تولید، اور اس کے بالمقابل قلت اخراج

جدید نقطہ نظر :-

- (I) اسٹریٹو کوکس ہولائیس
 (II) استھالی بے اعتدالی
 (III) انفعالی بے اعتدالی
 (IV) موروٹی اسباب
 (V) ضعف مناعت اور بیش حسیت
 بہر حال غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرض کے اسباب میں کوئی نہ کوئی فعلیاتی خلل یا جراثیمی عمل ضرور کارفرما ہوتا ہے۔ ————— جدید طریقہ علاج کے حاملین ابھی تک اس کے سبب کی تعیین نہیں کر سکے ہیں اور ان کا نقطہ نظر چند مفروضات پر مبنی ہے،

علامات

مریاتی نقطہ نظر سے اس مرض کے دو مرحلے ہیں (I) بلغمی / سردوتر مرحلہ
 (II) سرد و خشک مرحلہ، ————— سردوتر مرحلہ دراصل مرض کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اس میں غشاء زلالی اور مفصلی نیچ میں ورم اور امتلا پیدا ہو جاتا ہے، اور دائمی فساد واقع نہیں ہوتا، ————— سرد و خشک مرحلے میں غشاء زلالی ہینڈ (تجم) کسی ساخت / عضو میں خلیوں کی تعداد و مقدار بڑھے بغیر اس کا سائز بڑھ جانا (Hypertrophy) ہو کر اور کیسے بیرونی تہہ دبیز ہو جاتی ہے اور انتہائی دانے پیدا ہو کر ٹہی کے جوڑوں کے سرے پر چھوٹی چھوٹی شراکین

بننے لگتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڑوں کا وہ روغنی مادہ جو شریان کی تکوین کو روکتا ہے اس میں خشکی یا کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور دونوں سطح رگڑا کھا کر برباد ہونے لگتی ہیں اور کچھ مدت کے گزرنے کے بعد لیفی چپکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور دونوں سطح غیر متحرک ہو جاتی ہیں، بعد میں قریبی عضلات سکڑنے لگتے ہیں، جلد کے نیچے گہری پیدا ہونے لگتی ہیں اور نتیجہ کے طور پر التهاب عظمی مفصلی (Osteo-Arthritis) (دو غیرہ) رونما ہوتے ہیں۔

حاد:-

کرب و بے چینی ہوتی ہے اس کے بعد لہرہ کے ساتھ بخار آتا ہے، جس کے ۲۴-۳۶ گھنٹے بعد ایک یا متعدد جوڑ (مفاصل) میں تناؤ اور شدید درد محسوس ہوتا ہے، سب سے پہلے گھٹنے اور ٹخنے کے جوڑ اور اس کے بعد کہنی اور کلائی کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات کرب و بے چینی کے احساس کے بعد لوزین (Tonsils) کے غدود متورم ہو جاتے ہیں اور مختلف اعضاء میں معمولی درد ہوتا ہے اس کے بعد بڑے جوڑوں میں درد اور درم پیدا ہو جاتا ہے، مرن کے اچھی طرح نمایاں ہو جانے کی صورت میں درد میں غیر معمولی شدت آجاتی ہے، بلکہ کپڑا چھو جاتے پر بھی مریض تڑپ اٹھتا ہے، بخار ۱۰۲-۱۰۳ ف ہو جاتا ہے، شدید صورت میں ۱۰۸ ف تک پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات دونوں طرف کے مقابل والے جوڑ یکبارگی / ایک ساتھ متاثر ہوتے ہیں، جوڑوں کی سوزش ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے جوڑ میں منتقل ہوتی رہتی ہے، درد کی شدت کی وجہ سے حرکت دشوار ہو جاتی ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، نینس سرخ اور متلی ہوتی ہے، زبان میل رہتی ہے، پیشاب کم مقدار میں سرخ رنگ کا یورین سے بھرا ہوا، تیزابی رد عمل کا آتا ہے، سوز، ہلنم اور بطلان اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، ترش رد عمل کا بدبودار پسینہ خارج ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ۱۰-۱۲ دن بعد بخار ختم ہو جاتا ہے اور دوسری تکلیف دہ علامت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ مرن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو سکتا

ہے، تاہم اس کا پہلا اور دوسرا حملہ نہایت شدید ہوتا ہے، اس کے بعد کے دور سے نسبتاً تخفیف ہوتے ہیں،

غلیظ خون کی صورت میں عصبوں کی رنگت سرخ اور عروق بھری ہوتی ہیں، ورم میں تناؤ و محسوس ہوتا ہے، بخار لازم ہوتا ہے اور درد کی ٹیس کا احساس ہوتا ہے۔ غلیظ صفراء کی صورت میں درد میں شدت ہوتی ہے، سوزش اور التهاب بھی ہوتا ہے، بخار لرزہ سے ہوتا ہے، اس میں کسی وقت تخفیف ہوتی ہے اس کے بعد پھر آجاتا ہے، ذائقہ تلخ ہو جاتا ہے، نبض سریع ہوتی ہے، گرم دواؤں کے استعمال سے اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور سرد دواؤں کے استعمال سے راحت ملتی ہے، ای۔ ایس۔ آر۔ E.S.R. بڑھا ہوا ہوتا ہے،

باقی میں مذکور ہوا کہ اس مریض میں سوزش اور التهاب ایک جوڑے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتا ہے پھر اپنی پہلی جگہ پر لوٹ آتا ہے، جوڑوں میں یہ کیفیت اگرچہ خطرناک نہیں ہوتی تاہم جب اس کا سستی مواد اندرونی اعضا میں اثر انداز ہو جائے تو نہ صرف جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے بلکہ یہ عوارض نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور پیچیدگی کے طور پر قلب اور حجاب قلب کا التهاب، ذات المریہ، التهاب شعب ریہ، ورم جنجرہ، التهاب مفاصل، التهاب خصیہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔

تحت الحاد:-

اس میں بخار شدید نہیں ہوتا، مفاصل میں درد التهاب بھی نسبتاً کم ہوتا ہے، جوڑوں کی پشت اور ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اور انجام بھی عام طور سے بخیر ہوتا ہے۔

مرمّن:-

مفاصل اور ان کے عضلات میں درد اور صلابت پائی جاتی ہے، رات کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد میں تھجھن بھی ہوتی ہے، حرکت / مالش سے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے اور کبھی آرام محسوس ہوتا ہے، سرد تدابیر / سرد مقام پر رہنا / سے

عوارض میں شرت آجاتی ہے، بعض اوقات جوڑوں میں معمولی/کسی قدر زیادہ درم بھی رہتا ہے، جوڑوں میں رطوبتوں کے اکٹھا ہو جانے سے ساخت میں تغیر و تناسل ہو سکتا ہے اور جوڑے موٹے ہو جاتے ہیں، کبھی پھول کر بد نما ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ حرکت دشوار ہو جاتی ہے، اُسے دن ضعف اور لاغر د میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، عام طور سے بخار نہیں ہوتا، شدید سورت میں بہت معمولی بخار ہوتا ہے۔

غلبہ بلغم کی صورت میں جوڑوں میں گرانی کا احساس ہوتا ہے، رطوبات بھی اکٹھا ہو جاتی ہیں اور درم بہت نمایاں ہوتا ہے نیز نرمی ہوتی ہے، غلبہ سودا کی صورت میں درم کا رنگ نیلا، کسی قدر سیاہ ہوتا ہے، درم ہوتا ہے تاہم اس میں تناؤ زیادہ ہوتا ہے، صلابت بھی ہوتی ہے، غلبہ ریح کی صورت میں درد ایسی جگہ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دیگر عوارض کے طور پر سورہ ہضم کی شکایت ہوتی ہے، جگہ کے افعال میں سستی آجاتی ہے، معدی رطوبات کی تراوش میں بھی کمی آجاتی ہے، حصات متناہ اور التہاب قلب ہوتا ہے،

مزمن عضلہ :-

یہ مرض عام طور سے خارجی بردت کے زیر اثر آنے سے ہوتا ہے، اس سے تقدیر کے طور پر اس طرح کی سرگند شدت مزہ درملتی ہے، بہر حال عضلات میں صلابت اور درد کی شکایت ہوتی ہے، بعض اوقات گردوں، کمر اور پشت میں شدید درد ہوتا ہے اور کبھی درد اس قدر مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے کہ جسمانی حرکت کے بعد ہی محسوس ہو پاتا ہے، درد اور بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، بخار نہیں ہوتا، رات کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا تینوں انواع کی علامات درج ذیل ہیں۔

(I) قحفی :-

اس میں کھوپڑی میں درد ہوتا ہے، دبانے اور عضلات میں حرکت کرنے

سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے ۔

(II) عنقی :-

گردن میں درد ہوتا ہے، کھانسنے اور سر کو ہلانے ڈلانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ درد عام طور سے ایک ہی جانب ہوتا ہے،

(III) جنبی :-

اس میں سینہ کے عضلات میں شدید درد ہوتا ہے اور عام طور سے درد کا مرکز بئل کا زیریں حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسنے، پھینکنے اور سانس لینے سے درد میں شدت آ جاتی ہے، درد ایک ہی مقام پر قائم رہتا ہے اور دبانے سے اس میں کمی آ جاتی ہے،

(IV) قطنی :-

اس صورت میں کھڑے ہونے کی حالت میں مریض سامنے کی طرف جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، کمر میں اچانک شدت کا درد ہوتا ہے، رات کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے،

زلالی :-

اس صورت میں غشاء زلالی سے بہت زیادہ مقدار میں لیسہ اور رطوبت مترشح ہو کر مفاصل میں جمع ہو جاتی ہے اور ان کو متورم (کمر دیتی ہے جوڑوں میں پانی جیسی رطوبت بھر جاتی ہے، یہ صورت گھٹنے کے جوڑوں میں کثیر الوقوع ہے،

تجری^۱ :-

عام طور سے ایک ہی جوڑا مبتلائے مرض ہوتا ہے، چنانچہ اس میں ورم اور

۱۔ اس کو تجر مفاصل (Rheumatoid Arthritis) کہتے ہیں ۔

صلابت پیدا ہو جاتی ہے، بد وضعی ہوتی ہے اور درد کی شکایت رہتی ہے، وقتی طود سے کچھ عرصہ کے لیے یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر لوٹ آتی ہیں، یہ صورت متعذر بار، ایک یا کئی جوڑوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یکے بعد دیگرے بہت سارے جوڑے کار ہو جاتے ہیں، ————— مرصیاتی نقطہ نظر سے متاثرہ جوڑے کی تمام ساختیں متاثر اور متورم ہو جاتی ہیں اور درد کا احساس ہوتا ہے، الا لم جذاب للمادة (درد و تکلیف مادہ کو اپنی طرف جذب کرتی ہے) کے اصول کے تحت اس طرف دوران خون تیز ہو جاتا ہے نتیجہ کے طور پر اس میں فاسدر طوبتیں تراکشی پانے لگتی ہیں، کچھ مدت گزرنے کے بعد یہ رطوبتیں جذب ہونے لگتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی مفاصل کی کرباں (غضاريف) بھی جذب ہونے لگتے ہیں اور درد کا احساس شدت سے ہوتا ہے، مفاصل کی غضاريف (جوڑوں کی کرباں) کے مرے آپس میں مل کر پتھر (حجر) کی مانند سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہو جاتا ہے، حجر کی یہ کیفیت گمردن کے مہروں اور زیریں جہڑے کے جوڑے تک اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مٹھ کھولنا اور بولنا تک دشوار ہو جاتا ہے، رات کے وقت خاص طور سے درد شدت کا ہوتا ہے، روز بروز لائغری اور ضعف طاری ہو جاتا ہے، اور مرصیاتی زندہ درگور کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ دیگر اسباب مثلاً آشک، سوزاک وغیرہ کی صورت میں ان کی اپنی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

تفریقی علامات

حدار سوزاکی
(وجع المفاصل سوزاکی)
Gonorrhoeal Rheumatism

- ۱۔ سوزاک کی رویتداد ملتی ہے۔
- ۲۔ کسی جوڑے میں درد اور لنگ سے،

حدار حاد
(وجع المفاصل حاد)
Acute Rheumatism

- ۱۔ خارجی طود پر سردی سے متاثر ہونے کی رویتداد ملتی ہے۔
- ۲۔ مرض کا آغاز لہزہ کے ساتھ بخار

بالخصوص مفصل رکبے مرن کا
آغاز ہوتا ہے۔

۳۔ ایک یا دو جوڑ متاخر ہوتے ہیں۔

۴۔ پسینہ زیادہ نہیں آتا۔

۵۔ شاذ و نادر ہی ۱۰۲° ف سے زائد
ہوتی ہے۔

۶۔ درد بہت شدید نہیں ہوتا، جوڑ
میں تحت الحاد التهاب ہوتا ہے۔
۷۔ آنکھیں عام طور سے متورم ہوتی
ہیں۔

۸۔ قلب، شاذ و نادر متاخر ہوتا ہے۔

۹۔ شفا، تاخیر سے حاصل ہوتی ہے۔

سے ہوتا ہے۔

۳۔ ایک سے زائد جوڑ متاخر ہوتے

ہیں،

۴۔ پسینہ کثرت کے ساتھ آتا ہے،

۵۔ جسمانی حرارت ۱۰۸° ف تک پہنچ
جاتی ہے،

۶۔ درد بہت شدید ہوتا ہے،

۷۔ آنکھیں عام طور سے متورم نہیں
ہوتیں،

۸۔ قلبی عوارض بھی عام طور سے
پائے جاتے ہیں،

۹۔ علاج سے جلد فائدہ ہوتا ہے،

اصول علاج

○ مرطوب آب و ہوا میں رہنے سے احتراز کی تاکید کریں۔

○ غلبہ خون / صفراء کی صورت میں معدلات اور منقعات استعمال

استعمال کرائیں / فصد کھولیں،

○ غلبہ بلغم / سودا کی صورت میں ان کا تنقیہ کریں،

○ تسکین درد کی تدابیر کریں،

○ دافع بخار دوائیں استعمال کرائیں،

○ ورم کو تحلیل کرنے کی تدابیر کریں،

○ ضعف و لاعزنی کی صورت میں مقویات استعمال کرائیں،

○ قلبی، ریوی عوارض کی صورت میں ان کا ازالہ کریں،

علاج

○ غلبہ خون کی صورت میں، مریض کے قوائے جسمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے موافق جانب کی باسیلیق کی فصد کھولیں، اگر فصد کھونا موزوں نہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں، حرارت کو کم کرنے میں بھی مفید ہے۔

شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خربزہ، شیرہ تخم کاسنی، شیرہ خار خشک، ہر ایک ۶ گرام، شیرہ تخم کاہو ۳ گرام، عرق مکو، ۱۵۰ ملی لیٹر میں نکال کر شربت بزوری ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

سورنجان شیریں کا سفوف بنا کر ایک گرام لیں اور گلقد / اطریفیل صغیر، گرام میں ملا کر کھلائیں، اس کے بعد شربت بزوری ۲۵ ملی لیٹر نوش کرائیں، ۸-۷ دن تک یہ نسخہ استعمال کرائیں، اس کے بعد درج ذیل نسخہ منفع و مسہل دیں،

نسخہ منفع :-

گل بنفشہ، گل نیلوفر، تخم کاسنی، سورنجان شیریں، بیخ کاسنی، شاہترہ، مکوہ خشک، ہر ایک ۷ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر صاف کر کے گلقد ۱۰ گرام ملا کر نوش کرائیں، جب نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسی میں اس نسخہ کا اضافہ کریں،

ہلیلہ زرد ۲۵ گرام، سنار کی ۱۲ گرام، کدات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو جو ش دے کر مغز فلوں خیار شیر، روغن بادام ۶ ملی لیٹر حل کر کے، مذکورہ نسخہ ملا کر نوش کرائیں،

○ غلبہ صفراء کی صورت میں نفج و متیقہ کے یہ مندرجہ ذیل نسخہ استعمال

کرائیں،
نسخہ منفع :-

گل بنفشہ، گل سرخ، تخم خلی، شاہترہ، تخم کاسنی، جنب الثعلب، ہر ایک

گرام، گل نیلوفرہ گرام، سورنجان شیریں ۳ گرام، عناب ۵ عدد، _____ تمام
دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں ترکیبیں اور صبح کو مل چھان کر خیرہ بنفتہ / گلقد ۲۵ گرام
حل کر کے نوش کرائیں، _____ جب نفج کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو
اسی نسخہ میں درج ذیل ادویہ مسہل کا اضافہ کریں،

نسخہ مسہل :-

منتر فلوس خیار شبنم ۵ گرام، تر ہندی، ترنجبین، ہر ایک ۵ گرام، _____
تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور مل چھان کر نسخہ منفع کے ساتھ نوش کرائیں، گلقد
۵ گرام کر دیں، دوسرے دن تبرید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

لعاب بہدانہ ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفتہ، ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپنول
مسلم ۴ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،
_____ غلبہ بلغم کی صورت میں نفج و تنقید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منفع :-

بیج بادیان، بیج کرفس، بیج اذخر، بادیان، پر سیاوشاں، ہر ایک ۵ گرام، اصل اسوس
مقشرہ گرام، اسطوخودوس ۵، ۶ گرام، مویہ منقہ ۹ عدد، انجیر زرد ۵ عدد، _____
تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر گلقد ۲۵ گرام
حل کر کے نوش کرائیں، _____ ۶۔ ۷ دن تک یہی نسخہ استعمال کرائیں اٹھویں دن
مسہل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل :-

غاریقون مغربل ۲ گرام، تربد مجوف خمر الشیدہ ۵ گرام، سناب کی ۱۲ گرام، _____
تمام دواؤں کو نسخہ منفع میں ملا کر بھگو دیں، اور منتر فلوس خیار شبنم

۸۵ گرام، شکر سرخ۔ ۵ گرام ملا کر مل چھان کر دوغن بادام ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کر لیں، دوسرے دن تبرید کے طور پر یہ نسخہ دیں،

نسخہ تبرید :-

سنگنندہ ۲ گرام، عرق بادیان ۸۵ ملی لیٹر میں حل کر کے مل چھان لیں اور تخم ریحاں ۳ گرام جھڑک کر نوش کرائیں،

غلبہ بلغم کی صورت میں نضح و تنقیہ کے لیے درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسوی منصفج :-

برگ شاہترہ، چرائٹہ، ہرایک ۶ گرام، بادیان، یخ بادیان، ہرایک ۵۵
گرام، سودنجان شیریں، افیتمون ولایتی، بسفاج فستقی، ہرایک ۵ گرام، عناب ۵ عدد،
تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو جوش دے کر
مل چھان کر کلقتند ۳ گرام حل کر کے نوش کرائیں۔ ————— ۹ دن تک یہ نسخہ استعمال
کرائیں، دسویں دن مسہل کے طور پر یہ نسخہ دیں،

نسخہ زیر مسہل :-

سنار کی، گل سرخ، ہر ایک ۱۲ گرام کونسو منضج بالائیں ملائیں اور مغز فلوکس
خیار شبنم، گرم، ملا کر مل چھان لیں اور روغن بادام و ملی لیٹر حل کر کے نوش
کرائیں۔۔۔ دوسرے دن تبرید کے طور پر یہ نسخہ دے۔

نسخہ در تہرید :-

آطمربی کو گرم پانی میں دھوئیں اور چاندی کا ورق پیٹ کر کھلائیں، اس کے بعد لعاب گھاؤ زبان ہ گرم، پانی میں نکال کر مل جھان کر شربت (۱) اور ۲ ملی میٹر سے شیریں کریں اور تخم ریحاں، گرام چھڑک کر نوش کرائیں،

○ ————— تجر مفاصل کا سبب اگر سوداوی خلط ہو تو نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ زیادہ مناسب ہے۔

نسخہ منفع سودا :-

گل بنفشہ، گل گاؤ زبان، بسفاج، اقیسمون، بادرنجبویہ، کومر خشک، برگ شاہترہ، گل سرخ، سورنجان شیریں، ہر ایک، گرام، انیسون، یوزیدان، درونج عقرنی، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر کھنکھندہ ۵ گرام، حل کر کے نوش کرائیں، ۵ دن تک یہی نسخہ استعمال کرائیں، سو لہویں دن اسی نسخہ میں درج ذیل دواؤں کو بطور مسہل شامل کریں۔

نسخہ مسہل سودا :-

سنارکلی، ہلید سیاہ، ہر ایک ۸ گرام، تربد سفید، ریوند خطائی، ہر ایک ۹ گرام، مویز منفی ۲۵ گرام، مغز فلوس خیار شہزادہ ۴۰ گرام، تربد نجین ۵۰ گرام پانی میں حسب دستور بھگو کر مل چھان کر روغن بادام، ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، تنقیہ کے بعد تصفیہ خون، رفع بخار اور دوسرے عوارض کے ازالہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

سورنجان شیریں، یوزیدان، پوست ہلید زرد، شاہترہ، عشبہ، مغز تخم تربوز، مغز بادام شیریں، مغز تخم باؤ بڑنگ، مغز تخم خیار، کشنیز لمقشر، تخم خشخاش سفید، ہموزن ————— تمام دواؤں کو باریک پیس کر ہوزن نبات سفید حل کر کے سفوف تیار کریں، اور ۶ — ۱۰ گرام ہمراہ عرق جو لہسہ استعمال کرائیں، درج ذیل نسخے بھی مفید اور مجرب ہیں،

چوب چینی ۲۵ گرام، عشبہ مغربی ۱۲ گرام، دارچینی قلمی، ثعلب مصری، سورنجان شیریں، یوزیدان، بہمن سفید، شقاقل مصری، بہمن سرخ، تودی سرخ، سودی زرد، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو کورٹ، چھان کر تین گنا شہد میں ملا کر

حسب دستور معجون بنائیں اور ۷ گرام ہمراہ عرق حبثہ ۸۵ ملی لیٹر، نبات سفید ۱۲ گرام،
لاکڑی کرائیں،

پوست ہلیہ زرد، پوست ہلیہ کابلی، ہر ایک ۵ گرام، آم خشک ۳ گرام، افیمون
ولایتی، حبثہ مغربی، برگ شاہترہ، بسفاج فستقی، تربہ سفید، ہر ایک ۵/۱۴ گرام،
برگ سنار کی ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد میں حسب دستور
معجون بنائیں اور ۷-۱۳ گرام ہمراہ عرق بادیان مرکب استعمال کرائیں۔

سورنجان ۵ گرام، برگ سنار کی ۸ گرام، زنجبیل، زیرہ سیاہ، دار فلفل، اسارون،
ہر ایک ۷ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر تین گنا شہد میں حسب دستور
معجون بنائیں اور ۵ گرام استعمال کرائیں۔

برادہ چوب چینی ۶ گرام، سورنجان شیریں ۲۵ گرام، گل گاؤ زبان، گل سرخ، بلورنجو،
ہر ایک ۱۲ گرام، پوست ہلیہ کابلی، پوست ہلیہ زرد، تربہ سفید، ہر ایک ۶ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد کے قوام میں حسب دستور معجون بنائیں اور ۶ گرام
بوقت خواب کھلائیں، نجر مفاصل میں بے حد مفید ہے،

ہلیہ سیاہ، سورنجان شیریں، برگ سنار کی، ہر ایک ۸ گرام، اسارون، شیطرچ
ہندی، دار فلفل، بادیان، زنجبیل، ہر ایک ۹ گرام، حب النیل مد برد ۱۰/۱۰ گرام، ریلوند
خطائی ۱۶ گرام، نمک لاہوری حسب ضرورت۔ تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر
سفوف بنائیں اور ۹ گرام، صبح، شام کھلائیں۔

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخے بروئے کار لائیں۔

سورنجان ۱۲ گرام، آب کشنیز سبز مروق میں پیس کر متاثر مفاصل پر صناد کریں،
حادثہ صورت میں مفید ہے۔

سورنجان، یخ نے، ہوزن کو آب کور، سبز مروق میں پیس کر صناد کریں۔ حادثہ
مفید ہے،

صندل سرخ، صندل سفید، گل سرخ، فوفل، اقا قیا، اردجو، ہوزن کو باریک
پیس لیں اور آب کشنیز، سرکہ ہوزن ملا کر صناد کریں، تین دن کے بعد اسی
نسخہ میں بنفشہ، خطی، اکلیل الملک کا اضافہ کر دیں۔

سورنجان ۳ گرام، مکوہ ۵ گرام کو کوٹ چھان کر روغن گل ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے سفیدی بیفہ مرغ ایک عدد شامل کر کے لگائیں۔
اسپغول، کوکنار، ہوزن کو پانی میں جوش دے کر گاڑھا کر کے روغن گل ملا کر ضاد کریں، ———— شدید درد کی صورت میں افیون اور زعفران ———— وغیرہ، مذکورہ نسخہ میں شامل کر سکتے ہیں،

اسکند، زنجبیل، اجوائن خراسانی، ہوزن کو پیس کر سفوف بنائیں اور مقام درم پر روغن کنجد کی مالش کر کے یہ سفوف چھڑک کر برگ سناہکی باندھیں۔
گل بابوز، تخم کتاں، تخم حلبہ، منقل اذرق، جاوشیر، رائیخ، ہر ایک ۶ گرام، انجیر زرد ۳ عدد ———— تمام دواؤں کو باریک کریں اور روغن زیتون، روغن گل، ہر ایک ۲۵ ملی لیٹر چربی گروہ بکری ۲۵ گرام۔ دواؤں کو باہم ملا کر، باریک سفوف شدہ دوائیں خوب گھونٹ کر مقام درم پر ضاد کریں، محلل اور ملین ہے،
افیون ۶۰ گرام، روغن کنجد ایک لیٹر، شیر گاؤ ایک لیٹر، کچلہ ۲۰ عدد، ———— افیون کو گائے کے دودھ (شیر گاؤ) میں خوب حل کریں، اس کے بعد روغن کنجد، اہد کچلہ ڈال کر لوہے کی کڑاہی میں نرم آئینہ پر پکائیں، — جب صرف روغن رہ جائے تو صاف کر کے مقام درم پر مالش کریں،

روغن ارٹد، روغن کتاں، روغن تارا میرا، عاقر قرحا، اجوائن، مالکگنی، تخم حرمل، ہر ایک ۶۰ گرام / ملی لیٹر، ———— تمام خشک دواؤں کو نیکوب کر کے ۵۰۰ ملی لیٹر پانی میں ۸ گھنٹے تک بھگوئیں اس کے بعد جوش دیں، جب پانی صرف ۲۵۰ ملی لیٹر باقی رہ جائے تو تمام دواؤں کو چھان کر نکال لیں اور پانی میں مذکورہ بالا روغنات ملا کر دوبارہ پکائیں، جب پانی بالکل خشک ہو جائے تو چھان کر مالش کے طور پر استعمال کرائیں،

روغن خردل، روغن مصطکی، روغن گل، ہوزن کی مالش کریں اہد جوڑوں کو گرم دیتے رہیں، تحت الاماد صورت میں مفید ہے۔

روغن کنجد ۶۰ ملی لیٹر، آب ادراک ۵۰۰ ملی لیٹر ———— دونوں کو ملا کر جوش دیں، جب صرف روغن رہ جائے تو محفوظ کر لیں اور جوڑوں پر مالش کریں،

تجربہ میں مفید ہے،
 مغز تخم ارند ۳۵ گرام، شہد، گائے کا گھی، ہر ایک ۱۲ ملی لیٹر،
 تمام دواؤں کو باہم کھل کریں، جب خوب مل جائیں تو لپیپ کے طور پر استعمال کرائیں،
 تجربہ میں کارآمد ہے،

چربی بلیغ، چربی مرغابی، مغز ساق کاؤ، ہر ایک ۸ گرام، موم ۵۳ گرام،
 تخم کتان، تخم حلبہ، ہر ایک ۲۵ گرام، مرکی، مصلیٰ، سورنجان، منقل، میسرہ،
 ہر ایک ۵ گرام، — — — تمام دواؤں کو کوٹ کر قیرو ملی بنا کر لگائیں۔ تجربہ مفصل
 میں مفید ہے۔

اشق کو سرکہ میں ملا کر لپیپ کے طور پر استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Usman


نقرس

GOUT

اس مرض میں جسم کے چھوٹے جوڑوں میں التهاب پیدا ہو جاتا ہے جس سے شدید درد ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی اثر انداز ہو جاتا ہے اور غیر معمولی عوارض کا باعث ہوتا ہے، یہ مرض مردوں میں چالیس سال کے بعد کثیر الوقوع ہے،

اقسام

نقرس



اسباب

① خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی

(I) دوران خون میں غیر طبعی سرخی (تیز) اتار چڑھاؤ
(II) کمریات حمراء کی زیادتی (Polycythaemia)
(III) پیورائٹن کی حامل غذائیں مثلاً ————، مٹر، کھجور، گندہ
(IV) عیش و عشرت کی زندگی
(V) شیریں، جو کی شراب
(VI) مزمن بد ہضمی
(VII) سیسہ کا زہر
(VIII) مرطوب آب و ہوا / موسمی تغیرات / سردی / سردی
(IX) انفعالات نفسانی ———— مثلاً ذہنی تفکرات اور تردد، غم
(X) تھکان / کثرت مشاغل / کثرت ورزش
(XI) ضرب و سقط / جراحت کے بعد
(XII) دموی / صفراوی خلط کا غلبہ / سوداوی / بلغمی خلط کا غلبہ
(XIII) وراشت
(XIV) فاقہ کشی ———— غور کیا جائے تو ان جملہ حالات میں یورک ایسڈ اعنافی طور پر
(XV) غیر معتدل ہو جاتا ہے،

علامات

مرضیاتی نقطہ نظر سے خون میں یورک ایسڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مذکورہ تین صورتوں میں کوئی ایک، سورت، نزدیک، یا جاتی ہے (D) یورک ایسڈ غذا سے زیادہ مقدار میں حاصل ہو رہا ہو، (L) جسم زیادہ اخراج کر رہا ہو، (K) گردوں سے اس سمی مادے کا اخراج موثر انداز میں نہ ہو رہا ہو، یا (A) یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورک ایسڈ حرکت کرنا بہت باعزت مرقق بنتا ہے بلکہ اس مادہ کو ہضم کرنے کے لیے کربات بیضا () حملہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس سے زہریلے مواد خارج ہو کر مرضی، الماس پیدا کرتے ہیں، بہر حال، ابتدائی مرضیہ یورک ایسڈ، موڈ کی سوزش، قلم میں مفصل (جوڑ) کی بخاریہ، (کریو)، بہرہ، یا (A) کے اوپر ملاحظہ، اور غرضیہ

مفاصل کے قریبی عضلات اور ان کی بالائی جلد پر بھی یہ قلمیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور جوڑ متورم، بید وضع اور دردناک ہو جاتا ہے۔

درد کا آغاز عام طور سے چھوٹے جوڑ، خاص کر پیر کے انگوٹھے کے "نقوروسی" جوڑ سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام "نقرس" رکھا گیا ہے، بعض اوقات ہاتھ کے جوڑ پہلے مبتلائے مرض ہوتے ہیں اور شدید/مزمن علامات رونما ہوتی ہیں،

(I) نقرس حاد:-

ابتداء میں (مرضی علامات رونما ہونے کے قبل) سورہضم کی، درد اور دوران سرکی شکایت ہوتی ہے، بعض اوقات حلق میں بھی درد ہوتا ہے، اختلاج قلب بھی ہو سکتا ہے، نیند اتر جاتی ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، پیشاب کم مقدار بھی، گہرے رنگ کا غلیظ القوام، خارج ہوتا ہے اور اس کا رد عمل ترش ہوتا ہے بعض اوقات رقیق اور بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے، اس کے بعد مرض کا حملہ ہوتا ہے، مرض کا حملہ عام طور سے رات کے آخری حصہ میں ۲-۵ بجے ہوتا ہے، اور اکثر صرف دائیں پاؤں کے انگوٹھے کا پہلا جوڑ متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں پیروں کے انگوٹھے میں اور کبھی ایڑی اور ٹخنے کے جوڑ میں شدید درد ہوتا ہے، درد کی شدت کی وجہ سے مریض بیدار ہو جاتا ہے، جوڑ متورم اور سرخ دکھائی دیتا ہے، ذکاوت حس غیر معمولی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انگوٹھے کو حرکت دینا اور ہاتھ لگانا دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ کپڑا چھو جانے پر بھی مریض تڑپ اٹھتا ہے، کسی قدر لمرزہ کے ساتھ ۱۰-۱۲ درجہ بخار ہوتا ہے، صبح کو عوارض میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ پسینہ آکر بخار کم بلکہ ختم ہو جاتا ہے، درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن رات میں پھر مرض کا دورہ پڑتا ہے، جو پہلی رات کی نسبت زیادہ شدید ہوتا ہے، ۸-۱۰ دن بعد علامات میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس کے بعد بخار اور درد، دونوں رفع ہو جاتے ہیں، متاثر جوڑ کی جلد کی اوپری پرت اتر جاتی ہے، شدید خارش ہوتی ہے، اور جوڑ اپنی اصل وضع اور حالت پر آ جاتا ہے۔ ملحوظ ہے کہ یہ بہت ہی ہٹیلہ مرض ہے، ایک مرتبہ مبتلا ہو جانے پر ۳-۹ مہینے میں اس کا دورہ پڑتا رہتا ہے اور شدید صورتوں میں جسم کا کوئی نہ کوئی چھو، جوتا ہمیشہ

مبتلائے مرض رہتا ہے، بعد میں تمام چھوٹے جوڑ مبتلا، مرض ہو جاتے ہیں، دوروں کی شدت کی وجہ سے مرین نڈر حال اور کمزور ہو جاتا ہے،

(II) نقرس مزمن :-

مرض کا دورہ بار بار پڑتا ہے لیکن وقفہ طویل ہوتا ہے، ادھر دورے میں کوئی زکوئی نیا جوڑ مبتلائے مرض ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے جوڑ متورم اور دردناک ہو جاتے ہیں، متاثر جوڑ ہمیشہ کے لیے بے ڈول، بد وضع اور سخت ہو جاتا ہے، انگلیوں کے جوڑوں پر بڑی بڑی سخت گلیٹیاں نمودار ہو جاتی ہیں، ان کی قدرتی حرکت زائل ہو جاتی ہے، اوپر کی جلد نیلی/تھی ہوئی ہوتی ہے اور تناؤ کی زیادتی اور لمبی لچک کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے، اختلاج قلب کی شکایت ہوتی ہے، چڑچڑاپن اور بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب پیلے رنگ کا رطوبت بھیدہ آمیز خارج ہوتا ہے، بعض اوقات خفیف بخار بھی ہوتا ہے، عضلات میں تشنج اور چہرے میں عصبی درد کی شکایت ہوتی ہے، جلد بے آب ہو جاتی ہے، بعض اوقات جوڑوں کی گلیٹوں سے تختہ سیاہ (بلیک بورڈ) پر لکھا بھی جاسکتا ہے، اسی مناسبت سے ان کو چاک اسٹون کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جوڑوں کے ارد گرد بائی یوریٹ آف سوڈا اور کیلیم فاسفیٹ جمع ہو کر چاک اسٹون Chalke Stone کی سی کارکردگی کے حامل ہو جاتے ہیں۔

(III) نقرس حشوی :-

یہ صورت نقرس کے حملہ کے بظاہر ایک بیک رک جانے کے بعد پیش آتی ہے جتنا نچرہ جوڑوں کا درد موقوف اور بخار زائل ہو جاتا ہے لیکن مرض کا رجحان اندرونی اعضا کی طرف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد، تھ اور اسہال کی شکایت ہوتی ہے، اگر اعضاء تنفس پر مرض کا اثر ہو جائے تو تنفس میں دشواری ہوتی ہے، سعال مزمن اور ذات الریہ ہو سکتا ہے، ————— کلینک اثر انداز ہوں تو ان کی ————— اخذ، اور اہل میں نقص آجاتا ہے پیشاب میں رطوبت بھیدہ خارج ہونے لگتی ہے الزہار، متاز اور التبا، بالین اور حصاة مثانہ، البین، شکایت ہوتی ہے، —————

_____ قلب کے متاثر ہونے کی صورت میں مقام قلب پر درد محسوس ہوتا ہے،
حرکات قلب کے نظم میں فتور پیدا ہو جاتا ہے اور بایاں بطن کسی قدر لموٹا ہو جاتا ہے،
شرائین بھی سخت اور دبیز ہو جاتی ہیں عظیم قلب اور تشحم قلب تک نوبت آ جاتی ہے۔
_____ اعصاب کے متاثر ہونے کی صورت میں صرع، سکے، سدر، دودار، صداع اور
مختلف اعضا مفلوج ہو جاتے ہیں۔

(IV) نقرس غیر منتظم :-

اس کی صورت بہت حد تک نقرس حثوی سے مشابہ ہوتی ہے، _____ چنانچہ
جلد متاثر ہو جائے تو شری، التهاب جلد، نارقاری اور شور لبنیہ وغیرہ کی شکایت ہوتی
ہے۔ _____ آنکھ وغیرہ کے متاثر ہونے کی صورت میں آشوب چشم (نقرسی)
اور پردہ صلیبیہ میں سوزش ہوتی ہے، _____ ملحوظ رہے کہ موروثی نقرس میں
نقرس حثوی اور نقرس غیر منتظم کی علامات کثیر الوقوع ہیں۔

تفریقی علامات

وجع المفاصل Arthritis	نقرس Gout
۱۔ شاذ و نادر موروثی ہوتا ہے،	۱۔ عام طور پر موروثی ہوتا ہے۔
۲۔ مردوں، عورتوں میں ۲۵-۳۰ سال کی عمر میں یکساں طور پر کثیر الوقوع ہے،	۲۔ مردوں میں ۳۵-۴۰ سال کی عمر میں کثیر الوقوع ہے،
۳۔ غریب اور جفاکش لوگوں میں کثیر الوقوع ہے،	۳۔ امیر اور عیش پرستوں میں کثیر الوقوع ہے۔
۴۔ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے،	۴۔ مرن کا حملہ رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے۔
۵۔ بڑے اور دبیا نام درجہ کے جوڑے بالائے مرن، بونے پڑے درد	۵۔ مقام مرن چھوٹے جوڑے، بالخصوص پیر کے انگوٹھے ہوتے ہیں، حملہ

نسبتاً ہلکا ہوتا ہے، آرام کے بعد
متاثر حصہ کی کھال نہیں اترتی۔

۶۔ التهاب ایک عضو سے دوسرے
عضو کی طرف منتقل ہو جاتا ہے،

۷۔ درد ہمیشہ رہتا ہے۔

۸۔ بخار شدید اور یکساں رہتا ہے۔

۹۔ پیشاب پیلا ہوتا ہے اور اس میں
رطوبت بے فیہ کم ہوتی ہے،

۱۰۔ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے،

۱۱۔ خارش محسوس نہیں ہوتی۔

۱۲۔ پسیت میں ترشی ہوتی ہے۔ اور
زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

۱۳۔ عام طور سے قلبی عوارض بھی ہوتے
ہیں۔

کے وقت جوڑ چمکدار اور متورم ہوتا
ہے، اس کے اوپر کی وریدیں نمایاں
ہوتی ہیں، افاقہ کے بعد جلد اترتی
ہے، جوڑ بے ڈول بھی ہو سکتا ہے،

۴۔ عام طور سے درد، ایک جوڑ سے
دوسرے جوڑ کی طرف منتقل
نہیں ہوتا۔

۷۔ درد، دورہ کی شکل میں ہوتا ہے،

۸۔ بخار عام طور سے ۳۸.۵ سے زیادہ
نہیں ہوتا اور صبح کو کم / ختم
ہو جاتا ہے،

۹۔ دورہ سے پہلے اور دورہ کی حالت
میں پیشاب میں حامض پوئی کم اور
رطوبت بے فیہ زیادہ مقدار میں
خارج ہوتی ہے۔

۱۰۔ پیشاب قلیل مقدار میں تیز رنگ
کا ہوتا ہے۔

۱۱۔ مقام موقوف پر خارش محسوس
ہوتی ہے۔

۱۲۔ پسینہ میں کھٹی خامی کیفیت نہیں
پائی جاتی۔ اور نسبتاً قلیل مقدار
میں خارج ہوتا ہے،

۱۳۔ عام طور سے قلبی عوارض نہیں ہوتے
حشوی / غیر منتظم صورت میں قلبی
عوارض ہو سکتے ہیں،

۱۳۔ رسوب عام طور سے جبری و رطبی ہوتا ہے،
۱۴۔ رسوب جبری و رطبی نہیں ہوتا۔

تفریقی علامات

التهاب مفصلي تشويهي

Deformans Arthritis

نقرس مزمن

Chronic Gout

- | | |
|---|--|
| ۱۔ عام طور سے موروثی ہوتا ہے۔ | ۱۔ عام طور سے موروثی نہیں ہوتا۔ |
| ۲۔ مردوں میں کثیر الوقوع ہے۔ | ۲۔ عورتوں میں کثیر الوقوع ہے۔ |
| ۳۔ مریض دوری نوعیت کا ہوتا ہے۔ | ۳۔ مریض رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے، |
| ۴۔ کلوئی عوارض (گردے کی پھپھیاں) کثیر الوقوع ہیں۔ | ۴۔ کلوئی عوارض نہیں ہوتے۔ |
| ۵۔ نمایاں بد وضعی اور تخر عام طور سے نہیں ہوتا۔ | ۵۔ تخر اور بد وضعی نمایاں ہوتی ہے، |
| ۶۔ تیزاب بولی کثیر مقدار میں ہوتا ہے، | ۶۔ تیزاب بولی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا۔ |
| ۷۔ مفاصل وغیرہ میں جبری اور رطبی رسوب پایا جاتا ہے۔ | ۷۔ جبری اور رطبی رسوب نہیں پایا جاتا۔ |

اصول علاج

- تسکین درد کی تدابیر کریں،
- خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- رفع قبض کا اہتمام کریں،
- یودک ایسڈ کی تولید میں معاون غذاؤں سے احتراز کریں،
- سرد مغلوب آب و ہوا اور مقامات پر قیام سے احتراز کریں،
- محلل اور ام ادویہ استعمال کریں،

- حشوی عوارض کی صورت میں ان کا ازالہ / تدارک کریں۔
○ مدرات اور معرقات (پیشاب اور پسینہ لانے والی دوائیں)
استعمال کرائیں،

علاج

- نقرس حاد میں دورہ مرض کے وقت درج ذیل تدابیر اختیار کریں

متاثرہ عضو کو اونچا رکھیں / نیچے کوئی ٹیکہ وغیرہ رکھ دیں اور فلائین / روئی سے ڈھک کر کے حرارت کو روکنے اور برودت کو نہ سرایت کرنے والی شے اوپر سے پیٹ دیں،

- وقفہ مرض کی حالت میں کھلی فضا اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کی ہدایت کریں۔ خفیف ورزش اور گرم / سرد پانی سے (موسم کے اعتبار سے) غسل کرنے کی تاکید کریں،

- غلیظ خون کی صورت میں حسب ضرورت ہفتہ اندام / مصلوق کی فصلا کھولیں اور خوردنی طور پر درج ذیل نسخے استعمال کرائیں،

تخم کاسنی، تخم کشنیز، گل سرخ، ہر ایک، گرام، تخم کاہو ۳ گرام، مشابترہ ۶ گرام، عذاب ۵ عدد، تمام دواؤں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شربت عذاب ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

۵۔ دن بعد اسی نسخہ میں ان دواؤں کا اضافہ کریں، مغز فلوں خیار شیر

۶ گرام، تربجین ۱۲ گرام بھگو دیں اور مل چھان کر ملائیں، تبرید کے لیے

درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں، لعاب اسپنول ۱ گرام، لعاب بہداز ۳ گرام پانی میں

بکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

- غلیظ صفراء کی صورت میں تنقیہ کے لیے یہ نسخہ بروئے کار

لائیں،

گل سرخ ۵ گرام، سوربنجان ۱ گرام، صبر ایک گرام، سقمونیا ۵، ملی گرام،

تمام دواؤں کو باریک پیس کر گویا بنائیں اور مرین کو کھلائیں،
یہ ایک خوراک ہے،

تسکین درد اور تعدیل مزاج کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں
سورنجان شیریں، عدس مقشر، ہر ایک ۵۰ گرام، استخوان سوختہ ۱۲ گرام،
بنات سفید ہوزن جملہ ادویہ، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف
بنائیں اور ۷ - ۹ گرام کھلائیں۔

نقرس حاد میں خوردنی طور پر یہ نسخہ بھی مفید ہیں
تخم خرپڑہ، تخم خیار، سورنجان، ہر ایک ۱۲ گرام، ایفون ایک گرام، بنات سفید ہوزن
جملہ ادویہ، تمام دواؤں کو باریک کریں اور ۱۲ گرام صبح، شام کھلائیں،
ماہودانہ ۷، ۸ گرام روزانہ کھلائیں

عدس بریاں ۳۰ عدد ۴۰ دن تک سنہار منہ کھلائیں
سورنجان، مصطکی روہی، بنات سفید ہوزن، تینوں کو باریک کر کے
۱۰۰ گرام رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔

○ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں، ملحوظ رہے
کہ سرد اور مخدر دواؤں کا استعمال صرف شدید درد میں ہی کیا جانا چاہیے اور درد رفع
ہو جانے پر ان کا استعمال قطعاً روک دینا چاہیے۔

برنگ کشنیز باریک پیس کر جوڑوں پر لگائیں۔
آرد حلیہ، آب کربن، سرکہ، باہم ملا کر ضاد کریں۔

گل سرخ، صندل سفید، صندل سرخ، گل ارمنی، ہر ایک ۵ گرام، مامیٹا ۱۲ گرام،
فول، سفیدہ کاشغری، ہر ایک ۶ گرام، تمام دواؤں کو آب کا ہو اور
سرکہ میں پیس کر لگائیں، شدید درد کی صورت میں ایفون ۳ گرام کا اضافہ
کر سکتے ہیں، شدت درد میں یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں،

خشتا ش سیاہ مل کر پیس لیں اور ضاد کریں،

ایفون، زردی بیفتہ، مرغ باہم ملا کر ضاد کریں،

زعفران، گرام، ایفون ۵، ۴ گرام کو عورت کے دودھ میں پیس کر ضاد کریں۔

بالونہ، بنفشہ کو پانی میں جوش دے کر مقام مرقہ پر دھار کریں،
 مندل سرخ کو عرق گلاب، سرکہ، آب خرذہ میں پیس کر لیپ کریں،
 محل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
 موم سفید ۱۲ گرام کوروغن سوسن ۲۵ ملی لیٹر میں پگھلا کر لعاب تخم طیبہ، لعاب تخم کتان،
 ہر ایک ۲ گرام پانی میں نکال کر اس میں ملائیں اور ضاد کریں۔

○ نقرس مزمن میں یہ نسخہ استعمال کرائیں
 سورنجان شیریں ۲۵ گرام، سنار، مکی، گل سرخ، ہر ایک ۸ گرام، تربد موصوف،
 مغز بادام شیریں، پوست ہلیلہ زرد، ہر ایک ۲ گرام، رب السوسن، مصطکی، ہر ایک، گرام،
 زعفران ۵۰، ملی گرام، نبات سفید ۳ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
 سفوف تیار کریں اور ۷۰۰ گرام ہر آہ آب تازہ استعمال کرائیں،
 عشبہ، چوب چینی، ہر ایک ۶۰ گرام، سورنجان شیریں ۵۰ گرام، گاؤ زبان، گل سرخ،
 سنائے مکی، ہر ایک ۱۲ گرام۔ برادہ مندل سرخ، پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ کابلی، ہلیلہ، آملہ، ابریشم
 مقرض، ہر ایک ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد کے قوام
 میں حسب دستور تجویز بنائیں اور ۱۲ گرام، صبح، شام کھلائیں،

مدد کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں
 برگ سداب خشک، اجوائن، لہہ ہل، تخم کرفس، بادیان، دوقہ، ہر ایک ۵ گرام، قوہ
 مغز بادام تلخ، سنبھل الطیب، زراوند مدحرج، قسط، ہر ایک ۵ گرام، تمام
 دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں اور ۳۰۰ گرام، غذا لینے کے ۳-۴ گھنٹے بعد
 کھلائیں،

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں
 انجیر کے دودھ میں آرد جو خوب ملا کر ضاد کریں،
 انجیر، حلبہ کو سرکہ میں جوش دے کر باریک پیس لیں اور ضاد کریں،
 کبریت، نظرون کو سرکہ میں حل کر کے لگائیں
 کف دیا، مغز پنیر دانہ، حب البیان، تمام دواؤں کو سرکہ میں پیس کر
 لیپ کریں،

میوہ سائڈ، جند بید ستر، مرکلی، صبر، اقا قی، فریون، ہوزن کو شراب کہنے میں پس کر
طللا کریں۔

بزر ابنج سفید، شراب کہنے میں پس کر طللا کریں۔

○ نقرس حشوی / غیر منتظم میں بھی نقرس مزمن کے ذیل میں بیان
کردہ دوائیں استعمال کرائیں، درج ذیل نسخے بھی مفید ہیں،
تخم ترب، کنکئی (خریقی)، کوسکینجین، غفلی میں بھگو دیں اور شیرہ حاصل کر کے نوش
کرائیں، قے آکر جسم سے غلیظ مواد کا اخراج ہوگا، دن کے وقفے سے یہ نسخہ
تدبیر ۳ مرتبہ بروئے کار لائیں، تنقید کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں،

صبر سقوطی، پوست ہلیلہ کابلی، سودنجان شیشوں، ہر ایک ۵۰ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب ادرک / گھیکوار کے پانی میں گوندھ کر گولیاں بنائیں اور
۳ گرام، صبح، شام ہمراہ پانی کھلائیں،

عود بلساں، گرام، بزر ابنج، فلفل، ہر ایک ۵ گرام، اشق، سازج، فریون،
عاقرقرا، ریخ لغاج، سداب، سیلہ، سنبل الطیب، تخم کرفس، ہر ایک ۸ گرام، زعفران،
افیون، ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر شہد کے قوام میں مسکھو
مجنون بنائیں اور ۱-۵ گرام استعمال کرائیں،

ایا رنج فقرا ۵ گرام، تخم حنظل، قنطاریون، ہر ایک ۱۲ گرام، فریون ۷ گرام،
بوزیدان، سودنجان، ماہیز ہرج، ہر ایک ۵۰ گرام، تربد سفید ۳۲ گرام، شیطہ طریح،
خردل، فلفل، جند بید ستر، حلینت، سقمونیہ مدبر، مقل، زنجبیل، ہر ایک ۵۰ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر آب ادرک میں گولیاں بنائیں اور ۱-۵
گرام استعمال کرائیں،

خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔

بالونہ کو پانی میں جوش دے کر صاف کر کے اس جوشاندہ سے گرم گرم فلول کریں۔ اس کے
بعد یہ طللا استعمال کرائیں

میوہ سائڈ، جند بید ستر، مرکلی، فریون، اقا قی، صبر، ہوزن، تمام
دواؤں کو شراب کہنے میں پس کر تھوڑا سا عرق گلاب حل کر کے طللا کریں۔

ایفون ۳۵ گرام، کچلہ ۵ عدد، روغن کنجد ۲۵ ملی لیٹر، گائے کا دودھ ۲۵۰ ملی لیٹر
ایفون کو دودھ میں حل کریں اس کے بعد روغن کنجد اور حب اذراقی (کچلہ) ڈال کر لوہے
کی کراہی میں رکھ کر نرم آغ پر پکائیں، جب دودھ حل ہو جائے اور تیل باقی بچے رہے تو
پھان کر مقام مرض پر مالش کریں۔

یہ روغن بھی مفید ہے،

فہ (جمیٹہ) ۱۲۰ گرام، نر کچورہ ۹۵ گرام، سعد کونی، سورنجان تلخ، سیاذج، قرنفل،
دارچینی، زردچوبہ، داربلہ، عود غرقی، ہر ایک ۱۲ گرام، کاسیفل، پھریلہ، سیج، ہر ایک ۵۰ گرام،
دانہ میل خوردہ ۳۵ گرام، صندل سفید، چوب میردہ، کچلہ، ہر ایک ۲۵ گرام، سنبل الطیب
۱۲۵ گرام، جلو تری ۶ گرام۔ تمام دواؤں کو نیکوب کر کے عرق گلاب ایک لیٹر
میں ۲۴ گھنٹے تک بھگونے رکھیں، پھر اس کو قلعی دار برتن میں جوش دیں، جب تمام پانی
اڑ جائے تو روغن کنجد ۱۵۰ ملی لیٹر ڈال کر پکائیں، جب تمام پانی (ادویہ میں جذب شدہ)،
خشک ہو جائے اور صرف روغن بچے رہے تو اتار کر سرد کر کے پھان لیں اور ایک بوتل میں
متھ بند کر کے، دن تک زمین میں گاڑے رکھیں اس کے بعد نکال کر رات کے وقت متاثر
مفاصل پر مالش کریں۔

○ ————— دیگر حشوئی عوارض کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔



وجع الظهر

BACKACHE

اس مرض میں عمود الفقری (ریڑھ کی ہڈی) Vertebra Column کے بعض تمام حصوں میں درد ہوتا ہے، عورتوں میں یہ درد قطنی عجزی خط (Lumbo-Sacral Region) میں کثیر الوقوع ہے۔ — ہمیشہ مجموعی پشت کا درد اس درد میں ہر دوسرے شخص کو پریشان کرتا ہے۔

اسباب

مزاج :-

- (I) سوء مزاج ہار د
- (II) سوء مزاج یا بس

امراض کلیہ :-

- (I) ضعف کلیہ
- (II) وجع الکلیہ
- (III) حماة الکلیہ
- (IV) الاستقار الکلیہ

اخلاط:-

(I) غلیظ خلط بلغمی

(II) غلیظ خلط لزج مع ریاح

نسائی:-

(I) اختناق الرحم

(II) ایام حیض کا قریب آنا

(III) سیلان الرحم

(IV) میلان الرحم

(V) حوضی سرایت / حوضی نوسانتیں

(VI) عنق الرحم کے بعض امراض

(VII) درد زہ / وضع حمل کی تکالیف

امراض ظہر:-

(I) دیر تک پشت ٹیڑھی کر کے بیٹھنا

(II) عجزی حرقفی ربالمات (Sacro-coccygeal Ligament)

(III) پردباؤ پٹنا / وزنی اجیز (Lumbo-Sacral Ligament)

اور قطنی عجزی

اٹھانا، مشقت کا کام کرنا

(III) قطنی فقرات (مکر کے مہرے) کا اپنی وضع پر نہ رہنا

(IV) فقرات (مہروں) میں کسی بھی طرح کا التباب

(V) فقرات میں نخر پیدا ہو جانا

متفرقات:-

(I) ادویاتی تسمم

- (II) سمیت آتشک
 (III) سمیت نفرس
 (IV) فسادخون عمومی
 (V) المتلاہ شریان اعظم، اجوف
 (VI) کثرت مباشرت
 (VII) کثرت ۷ نوشی
 (VIII) بحران
 (IX) پھیپھڑے کا دم / قمرہ
 (X) حالبین کی بعض غیر طبعی حالتیں

علامات

سوم مزاج بارد / ریالیں میں پشت پر درد کے ساتھ ان کی مخصوص علامات بھی پائی جاتی ہیں، سوم مزاج حار میں جسمانی درجہ حرارت بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، نبض عظیم چلتی ہے، سوم مزاج یابس کی صورت میں کثرت استفراغ وغیرہ کی روئیداد بھی پائی جاتی ہے، سوم مزاج بارد میں چلنے پھرنے، گرم تدابیر سے راحت ملتی ہے اور آرام، برودت وغیرہ کی صورت میں، دردیں اضافہ ہو جاتا ہے

امراض کلیہ مرض کا سبب ہوں تو علامات کا ظہور بھی انہی کے مطابق ہوتا ہے، چنانچہ مقام درد کمر ہوتا ہے اور قوت باہ بھی کسی قدر ضعیف ہوتی ہے، غلبہ بلغم کی صورت میں درد بتدریج شروع ہوتا ہے اور اس کی نوعیت ثقیل مزمن ہوتی ہے، جسمانی نقل و حرکت اور یا صفت و ورزش وغیرہ کرنے سے دردیں کمی ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف ٹھنڈی اور بلغم پیدا کرنے والی غذاؤں لینے سے درد اور نقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، لمس بھی سرد ہوتا ہے،

ریاح کے غلبہ کی صورت میں درد تہمداد اور نقل کے ساتھ جگہ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گرم، کاسر ریاح ادویہ سے راحت ملتی ہے اور ثقیل و نفاخ غذاؤں سے دردیں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نسائی اسباب کی صورت میں، اسباب کا قدرہ خود بہت بڑی علامت ہے، —
 — غمزی حرقی رباط پر دباؤ پڑنے کی صورت میں درد خفیف سے ناقابل برداشت حد تک
 ہوتا ہے، ابتدا میں تو صبح کو اٹھنے کے بعد درد کا احساس نہیں ہوتا لیکن دن میں درد کسی
 قدر شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے، جسم کی وضع بدلنے پر بھی درد میں کمی یا اضافہ ہوتا رہتا
 ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی روئیداد ملتی ہے، پشت کو سہارا دے کر آرام کرنے کی
 صورت میں درد نہایت شدید ہوتا ہے اور کسی طرح خارجی دباؤ اس کو مزید درد ناک
 بنا دیتا ہے،

فقرات میں التهاب کی صورت میں درد کی ابتدا نہایت شدت سے ہوتی ہے اور
 مزمن ہو جانے کی صورت میں رفتہ رفتہ درد میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے اور نوعیت مزمن
 ہو جاتی ہے، ورزش سے درد میں اضافہ اور آرام و استراحت سے افادہ ہوتا ہے،
 مفصل میں تجرب کی صورت میں، تجرب کی دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں، —
 شریان اعظم اور رجوف کے امتلاء کی صورت میں درد ساری پشت میں محسوس ہوتا ہے
 اس کے ساتھ حرارت اور غلبہ خون کی دوسری مخصوص علامتیں بھی پائی جاتی ہیں،
 ادویاتی تقسیم یا دُموی فساد کی صورت میں درد کے ساتھ ان کی اپنی مخصوص علامتیں
 بھی ضرور موجود ہوتی ہیں جن سے تشخیص مرض اور تعیین سبب میں کوئی دشواری پیش
 نہیں آتی۔

اصول علاج

- تسکین درد کی تدابیر کریں،
- سوہ مزاج حار / بارد / یاس کی صورت میں تبدیل مزاج کریں،
- امتلاء عروق کی صورت میں فصد کھولیں،
- غلبہ بقم کی صورت میں اس کا نفع و تنقیہ کریں،
- حسب ضرورت ترک ریاضت / ریاضت کی تاکید کریں،
- رفع قبض کا اہتمام کریں،
- دیگر اسباب کی صورت میں ان کا ازالہ کریں۔

علاج

○ تسکین درد کے لیے درج ذیل نسخے استعمال کرائیں اور استعمال سے قبل مرض کے سبب اور مریض کے مزاج کو مد نظر رکھیں، پیٹھ کو روغن سے چرب کریں، اس کے بعد ہالون، پانی میں پیس کر طلا کریں اور دھوپ میں بیچائیں۔

روغن زنبق، اعلیٰ لیٹر، جند بیدستر، فرنیون، میعہ، ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو روغن زنبق میں حل کر کے مقام درد کی مالش کریں۔
روغن بالونہ، روغن بنفشہ، دونوں کو طلا کر مالش کریں،
○ غلہ بلغم کی صورت میں یہ نسخے استعمال کرائیں،

نسخہ منفع بلغم :-

سورنجان، عنب الثعلب، بادرنجبویہ، پوست یخ بادیان، پوست یخ کاسنی، ہر ایک ۱ گرام، بسفاج ۵ گرام، اذخر ۳ گرام، مویز منقی ۵ گرام، انجیر زرد ۳ عدد، تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اس کے بعد مل جھان کر گلقتہ علی ۵ گرام، حل کر کے نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ مسهل بلغم :-

ایار ج فیکرا، تربد، ہر ایک ۱ گرام، حب النيل، غار یقون مغربل، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، شحم خنظل، نمک سانجھر، ہر ایک ۲ گرام، تمام دواؤں کو کورڈ
چھان کر عرق بادیان میں گوند ۵ گرام دانہ مومنگ کے برابر گویاں بنائیے، اور ۳ گرام گویاں چاندی کے ورق میں پیٹ کر رات کے آخری حصہ میں ہمراہ عرق بادیان، عرق کھاؤزبان، آب تازہ استعمال کرائیں، اس کے بعد مریض کو سونے کی ہدایت کریں اور نسخہ کو تین دن کو دوبارہ نوش کرائیں۔

غلبہ بلغم میں یہ نسخہ بھی مفید ہیں
اسکند ناگوری، زنجبیل، ہر ایک ۲۵ گرام، نبات سفیدہ ۳ گرام، _____ تمام
دواؤں کو سفوف تیار کر کے ۶ گرام کھلائیں،

زنجبیل، فلفل سیاہ، شیطرح ہندی، انداوندہ حرج، خضیر الثعلب، مغز چغوزہ،
ناد صیل تازہ، یخ بالونہ، ہر ایک ۵ گرام، تخم بابونہ ۸ گرام، مویزہ منقی ۱۰۸ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر دو گنا شہد کے قوام میں ملا کر حسب دستور معجون بنائیں اور ۶ گرام،
کھلائیں، اسکند ناگوری، تخم قرطم، بادیان، ہر ایک ۶ گرام، مویزہ منقی ۹ عدد،
تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان کر نوش کرائیں،

قرنفل، جوز بوا، گل سرخ، بسباسہ، زعفران، زرنباد، نونجان، سعد کونی، ہر ایک
۵ گرام، دار فلفل، زنجبیل، عاقر قرحا، جدو اور خطائی، ہر ایک ۵ گرام، دار چینی، فلفل سیاہ،
قاقلہ، سودنجان، مصطکی، سنار کی، بوزیدان، اندر جو شیریں، ہر ایک ۲۱ گرام، چوب چینی
۳۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر تین شہد کے قوام میں حسب دستور
معجون بنائیں اور ۶ گرام ہمراہ عرق عشبہ ۶۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں،

سودنجان شیریں، تربد سفید، ہر ایک ۵ گرام، صبر سقوطری ۵ گرام، حب النیل،
خاریقون، انیسون، ہر ایک ایک گرام، مقل ازرق، مصطکی، ہر ایک ۵۰، ملی گرام،
_____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر پانی سے گوندہ کر گویاں بنائیں اور ۳ گرام،
بوقت خواب کھلائیں،

○ _____ امتلا، عرق کی صورت میں فہد کھولیں،

اور خوردنی طود پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،

بنفشہ، نیلوفر، تخم کاسنی، اصل السوس، ہر ایک ۵ گرام، حب الثعلب ۸ گرام،
سنار کی ۲۵ گرام، تربد ۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح
کو خفیف جوش دے کر مل چھان کر محفوظ کریں اور مغز خلوس یا خارشبر، زنجبیل، ہر ایک
۶ گرام کو ملا حدہ سے پانی میں مل چھان کر اس میں ملا کر نوش کرائیں،

غناہ ۵۰۰ گرام کو نمکوب کر کے ۲ لیٹر پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر ۵۰۰ گرام
شکر ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور ۲۵ — ۵۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

○ ریا ح کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں ،
 حلیقیت (ہینگ) بریاں ۸ گرام ، زنجبیل ۵ گرام ، نمک سیاہ ، نمک لاهوری ،
 ہر ایک ۲۵ گرام ، شونیز ، پوست ہلیدہ ، آملہ ، پوست ہلیدہ کابل ، اجوائن دیسی بکاب چینی ،
 میل خورد ، پیلا مولہ مصطفیٰ ، فلفل سیاہ ، فلفل دراز ، قرنفل ، خوجان ، ہر ایک ۱۳ گرام ، -
 - تمام دواؤں کو پیس کر عرق لیون آب گھیکوار ، آب ادرک میں ڈالیں ، مذکورہ
 عرقیات دواسے ۳ سینٹی میٹر اوپر تک رہیں ، اس کے بعد خوب کھل کر کے پانی خشک
 کرنے کی سعی کریں ، اور جب پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ ، سہ بارہ پانی ڈال کر کھل کریں ،
 اس کے چنے کے برابر گویاں بنائیں ۱ - ۲ گویاں غذا لینے کے ایک گھنٹے بعد ہمراہ
 آب تازہ کھلائیں ،
 زنجبیل ۵ ، ۴ گرام ، نمک سنگ ، نمک سیاہ ، ہر ایک ۱۲۰ گرام ، فلفل دراز ، قرنفل ،
 گندھک اطلسا مدبر ، ہر ایک ۸ گرام ، میل خورد ، ۱ گرام ، - ہر دوا کو علاحدہ
 علامہ کوٹ چھان کر عرق لیون کاغذی میں کھل کر کے خشک کریں اور یہ عمل بار کریں ،
 اس کے بار چنے کے برابر خوب بنائیں اور ۲ - ۳ گویاں بعد غذا کھلائیں ،
 تنکار (سہاگ) ۲۵ گرام ، اجوائن خراسانی ۳ گرام ، فلفل سیاہ ۳۳ گرام ،
 صبر سقوطی ۲۱۶ گرام ، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر مغز گھیکوار کے ساتھ
 چنے کے برابر گویاں بنائیں اور ۳ گویاں بعد غذا ، دونوں وقت ہمراہ آب تازہ
 استعمال کرائیں ۔

○ کثرت مباشرت کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں ۔
 مغز مرکبہ نیک ، ار جیل تازہ ، خمیہ الثعلب ، خشتا ش سفید ، ہر ایک ۳۵ گرام ،
 مغز پستہ ، مغز بادام ، مغز فندق ، مغز حبہ الحفرا ، مغز اخروٹ ، مغز حب الزم ، مغز
 چلوڑہ ، ماہی رو بیاں ، شقاقل مہری ، بہمن سرخ ، بہمن سفید ، تودری سرخ ،
 تودری سفید ، خوجان ، کبجہ مقشر ، زنجبیل ، دار چینی ، ہر ایک ۸ گرام ، بومدہ قیض گاؤ ،
 سور بنجان ، نعنار خشک ، بوزیدان ، ہر ایک ۳۳ گرام ، قرنفل ، سنبل الطیب ، سعد کوفی ،
 بکاب چینی ، اندر جو شیریں ، درونج عقری ، زرنباد ، حب الفلفل ، تخم گزہ ، تخم پیاز ،
 تخم تربہ ، تخم شلجم ، تخم شبت ، تخم لیون ، ہر ایک ۱۰ گرام ، چھریہ ، جاوتری ، فلفل دراز

جوزبوا، ہر ایک، گرام، زعفران، مایہ شتر اعرابی، مصطکی روئی، ہر ایک ۳ گرام، عود خام ۹ گرام،
عنبر اشہب ۳ گرام، مشک ۲ گرام۔۔۔۔۔ تمام دواؤں کو حسب دستور کوٹ چھان کر
تین گنا شہد کے قوام میں ملائیں اور اس کے بعد ورق نقرہ ۵۰ عدد، ورق طلا ۳۰ عدد ملا کر
خوب گھونٹیں، اور صبح کوہ گرام ہمراہ دودھ تازہ استعمال کرائیں، اس کے
بعد شیرہ تخم قرطم، شیرہ بادیان، ہر ایک ۶ گرام پانی میں نکال کر شربت بنوری ۳۵ ملی لیٹر
حل کر کے نوش کرائیں،


○ خارجی طور پر رفع درد کے لیے نسخہ بھی مفید ہیں۔

سورنجان تلخ، قسط تلخ، عاقر قرحا، اسگندرن گوری، دارچینی قلمی، حلینت، یوبان، جانفل،
کافل، زنجبیل، ہر ایک ایک گرام، تمام دواؤں کو پس کر روغن کچھد ۳۵ ملی لیٹر
میں ملا کر مالش کریں،

بزرابنج، ایون، حلینت، کافور، تخم دھتورہ، سورنجان تلخ، جانفل، ہر ایک ایک گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن تاپین ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر مالش کریں،
تخم حلبہ، بنفشہ، تخم کتاں، ہوزن، تینوں دواؤں کو پانی میں پس کر ضاد کریں،
روغن محل میں موم کو پگھلا کر یوبان، مصطکی روئی، ہر ایک ۶ گرام باریک پس کر ملائیں
اور نیم گرم مالش کریں،

تازہ دیسی بیگن کے دو ٹکڑے کریں اور زرد چوب (ہلدی) سہی، ہر ایک ۶ گرام،
باریک پس کر چھڑکیں اور تھوڑا سا گھی ملا کر نیم گرم حالت میں مقام ماؤف پر رکھیں،
روغن بلساں گرم کر کے روغن جند بید ستر میں ملا کر مالش کریں۔
درد کے رفع ہونے کے بعد اگر عضلات میں صلابت پیدا ہو جائے تو تخم کچھد ہمراہ
مغز ساق چھاؤ ضاد کریں۔

○ امراض کلیہ، امراض مفاصل اور نسائی امراض، سبب مریض
ہوں تو ان امراض کے ذیل میں بیان کردہ علاج بروئے کار لائیں۔



وجع القطن

LUMBAGO

اس مرض میں کمر میں درد ہوتا ہے جو نقل و حرکت سے بڑھ جاتا ہے، اور دوسری مرضی علامات کا باعث ہوتا ہے۔

اسباب

(I) تقرسی/وجع المفاصلی مواد

(II) بحکان/کثرت ریاضت

(III) برودت کا غلبہ

(IV) ضعف/کثرت مباشرت

علامات

علامات مرض کا آغاز عام طور سے یکسویک ہوتا ہے، کمر میں خفیف/شدید درد ہوتا ہے رات کے وقت درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسمانی نقل و حرکت بھی ناگوار گزرتی ہے، کسی قدر ضعف اور نفاہت بھی پائی جاتی ہے۔

اصول علاج

- برودت کے غلبہ کی صورت میں گرم تدابیر اختیار کریں،
- تسکین درد کی تدابیر کریں،

○ خلط غائب کا تنقیہ کریں،
○ مقویات استعمال کرائیں، اور مباشرت میں اعتدال
کی ہدایت کریں،

علاج

○ سادہ برودت کی صورت میں سبک کریں / ردغن خردل / ردغن
قسط کی مالش کریں، ردغن سوسن کی مالش کریں، یہ نسخہ بھی مفید ہے،
موم سفید ۶ گرام، کوردغن گل ۲۵ ملی لیٹر میں پگھلا کر مصطفیٰ ردنی، لوبان، ہر ایک ۶ گرام،
کو باریک پس کر ملائیں اور مقام درد پر نیکرم مالش کریں،
○ غلبہ بلغم کی صورت میں تنقیہ کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
نسخہ منصفج بلغم :-

بادیان، گرام، گل بنفشہ ۶ گرام، موجر منقہ ۵ گرام، انیسون، گھاؤ زبان، ہر ایک
۵ گرام، بجن کاسنی ۵ گرام، سورنجان شیریں نیکو فہ ۲۶ گرام، تمام دواؤں
کورات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر خیرہ بنفشہ سادہ ۵ گرام حل کر کے
نوش کرائیں، مسہل کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،
نسخہ مسہل بلغم :-

نسخہ منصفج بالا میں تربید سفید ۷ گرام، سنار کی ۲۵ گرام، مغز فلوس خیار شیرہ ۸ گرام،
بھگو کرادل چھان کر شیرہ مغز بادام ۵ مدد پانی میں نکال کر اس میں حل کر کے نوش کرائیں،
○ تنقیہ مواد کے بعد درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں

عشبہ مغربی، بسفاج فستقی، اقیقہ لون دلاقی، دار چینی، گاؤ زبان، ہر ایک ۵ گرام،
چوب چینی، مندل سرخ، مندل سفید، گل سرخ، ہر ایک ۱۱ گرام، ہلیلہ سیاہ، گرام، پلاست
ہلیلہ زرد ۶ گرام، تمام دواؤں کو باریک پس کر شہد ۵۰ ملی لیٹر، شکر ۵۰ گرام
کے قوام میں محون بنائیں اور ۶ گرام ہمراہ حرق عشبہ ۵۰ ملی لیٹر استعمال کرائیں،

تخم بابونہ ۸ گرام، زنجبیل، فلفل سیاہ، شیطرح ہندی، زراوند مدحرج، بیج بابونہ،
مغز چلتوزہ، نارہیل تازہ، خبیثہ اشعلب، ہر ایک ۵ گرام، موینز منقہ ۸ گرام، _____
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر دو گنے شہد کے قوام میں ملا کر معجون بنائیں اور صبح
کے وقت ۷ گرام کھلائیں۔

کشنیر کوہی، زنجبیل، ستونیا مشوی، گل سرخ ہر ایک ۱۰ گرام، سورنجان شیریں ۹ گرام،
ہلیلد زرد ۲ گرام، تربد سفید ۸ گرام، بوزیدان، ماہیز ہرج، شیطرح ہندی، بیج کبر،
ہر ایک ۵ گرام، بادیان، تخم کرفس، سمندر جھاگ، صستر، نمک ہندی، برگ حنا، فلفل سفید
ہر ایک ۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر روغن بادام ۳۵ ملی لیٹر میں
چرب کر کے شہد ۵۳ ملی لیٹر کا قوام بنا کر ملائیں اور ۷ گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کرائیں،
_____ خارجی طور پر درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں،

موم سفید ۲ گرام کو روغن گل ۲۵ ملی لیٹر میں پگھلائیں اور گل خطمی، گل بابونہ، تخم کتان،
تخم جلد، آرد جو، اکلیل الملک، ہر ایک ۵ گرام، _____ تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
ملائیں اور روغن بید انجیر ۲۵ ملی لیٹر، روغن زیتون ۱۲ ملی لیٹر ملا کر نیگرم ضاد کریں،
تخم کتان، تخم جلد، تخم خردل کو پانی میں پیس کر نیگرم ضاد کریں۔



وجع الخصرہ

FLANK'S PAIN

اس مرض میں خاصر (تہی گاہ - Flank) میں درد محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی ہے، اور ہر وقت مکان کا احساس ہوتا ہے،

اسباب

- (I) غلبہ بلغم
- (II) ضعف کلیہ
- (III) جنسی امراض مثلاً

(IV) ضعف باہ

(V) ہجریان

(VI) کثرت مباشرت / جلق

علامات

تہی گاہ، کولہے میں ہر وقت درد محسوس ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مکان کا غلبہ ہوتا ہے، غلبہ بلغم کی صورت میں ہر وقت کی دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہیں اور گرم تداہیر / دواؤں سے درد کم ہو جاتا ہے، ضعف کلیہ اور ضعف باہ کی صورت میں پٹریوں میں پھڑکن ہوتی ہے، جھکنے پر درد بڑھ جاتا ہے، بعض ضعف باہ / کثرت مباشرت / ہجریان کی شکایت کرتا ہے، بعض اوقات بصلت بھی حائر ہوتی ہے،

اصول علاج

- غلبہ بلغم کی صورت میں تنفیہ کریں،
- ضعف باہ کی صورت میں مقویات باہ استعمال کرائیں،
- ضعف کلیہ کی صورت میں کلیہ کی تقویت کا اہتمام کریں،
- کثرت مباشرت کی صورت میں ترک مباشرت اس کے بعد مباشرت کم کرنے کی ہدایت کریں،

علاج

- تنفیہ بلغم کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں
پوست خنظل، شحم خنظل، ہر ایک ۲۵ گرام، بیج خنظل ۴۰ گرام، اقلیتون ولایتی (مرہ بستہ) سنار کی، ہر ایک ۳۵ گرام، تمام دواؤں کو ۵۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں اور جبب ۲۵۰ ملی لیٹر نکال دے تو مل بھان کر شکر سفید بھوزن ملا کر شربت کا قوام بنائیں اور ۲۵ ملی لیٹر، ہمراہ آب گرم نوش کرائیں۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے،

زنجبیل ۲ گرام، گل سرخ، اصل السوس، ہر ایک ۴ گرام، برگ سنار کی، تر بد، ریوند خطائی، ہر ایک ۱۲ گرام، حب الینل ۲۰ گرام، تمام دواؤں کو باریک کوٹ چھان کر نبات سفید بھوزن کے ساتھ ۹ گرام کھلائیں،

- ضعف کلیہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں
لبا شیر، گل ارمنی، گل قبرسی، گل قنوم، صمغ کثیر، صندل سفید، اقا قیا، بید باریک کردہ، گل سرخ، شاذنج عدسی، محسول، تخم خرفہ مقشر، خار شک پروردہ، ست سلاجیت، قلعی کشتہ، ست گلور، مروارید ناسفتہ، ہر ایک ۲ گرام، تخم خشکاش، مختر تخم نیارین، ہر ایک ۴ گرام، مختر تخم کدو، مختر بادام، مختر فندق، مختر چلوغوزہ، موچر، ہر ایک ۳ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور ۳۰ — ۲ گرام استعمال کرائیں،
○ ضعف باہ کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں، ضعف کلیہ

میں بھی مفید ہے،

مغز چٹوڑہ، مغز پستہ، تخم خشکاش، کچد مقشر، مغز قندق، مغز حب الغلغل، مغز حب السمند، مغز حبہ الخضر، خولجان، دارچینی، موچرس، ہر ایک ۵ در ۳ گرام، مغز نار جیل، بہمن سرخ، بہمن سفید، توددی سرخ، توددی زرد، ہیل سفید، ہیل کالا، ہر ایک ۵ در ۳ گرام، کشمش ۳ گرام، مویز منقہ ۱۱ عدد، خرما ۲۱ گرام، شقائق، تخم کرفس، لسان العصافیر، درونج، پودینہ، مصطکی، جلا شیر، مال کھانا، کبابہ، بسباسہ، دار فلفل، زنجبیل، پوست آترج، قرفل، شم ہلیون، تخم ترنج، زرنباد، برادہ چوب، ہر ایک ۲ گرام، سنبل الطیب، جنتر اشہب، زعفران، ہر ایک ایک گرام، تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے قند اود شہد، ہر ایک ۲۵۰ گرام، ترنجبین ۱۳۵ گرام ملا کر معجون بنائیں اود ۲ — ۵ گرام استعمال کرائیں،

یہ نسخہ بھی مفید ہے،

بسباسہ، زعفران، دانہ، ہیل خورد، دارچینی، قرفل، بہمن سرخ، بہمن سفید، خولجان، شقائق، ہر ایک ۵ در ۳ گرام، مشک غبر، ورق طلا، ہر ایک ۵ در ۳ گرام، موچرس ۵ در ۳ گرام، نہات سفید ۲۲۵ گرام، تمام دواؤں کو حسب دستور باریک کر کے سفوف بنائیں اور ایک گرام کھلائیں،

○ خارجی طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

۱۔ سنگد ناگوری، سودنجان تلخ، قسط تلخ، دارچینی قلمی، حلیت، لوبان، حاقرقہ، جاتفل، کانسیچل، زنجبیل، ہر ایک ایک گرام، تمام دواؤں کو بلیڈیک پس کر روغن کچد ۳۵ ملی لیٹر ملا کر مقام درد پر مالش کریں،
سودنجان تلخ، جاتفل، تخم دھتورہ، بذر النج، حلیت، کافور، ایفون، ہر ایک ایک گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن تارہین ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر مالش کریں،

ایفون ۱۳ گرام، شنگرف، قسط تلخ، صبر زرد، ہر ایک ۴ گرام، تمام دواؤں کو آب اددک میں پیس کر طلا، کریں،

تخم ارند ، نمک لاہوری ، برادہ چوب ، ہر ایک ۳ گرام ، حلیت
 ۴ گرام ، آرد گندم ۱۲۵ گرام ، ————— حسب دستور گوند ہو کر ایک طرف
 روٹی کی طرح پکائیں اور سیک کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Salman

وجع الركبه

PAIN IN THE KNEE

اس مرض میں گھٹنوں میں درد محسوس ہوتا ہے جو اٹھنے، بیٹھنے میں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے،

اسباب

(I) غلبہ خلط حار / غلبہ خلط بارد

(II) غلبہ ریح

علامات

گھٹنوں میں ہر وقت درد ہوتا ہے جو نقل و حرکت کی صورت میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر درد کا سبب خلط حار ہو تو درد کے ساتھ سوزش بھی ہوتی ہے اور لمس حار محسوس ہوتا ہے اور مقام درد سرخ یا زردی مائل ہوتا ہے، خلط بارد، درد کا سبب ہو تو متاخر صبح کا رنگ سفید یا کسی قدر سیاہی مائل ہوتا ہے، غلبہ خلط بارد کی دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، درد، سوزش کے بغیر ہوتا ہے، غلبہ ریاحی ہوتا ہے، درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے،

اصول علاج

خلط نازلہ، کما تیتہ کرنا،



- ————— رفع قبض کی تدابیر کریں / کاسر دیا ح ادویہ استعمال کرائیں،
○ ————— مسکات دوا استعمال کرائیں،

علاج

- ————— غلبہ صفرہ کی صورت میں سفنج و تنقید کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منصف صفرہ :-

عنب الثعلب، گل بنفشہ، گل سرخ، شاہترہ، تخم کاسنی، تخم خلی نیکوب ہر ایک
۵ گرام، گل نیلوفرہ ۵ گرام، آلو بخارا، عنب، ہر ایک ۵ عدد، ————— تمام دواؤں کو
رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقدہ آخابی ۲۵ گرام حل کر کے
نوش کرائیں۔ ————— پانچویں دن درج ذیل نسخہ مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل صفرہ :-

منصف مذکورہ میں گلقدہ کی مقدار بڑھا کر ۵۰ گرام کر دیں، ————— اور
مغز فلوس خیارد شہزہ ۵ گرام، تبرنجین خرد اسانی، تمر ہندی مقشر، ہر ایک ۵ گرام کورات
کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر منصف کے ساتھ ملائیں اور شیرہ مغز بادام
شیریں ۵ عدد نکال کر حل کریں اور نوش کرائیں، پیاس وغیرہ لگنے پر کاسنی / عنب الثعلب
ساقوق نوش کرائیں، ————— تبرید کی ضرورت ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

لو اب ۲۰ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپنول مسلم
۶ گرام بھجور، آرنیکا، —————
غلبہ صفرہ میں یہ نسخہ بھی مفید ہے،

سوربخا، بوزید (۱)، ہر ایک، ایک، گرام، پس کر اطر فیض صغیر ۲ گرام کے ساتھ
کھلائیو، اور عرق شاہترہ ۵۰ ملی لیٹر، میں عرق گلاب ۳۵ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں،

تسکین حرارت کے لیے یہ نسخہ مفید ہے،
شیرہ خارخسک ۶ گرام، شیرہ تخم خیارین، ————— پانی میں بحال کر نبات سفید
۲۵ گرام، حل کر کے نوش کرائیں،

○ غلبہ خون کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں،
اطریفیل صغیر ۱۲ گرام کھلا کر تخم کاسنی نیکوب ۹ گرام، سورنجان شیریں ۳ گرام، عرق بادیا،
عرق مکو، ہر ایک ۸۵ ملی لیٹر میں جوش دیں اور مل چھان کر نبات سفید ۱۰ گرام حل کر کے
نوش کرائیں،

سورنجان شیریں ایک گرام، اطریفیل ۱۲ گرام میں ملا کر کھلائیں اور شربت ضروری بادیا،
۲۵ ملی لیٹر عرق کاسنی ۶۰ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں، نسخہ اطریفیل صغیر درج ذیل
ہے،

پوست بلیلہ زرد، پوست بلیلہ کابلی، بلیلہ سیاہ، بلیلہ آمد مقشر، ہر ایک ۱۰ گرام،
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر روغن کاؤر روغن بادام ۱۰۰ ملی لیٹر میں چرب
کریں اور ۵۰ گرام شکر کا قوام بنا کر حسب دستور یہ ادویہ ملا کر اطریفیل تیار کریں۔
○ غلبہ بلغم کی صورت میں نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ منضج بلغم :-

بادیان، پر سیاوشان، اصل السوس، سورنجان، تخم خطمی، ہر ایک ۳ گرام، یخ بادیان،
یخ کرفس، یخ کاسنی، ہر ایک ۶ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، مویز منقح ۹ عدد، سپستان ۲۰ عدد
تمام دواؤں کو پانی میں رات کے وقت بھگو دیں اور صبح کو خفیف جوش دے کر
مل چھان کر گھٹند ۳۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں
ہونے لگیں تو تنقیہ کی غرض سے درج ذیل مسہل استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل بلغم :-

پوست بلیلہ زرد، سورنجان، شحم حنظل، تربد سفید، مقل، ہموذن ————— تمام
دواؤں کو پیس کر گویاں بنائیں اور ۳ گرام بھراہ آب گرم استعمال کرائیں،

تفقیہ کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں،

تخم کرفس، بادیان، سمندر جھاگ، فلفل سفید، صحر فارسی، نمک ہندی، برگ خنا
ہر ایک ۵ گرام، شیطرج ہندی، بیخ کبر، بوزیدان، ماہیز ہرج، ہر ایک، گرام، کشیز، کوہی،
محل سرخ، ستمو نیامد بر، زنجبیل، ہر ایک، ۱۰ گرام، سورنجان شیریں ۱۹ گرام، ہیلہ زردہ ۲۵ گرام،
ترہ بد سفید ۵۰ گرام، ————— تمام دواؤں کو باریک کر کے روغن بادام ۳۵ ملی لیٹر میں
چرب کریں اور شہد خالص ۵۳ ملی لیٹر کے قوام میں سفوف کردہ دواؤں کو ملا کر معجون بنائیں
اور ۷ گرام استعمال کرائیں۔

○ خارجی طود پر درج ذیل تدابیر / دوائیں بروئے کار لائیں،
برگ خنا پس کر مقام درد پر لگائیں، ————— غلیظ خلط حار میں مفید ہے،
آرد جو ۳ گرام، مشک بزر ۴ گرام، دونوں کو پس کر سرکہ اور روغن زیتون میں ملا کر
ضاد کریں، غلیظ خون کی صورت میں باسلیق کی فصد کھولیں،
خلط بارد کی صورت میں یہ تدابیر بروئے کار لائیں،
برگ کینر کو پانی میں جوش دیں، اس کے بعد باریک پس کر روغن بالوڑ ملا کر ضاد کریں،
صابن، سورنجان، حنا، ہموزن، ————— تینوں کو پس کر ضاد کریں،
برگ پنوار کو روغن زردہ میں پکا کر ضاد کے طور پر لگائیں،
روغن تخم سیجہ سے مالش کریں،

خضلل ۲ عدد، کو ۵۰۰ ملی لیٹر میں خوب جوش دیں، جب پانی نصف رہ جائے تو اتار کر مل
چھان لیں اور روغن زیتون ۸۵ ملی لیٹر ڈال کر دوبارہ جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو
حب القار ۱۲ گرام پس کر اس میں ڈال کر مزید جوش دیں جب تمام پانی اڑ جائے تو اتار کر
سورنجان، بیخ بنفشہ، حنا، خشک، ہر ایک ۳ گرام پس کر ملائیں اور مقام درد پر لگائیں۔
یہ نسخہ نقور بھی مفید ہے،

ہلوست بیخ کرفس، سورنجان، بوزیدان، شکاعی، بادآعد، اکیلل الملک، قیصوم،
بالوڑ، سداب، ہموزن، ————— تمام دواؤں کو پانی میں جوش دیں اور مل چھان کر
مقام درد پر نطول کریں، اس کے بعد خفک کر کے روغن کی مالش کریں۔

○ غلیظ ریاح کی صورت میں کاسریلج کے طور پر یہ نسخہ استعمال کریں

زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، ہر ایک ۳۱ گرام، پودینہ، فلفل، دار فلفل، فلفل حبیبہ، سیلنہ،
 بورقہ ارمی، زنجبیل، سداب، ہلینڈر، ہلید سیاہ، گل سرخ، ورج، شبت، ناخواہ، دائرہ سیل،
 ہر ایک ۲۱ گرام، سنہل، تربید، ہر ایک ۱۰ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر
 شہد دو گنا، نبات سفید ہوزن کے قوام میں ملا کر حسب دستور جوارش بنائیں اور ۱۰۰ — ۱۲۰ گرام
 عرق بادیان کے ساتھ استعمال کرائیں۔



Learn Unani By Abdul Waris Samadani

وجع الساقین

PAIN IN THE LEGS

اس مرض میں پتہ لیوں میں درد ہوتا ہے، جو چلنے پھرنے سے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اکثر اوقات نقل و حرکت دشوار ہو جاتی ہے،

اسباب

(I) امراض معدہ و امعاء

(I) ضعف ہضم

(II) اسہال دموی / اسہال حاد

(III) زحیر

(IV) قوت ہضم سے زیادہ کھانا

(V) بواسیر دموی

(II) اعضاء رئیسہ کا ضعف

(III) خلل اخلاط

(IV) بعض مرضی امراض

(V) خون حیض کا زیادہ مقدار میں آنا / سیلان الرحم

(VI) دوالی

(VII) زیادہ دیر تک کھڑے رہنا

(VIII) پھوٹ نا نا

(۱۷) یورک، ایسڈ کی زیادتی

علامات

پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے اور نقل و حرکت (چلنے پھرنے) سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، صبح کو بیدار ہونے پر بھی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مکان کا احساس ہوتا ہے، بعض اوقات ہڈی میں شدید بردت کا احساس ہوتا ہے گویا برف لگائی گئی ہو، اس کے برعکس گوشت، میں گرمی اور سوزش محسوس ہوتی ہے، اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ گویا پنڈلی کو چیرا جا رہا ہے، اسباب کے تقدر سے مرض کی تشخیص میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور علاج کا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے،

اصول علاج

- مقویات معدہ و امعاء استعمال کریں،
- مقویات اعضاء رئیسہ استعمال کریں،
- حسب ضرورت خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- یورک ایسڈ وغیرہ کی زیادتی کی صورت میں، اس کے اندراج کی تدابیر کریں۔
- تسکین درد کی تدابیر کریں۔

علاج

- سورنجان ۳ گرام، پیس کر اطرینفل صغیر ۱۲ گرام کے ہمراہ کھلا کر کل نصف تخم خمر پڑہ کوفہ، خار خشک کوفہ ہر ایک ۶ گرام، پانی میں جوش دے کر کلقتہ ۳۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کریں،
- جب پنڈلی میں نشری درد ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں،
- شاہترہ، گل سرخ، ہر ایک ۶ گرام، سورنجان سفید، ریونڈ چینی، ہر ایک ۲ گرام،
- تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور شربت بنووری ۲۵ ملی لیٹر ملا کر نوش کریں،

○ ————— تقویت معدہ اور وجع اساق، دونوں میں یہ معجون مفید ہے،
 زنجبیل، سنبل الطیب، زرد باد، اسارون، ساذج ہندی، شقاقل مصری، عنبر،
 جدوار خطائی، فلفل دراز، بوزیدان، قرنفل، خشک، کباب چینی، خولجان، دانہ ہیل خورد،
 دانہ ہیل کلاں، ہر ایک ۹ گرام، سورنجان شیریں، دارچینی، خضیصۃ الثعلب، مصطلی، عود ہندی،
 اندر جو شیریں، زعفران، ہر ایک ۳ گرام، مغز چروہی، حب القلقل، مغز تم قرطم، مغز حبۃ الفلفل،
 ہر ایک ۲ گرام، مغز نارجیل بریاں، مغز چلتوزہ، ہر ایک ۹ گرام، چوب چینی ۵، ۶ گرام، —
 چوب چینی کو ۴ لیٹر پانی میں بھگوئیں، اس کے بعد باریک باریک تراش کر
 اسی پانی میں اس قدر جوش دیں کہ پانی صرف ایک لیٹر باقی رہ جائے، اس کے بعد ترنجبین،
 شہد، ہر ایک ۸۰، ملی لیٹر ملا کر قوام تیار کریں، اس کے بعد باقی تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر
 ملائیں اور حسب دستور معجون بنائیں اور ۶ گرام صبح کے وقت کھلائیں،
 ○ ————— تنقید کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

سورنجان شیریں، پوست ہلیلہ زرد، برگ سناکی، مصطلی رومی، تربد خرمشیدہ،
 مغز بادام مقشّر، ہر ایک ۶ گرام، ————— تمام دواؤں کو پیس کر چنے کے برابر
 گولیاں بنائیں اور سوتے وقت شب میں ۶ گرام، ہمراہ عرق بادیان استعمال کرائیں،
 یہ نسخہ بھی مفید ہے،

پوست ہلیلہ زرد، ۵۰ گرام، روغن بادام ۱۲ ملی لیٹر، شاہترہ ۱۲ گرام، صبر ۶ گرام،
 سورنجان ۳ گرام، شحم حنظل ۵۰ گرام، کیترا، مقل، ہر ایک ایک گرام، تمام دواؤں
 کو سہجہ کی جڑ کے پانی میں کھل کریں اور ۳ گرام، بوقت خواب کھلائیں،
 ○ ————— خارجی طور پر درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں،

سورنجان تلخ، بزر البیج، مصطلی رومی، ہر ایک ۳ گرام کو باریک کر کے
 روغن گل میں ملا کر مالش کریں۔

کات سفید، پوست درخت کچال، مردار سنگ، صندل سرخ، ہوزن کو آب
 کشیز سبز مرق میں پیس کر ضاد کریں،

سورنجان، بیج نل، ہوزن کو عرق گلاب میں پیس کر ضاد کریں،
 سداب، بیج کرفس، سورنجان، بوزیدان، شکامی، باد آورد، اکیلل الملک،

پایونہ، قیصوم، ہوزن، _____ تمام دواؤں کو پانی میں جوش دے کر مقام درد پر
نپول کریں، اس کے بعد پٹیلیوں کو خشک کر کے روغن حنا کی مالش کریں۔

_____ اعصاب و نمیہ کے ضعف کی صورت میں مقویات استعمال

کرائیں،

_____ یورک ایسڈ کی زیادتی کی صورت میں عرق کلاب ۱۲۰ ملی لیٹر
میں ایک عدد بتاشہ ملا کر نوش کرائیں، _____ اور گرم حمام کرائیں۔

Learn Unani By Abdul Waris Khan

وجع العقب

PAIN IN THE HEEL

اس مرض میں ایڑی میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے،
اور دوسری روزمرہ کی کارکردگی پر غمراہ اثر پڑتا ہے،

اسباب

- (I) چوٹ لگنا
- (II) کسی خارجی شے کی رگڑ
- (III) تلوے کے رباط
- (IV) غلم العقب (Calcaneum)
- (V) کسہ کی سوجن
- (VI) تامل غلم العقب
- (VII) قرن (عقف - Corny Corn)
- (VIII) وجع المفاصل / نقرس
- (IX) عقب میں کسی ردی خلط کا غلبہ
- (X) عیلمان الرحم

(کے موخر مہرے میں)

(میں زائیدہ کی تولید)

علامات

ایڑی میں بہت تکلیف دہ درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری اور تکلیف ہوتی ہے۔ ایڑی میں چوٹ لگنے / کچل جانے کی صورت میں اس کی سرگندہ شمت ملتی ہے، اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ تلوے کی رباط متاثر ہوتی ہے، شدید صورتوں میں کسر بھی نمایاں ہوتا ہے، اگر مرض کا سبب ایڑی والے جوتے پہننا یا تنگے پیر (خلاف عادت) پتھر ملی اور کنگریلی نرمیں پر چلنا ہو تو عقب کی غشا ظہری میں سوزش محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات عضلات کے سخت ہو جانے سے اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات مقامی طور پر گرہ پڑ جاتی ہے اور چلنے پھرنے سے اس پر دباؤ پڑتا ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات اچانک گرہ پڑ جاتی ہے تو مریض درد اور ٹیس کی شارت سے کربناک ہو جاتا ہے، تلوے کے رباط طویل کے تکس کی صورت میں درد کا احساس ایڑی کے وسط میں ہوتا ہے، بعض اوقات کناروں پر بھی محسوس ہوتا ہے، ایڑی میں زائدہ پیدا ہو جانے کی صورت میں وسط ایڑی / زائدہ کے مقام پر درد ہوتا ہے اور اگر زائدہ نمایاں نہ ہو تو تشخیص مرض اور تعیین سبب میں دشواری ہوتی ہے، چنانچہ جب مریض کی عمر ۴۰ سال کے آس پاس ہو اور وہ کسی ظاہری سبب کے بغیر ایڑی میں درد کی شکایت کر رہا ہو تو معالج کو، ایکسرے کا مشورہ دینا چاہیے، اس سے مرض کی تشخیص اور سبب کی تعیین ہو جاتی ہے، موسم سرما میں غیر معمولی برودت سے بھی ایڑی میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن تعیین سبب میں کوئی دشواری نہیں ہوتی،

آماس کیسہ (Rursitis) میں دراصل عظم العقب اور عرقوب

تندو-اچیلز (Tendo-Achillis) میں سوزش محسوس ہوتی ہے تاہم وہاں کے رجب میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، کوئی ابھار بھی نہیں پایا جاتا لیکن اس مقام پر دبانے سے درد ہوتا ہے، ایڑی میں تاگل (تاگل عظم العقب) میں بھی درد ہوتا ہے، بعض اوقات مقامی طور پر ابھار بھی پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں تاگل، ناسور میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ صورت شاذ بلورے دق میں ہی پیش آتی ہے اور

ابتدائی مرحلے میں اس کے سبب تک رسائی دشوار ہوتی ہے لیکن بعد میں دق کی دوسری علامات رونما ہوتی ہیں تو تشخیص آسان ہو جاتی ہے، ————— قرن ۱
کی صورت میں ایڑی میں عام طور سے ہمہ وقتی درد نہیں ہوتا بلکہ چلنے وقت یا اس پر کسی طرح کا دباؤ پڑنے پر نہایت شدید درد ہوتا ہے، ————— بعض اوقات کوئی خارجی شے (سوئی/شیشہ/معدنی اجزاء) ایڑی میں چبھ جاتی ہے اور مریض (بالخصوص بچہ ہو تو) اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد درد ہوتا ہے تو معالج کو کوئی معقول وجہ نہیں بتا پاتا بلکہ اس صورت میں ایڑی کو صاف کر کے دیکھنے پر کسی حد تک سرخی یا الجھار دکھائی دے گا، بصورت دیگر ایکس رے سے سبب بالکل واضح ہو جائے گا۔
نقرس/وجع المفاصل کی صورت میں ہونے والا درد، ان امراض کی دوسری علامتوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، چنانچہ نقرس میں جھوٹے جوڑے، بالخصوص پیر کی انگلیوں کے سرے بھی دردناک ہوتے ہیں اور وجع المفاصل میں ایڑی میں درد کے ساتھ جسم کے پڑے مفاصل بھی دردناک ہوتے ہیں،

اصول علاج

- ————— تسکین درد کی تدابیر کریں،
- ————— دم کی صورت میں عملات استعمال کرائیں،
- ————— حسب ضرورت قصہ کھولیں/سینگھیاں کھینچیں،
- ————— قرص کا اندیشہ ہو/کوئی خارجی شے چبھ گئی ہو تو علیہ کریں،
- ————— قرن ۱ کی صورت میں علیہ واحد علاج ہے تاہم معالجی طور پر بعض ازال ادویہ کا ضہاد بھی (صرف مقام قرن پر ہی ہے) لگا سکتے ہیں۔

علاج

- ————— تسکین درد کے لیے یہ نسخے استعمال کرائیں، بیرونی اسباب کی صورت میں یہ مفید ہیں،
- سبوس گندم کو پانی میں جوش دے کر نطول کریں،

ما میٹھا، محل ارستی دونوں کو عرق گلاب میں حل کر کے لگائیں،
 ○ محل کے طور پر یہ نسخہ بروئے کار لائیں،
 ارد حلیہ، بابونہ، منقل، جاوشیر، راسخ، تخم کتاں، ہر ایک، گرام، انجیر، عدد
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر روغن زیتون ملا کر ضا د کریں،
 ○ اگر تلیسین اور نفیج کی ضرورت ہو تو یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 دنبہ کی چکتی باندھیں، اور جب نرم پڑ جائے تو نشتر کے ذریعہ شکاف
 دیں اور تمام مواد خارج کریں، اس کے بعد شاہ بلوط خاکستر کو چربی میں ملا کر / حنا،
 ماندو، سرکہ میں پیس کر لگائیں،
 ○ غلبہ خون کی صورت میں صافن کی فصد کھولیں اور روغن گل
 کی مالش کریں،
 ○ غلبہ بلغم کی صورت میں درج ذیل نسخہ استعمال کرائیں اور تنقیہ
 کے بعد روغن قسط، روغن فرقیون، روغن بابونہ ملا کر مالش کریں۔

نسخہ مسہل بلغم :-

ہلیلہ کلاں، نرد چوب، نمک لاہوری ہموزن، تمام دواؤں کو پیس
 کر شمع حنظل میں خوب کھل کریں اس کے بعد جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور ۳-۵
 گولیاں کھلائیں، دوا لینے سے تین گھنٹے بعد مرغن کچھڑی کھلائیں۔ قے آور
 دوا بھی استعمال کرا سکتے ہیں،
 ○ میلان رحم کی صورت میں رحم کو اصل وضع اور مقام پر لانے کے
 بعد شکم پر پٹی باندھ دیں۔
 ○ مقامی طور پر محذرات بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔

عرق النسا

SCIATICA

اس مرض میں عصب وری کی کبیر (Great Sciatic Nerve) میں
شدید درد ہوتا ہے، جو اوپر سے نیچے کی طرف دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور عام طور سے
صرف ایک طرف اور شاذ و نادر دونوں طرف ہوتا ہے، ————— یہ مرض اوسط عمر والوں،
خاص طور سے مردوں میں کثیر الوقوع ہے،

اسباب

- (I) عصبی غلاف کا متورم ہو جانا / مسلسل دباؤ
- (II) ضرب و صدمہ
- (III) شدید ریاضت
- (IV) مفصل قطنی عمری کا یعنی التهاب
- (V) جوق عاز سے باہر، عصب کے کسی حصہ کا دب جانا
- (VI) عصبی شاخوں کا بحری نخاعی کے اندر عظمی بوسیدگی یا سلعہ لمبیہ کی وجہ سے دب جانا
- (VII) فساد خون / نفرسی / آتشکی سمیت / وجع المفاصل
- (VIII) سرد اور نمناک مقامات پر قیام پذیر ہونا
- (IX) شدید قبض / معامہ مستقیم / قولون عالی کا سرطان
- (X) نخاع کے بعض مزمن امراض
- (XI) ذیابیطس

علامات

درد دورہ کی شکل میں ہوتا ہے اور سرین کے نیچے ہیر کی پچھلی طرف سے شروع ہو کر گھٹنے کی پچھلی جانب اور ٹانگ میں ہوتا ہوا گھٹنے تک پہنچتا ہے، ابتداً خفیف اور رفتہ رفتہ شدید نوعیت اختیار کر لیتا ہے اور مزمن ہو جانے پر قدم کی انگلیاں بھی درد سے متاثر ہو جاتی ہیں، عصب کی لمبائی میں دباؤ پڑنے / پیر پھیلانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مریض عام طور سے ٹانگ سکڑے رہتا ہے اور چلنے پھرنے کی کوشش میں غیر متاثر پیر پر بڑبڑا ہوا بوجھ ڈالتا ہے، التهاب عصب کی صورت میں عصب کی پوری لمبائی میں درد ہوتا ہے، مزمن ہو جانے پر پاؤں میں لاغری آ جاتی ہے، گھٹے کا انکسائی فعل کم ہو جاتا ہے اور عضلات میں ضمور پیدا ہو جاتا ہے، بعض اہلکار اس کی تشخیص اس طور پر بھی کرتے ہیں کہ مریض کو دیوار کے سہارے لگ کر کھڑا کر اگر گھٹنا موڑے بغیر ٹانگ کو سامنے کی طرف اٹھا کر زاویہ قائمہ بنواتے ہیں اور زاویہ نہ بننے کی صورت میں عرق النساء تصور کرتے ہیں۔

اصول علاج

- تسکین درد کی تدابیر کریں،
- خلط غالب کا تنقیہ کریں،
- لذت پیدا کرنے والے اور سرخی اور آلودگی والے ضادات استعمال کرائیں،

- کئی کریں، تعلیق کریں اور سینگھیا کھینچیں اور فصد کھولیں،
- التهاب کی صورت میں آشک / نقرس / وجع المفاصل کا اصول علاج اختیار کریں،
- مصفیات استعمال کرائیں،

علاج

- تسکین درد کے لیے درج ذیل تدابیر استعمال کرائیں،

تخم کتان، خردل، دونوں کو باریک کر کے گوندھ کر حسب دستور پلٹس لگائیں،
 روغن شبت، روغن گل اور روغن کنجد کی مالش کریں،
 مقل ۱۲ گرام روغن گل میں ملا کر ضاد کریں،
 ایون کو روغن حنا میں ملا کر ضاد کریں،
 گل بالونہ، اکیلل الملک، مرزنجوش، برگ خار، ہر ایک ۳۵ گرام، تخم حرمل ۱۲۰ گرام،
 تمام دواؤں کو باریک پس کر مقل حل کردہ پانی میں ملا کر نیکو کر ضاد کریں، —
 مزمن صورت میں مفید ہے،

صعتر فارسی، قطوریون، پوست یخ کر فس، حاشا، شبت، صعتر فارسی، بالونہ،
 اکیلل الملک، ہر ایک ۳۵ گرام کو ۲ لیٹر پانی میں جوش دیں جب ۱۵۰۰ ملی لیٹر رہ جائے تو
 چھان کر نیم گرم حالت میں، ٹانگ پر دھار کریں،
 حسب ضرورت باسلیق / صافن کی فصد کھولیں اس کے بعد عرق النساء کی فصد
 کھولیں، پہلے ہاتھ کی فصد ہی کھولیں،
 خلط بلغمی کی صورت میں حسب دستور تنقیہ کے بعد روغن قسط، روغن فرقیون،
 روغن جندبید ستر کی مالش کریں۔ اور پودینہ پانی میں پس کر ضاد کریں،
 ابوائن، حلبہ، مغز فلوس خیار شبر، کندر، ہر ایک ۶ گرام، ایون، زعفران، ہر ایک
 ۲ گرام، — تمام دواؤں کو باریک کر کے زردی سفید سرخ میں ملا کر لگائیں،
 حسب ضرورت سرین کے نیچے سینگیہاں کھینچیں / تعلیق کریں،
 ○ — تنقیہ کی غرض سے خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 نبلہ بلغم میں نفع و تنقیہ کے لیے یہ نسخہ بروئے کار لائیں،

نسخہ سفنج بلغم :-

یخ کاسنی، یخ بادیان، یخ اذخر، یخ کر فس، بادیان، نیکوب، پرسیاوشان،
 اسطوخودوس، ہر ایک، گرام، اصل السوس مقشر نیکوب ۵ گرام، انجیر زرد ۵ عدد، ہویہ زرد ۵ عدد،
 ۹ عدد، — تمام دواؤں کو رات میں بھگو دیں اور صبح کو ضعیف جوش دے کر چھان
 کر گھنڈہ حسی ۵ گرام حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، — جب نفع کے

آثار نمایاں ہونے لگیں تو درج ذیل نسخہ مسہل کا اسی منفع میں اضافہ کریں۔

نسخہ مسہل بلغم :-

ترید نجوق غراشیدہ ۵ گرام، غارلقون مغربل ۲ گرام، سنار کی ۱۲ گرام، مغز قلوں
خیار شبنم ۸ گرام، شکر سرخ ۵ گرام، حسب دستور نسخہ مذکورہ بالا میں شامل
کر کے دو غن بید انجیر ۱۲ ملی لیٹر حل کر کے نوش کرائیں، دوسرے دن یہ نسخہ تہرید ہیں،

نسخہ تہرید :-

گلفندہ آفتابی ۲۵ گرام، عرق بادیان ۵۰ ملی لیٹر میں حل کر کے مل چھان لیں اور
تخم ریاح ۳ گرام چھڑک کر نوش کرائیں،
منفع بلغم کے طور پر بعض اطباء یہ نسخہ تجویز کرتے ہیں،
تخم کرفس، اصل السوس، انیسون، ہر ایک ۵ گرام، بادیان، بادرنجبویہ، بکور، برگ شاہترہ
سورنجان، ہر ایک ۵ گرام، بسفاج، یخ کبر، ہر ایک ۱ گرام، تمام دواؤں کو
پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں اور گلفندہ حسلی ۳۵ گرام حل کر کے نوش کرائیں،
تفقیہ کے لیے یہ نسخہ مفید ہے،

بیلہ کلاں، زردچوب، نمک لاہوری، ہموزن پس کر شیرہ خنظل میں کئی دن
کھل کر لیں اور جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ۳-۵ گولی کھلائیں اور تین گھنٹے بعد مرغز کھجری
کھانے کی ہدایت کریں۔

○ خون / صفراء کی صورت میں نفج کی غرض سے یہ نسخہ استعمال
کرائیں،

نسخہ منفع :-

تخم کاسنی، یخ کاسنی، گل بنفشہ، شاہترہ، تخم خیاریں، پر سیاوشاں، گل سرخ،
ہر ایک ۵ گرام، بادیان، یخ بادیان، گکاذربان، تخم خنظل، ہر ایک ۳ گرام، حناب ۱۰ عدد،
موہن منقی ۲ گرام، تمام دواؤں کو رات کے وقت نیم گرم پانی میں بھگو دیں اور

صبح کو خفیفہ جوش دے کر مل چھان کر گلابد سسلی ۲۵ گرام ملا کر نوش کرائیں، ————— جب
نفیج کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو یہ نسخہ سہل استعمال کرائیں،

نسخہ سہل :-

ہلید سیاہ، تربد موصوف، افیتھون ہر ایک ۴ گرام، غار یقون مغربل ۲ گرام، زنجبیل
۲ گرام، تخم قرطم، سنار کی، ہر ایک ۱۲ گرام کو پانی میں جوش دیں اور مغز فلوس خیابا رشبہ
۵۰ گرام، تربجیسی ۲۵ گرام، روغن بادام ۵ ملی لیٹر، حسب دستور ملا کر مل چھان کر نوش کرائیں۔

① ————— تنفیج کے بعد درج ذیل نسخہ جات استعمال کرائیں،

سور بنجان شیریں، صبر زرد، پوست ہلید زرد، برگ سنار کی، ہر ایک ۱۲ گرام، —
تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر لعاب گھیکوار میں چھنے کے برابر گولیاں بنائیں
اور ۳ گرام استعمال کرائیں،

سور بنجان شیریں، وج ترکی، مخلور سبز، گوکھرو، نمپور، دار ہلد، دار فلفل، اسپند
پوست بول کہنہ، ہر ایک ۹ گرام، برگ راسن ۱۲ گرام، ————— تمام دواؤں کو
پانی میں جوش دیں اور درج ذیل دواؤں کا سفوق اس میں ملا کر جھگی پیر کے برابر گولیاں
بنائیں اور ایک گولی صبح، شام کھلائیں، ————— تربد سفید جوف، برگ سنار،
پوست ہلید زرد، پوست ہلید سیاہ، ہر ایک ۳۵ گرام، یخ کبر، زنجبیل، ہر ایک ۱۸ گرام،
نور ۲۸ گرام، مقل ازرق ۳۰ گرام، مصطکی ۱۸ گرام کو پس کر ملائیں۔

سور بنجان ایک محرام باریک پس کر اطرافل صغیر ۱۲ گرام میں ملا کر کھلائیں اس کے بعد
عرق شاہترہ ۵، ملی لیٹر نوش کرائیں،

سنار کی ۳۵ گرام، سور بنجان ۱۸ گرام، شیطر ج ہندی ۹ گرام، زعفران ۵۰۰ گرام،
تمام دواؤں کو باریک پس کر ہوزن نبات سفید ملا کر سفوق بنائیں اور ۲ گرام
بمراہ آب نیم گرم کھلائیں،

سور بنجان شیریں ۳ گرام، مصطکی روحی ۵۰۰ گرام، نمک لاہوری ۳۰ گرام، زنجبیل،
بادیان، گل سرخ، گل بخت، دیوند جینی، ہر ایک ۵ گرام، ————— تمام دواؤں کو کوٹ
پس کر سفوق بنائیں اور ۲ گرام، ہمراہ آب نیم گرم، رات کو سوتے وقت کھلائیں، —————

○ خارجی طور پر درج ذیل دوائیں مفید اور مجرب ہیں،
 پنج کبر، عاقر قرحا، پلودینہ، ہر ایک ۱۲ گرام، عصارہ قثار الحار ۶ ملی لیٹر، حب القارہ ۶۰
 گرام، تمام دواؤں کو شراب میں پیس کر لگائیں،
 موم خام کو روغن ایدس میں پگھلا کر مرخدان ملا کر لگائیں،
 شیطرح، پنج راسن کو پاؤں میں پیس کر لگائیں،
 برگ شبت، برگ کرملہ، برگ نیم، برگ تنباکو، برگ دھتورہ، برگ مدار، برگ
 سنبھالو ہوزن، ہر ایک کو چوڑ کر ۳۰ ملی لیٹر پانی نکالیں اور اسی قدر روغن کنجد اور ۲۰۰
 ملی لیٹر آب باراں (بارش کا پانی) ملا کر جوش دیں، جب صرف روغن رہ جائے تو صاف کر کے
 روغن گل ۱۲۵ ملی لیٹر ملا کر دوبارہ جوش دیں اور سورنجان تلخ، بزرالینج، گل بالونہ، قسط تلخ،
 ہر ایک ۸ گرام، مصطکی ۱۲ گرام، میسرہ یا بسہ، جند بیدستر، ہر ایک، گرام میں کر ملائیں اور مقام
 درد پر مالش کریں۔

آرد منڈوا، آرد باجرہ، ہر ایک ۱۰ گرام، قند سیاہ ۱۲۵ گرام، روغن بید انجیر ۵ ملی لیٹر،
 حسب دستور حلوا بنائیں اور تخم جلد، تخم کتاں، تخم شبت از بخیل، بزرالینج، ہر ایک ۱۴ گرام،
 بالونہ، سورنجان تلخ، کبوتر کجری، قسط، ہر ایک ۵۰ گرام، تمام دواؤں کو
 باریک کر کے شراب کہنہ ۵۰ ملی لیٹر ملا کر، درد کے مقام پر مناسب روغن لگا کر یہ دوائیں گرا
 باندھیں،

قسط تلخ ۲۵ گرام، صبر بادیان، ہر ایک ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر
 گھسکار کے گودے میں ملا کر نیم گرم لگائیں،

فرغون، مصطکی، دارچینی ہوزن کو باریک پیس کر روغن زیتون میں حل کر کے لگائیں،
 حرف، خردل، پوست پنج کبر کو آب مرزنجوش میں باریک پیس کر لپیٹ کریں،

○ آبلہ ڈالنے یا نمر کے طور پر درج ذیل ادویہ استعمال کرائیں،
 بید انجیر / ناگ پھنی (زقوم) کا دودھ مقام مرض پر لگائیں،

بھلاواں کا دودھ لگائیں، اور زخم کو کچھ دنوں تک مندمل
 نہ ہونے دیں،

○ تصفیہ خون کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

عشبه مغربی، بسفاج قسقی، اقیتمون ولایتی، دارچینی، گاؤ زبان، ہر ایک ۵۰ گرام،
 چوبہ چینی، گل سرخ، صندل سرخ، صندل سفید، ہر ایک ۱۲ گرام، جلید سیاہ، ۱ گرام،
 پوست زرد ۶ گرام، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر شکر ۵۰۰ گرام، شہد
 ۵۰۰ ملی لیٹر کے قوام میں معجون بنائیں اور ۱۲ گرام ہمراہ عرق عشبه ۵۰۰ ملی لیٹر نوش کرائیں۔

○

Learn Unani By Abdul Waris Salman

* اورام مغابین

BUBOS

اس مرض میں بغل اور کچ ران کی غدود میں دم پیدا ہو جاتا ہے، تاہم مرین کو بخار نہیں ہوتا نہ ہی مغابین کا یہ دم طاہرہی علامت کے طور پر رونما ہوتا ہے،

اسباب

- (I) اعضاء دہیسہ کا، ردی، فاسد، مادے کو مغابین کی طرف دفع کرنا اور ان غدود کے نرم اور نازک ہونے کی وجہ سے ان مواد کو جلد قبول کر لینا،
- (II) طبیعت کا، ان مادوں کو بحران انتقالی کے طور پر مغابین کی طرف دفع کرنا،
- (III) قریبی اعضاء کے زخم / دم
- (IV) اقلہاء / جوشش خون
- (V) آتشک

علامات

غد متورم ہو جاتے ہیں اور ان میں شدید درد بھی سوزش بھی ہوتی ہے، دم عام طور سے جلد کے رنگ کا ہی ہوتا ہے لیکن ردی مواد اگر صفراوی یا دموی نوعیت کا ہو تو سرخی بھی ہو سکتی ہے، اور کچہ دنوں بعد دم بالکل تحلیل ہو جاتا ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا

» اس کو خیارک، بد بھی کہتے ہیں،

ہے، ————— شدید سردیوں میں دم، متفرج بھی ہو سکتا ہے۔

اصول علاج

- ————— حسب ضرورت فصد کھولیں،
 - ————— منفع و مسہل کا اصول اختیار کریں،
 - ————— جو نمکیں لگائیں،
 - ————— مسکنات درد استعمال کرائیں،
 - ————— تسکین حرارت کی تدابیر کریں،
 - ————— مریضیات (ورم کو ڈھیلہ کرنے والی دوائیں) اور عملات منفعیات
- منفورات استعمال کرائیں،

علاج

- ————— امتلاء بدن اور درد کی شدت کی صورت میں فصد کھولیں اور
- ————— متاثر حصہ پر جو نمکیں لگائیں۔
- ————— منفع اور مسہل کے طور پر یہ نسخے استعمال کرائیں،

نسخہ منفع صفراء :-

حل بنفشہ، گل سرخ، حنب الثعلب، شاہترہ، تخم خطمی، تخم کاسنی، نیکوب، ہر ایک
 ۵ گرام، گل نیلوفرہ گرم، آلو بخارا، عناب، ہر ایک ۵ عدد، تمام دواؤں کو
 رات کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقد آفتابی / خمیرہ بنفشہ ۵ گرام
 حل کر کے دوبارہ چھان کر نوش کرائیں، جب نفع کے آثار نمایاں ہو تو یہ نسخہ
 استعمال کرائیں،

نسخہ مسہل صفراء :-

مذکورہ بالا نسخہ منفع میں گلقد کی مقدار ۵ گرام کریں اور مخز قلوں یا شہرہ گرم،

ترنجبین خراسانی، ترہندی مقشتر، ہر ایک ۵۰ گرام کورات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر شیرہ مغز بادام ۵ عدد، پانی میں نکال کر مذکورہ نسخہ نفع کے ساتھ نوش کرائیں، پیاس کے وقت عرق کاسنی اور عرق کور، وغیرہ نوش کرائیں، دوسرے دن تبرید کی غرض سے یہ نسخہ استعمال کرائیں،

نسخہ تبرید :-

عاب بہدان ۳ گرام پانی میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر حل کر کے اسپنول مسلم ۶ گرام چھڑک کر نوش کرائیں۔

○ تسکین حرارت کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں

عاب بہدان ۳ گرام، شیرہ غناب ۱۰ عدد، عرق شاہترہ ۵۰ ملی لیٹر میں نکال کر نوش کرائیں۔

مکور خشک ۲۵۰ گرام، پانی ۶ لیٹر میں بھگو دیں اور ۳ لیٹر عرق کشید کر کے ۱۲۰ ملی لیٹر نوش کرائیں، کسی شیریں چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں،

○ مرخی اور محلل کے طور پر یہ نسخہ استعمال کرائیں، خطمی، بنفشہ، تخم کنوچہ، ہوزن، تمام دواؤں کو پیس کر روغن بنفشہ اور موم میں خوب ملائیں اس کے بعد متاثرہ جگہ پر رکھیں۔

تخم حلبہ، عنب الثعلب، تخم کتاں، ریوند چینی، ہوزن، تمام دواؤں کو باریک پیس کر آب برگ مکور میں ملا کر لگائیں۔

جدوار خطائی، زراوند، طویل، دونوں کو گھس کر پیس کریں۔ ریوند چینی باریک پیس کر بنیر بھا جونا ملا کر شہد اور سفیدی بقیہ مرغ میں ملائیں اور کپڑے پر لگا کر مقام ورم پر رکھیں اور حرارت پہنچائیں، جب کپڑا خوب چپک جائے تو چھوڑ دیں، ۲، ۳ دن میں ورم تحلیل ہو جائے گا۔

خمیر کا آٹا ۳ گرام، برگ حنا باریک کردہ ۴ گرام، نمک طعام ۳ گرام، تمام دواؤں کو پیس کر روغن گل ۳ ملی لیٹر میں ملائیں اور آب برگ کو، سبز عرق گلاب میں حل کر کے مناد کے طور پر استعمال کرائیں،

بیخ درخت پیلو کو پانی میں گھس کر مناد کریں۔

اکیل الملک، تخم ریحاں، دھنوں کو پانی میں پکا کر مناد کریں،
صندل سرخ، فوغل، شیا ف مائیشا، صبر، زعفران، مرکئی، ہموزن۔
تمام دواؤں کو عرق گلاب میں گھس کر مناد کریں۔

○ منفع کے طور پر (مادہ کو پکانے کے لیے) یہ لادویہ خارجی طور پر استعمال کرائیں،

آرد جو، آرد برنج، آرد حلبہ، تخم سن، ایلوا، تمام دواؤں کو پیس کر دودھ میں پکائیں اور مناد کریں،

گوگل، صابن، سین پھل، تینوں کو باریک پیس کر مناد کریں۔
برگ گھیکوار کا بالائی پرت دور کر کے اس پر پھٹکری، زرد چوب
بادیک پیس کر چھڑکیں اور مقام ورم پر باندھیں۔

تخم حلبہ، تخم کتاں، مغز تخم تر ہندی ہموزن، تینوں کو کوٹ
چھان کر گائے کے دودھ میں پکا کر مناد کریں۔

○ ورم کے انفجار (پھارنے) کے لیے یہ نسخہ استعمال
کرائیں،

نیلا تھوٹھ ایک گرام، ہلدی، رال، ہلون، ہر ایک ۲ گرام، گوگل ۳ گرام،
قند سیاہ ۱۲ گرام، تمام دواؤں کو باریک پیس کر قند سیاہ میں
ملا کر نیم گرم مناد کریں۔

برگ نیم، نمک سنگ، دیوند چینی، ہلون، گوگل، مین پھل، چوکر، صابون،
ہلدی، تمام دواؤں کو پیس کر نیم گرم مناد کریں۔

گوگل زرد، دیوند چینی، بہر وہ خشک، پنچال کو تر صمرائی، تمام دواؤں

کو پیس کر شہد میں ملائیں اور کپڑے پھر رکھ کر ودم پر لگائیں اور حرارت پہنچا کر خوب اچھی طرح چپکادیں۔

○ ————— زخم بھرنے کے لیے (مدقل کے طور پر) یہ نسخہ استعمال کرائیں،
 مال، گل ہرمزی، ہر ایک ۲۱ گرام، توتیا سبز ۲۵ ملی گرام، ————— تمام دواؤں
 کو روغن کجد میں خوب سحق کر کے مریم کی طرح بنائیں اور زخموں پر لگائیں،
 کات سفید، کافور، مردار سنگ، سنگجراحت کو باریک پیس کر روغن کجد میں حل
 کر کے لگائیں۔

○ ————— آتشک کی صورت میں اس کا علاج اختیار کریں۔



Learn Unani By Abdul Waris Sultan

Learn Unani By Abdul Waris Salman

مصادر

- — اختیارات قاسمی
ڈاکٹر اقبال احمد قاسمی
پاٹلی پتر ایجوکیشن، سبزی باغ، پٹنہ — ۱۹۸۷ء
- — اکسیر اعظم (جلد سوم)
حکیم محمد اعظم خان
مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ، — ۱۹۰۷ء
- — اصول طب
حکیم محمد کمال الدین حسین ہمدانی
لیتھو کلر پرنٹرس، علی گڑھ، — ۱۹۸۰ء
- — امراض الاطفال
حکیم نور شیدا احمد شفقت اعظمی
سپریم آفسیٹ، مالویہ نگر، نئی دہلی، — ۱۹۸۹ء
- — بیاض کبیر (حصہ دوم)
حکیم محمد کبیر الدین
شوکت بک ٹریڈ، شوکت بازار، اندرون شاہ در سگٹ بھارت،
۶۸-۶۹

- ————— تجربات طبیب
حکیم محمد سعید
نوید پرنٹنگ پریس، ناظم آباد، ————— کراچی، ۱۹۸۳ء
- ————— ترجمہ کبیر (جلد سوم)
حکیم محمد کبیر الدین
اسلامی پریس، بازار نور الامراء، حیدرآباد دکن، ۱۹۵۰ء
- ————— ترجمہ کبیر (جلد چہارم)
اسلامی پریس، بازار نور الامراء، ————— دہلی، ۱۳۶۹ء
- ————— حیمات القانون (اردو ترجمہ)
عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا / حکیم محمد کبیر الدین
کوہ نور پرنٹنگ پریس، ————— دہلی، ۱۹۵۹ء
- ————— جامع العلاج
حکیم انیس احمد صدیقی
لاہور آرٹ پریس، ————— لاہور، ۱۹۵۸ء
- ————— حیمات اجامیہ
حکیم محمد کبیر الدین
محبوب المطابع پریس، ————— دہلی، ۱۹۳۳ء
- ————— الحاوی الکبیر فی الطب (جلد ۱۳-۱۲)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن، ۱۹۶۳ء
- ————— الحاوی الکبیر فی الطب (جلد ۱۵-۱۴)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن، ۱۹۶۳ء

- ————— الحاوی الکبیر فی الطب (جلد ۱۷-۱۶)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ ————— حیدرآباد دکن ۱۹۶۲ء
- ————— الحاوی الکبیر فی الطب (جلد ۱۸)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن ————— ۱۹۶۵ء
- ————— الحاوی الکبیر فی الطب (جلد ۱۹)
ابوبکر محمد بن زکریا الرازی
مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ ————— حیدرآباد دکن، ۱۹۶۶ء
- ————— خزائن الطب
ڈاکٹر محمد نصیر الدین
لاہور
- ————— خزینۃ العلاج
حکیم محمد عبدالعظیم
مطبع مجتہائی ————— لکھنؤ، ۱۹۰۹ء
- ————— دہلی کے منتخب مرکبات
حکیم رام بیچایا
اعلیٰ پریس ————— دہلی ۱۹۷۹ء
- ————— ذخیرہ خوارزم شاہی (الدو ترجمہ) جلد ۵-۹
سید اسماعیل جرجانی / حکیم ہادی حسین خان
مطبع منشی نول کشور ————— لکھنؤ ————— ۱۲۹۹ھ
- ————— رہنمائے تشویش
حکیم احتشام الحق قریشی
نظامی پریس لکھنؤ ————— ۱۹۸۸ء

- — سریریات
حکیم سید محمد حسان نگرانی
نیو پبلک پریس، دہلی، ۱۹۸۸ء
- — طفیلی اجسام
حکیم مرزا عبد النور بیگ
سرفراز پریس، —، لکھنؤ، ۱۹۷۳ء
- — طب اکبر
حکیم محمد اکبر ارزانی
ہندو پریس، — ۱۲۸۱ھ
- — عمل طب (ٹیلرز پریکٹس آف میڈیسن)
ای۔ بی۔ پولٹن / ڈاکٹر محمد عثمان، ڈاکٹر قلام دستگیر
دارالمطبع، جامعہ عثمانیہ سرکار عالیہ، حیدر آباد دکن۔ ۱۹۴۵ء
- — فروق الامراض
حکیم نذیر الدین احمد
محبوب المطابع برقی پریس، — دہلی، ۱۹۳۸ء
- — کتاب الحیات
حکیم سید علی حیدر جعفری
لیتھو کمر برنٹرس، — علی گڑھ، ۱۹۷۸ء
- — کامل التشییص
ڈاکٹر صادق حسین
حمایت الاسلام پریس، ریلوے روڈ، — لاہور، ۱۹۸۱ء
- — کامل المصنوعہ (اردو ترجمہ) جلد اول و دوم
ابوالحسن علی بن العباس الجوسی / غلام حسنین کنتوری
مطبع منشی نول کشور، — لکھنؤ، ۱۸۸۹ء

- ————— کتاب الکلیات (اردو ترجمہ)
 ابو الولید محمد بن رشد / سی۔ سی۔ آر۔ یو۔ ایم
 نیو یارک پریس، ————— دہلی، ۱۹۸۶ء
- ————— فردوس الحکمت
 ابو الحسن علی بن سہیل بن الطبری / حکیم رشید اشرف ندوی
 ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، ————— کراچی، ۱۹۸۱ء
- ————— القانون فی الطب (جلد ۴)
 شیخ الرئیس ابن سینا
 مطبع نامی، لکھنؤ، ۱۹۰۵ء
- ————— مخزن حکمت (جلد اول)
 حکیم غلام جیلانی
 مفید عام پریس، چٹرجی روڈ، لاہور، ————— ۱۹۳۱ء
- ————— مخزن حکمت (جلد دوم)
 حکیم غلام جیلانی
 کھنڈ لیتھو پریس، دہلی، ————— ۱۹۵۷ء
- ————— مہیت الامراض
 حکیم محمد شریف جامی
 مصباح الحکمت موسوم بہ دستور العلاج
- ————— حکیم محمد فیروز الدین
 دار الکتب، رفیق الاطباء، اندرون عجمی دروازہ — لاہور، ۱۹۳۹ء
- ————— رسالہ الحکیم نومبر، دسمبر ۱۹۳۲ء
 لاہور :-

A Hand Book of Medical Treatment

by L.K. Ganguli

Academic Publishers

5A, Bhabani Dutta lane

Calcutta 1978

A Synopsis of Infections And

Tropical Diseases

by A.W. Woodruff, S. Bell

Great Britain, by Henry Ling Ltd 1978

Davidson's Principles And Practice of Medicine

by Jhon Macleod

E.L.B.S. Edition 1979

Differential Diagnosis

by L.C. Gupta S.R. Gupta

Printed at P.L. Printers,

R.P. Bagh, Delhi 1989

Fever From Symptom To Treatment

by Manuel M. Villaverde

Wright Macmillan

Van Nostrand Reinhold Company

New York

Lecture Note on the Infectious Diseases

by Jhon F. Warin, Alastair

G. Ironside, Bibhat K. Mandal

Great Britain Bell And Bain Ltd.

Glasgow 1983

Medicine For Students

by A.F. Golwalla

India Printing Works

9, Nagindas Master Road Extension I

Fort Bombay 1975

Oxford Text Book of Medicine

by D. J. Weatherall, J.G.G.

Ledingham, D.A. Warrell

Oxford University Press

E.L.B.S. Edition 1985

Practice of Dermatology

by P.N. Bhehl

Allied Book Agency

Calcutta 1982

Roxburgh's Common Skin Diseases

by Peter Borrie

E.L.B.S. Edition 1975

❖ ❖ ❖

FINAL